



Del Medico Ignario ~~del~~.

L7BO.

~ ~

~
pag. 10. 11.

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as "C. J. ...".

1880

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as "H. ...".

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as "J. ...".

Antiqua Medicinae Libri

AETII MEDICI

GRAECI CONTRACTAE EX

VETERIBVS MEDICINAE TETRABIBLOS,

hoc est, quaternio, siue libri uniuersales qua-
tuor, singuli quatuor sermones com-
plectentes, ut sint in summa

quatuor sermonum

quaterniones,

id est,

Sermones sedecim, per Ianum Cornarium

Medicum Physicum Latine

conscripti.



*Acceſſerunt in duos priores libros (quos de Simplicibus ſcripſit)
Scholia, rei medicae ſtudioſis plurimū profutura, per Hugonem
Solerium Sanionenſem, Medicū, nunc primum in lucem edita.*



Handwritten signature and date: 1723

LVGDVNI,

EX OFFICINA GODEFRIDI

ET MARCELLI BERIN-

GORVM FRATRVM,

M. D. XLIX.

Handwritten signature at the bottom of the page.

ARTI MEDICI

GRATIS CONTRA FAX

VERITAS MEDICINAE VERITAS

habet quatuordecim libris in unum

et singulis annis in unum

placuit, ut in unum

quatuordecim

quatuordecim

idem

et singulis annis in unum

placuit, ut in unum

quatuordecim

idem

et singulis annis in unum
placuit, ut in unum
quatuordecim libris in unum



LIBRARI

IN OFFICINA GODFREDI

ET MARCELLI HERING

IN ROMA

M. D. C. C. C.

Handwritten signature or note at the bottom of the page.

AMPLISSIMIS AC

PRVDENTISSIMIS HONESTIS-

SIMISQVE VIRIS, SENATVI, POPVLOQVE

IMPERIALIS VRBIS FRANCFORDEN.

IANVS CORNARIVS ME-

DICVS. PHYSI-

CVS S. D.

*



ET IVM medicum Gracum iam decennium quum uertendum suscepissem, multum operæ precij mox ab initio facere mihi uisus sum. Tametsi enim fragmentum tantum, ueneranda tamen illud uetustatis, mihi obtigisset, attamen ex eo ipso colligebam non uulgare aliquod consilium illi uiro fuisse, sed institutum penitus optimum, & ab omnibus approbandum, totam uidelicet medicinam in breues quasdam summas contrahendi. Erat autem tum mihi, sicut plerisque omnibus autor ignotus, nisi quod Asulanorum apud Venetos familia, Græci exemplaris editionem pollicita erat, ante Hippocratis, & Galeni operum editionem. Itaque etiam si fragmentum illud meum sex sermonum, ab octauo usque ad decimum tertium, contemptibile uideri poterat, ut in publicum ederetur: & incertum esset ad quot libros uniuersales, aut sermones partiales, autor opus ipsum extendisset: tamen neutiquam suppressendum ratus inuentum thesaurum (sic enim tum mihi placebam) sex illos sermones in Latinam linguam à me conuersos edidi. Neque male successit. Nam nouum & incognitum opus studiosi benigne exceperunt, per omnem adeo Europam, ut etiam Italia uisum sit, non paruum esse incommodum, totum illum autorem non ad Latinos translatum extare. præsertim quum totum Græcum opus in aliquot exemplaribus in Italia superesset. Et tum sanè excitatus est quorundam magnorum & rectis studiis beneuolentium Heroum stimulus Baptista Montanus, non incelebris apud Veronenses medicus, qui exemplarium illorum copia confusus, & priores, & posteriores, quos ego non habueram sermones, fragmento meæ translationis adiecit: & sic translationem meam suam apud Venetos editioni inseruit. Et quia candore quodam hoc à se factum esse, in præfatione testatus est, ego uicissim illi hoc talionis uice rependam, quod studiosis cognoscendum propono: hætenus translationem illius, unam cum meâ lucem ferre potuisse. nam in posterum non erit, qui me iudice, uel meam priorem, uel illius conuersionem per omnia sequi debeat. Discipulus est prioris posterior dies. Honestissimum est certamen, non solum alios, sed etiam seipsum superare. Proinde totum opus Aetij etiam nos adepti, illud denuo ex toto conuertendum suscepimus, non tantum quod uideam, dum exemplaria alia plus, alia minus adscripta habent, unum aliquod certum sequendum esse: sed etiam ut ne amplius sit styli diuersorum interpretum in uno opere pugna. Et hoc meum consilium si Montano sequi uisum fuerit, adeo non improbo, ut ingentis candoris loco id habiturus sim, si etiam ipse totum Aetij opus ex sua interpretatione legendum edet. Quapropter meam operam non aliter studiosis approbare uolo, quam ut putent me nulla quam publici commodi causa commotum, huc progressum esse, & sincere optimum medicum emendatissimum, ac optime Latinum factum (quantum eius per me fieri potuit) inuulgasse. Tantumque abest ut in præsens eius translationem, propter meam editionem, superfluam uideri uelim, ut uehementer expetam etiam illum, totum opus de suo denuo publicare. Et nisi fallor, hæc res non tam ad illius gloriam spectat, quam publicam studiosorum utilitatem: præsertim eorum qui Latinam linguam solum nouerunt. Continget enim ipsis ex utriusque translationis collatione, ut ueram senten-

tiam assequantur. Atque utinam etiam hi qui ex Hispanis altas de montibus umbras nobis u-
trisque offundunt, & in alienis libris ingeniosi sunt, huc incumberent: ut similem, aut potiore
(qualem ostendant) operam praestarent: plenis buccis studium hominum collaudarem. Iam
quod illos facere iuuat, nemini prodesse uideo. Et reuera in quatuor uersibus, si quando ali-
quid è suo exemplari, uelut potiore citat ille, plures errores in conuertendo admittit, quam in
integro sermone prioris editionis inueniuntur. Deinde leuissima quaeque & nullius momenti
notat. Verum ubi nodus aliquis incidit, ibi transilit uelut angue conspecto, & nihil hic secat
Tenedia ipsius bipennis. Sed huc progredi nolebam. Hoc uolebam, expetendum mihi uideri,
ut & ex Hispanis Latina Aëtij translatio extaret: quò sic studiosi medici, uel aucta, uel de-
curtatam, aut etiam corruptam lectionem diuersorum Graecorum exemplarium cognosce-
rent. Hispani suum in hac parte ducem, itemque Itali suum haberent. Profecto mihi satis est, si
Germanis meis mea & placent, & prosunt. Iam uerò eiusmodi cauillationibus nihil profici-
tur, & in talibus annotationibus utcumque ueri inueniendi studium praetexitur: tamen haec sunt
ipsissima maligni ac morbidum ingenij nota. Facile est aliorum errores indicare: sed te ipsum
inculpabilem praestes, si quid simile tentes, aut etiam in his annotandis, hic opus hic labor est.
Et cognosco pennas ex corpore commentariorum meorum medicorum in Galeni uaria raris li-
bros conscriptorum, extractas, & sagittis illius adaptatas: ut uehementiore impetu in me fer-
rentur. Non enim non uidebam ipse quae mihi in mea translatione displicerent. Verum ea,
quia potioris, aut alterius exemplaris copia deerat, interim ferri posse sperabam, donec clare
à meipso iudicarentur: id quod factum est mox in relatorum commentariorum editione: in
quibus potissimos locos prioris meae in Aëtio translationis indicaui ac retractaui. Et iam
amplius fiet in huius repetitae meae translationis editione, quam ad duo exemplaria praeuia à
me conscriptam, & ad Galeni, ac Pauli lectionem collatam, in omnibus sequendam puto.
Neque curandum arbitror, si alicubi aliam exemplaria plura, uel pauciora habent, aut etiam
ordine immutato. Hoc enim in eiusmodi autoribus peculiariter contingere potest, ut certi loci
ab alijs atque alijs augeantur, aut imminuantur, dum quisque postea uel sibi approbata addit,
aut superflua iudicata detrahit. Quod ipsum fortassis etiam ab ipsis iustis scriptorum autori-
bus aliquando fieri contingit. Hanc ipsam operam meam in urbe uestra, Ueri Francforden-
à me perfectam, uobis inscriptam ac dicatam esse uolui. Nam quum alias hoc inscribendi li-
bros magnis principibus, ac urbibus munus, publice receptum sit: ego qui apud uos iam in
quartum annum medicum Physicum ago, neuiquam committere debui, ut ex scriptis meis
non eximium aliquod specime (quale sane hoc Aëtij à me Latine conscripti opus esse iudico)
urbi uestra peculiariter à me destinaretur: quò uestro grauissimo iudicio approbatum, maio-
re gratia ac autoritate in publicum exiret. Atque haud scio an post ullas alias imperij Roma-
ni urbes, uestra respublica numerari debeat, tot insignibus ornamentis praeceteris clara. Pri-
mum enim quid praeclarius urbi alicui contingere possit, quam quod urbs uestra iam per mul-
torum annorum successionem habet, aurea etiam appellata bulla sacramento roboratum?
Quod uidelicet Romanus futurus rex in sola uestra urbe, excitis è sedibus suis Romani impe-
rij electoribus, tanquam ad rem orbi terrarum imprimis, uelut etiam est, necessariam eligi-
tur, proclamatur, & ex urbe orbis rex & imperator suus innotescit? Quod si priscos histori-
cos omnes diligentissimos in hoc exquirendo, describendoque esse uidemus, ut regum ac magno-
rum principum ortus, ubicunque tandem contigerunt, tanquam locis in quibus contigerunt
clarioribus inde futuris, exacte prodant ac conscribant: & hodie in annales principum refer-
re mos est natales ipsorum locos: quod monumentum satis amplum urbi uestra statui potest?
Ad quam non unus aliquis magnus princeps, sed tam multi, tot uoluentibus annorum secu-
lis orbis imperatores, ueri ortus sui primordia referunt: maxime qui non fortuito, ac incerta
nasce[n]di

nascenti sorte ipsis contigit: uerum septem sacramento adiuratis principibus, totius Germania supremis, ob hoc Electorib. imperij appellatis, eius gratia conuenientibus, & summa fide, incorruptissimis iudicijs, firmissimaq. autoritate, noui regis Romani atq. orbis domini futuri, imò clementissimi imperatoris, ortum ac natiuitatem, hoc est electionem, orbi uniuerso salutarem pronunciantibus. At uerò, ut maximum est hoc urbis uestrae, uiri Francforden. decus, sic non minus ornamentum ex nobilissimo emporio uobis accedit, quod omnium totius Germania emporiorum maximum esse constat. Possint fortassis alijs alia quaedam emporia, aut ob mercium quarundam pleniorē ubertatem, aut uiliorem annonam, aut perpetuum emporij statum praefenda uideri. uerum ob mercium omnium aequalem apud uos copiam, mihi quidem nullum emporio uestro maius uidetur: praesertim quum duobus statis anni temporibus celebretur, quibus quisq. & sua commode aduehere ac diuendere, & aliena comparare potest, non dubito quin maiore utrinq. lucro, quàm si perpetuus emporij status apud uos exset. Quamquam si quis adeò extra statam duorum temporum oportunitatem uos adeat, reperire itidem possit & emptorem & uenditorem quarundam mercium ab ipso expetitarum. Quanta uerò commoditatis res sit, talia emporia esse ac celebrari, uel inde palam fit, quòd egentissimi sunt populi ad quos nihil peregrinarum mercium inuehitur: ut & hoc nomine insigniter celebris uestra urbs sit, quòd hanc commoditatem ex se in uniuersam ferme Europam deriuat. Atque sint haec quidem praecipua duo uestrae urbis praekonìa. Mihi uerò neque hoc leuiter ad laudem uestram pertinere uidetur, quòd mechanicarum artium opifices per omnem Germaniam, morum, consuetudinum & rituum, unicuique arti peculiariū praescripta ac rationes, ex uestra republica uelut optime instituta, aut primum petunt, aut si prius habent, ex uestris emendant, ac confirmant. Quid uerò an non praedicandum uel imprimis erat, quòd artis gladiatoriae apud Graecos ac Romanos olim celeberrimae, hodie uerò ubique exoletae ac interceptae, nulla totius orbis parte tam insignia uestigia restant? Quum enim gymnastices partes pleraque omnes hodie sublatae sint. Nam neque in usu sunt tam frequentia & priscis adeò quotidiana balnea. Neque defrictiones ex oleo quotidianas, aut ullas aliquas ualitudinis conseruandae gratia hodie corporibus adhibemus. Et palaestra ferè tota intercidit, ut etiam strigmentorum ex balneis, & palaestra ueteribus medicis petitorum, aequè materia atq. usu careamus: gladiatoria ars apud uos non tantum praeclare exercetur, sed eam exercentibus etiam praemia constituta sunt: & in ea praecellentes gladiatoriae artis magistri publicè creantur. At uerò quàm utilis res sit humanis corporibus, imò etiam animis gymnastice, cuius pars est & ipsa gladiatoria: uel maxime ab ipso omnium studiorum doctissimo Galeno, in libris salubrium, siue de sanitatis tutela declaratur. Quin idem ad Thrasibulum scribens dubitare audet, num ad medicinam, aut gymnasticen pertineat sanitatis tutela: intantum uidelicet commodat apta corporum exercitatio, ut non minima pars artis tutelarīs sanitatis ipsa gymnastice existat. Atq. hoc sane modo, idem fuerit optimus medicus, qui optimus corporis exercitator, ad sanitatem uidelicet conseruandam: quem Graeci significantissime non medicum, sed *ὑγιαίνων*, hoc est, sanitatis tutorem appellant. Quare minus mirum mihi uidetur, fuisse semper, & esse adhuc honoratissimam apud uos artem medicam curatiuam: quum uideam etiam superesse apud uos ferè solos, aut certe non alios quàm qui à uobis transumpserunt, artem medicam sanitatis tutelarem. Haec enim duae maximae ac principalissimae sunt partes medicinae, quarum altera *ἰατρική*, altera *ὑγιαίνων* appellatur. Quamquam autem in hoc diligentia uestra omnibus admirationi sit, ut bonos apud uos medicos semper habeatis, tamen nescio quo malo fato id fiat, ut uulgius aequè apud uos, uelut nunc ubiq. gentium, ferme pessimos sequatur, hoc est, ut ego puto, sui similes. An autem hoc ex reipublicae utilitate sit, indiscriminatim quosuis ad medicinam publice exercendam admittere, id quod apud uos


uelut

uelut in libera urbe, omnibus liberum est, ampliore consideratione opus habet. Illud certe magna laude præ omnibus Germania urbibus facitis, quod tot medicos, quot nulla alia, publico salario alitis. Par est, aut etiam amplius, studium uestrum in conseruandis bonarum literarum, ac artium studiis. Nec desunt uobis præceptores, uel maximis scholis pares. Quin & celeberrimos multos respublica uestra habet Iurisconsultos, quibus omnibus tum in iure dicendo, tum etiam priuatim quibusuis ad consulendum publicis constitutis stipendijs utimini. Quod uero maximum est, pietatis studia, & renascentem uera Christianæ religionis cultum tanta prouehitis moderatione, ut etiam ipsis uera pietatis aduersarijs admirationi sitis, dum uident, ac audiunt populum à uerbi ministris ac doctoribus placate edoceri, & sedatis animis populum de sacris concionibus ad suas functiones obeundas abire, & à neutra parte tumultus cieri. Quæ res summam magistratus prudentiam declarat. Vulgo dicitur, Qualis princeps, talis populus. Sed egregie dixit pœta ille: Mobile mutatur semper cum principe uulgus. Quare amplissimi senatus imaginem, uel in ipso populo spectare apud uos licet. Sed heu cladem ingentem illam, ex quo magno illo, reipublica uestra principe orbatu estis PHILIPPO Forstbergero, in omnibus bonis studiis, ac uirtuosis actionibus uiro admirando. Cuius ego priuatus priuatim, & amore, & admiratione adhuc ita afficior, ut eius sine suspirijs nunquam, sepiissime etiam lacrymis obortis, mentionem facere possim. Quanto magis putandum est uos uestrum uulnus sentire, à quorum corpore ille resectus est? Erat uir eius ætatis, ut recte immatura morte ereptus dici possit, sexagenario propior quàm quinquagenario. Sed corpus uegetum aderat, ac animus uiuidus, ingenium acre, iudicium exactum, mores mansueti, sermo suauis. Et in summa, natura ad benefaciendum omnibus, neminem ledendum nata, quod quò rarius est, eò maiorem laudem in magistratu meretur. Utraque in super callebat linguam, Græcam supra mediocritatem, Latinam, ut cum magnis professoribus certare potuisset: quod aliquot ipsius ad me scriptæ epistolæ testantur. Et quum tota uestra respublica ex eo penderet, & perpetuis senatus curis grauaretur, tamen quantum succisui temporis suffurari poterat, id totum conuertebat ad optimorum autorum lectionem. Et hoc tempore præter reliqua, totum Homerum Græcum perlegendum, ac conferendum susceperat. Hæc facientem superioris æstatis inauditus Germanis æstus corripuit, & ardentissima febris abripuit: quam eodem tempore in me sæuientem summa difficultate ego uix à me reieci. At siue bonorum usum nobis non fauent inuida fata, uelut pœtis quibusdam placuit: siue ostendit deus magis quàm tradit optimarum rerum fruitionem: profecto uestrum luctum priuatus meus dolor proferre cœgit: quo optimi, ac sapientissimi uiri obitus reuera reipublica uestra immaturus, à me publice deplangeretur. Videor tamen mihi aliquanto leuius ferre illius ad meliorem uitam translationem, quum considero qualia reipub. decora post se reliquit, generos suos, uirum omnibus bonis studiis fouendis, ac prouehendis natum Iustinianum ab Holtzhusen. Et soceri uestigijs innitentes, ex ueteri familia ad Iuuenes appellata, Orthonem, ac Danielelem. Nec desunt alij egregij uobis uiri, qui certatim conentur, ut sincera pietas uigeat, & literarum, ac bonorum studiorum honos perstet, ac conseruetur. Sed quorsum tandem hæc omnia? Nimirum quum in urbe uestra uiuo tot insignibus decoris celebri, ut uidear uirtutis uestræ aliquam rationem habuisse, dum & grauiissimis iudicijs uestris approbatam hanc operam meam uideri uolo, & uicissim meam erga uos uoluntatem declarare cupio: quò utraque re cognita, studiosi rerum medicarum hoc Aëtij opus à me Latine conscriptum, alacrius excipiant, auidius perlegant, studiosius sequantur, & medicando de humano genere bene mereantur. Quod ubi continget, non dubito quia intelligent hoc uestrum uiri Francforden. beneficium esse, quò tantum autorem, insignem medicum, in publicum usum editum habent. Crede mihi quisquis es rerum

rerum medicarum studiose, sit totum Galenum contractum, sit totum Oribasium explicatum, si Paulum ampliatum, si omnes ueterum speciales, tum per phramaca, tum per chirurgiam aggressiones, ad omnes affectiones, in summa habere uoles, Aetium habes, unde totum hoc petere, ac ferre potes. Neque refert an sit Aetius ille Hæresiarcha, aut alius quispiam Amidenus Opsicij comes, uelut quadam exemplaria præscriptum habent. Certe Aetium hæresiarcham uarijs artibus instructum fuisse, & philosophicis Aristotelicis ratiocinationibus ingenium exercitatum habuisse, D. Epiphanius abunde declarat, in opere contra Octoaginta hæreses, quod item recens in Latinam linguam transtulimus, ut fieri potuerit, eum etiam medicinam tractasse. Nam quod comitis dignitas recentior sit, quam ut Aetio hæresiarchæ competat, penitus falsum est. Habet enim, iam citatus à me D. Epiphanius, Comitum appellatione ac dignitatem sub ipso Constantino Magno receptam. Et Iosephum quendam à Iudæo Christianum factum, ea dignitate à Constantino Magno donatum tradit. Potuit igitur fieri, ut aurifaber usque ad perfectam ætatem Aetius, & postea ad Aristotelicæ philosophiæ studia progressus, & deinceps à Georgio Alexandrino Diaconus constitutus, tandem per principem aliquem Opsicij comes factus sit, & ut uir philosophiæ doctus, hoc opus ex ueteribus Medicis collegerit. Sed nihil pronuncio, neque quicquam refert. Ceterum quod ad operis totius diuisionem attinet, manu scriptum exemplar meum habuit τετραβιβλος inscriptionem, ante aliquot sermones partiales. Velut uerbi causa, ante nonum sermonem, Ἀρχὴ τῶ θ. λόγου Αἰτίου, πρῶτος τῆς τρίτης τετραβιβλῶς. Et ante sermonem XIII. Ἀρχὴ τοῦ λόγου Αἰτίου, πρῶτος τῆς ἑτέρας τετραβιβλῶς. Quam rationem sequutus, totum opus in quatuor Tetrabiblos, hoc est quaterniones uniuersales, singulos quatuor sermones siue libros partiales continentes distinxī, uelut autorem ipsum ab initio fecisse apparet. Porro quod superest precor, ut & uobis, uiri Francforden. ex huius operis editione merita gloria, & studiosis lectionis ac imitationis fructus contingat. Mihi satis est, si in huius Dramatis actu non penitus (quæ quorundam malignorum ingeniorum improbitas est) fuero ex scena ac theatro explosus. Valete. Francfordiæ, Calend. Nouembrib. Anno Christi M. D. XLI.

Errata in Annotationibus.

- In Acoro, penultima capitis linea, flabe, lege, flambe.
- In Aconito, linea 49. complicatis, lege, complicatas.
- In Dipsaco, διψακας, legendum.
- In Thapsia, linea 8. hapsiam, lege, thapsiam.
- In Cymino, linea ultima, appellatus, lege, appellatur.
- In Cypero, linea 12. ab ullo, lege, ab illo.
- In Ligustico, linea 6. oleus, lege, olens.
- In Malua, linea 5. quam, lege, quàm.
- In Rhu, linea 2. sumachi, lege, sumach.
- In capite 26. libri 2. femriglio, lege, smeriglio.
- Cap. 143. lin. 4. Delphinis, lege, Delphinus.
- Cap. 172. lin. 31. dysoria, lege, dysuria.
- Cap. 183. De cochleari, lege, cochlea.



CLARISSIMO ATQ.

PRUDENTISSIMO VIRO, DO-

MINO HIERONYMO MONTVO, CHRISTIA-

nissimi Galliarum Regis Henrici secundi, medico

eruditissimo & acceptissimo, Hugo

Solerius medicus.

S. P. D.

*



MEDICINAM à veteribus Gracis copiosissime traditam atq; illustratã fuisse, norunt omnes: à Gracis manasse in Arabas, qui postremã eius partem, ut diligenter excoluerunt, sic, neglectis Gracorum remedijs alijsq; minoribus inuentis, novas sibi medicaminum formulas condiderunt: quorum usum posterior ætas retinuit, approbavit, & nonnulla inuenit: quibusq; penè dixerim, solis contenta fuisse, & adhuc nunc esse uidetur. Cumq; sic ferente rerum omnium insigni uicissitudine, ab annis, plus minus, quinquaginta priorem suã maiestatem resumere, ac ueterem cultum induere cœperit: tantosq; sibi neruos ac robur nostro æuo cōpararit, ut nullo tempore celebrior magisq; culta fuisse uideri possit: mirum profectò nulli non esse debet, cur Gracorum remediorum usus, penè solus, reparata medicina antiquioris maiestate, tanquam despiciatus & inuicilis exoleuerit. Quod cum ego diligentius perpenderem, ac sedulo contemplarer, duas causas precipuas fuisse comperio: inueteratum ac contumacem usum alteram: simplicium crassam ac pudendam ignorationem: è quibus ille meticulosos minusq; audentes (nullo rerum habito discrimine) & antiquitatis studiosos: hac negligentes laborumq; ac disciplinarum contemptores homines facit. Huius itaq; calamitatis ego atq; indignitatis sedulus aestimator, cum exploratum haberem hunc uetusta dignitatis neglectum, aut dissimulari omnino, aut à quàm plurimis saltem fieri minimi: cœpi cogitare, num arte quadã ac uia certitudine fieri posset, ut cuius medicina studioso iudicare non esset difficile, an scilicet ueterum Gracorum formula in usum (si id exigeret necessitas) uocari posset: aut omnino, ob simplicium tum inopiam, tum ignorationem negligenda uenirent. Eam igitur ob causam consilij mei fuit, quendam è Gracis autoribus deligere, qui morbos omnis generis, à summo capitis uertice usque ad calcem, fuisse accuratissime, iuxta ueterum normam ac traditionem, complexus: eumq; ue, si id quidem fieri posset, tam diligenter illustrare, & modis omnibus ornare, ut hac ratione prisca medicina auctoritas illucesceret, & antiqua claritudine ac celebritate tandem donaretur. Ex ijs itaque unus Aetius dignior mihi uisus est, qui reliquis omnibus, (iuniores dico) hac in parte anteponi iure optimo debuerit. is siquidem medicinam omnem ita ex ueterum libris in unum uelut corpus ac uolumen contraxit: suoq; singula loco tam appositè collocauit & accurate distinxit, ut ingenia Galeni & aliorum uolumina hoc quasi breuiario comprahensa & disertissime explicata uideantur. Quam ob rem, ut huic tam funesta ac deploranda calamitati tandem pro uiribus reluctarer, & induc̃ta rebus ipsis noua luce, depulsaq; ue ignorantia caligine, uiam quandam ad simplicia, tum nobiliora, tum cognita (si absit qui demonstret) ualde difficilia, studiosis pararem ac uelut sternerem: è mei institui dignitate, rei publicæ literariæ utilitate esse putavi, breues, ac quantum per maximam diligentiam liceret, perspicuas in singula simplicium eius capita adnotatiunculas (& eas quidem Gracis, Latinis, officinarum ac herbariorum, Italicis, Gallicis, Delphinaricis, ac nostratum uulgaris nomenclationibus: necnon soli natalitij plantarum inuentu difficilium

A a

indica-

indicatione, illustres) conscribere: quarum ope ac familiaritate nouus lector adiutus, caligare
 in expendendis & ad uiuum dydicandis priscorum remedijs, posthac desineret, & quasi manu
 ad grauiorū πολυχρῆστον τὴν ἀρχαίαν autorum duceretur. In quibus si quid minus tersum, minus ele-
 gans, minus eruditū, minusq; compiū à Zoilis alieniq; cū laboris, tum industriæ sapidis uellica-
 toribus iudicatū fuerit, curatū tamē religiosissimè est, ne diligētia ac fides alicubi nobis deesset.
 Quapropter admonitos uelim exactiores istos, seueriorisq; notæ censes, ut terq; quaterq; no-
 stra scripta sedulo prius expendant, quàm de re, fortasse illis parū exactè cognita, temera-
 riam sententiam ferre. Accedit tum ex Galeno Aetioq; tum alijs non postrema classis ac
 nominis autoribus, ea nos simplicia adnotasse, ac, quasi digito, cōmstrasse, quæ ueterum quo-
 rundam inopiam sarcirent, & eorum loco in usum medicum admitterentur. Ceterū, ut in
 pauca tandem rem omnem contraham, nullis laboribus, nullis uigilijs, nulli deniq; rei familia-
 ris iactura, cum in conquirendis ac peruestigandis simplicibus, tum in hisce conscribendis &
 solertiore cura elimandis scholijs, pepercimus, quò ut quidam promoueretur, facilioraq; omnia
 ac expedita magis haberet. Unde, opinor, erit, quòd medicina studiosa iuuetus (eruditus enim
 & grauib; uiris hæc non scribuntur) nobis pro tot susceptis laboribus, cū se mirum in mo-
 dum adiutam senserit, aliquam se gratiam debere ingenue fateatur cū nimirum multa no-
 stris hisce (absit interim uerbo temeritas) scholijs luculenter ac dilucide explicentur, quæ è re-
 centioribus nemo adhuc satis disertè ac pro dignitate monumentis literarū mandauit. Quam-
 obrem cū tam multorum hominum iudicia mihi sustinenda uiderem: puderetq; tam mul-
 tos, tamq; uiriles & publicæ rei minimè obfuturos labores, prius quàm in aliquod discrimen
 uentum esset, suppressere: anceps quid agundum esset, tantisper animo fui, dum, superata o-
 mni suspitione, deuoratoq; inani metu, satius fore duxi, aliquid studioso homine dignum, etiā
 cum periculo, audere, quàm domi, sine fruge ac laude, segniter delitescere. In lucem igitur,
 quanquàm ancipiti Marte, prodire statui: tibiq; idcirco, doctissime Hieronyme, hæc nostra-
 rum lucubrationum primitias consecrādas existimaui, quòd his regionibus nemo hoc, exi-
 guo quidem, at non usquequaq; contemnendo, munusculo, dignior te uno uisus fuerit: tum,
 quòd tutandis, & à sugillatorum grunnitu uendicandis nobis, aptior, uigilantior, disertior,
 doctiorq; ue quisquam, uix in orbe Christiano, nedum hic, etiam graui doctorum testimo-
 nio, inueniri queat. Ceterum quem, obsecro, magis decenē celebrium medicorum congressus,
 studiosorumq; medicina fauor, quàm eū qui doctissimus medicus sit: suaq; apud reges ac prin-
 cipes autoritate plurimum possit: & ad studiosos omnes promouendos, officiosissimus ac na-
 tura propensissimus iudicetur? quiq; uanos laceſcentium insultus compescere, cla-
 uumq; clauo, si opus fiet, retundere diligentissimè norit? Accipe igitur fronte
 serena benignoq; uultu tenelli huius nostri parui, ac primogeniti opu-
 sculi patrocinium. Is enim, quanquàm uiribus adhuc, ob ætatem
 & exiguam corporis molem, imbecillis uideatur: quocunq;
 tamen ire perrexeris, dum modo benignam adiu-
 tricemq; manum non deneges, satis (quæ est
 πρὸς διμῆκτον παῖδα animositas) expeditè se-
 quetur. Vale. Lugduni,
 Calendis Maij,

HVGONIS SOLERII

MEDICI IN II. PRIORES

AETII LIBROS

SCHOLIA.

*

ἀβρότονον, Abrotonum.



ABROTONVM Græcis iuxta ac Latinis idem nomen seruat. Duū est generum: mas & foemina. mas officinis nomen retinet: Gallis aurone, aut de la garde robbe: Italis, abrotono & ueronica: Delphinatibus, de la gabieuse: nostratibus belambroys: foemina uero Gallis, Delphinatibus, & nostris, du cypres: Italis cipresso & santolina nominatur: officinis crispula. *off. c. parthenium*

ἄνισος, Vitex.

ANISUS Græcis, Latinis uiter: officinis, copulata tum Græca, tum Latina uoce, agnus castus dicitur: Italis agno casto: Delphinatibus, nostratibus, & Aquitanis pebriser, quod eius semen piperis modo acre sit, appellatur. Duo uiticis genera: altera ex purpura, candicantibus floribus, quæ & notior: purpureis altera, eaq; minus nota.

ἄνισος, Gramen.

ANISUS Græcis, gramen Latinis nominatur. Officinæ, Delphinates, nostrates & Aquitani Latinum nomen retinuerunt. Galli autem eam herbam, dent à chien, Itali gramina uocitant. Duo rum est generū, uulgare & parnasium. Quod pro parnasio uulgo monstratur, plerūq; Fuchsi centum morbia putatur. & similis ueri est, parnasium gramen hisce orbi tractibus ignotum esse.

ἄνισος, Anchusa.

ANCHUSA Græcis: anchusa Latinis. Multa anchusarū genera: Onochelos Gallis orcanete. Lycopsis officinarum cynoglossum censeripotest, & Gallorum bage. reliquæ species notæ sunt, & ex delineationibus petendæ.

ἀγάρικον, Agaricum.

Idem nomen Græcis, Latinis, & officinis habet. Galli, Delphinates, & nostrates de l'agaric, Itali agarico appellant. duo eius genera, mas, foemina, uulgaris tamen ambo notitæ.

ἀγάρικον, Ageratum.

AGERATUM Græcis & Latinis idem nomen seruat: officinis & uulgo ignotū: Italis anonymon, nostræ tamen officinæ herbam sanctæ Mariæ nominant. Nam in nostra prouincia quasi ubiq; luxuriat: sed præcipue non procul ab Aquis sextijs in uuidis & argillosis locis.

ἀδίαντον, Adiantum.

Duo adianti genera: *πολύτρυχον*, quod Theophrasto adiantum album: Gazæ Theophrasti interpreti, & officinis capillus Veneris, Italis capel uenere. *τριχόμαλον*, quod in duo genera distribuitur. Siquidem alterum Theophrasto adiantum nigrum, uulgo autem & officinis falsò polytrichū nominatur: alterum uero folijs filici effigie proximis, & uulgo simpliciter adiantū nominari solet. Ad quartum adianti genus saluiam cognomento uitam referri quidam autumant: quidam Dioscoridis empetrum uolunt, ut ut tamen res habeat, constat eam multarum ac magnarū uirium esse, ut in nostra simplicium historia, deo bene nostris cœptis fauente, dicetur.

ἀνίσων, Anzoon.

ANIZON tum apud Græcos, tum apud Latinos dicitur. etsi Latini id quoq; sedū uocent. Multa eius statuuntur genera. maius quod officinis semper uiua, nostris semper uiue: Gallis iou barbe: Italis sempre uiuo. minus Gallis de la trippe madame: nostratibus cacachet, Italis nunc uermicularia, nunc herba grassa, nunc granellofa, nominatur. Ad tertium genus referri potest officinarum uermicularis.

ἀνίσων, Aegylops.

Syluestris auena est, nostrisq; sinado fero, Italis squala, nominat.

ἀνίσων, Lolium.

Officinis nomē retinet, loglio & giolio Tuscis, alijs orzo di topi dicitur. Galli autem iurée, quod se comedentes uelut inebriet: nostrates uero iueil, nominant. uulgaris est apud omnes notitæ.

ἀνίσων, Populus nigra.

Latinum nomē officinis retinet: Gallis peuplier: Italis oppi: Longobardis pioppe: Delphinatibus un piouou: nostratibus pioua

lo, quasi populus, dici solet. uulgo nota arbor est.

ἀκανθία, Acacia.

Verā acaciam desiderat Europa: atq; idcirco eā nunc ex pruno syluestri colligunt officinæ.

ἀκανθία ὡς ὕλη, Vrtica.

Duū est urtica generū: syluestris, quæ Gallis ortie grièche, aut græche: Tuscis ortica saluatica: nostratibus ortigo barbarano, id est barbara ac syluestris: altera mitior, nomenq; citra adiunctionem seruat. Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Ainz notæ sunt.

ἀκανθία, Acantha.

Officinarum est branca ursina: Italarum branca orsina. in locis maritimis copiosissima, ut & in Gallia, prouenit. Delphinatibus inuētū rara, apud quos nusquā, nisi in hortis quibusdā uisitur.

ἀκανθία λευκή, Spina alba.

Existimatur à multis, etiam uiris doctis, ea esse herba, quam officinæ carduū beatæ Mariæ nominant: quæ, inquam, ubiq; circa urbium fossas ac rudera pinguib; locis adolescit, affatimq; luxuriat: folijs amplis, candicantibus maculis conspersis, caule breui. Dioscoridis autem spina alba folijs constat, quā albus chamæleon, angustioribus, caule procero, capite oblongo, echinato, & in montibus prouenit. Quæ rationes satis conuincunt, uulgatum officinarum carduum Mariæ (qui Italis cardo di santa maria, & herba del latte, à lacteis maculis, nominatur) spinam Dioscoridis albā nō esse. Vidi ego, in montibus Delphinatus & in ipsis alpiibus, locis asperis, cardui gen^o, qui Dioscorideæ albæ spinæ imaginem prorsus referret. Folia enim angusta erant, candida, profundis diuisuris incisa, spinosa. Caulis cubito longior, molli incanaq; lanugine intectus: intus cauus, supremo quasi loco ramosus: caput echinatum, spinis ualde horridum, oblongum, oui gallinacei magnitudine: flores, ut plurimum, candidi, nonnunquā purpurei. Radix digitalis crassitudinis, longa, foris ex flauo pallida, intus candida, gustus non insuauis, tantillum tamen adstringentis. Semen, quia nondum maturum tum esset, non obseruauit. Ex quibus notis certum est, eam plantam, ad spinam albam plurimū accedere: non tamē ausim affirmare, donec res exploratio mihi fuerit.

ἀκανθία αἰγυπτία, Acantha Aegyptia.

His regionibus desideratur, Aegypto nimirum & Asiæ familiaris: Arabibus suchaa.

ἀκόνιον, Acorum.

Ad ueterum acorum reuocat ex doctis quamplurimi galangam minorem officinarum: Alij contrā, nō galangam (quæ illis cyperus Babylonicus est) sed officinarum calamum aromaticū, ueterum acorum esse, multis ac ualidis argumentis affirmant: adeo ut hæc sententiæ uarietas difficultate minimè careat. Verū si gustum saporum (ut oculus est colorum, & reliquæ formæ) certissimum iudicem, consulamus: dubium non est, quin officinarum calamū aromaticum, ueterum acorum esse existimemus. Is siquidem non calamus est, sed radix candicās, odorata, plena, geniculis multis intercepta, gust^o acris, admixta (id quod Galenus lib. 6. simpl. in uero acoro requirit) tantilla amaritudine. Galanga autem minor quasi rubra spectatur, gustu, quā sit aromaticus calamus officinarū, acriore, citra amaritudinem, geniculis uidua. Quæ omnia conuincunt, nō galangam quidem, sed calamum aromaticum officinarū, esse ueterum acorum. Accedit calamum ex Lituania Ponti regione, non procul à Galatia, afferri, barbarorumq; lingua tartarschi zelij, id est, tartaricam herbam uocari: galanga uero nō ex Ponto, sed ex Syria Alexandriam, Alexandria Venetias, Genuam ac Massiliam ad nos importari. Postremo cōspici nonnunquā apud solidarios, calamum cum siccis folijs, quæ iridis, folijs omnino respondeant. E quibus colligere nō sit difficile, calamum aromaticum officinarum esse ueterum acorum: ueterum autem calamum aromaticum adhuc ignotari (quod ex India ad nos nō adferatur) eiusq; loco sphagnū, id est, arborum muscum, ex Galeni Pauliq; succidaneis, posse substitui. Plura de acoro & calamo odorato lege apud Petrum Andræa Matthiolum uirum apprime eruditum, suis in Dioscoridē cōmentarijs. Habent officinæ suum acorum à ueterum acoro uiribus longè dissimile: radicibus purpureis, intortis, nodo-

sis, gustu, sine calfactioe, ualde adstringenti, caule & folio iridis, sed folio angustiore, flore luteo. Floret ineunte æstate. Nasci-
tur ubiq; aquosis locis, & Gallis flabe bastarde, & glaucul d'e-
aue: nostris blanlou iaulne, quasi gladiolus luteus, nominat.

ἀκόνιτον, Aconitum.

Ἀκόνιτον Græcis: Aconitum Latinis. Duo sunt præcipua aconiti
summa fastigia. Pardaliâches, quod, quorundam opinione, offi-
cinis uua uersa nominatur. Id uulgo anonymum est: heremitis
tamen syluæ Gallicæ quæ de liury nuncupatur, nec procul à Lu-
tetia Parrhisiarum uersus orientem solem est, lachryma Iob di-
ci solet. Alterû est lycoctonon, à perimendis lupis sic nomina-
tum. Huius tria extant genera: duo ad luporum & aliarum fera-
rû uenationes nata: tertiu, quo ad purgationes, uomitu & de-
iectione molendas, utuntur alpiûm rustici. Ea ipsa species eo-
rum lingua nunc antônno, nûc antôlo dicitur: Lyguribus au-
tem & rusticis terre cognomento noue (quæ agrum Delphina-
ticum & Pedemontanum interiaceret, & usq; ad mediterraneû
mare, inter nostrâ provinciam & Lyguriâ protenditur) antho-
ro, & practicis nonnullis anthora nominatur. Illi folia insunt
platano similia, minora tamen, nigriora, profundè per ambitû
incisa: caulis palmû aut cubitum altus: radices geminæ, oblon-
ge, utrinq; obtusæ & continuæ magnitudinis, id est, in neutra
partè aut maiores aut minores: foris ex fusco colore subflauæ,
intus candidæ: ubi siccata fuerint, fractu satis difficiles, friabi-
les tamen. Vtriuslibet radices ad fabæ magnitudinem in iuscu-
lo aut uino derasam propinant, ad largas duriorû corporû per
superna & inferna purgationes. Debilioribus autè pro uirium
ratione exhiberi à iam cõmemoratis rusticis, scimus. Secun-
dum lycoctoni genus herbarijs itidem anthora: Lyguribus
anthoro & thoro: alpinis Delphinatibus de la thoro nomina-
tur. Hoc radices quoq; geminas, uerum unam ex altera appen-
dicis modo nascentem habet, ima parte ualde acutas, supernè
crassas, quatuor circiter digitos longas, foris nigras, intus ex
terreo cineritias, napi modo turbinatas, eiq; effigie similimas,
ac toto bulbo atris fermèque capillaribus radiculis uestitas.
Caulis uerò bicubitalis, folia platani, subscabra, frequentibus
ac profundis diuisuris incisa, nigricantia. Flos ex purpura æ-
ruleus, lamij floribus haud absimilis. Semen in triangularibus
tricuspidibusq; siliquulis exiguum, cnico quadantenus pro-
ximum, sed multò minus, uermiculorum exemplo rugosum,
imparte sessile, altera acutum. Hanc lycoctoni speciem esse
officinarum napellum (ob eximiam similitudinem, quam
eius radices cum napo habere, uel aspectu iudice, depræhen-
duntur) existimare quis possit: quanquam ex Auicenna, intra
tèrram, iuxta napellum talpam inueniri, eius radicibus uicti-
tantem, quidam existiment, seq; uidisse affirmant: id quod e-
go, fateor, non tam curiosè obseruau (et si reliqua omnia in
defosis & enulsis plantis sæpissimè fuerim in alpiibus ad un-
guem contemplatus) ut musculum illum inuenerim. Quartû
aconitum, quod & ipsum lycoctoni quoq; tertiu species est,
uitigineis uel plataninis cõstat folijs, minus profundè, quàm
aliorum sint folia, incisiss, suppalidis: flore ex luteo pallido, se-
cundi lycoctoni flori (ut semen triangularibus siliquulis con-
tentum) effigie prorsus æmulo. Radice longa, crassâ, multos
in ramos siue appendices inter se complicatis, diducta, ab alio-
rum radicibus ualde dissimili, ut quæ nullo pacto bulbi ima-
ginè referat. omnes tamè, & præcipuè duæ lycoctoni postero-
res, species gustus horredî, supraq; modû abominabilis. Hæc
postrema est herbariorum luparia, uenatoribus haudquaquâ
ignota: uulgo Delphinatium nota quidem, sed tamen anony-
ma: Italis autem luparia, & herba de la uolpe. Florent omnes
mense Iunio & Iulij initio. Semen maturefcit circa finem se-
ptembris. Prima species in syluis ubiq; prouenit. Reliquæ mō-
tibus altis delectantur, & in umbrosis apricisq; nasci gaudent.
Hæc tam multa de aconito literis mandanda duximus, non ut
plantam alioqui uenenosam, & maxima religione uitandam
(præter primâ lycoctoni speciem anthoram uerè dictam, quæ
usurpari à doctis & prudētibus adhibito iudicio potest) omni-
bus cognobilè redderemus: sed ut, historia accuratè distincta,
studiosum lectorè admoneremus, ne posthac sibi, ab imperi-
tis quibudam tum herbarijs, tû pharmacopæis, temerario ni-
mis ausu, lycoctoni secundi generis radices, nigri ellebori ra-
dicum (quibus nulla ex parte respōdent) uice, in usum medi-
cum uocantibus, imponi, suo dedecore, & mortalium irre-
parabili danno, sineret.

ἄμυγρον, Sambucus: *χαμαίερη*, Ebulum.

Ἄμυγρον Græcis: sambucus Latinis. Duo eius genera: maior qui
ἄμυγρον: & minor: qui *χαμαίερη* Græcis nominatur. Maioris
duæ nobis cognitæ sunt species: uulgata ac omnibus nota,
quàm fœminam appellauimus: & alia in excelsis frigidisq; mō-
tibus nascēs, omnibus herbariæ rei scriptoribus indicta, & pau-

cis medicis cognita, quam certioris discriminis gratiâ, maris
titulo insigniimus. Vulgatiore maioris sambuci species officii-
nis omnibus Latinum nomen seruat: Gallis du sus: Italis sam-
buc: Delphinatibus, ut & sambucus mas, du sus, aut sur; no-
stratibus sambuc aut sambucquier & famicquier dicitur. Ebuli
nomen tû Latinis, tum officinis est cõmune: Galli uerò yeble,
Delphinates & nostrates ougue, Itali ebulo appellant.

ἁλυνόν, Halunum.

Inter doctos ambigitur quid sit. Existimant quidam esse Gallo-
rum blanche putain, quam nostrates ratine, & Delphinates ta-
toulter appellant. Verùm descriptio illi parum conuenit, ut tu-
tius inter adhuc ignotas plantas sit reponendum.

ἁλὼν, Aloë.

Visitur herba apud Gallias eò aliunde importata, uulgoq; du per-
roquet, ab insigni uirore: Italis, ut & succus, aloë appellatur.
Succus ipsius, herbæ nomen retinet.

ἁλυσσον, Alyssum.

Si, ut auctori ex aliorum sententia placet, syderitis heraclea est,
multorû peritiam haudquaquam effugit. Quorundâ opinione
ad alysson referri potest uulgaris cauda uulpina. Nos autem
alyssum relegendû existimamus inter ignotas nostro æuo plâ-
tas: quanquam spes est maxima excitatû iri præclara ingenia,
quæ in illius & aliorû, quæ adhuc latent, peruestigatione perti-
naciissimè incumbât, ac tandem multa tum difficilia, tum igno-
ta, uulgantissima, mortalium omnium bono, uel maximo, sine
redditura.

ἀλσιν, Alfine.

Ἀλσιν Græcis: alfine, & auricula muris tum Latinis, tum officii-
nis dicitur: Gallis autem, Delphinatibus & nostratibus du mor-
ron: Tuscis centone appellatur.

ἀμαράκον, Amaracum.

Amaracû auctori & Galeno idè est cû Dioscoridis parthenio: qui
partheniû ipsum amaracû uocari à nonnullis, quæadmodû sam-
plichum à Cyzicenis & Siculis amaracû quoq; nominari, cõ-
memorat. Magna est doctorû in amaraco, quod est Dioscori-
dis partheniû, controuersia. Quidâ officinarû matricariâ esse
uolunt: alij cotulâ fœtidâ, quæ Tuscis cota, Ferrariensibus bru-
sciaculo, nostris, detractis tatum duobus de ueteri nomencla-
tione elemētis, amarô nominatur. Matricaria autè officinarû
Italis amarella, Gallis anonyma, Delphinatibus de blancheto,
nostris l'herbo de nostro damo uocatur: ut hinc manifestum
liceat agnoscere inter illos discriminè. Verû si Dioscorides re-
ctè cõsulatur, parthenij delineamēta cotulæ fœtidæ multò ma-
gis fauebûnt, quàm matricarię: nâ dodrâlis aut pedalis herba
est (matricaria plerûq; bicubitalis) folijs coriandrinis, non (ut
quidâ peruerse calumniantur) fœniculaceis (matricaria multò
amphoribus) odore graui ac tetra (matricaria nō item) sapore
amaro, matricarię cõmuni, ut & flos intus melinus, per ambitû
albus. Accedit cotulâ fœtidâ adhuc à nostrate plebe, amarô no-
minari. Quæ omnia efficiûnt, ut ipse cotulâ fœtidâ, nostris ama-
rô dictâ, uerû Dioscoridis parthenium esse existimè. Suum ta-
men, aliter cogitandi, iudicium cuiq; liberum relinqui uolo.

ἀμβρωσία, Ambrosia.

Ignota herba est: quanquam immeritò apud Gallias herbam quâ-
dam pro ambrosia ostentent: cui sanè tam cõuenit descriptio,
quàm ruta similis est quercui.

ἄμυ, Ami.

Latini & officinæ omnes Græcâ nomenclationem retinuerunt.
Lutetiæ notissima ac uulgatissima plâta, adeo ut uulgo ammi
uocari iâ cœperit: hic tamen & apud nostrates, quâquâ inuen-
tu nō difficilis, pharmacopolarû tamè desidîa, crassè ignoratię
magistrâ, ignota delitescit, etsi quotidie illius semen in usum
medicum uocent. Quidam uolunt ignotam plantam esse.

ἀμαράνθιον, Amaranthum.

Autor Galenum secutus amarâthi nomine eius plâta uires expri-
mit, quam Dioscorides elichryson appellat: quamq; officinæ
omnes stæchadem citrinû nominât. Delphinatibus ioye dieu
appellatione notissimum. Est & aliud amaranthû, flore purpu-
reo, quod uulgo Gallorum, Delphinatium & nostratû passe
ueloux, appellat: Itali autem fiore uelluto.

ἀμύργη, Amurca.

Amurca fex est olei oliuarum, quæ in fundo uasorum residet: no-
stris crappe d'huyle, Italis morca & morchia uocatur.

ἀμπελονορασσον, Ampeloprasum.

Latini Græcâ nomenclatione in usum suum uerterunt: Sic dictû
est, quod uitium familiaritate oblectetur. Largus siquidem est
illius in uineis prouentus, atq; ob id porrû uineale, cepa tani-
na ab ipso uulgo: Tuscis autem porandello dicitur.

ἀμπελος λευκή, Ampelos leuce.

Officinarû bryonia est, quæ præsertim apud Delphinates, pudèdo
errore uitè syluestre (quâ Galli uiorne, nostrates aïrredorto,
quâ

quasi retortâ, q̄ arboribus uehementer implicet, nominat) uitis
albę appellatiõe accipiunt. Galli uitę albâ colourée: nostrates
cocordier de serpēt: Itali uerō zucca saluatica uocāt. Ad uitę
nigrâ referri cõtendunt: alij flâmulâ, sed falso, q̄ ea clematidis
altera species sitalij sigillũ beatę mariz, cui* delineatio illi nō
illepidę quadrat, quorũ certę sentētia nobis donec melior in
mediũ adducta fuerit, pbat. Italis uitis nigra tamarodici solet.

amygdala, Amygdala.

Græci, Latini ac officinæ idem nomen usurpant. Duũ præcipue
sunt generum, dulcia, & amara. Ex dulcibus quædam molli fra
giliq̄ cortice integuntur, ac ob id nostratibus Græcum idioma
sequitis abalanos, quasi *ἀβάλανος*, id est, cortice glandis desti
tuta, & Delphinatibus metathesi syllabarũ alauanes dicta fue
rūt. Quædã internũ corticē duriorē habent, & absolute cōmu
ni nomine insigniuntur. Gallis enim ac Delphinatibus amē
dres, Italis mandole, nostris aut amēdos & amelos dicuntur.

ammoniacum, Ammoniacum.

Officinis Græcas uoces ignorantia partim, partim desidia adul
terantibus, ammoniacum dicitur.

amomum, Amomum.

Desyderatur uerum amomum.

anagallis, Anagallis.

Latini Græcũ nomen usurparunt. Officinis morsus gallinę: Gal
lis morgelline, & petit morron. Duo anagallidis genera: flo
re cæruleo fœmina: phœniceo mas insignitur.

portulaca, Portulaca.

portulaca Græcis, Latini & officinis portulaca: Gallis poulle pied,
& pourpie: Delphinatibus pourchalle, nostris portolaigo, Tu
scis procachia: alijs Italicis populis procellana nominatur.
Duũ est generum, syluestris & hortulana: ambæ tamen uul
garis notitiæ.

anemone, Anemone.

Duũ est generum: syluestre unum: alterum in cultis nascens.
Syluestris folio est fœniculaceo, flore ex uiolaceo, suppurpu
reo, magno, qui flantibus uentis patefit, atq; ob id herba uenti
est appellata: (quanquã herbæ uenti appellatione parietariam
helxinen usurpent officinæ) Gallis des coquelourdes. Hæc
primo uerē erumpit, floret, ac post paulum flos ipse uanescit
in pappos, syluis Galliz familiaris. Apud Delphinates in ne
more Rossillionensi, & montibus Tincto oppido proximis
inuenitur, nec non in agro Lugdunensi, ubi eius flos à rusticis
des flascos nominatur. Quę uerō cultis locis prouenit, folijs
est coriandrinis, puniceo flore, capitulo rhœadis, frumenta
ceis agris familiaris. Gallicum nomē flori est des asphlenons,
aut des rubis: alibi des passefleurs. Tertia florem lacteum aut
purpureum edit, & ferē est ignota, nisi ea sit, quam passim Lu
tetiz pro argemone ostentant. nam descriptio ei non ineptē
cōuenit, & penē tora adstipulatur.

anethum, Anethum.

Latini & officinæ Græcum nomen usurparunt. uulgu tum Gal
lorum, tum Delphinatum, tum nostratum de l'aneth appel
lat: Itali anetho.

anthemis, Anthemis,

Chamæmelum.

Chamæmeli nomen Latinis, officinis & uulgo Gallico, Delphi
natico, & postrati celebre est: illis enim camomille: Italis autē
camamilla uocatur. Tria statuitur anthemidis siue chamæmeli
genera: leucanthemon chamæmelũ, chrysanthemon, & eran
themon. Ex quibus leucanthemon toti Galliz notissimum,
& usu multo clarissimum est: reliqua genera non item. Vult
Fuchsius eranthemon consolidam regalem dici. Syluio præ
ceptor nostro, Fuchsius erāthemini nomine cornuetam pingit,
quam nonnulli ad edysarum referunt. Chrysanthemon cha
mæmelum hic inuentu rarum, & paucis notum.

anisum, Anisum.

Officinis nomen retinet, uulgu Galliz uniuersæ de l'anis: Ita
lia autē aniso appellat.

aparine, Aparine.

Officinis rebulus & spargulum: Gallis dur gratteron: Italis spe
ronella. Philanthropi nomen idēo sibi adoptauit, quod per
transfontium uestibus adhærēscat: omphalocarpī autē, quod
humani umbilici effigie semen eius sit æmulum.

pirus, Pirus.

Varia ac penē innumera sunt pirorũ genera: Gallis des poires,
Delphinatibus poires & perus, nostris de peros, Italis pera di
cuntur. Arbor poyrier Gallis, & perier nostris.

pyrus, Pira syluestria.

Notiora sunt pira syluestria, quàm ut explicari debeant.

aristolochia, Aristolochia.

In tria genera fastigiatur, longam, rotundam, & clematitim. Lon
ga officinis nomen retinet: Arabibus faufel, nostratibus fau

terlo, & Delphinatibus de bloufons, nominatur: Gallis iam a
ristolochie dici cœpit. Rotunda suam quoq; nomenclatiõe
seruat. nostris autem fellayo ab amaritudine, quasi fellago, di
citur. utraq; officinis notissima, & quotidiano usu clarissima.
Italię ambę anonymæ. Clematitis autem, quantũ equidem iu
dico, adhuc ignota delitescit.

aracus, Aracus.

Cicerculæ effigie auctori similis est, ut possit cicercula syluestris
censeri.

juniperus, Juniperus.

Juniperi duò genera: maior & minor. Volūt quidã maiorē iuni
perum eadē uulgo appellari: minorem autem genefure: no
strates tamen utramq; speciem una appellatione, eadē nimi
rum, complectuntur. Juniperus maior Gallis infrequens, Del
phinatibus inuenitur, apud nos autem copiosissime fruticat,
& plerunq; calidioribus syluis, in arboream proceritatem as
surgit. ambo ginepro Italis dicuntur.

plantago, Plantago.

Duo plantaginis genera: maior & minor. maior officinis nomē
retinet: minor quinqueneruia aut lanceolata nominatur. Est
& altera maioris plantaginis species, quę priuatim officinis
arnoglossum dicitur, rotundioribus folijs, lanuginosis & sessi
libus, usuq; multo clarissima. Omnes uulgo notæ. nã Gallis &
Delphinatibus du plantain, nostris plantage: Italis autem pian
tagine & centinerbia appellatur.

aron, Aron.

Officinis iarrus, & pes uituli: Italis gigaro. Flos autē, q̄ in uirilis
pudendi speciem assurgit, Gallis uit de prebstre nuncupatur.

artemisia, Artemisia.

Artemisia Græcis, Latinis & officinis, Gallis armoyse: Delphina
tibus & nostris arcemise. Duũ est generũ: multicaulis, & u
nicaulis. Multicaulis in maiorem ac minorem diuiditur. Ma
ior iam dictis nominibus appellatur. Minor quorundã senten
tia est uulgaris matricaria, quę Italis amarella, Delphinatibus
blancheto, nostris l'herbo de nostro damo nominatur. Alio
rum non item, ut qui eam ad parthenium commodissimē re
ferri putēt. Tertiã artemisiz speciem monoclonon dictam,
ignorari est certissimum: idēoq; falli eos qui tanacerum offi
cinariũ athanasiam, Gallorũ thanasie, Italarũ danéa, Delphina
tiũ thanéo, & nostratũ thanarido, artemisiz speciem, præci
puē tertiã esse statuunt, ut quę sit multicaulis, & grauissimũ
spiret odorem: monoclonos contrā unicaulis, & suaue olens.

asarum, Asarum.

Officinæ antiquum nomen seruant: Gallis du cabaret: Italis baca
chara dicitur.

aspalatus, Aspalatus.

Desyderatur ueterum aspalatus: cuius loco suffici potest uiticis
semen, ex Galeni succidaneis.

asparagus, Asparagus.

Latini & officinæ Græca nomenclatiõe utuntur. Duo asparagi ge
nera. Atilis, & syluestris. Atilis ubiq; Galliarũ des asperges:
Italis autē asparago. Syluestris qui & petræus, & myacathinus
Græcis dicitur: Delphinatibus rouge cōniz: nostratibus (apud
quos copiosissimus ubiq; puenit) romieu conieu, quod cuni
culis annuũ pabulũ suppeditet, nominatur. Apud Delphinates
nusq; nisi in hortis, uisit. Gallia asparago syluestri caret, nisi eò
aliudē importetur. Illius radices magni sunt in medicina usus.

aster atticus, Aster Atticus.

Quid fuerit aster Atticus, hæten* dubitatũ à doctis penē omni
bus est. Nos tamē, multis laboribus & uigilijs huic disciplinz
insumptis, dei beneficio uerũ asterē Atticum in gratiã tadem
cũ suo Dioscoride primi (quod equidē sciam) in Gallia supe
riore anno reuocauimus. Ea siquidem plãta est, quã nostrates
officinæ Christi oculũ appellat: Galliz ignota, Delphinatibus
inuentu rarissima: apud nos ubiq; tam frequens & copiosa, ut
nusquã nō pedibus, si uel tantillum in agros uel itinerũ mar
gines diuerteris, conculcetur, ut alibi copiosius dicetur. In Ita
lia frequens, sed uulgato nomine destitutus.

vua passa, Vua passa.

Vulgaris est ubiq; gētium notitiæ. Galli de la panse, ou raisin de
panse, Itali uua passa, Delphinates raisins cōfitez, nostrates agi
bisses nominant.

astaphis agria, Astaphis agria.

Officinis staphis agria. Semē enim sub plantę appellatione usur
pant. Planta his locis non ita familiaris. Apud Gallias in hortis
frequens. Gallis, Delphinatibus & nostratibus de la graine de
l'esparuier dicitur. In Italia anonyma.

asphodelus, Asphodelus.

Officinis aphrodilus. Apud Pictauios frequēs, & alendis suisibus
accommodus. hic rarus. Apud nos copiosissimus nascitur, &
uulgo de porraches, à similitudine foliorum porri, appel
latur.

latur: in Italia uero amphodillo.

ἀτρακτύλις, Atractylis.

Ἀτρακτύλις Græcis: Atractylis Latinis: officinis & uulgo ignota. Nam cnici generibus, & acarna candidior à Theophrasto cap. 4. lib. 6. hist. plât. pingitur: cuius foliū peculiare hoc habet, ut uulium, & carni admotum sanguineum succum remittat. unde sanguinis cruentæ ue nomen herbæ inditum, graui est præterea & maligno odore. Semen tardè perficit, autumno nimirum. Quæ notæ satis sunt ad improbandam eorum sententiam, qui syluestrem cnicum primi generis, atractylidem esse autumant: ut taceam ea omnia atractylidi parum aptè assignari, quæ Theophrastus loco iam commemorato, manifestis uerbis de cnico pronunciauit. Sit igitur atractylis ex earum plantarum genere, quæ adhuc parum cognitæ sunt: & putata atractylis, atq; carduus benedictus (ex Theophrasti sententia) syluestris cnici species: hic, posterior: illa, prior, ut in cnico dicitur.

ἀτρίπλεξ, Atriplex.

Latinis & officinis idem obtinet nomen: Gallis nunc bonne dame: nunc prude femme: nunc des arroches: Italis autem trepe se, & reppese uocatur.

ἀψίνθιον, Absinthium.

Quatuor absinthij sunt genera. Ponticum, quod officinæ Romanum appellant. Santonicum officinis propè omnibus ignotum: eius tamen semen santonicæ aut seminis contra (uulgu Gallorum id mort à uers, & cum nostratibus, barboutine uocat) appellatione celebratissimum: quanquam non desint, qui absinthij marini semen id esse existiment. Seriphium seu marinum, tum officinis, tum medicorum non paucis incognitum, maritimis tractibus familiare ac copiosissimum. Et uulgare, quo solo, maximo tum errore, tum mortalium detrimento, utuntur omnes fermè officinæ: tanta est earum cæca ignorantia, & uirtutis inimica, desidia. Omnia absinthij genera Luteriæ Parrhisorum uiuntur, præter marinum, quod ipsi Tholone, & alibi passim maritimis locis millies uidimus. Ponticum in hortis Lugdunensibus copiosum diligentia Claudij Mulleti, medici doctissimi, & rei herbariæ peritissimi iam luxuriat. Vulgare absinthium Luteriæ de l'aloine: Belgis & Delphinatibus du fort, nostratibus d'eyssensis quasi d'absinthium, Italis assenzo nominatur. Reliqua genera, uulgata, quod sciâ, nomenclatione carent.

βάλανος μυρική, Glans unguentaria.

Glans unguentaria Dioscoridi fructus est arboris myricæ similis, in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra secus Iudeam. Is Arabibus ben dicitur. Duūm est Mesuæ generum: maior & minor. Maior auellanz magnitudine spectatur, triangularis quodammodo, superiore sui parte uetricosior, inferiore tenuior, & nonnunquam sessilis, interdum subacutus: & (quæ est naturæ in rebus fingendis uarietas) quandoq; multangulus, proq; sua magnitudine ponderosus: cortice pistacij, læui, sed fragiliore ac subfusco: intus carnosus, carne oleosa, leni ac pingui, quæ paulò diutius mansa nauseam proritat. Hic fructus copiosissimus nostra ætate in Hispania prouenit: iamq; inde Venetias portatur: solidarijs non ignotus: suffumigatoribus ben nomine notissimus. Est & minor myrobalanus, ciceris magnitudine, niger, malus: qui Mesuæ, si ex nigro albescit, & medulla est alba, leni, pingui, & uetus, est innocentior. Hic ambo inueniuntur. Minorem tamen nondum uidi. Maioris glâdes habeo plures uiginti, quæ ueterum tum Græcorum, tum Arabū descriptioni tam eleganter conueniunt, ut certissimum sit ben suffumigatorum & solidariorum esse Græcorum balanon myrepicam, & Arabum ben.

βάλανος, Glans quercina.

Glandis quercinæ, ut & quercus ipsius, uaria sunt genera: nota tamen, & speciei appellationem retinentia, ut de quercu dicitur.

βάλσαμον, Balsamum.

Nomine tenus cognita sunt tū liquor, tum fructus, tū lignum: tametsi uidere est apud solidarios & pharmacopolas fructum & lignum res plane à carpobalsamo & xylobalsamo diuersas. Ex Galeni tamen succidaneis opobalsami loco substitui potest myrrha stacte, quæ est purissima totius liquoris portio, & doctorum sententia, styracis liquidi nomine cognita: aut oleum irinum, aut odoratissimæ iridis radix: aut xylobalsamum oleo ueteri incoctum, Manardo. Alijs aliæ misturæ, quas in recentiorum libris inuenies. Xylobalsami autem inopiam emendant, albæ uiolæ radices. Carpobalsamo nullum succidaneum est, ut tutius sit à uulgaris carpobalsami usu abstinere.

βάλανος κυτίνη, Balautium, Cytinus.

Hoc discriminis inter se duntaxat habent, quod illud syluestris,

hic hortensis punici mali flos sit. Ambo uulgaris notitiæ. Nomen enim apud officinas retinent.

βάτος, Rubus.

Bati nomen communioem nobis appellationem sortitur, buysson scilicet, qui ad omnem spinosum fruticem se extendit. Rubus autem magis propriè accipitur ronse: nobis roumi: Italis rouo. Rubi duo genera, maior qui & celsus barbaris dicitur: minor qui bassi nomen ipsdem obtinuit: humilior enim est, humi fermè ubique repens, & in medicos usus accommodatur.

βανύχιον, Ranunculus.

In quatuor fastigia distribuitur. Vulgare flore luteo, uineis familiare, cuius flores Galli des baises appellant: herbam, hic piepou. Lacteo flore insignitum, in syluis Galliæ & Delphinaticis copiosissimum. Vulgatum apium risus, in stagnantibus, aut pigro lapsu repentibus aquis frequētissimum. Purpureū, nobis non adeo familiare: quanquam id ad pedem corui referri quidam uelint. Rari sunt his temporibus in medicina usus. Ranunculi Italis pie coruino, & pie di gallo nominantur.

βελλίδιον, Bdelium.

Officinæ, uocum adulterio gaudentes, bdelium uocant.

βλήτων, Bitum.

Betacei generis olus est, Gallis du bleti, Italis biedoni.

βούβις, Bulbus.

Bulbus: alius esculentus, qui Gallis des appetitz, quod sit uelut quoddam gulæ cibos fastidientis iritamentum, appellatur: aut etiam oignonet, à forma cepe, quam repræsentat. Vomitorius alius, mihi ignotus. Non desunt tamen, qui utrunque bulbum ignotum esse uelint.

βούλων, Buglossum.

Vulgaris borago est. Cuius duæ sunt species: hortensis, quæ Italis borragine: toti Galliæ borache: nostris borrayo: & erratica. Quæ uero herba passim pro buglossio in usum medicum trahitur, ad Dioscoridis circium doctorum omnium consensu est referenda.

βούθαλμον, Bupthalmum.

Cotula officinarum non foetida est. Nam uulgarem cotulam foetidam uerum Dioscoridis parthenium esse, eius delineatio demonstrat, ut suo loco, in amaraco uidelicet, diximus.

βένιον, Bunium.

Gallis nauet, aut naueau: Italis nagoni. Semen eius de la nalette: Delphinates & nostrates etiam naueau appellant: nostri tamen, frequentius rabo nominant, buniadis ac rapi nomenclationem confundentes.

βράβη, Sabina.

Officinis sauina: Gallis du saunier: Delphinatibus & nostris saune: Italis sauina. Duo sabinz genera: unum folijs cupressi, notum: Alterum tamarisci, non ita multis cognitum. Facit Dioscorides sabinam herbam arborē coactæ breuitatis, quod ut plurimum accidit. nos tamen anno superiore duas apud Delphinates sabinæ plantas uidimus, quarum altera quatuordecim, altera duūm supra uiginti pedum altitudinem excederet, ac superaret.

βρετανική, Bretanica.

Doctorum penè omnium iudicio, officinarum & herbariorum bistorta est: Galliæ & huius gentis montibus præcipuè familiaris: quidam tamen bretanica ignotam putant.

βρώμη, Avena.

Vulgaris est notitiæ: officinæ nomen Latinum usurparunt: Gallis & Delphinatibus auoine: nostris suado: Italis uena, & biau.

βρύον θαλάσσιον, Marinus muscus.

Officinis corallina. Inuentu facilimus in mari, unà cum corallio, cum quo euellitur, & ab eo nomen sumpsit.

βρύον, Muscus arborum.

Is est, qui arborum caudicibus adhæret. duūm generum est: Procerior & prominentibus barbis adsimilis: umbrosarum sylvarum & uallium arboribus adnascens: hic rarus est, & ueluti per floccos sparsus ac distributus: Alius breuior, densus & crassior roborum caudicibus agglutinator: uterque uulgo dela mouffe, officinis usnea, Italis mosco appellatur.

βρυονία, Bryonia.

De bryonia in uite alba dictum est.

βυβόνιον, Bubonium.

De bubonio supra in astere Attico diximus: copiosissimè eius historiam alibi exaraturi, si domino ita uisum fuerit.

γυντιανή, Gentiana.

Officinis nomen retinet: Gallis de la gentiane: Delphinatibus (apud quos, si usquam gentium, copiosissima progerminat) & nostratibus de genfano: Italis gentiana uocatur. In ore est

est omnibus radix plurimis cognita, planta non ita multis. excelsis enim montibus, eorumque planiciebus delectatur. Nec facile est gentianam calidior solo, sponte natam, inuenire. Faciunt nonnulli & minorem gentianam, quæ alibi raro quam in montibus inuenitur, gustu amarissimo, folio quasi saponariæ, flore cæruleo, radice digitali, caule dodrantali, nodoso, læui. Eam sæpius uidi in montibus, argillosis præsertim in locis. Floret æstate. Semen uix maturescit. Aiunt eam quibusdā Italiæ populis uulgo petimborsa nominari: maximamq; ac nobilissimarum uirū esse. Ea Fuchsio cruciata nominatur.

γίναντα, Vinacea.

Officinæ arilli, Gallis des pepins, nostris des grignons, ac si dicas granula, appellantur: uulgaris sunt notitiæ.

γινγιδιον, Gingidium.

Officinæ est chærepholiū, uulgo item Gallorū, Delphinatium & nostratium du cerphueilz nominat, nulli matronæ olitorie incognitum, quanquam sunt qui contendant uerum gingidium in his regionibus ignotum esse.

γλαυκίον, Glaucium.

Quidam, & quidam doctiores, putant apud seplafias memithæ nomine haberi: alij ignotum esse contendunt. Nos eam item alijs dirimendam relinquimus. Constat tamen certumq; est, multas remediorum formulas parari posse, si memitha glaucium sit, quæ alioqui nequaquam parabuntur.

γυλιαν, Pulegium.

Officinæ nomen seruant: uulgo du polieu aut poliot: Italis pulegio.

γλυκισ, Balnearum sordes.

Balnearum quasi obsoleuit usus, præterquam in Italia: atq; ob id sordes huiusmodi ad usus medicos non expetuntur.

γλυκύριζα, Radix dulcis.

Officinæ corrupte liquiritia pro glycyrrhiza: Gallis reglice: Delphinatibus & nostratibus regalice: Italis regolitia. Radix maximi in medicina usus, planta non ita multis cognita. Succus autem glycyrrhizæ inopia ut faciat habes cap. 12. lib. 8.

γλυκύριδα, Præonia.

Officinæ nomen retinent. Duū est generū: mas folijs iuglandis, foemina latioribus, rotundioribus, & insigniter dentatis, adq; smyrnij folia proximè accedentibus. Vtraq; species Lutetie in hortis inuenitur. Foemina his locis copiosissima, Galli utranq; speciem una appellatione complectuntur: nā præoniæ flores des roses nostre dame nominant: hic, quod sciam, anonyma est. Nostrates de pioūno uocant.

γναφαλίον, Gnaphalium.

Putatur uulgaris officinarum cotonaria: quibusdā tamē ignotum est.

γρύναις, Rapum.

Latinis & officinis idem nomen seruat. Gallis & Delphinatibus des raues: Italis rape: nostris rabes: quanquam hac appellatione huiusmodi quoque, id est, rapum complectantur. Galli item ea uoce raue raphanum hortensem plerumque nominant.

δαμασκόνιον, Damasonium.

Ad damasonium referunt docti herbariorū plantaginem aquaticam, cuius penuriam facit eryngium cap. 29. lib. 11.

δαυκος, Daucus.

Officinæ nomē quidem retinent: At suspicio est uel maxima, primam dauci speciem his regionibus ignotam esse. Ad secundā reuocat Manardus lebysticiū officinarū, quod sanē assentiēte multorum doctorū uirorū iudicio ac testimonio smyrnion Dioscoridis est. Sed tamen ad secundum genus nō ineptè referrentur saxifragæ uulgares, etsi eas quidam sui generis herbas existiment. Tertium genus uulgaris est notitiæ, & solum apud officinas, dauci nomine, in usū creberrimo.

δάφνη, Laurus.

Officinæ nomen seruat. lauri bacæ in usū sunt frequentissimo: planta rarissimo. Gallis, Delphinatibus, & nostris laurier, Italis lauro.

διπταμνον, Pseudodictamnium.

ψευδοδικταμνον, Pseudodictamnium.

Officinæ diptamum appellant. Verum dictamnion ex Creta insula (cuius unius soboles est) Venetias: Venetijs Lugdunū im portatur: quo loco id mihi, sed sicum, uidere contigit: rarum tamen negotiatorum incuria hic est. Pseudodictamnion in Hispania copiosissimum: hic ignotum.

δελαν, Veneris labrum.

Officinæ & herbarijs uirga pastoris. Duo eius genera: hortensis, Gallis chardon à bonetier, Italis cardo: syluestris nostratibus debrustis, id est, scopauetibus emundandis dicata, nominatur.

δωρύνιον, Dorycnium.

Ignoratur.

δολιχον, Dolichi.

Vulgo nostratium phaioux rouges, Italis fagiuli turcheschi nominantur: maritimis præsertim locis assiduo cultu nobiles, & cibis propè quotidianis expetiti.

δρακοντιον, Dracontion.

Tria sunt eius genera: primum uidit Plinius in Hispania, nostris temporibus ignotū: alterum est uulgaris serpentaria maior: tertium, minor, seu uirile sacerdotis. Dracontio Italis dragocello & serpētaria. Ruellio placet hoc caput apud Dioscoridē ascititium esse, quod simile uerū non est. Nam id Galenus silentio minime erat prætermisurus, quem constat lib. 6. simpl. satis amplam de dracontio mentionem fecisse.

αἰξ, Quercus.

Græcis: Quercus Latinis & officinis: Gallis & Delphinatibus chaisne: Italis quercia: nostris roure. Ad quercum multæ gladi feræ arbores referuntur: iuxta, Latinis ilex, quæ duorū præcipue est generū. Pumilla, quæ post cocco baphicum rubrum (nostris, apud quos plurimus colligitur, uermilhon appellant) glande de se promit. Proceræ, quæ nostro sermone eulse, Italico, elice dicitur. Est & tertia ilicis species aquifolia cognominata. Huius duo quoq; genera. Mas pumilla, quæ fructū ex croceo purpureū, pisi magnitudine, & effigie racemosum, autūno inclināte ad hyemem, profert. In agro Delphinatico & Lugdunensi copiosissima. Foemina procerior, arborq; iustæ magnitudinis, naturā sterilis, folijs latioribus & magis aculeatis, quam Galli du houx, nostris greu uocant: ex cuius cortice uiscū optimū cōficiūt aucupēs. Ad quā ilicis specie iure optimo suber referri potest: cuius cortex Gallis du liege: nobis tū, arbor, tū, cortex siue, Italis souero nominat. Maritimis (quod Plinius minime existimauit) nostre puinciæ locis, circa Forū Iulij, & Grasiā, urbes nō incelebres, familiare. Ilcis species oēs perpetuā fronde uirēt, & robustissima sunt materie. Quercuum generū a quibusdā assignatur fagus, quæ Gallis fausteau: Italis faggio: nostris faus, eius fructus Gallis des faines: nostris, fayō: Italis ghianda di faggio nominatur. Is triangularis est, & rusticis, in stāte fame, in cibis, ob dulcedinem, expetitus: præcipuumq; urforum pabulum.

εἰς τὸν ἑρπιδιον, Ebiscus, Althæa.

Nobilissima, quāquam syluestris, species malus est, & usū medico celebris: uulgo officinarū & herbariorum bismalua ab eius præstatiā. Gallis guimaulue, Italis malua uisco, nostris maülue blāche dicitur. Est & alga herbarijs herba symeonis, Italis nūc bismalua, muc malua saluatica, interdum buon uischio, & malua uischio nominata.

εἰς τὸν, Ebenus.

Autori lignū est. Dioscorides indeterminatā eius generis, lignū ne esset, an aliud, nomenclationē reliquit. Paulaniz, in Attica historia, radix cēsetur, qui, ex herbarij cuiusdā cyprij sentētia, hæc de ebena scriptis mandauit. Equidē audiui Cyprium quendā, qui herbarum genera omnia ad medicandos homines optime dignoscere sciebat: is ebum folia producere, negat, neq; ullum fructum ex ea existere: deniq; sub sole nusquam apparere, sed esse radices subterraneas, quas Aethyopes fodiant, apud quos sint qui ebum reperire sciant. hæc ille. Ex quibus colligi potest, quid sit ebenus. Apud doctos nomen retinet: Italis de l'ebeno, officinis ignotus. De hebeno plura lege apud Solinum cap. 65. ad hæc apud Plinium, & Theophrastum.

ελαια, Olea.

Græcis: Latinis olea. Duū est generum, urbana & syluestris: urbana Gallis, Delphinatibus & nostris oliuier, Italis oliuo: fructus oliue nominatur: arborq; est omnibus nota. Syluestris autē officinis, medicorum plurimis, & Gallis incognita: nostris & Delphinatibus nostre prouinciæ (nā frigida loca horret & calidis delectatur) conterminis alauerd, ac si dicatur olea uiridis, & d'alauerd, Italis oliuo saluatico nominatur. Folia enim quā domestica uirentiora, minora, breuioraq; habet, & per ambitum molliter crenata. In syluis frequens nascitur, unde sibi apud Græcos id cognomentū adoptauit. Apud nos copiosissima inuenitur.

ελαφοβοσκον, Elaphoboscum.

Officinæ & herbariorum gratia dei est, iam cognitu facilis: Gallis quibusdā de la phalouse. Lutetie innominatum, ut & Italiæ.

ελαν, Helenium.

Vulgaris iam est notitiæ. Officinæ & herbarijs enula campana: uulgo Gallorum, Delphinatium & nostratium, de la campana, Tuscis lella, alijs enola, & enoa, usu multo celebris.

Veratrum

Veratri duo summa fastigia: album & nigrum. Album Gallis de l'ellobore: Italis elleboro bianco: rusticis alpium de uerare & de uararou: nostris uerayre nominatur. In excelsiorum montium pratis luxuriat, humidioribusq; præsertim locis (in quibus non raro candidi ueratri caulem, tricubitalem implere longitudinem conspexi) delectatur. Frequens ac copiosum apud Delphinatium montes, & in alpiis prouenit, nulli è plebe ignotum. Nigrum officinis nomen, ut & candidum, seruat: quanquam inter doctos non constat, an ea planta, quæ nigri ellebori nomine celebratur, & in medicos usus admittitur, nigrum ueratri sit. Scio plerumq; pharmacopolas ualde deceptos lycoctoni secundi generis radices inconsulto pro nigro ueratro in suis tabernis uenales habere, eisq; quoties nigrum ueratrum expetitur, pudore omni deposito, uti. Fuchsio, placet consiliginem Plinij & Columellæ (quæ Gallis poumelée: Delphinatibus marsitre: nostris pomolueyo, quasi polmoniero, id enim nomen iam dictis autoribus quoq; habuit, nominatur) nigrum elleborum uocandam, & alterius inopia, in usum uocandam esse. Alij, etiam uiri celebres, tria nigri ueratri genera in Italia nasci contendunt: primum, cui purpureæ: alterum, cui candidi: postremum, cui herbidi insunt flores. E quibus nos duo priora, lycoctoni aconiti species: postremum, Columellæ ac Plinij consiliginem esse existimamus. Siquidem Alpini Delphinates radicibus primi aconiti lycoctoni generis utuntur ad mouendas utrinq; purgationes: eorumq; lingua Antonno & anthoulo, Lygurum uero anthoro dicitur: duas posteriores species ad Iuporum & aliarum ferarum uenationes ac perniciem reliquas faciunt. Postremum, id est Columellæ ac Plinij consiligo, Fuchsio, ut dictum est, elleborus niger adulterinus: Gallis poumelée, Delphinatibus marsitre, nostris pomolueyo nominatur, maximamque uirum est contra omnis generis inflationes, maximè uenenosas: contra ellebori albi, ouillu pecus male habentis, uiolentiam: contra pestilentiae contagia, ut quotidiana mirèque salubria rusticorum experimenta testantur. Siquidem oues quæ pullulascens candidum elleborum, una cū reliquo pabulo, deuorant, statim totæ intumescunt tantopere, ut minimū absit, quin præ immodica tensione distumpantur, uomuntq; assidue ac magnis conatibus. Unde opilio nes, nō ignorata tã perniciosi alimenti inclemētia, cognitoq; salutari remedio, consiliginis ramis aliquot arreptis, malè affectarū & de uita periclitantiū pecudū terga, uentrē, lateraque eis tandiu percutiūt, (eas obambulare cogentes) donec totus immodicusq; ille tumor euaporarit, & uomitus sedat⁹ fuerit: id quod duabus tribusue, ad summū, horis perficitur. Ad hæc scio nostræ provincie rura, ad quauis pecoris contagionem, trunco consiliginis uti, perforatis ferro animalium auribus, truncoq; ad extirpandū uenenū, foraminibus impacto. Quamobrem simile ueri non est, consiliginē, eum ueratri candidi uitia emendet, eiusq; malignitati aduersetur, nigrum elleborū esse: nihilq; mirū uideri, si uiri docti, magno successu, primi generis lycoctono aconito, & Plinij consiliginē, ad melancholicas affectiones utantur. Cæterū si quis commemoratarū iam plantarum radices diligenter expendat, nihil illas cum nigri ueratri radicibus (quæ teste Dioscoride, cepe modo bulbosæ sunt, erumpentibus ab imo earum bulbo multis radiculis) cōmune habere multo euidentius cōperiet, quàm ut pluribus demonstrari nunc debeat. Taceo nullam ex his plantis, dum uelluntur, capitis dolorē, ob uaporū halitum, cōcitare, ut ipse millies sum expertus. Id qđ in nigri ueratri euulsione testatur Dioscorides: ideoq; citissimè, ad uitandos dolores, euellendū esse. Ex his igit constat, nullā harū triū plantarū, ad nigrum ueratrū satis aptè posse reduci, qn̄ duas priores, aconiti lycoctoni postremas species esse: postremā herbam sui generis: difficilēq; his in regionib. nigrum ueratrū inueniri, sed nomine ten⁹ cognitū esse.

Helxine parietaria.

Officinarum parietaria est, Delphinatibus de l'esparge: nostris spargoulo: Gallis paritoire: Italis uetriola.

Panicum.

Panicum nomen officinis & Gallis, du panicum appellantibus, retinet: Italis panico, & panizzo.

Empetrum siue epipetrum.

Vulgatam cretam marinam ad empetrū referri quidam uolunt, sed nequequam: nam ignota his regionibus herba adhuc est. Epipetri tamen inopiam sãrcit scammonium pari pōdere cap. 76. lib. 3. Est & Fuchsio suum empetrum seu saxifragium, quod officinæ saluam uitam: & Delphinates saue uie appellant: quodq; dominus Iacobus Syluius præceptor meus longè doctissimus, ad quartum adianti genus reducit: quæ herba à ueterum empetro siue epipetro longè diuersissima, tum delineamentis, tū facultatibus est, quæadmodū alibi suo loco dicemus.

Epithymum.

Officinis nomē retinet, omnibusq; in ore est: thymo & satureiæ adnascitur. usus est in medicina celebris, & multi.

Cicer.

Officinæ Latino nomine utuntur. Gallis pois ciches: Delphinatibus & nostris ceces, Italis cece. Duo ciceris genera, album & nigrum, quod arietinum uocatur, inq; medicinam recipitur, & officinis cicer rubrum nominatur. Album, aliud maius, aliud minus. Maius fabas sua fermè magnitudine æquat: coctionem paucam sustinet, & cibum palato suauissimum præstat: meis Saniensis familiaris, qui, à magnitudine sumptâ appellatione, gros cese nominant: minus omnibus notum.

Serpyllum.

Nomen officina seruat. Gallis & Delphinatibus du serpoulet, Italis serpillio, nostris serpoulhet dicitur.

Irio.

Eruca nobilis herbarijs: Gallis noble roquette: officinis ignotū. Italiæ anonymon. Eruca species est. urbium fossis & itinerum marginibus familiare. Luteum florem promit.

Rubia.

Duo erythrodani genera, maius quod rubia maior, aut rubia tinctorum: minus rubia minor officinis & herbarijs dicitur. maior autem rubia Gallis de la guarence: nostris autem rouio, & Italis robbia, nuncupatur.

Eruca.

Officinis nomen seruat. ubique Galliarum de la roquette, Italiæ rucchetta. omnibus nota.

Eupatorium.

Officinarum est, & Italarum, agrimonia: Gallorum agrimoine: nostratum agrimoni. Quod autem officinæ eupatorium appellant, hydropiperi Dioscoridis maximè respondet.

Euphorbium.

Habetur, & nomen retinet. Si recens non adsit, ueteris duplum substituitur. cap. 31. lib. 12. Sin omnino desit, sulphur aut castorium eius loco admittitur, cap. 27. lib. 14.

Zea.

Est uulgaris Italarum spelta: Gallis, Delphinatibus & nostratibus espeulte.

Zingiber.

Officinis ginger, Gallis du gingembre, Delphinatibus & nostris ginger, Italis giengewo. Officinis duplex habetur: album à uulgo magis expetitur, & minus præstans, ob adulterium dolō contractum: flauum, aut penè terreum: ambo notissima.

Zythus.

Potus genus est, ex ordeo aqua tādium macerato, donec in liquorem uino similem resoluatur.

Zyma, Fermentum.

Officinis fermentum: Gallis du leuain: Delphinatibus leuam: nostratibus leuamē.

Menta.

Mentæ duo genera: satia, & syluestris, quæ mentastrum Latinis, nobis mentastre, Italis menta saluatica appellatur. Satia in quatuor species distribuitur, quæ nō ita multū à sese differunt. nomen omnes retinet, excepta una specie quæ balsami nomē sibi apud uulgos adoptauit. Nā du baulme passim oibus uocat.

Securidaca.

Ruellio placet edysarum, de la graue, quod frumentis sit molestū, Gallis nominari: alijs des cornuettes dicit, à similitudine quam siliquæ cū corniculis habent. Hanc, cornuetā inquam, Fuchsio, ut Syluius noster annotauit, eranthemi chamæmeli nomine depinxit, quæadmodum in Anthemide diximus. officinis q̄ sit ignoratur. In Italia autē frequēs est, sed anonymon.

Emierocallis.

Quid sit, non ita inter doctos constat. quidam lilium, cui flos est: croceus, hemerocallim putant uocari: quidam adhuc inconsultius, ne ineptius dicam, genus quoddā saryrij flore pallido aut subalbido hemerocallim faciunt. Italis autem giglio saluatico nominatur. Memoria teneo me, anno domini 1547. mense Maio, non procul à Lugduno herbam quandā uidisse, cui notæ hemerocallis omnes magno cōsensu adstipulentur. Siquidem bulbosam habet radicem, satis magnā, tuniulis ceptarū exemplo intertextam, cādida, succosam: caulem rectum, teretem, caulis summum, flores exiguos, suppalidos, florem lilij figura omnino repræsentantes: folia porracea, non numerosa, humi strata, & alia omnia, quæ eam plantam hemerocallim esse apertè conuincant. Copiosissima nascitur in monticulo, seu uerius colle terreno quodam, qui planitiem, quā Lugduno Viennam Allobrogum iter est, terminat. Floret mense Maio. Quod illi sit uulgatum nomē, me ignorare ingenuè fateor: in ea tamen sum sententia, ut eam quam depinxi herbam

bam hemerocallim esse certò existimem.

ἑρπύριον, Senecio.

Officinis nomen retinet: Gallis du senecón: Delphinatibus, & nostris de senigon: Italis cardoneello & spelicciosa. herba est uulgo nota, & magni Aëtio in hepatis affectibus, momenti.

ἑρύγγιον, Eryngium.

Officinis iringus: herbarijs centum capita: Delphinatibus panchault: nostris panicaut: Gallis (ut & Italis) nullū, quod sciam, apud uulgos nomen obtinuit, ut alibi fusius annotauimus.

θάψια, Thapsia.

Θάψια Græcis iuxta ac Latinis officinis prope omnibus, Gallis & Delphinatibus ignota. Musæ Brassauolo in quibusdam Italiæ montibus prouenit, & à rusticis crassegnana uulgo nūcupatur. In nostræ quoq; prouinciæ monticulis quibusdā, prope Pertusium celebre oppidū, quos uocat Les trois freres, nascitur, pharmacopolis eius urbis cognita, uulgo ignota. plurima quoq; in Apulia luxuriat: uulgo tamen anonyma. Nec hoc loci id est de thapsia silentio obliterandū. Si quis spiratibus uentis: hpsiam (media existente inter illū & aurā herba) fossorio rastro euulserit, tā molestos illico pudendorū experietur pruritus, ut præ scabendi assiduitate ac pertinaciā, absit quā minimū, quin sibi uirile membrū euellat. Id enim ab ijs q periculū fecerunt, nuper intelleximus: ut inde facili sit obseruationē cōfirmare, quam in eruenda thapsia præcipit Dioscorides.

λύπινος, Lupinus.

Officinis nomen seruat, uulgo ubiq; Galliarum des lupins, Italis lupino. Duorum est generum, satius & erraticus.

θλάσις, Thlaspi.

Capfella & scandulaceū Latinis: officinis ac herbarijs nasturtium testorū, & sinapi rusticum. Duo thlaspios genera, maius & minus: utrūq; lapidosus & uineis delectatur, herbariæ rei studiosis iam notissimum, uulgo ignotum.

λακκάδα, Lactuca.

Lactuca alia crispa: rotūda alia: alia capitata: officinis nomen retinet. Gallis & Delphinatibus lactue: nostris lachugo: Italis lactuga: omnes uulgo notæ.

θύμος, Thymus.

Latinis & officinis nomen retinet: Gallis du thym: Italis thimo: Delphinatibus & nostratibus frigoulo: tā ubiq; notus, ut ne tri mum puellum eum ignorare existimem.

σάτυρος, Satureia.

Satureia Latinis & officinis: Gallis de la thymbre ou sariette: Tuscis conijella, in alijs Italiæ locis saoureggia & penerella. Delphinatibus de saouree: nostratibus seiruegno. Duo eius summa fastigia: syluestris, quæ præstantior: & domestica, maximi in hybernis iusculis apud Delphinates usus. Iusculi genus appellant de la pouruôlo, aut pouruora.

ἰντύν, Intybi.

ἰντύν Græcis: intybus Latinis. Duo summa seridis genera: syluestris & satia. Satia seris bifariam distribuitur: In unam quæ latiore constat folio, lactucæ similior: Hetruriz corrupta ab intybo appellatione endiuiā: officinis itidem hæc pro uera endiuiā est usurpanda, longè ualere iussa illarum endiuiā, quæ est syluestris lactuca: Gallis endyne: nostris endyuo. Delphinatibus cichorée. Alterā angustioribus folijs, & gustu subamaro. Hæc quadā uocum diminutione seriola dicitur, quam corrum pentes recentiores, scariolam dixerunt: ea Gallis scariolæ etiā nominatur, & officinis scariola, Lugduni passim cichorée, qua in acetarijs hyeme tota, maxima palati suauitate, utuntur. Syluestris item in duas species diuiditur. Alteram quæ ab insigni amaritudine *πικρὴ ἡ καχόβριον*, Latinis ambubeia, herbarijs & officinis cichoræa: Gallis, & nostratibus cichorée: Delphinatibus cichorée bouschasse. Alteram, quæ hedypnois nomen à somno conciliando, aut ab eleganti inter serides odoris suauitate, sibi adoptauit. Hæc dens leonis, aut rostrum porcinum officinis, Gallis pisse en liêt, Italis piscia al letto appellatur.

ἰσχύς, Viscum.

Latinis & officinis uiscū, nostris & Delphinatibus de uisch, Italis uischio: Gallis guis de chesne. Varijs in arboribus gignitur, & omnium rarissime in quercu, quanquam id solum ad medicos usus celebrari & experi uideatur.

ῖος, Viola.

Hoc loci, uiolæ noīe, martiam appellatam uiolā intelligit. Huius duo inueniuntur genera, cādida & purpurea. Cādida folio est minore, nigriore, quā purpurea, subhirtuto. In hortis Lugdunensibus, & syluis uicinis passim inuenitur. Purpurea duū est generū. Siq; alterius flores, quinque: alterius uerò, quatuordecim folijs cōstāt. Hūc uiolæ double: illum simplici-ter uiolæ uulgo totius Galliz appellat. Ambo in Italia uiolæ māmole dicūtur. De reliquis autem uiolæ generibus in leucoio agetur.

ἱσπρίσις, Equisetum.

Herbarijs & officinis cauda equina: Gallis de la prele: Delphinatibus, ab eius asperitate, d'asprette: nostris, à cōsolidandis glutinandisq; uulneribus, consaulde nominatur. Trium est generū, sed omnes notæ, & idem nomen retinent. In Italia tamen minor asprella, maior coda di cauallo dicitur.

ἰσάτις, Isatis.

Officinis ignota. Duū est generum. Satia Gallis du guesder: Tuscis guado: Aquitanis, apud quos mercimoniz nomine celebratissima est, ac nostratibus de pastel, nominatur. Syluestris, quanquā doctis non ignota, nullum tamen, quod explicari saltem potuerim, uulgatum sibi nomen adoptauit.

ἰλίξ, Salix.

Officinis nomen seruat. Tria salicis genera, nigra omnium maxime procera, Gallis du saulx aut saule: Delphinatibus & nostris saulse, Italis salice. Candida, quæ mediæ est altitudinis, nostratibus uege dicitur, fluminū ripis familiaris. Viminalis, quæ in satiam & erraticā distribuitur. Erratica rursus bifariam partitur: in pumillā omnium tenuissimā & ruberrimā, & aliā prociorem, quæ nigrā salicē quodammodo æmulatur ac mētitur. Viminales omnes sub amerinæ nomine intelligūt & cōprehēdūt, quæ Gallis oustier: nostratibus amarinier: Delphinatibus armarinier, & stolones aut seôte uiticulæ nobis amarinos, illis armarines, Italis uēchi nominātur. Aliam habes salicis diuisionē apud Fuchsiū ex Theophrasto, Plinio & Lucio Columella. Nos hæc sumus amplexi, ut qui has oēs salicis species exactē cognitas habemus, quarūq; historiā alibi copiosē tractabimus.

καλαμίνθη, Calaminthe.

Tria eius genera. Primum officinis nomē retinet: Italis calamēto. Alterū pulegij regalis (quod uerius clynopodium Dioscoridis est) nomē sibi asciuit. Tertiū putatur herbariorū & officinarum herba catti. Gallis, Delphinatibus & nostris l'herbe au chat. Nepeta Italis nipotella: nec desunt (quod est uerò similis) qui herbam catti calamēti speciem esse negent.

καλαμὸς ἀρωματιστός, Calamus aromaticus.

Ostētant officinæ radicē quādam, quam calami aromatici nomine uenditāt: quāq; nonnulli ad acorū referendā putēt: quorū nimirū sentētia ueterū odoratus calamus desyderet. Substitui calami, cuius laboramus inopia, potest arborū muscus.

καλαμὸς φραγμαίτης, Calamus phragmites.

Arundo. uulgaris est notitiæ: Gallis du rousseau: Delphinatibus & nostris de cannos: Italis canna.

κάνναβις, Cannabis.

Officinis nomen retinet: Gallis chanure: Delphinatibus channeou: nostris cannebe, & carbe: Italis canape. In satia & syluestre diuiditur. Satia in marē & foeminā, quæ ad lineos usus est accommodatio: sed sterilis mas semen profert. Syluestris multorū ingenia torfit, nec tamē adhuc satis cognita est, quam non me latet herba, quā pro syluestri cannabi ostētant.

κάπνιον, Fumaria.

Fumus terre officinis, Gallis, nostratibus, & Delphinatibus fume terre: Italis fumaria & fumo tere, omnibus nota est, & frequētia in medicina usus.

κάππαρις, Capparys.

Latini & officinæ Græcam appellationem usurparunt. Maritimis locis delectatur hic frutex. Lutetiz quoq; in horto diuæ Mariz uisitur. Fructus Gallis & Delphinatibus des cappres: Italis cappari: nostris, dictioē tantillum immutantibus tapperos nominat. in nostra prouincia frequēs, maritimis præsertim locis.

κάρδαμον, Nasturtium.

κάρδαμον Græcis: Nasturtium Latinis & officinis. Duo sunt nasturtij genera: hortense, & syluestre, quod quibusdam lepidiū minus, alijs iberis nominatur: & seorsim ab autoribus pingitur. Hortense in duo quoq; genera distribuitur. Alteri siquidē folia sunt coriandrinis quadantenus proxima, subalbida: caulis rectus, cubitalis, leuis, teres, iunci crassitudine: flos exiguus lactei cādoris. Hoc Gallis craifcon halenoys: Italis agretto: Delphinatibus anitour: nostris nastours dicitur. Alterū uerò folia habet silymbrij cardamines, aliquanto maiora, herbacea, caule rectū, cubitū altum, crassiusculū, striatum: in cuius summo flos insidet luteus, aspectu gratus, alterius flore maior, & ei dissimilis. Hoc Lugdunensibus Frāsciscanis, in quorū horto tantū hātenus uidere nobis licuit, anitour nominat. Alterū enim illi ipsi crescō des iardins discriminis gratia appellāt. Ambobus insignis acrimonia: sed ī eo cui flores sunt lutei, aliquāto maior,

κάρδαμον, Cardamomum.

Duplex est cardamomū: malus & minus. utrūq; triangularibus filis, quolis continetur. Verum in minori flauiores sunt filique, breuiiores, multoq; magis articulatę: tunicę autē filiquarū tenues sunt, flaue, colore & cōsistentia maci officinarū similes. E maiori cardamomo eruitur uulgaris grana paradisiē minori aut

B b uulgatum

vulgarū cardamomū minutis acinis, colore ex terreo flauis, & ita inter se compactis, ut sua effigie muscerdam ualde imitentur. Maioris semina multāgula sunt, colore fusca, uinaceis minora, gustus acerrimi, sine ulla adstrictione, cuius, quāquā exigue, uidetur particeps esse minoris cardamomi fructus: & gustus est cum acrimonia minimē insuauis atq; tantillum aromatici. Quibusdam placet officinarum hoc cardamomum, nō quidem Græcorum, sed Arabum esse cardamomum: alijs neutrorum, sed aliquid tertium. Alij piper Indicum, quibusdam Plinij siliquastrum existimatum, ad cardamomum reuocare contendunt: sed quā appositē uiderint ipsi.

καρπυ, Caron.

Officinis carui. montibus huius gētis herba familiaris, macilentis locis dodrantalis, caule anguloso, non usquequaq; , ut Fuschio placet, quadrangulo, lætioribus & riguis bipedali, plurimum brachiato, flore albo, aut in purpura candido, in summis cauliculis semē angulosum ac copiosum. Folia staphylini, subalbida. Radix cādidā, intorta, gustu aromatico. floret æstate. nascitur, ut dictum est, in montium pratis, uulgoq; cheruy nominari ab indigenis solet. Nam illi eius seminis assiduo esu corpora ab hybernis frigoribus tutantur.

κασία, Casia.

Vulgaris canella est. officinis falso cinamomum dicitur. Nam ueterum cinamomum desyderatur. cuius tamen loco optimæ casia duplum capitur cap. 91. & 101. lib. 13.

καρυα, Caria nux arbor, nux iuglans siue regia, nux parua, pontica, auellana.

Nux iuglans siue regia, uulgo Gallorum Delphinatiumq; noyer: nostris noguyer: fructus illis noix, nobis nose aut noye: Italis noci. Huius innumera penē sunt genera. Auellanae nucis duo genera. Nā altera edomita, altera syluestris statuit. Syluestris Gallis couldrier: nobis & Delphinatib⁹ oulagnier: fructus oulagne: domestica auellanier: fructus utriusq; Gallis auellaine aut noisette: nobis & Delphinatibus auellane: Italis auellana, nocella aut nociuolla. Sūt & Indicæ nuges, nomicæ, metel, & anacardi, de quibus recētiore multi abundē scripserunt: ad quos te remitto.

καστανία, Castanea.

Castanea tum Latinis, tum officinis dicitur: Gallis & Delphinatibus des chataignes: nostris castagnos: Italis castania: multorū sunt generum. Nam alię syluestres, alię domesticæ: alię maiores, minores alię: alię gustui suauiores, alię min⁹ suauies. Quæ maiores & suauiores sunt, Lutetię marons de Lyon appellantur. Maximus hic apud Delphinates castanearum omnis generis proventus. In Gallia rarus: apud nos nullus, aut saltem minimus. Pedemontanorum quoq; ac Lygurū ager castanearum feracissimus est, nec non & Aruernorum.

κικυρις, Milium.

Officinis nomē seruat: Gallis & Delphinatibus dū milhet, & Delphinatibus iuxta ac nostratibus etiam de melh, Italis autem miglio, uocatur.

κεδρος, Cedrus.

Cedri duo genera: maior, & minor. Maior his regionibus nomine tenus cognita. minor ea planta est, quam nostrates ormin appellant, folijs cupressinis, baccis iuniperi maioris, rotundis, pilorum magnitudinē æquantibus, subflauis, gustu acri & aromatico. Planta huiusmodi uulnarū duarū, triūmue, aut ad summum quatuor (in tantā enim proceritate assurgere interdum apud nos uidetur, quāquā rarissimē) longitudinem, & uirilis tibiz magnitudinē non excedit, materie dura est, uenis quibusdā santalinis intercurrentibus distincta, suauiter spirās, fronde sempiterna, cortice rimoso, non supra modum duro. Nascitur in montibus, saxosis præsertim locis, calidisq; duntaxat regionibus. Cedria liquor cedri est, qui primus, dū pix ex cedro sit, ui ignis elicitur. eo liquore his regionibus carem⁹.

κένταυριον, Centaurium maius.

In Gallia infrequens. Lutetiæ tamē in hortis quibusdam uisitur. Audio à familiaribus rei herbariæ peritis, in alpinis nasci, in monte qui cameraco Sabaudorum metropoli ad septentriones adiacet: tum à docto quodam herbario apud Hispaniam, in montibus ei urbi finitimis, quā uulgo nostram dominam de finibus terræ nominant. Doctorum penē omnium consensu radix, quā officinæ rhapōtici nomine uenditāt, centaurij maioris radix est. Explodendus igitur officinarū de cetaurio maiore absurdissimus error: admonendiq; sunt, ut doctos de simplicibus medicamentis consulant, desinantq; tam impudenter in tempus reliquū delirare.

κενταύριον μικρόν, Centaurium minus.

Vulgo herbariorū & officinarum cetaurea minor: Gallis du sacotin: Delphinatibus de repairet: Italis biondella. Vbi que frequēs. Duo huius inueniuntur genera: uulgarū, & aliud monta-

nū, humilior, flore caruleo, calathi aut campanulę effigie representante, caule item quadrangulo, gustu amarissimo. monticolis gentis Delphinaticæ uulgo repairet etiam nominatur. Sed de his alijs copiosius agemus.

κερασις, Cerasus.

Multa cerasi genera. Nā alię acidū fructū, alię dulcem ferūt. quę acidum fructū edūt, Gallis cerisiers, fructus cerises: nostris & Delphinatibus agriottiers, fructus agriottes, Italis ciregie. Huius duo genera. Dulces in multas species distribuūtur. Nā alia duracina, quę Gallis & Delphinatibus des cœurs, nostris grafions. Alia nigra quę Italis corbine: nostris ceyrieros negros. Alia ex albo rubroq; mixta spectātur. hæc Gallis des guines: Delphinatibus & nostris cerises appellantur. Præstātius cerasi genus officinæ agriottam nomināt. De cerasi generibus uide plura apud doctissimum Ruellium cap. 64. lib. 1. suæ de stirpium natura historię: & Matthiolum cap. de ceraso.

καραυρία, Siliqua.

Ea planta est, quam recentiores Græci *ζυλαινία* uel *καρφόβια* appellant, nostrates de carrubios: Italis carobe, & carobole. Lyguribus maritimis familiaris, & tam frequens, ut apud nos in prouerbiū abierit, carrubia auenā esse asinorū Lygurū. Raro in nostra prouincia inuenitur, apud Niceā & Villā cognomēto Francā, passim. Saxosis enim asperisq; locis delectatur.

κετρον, Betonica.

Dux betonica species. Prior officinis nomen retinet: Gallis de la betoine: Delphinatibus & nostris betoni: Italis betonica. Altera bifariam diuiditur, in altilem & syluestre. Altilem Gallis oilhet: Delphinatibus giroflée: nostris giroflado. Syluestris officinis tunicis, Gallis des ameris. Inuenitur & in syluis altera agrestis betonica flore suppalido, mirē elegantī, quam Delphinates giroflée-boschasse appellant.

κύνις, Galla omphacitis.

Galla duplex habetur. Alia ab oriētis partibus ad nos inuehitur, & uulgo galle de romanie appellatur: in Italia autē galla. Alia hic ē quercu nascēs nobis familiaris, quę simpliciter gallæ nomen retinet.

κερός, Cera.

Officinis nomē seruat, uulgo de la cire. Cera species notiores, quā ut in his explicandis immorandum existimem.

κεβόριον, Cichorium.

Pocilli genus est, ex Aegyptia faba confati.

κινάρα, Cinara.

Cogitāti mihi ac memoria repetēti, quā incerta sit & obscura carduorū nostra etate cognitio: uix succurrit quid de illis, pro re pbabili, nedū certa, sit pronūciandū. Nā, ut agrestes omittamus, duo fecit Theophrastus, cap. 4. lib. 6. hist. plāt. cardui genera: alterū, cui scolymi: alterū, cui casti nomē insit. Scolymō hoc sibi peculiare uēdicasse, q; radicē tum crudā, tum coctam, uescēdā subministrat: sed cibo gratissimā, cūm florescit. Cūm solstitiū agitur, eius florē erūpere. Eundē senescētem in pappos fathiscere: partū oblōgū esse, nec spinosū. Eius quoq; folia spinis carere, quāuis plāta ipsa acanī speciē gerat. Casto uerō statim à radice caules humi reptātes, pducere, quos uocent castos, & foliū spinosum. Desquamatos eos esculētos esse, tātillūq; subamaros, & in muria seruari. Emittere præterea alterum caule rectū, quē uocēt pternicē: esculētū & ipsum quoq; , at uetustatis impatiētē. Seminis inuoluerū, forma quidē spinosum: qd, detractis lanuginosis seminibus, uescum sit, & palmæ cerebro persimile. Dioscoridi autē scholymos chamæleonis folia obtinet, aut albæ spinæ, nigriora & crassiora: caule lōgū, foliosum: spinosum caput: radicē nigrā & crassā. Ex quibus liceat, inter Theophrasti, & Dioscoridis scolymō, manifestū agnoscere discriminē. Accedit, Galenū lib. 2. de facultatib. aliment. Paulū, cap. 74. lib. primi, & Aetiū hoc loco, cinarā à scolymo (de quo in simpliciū cēsu meminerūt) distinxissē. Cinarā aut Athenęo, lib. 2. Dipnosophistarū, nihil aliud esse, quā Siculorū caston, quæ à Romanis eorū uicinis, leui quadā litera rum mutatione, carduus nomine ē. Vnde ex illorū scriptis hoc colligi possit, cinarā & scolymon, plantas quidē congenere: sed hūc (præcipuē Dioscorideū) erraticū: illā, hortēciem esse: quæ, inquā, à Siculorū casto diuersa planta non sit. Ad caston igit reuocari posset cardui genus illud, quē Itali cardone: Galli aut cardon & carde nomināt. Siquidem radice est crassā, candida, folijs amplis, in ambitu profundē incisis, multis ac rigētibus aculeis armatis: caule recto, nō admodū procero: capite satis amplo, spinis horrido: flore purpurascēte: semine uariis magnitudine, læui nec anguloso. Verū in hac planta, radices crudæ ac coctæ in usum ciborum ueniunt: & inflexi deorsumq; nutātes caules, casti dicti (nisi castorum nomine foliorum pediculi ueniānt, qui quasi humi reptant, uesci sunt, & modicē

modicè amari) desideratur. Vt inde colligi possit eā, aut non uerā cacton, sed quandā eius speciē esse: quanquā urbanam, & laurioribus mēsis expetita: aut, si uera cactus sit, ob regionū & cultus uarietate, aliqua nūc deesse, quæ in ea olim uidebantur: & adesse alia (uesca radix scilicet, tū cocta, tū cruda, & foliorū pediculi, sed cocti) quæ olim ignota fuerint. Ad scolymon aut Theophrasti, Italorū carcioffi, q. Lōgobardis archichiochi: nostris carchofles: Gallis & Delphinatibus artichault dicuntur: quanquā omnia illa nomina corruptā quandā eadē nomenclationē testent. Huic radix est crassa, cādida, folia ampla, multo minus, quā priora, in ambitu incisa, nullis spinis horrida, molli lanugine incana: dorsum pediculi foliorū pminēs, ac ualde striatū: caulis procerus: caput in cacumine ex rotunditate oblongū, nucis pineæ quasi æmulū: flos nūc purpureus, nūc ex purpura cādidus: Semē enici, alterius semine breuius, crassius, & minus nigrū. Huius præsertim esculentū est pomū. Radices (quas in scolymō esculentas facit Theophrastus) & reliquæ eius partes, uelut amariore, à mēsis abdicatur. Prioris autē pomū, pediculi foliorū, & radices expetuntur. Verū foliorū costæ minus, ob tantillā amaritudinē. Audio in Italia secundū huius generis, scolymū uidelicet, quosdā spinosos esse: ut inde elici possit cardui genus illud, quod Dioscoridis scolymō respōdet: nisi Italorū presura, & Gallorū chardonnette (ex cuius florib⁹ lac cogitur, unde ab Italis inditū nomē) quæ scolymos syluestris est, ad Dioscorideū scolymon referatur. Radicē enim crassā ac nigrā habet: caule rectū, longū, foliosum, spinosūq;: in cuius summo insidet caput multis spinis horridū: flores cerulei, aut ex ceruleo purpurei: Semē reliquis min⁹: folia quasi albæ spinæ aut chamæleonis, nigriora & crassiora. Hæc sunt q. de scolymō, cactus, & cinara, ex pbatiorū autorū lectione seligere ac depromere potuimus, adhibita interī plātārū nostri temporis oculari fide. Aequū tamē ac beneuolū lectorem optamus meliora in mediū adducere, si ueri similia, & lecturis utiliora apud eosdē inuenierit.

κικίν Ricinus.

Ricinus herbarijs & officinis palmā Christi, Gallis & nobis paul me Christi: quibuscūq; tamē officinis cataputia maior nominat.

κίσθος Cisthus.

Aquitanicis officinis præsertim Monspeffulanis cognitus: Gallis ignotus: uulgo Gallorū, ut quibuscūq; placet, garrines aut englentier. Duo eius genera: mas flore rubro: foemina pallido: ambobus roseo effigie. Altitudo fruticis cubitalis, rami multi, folia numerosa, ramorū summitatē uestientia, rotūda, hirsuta. Frequēs uterq; in nostra prouincia, & in Aquitania, syluosis, aridis & asperis locis prouenit. Vulgatum illi quod insit apud eosdē nomen, adhuc me latet. Foemina cisthus apud Delphinates & in Gallia quoque multis locis inuenitur.

κίσθος ἡ λάνθον Cisthus siue Ladanum.

Officinis ladanum.

κισσός Hedera.

κισσός Græcis: hedera Latinis, officinis & Italis: practicis quibuscūq; cussus, ineptē pro *κίσις*: Gallis hierre: Delphinatibus ere: nostris heurre. Tria Dioscoridi hederæ præcipua genera: Candida, nigra, helix. Cādida, candidū fructū parit. Nigra, nigrum aut croci æmulū, quā Dioscoridis ætate, uulgo Dionysia nominabat. Helix fructū nō gignit, sed tenues emittit uiticulas, folia parua, angulosa, rubra. Hæc oēs species notæ hodie sūt, & generis nomen retinet. Longē plures hederæ species fecerūt Theophrastus cap. 18. lib. 3. hist. plant. & Plinius cap. 34. lib. 16. nat. hist. ad quos autores breuitatis studio te remitto.

κνέκος Cnecus.

κνέκος Græcis, Cnecus Latinis. Duo ei⁹, autore Theophrasto cap. 4. lib. 6. hist. plāt. genera: urbana, & agrestis. Satiua officinis carthamus: Italis zaffarano saracinesco: Gallis & nostris, à crocatis floribus, saffran bastard. Syluestris duūm itē generū. Altera hortēū cneco similis, sed caule magis recto, quo antiquæ mulieres colus uice utebātur. fructū edit nigrū, magnū, amarum. Altera species hirsuta, caulibusq; soncho proximis, qui ob foliorū mollitiem terrā uersus inclinētur, & humi quasi reptare cogātur. Semen profert amarū, hirsutū. Hæc duæ species syluestris enici tā apertē putatā atractylidem & carduum officinarū benedictū (q. Italis cardo benedictō, cardo santo, & herba turca: Gallis chardō benict: Delphinatib⁹ l'herbo dau uerin: nostris cardū benict nominat) exprimit, ut significatiuū nō possint. Vnde mirari subit, Pliniū & alios quosdā Latinos scriptores eum sequutos, ea uni atractylidi attribuisse, quæ cneco di lucidē adscribit Theophrastus. Sed inde, opinor, suæ argumentum sententiæ deprompserūt, quod eadē Theophrastus primæ eneci syluestris (q. ad colus rationē attinet) speciei penē adscripserit, q. atractylidi Dioscorides: nec ineptē quidē, nisi (interferta acarnæ historia) atractylidis ilicō meminisset. Ex cui⁹ delineamētis non minus prōptū sit colligere, uerā atractylidē

esse adhuc ignotā: aut, si cognita sit, sine honore iacere. Nō est interim hoc silētiō obliterandū, syluestre enicū secundi generis, nostra ætate in hortis coli, & cultus māgonio, deposita feritate, in domesticam cōsuetudinem iam transisse. Quamquā scio quosdam leuibus argumentis permotos, nolle carduum benedictum, ad syluestris enici speciem alteram reuocari: quā si tātula in una aut altera nota dissimilitudo, reliquis omnibus exactē consentientibus, herbæ speciem possit immutare.

κνέκος ενιδιος Coccus enidius.

Coccus enidius semen thymelææ est. Thymelæa autē officinarū mezereō, & herbariorū leo terræ. Ea folio est hortēis lini, flagellis cubitalibus, multis ab una radice cōsurgētibus, rotūdis, foliosis: fusco colore: flore albo, copioso: semine myrti penē magnitudine, primō uiridi, ubi maturuerit rubro. Floret ineūte ætate. Semē maturefcit circa mēsem augusti. In nostra prouincia ubiq; inuenitur, sed præcipuē apud Aquas sextias urbē clarissimā, & quā inde Malsiliā itur, in locis saxosis, aridis, & penē sterilibus: facilisq; uel hac nota inuētū esse potest, quod nullā pede uno aut altero, prope se uirentē herbam patiat, quin omnes sua perniciofa natura interimit, ut nō immeritō leo terræ fuerit ab herbarijs cognominata. Inopiā interim radicū thymelææ facit chamelæa cap. 78. 79. lib. 16.

κνέκος βαφικος Coccus tinctorius.

Nostratibus & Gallis du uermilhon: Italis grana, fructus est arbuti ilicei generis apud nos frequentis, ut suprā in quercus mentione annotauimus.

κνέκος πυρηνος Prunus.

Varia prunorum genera, sed quæ in duo præcipua reducūtur. Syluestre & satiuū. Satiuo adscribuntur nigra multiplicia, alba, cerea, & rubentia: quorum item plures sunt species, ut alibi suo loco à nobis dicetur. Syluestria Asianis *πρύνος*, & Galen. lib. 2. facult. aliment. *αγριμυρμυρ*: Gallis autem, Delphinatibus & nostris prunes: Italis Tuscis succine dici solent.

κνέκος σπορον Colocasion.

Radix est Aegyptiæ fabæ.

κνέκος κινθρος Cucurbita.

Multa cucurbitæ sunt genera, sed quæ omnes nomē generis seruent: Gallis de courges: Delphinatibus & nostris courcours: Italis zucca. Est & colocynthis in usu frequens: Gallis colocynthe: officinis colocynthidos, aut colocynthida.

κνέκος Arbutus.

κνέκος Græcis, arbutus & unedo Latinis, incolis Corsicæ insule árbyto: Italis álbato: Delphinatib⁹ & nostris arboux, & d'er boussiere: eius fruct⁹ d'arboussos, q. Græcis, teste Dioscoride, *μυρμυρ* nominatur. Arbor est coactæ breuitatis, cotoneæ malo similis, foliis numeroso, lauri figurā, p. summa tamē obtusiore, & in ambitu lentē simbriato: flore subherbaceo: fructu é lōgis pediculis inæqualiter depēdēte, pruni aut gallicæ (aliquādo tamē parui mali araci) magnitudine, rotundo, fragrum sua effigie penitus exprimente, primū uiridi, ubi maturuit ex saturata purpura fuluescēte, gustu cū quadā acerbitate dulci, largioreq; esu nauseā proritante, intus granuloso, qui autumnō maturefcit. Plurimus nascitur in Corsica ac nostra Prouincia maritimis locis: & apud Delphinates in syluis: in quibuscūq; itē Sabaudie mōribus, ubi d'arbesse noīatur. Gallie infrequēs & parum cognitus. Lugduni, Valētiæ, & Tournone in hortis quibusdam plantatus uisitur. Dioscoridi nullius est in medicina usus. Nostrā tamē memoriā à quibuscūq; fructus maturus in capitellum coniecit, liquorq; qui inde ui ignis elicitur, recondito, aut prorsus ignoto multis experimento, ad renum & uescicæ calculos atterendos, felicissimē usurpatur.

κνέκος Gummi.

Gummi nomine Arabicum puto intelligi: quod quidem habetur, & officinis nomen seruat, uulgo gomme.

κνέκος Lixium.

Officinis nomen retinet. Gallis du lexis. Delphinatibus lexien nostris leixieu.

κνέκος Conyza.

Pumicaria, & cimicaria, & herba sancti Rochi dicitur, Gallis l'herbe aux pulces: Italis pulicaria. Duūm est generum, maior & minor. ambæ notæ: officinis herba pulicaria. Tertium addit Dioscorides, hodie aut ignotum prorsus, aut paucis cognitum.

κνέκος Coriandrum.

Vulgaris est notitæ. Ab oīb⁹ coriādre: Italis coriādroli nominat.

κνέκος Colla, glutinum.

Galli, Delphinates & nostrates Græcū nomē retinet, de la colle.

κνέκος Pes cornicis.

Doctōrū propē omnium sententiā cornu cerui officinarum est. Gallis corne de cerf: Italis herba stella. Ad coronopodium reuocari potest herba, quam Galli uocant du targon.

κνέκος Coīsus.

Costi unicū genus Dioscoridi fuit: uerū colore, cōsistentia ac re-

gionib⁹ distinctū. Arabici em̄ candidū facit, leuē, eximia odoris suauitate p̄ditū. Secundū locū tribuit Indico, leuī, uberi, & ferulē modo nigro. Postremā sedē assignat Syriaco grani, q̄ colore buxeus sit, & odore feriens. Galenus autē costū modicē amarū dicit. Arabū scholā duo costi genera faciunt: dulcē & amarū. Dulcis sapore quadatenus mētū glycyrrhizā, colore fusco, gustu acri, substantia radiceis solida & pōderosa. Amarus ex flauo pallidus est, leuī, lignosus, dulci crassior; minime acrimoniæ particeps. Ex qbus intelligit Arabū utrūq; costū à Græcorū costo alienū esse. Vnde tutius sit ex Galeni succidaneis ammoniacū, aut helenij radicē costi inopia usurpare. Aiūt docti nōnulli ueterū costū Venetijs iam haberi. Habet & uulgus suū costū qui Gallis Delphinatibus du coq; nostris cost; Italis piperella dicit. Radice numerosa, implicata, multis hinc & inde adnatis appēdicib⁹, exigua: caule cubitali: flore in cacumine luteo, flori uulgaris athanasiz simili: folijs maioris lepidij, candidis, minime crassis, in ambitu serratis, gustu feruido, sapore aromatico ac grato. In hortis ubiq; inuenit, quidā putāt costū uulgarē ad Plinij siliquastrū aut piperitim reuocādū. Alij nōnulli p̄ter omnē rationē ad Pauli & Plinij lepidiū, quasi uulgaris costus odore sit & sapore nasturtij: unde constat lepidium Græcis, agriocardamon & cardamanticē fuisse uocatum. Verū in lepidij mentione, hac de re pluribus agemus.

περιχλωρὸν, Umbilicus Veneris.

Officinis & Gallis ignotus: apud nos frequēs uulgōq; aureilheos nominat, quod, meo iudicio, quadatenus humanas aures sua effigie emuletur. Delphinatib⁹ de bloudo: Italis cupitiuola.

κράββη, Brassica.

Duū est generū, Satiua, cuius plurimæ sunt species: & syluestris quæ officinis soldana aut soldanella nominatur, Aquitaniz & nostræ prouinciæ maritimis præsertim locis familiaris. Satiua, ab insigni ac penē arboreo caule, Gallis & Delphinatibus chou: Tuscis caulo: Longobardis uerza: nostris caulet nomen obtinuit.

κρεθμύον, Crethmum.

Batis duo genera: syluestris, cui⁹ meminerūt antiqui, & crethmū appellarunt, quod officinarum creta marina, Gallorum crethe marine est, id Romanis sinoechio marino: alijs quibsdā Italiæ populis herba di san pietro nominatur. Hortensianā batin neglexerunt ueteres Græci. Eius mentionē fecit Columella. Ea Italis baticula, Gallis bacilles: nostris tum basilhes, tum basignes, maxime à maritima plebe, dicitur.

ορδύον, Ordeum.

Officinis nomē seruat: Gallis & Delphinatibus orge: Italis orzo: nostris orge & ordi. Diuidit in polystichū, & distichū, quod aliud in duos, aliud in plures uersus siue ordines distribuatur.

λίλον, Lilium.

Græcis: lilium & rosa iunonia Latinis: officinis lilii. Tria habentur præcipua lilij genera, candidū, purpurascens & croceum. Candidū in hortulanū & syluaticum diuiditur. Syluaticum à nemine hætenus depictū. Constat autē radice candida, succosa, in manus effigiem conformata, radiculis oblongis, radicibus albi ueratri æmulis, nō numerosis, caule dodrātali aut proceriore, folio porri aut narcisci, lōgō, angusto, flore hortēsis lilij, minōre, in summis cauliculis prodeunte, floret mense Iulio. Nascitur apud Delphinates in mōtib⁹ altis, præcipuē in mōtis cuiusdā pratis, qui eorum lingua Chironno appellatur. Situs est autem ad septentriones ei urbi quæ Die uulgō dicitur. Croceū & purpurascens Fuchsius cognita, distincta & depicta: Gallis hominibus nondum exactē cognita. Nos omnium historiam seorsum exarauimus. Sed ad rem. Lilium officinis nomē seruat: Gallis du lys, Delphinatibus ile, nostris yeli & ili: Italis giglio. Croceū, purpurascens & candidū syluestre, quia montibus sunt peculiariz, ideo uulgō ignoratur: purpureū tamē, ut quidā uolunt, Italis martagon dicitur. Croceum autē & purpurascens iam in hortis quibusdam maxime Lugdunensibus haberi cœperunt. Cœleste uerō officinarum lilium, iris Dioscoridis est.

κροκόδεινον, Crocodilium.

Spinosa plāta, in aquatilibus syluarū pratis nascens pro crocodilio ostēdit: de qua tamē statui certi, meo iudicio, nihil potest.

κρόκος, Crocus.

Officinis crocus: Gallis, Delphinatib⁹ & nostris, Mauritana imitatione saffram, quasi zaffaram, Italis zaffarano nominatur.

κεφαλή, Cepa.

Ceparū duo præcipua genera: Albæ mitiores, minorisq; acrimoniæ participes, ac, ut plurimū, maiores. Rubescens, acriores, & sensum gustus magis ferientes. hæ Gallis & Delphinatibus oignon: nostris, Latinum nomen tantillum uitiantibus, cebo: Italis cipolla. Habentur ceparum species quædam perexiguæ, & in cibis magis expetitz, quas Galli ciboules appellant, alij ciucs.

Vulgaris est notitiæ: Gallis faues: Delphinatibus & nostris faues: Italis faua.

κυκλάμιον, Cyclaminus.

Duū est generum: prior officinis cyclamen & panis porcinus: herbarijs panis porcinus: uulgō Gallico pan porcino: Italicō autē pan porcino. Hæc species copiosa nascitur apud Diuū Claudium nō procul à finibus Helueticū, & in montibus Aruerniz, & alibi multis in locis. Altera species quæ sit, nondū doctis compertū est. Ruellius tamen contendit esse Gallicarum officinarum sigillum Mariæ, quo nomine Delphinaticæ polygonatum intelligunt.

κύνιον, Cuminum.

Aliud Aethyopicū, nobis ignotum. Aliud his regionibus nascēs, quod officinis nomē seruat: Gallis & Delphinatibus du cumin: nostris cumin: Italis ciminio appellatus.

κυσσάριον, Cupressus.

Vbiq; Galliarum cypresin Italia cipresso. arbor est notissima.

κύπερος, Cyperus.

Cyperus officinis nomē retinet: Gallis du fouchet. Dioscorides cyperi radices oliuarū tuberculo facit tumētes, inter se cōmixtas, nigro colorē, iuchidē spirātes. Inueniunt tamē nōnullis in locis oblongæ, nec à prioribus gustu differētes. Cypero caulis nūctriagulus, nūc quadrāgul⁹, ut ob id angulosus Dioscoridi fuerit dictus. Herba est notissima, ubiq; in paludosis & humidis nascēs. Est & cyperus Indicus zingiberi similis, gustu leniter, aut nihil prorsus, amaro, qui cōmanducatus croceū remittit colorē: & pilosis partib⁹ illitus, psilothron efficacissimū est. Hic assentiente descriptione, & doctorū omniū iudicio, nihil aliud est, quā radix illa, quæ ex India cum zingibere affertur, uixq; ab ullo, nisi à peritis, discernitur, quā Italicæ officinæ curcumā (non quidē radicem maioris chelidonij, quæ in Serapiōis codicibus curcuma corruptē pro chelidonia legitur). Gallicæ terram meritam nominant. Tertium cyperi genus herbarum coniectores fecerunt eam radicem, quæ officinis & medicis recentioribus, galanga dicitur: quod subrubra sit, geniculis scatens, surculosa, in quosdam nodos crassiores ex internallis intorta, sapore acerrimo, linguā admodū uellicante, odore quadatenus cyperum imitante. Hanc cyperū Babylonicum cognominarunt. Quidam contendunt eam esse ueterum acorum. Verū multa notæ repugnant, quo minus galanga dici acorum ueterum possit, ut in acori mentione dictum est.

λίγιστρον, Ligustrum.

Officinis alkanna, Gallis du troyne: Delphinatibus & nostris oliuier sauluaige. Tuscis guistrico, alijs quibusdā Italiæ locis oliuetta, alijs oliuella, alijs nōnullis chébrossene, nominatur. Nec me mouet, quod Fuchsius cyprum plātā peregrinā ex Plinio esse uelit. Nā multa plerunq; ē lōginquo petūtur, quæ domi citra magnum negocium inueniri possunt. Siquidem plātā nō pauca his in regionibus affaciū luxuriant, quas antiqui soli, pene dixerim, Crete peculiare existimarūt, ut de tordyljo apparet, quod ipsemet Fuchsius copiosissimum nasci in Germania prodit: quodq; in huius Delphinaticæ gentis montibus, & alpius ipsis, uel ad nauseam usq; luxuriare certō scimus, quæ admodum alibi copiosius dicemus.

κύτιον, Cytisum.

Græcis: Cytisum Latinis: officinis & uulgō ignotum. Antiquis tum medicis, tum rei rusticæ scriptoribus celebratū fuit, & in precio habitū. Nostris temporibus à paucissimis notum. Hic tamen Lugduni in horto Franciscanorum habetur frutex quidam, qui cytiso antiquorū omni ex parte respōdet. Spectatur autem hac forma. Frutex est sesquiulnæ altitudinem petens, nulla ligni gratia, brachio minus crassus, flagellis exiguus, oblongis, aspectu incano, folio sempiterno, folij scenigræci aut loti trifoliz æmulo, dorso medio prominente, superne herbaceo, inferne candicante, quod digitis constrictum erucam olet, commanducatum uerō, ciceris recentis gustum resipit. Flore quasi pisi luteo, nigricantibus uelut punctis maculoso: quo decussō semen in siliquis, spartij Dioscoridei siliquis, aut anagyridos (quæ uera Theophrasti cap. 17. lib. 3. hist. plant. colutea, & Plinij cap. 18. lib. 16. laburnum est) corniculis non absimilibus, recondit. Floret hyeme tota & usq; ad uernum æquinoctium, aut etiam mensem Maium: sed urgente hyemis inclementia, magis appetente æquinoctio, minus: Maio uerō, minimum: quo nimirum tempore non tam multi sanē flores apparent. Exin sensim æstate siliquatur, ac tandem Autumno, in siliquis spartij Dioscoridei, aut coluteæ Theophrasti, quæ Dioscoridi anagyris est, & Plinio laburnum, siliquis non dissimilibus maturum semen recondit. Rarissima planta in Gallia est, & crediderim unica, ut quæ ante annos aliquot Roma à perito quopiam medico

huc allata fuerit. Olim iuxta aluearia serēbatur, tum in Italia, tum in Hispania. Verum Plinij ætate (ut ipse testis est. cap. 24. lib. 13.) iam in Italia erat rarissima. Nostris temporibus aut nulla, aut (si Virgilio Marcello credimus) ignota sine honore iacet. Vnde mirari subit eorum sententiam, qui cythium faciūt plantam toti Italiæ notissimam, quēdāq; patrio ipsi sermone trifoglio, di. cauallō & tribolo nominari dicant: & Fuchsius (ut ipse docet, trifolium aspalion inconfulto existimari. Verum an iuxta capraria herbariorum, quę nostris l'herbo de la cabrière, & Fuchsius odoratum trifolium dicitur, trifolium illud sit, an cythium, capite de trifolio exactius in examen adducemus. Nunc autem, quoniam in coluteæ mentionem inciderimus, minimē alienum ab instituto nostro fuerit, huic orationi pauca de illa subnectere. *καλυρία*, Theophrasto: *ἀνὰ γύριον*, Dioscoridis laburnum, Plinio: quibusdā Italiæ populis, *eghelo*: Delphinatibus, Sabaudis, & terrę nouę incolis, metathesi quadam literatum à Latina nomenclatione minimum uariantibus, *albour* & *aulbour* nominatur. Arbor est fruticosa frutēxue arbor escens, in quatuor nimirum ulnarum altitudinem assurgens, caudice non admodum crasso, ramis hinc & inde diffusis. Aut nonnunquam, quia plerumq; ceditur, & coryli modo ab imo caudice regerminat) fruticosa spectatur, stolonēs numerosos ab una radice fundens, longos, rectos, ex uiridi candicātes, agni uirgis similes: ē quibus per cetera interualla erumpunt folia terna, longo pediculo nitentia, fœnigræci folijs effigie ac numero similia, maiora tamen adq; uiticis folia plurimum accedentia, læuia, supernē uiridia, infernē candicantia. E ramis ipsis prope foliorum pediculos emergunt flores lutei, ut flores genistę aut brassicę, ē longis pediculis inæqualiter dependentes, rariorēq; illa ac prælonga textura cubitalem æquantēs longitudinem, olentes grauitē, atq; ob id, profecto, apibus in grati. Floribus decussis prælonga succedit cornicula siliquę uē, nō prætumidę quidem, & multo spiritu distentę, sed pisorum hortensium siliquis adsimiles, aliquanto tamen breuiores ac presiores, fractu contumaces, in medio interdum inanēs ac compressę. In extremis autē ac nonnunquā intermedijs spatijs cōtinetur semen lentis magnitudinem æquans, ex latitudine subrotundum: imo loco, quā siliquę per petiolum hæret, tantillū excauatum, renis prorsus æmulū: quod, antē quā maturuerit, uiret: post maturitatē uarium est, durū, & ob lænorē splēdidū. Floret mēse Maio & Iunij initio. dein sensim siliqua tur ætare, actandē durefcit maturescēte uua, & circa calend. Octob. integrē perficitur. Nasctur in alpijs & montibus ferme omnibus Delphinatus, Sabaudię, & terrę cognomento nouę, umbrosis & syluosis locis humidisq;, & nonnunquā siccis, aque eorum locorū indigenis *albour* & *aulbour* nominatur. Ex quibus notis constat Dioscoridem, Theophrastum ac Plinium unam & eandem plantam uarijs nominibus descripsisse. Verum obijciēt aliquis: Si Laburnum Plinij & Dioscoridis (id quod negari nō potest) anagyris cēseri hæc plāta debet, q fieri potest, ut de anagyride seorsim Plinius tractarit? Sed his respōderi potest, Plinium anagyrin ē Græcorum libris, ut pleraq; aliā, transtulisse: & laburni historiam, qualem auditione à rusticis alpium cognouerāt, aut fortē etiā plantam uiderat, summam cōscripsisse: argumēto inde sumpto, quod nunquam Theophrastus, nunquā Dioscorides laburni meminerit: ut interim taceam illum, cap. 34. lib. 16. eadem de hedera: quę cap. 10. lib. 24. de cistho: & alibi de marthubio, quę de porro dicenda erant, tradidisse. Ceterū, ne longior sim, certō (præter reliquā historię similitudinē) ac indubitātō scio, laburni alpinorū corticem siccatum, in pollinem redactum, & drachma plus minus una, ex quopiā liquore potui exhibitū, maximas uacuationes moliri. uerū diuersa ratione, quandoquidē, si ab infernis ad superna procedendo corticem eunsum porrigas, uomitū: sin uerō à supernis ad inferna descendendo, deiectiones uel insignes mouebis. Quę omnia fidē faciūt Plinij laburnū à Dioscoridis anagyri, quę est Theophrasto colutea, nulla in re differere eosdēq; autores unam eandēq; plantam uarijs nominibus expressisse & adumbrasse. Esto igitur, ut rādem huic disputationi finem imponamus, Theophrasti *καλυρία*, eadem ipsa planta, quę Dioscoridis anagyris, & Plinij laburnum: quę, inquam, Italij quibusdā *eghelo*: incolis terrę nouę, Delphinatibus & Sabaudis *albour* & *aulbour* uulgo nominatur. Sena autem officinarum Arabum magis inuētum est existimanda: quā quā coluteæ cōgenetē, & ab eius uiribus non usquequaq; abhorrentem, defendere quidam uoluerint. Verum de his alibi latius ac pluribus (si opus fuerit) agetur.

κικυτις, Cicuta.

Officinis nomen retinet: Gallis de la cigue: Aquitanis *cegudo*: Italij *cicuta*: nostris de fenoihas aut fenolh de serp nominat. *πύκναις πίνας*, Nux pinea, Cocalus, Strobilus.

Officinis nux pinea: Gallis & nostris pomme de pin: fructus ipse

id est nucleus nostris, præsertim in maritima prouincia, de pignons: Italij pinochi & pignoli appellatur.

καυκάλιον, Cancaniradix.

Quidam putant esse carui syluestre: *καυκάλιον*, Caucalis.

Gallis, ex Ruellij sententia, persilij bastard: Senis Italiæ urbe petrosello saluatico. Verum domino Ioanni Vassæo, medico doctori Parrhisiensi peritissimo, placet caucalidem eam esse herbam, quę Gallis l'herbe aux gouttes appellatur. Eius namq; uindendę copiam nobis fecit anno domini 1543. cū adhuc Lutię essemus. Nam tum unicam illius plantam in suo horto, istudiosē, unā cum maiore centaurio (quod iridē ibi uidimus) colebat.

καρπύσιον, Carpesium.

Officinis cubebe: nomen ex Arabum disciplina obtinuit. Quidā negant cubebas carpesiū esse, quod eē fructus sint: carpesiū autem caulis aut radix: cuius inopia augeri uolunt phu, aut uerami cassiam minui.

κίκερυς, Cicercula.

Officinis ignotę. Gallis, Delphinatibus & nostris iaysses.

καθυρίς, Lathyrus.

Officinis cataputia minor: Gallis & Delphinatibus de l'espurge: nostris, officinarum nomen usurpantibus cassapuce: Longobardis cacapuzzā uocatur.

λαμπάνα, Lampfana.

Herba est officinis ignota. nostri à Græca nomenclatione tantillum euariantes, de lassenos: Itali lassana: Galli des armoiries appellant. In frumentaceis agris ubiq; copiosissima nascitur.

ῥαῦμα, Rumex, Oxylapathum.

Oxylapathum officinę lapathium acutum, Galli de la pabelle, aut de la patience: Itali rombice. Secundū genus ea herba est, quā omnes hodie rheubarbe & putant & nominant. Tertiū syluestre lapathū est, exiguum, ubiq; copiosissimū, & nostris lapas, Gallis & Delphinatibus du lapais dictū. Quartū oxalis dicitur: cuius duo sunt genera, syluestris & hortensis. Hortensis etiam bifariam distribuitur: in eam, quę oblongis & nigricantibus folijs: & eam, quę albicantibus & rotundiufculis constat. Est & syluestris oxalis omnium minima, & in medicos usus, plusquam cetera lapathi genera, expetita. Officinis & Italij acetosia: Gallis oxaille: Delphinatibus & nostris aigretto, Lugdunensibus sallettenum hæc, tum reliquę oxalidis species dicuntur.

λεμόνιον, Limonium.

Latinis beta syluestris, limonium, terrę tintinabulum, quibusdā pyrola: Gallis, nostris, Delphinatibus, & officinis ignotum.

λεχέρις, Lichen.

Officinis hepatica: ubiq; in locis riguis frequens.

In calce huius libri habes Leontopodij & Lepidij capita, quæ hic per imo prudentiam omissa sunt.

λευκοίον, Leucoium.

Tria leucoij genera colore inter se disparata. Nā aliud luteum, quod keiri officinis nominatur: Aliud candidū: & tertiū quod purpureum florem emittit. Gallis & Delphinatibus des giroflees aut uiolettes: Italij uiola bianca: plante des uoliers: nostris de garranos, sumptā, ni fallor, à Mauritanis nomenclatione, quasi keiranes, appellantur. Luteū leucoion aliud spōte naturę prouenit, aliud in hortis studiosē à mulierculis colitur. Cetera hortensia sunt. Ceterum nostra memoria haberi cœpit planta, quę radicibus constat exiguis, confibratis: caule cubitali, rotundo, molliter uiloso, folioso: folijs nigris, oblongis, folijs lysimachię proximis, acutioribus tamen, in ambitu lere & ex interuallis fimbriatis: flore in cacumine albo, exiguo, agglomerato, barbulis prius quā aperiatur molliter hispido, copioso, leucoij floris æmulo (ubi id nominis sibi apud uulgus adoptauit. Nam maxima ex parte uolier d'espaigne, aut uolier muscat appellatur) odoris suauitate præstanti, & à styrace calamitide minimē alieno. Floret uerno tempore. In hortis ubiq; iam inuenitur. Violę Hispanicę aut moschatę (aptius tamen styracina uiola diceretur) nomenclationem cum uulgo retinuius, quod ex Hispania primum huc allata fuit, & re uera, species uiolę cēseri possit. Nullum tamen eius in medicina usum nouimus: etsi ex odore constet herbam esse uiribus ac dignitate præstantem, & ad multa utilem.

λευκή, Populus alba.

Officinis populus alba: Gallis du tremble & peuplier: Delphinatibus pinou: Italij alberi: nostris piboulo & aulbero nominatur.

θύσος, Thus.

Vulgaris est notitię: uulgus encens: Italia incenso, quod passim in templis, & alibi incendatur, appellat.

ροσμάρινος, Rosmarinus.

Coronaria rosmarinus ubiq; & frequēs & cognita: Gallis & Delphinatibus du romanin: nostris romain: Italij rosmarino. Reliq;

eius species non item. Maximi usus olim fuit in medicina primæ rorismarini speciesi semen, quod canchry dicit, eiusq; mentione scitent ueterum medicorum formulæ. Verum tamen eius inopiâ substitui potest tantundem pyrethri cap. 5. lib. 12. seu pyrethrum aut astaphis agria cap. 65. lib. 8. & cap. 34. lib. 9. Audio tamen Venerijs in quibusdam hortis primâ rorismarini speciē inueniri, & doctorū studio ac diligentia coli.

κρυνός, Fuligo.

Varie sunt fuliginis species.

λυσιστικόν, Ligusticum.

Verum ligusticū adhuc desideratur. Brassauolus nequicquā conatur herbariorū & officinarū imperatoriā, quæ est Delphinatium alegros, & Dioscoridis laserpitii, ad ligusticū reuocare, argumēto inde uel firmissimo sumpto, q̃ imperatoriæ semen oblongū nō est, subnigrū, sceniculaceo maius, acré, & aroma oleus (quæ sunt uerè ligustici seminis notæ) sed latum lenticulæ modo, membrana in ambitu cinctū, & admodum pressum, quemadmodum alibi copiosius dicemus. Quidam docti affirmant se in montibus Lyguriæ uerū ligusticū uidisse: nomē tamen genti peculiare illius plantæ non exprimunt, ut ex illorū scriptis quod sit, cognosci possit, & postmodum haberi.

λινισπέρμιον, Lini semen.

Officinis nomen seruat, & usu multo clarum est. uulgo semence aut graine du lin. Italis seme di lino.

λοβός, Lobi.

Sunt dolichi, nostris phaioulx. de quibus in dolichis iā dictū est.

λινισπέρμιον, Mercurialis.

Officinis mercurialis: Gallis de la mercuriale: Delphinatibus panareaulx & uignolane: nostris corruptè marturiau pro mercuriale: Italis mercorella dicitur. Duū est generum, mas & fœmina: ambæ notæ.

λυνχίτις, Lonchitis.

Ignoratur.

λύσιον, Lycium.

Verum lycium his regionibus desideratur: ut factitium haberi possit. q̃dē cap. 63. lib. 8.

λυσισμάχιον, Lysimachium.

Herbarij corneolā uocāt: Galli poulse aut pelle bossē, q̃ paulō supra pestilētes tumores adalligata eius folia, præsens remediū laborantib⁹ supeditēt. Duo statuūt eius genera: alterū flore luteo, q̃d habem⁹, nā caule cōstat iūceo, lōgo, nodoso, folijs salignis ut plurimū ternis, gustu ualde adstringentibus, flore in cacumine luteo, specioso, radice purpurascēte, copiosa. Nascitur in pratis humidis, & iuxta alueorum margines ubiq; Alterum purpureo, adhuc ignotum.

λωτός, Trifolium.

Officinis andacoca, & corona regia.

λωτός τὸ ἄνδρον, Lotus arbor.

Officinis ignota: Gallis aliflier: nostris aliquier dici solet. Italis quibusdam balogaro: alijs perlaro.

μάκρη, Macer.

Macer ueterum desideratur: in usum tamen eius loco uenit cortex nucis moschata, quem macis officinæ appellant.

μαλαβάρην φύλλον, Malabathri folium.

Veterum malabathrum non amplius extat. foliū autem quo nūc utimur, inuentum Arabum est.

μαλάχη, Malua.

Maluæ tria genera. uulgaris siue domestica, quæ officinis Latinū nomē seruat, & uulgo mauue dicit: syluestris, quæ althæa siue ebiscus nūcupatur: officinis bismalua: Gallis & Delphinatibus guimauue. Italis maluaufco: nostris mauue blanche. Tertia alcea est, folijs quā reliquæ articulationib⁹, caule procero & lignoso: officinis incognita: herbarijs herba symeonis: doctis nō ignota. Est & arborecens malua, quā opinor antiquis hortulanam fuisse, caule quaternūm quinūmue cubitorum, folio amplo, circinnatæ rotunditatis, flore albo aut purpureo, inodoro. Hæc pascim in hortis inuenitur.

μαδραγόρας, Mandragoras.

Duo eius genera. mas, mihi cognitus: & fœmina, quæ nōdū uidi. Officinis nomē seruat: uulgo mādragore: Galli tamē metathe si quadā syllabarū mōt de gloire, p mādragore nomināt. Aiūt qui se uidisse testant, marē mādragorā, uirilē: fœminā, fœminei pudēdi imaginē i radice habere: eosdē meli⁹ adolescere, & fœcundiores esse, si mas iuxta fœminā, plātes, & cōtrā: alioqui steriles esse. Mādragoras hic in multis hortis inuenit: & satū facili mē prouenit. Quidā mala insana, quæ uulgo pommes d'amours uocātur, ad mādragorā referri debere cōtēdūt. Si desint poma mādragore, cortex radicū ei⁹ usurpat cap. 107. lib. 7.

μαράς, Fœniculum.

Dū est generū: domesticū, & syluestre, quod hippomarathrum, idest, magnū fœniculū. Domesticū aliud satiuū dulcius & humilius: uulgare acius. officinis Græcum nomen insedit: uul-

gō fenoilh: Italis finocchio.

μαστήκη, Mastiche.

Duo mastiches genera: Aegyptia nigra, inuētū rarior: cuius inopiā chia usurpari debet, cap. 14. lib. 15. Est & chia mastiche, mastix officinis, & Gallis du mastic appellata, candida, usu celebris, & uulgo nota. Hoc tamē silētio prætereūdū nō duxi, mastiche uires deijciēdæ alui ab antiquis nūquā attributas fuisse. Aētius autē mastichen scrupulorum nouem pondere aluū mouere, scriptis mandauit cap. 67. lib. 8. & cap. ultimo eiusdē: eandēq; duodecim scriptulorum pondere alui excrementa deijcere, cap. 117. & 155. lib. 3.

μελανθίον, Melanthium.

Officinis nigella Romana: Gallis de la poiurette: Delphinatibus de barbues: nostris fenoilh de sainct Ieā: Italis niella. Est & syluestre melāthiū, q̃d quibusdā officinis temerè pro uero usurpatur, & à Fuchsio nō multo cōsultius pro lolio Græcorū accipitur. Gallis de la noyelle: Delphinatibus & nostris nielle. Habetur quoq; iam pascim Lutetiæ aliud uerū melāthij genus, semine subflauo aut rufo, quā ipsū nigrū sit, odoratiore.

μελιότις, Melilotum.

Latinis fertula cāpana, & corona regia: officinis Græcū nomē insedit: Gallis du melilot. Tria hodie inueniunt meliloti genera. Primū odore suauissimo præditum, folio scenigræci, lentè fimbriato, flagellis oblongis, flore luteo, auenæ fere exēplo spicato. Id à doctis penè oībus uerū Dioscoridis melilotū existimant. Quidā id luteā saxifragā malūt appellari. Alterū aspectu incano, folijs minutis, crocato flore. Id pro uero meliloto in hæc usq; tēpora usurpatū ab officinis fuit. Tertiū Italicū, q̃d nōnullis uerū melilotū putatur. Primi, id est, uerū generis duæ sunt species, solo floris colore distinctæ. Siquidem unius flos, luteus: alterius, cādīdus est. In cæteris, caule nimirū, radice, folio, floris effigie, & pēdulo semine plantæ omnino similes: adeo, ut si saxifragæ titulo insigniri debuit, nihilo secius saxifraga alba, q̃ lutea appellari poterat: cū uidelicet plurimis nostræ puinciz locis, uberior sit albi meliloti, q̃ lutei puentus.

μέλι, Mel.

Præstantius Atticum, nostrū & Narbonense uiribus & præstantia Attico respondet. Reliqua quæ frigidioribus locis proueniūt, inferiora sunt. Officinis nomen retinet: Gallis & Delphinatibus du miel: Italis melle: nostris meu & miel dicitur.

μελισσόφυλλον, Melissophyllum.

Officinis melissa: Gallis de la melisse: Delphinatibus & nostris melize: Italis cedronella & melissa.

μύκη, Papauer.

Quinq; præcipua cōperiūtur papaueris genera: albū, nigrū, purpureū, rei herbariæ scriptoribus intactū, & de quo abundē alias suo loco. Rhœas, cui⁹ duo genera: mas, cui⁹ flos purpure⁹: fœmina, cui⁹ pallidulus: & cornutū. Prima genera officinis nomē retinēt: Gallis du pauot: nobis papārri: Italis papauero. Purpureū autē officinis ignotū. Rhœas officinis papauer rubrū: Gallis du ponceau aut coquelicoc: nostris, corruptā Græcā nomēclatione, rhoello: Italis papauero saluatico. Cornutū officinis nomen seruat: Gallis & nostris anonymum, quod sciam, est.

μεισπιον, Mespilum.

Latinis & officinis Græcū nomen insedit: Gallis meslier & nespulier, Delphinatibus nespoulier, nostris nesplier: Italis nespulo. fructus Gallis mesles aut nesles, Delphinatibus nespoulos, nostris nēsplos. Duo mespili genera facit Dioscorides. Primum quod à quibusdā aronium dici cōmemorat. Id, ut autor est Manardus epist. 1. lib. 10. uulgō in Italia azarolo nominat. Alterū quod in Italia nascit, & à quibusdā setaniū, ab alijs epimelis uocatur. Theophrastus autem, cap. 12. lib. 3. histo. plant. & Plinius cap. 20. lib. 15. nat. hist. tria mespili genera fecerūt, anthedonā, setanē, & Gallicā: ad quos autores breuitatis studio te remitto. De epimelide uaria est doctorū sentētia. Nam Dioscoridi mespili: Galeno arbuti genus esse uidetur: quāuis ipsi Galeno lib. 2. aliment. idē sit amamelis quod Dioscoridi epimelis: in censu autē simpliciu epimelida arbuti genus esse dicat, quæ Græcis νίμαρες uocetur: adeo, ut, in tāta sententiarū ambiguitate, quid certi pronūciari possit, sit prorsus difficile. Sed siue mespili Dioscoridi species sit epimelis, siue arbuti rusticis Italiæ, Galeno & Paulo autoribus, unedo, & Græcis νίμαρες nominata, non est huius loci cōsiderare. Verū in præsentia hoc tantū addidisse sat fuerit, mespilorum apud Galias duo haberi fastigia: maius, quod & mitius: minus, horridius. De comaro autem quibus nominibus uocetur, quibusq; in locis proueniat, abundē suo loco diximus.

μαλίαν περισκεύη, Malus persica.

Persicæ mali genera non pauca. Quædam enim duracina uocantur, & sanguinolenta sunt, nucleoq; tenacissimè adhære scunt. Quædam nucleum deierunt, & hæc duū sunt generū. nā ficiora alia, friabili & solidiore carne, non postremè inter persica

persica dignitatis & alia humidiora omnibus uulgatissima. Corbelliana Lutetiae in magno sunt honore. Officinis omnia nomē retinent: Gallis & Delphinatibus pesches: nostris persegēs, ac si dicas persica: Italis pesche: quae autem multum lutea sunt, pesche cotogne appellantur.

malus armeniaca, Malus armeniaca.

Romanis Galeni saeculo praecocia dicebantur: unde, opinor, Galii ac Delphinates, deprauata priscorum appellatione, abricotz: Itali autē bacoche & moniache, appellat: nostri auant persegēs, quod nimirum sint persicorum malorum uelut anteambulo- nes quidam, ac praecursores. Varia his regionibus spectantur armeniacorum genera. Nam quaedam hic habentur, quae galli nacei oui magnitudinem aequent, subfulua, carnosae, & palato gratissima. Alia minora sunt, & multo minus suauia.

malus medica, Malus medica seu citrea.

Ab insigni fructuū, tā in colore, sapore, quam forma ac uarietate arbores horum feraces appellationē sibi cōpararunt: quanquā congeneres, & ita inter se similes sint, ut distingui, nisi magna difficultate, nequeant. Mala igitur fulgoris auri aemula, auren- ges Gallis: Delphinatibus & nostris aranges: Italis arāci, parēs uulgo aurengier, & arangier. Quae ex uiridi in luteum langue- scunt, uulgo citrōs, Italis cedri & citroni: arbor citronier. Her- baceo uirentia colore, limons: Italis limoni: arbor limonier. Praegrādia instar melonum, orbiculataq; facie turgentia, pon- cires dicuntur: arbores poncieri. De his plura apud Ruellii cap. 69. lib. I. Et nos quoq; singulorū tum fructuum, tum arborū mali medicae faciem tuis oculis scripto aliquando ita subijcie- mus, ut etiam absens, quasi praesens, de illis iudicare possis.

malus omnis, Malus omnis.

Pomorū infinita genera, sed quae in tria quatuorq; praecipua redu- ci possint: austera nimirum, acida, acidodulcia, & dulcia. No- mē retinent officinis, Gallis, & nostris: priuatas tamē nomen- clationes, aut à locis, aut ab imponentium arbitrio acceperūt, ut aliās explicabitur.

meon, Meon.

Officinis foeniculus tortuosus: uulgo ignotum. Locis calidis gau- det. Inuenitur hic in agro Valentino: & in Gallia non procul à Lutetia copiosissimum apud nostrates prouenit: uulgo tamen nostrati, anonymum.

mora, Mora.

Mora duū sunt generum, alba & nigra officinis mora: Gallis & Delphinatibus des meures: nostris amouros: Italis more: ar- bor illis meurier: nobis amourier: tum arbor, tum fructus, uul- garis sunt notitiae.

fungus, Fungus.

Fungi Gallis des champignons: Delphinatibus bracoules: Italis prignoli: nostris bourigoulos: nullius in medicina usus. Alia multa sunt fungorum genera, sed planē inutilia ac pernicioſa.

auricula muris, Auricula muris.

Officinis auricula muris: uulgo du morron. Italis anonyma.

tamarix, Tamarix.

Officinis tamariscus: uulgo du tamarix. Italis tamarigio: Copiosa nascitur in Narbonensi Gallia, apud nos passim in hortis: apud Delphinates in sylua Gratianopoli ad orientem posita. Adhuc in quibusdam Rhodani insulis.

myrtus, Myrtus.

Officinis myrtus: Gallis, Delphinatibus & nostris de la nerte: Ita- lia myrto. Duo myrti genera: maior, cui maris nomen: minor, cui foemina discriminis gratia adaptari potest. Plurima Lute- tiae uisitur in fistilibus uasis. In nostrae prouinciae maritimis tra- ctibus uberrimē luxuriat.

moly, Moly.

Quid sit syluestris ruta, nisi ea cēseatur, quae passim in agris, tum apud nos, tum alibi inuenitur, nescio. Scio tamē eam herbam, quam Lutetiae syluestris rutae nomine ostentant, moly non esse. Audio tamen Plinianum moly (nam Dioscorideū ignotū est) in Cāpania Italiae inueniri, radicibus eius pedum triginta longitudinem equantibus. nasci saxosis locis.

nardi spica, Nardi spica.

Officinis Graecū nomē insedit: quāquā illis nō infrequēter turpi- ter imponitur. Nā institores quidā ac callidi nebulones hoc adulterio nardi spicā mētuntur. Accipiūt enim superiore radi- cis seseleos cretici (quod Delphinates ceitre, Lygures ceistre uulgo appellāt) partem siccis ac uelut comantibus staminibus refertam, truncoq; caulis & inferioris radicis amputatis, mace- rant, aut modicā aquā, in qua dissoluta est rubiae maioris radix, respergūt: dein cinamomi decocto aromatizant, sicq; diligēter siccant pro nardi spica dāt uenium. Nam hunc fucum mihi nu- per detexit quidam, qui eodem ipso quotidie multorum detri- mento uteretur. Volunt docti nonnulli nardi spicam officini- narum, non Indicam, sed Syriacam nardum esse.

nardus celtica, Nardus Celtica.

Si doctis creditur, à paucis hodie nota est, quanquam non de- sunt, qui Gallorum & nostrorū aspici ad Celticam nardū refe- rendū putent, pseudonardū uulgarem lauandulam esse uolūt: uerū nardus celtica in alpīū summitatibus prouenit, & à ru- sticis aspici adhuc nominatur. Et pseudonardi duo sunt gene- ra: mas Italis spigo: Gallis & nostris aspici: foemina omnibus Gallie populis lauande: Italis lauanda.

ferula, Ferula.

His regionibus ignorat. In Apulia frequēs ac copiosa prouenit: uulgatū tamē gētis nomē nullū ex autoribus scire potuimus.

sinapi, Sinapi.

Officinis sinapi: uulgo moustarde, aut uerius, graine de moustar- de, Italis senape & mostarda.

narcissus, Narcissus.

Narcissus Graecis: narcissus Latinis: officinis ignotus. Duo pra- cipua narcissi genera: Cādidus & luteus: Cādidus in mare di- stribui potest & foemina. utriq; flos est cādidus: sed mari in me- dio purpureus: foeminae uerō, croceus. adhuc in mari narcissi maiora sunt oīa, flos, caulis, folia, radix: in foemina, minora. Ambobus tamē idē nomē. Nā flos Gallis des narcis: Lugduni des ieānettes: Alpinis Delphinatibus (nā in alpīū pratis copio- sissimus luxuriat) nunc fleur d'oye, nūc gonnette, nūc donnet- te: nostris courbo donno, quod, more decrepitarum mulierū, caput deorsum inclinet: Aquis sextijs tamen, Malsiliae, & alijs nostrae prouinciae tractibus maritimis, de iueufues, id est, iu- dēx, aut iudaicus flos nominatur. Hae species ubiq; in pratis uuidis tempore uerno florere inuenitur. In alpibus autē flores- mensibus Iunio & Iulio. Observatione interim dignū est, ab uno candidi narcissi, praecipue foeminae, cauliculo eodemq; lo- co sepe duos, nonnunquā tres simul flores erumpere: id quod ego ualde, mehercle, sum, paucis ab hinc diebus, admiratus. Luteus narcissus in maiore & minore diducitur. Maior paucis medicis cognitus: officinis prorsus ignotus. Lugduni & locis circum uicinis, uulgo notissimus. Nam quibusdam illorum des ieānettes, alijs des campanettes, alijs des coculz, nomi- natur. Radice, caule, & folio cādido similimus est. flos euariat. Siquidem longus est, media sui parte calathi effigie represen- tans, crispatis in ambitu fimbriatus, appendicibusq; septē in eius medio inclusis. in ambitu autem folia sex obtinet, stellae modo radiata, molliter acuta, ab ipsoq; floris calathio, paulo in- fra medium, prodeuntia, sup pallida. Floret statim primo uere, nondumq; bene exacta hyemis inclemētia: adeo, ut huius flo- res tum maximē appareāt, cū candidi narcissi folia ē terra erū- pere coeperint. Reliqua omnia illi similima habet. Minori lu- teo narcissi folia croci insunt: cauliculus quaternū digitorū. Radix bulbosa, nucis auellanae magnitudine, foris nigra, intus candida & succosa. flosculus aurei penitus fulgoris, cādidi nar- cissi floribus effigie omnino similis: semē atrū, exiguis sili- quulis cōtentū. floret mēse Martio, & Aprilis initio. Nascit dū taxat, q; equidē explorare hactenus potuerim, in nostra puin- cia, apud Aptā Iuliā, saxosis locis ad occidentē urbi adiacētib; quos patria lingua, q; cauernosi sint, les baumos appellant: in quib; terebinthus idēa, cedrus humilis, meon, thymus, clema- tis utraq; onitis origanos, asterq; atticus maximē luxuriant.

nerium aut Rhododaphne.

Quid sit his regionibus ignoratur. Fuchsius placet nerium in Ger- maniae locis quibusdā inueniri. Audio Italiae familiare esse, & uulgo oleādro nominari. notum quoq; iam est in Aquitania.

nymphaea, Nymphaea.

Officinis nenuphar. Duo eius genera: alia candido, alia luteo flo- re. ambae notae.

xanthium, Xanthium.

Lappa minor officinis: Italis lappola minore dicitur. uulgo ano- nymum: frequēs ubiq; in rudibus, urbium fossis, lacuosis ac stercoreatis locis prouenit.

gladiolus, Gladiolus.

Officinis spatula segetalis: uulgo Gallorum des espées: flos, Tu- scis monacuccie.

vinum, Vinum.

Varia ac penē infinita sunt uini genera, sed nota.

acetum, Acetum.

Aliud album, aliud rubrum. uulgo du uin aigre: Italiae aceto.

laser, Laser, succus cyrenaicus.

Verus cyrenaicus ueterū succus, uix habetur. Syriacus officinarū beniuin aut belzuin: Italicorum belgioino: si doctis creditur, est qui laseris purior ac nobilior portio uidetur. Est & officinis asa cognomento foetida, purioris illius recrementum: aut certē laser ē Mediae Syriae allatum, Dioscoridi olens graui- ter, & putorem resipiens. Aetio tamen laser à cyrenaico la- se separatur, siue quia laser succus ipse sylphij, non lac esset, siue, quia

sue, quia laseris appellatione persicum aut medicum, ut cognobilia, & uiribus ac dignitate posteriora, non cyrenaicum, uenirent: argumento inde sumpto, quod cyrenaici succi inopiam emendari tradit laseris duplo cap. 40. lib. 8. & cap. 18. lib. 13. Vnde constat laser cyrenaico succo uiribus infirmius esse (quāquam congener sit) & ob id duplum illius, alterius inopia, ad usus medicos desiderari.

ὀρίγανον, Origanon.

ὀρίγανον Græcis *ὀρίγανος*: origanum Latinis. Tria sunt origani genera: heracleoticum, onitis, & sylvestre. Heracleoticum origanon officinis generis nomen seruat: Gallis (ut nonnulli uolunt) mariolaine d'angleterre: Delphinatibus ouriam: nostris l'herbo de nostro damo, nominatur. Quod in his regionibus adolefcit, non usquequaq; uiribus ipsi ab antiquis adscriptis, respondet. Quare onitis origanos aut satureia commodius eius loco usurparetur. Onitis autem officinis omnibus ignota: paucis adhuc medicis cognita: nostrati uulgo notissima. Appellatur enim in nostra prouincia pebre d'asè, id est, asini piper: seruato nimirum Græco cognomento, assumptoq; ab acrimonia, piperis nomine. Herba est pedalis altitudinis, radice capillari, nigra, inutili, numerosis ramulis ab eadem erumpentibus: folio hyssopi, aliquanto angustiore: flore ex dilutissima purpura cado, semine exiguo, nigro. tota herba gustus est feruidi, unde sibi piperis nomen adoptauit, odore suauis, fragrantis & ualde aromatico. floret quasi æstate tota. Nascitur in asperis, aridis & sitientibus ubiq; in nostra prouincia & alijs calidis regionibus. in frigidis enim nusquam sponte natum inuenitur. Sylvestre origanum quod sit, nondum mihi est comperitum. Tragoriganum esse uolunt eam herbam, quā Galli l'herbe du mastic appellant.

ἰύνκος, Iuncus acutus.

Iuncus alius holoschoenus, mollissimus & ad utilia utilissimus, qui Latinis marisca, Ruellio autore, dicitur: alius nobis acutus, Græcis *ἰύνκος*: tertius melanceranis, quasi atriceps, fructum gerens uuarum coheretium modo. Hoc nihil in uliginosis locis occurrit frequentius. uulgo ionc: Italis seruato generis nomine giunco.

ἐρουμ, Eruum.

Officinis Græcum nomen insedit: nostris erre.

ὀροβάγχη, Orobanche.

Cuscuta quibusdā est: rusticis Galliæ tigne: Italis herba lupa, & coda di leone: alijs herba tora. nomē à strangulādo lino sumpfit.

ὄρυζα, Oryza.

Officinis nomen retinet. practicis non paucis ryzum: uulgo du ryz: Italis riso.

ἔρχις, ἢ κυνὸς ἔρχις, Testiculus canis.

Officinis testiculus canis, & nonnunquā satyrium, quāquam id minus propriè: Gallis, maximè Parisinis, du satyrium. Italis anonyms.

ἔρχις σερᾶπιας, Testiculus serapias.

Triorchis à triplici radice dicitur. Huius duo genera. mas flore purpureo: scemina uariiegato. officinis ignoti, aut saltem anonymi. in montium pratis copiosissimi. Testiculi præterea species sunt illæ plantæ, quas Fuchsius satyrij basilici nomine describit. nam satyrii radice est bulbosa: illæ radices habet multifidas, ut aptius inter testiculares numerentur.

ὄσυρις, Osyris.

Est officinarum & Italorum linaria. uulgo ignota: frequens tamen ubiq; prouenit.

πανκράτιον, Pancratium.

Radix est scillæ similis, quam scillam maioricam uocant: multorum tamen sententia uulgaris scilla uerum pancration est. Italis scilla minore.

παλιurus, Paliurus.

Ambigitur inter doctos de paliuro. Quidā Gallorum aulbe spine paliurum putant: quidam diuersum sentiunt, quod nimirum uulgaris illa alba spina semē in siliquis minimè recondat. Verū, si ueteris ac clarissimi autoris Theophrasti de paliuro scripta paulo accuratius in examen adducantur, facilius ueritas erui, horumque componi discordiæ poterunt. Siquidem ex capite 17. lib. 3. de plant. hist. nulli non manifestum ac perspicuum existit, plures Theophrasti paliuri species nouisse, sed duas præcipuè: Alteram cuius semen in siliquis contineatur, quam ignotam existimamus: Alteram uerò (ut ipsemet autor est cap. 4. lib. 4. eiusdem historię) cui semen rotundū, rubrū, cedridum magnitudine, aut paulo minus: nucleum habens non mandendum, modo acinorum punici mali: & hæc est uulgata Gallorū aulbe spine, & nostratum aubrespin. Accedit Dioscoridem fructui paliuri uires exterendi uesicæ calculi assignare: quæ quidem uires tam manifestis experimentis in albæ spinæ uulgaris semine inueniuntur, ut inde uel liquido cōstet, eam à

Dioscorideo paliuro diuersam plantam non esse. Sinto igitur duo paliuri genera: Alterum quod semen in siliquis recondit, idq; adhuc ignotum, & Dioscoridi intactum: Alterū uulgaris alba spina, cuius fructum Galli & Delphinates poyres saint Martin nominant: nostris autem generis, id est, seminis nomenclationem seruat. Meminit & Plutarchus cuiusdam paliuri, ab his longè diuersi: sed is nobis ignotus.

παναξ ἡράκλειος, Panaces herculeum.

Quid sit, non ita constat. Nam huic conuenit (delineamentis saltem, si non uiribus) ea planta, quam sphondilij nomine Luteriæ uulgò ostentant: quāq; Gallica plebs panaiæ appellat. Ea, inquam, ubique locis pinguibus & humidis uberrimè luxuriat. Inuenitur quædam herba in maritima nostra prouincia, cuius notæ herculeo panaci omnes responderent, si eius caulis lanugine quadam incanesceret. Nam folia humi strata iacent, aspera, oblonga, à ficulneis non multum abhorrentia. Caulis rectus, cubitum excedens, infernè candidus, supernè luteus, læuis. Flos illi luteus, sphaericæ rotunditatis. Radix candida, longa, succo prægnans, gustu feruida. Floret mense maii. plura non obseruauimus. Nascitur in asperis & sitientibus solèq; illustratis locis. Hæc interim non ineptè ad Peloponnesense teseli reuocaretur, ut iusto loco dicit. Herculeus panax in Apulia & in Apennino plurimus nascitur, sed anonymus apud uulgos est. Reliqua panacis genera ignorantur. Quæ uero Luteriæ chironij panacis appellatione falsò ostenditur, sylvestre sitarum, quod & chermilla herbarijs, officinis baucias, Delphinatibus chiroulo: nostris giroulho dicitur, est.

πενταφυλλον, Quinquifolium.

Ad pentaphyllum uulgarem tormētillam (quæ Gallis & Delphinatibus tomentille dicitur: nostris autem penè ignota est) ferè omnes referunt. Quidam tormētillam herbam sui generis faciunt, quod septem, non quinque folia habere oculorum iudicio eam constet. uolunt tamen pentaphylli inopia in usum tormētillæ uocari. Alij pentaphyllon in Italia nasci cōtendunt, sed uulgo anonymon: & uulgare faniculam pentaphylli speciem quartam faciunt.

πέπλον, Peplium.

πέπλον Aëtio cū Hippocrate: *πέπλος* Dioscoridi: utrumq; Latinis: officinis herba incognita. Nascitur in quibusdam maritimis nostræ prouinciæ locis, sed in eo præcipuè, qui uulgo Istres dicitur. in faucibus enim amplissimi, & nobilissimi lacus maritimi est, qui nostro sermone le Martegue appellatur, stadijs plus minus sexaginta, à Malsilia urbe antiquissima & clarissima, uersus occidentē solē. Herba est pumilla, portulacæ similis, folijs supernè uirētibz, infernè suppurpureis, à domestica portulaca minimum absimilibz. Officinis quibusdā nostra tibus egregiè nota: quibus, ob similitudinem domesticæ, portulaca marina nominat. Est & peplos herba, appellatione ab hac non omnino dissimilis, quā officinæ esulam rotundā appellant.

πέπων, Pepon.

Cucumerum generi assignatur pepones: Italis meloni & peponi dicti: quorum uaria genera existunt: de quibus lege Ruellium & Fuchsium. officinis nomen retinent. uulgo pompon.

πίπερις, Piper.

Tria piperis habentur genera: album, nigrum, & longum. omnia nota, Gallis poivre: Delphinatibus peure: nostris pebre: Italis pepe. Admonendus est mihi lector, haberi Luteriæ in pleriq; hortis frutices quosdam, quinque plus minus cubitorum altitudinis, caudicosos, ramis plurimis illustres, folio mori, aut rubi idæi (ribes officinæ appellant) non amplo, fructu iulorū modo à ramulis per pediculos propendente, ex herbaceo cado, quod piper appellant: fruticibus nimirum eo iam pridè ex peregrinis admodum regionibus importatis. Lōgi interim piperis inopiam sarcit album, & albi nigrum cap. 24. lib. 9.

πικιστέριον, Verbenaca.

Duo summa uerbenacæ fastigia traduntur, officinis nota, ut apud quas nomen seruēt. uulgo ueruene: Tuscis uermiolaca: alijs Italix populis berbena.

πέρση, Persea.

Ignota his regionibus arbor est, Aegypto familiaris.

πέρδις, Perdicius.

Officinarū parietaria est. Gallis paritoire: Delphinatibus espargen: nostris espargoulo: Italis uetriupla: de qua supra in helzine dictum est.

πριονία, Pronia.

Duo eius genera: mas & scemina: illius flores Gallis roses nostre dame appellantur. officinis herba, pronia: nostris piouono nominatur. nam copiosissimus est proniæ prouentus, in finibus nostræ prouinciæ & huius Delphinatice gentis, in montibus ignobilis uici, qui nostra lingua les Amergues dicitur: in Galliæ hortis multa quoq; inuenitur.

Selinum multa genera. Hortense: quod Latini apiū: officinæ petroselinon: Itali petrosello: Galli persilb: Delphinates peresilb: nostri iuverd, nomināt. Hippofelinon Latinis equapiū & olus austrū: officinis apiū: Gallis & Delphinatibus ache: nostris api. Oreoselinō & eleoselinō officinis ignota. Est & aliud selini genus, magnū quidē & amplū, quod officinæ petroselinon macedonicon uocant: cui nulla prorsus ex parte conuenit descriptio. Apud Delphinates in hortis quibusdā uisitur herba, cui petroselini macedonici historia, quāquā breuis admodum, mirē adstipulatur. Ea uulgo l'herbe de la grauellō nominatur. Radicem habet digitalem, non longam, radicis apij æmulam, uerū duram, lignosamq; (plantā nimirū ad seminis maturitatem appropinquante) odoratā, gustu acrem, quiq; diu linguam uellicet, suauem tamen, & ad cheruillæ hortensis gustum nonnihil accedentem. A radice erumpit caulis cubitalis, aut procerior, teres, geniculat⁹, inanis, intus medullaceus, leuis, uirens, multis alarum sinibus concauus: ramulū ē singulis geniculis erumpentibus, inq; alios etiam ramulos diductis, in quorū omniū summitatibus flos insidet albus, minutulus, sparsus, nulla umbellæ aut muscarij seruata ratione. Florē illic subsequitur ipsum semen, duobus granulis inter se coherentibus, semini ameos uulgaris similitum, odoratus tamē, initio uirens, post maturitatem ex flauitie pallidulum, acre, aroma olens, diuq; os ipsum gustantis mira odoris suauitate comendans: folia quæ ē singulis caulibus erumpunt alis, magna sunt, hortensis cheruillæ folijs similia, aliquoties utrinq; pinnata, & in ambitu serrata: & quo magis ad suum caulem accedunt, eo minora sunt. quæ uerō ē ramulorū sinibus exeunt, parua sunt, folijs hortensis apij effigie similia, pinnata semper, & per ambitum serrata. Cæterum quæ ē summis exiliūt, minutissima sunt, & quasi fœniculacea, nisi plana essent, & ut coruinū cornu uulgare, perpetuo dentata. floret ætate. Semen mature scit circa autumnū initia. Inuenitur in paucis Delphinatū hortis (& istū hic quoq; nostra cura, ut terebinthus idæa ac macedonica, philyra, phillyrea, lotus arbor, cedrus humilis, & rhamnī tertia species) diligentiq; matronarum studio, & seruatur ad extirpandos renum calculos. Nam constat modicam eius seminis portionem tritam, & ex albo uino potui datam, magnam uim arenularum per urinas exigere. Vnde ab effectis uulgis eam l'herbe de la grauelle nominare cōsueuit. Adhæc certum est huius herbe seminā ē Macedonia, superioribus annis fuisse allata: ut uel hinc probari possit, illam ē genere selini macedonici esse.

Peucedanum. Ad peucedanum meo iudicio reuocari potest ea herba, quæ passim Lutetiæ, Malsiliensis feseleos nomine, ostenditur: cuiusq; maximus est prouentus in prato Gentilitio propter Lutetiam: necnon in tota Gallia: nam si (ut Ruellio, & alijs doctis placet) officinarum filer cognomento montanum, Malsiliense feselex existimandum sit, ē duobus alterum erit necessarium, aut duo Malsiliensis feseleos statuere genera, aut alteram ē plantis illis (quod ueri similis est) feselex Malsiliense nō esse. Accedit, quod ea planta à multarum gentium officinis peucedani nomine in usum medicum uocatur. Succo peucedani usi sunt ueteres medici atq; idcirco, si illius copia non adsit, tantum sic ex herbæ, & diuidium sagapeni coniiciendum monent, cap. 47. lib. 12.

Ruta. Officinæ & Itali Latinum nomen usurparunt. Galli & Delphinates da la rue: nostri rudo nominant. Duo rutæ genera: hortensis, & syluestris. Syluestris apud nos calidis siccisq; locis copiosissime prouenit: quæ autem planta Lutetiæ syluestris rutæ loco ostenditur, ruta syluestris, saltem ueterum, non est. Satius ubiq; in hortis inuenitur.

Pix. Officinis nomen seruat: Gallis de la poix: Delphinatibus peio: nostris pegō: Italici pece. Multa picis genera, liquida, arida, brutia, cedria, & similes, de quibus copiosissime ac doctissime Ruellius cap. 113. lib. 1. sui operis de stirpium natura.

Pistacia. Arbor est peregrina, folijs rotundis, capparinis proximis, odoratis, gustu aromatico. Lutetiæ uisitur in horto diuæ Mariæ. Fructus Græcis & Latinis pistacia: officinis fistica: Italici pistachi dicuntur.

Pityides, nux pinea, nux picea. Nomen seruauit officinis uulgo pomme de pin.

Pini cortex. Officinis Latinum nomen insedit. Gallis escorce de pin: Delphinatibus rusche de pin: nostris rusco de pin. Hic cortex loti arboris cortici substituitur, si ille desit, cap. 48. lib. 9.

Platanus. Græcis: Platanus Latinis: officinis ignotus. Duo eius stui possunt genera. fertilis & sterilis, qui pseudoplatanus discerniminis gratia dicitur. Ferax platanus Gallorum paucissimis cognitus: Delphinatibus & nostris ignotus. Hic Lugduni hac forma in horto quopiam spectatur. Arbor est adhuc non procerat, trium aut quatuor ulnarum longitudine, caudice uirilis tibie magnitudine, candida ligni materie, cortice crasso, spadicei coloris, ramis oblongis, à pseudoplatano non absimilibus: fronde uitiginea, longo eqq; purpureo pediculo nitente: flore racemoso, ex luteo pallido, semidodrantem longo, labruscæ magnitudine, multis appendicibus, ex pallido in luteū languescentibus, ornato. In summis illis petiolis mox oriuntur siliquulæ, breues, triangulares, membranosis & pressis uelut corniculis, in tripodis formam, singulis eius angulis aduatis. Floret uere: fructus exin sensim increscit: ac tandem maturefcit ad autumnum. Florem ipsi uidimus: & plantam totam. Fructum uerō cernere nondum licuit: uerū quæ de eo scriptis mandamus, ab œconomo intelleximus. Audio in Sabaudiz montibus inueniri, àque indigenis platin nominari: id quod à ueritate alienum non uidetur, cum ea planta quæ hic uisitur à Pictauijs Galliz populis huc fuerit allata. Habetur & apud Neapolim in hortis quibusdam. Pseudoplatanus autem ubiq; luxuriat, & Gallis du plan: Delphinatibus playe: nostris blaye: Sabaudis uerō planou uocatur. Huic folia quoq; uitis insunt, ligni candida materia, cortex crassus, spadiceus, ut ob similitudinem pseudoplatanus non ineptè appellari possit.

Polygonum. Duo polygoni genera: mas & fœmina. mas Latinis sanguinaria: officinis centinodia, corrigiola, lingua passerina: Apuleio proserpinaca: Parisinis autem herba sancti Innocentis (quod frequens ac copiosum in eo cœmiterio luxuriat) nominatur. uulgo anonymum. Fœmina officinis ignota. Quod autē in aquis stagnatibus aut pigro lapsu repentibus adolescat, ideirco Gal lis pin d'æue dicitur.

Polemonium. Græcis, Latinis polemonium: officinis planē ignotū, nisi ea planta sit, quam herbarij bosci saluiam, & quædam Galliz officinæ ambrosiam nominant. Verū non ausim affirmare bosci saluiam, idest, syluaticam saluiam polemonium esse. Quidam se id nosse prædicant, quorum sententiam nec probo, nec improbo. Quibusdam alijs tutā herbariorum cognomento capraria polemonion existimatur: uerū parū probabiliter, quando quidem omnes illius notæ, ne minima quidem reclamante, asphaltiti trifolio tam adstipulantur, ut absurdissimum putem eam ad aliud genus reuocare. Sit igitur polemonion ex earum plantarum numero, quæ parū adhuc exactè cognitæ sunt.

Polium. Duū est generum: montanum, quod officinis uomen retinet: alterum fruticosius, minus notum.

Potamogeton. Paludibus & stagnis familiaris: officinis & uulgo ignotus.

Polypodium. Latinis filicula: officinis polypodium. Quercinum laudant, quod rarō, herbariorum incuriā, utuntur.

Marrubium. Duo præsij genera: album, officinis præsium album: Gallis, Latinā nomenclationem usurpantibus, du marrubium iam dici cœpit: Italici marrubio: Delphinatibus & nostris corruptæ uoce lapsuq; facili bon robin, pro eo quod est marrubium, nominatur. Nigrum officinis præsium fœtidum, balote Dioscoridis est, uulgo ignotum. Habet & præsium officinæ, cui uiridis nomen indiderunt, albo congener, & uiribus eisdem præditum.

Porrum. Officinæ Latinum nomen seruauit. Gallis porreau: Delphinatibus porreau & por: nostris porre: Italici porro. Duo eius genera: hortense, & uineale. ambo nota.

Propolis. Quid propoleos nomine accipiendum sit, ambigitur. Scribonio Largo cera uirginea dicitur. Alijs tamen rudis est & crassa materia in apum officinis nondum cera, odore graui, qua pro galbano ueteres utebantur. Emendari potest eius teneræ inopia, si terebinthinæ, aut, deficiente terebinthina ipsa, picis brutiæ par pondus substituat, cap. 42. lib. 12.

Ulmus. Officinis ulmus: Gallis & Delphinatibus orme: Italici olmo: nostris oume. Duo faciunt ulmi genera, domesticum & montanum. Italia, ut Ruellio placet, quatuor ulmi fastigia habet. Est & apud nos arbor montana, quam uulgis nostrum, quasi ulmo congenerem putet, oume teilh appellat. Ea species tiliz

Latinorum est. De tilia autem arbore variatum sententijs ab antiquis fuit. Dioscoridis namq; *φίλυρα*, quam nostri tiliam uerterunt, longè diuersa à Theophrasti (cap. 10. lib. 3. de plantarum historia) *φίλυρα*, quæ item nostris tiliæ nomen sibi adoptauit, uel sensu iudice, est. Nam Dioscoridis *φίλυρα*, id est, tilia, dubio procul, si notæ omnes diligenter expendantur, ea arbor est, quam nostri patrio sermone amelanthe, fructus autem amelancos nominant. *φίλυρα* uerò, hoc, est tilia Theophrasti, lógo ab illa interuallo dissidere, cuius, uel mediocriter oculato, comperietur. Siquidem *φίλυρα* Theophrasti duo summa statuuntur genera: fœcundum, & sterile: fœcunda tiliæ fœminæ appellatione dotatur: officinis ignota: Gallis anonyma: Delphinatibus, præsertim montanis, notissima: Eam enim uulgata eorum lingua terlier, eius autem fructus terlis appellant. Sterilis tiliæ maris nomen obtinuit, Gallis tiller: Delphinatibus teilh: nostris, ut dictum prius est, oume teilh uocatur. Accedit tiliæ Dioscoridæ (quam nostris amelanthequæ nominari diximus) fructus nigros racematim cōgestos ac gustu subdulces: tiliæ autem fœminæ Theophrasti (quæ huius gentis hominibus terlier dicitur) sorborum colore & figura penè æmulos, gustu (quanquam ad summam maturitatem peruenierint) austeros, intus granulosos, semine, ut solanum balycacabum, copioso prægnantes esse. Quæ omnia etiam si reliqua silentio prætereatur, manifestum inter has plantas discrimen ostendere possunt. Sed harum prolixiorē atq; exactiorē, ne longior sim, tractationem in aliud tempus differendam institui. Nunc ad ea quæ sequuntur properemus.

φίλις, Filix.

Duo filicis genera: mas, officinis osmunda regalis: Gallis osmunde. Fœmina officinis nomen seruat: Gallis & Delphinatibus de la feugiere: nostris faugiere: Italis felce dicitur.

πύρεθρον, Pyrethrum.

Pyrethri planta his occidentis regionibus desyderatur. Radix in usu frequentissimo est, & nomen officinis retinet: Gallis pied d'alexandre. Habent & herbarij suum syluestre pyrethrum, quod doctorum ferme omnium sentētia, ad Dioscoridis ptarmicam referri debet.

τρίτικον, Triticum: *ἀμύλον*, Amylum.

Tritici uaria genera: quanquam eius communi nomine omnia semina, quæ in panificium assumuntur, complecti uidentur. Vulgus Gallorum & Delphinatium froment: Tusci grano: Lō gobardi formento: nostris blad & annoño appellant. Amylum officinis, & uulgò amydom, ideo hoc nomen obtinuit, quod citra molæ usum ac operam fieri soleat.

ῥάμνος, Rhamnus.

Trium est generum. Prima species mihi adhuc ignota. Secunda exigua copia prouenit apud Geruanum Delphinatium propè Tinctum ignobile uicini in sepibus, ubi ab indigenis l'espine de nostre Seigneur nominatur. Tertia, quæ fructum uerticillo similem gestat, & in ambitu membranofum, copiosissima luxuriat in nostra prouincia ubiq; maximè apud Aptā Iuliam, & quā Aptā Iulia Auenionē & Caballionem itur: & uulgò ab omnibus arnaueau: Italis autem marruche nominatur.

ῥαφανίς, Raphanis.

Duū est raphanus generum. Satiuus, qui Gallis rauē: nostris & Delphinatibus raiffort: Italis quibusdam radice: alijs rauanello. Syluestris etiā non rari est in medicina usus: quanquam inuentu non usquequaque facilis. officinis Græcum nomen seruatur. Italis ramoraci.

ῥεονποντικόν, Rheon ponticum, Rha.

Verum rha ponticum occidentis hisce regionibus desyderatur. Quæ uerò radix à seplasiarijs rha pontici appellatione ostēditur, centaurij magni radicem esse, longè plura argumenta conuincunt, quàm ut pluribus demonstrari nunc debeat. Ruellio & Manardo rha cognomento barbaricum siue sceniticū eiusdem generis & uirium cū pōtico statuitur. discrimen tantum in odore est, quod hoc, id est, ponticum inodorum sit: illud autem, præsertim tritum, grauē spiret odorem. Rha pontici si quando non adfuerit copia, centaurij magni radix in usum uocari potest, cap. 17. lib. 8.

ῥετίνη ὅλα, Resinæ omnes.

Resinarum multæ species. Terebinthina, abietina, laricea, picea, pinea, lentiscina, cui mastiche nomen est, iuniperina, cedria. Terebinthina è Cypro & Rhodo Venetias aduehitur: Venetijs in Galliam transmittitur, apud quam terebinthinæ Venetæ nomen inuenit. Apud nos quoq; mensibus augusto & septembri uera terebinthina sudare ac stillare conspicitur, neglectaq; plebeiiorum & aliorū ignorātia, adhuc manet. Abietina multa in alpebus colligitur, & occidentis his regionibus terebinthinæ nomine

nomine ostenditur & usurpatur. Vulgus alpinorum appellat biuoin: officinæ terbinthinæ plebs tormentine. Lariceam autem abietina permisceri suspicor ab his, qui omnia dolo uisitant. Picea huc adfertur in calathis è corticibus arborum (ut fraga reponi solent) contextis. Lentiscina mastiche est. Pineæ calidis in locis uisitur, ut & iuniperina. Hanc postremam officinæ Arabas secutæ sandaracham nominant, quam à Græcorum sandaracha (quæ chymistarum auripigmentum rubrum est) diuersissimam esse constat. Resina igitur iuniperi officinis sandaracha & uernix dicitur. Vulgo autem du uernix aut de la glasse. Cedria his locis ignota. Plura de resinis lege apud Ruellium cap. 13. lib. 1.

ῥόζα, Rosa.

Rosarum tria præcipua genera: Rubra, candida, & ex rubro diluta. Hæ postremæ uulgo incarnades, quod floridum uividæ carnis colorē representent, dicuntur. Rubræ nostris rosos eneros: Italis rose rosse uocantur: officinis singulæ suum seruant nomen. Vidi ego admodum adolescens apud Saltum prouinciæ nostræ oppidum bifera rosæta. Nam nihilo minor rosarum prouentus autumnino in illis habebatur, atq; uerno tempore solet. Habentur & damascenæ rosæ, odore suauissimo ac fragrantissimo præditæ, aliz albæ, aliz rubræ: quæ Tuscis damaschini, moschete uocantur. Hierosolymis de damasce

ῥοδόδωρον, Rhododaphne.

De rhododaphne suprâ in uerio dictum iam est. Dissimulandum tamen hoc loco nequaquam est, maritimis nostræ prouinciæ tractibus copiosissimum nasci fruticem, cui folia sint amygdalinis: offigiè proxima, gustu insigniter dulcia, cū salisugine quadam, foliorum saluiz modo aspera, glutinosa adeo, ut pressa tenaciter digitis hæreant. Flores edit caninis rosis adsimiles, ex rubro dilutos. Floribus succedit semen nigrum, melanthij semini non dissimile, colore nimirum, figurâ & magnitudine, pilulis, aut, si mauis, corniculis quibusdam auellandarum magnitudinem æquantibus conclusum, collectis hinc inde regminis asseribus, & in unum (ut in pæoniæ fœminæ nucibus apparet) cōeuntibus. Frutici binum ternumue cubitorū altitudo inest, rami multi, lignosi, cortex asper atq; horridulus. Radix lignosa, acuta, longa. Plura nondum obseruauit. Ex his tute iudicato, num hæc planta ad rhododaphnen possit reduci: quod ipse nolim affirmare. Verum, ut te ad eius apud ueteres inuestigationē incitarem, historiâ apposui. Plurima Tholone & Arcis, & tota maritima prouincia inuenitur. Floret ineunte æstate, ac subinde semen profert.

ῥήν, Malum punicum.

Malum punicum triplex: dulce: acidum, & inter ea medium, acidodulce, officinæ malum granatum, à granorum siue acinorū multitudine: Galli des grenades: nostris migranos: Itali pomi granati appellant. Inueniuntur & syluestria punica mala.

ῥήν, Rhus.

Planta quæ sit, à paucis scitur. Fructus seu semen in usu frequentissimo est. officinis sumachi.

ῥήν, Sordes.

Sordium hodie nullus usus, atq; ob id, in Gallia præsertim, minimi habentur, nec inueniuntur omnino, quod balnearum usus apud nos penè obsoleuerit.

ῥάγαννον, Sagapenum.

Officinis corruptè, ut pleraq; alia, serapinum dicitur.

ῥάμφυλον, Sampfuchum.

Latinis & officinis maiorana: Gallis & Delphinatibus de la marjolaine: nostris maiorano: Tuscis persal: alijs Italiæ populis maiorana: uulgaris apud omnes notitiæ.

ῥαπτόν, Caries lignorum.

Caries illiusmodi nostris coucroffon: Italis tarlatura di legno, dicitur: Cariem experiri coucroffar: Delphinatibus chironnar.

ῥαρκόλλα, Sarcocolla.

Officinis & Gallis nomen retinet.

ῥατύριον, Satyrium.

Duplex est satyrium: trifolium & erythronium: neutrum officinis satis notum, ut quæ testiculi canis speciebus, quem satyrium abusuè uocant, loco satyrij utantur. Addunt recentiores genus tertium, quod basilicum cognominant. Exiguum, flore saturata purpura nitente, cauliculo quaternum digitorum, aut paulo altiore, radice in manus effigiem conformata: unde Auicennæ digiti citrini: officinis autē palmæ Christi cognomentū accepit: quāquā palmæ Christi appellatiōe ricinus herba uulgo intelligatur. Huius duo genera. Purpureum, quod iam diximus, minus, quod mas dici potest: & variegatum, aliquanto maius, fœmina. In classes tamen testicularium aptius relegantur, ob dissimilitudinem quam habent cum uero satyrio. Hoc montes præcipuè amat, alpiū indigenis minimè ignotum. Vidi

tum. Vidi ego postremis annis uerum satyrium in montibus Delphinatium: radice bulbosa, ovi gallinacei ferè magnitudi-
ne, foris ruffa, intus candidissima, succosa, gustus suavis ac præ-
dulcis: folijs lilij, caule dodrante altiore, læui, terete: flore py-
ramidalit ac penè rotundo, ex saturata purpura candicante, qui
tamen calathodem uulgaris lilij effigiem non repræsentaret.
Floret mēſibus Iunio & Iulio. Semen, quia maturū tum haud-
quaquam esset, non obseruauit. Copiosissimum adolescit in al-
pibus: & in eo Delphinatus monte, qui ex omnibus, quos un-
quam uidi, herbarum medicarum feracissimus est: patria eorū
lingua Chironio uocatur, nec procul à Dia urbe ad septētrio-
nes est. Nam, præter satyria, illic uidentur testiculares omnes,
gentiana utraq; selseli tum Malsiliense, tum Creticum, aconita,
lilium purpurascens, & candidum syluestre, lunaria minor
(quæ eorum lingua l'herbo de la ronto nominatur) chamæ-
leones, asarum, carui, petasites, narcissus candidus, centaureū
minus utrumq; bistorta, oxyacantha, anagyris, & alia innume-
ra quæ recensere longissimum esset. Distat & ab hoc monte
uersus orientem solem milliariis circiter octo, planities am-
plitudinis admirandæ, aquis abundans, monte excelsissimo ab
orientē: locis præruptis & plane inaccessis à septentrionibus
& occasu, saxosa uero planitie à meridie circumscrip̃ta: cuius
angustissimum ingressum elegantissimus fons exornat. Ea
priuata gentis lingua les pres de cheuallieres nominatur, &
monti inaccessi (quem rustici indigenæ l'aigulle appellant)
admodum uicina est. In quam, inquam, planitiem si quis stu-
dio simplicium adductus, concesserit: illi simplicium (& maxi-
mè seseleos Cretici, quod illic, si usquā gentium aut locorū,
copiosissimum & pulcherrimum luxuriat) copiam, uarietate,
nobilitatem, raritatem, & in his diuinam providentiam admi-
rari licebit: quæ loca tam deserta, tam inuia, & quasi mortali-
bus inaccessa, tanta herbarum preciosissimarum uarietate atq;
ubertate locupletarit.

Σάμιν, Apium.

De apio supra in petroselino diximus.

Σέρη, Seris.

De seride copiosissimè in cichorio dictum iam est.

Σέλι, Selseli.

Σέλι Græcis: Selseli Latinis. Quatuor sunt & inueniuntur sese-
leos genera. Malsiliense Stoechadibus insulis, & maritimis no-
stræ provincie tractibus familiare: necnon in alpibus, & omni-
bus Delphinatium nostrisq; montibus frequens ac copiosum:
officinis siler montanum; uulgo alpinorum sire mōtan. Quod
Fuchsio Aethyopici seseleos nomine pingitur, iam dictis in
montibus, alpibus nimirum, copiosum prouenit: inuentu &
cognitu (si quis uigilantior fuerit) non difficile. Aut uerius
Aethyopicum (quia in alio multæ notæ reclamant) selseli eam
plantam dixerim, quam Luteriæ, in hortis quibusdam, parū
consulto, pro terebintho ostendant. Cuius, inquam, largissi-
mus est prouentus, propter Druentiam, rapacissimum nostræ
provincie flumen, saxosis locis, iuxta Orgonum Caballioni
proximum oppidum. Siquidem delineatio uniuersa illi fauet,
nulla reclamante notā. Nam frutex est binūm ternūque cubito
rum, caudice digitali, flagellis cubito lōgioribus, iuncōq; cras-
sioribus ac lignosis, folio demestice oleæ, nigriore, molliore,
& ad periclymeni folia satis accedente. Flos in ramorum ca-
cuminibus insidet luteus, speciosus, circinnatæ (ut cepæ porri-
ue flores) rotunditatis. Semen fœniculo crassius, nigricans,
dēsum, solidum, & feruentis gustus. Radices ualidæ, in pro-
fundum astæ. Vulgatum nomen mihi nondum scire licuit. Flo-
ret mēse Iunio & Iulio. Semen matureſcit Autumno. Nasci-
tur Orgone & Celone, oppidis nostræ provincie, aridis, saxo-
sis, & macilentis locis. Peloponnense, in maritimis nostræ pro-
uincie luxuriat, folio cicutæ latiore, crassiore, subaspero &
contrectatu ingrato, nullis tamen spinis horrido, humi strato.
Caulis illi inest rectus, cubitalis, aut procerior, fœnicula-
ceus, prope terram candicans, à medio sursum uersus auri ful-
gore nitens, læuis ac depilis, tereti forma. Summo cauli insi-
det umbella, orbiculatæ planè rotunditatis, floris Aethyopici
æmula, flos luteus. Radix subest longa, recta, crassitudine digi-
tali, teres, succo prægnans, candida. Floret mēſibus Maio &
Iunio. Plura nondum uidi. Nascitur in montibus & collibus
terrenis mari propinquis, & aliquantum remotioribus, cali-
dis tamen & sitientibus locis, & ibi humidis nonnunquam. Tu-
tò interim hanc plantam inuenies in agro ignobilis cuiusdam
uici nostræ provincie, qui uulgo Meunos appellatur: secusq;
uiam est, quæ Tholone urbe maritima Sanctū Maximinū ducit.
Vulgi nomenclationem non didici. Ex iam dictis itaq; tibi
constare potest, hanc quā depinxi plantam, uerum selseli Pelo-
ponnense esse. Quartum est Creticum, quibusdam tordylium,

Paulo gordylium: officinis, & medicis ferè omnibus igno-
tum. Fuchsio cognitū & bellè depictū. Hoc Lygures & Hīpa-
ni ceistre: alpini Delphinates, Sabaudi, & qui agro Pedemōta-
no sunt uicini, de la ceitro nominant. Herba fruticosa est, do-
drantalē Dioscoridi (nos tamē pinguibus locis cubitalem fre-
quētissimè in alpibus uidimus) radice crassa, longa, buxea aut
ex buxco candida, omnium maxime aromatica, gustu acri ac
suauissimo: folio fœniculi, tenuiore tamen & ferè capillari.
Caulis rectus est, palmo, aut cubito nonnunquam longior, in
summo brachiatus: umbella coriandri: flos lactei candoris. Se-
men primò ex rotunditate oblongum, & quadantenus angu-
losum, quod, ubi exactè maturuit, in duo ueluti scutula scindi-
tur, gustu feruidum est, odoratum ac iucundum. Floret æstate.
Semen matureſcit, in alpibus, circa finem Augusti. Herba tota
tantæ profectò suauitatis, ut si æstiuis ardoribus euellatur, &
cōfracta manibus attrectetur, uix aliud sis multo tempore pal-
paturus, quod tibi Cretici seseleos inusitatā, & uix satis expli-
cabilem, suauitatem non resipiat: id quod ipsi frequentissimè
sumus experti. Nascitur, ut dictum est, in alpibus ubiq; nulli
non è plebe notissimum.

Σέσμη, Sefamum.

Sesami planta non ita multis nota est. Semen officinis sisamum di-
citur. Italice anonymon.

Σιδερίτης, Sideritis.

Sideritidis tres species Dioscoridi statuuntur: ex quibus prima tã-
tum cognita est, & officinis tetrahil aut herba Iudaica nuncu-
patur: reliquæ species ignotæ: quanquàm non desint qui uul-
garem carpentariam, Gallis mieulx uault qu'or, dictam, ad si-
deritin referendam putent, quorum sententia explodenda:
prorsus uenit.

Σίνω, Cucumeres.

Cucumeris satui multæ species officinis nomen seruant. uulgo
concombres: Tuscis cedriuoli: Longobardis cocomeri.

Σίνω σylvηστρ, Cucumis syluestris.

Cucumis syluestris Latinis nomen seruat: officinis cucumer as-
sinus: Gallis concombre saulage: Italice cocomero saluatico:
nostris cocourmasso. Succus eius Græcis, Latinis & officinis
claterij nomen inuenit.

Σίλη, Laspitium.

Quorundam opinione officinis & uulgo osteritium: quibus ne-
quaquam probatur eorum sententia, qui herbam quæ ab her-
barijs, nunc imperatoria, nunc angelica, nunc sancti spiritus
radix nūcupatur, eandem cum laserpitio existimarunt: ut quæ
foliorum effigie à sylphio diuersissima, uel sensuum iudicio
ac testimonio appareat, quando quidem hoc folia uulgaris a-
pij, ex pallido in luteum languescentia, caulem ferulaceum ha-
bet: illi autē subnigra folia, per ambitum serrata insunt: caulis
concauus, flos ex purpura candidus (his tamē regionibus can-
didissimus). Veruntamen, cum in floribus, semine, caule, radi-
cibus, & quod omnium præcipuum est, facultatibus ipsis, tam
inter se consentiant hæ plantæ, ut nullum, aut minimum saltē,
statui discrimen possit: non erat, meo quidem iudicio, cur ob
tantillam foliorum diuersitatem, plantæ inter se alioqui simi-
limæ disungeretur, notamq; tanti discriminis subirent. Nam
si radix utrique foris nigra intus candida, aut uerius buxei co-
loris, semen latum, foliaceum, flos candidus, facultates omni-
no eadem: quæ, obsecro, exigua illa foliorum uarietas, & dis-
similis utcumq; effigies, congeneres plantas, genere diuersis-
simas efficere potuerit? quid? nonne utriq; folia sunt in ambi-
tu serrata? nonne oblonga? sed illi quadantenus nigricantia, &
septipartito diuisa: (nam medius pediculus folium in tria dis-
sectum: laterales singuli singula in duo distributa folia susti-
nent) huic ex luteo suppallida, & (nisi tergiuersari consilium
est) in septenarium quoque numerum quodammodo dispen-
sata. Suntu igitur duo Europei laserpitij summa fastigia: alte-
rum, cui apud uulgos & Germanicas officinas osteritij nomen
insit: alterum uerò quod Gallicis officinis & herbarijs impe-
ratoria, angelica aut sancti spiritus herba: uulgo autem Del-
phinatium alpinorum alegros nuncupetur. Vtraque species
Parisijs in hortis uisitur: prior tamen in alpibus inuentu
rarior: posterior nullibi gentium aut locorum copiosior.
Sed hæc alio loco accuratius demonstrabuntur. Nā quia hic
specierum diuisionem omisit: ille plantas genere easdem, di-
uersas esse uoluit: nos generis (ut ita dixerim) idēitate serua-
ta, speciebusq; exactè distinctis, eorū discordias cōponemus.

Σίνω, Sinon.

Ignoratur.

Σίλη, Lauer.

Officinis berula. uulgo de la berle. Sic enim metathesi syllaba-
rum pronunciat.

Imperatoria
Angelica

Σισυμβριον, Sisybrium.

Sisybrii duo genera. prius officinis balsamita: uulgo du crescon: Italis crescione. Alterum, quod & cardamines, à nasturtij odore, cognomentum accepit, officinis nasturtium aquaticum, Senis autem Italiæ urbe gorgolestro dicitur.

Σκάνδιξ, Scandix.

Quidam uolunt Romanis aciculam dictam fuisse. Quid tamen sit ignoratur. Dioscoridea enim breuitas eam nobis ignotam reddidit.

Σκίλλα, Scilla.

Officinis squilla marina, quanquam & pseudosquilla alibi passim inuenitur, uulgo nostratum cebo marino. Italis scilla.

Σκώδριον, Carduus.

Scolymi meminit Theophrastus cap. 4. libr. 6. hist. plât. meminit & Dioscorides. Ex quorum scriptis uix aliud elicere possis, quam Theophrastu de hortensi (q Italis carcioffi: Longobardis archichiochi: nostris carchoffes: Gallis & Delphinatib⁹ artichaultz, nominatur:) Dioscoridem uero de erratico (qui Italis, à ui cogendi lactis, presura: Gallis autem chardonnette, dicitur) fuisse locutum: ut in cinarz mentione dictum fuit.

Σκώρδιον, Scordium.

Officinæ seruata Græca nomenclatione, multis sæculis pudendo nimis errore ophioscorodon rudi plebeculæ obtruserunt. Nunc iam tamen uerum scordium nosci cœpit: In hortis siquidem Parisinis frequens inuenitur. Adhæc propter Gratianopolim Allobrogum ab occidente, & in nostra provincia passim, maxime Tholone iuxta mare, luxuriat.

Συλόδορον, Allium.

Duam est generum, hortense, & syluestre. Syluestris duo genera. Nam aliud est folio latiore, oblongo, molli, uirentissimo, flore albo, capitello paucioribus glebis conformato: radice non admodum bulbosa, candida: syluis umbrosis gaudet, & Plinio atque herbarijs allium ursinum dicitur. Aliud in excelsis ac nudis montibus luxuriat, ab aquilone, hortensi simile, nisi minus. nomen seruat. Gallis ailb: nostris alhet.

Σμύρνα, Myrrha.

Officinis myrrha: uulgo de la myrrhe.

Σμύρνιον, Smyrnum.

Σμύρνιον Græcè: Smyrniū Latine. Duo eius ex Galeni lib. 8. simpl. sententia genera: Alterum, quod à quibusdam agreste hipposelinon uocari commemorat: non autem, ut quidam perperam interpretantur, hipposelinon syluestre à quibusdam uocari smyrnion. Id officinis lybisticum: Gallis leueche: alpinis Delphinatibus, nostra etiam memoria, api., nominatur. Est & aliud smyrnion Amano monti familiare, quod olim Cilices petroselinon cognominabant. Id in Italia copiosum inuenitur: uulgoque (ut autor est Manardus epist. 24. lib. 9.) alexandrum, quasi olusatrum (sic enim Romæ Galeni ætate uocabatur smyrnium, ut ipse testis est lib. 2. de aliment. facult.) & Florentinis macerones, appellatur. Ea quoque species iam hic Lugduni, & apud Delphinates, omnibus nota: uerum illic alexandre & alexandrine: hic macerons à quibuslibet uocatur. Ambæ plantæ in hortis habentur, & iamdictis nominibus uulgo cognitæ sunt.

Συγχο, Cicerbita.

Officinis rostrum porcipum, & pastus leporis: nostris de cardellos: Gallis, à lactis, quam reddit, copia, lacteron: Delphinatibus lacheiron: Italis cicerbita, nominatur.

Σπάρτον, Genista.

Spartium quod à Dioscoride pingitur, genista est: sed ea, quam Galli genest, nostri genesto fero, Lugdunenses geneste de florence, Itali genestra, appellant. Est & iuncus quidam Hispanicus, qui, quia funibus, rudentibus ac ficarijs corbibus cōficiundis sit accommodus, à quibusdam ad sparti genus alterum reuocatur: uulgo autem sport, & ficariæ corbes ex eo conflatz sportins, quasi spartins, dici solent.

σταχίς, Staete.

Doctorum sententia officinarum styrax liquidus, ueterum staete est.

Σταγδίνος, Pastinaca, Daucus.

Duo pastinacæ genera: hortensis, quæ officinis pastinaca: Gallis carrote: Delphinatibus pastenade & pastenaiye: nostris pastenargo: Syluestris quæ & daucus appellatur, de quo suo loco dictum iam est. quorundam tamen sententia pastinaca satia candida: erratica autem carne est purpurea.

Στερχας, Stœchas.

Officinis stœchas Arabicus: plebi nostræ maritimæ morranilh. Citrinus officinarū stœchas elychryssum Dioscoridis & Galeni amaranthum à doctis penè omnibus censetur, ut in amarantho dictum est.

Στράβιον, Struthium.

Latinis radícula & herba lanaria dicitur, putatur esse officinarum saponaria. Alij uolunt esse ignotum.

Στράξ, Styrax.

Officinis, mutata unâ litera, storax dicitur. Duo faciunt styracis genera: Liquidum, qui doctorum opinione myrrha staete est: Siccum, cui calamitæ nomen indiderunt, & is uerus styrax existimandus est. Siquidem Arabes duam styracis generum, Græci autem unius duntaxat meminerunt.

Σταφυλά, Vua.

Vuarum innumera species, quæ ab imponentium arbitrio uaria nomina acceperunt. officinis nomen retinent. uulgo raisin. Italis uua. Vnde nostri principis & innocentioris uuarum species emphasticon nomen semper retinuerunt, eam uni aut uinio, id est, uuam appellant: Eam speciem Delphinates pachurelle nominant.

Σύκα, Ficus.

Ficum ex uarijs antiquorum scriptis infinita genera obseruauit & annotauit Ruellius, ad quem breuitatis studio te remitto. officinis Latinum nomen insedit. uulgo figues.

Σύμφυτον πετράιον, Symphytum

petræum.

Herbarijs bugla: Gallis du bugle, nuncupatur: quamquam in hæc usq; tempora non defuerint, qui herbam Fuchsio prunellam dictam, ad petræum symphytum referendam, nec id satis consulto, existimarint. Est & symphytum magnum, quod officinis consolida maior dicitur. huic flos est albus, & ex purpura dilutus. Symphytum medium est officinarum consolida media, uulgo des marguerites. Restat minimum, quod & bellis dicitur, consolida minor: uulgo Gallorum des pasquetes: Delphinatium & nostratum de marguerites.

Συκόμωρος, Sycomora.

Fructus sunt Aegyptiæ ficus, si Theophrasto credimus. his regionibus non habentur.

Σχάινος ἰ βάλανος, Lentiscus.

Σχάινος Græcis: lentiscus Romanis & officinis: Gallis & Delphinatibus ignotus: nostris lentiscole: Italis lentisco. Plurimus in maritimis nostræ provinciae tractib⁹ adolescit, frigida loca naturâ horret. E lentisco resudat mastiche, sed apud Chium, Rhodum, Cyprum, Cycladas insulas, Aegyptium, aliaque calidiora loca. Apud nos enim nulla colligitur, quod locus ob remissionem (si cum prædictis conferatur) calorem resudationibus, quam illa, minus sit aptus.

Σχόλον ἰ ἄνθος, Iunci odorati flos.

Officinis corruptè omnia pronunciantibus squinantum dicitur.

Σχονος λείος, Iuncus leuis.

De iunci speciebus suprâ dictum est.

τερεβίνθος, Terebinthus.

τερεβίνθος, ἢ τερεβίνθος Græcis: terebinthus Latinis: officinis & Gallis ignota. Tria sunt Theophrasto & Plinio terebinthi genera. Syriaca mascula ac procera, Idæa & Macedonica breues. Syriaca his regionibus ignota est. Idæa ac Macedonica, quæ breues sunt & foeminae, multis sunt notæ. Alteri enim fructus inest lentis magnitudine & figura, & folium propè cappari simile, uerum longè maius. Alteri uero racemosus, piperis magnitudine, primò uiridis, dein rubens, postremò nigricans, resinofusus furfurosusue, folia angusta, oblonga, lauri æmula, in uersus, ut sorbus, digesta, cui apud nos petelin uulgatum inest nomen: prior autem à rhus Latina feminis appellatione Rhous nominatur. Frequens utraque apud nos luxuriat, & iam dictis appellationibus uulgo est notissima. Quæ autem planta Luteriæ Parrhisiorum inconsulto pro terebintho ostenditur, non terebinthus, sed seseli Aethyopicum est.

τύτλον, Beta.

Vulgaris est notitiæ. officinis Latinum nomen insedit: Gallis de la poyrée: Delphinatibus de reparas: nostris bleo: Italis bieeto la, nuncupatur.

τίρρα, Cinis omnis.

Nomen retinet, uulgo cendre.

σίλος, Fœnum Græcum.

Officinis fœnogræcum, uulgo du senegræ corruptè pro fœnogræc.

τιθύμαλλοι, Tithymalli.

Septem tithymalli genera. Characias, qui hodie passim ab herbariæ rei studiosis amygdaloides: quibusdam espurge: Gallis reueille matin, dicitur: eiusque in syluis largissimus est prouentus. Paralios peculiariter reueille matin. Cyparissias passim inuenitur, & officinis tithymallus coronatus: Italis herba morra, nominat. Reliquæ species nō ita cuius notæ. Tithymallo-

rum

lorū genera nota Delphinatibus thymonet: uulgo nostratiū de chousclo, à lactis dum franguntur eiāculatu, uocantur: qua appellatione lathyrides plerūq; comprehendunt.

τρυφάνθη, **Tragacanthus.**

Officinā uitiōsis pronuntiationibus assuetā dragaganthum, aut adhuc ineptius draganthum appellant.

τρίβλος, **Tribulus.**

Duo tribuli genera. Palustris, officinis ignotus: Gallie rusticiis chastaigne d'eau. Terrestris, qui esse putatur herbariorum caleitrappa: Gallorum chauchetrappe: nostratium caucotrep-po, aut auruolo.

τρίφυλλον, **Trifolium.**

τρίφυλλον Græcis: trifolium Latinis & officinis. Duo- rum habetur generum. Pratense officinis trifolium: Gallie tresle: Delphinatibus & nostris triolet. Odoratum siue asfalti-te, paucis adhuc medicis notum, Fuchsius cognitum & eleganter depictum: officinis, ut quidam uolunt, trifolium odora-tum, quanquā illis ignotum suspicor: Italis, quantum conie-ctare licet, lauane & galega: herbarijs ruta capraria: nostris Pherbo de la cabriero, nominatur: ut hinc constet rutam ca-prariam herbariorum uerum trifolium odoratum esse. Nam eius folia, dum primum erumpunt, rutam olentibus uerō ado-leuerint & æstate grauem ac uolentum bituminis odorem spi-rant: maxime, si digitis atterantur, aut uulsæ herbæ inter lapi-des cōfringantur. Accedit notas trifolij asfaltitis omnes tam apte nostratium caprarie respondere, ut nulla ita in contra-rium adduci possit, quin perpetuō, ad stipulantibus eisdem omnibus, capraria nostræ prouinciæ uerum trifolium aspal-tite existimanda sit. Siquidem nostratium capraria supra cubi-tri altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iunceas & ni-gras, unde ramulæ nascuntur appendiculæ: in quibus singu-lis terni exeunt folia lato trifoliæ aut meliloto similia. Ijs recentē enatis rutæ odor inest: adultis autem, bituminis, id-est, odor grauis, fortis ac sua acrimonia sensum feriēs. Florem edit purpureū aut ex purpureo cæruleum, agglomeratum. Semen quadantenus latum, subhirsutum, ex altera extremita-te exertum. Radix tenuis, longa, ualida. Ex quibus notis est per-spiciū nostratium caprariam esse odoratum ueterum trifo-lium, floret ineunte æstate. Semen maturescit augusto, & septembri decidit. Nascitur ubique in nostra prouincia, uul-goque Pherbo de la cabriero dicitur: & in alijs regionibus ca-lidis, in frigidis autem nusquā sponte naturæ nasci constat.

σολάνιον, **Solanum.**

Solani multa genera. Hortense, officinis solatrum & morella: cu-ius duo genera faciunt: candidius alterum: alterum ad nigre-dinem magis tendens. Halycacabum, cuius duo genera habentur, nam aliud simpliciter nomen retinet: & officinis alkekē-gi: Gallis (communi cum alijs rebus multis appellatione) ba-guenauldes & cocrette: Delphinatibus bonne bue: nostris de bons hommes nominatur. Alterum recentis notitiæ, quod di-scriminis gratiā peregrini nomen obtinuit, uulgo parisino pois de merueilles, ob elegantiam illius fructus dici coepit. Habetur iam & his regionibus multis locis in hortis. Tertium somniferum, paucis adhuc notum: tractibus maritimis tum mediterraneis, tum occiduis frequens. Nam apud Niceā pro-uinciæ nostræ conterminam, maximum eius prouentum sa-xosis locis uidere est: tum in Gallia apud Turonenses & Ro-chellanos. Est & manicum, de quo inter doctos ambigitur. Quidam enim uolunt eam plantam esse, quam hodie Lutetie solani nianici nomine ostendunt: quidam contrariam senten-tiam tuerentur, utcumque tamen res habeat, negari non potest, quin ea ipsa herba solani (crediderim autem ego somniferi) species quæpiam sit. Quod autem solani lignosi nomine uul-go ostenditur, circa Dioscoridis existimatur. Quidam tamē solani genus esse uolunt: ea planta Italica herba bella donna no-minatur.

ἡακύνθος, **Hyacinthus.**

ἡακύνθος Græcis: Hyacinthus Latinis: officinis ignotus. Tria sunt hyacinthi summa fastigia. Purpureus, cæruleus, ex cædido pal-lidus. Purpurei Dioscorides meminit, reliquis duobus inta-ctis. Cæruleū agnoscunt rei herbariæ studiosi. Is Gallis oignons des boys, & uaisiel nominatur. Cæruleum hyacinthum esse, confirmatur ex Philostrati lib. 3. de uita Apollonij, his uerbis. Arbor Indica lauro similis, siliquam calycis instar formatam, mali punici magnitudine, profert. Siliquæ autem pomum in-est colore cæruleum, ac ueluti pulcherrimus hyacinthus: gu-statu uerō suauissimum omnium, quæ in illo monte nascun-tur. Hæc ille. Ex quibus colligitur esse & hyacinthum, cuius flores cærulei sint coloris. Est & tertium eius genus floribus pallidis, & in singulis foliorum floris summitatibus ex cædido pallidōue herbidis, ut macula lentis magnitudine unicuiq; in-

sculpta uideatur. Omnibus folium inest porri, minus tamen, radix bulbosa, candida, succo prægnans. Primum genus credi-derim parum notum esse. uolunt tamen nonnulli cepam ca-ninam, quæ Italica cepola dicitur, esse primam hyacinthi spe-ciem. Quorum sententiæ (etsi reliqua omnia non malè conue-niant) reluctari uidetur, quod eius flores, nostris coculz dicti, nunquā pendere deorsum appareant, quod in hyacintho cum primis requirit Dioscorides. Secundum in syluis frequē: in quibus, uerno tempore: & in admodū umbrōsis locis, æsta-te, cæruleos flores emittit. Postremum in hortis Lugdunēsi-bus uisitur, & uulgo (communi cum alijs multis floribus no-menclatione) des campanettes, nominatur. Primus hic flori, post ingentia hyemis frigora, erumpit, odoris non insuauis: qui tamen promptissime marcescit, & minimum temporis du-rat: quanquā siccatus (expertus loquor) longo tempore in-sitam ac uerè suauem odoris gratiam seruat.

ἡακύνθος, **Tubera.**

Gallis des truffes: Italica tartuffi: Delphinatibus & nostris tartif-les, nullibi gentium, opinor, eorum maior uberiorue prouen-tus, quā apud Delphinates.

ἡυδρόπικρον, **Hydropiper.**

Officinis eupatorij nomen falso multis sæculis obtinuit. doctis hodie cognitum, & nomen seruat.

ἡυόσκιος, **Hyoscyamus.**

Tria hyoscyami genera. album, flauescens, & nigrum. officinis inusquam: Gallis hannebane. Primi generis usus frequens, reliquæ species improbantur.

ἡυπερίκον, **Hypericum.**

Duo eius genera. terrestre, omnibus notum. officinis hyperi-cum, & Italica perforata, Gallis mille pertuis: Delphinatib; tru-cheran: nostris herbe de la sainte Jean. Aquaticum caule qua-drangulo, crassiusculo, cetera terrestri simile, in alueorum mar-ginibus frequens: officinis & uulgo ignotum.

ἡυψόπον, **Hyssopum.**

Duo hyssopi genera, hortense & montanum. Hortense officinis hyssopum: uulgo hyssop: Italica hissope. montanum in regioni-bus calidis frequens, & odore fragrantissimo præditum, no-strisq; uulgata appellatione meirarmo nominatur.

ἡέντις, **Lentes.**

Duū sunt generum: maiores & minores. officinis lentes, uul-go lentilhes: Italica lenticie. Apud nostros Græcæ lentis appella-tionis scomma in hodiernū usque diem est relicta. Appel-lant enim ineptum & nullius precij momentine hominem phacquin, id est hebetem, ineptum ac lentis pabulo dignum.

ἡέντις, **Lens palustris.**

Officinis lenticula aquæ nominatur, inuentu ubique facilis.

ἡάσκιος, **Phaseli.**

Dioscoridi hortensis similax appellantur, nostris phaioulx: Italica fagiuli.

ἡέρβασκον, **Verbascum.**

Multa habentur uerbasci genera. Album cui fœminæ: nigrum cui masculi nomen inest. Vtrumque officinis rapsus barbatus. Candidum autem Gallis du boullhon blæ, nostris de torchos, Hæc duo uulgo nota sunt. Est & tertium uerbascum angustis folijs, oblongis, fragilibus, ex herbaceo nigricantibus, flore albo, aut pallido, calathi formam representante, caule recto, folioso, cubitali aut ampliore, in syluis frequens, anonymum adhuc, & officinis ignotum. Quartum illud genus, quod mar-rhubio simile facit, uulgaris stachys esset, nisi ea subrubro flo-re prædita spectaretur. Triallis siue lychnitis, quæ sit, ignora-tur. Ad phlomidēs referunt uulgarem herbam, quæ quibus-dam herba sancti Petri, alijs herba paralytis, omnibus simul pri-mula ueris (quanquā, primulæ ueris appellatione, scio bel-lides, id est, primo uere erumpentes margaritas, quæ sunt Gal-lorum pasquetes, intelligi à quibusdam & uocari) nomina-tur, tum eam quæ odorata est, tum quæ odore caret. Putant etiam nonnulli ad phlomidēs referendam eam herbam, quā Fuchsius ueronicæ fœminæ nomine depinxit: quam, inquam, nostrates corruolo blanco nominant, quæque nulli ex uulne-rarijs herbis est dignitate secunda.

ἡείλη, **Palma.**

Arbor est transmarina, saltem quæ fructum parit: cuiusq; fructus ad nos importatur. Is officinis dactylus: uulgo dates solet no-minari. Quæ autem in Italia, Lyguria & nostra prouincia ado-lescit, sterilis est, palmaq; uulgo nuncupatur.

ἡείλη, **Phu.**

Doctorum omnium testimonio officinarum ualeriana est, quæ in maiorem & minorem distribui solet. In Gallia & Delphina-tu frequens. Apud nostros in hortis tantum inuenitur. Vnde eam minus calentibus delectari, & in eis sponte nasci constat. Vulgus iam ualerianæ eam appellat.

ginos, Alga, Fucus.
Maritima provincia aulgo nominat, eaq; stercoreandis uineis pro
fimo untur. Italia alga.

γαλβαν. Galbanum.
Officinis galbanum. Vulgo garbane, nostris bon gaume.

χαμαίδρις. Trixago.
Officinis Græcum nomen insedit. Gallis & nostris germandrée:
Delphinatibus gelimandry: practicis non paucis germandrea.
Italica calamandrina.

χαμαίλα. Chamælea.
Χαμαίλα Græcis: Latinis chamælea: recentioribus, ut autor est
Ruellius, oliuella: officinis mezereon Arabum more dicitur.
Sed interim non est hoc loco silentio dissimulandum, quas-
dam officinas ausu, me hercle, parum sobrio thymæleam pro
chamælea usurpare. Nam chamælea (cuius ramum Viennæ Al-
lobrogum, apud doctissimum Guidobaldum, medicum, illi ex
Italia allatum, uidi) folijs est oleæ domesticæ, minoribus ta-
men aliquanto, & aspectu incano aut subcineritio. Mezereon
autem, quo utuntur officinæ, folijs constat angustis, oblon-
gis, foliorum lini hortensis æmulis, numerosis, crassiusculis,
summos ramos præsertim uestientibus, gustu uiscofo gummo-
soq; ac non uulgariter acris: flagellis cubitalibus aut longiori-
bus, multis ab una radice erumpentibus: flore exiguo, candi-
do, copioso: fructu primum uiridi, cum autem maturuit, ru-
bro, myrti ferè magnitudine. Quæ notæ omnes satis arguunt
eam plantam, id est, officinarum mezereon, non chamæleam,
sed thymæleam esse. Floret mense Maio. Semen maturescit
mense Iulio & Augusto. Copiosissima nascitur, in nostra pro-
uincia ubiq; maxime apud Aquas sextias in montosis, asperis,
calidis ac siccis locis. Quo uero apud eos nomine uulga-
to nuncupetur, nondum mihi compertum esse, fateor. In qui-
busdam Italici locis fructus tam chamæleæ quàm thymæleæ pe-
pe montano nominatur.

χαμαίλευς. Chamæleuce.
Latinis farranum aut farfugium: herbarijs populago. Herba
est rotundis folijs molliter per ambitum serratis, uulgari allia-
riæ effigie proximis: cauliculo recto, herbacei coloris, rotun-
do, pedali altitudine aut ampliori: flore luteo aut candicante,
radice fibrosa, inutiles: floret æstate. Humidis ac uliginosis lo-
cis, maxime pratis, gaudet. Toti Gallici familiaris. Vulgo, si
non ignota, saltem anonyma. Quidam tusilaginem chamæleu-
ce congenerem putant: in qua sententia fuisse autorem uerissi-
mile est, ut qui de bechio nobili herba nusquam antea memi-
nerit. Accedit becchium barbaris farfar appellari: officinis un-
gulam caballinam. Gallis pas d'âne: Delphinatibus de la pate:
nostris unglo cauallino. Chamæleuces interim penuriam far-
cit conyza parua aut capparix cortex cap. 16. lib. 8.

χαμαίλεον. Chamæleo.
Albus ubiq; frequens: doctis non ignotus: officinis & uulgo car-
lina. Niger montibus fere delectatur, latoq; eius flos ambitu
circumscriptur, qui ædium liminibus, ad arcendas fascinatio-
nes, clauo affigi, à plebeijs, solet.

χαμαίπιτυς. Chamæpitys.
Tres eius sunt species, è quibus una desyderatur. Ex his quæ
habentur, altera iua muschata: altera iua arthetica & chamæpi-
tys officinis dicitur: nostris iuo: Italici iua.

χελιδόνιον. Chelidonium.
Duo chelidonij genera: maius, & minus. Maius officinis chelido-
nia: alchymistis donum cæli: Gallis de l'esclaire, Delphinati-
bus soulongne, apud quos certissimo experimento constat,
eius radices, si dentibus affricentur, aut manducentur, eos pu-
trefacere, & ore, corruptos, euocare: tantum abest, ut eorum
dolores, cum Dioscoride, finiant. Minus chelidonium offici-
nis & herbarijs scrofularia. Parisijs uulgo l'herbe sainte gene-
uiefue. Tusci fanoscello. Nec est silentio prætereundum mi-
noris chelidonij radices saluari experimento duriorum cor-
porum hernias sanare, si earum succus ex albo uino extra-
ctus, sesquicyathi mensurâ, supinis in lecto reclinatis hernio-
sis, diebus circiter duodecim, ieiuno uentriculo, propinetur.

χονδρίλλα. Chondrilla.
Seridis species est, de qua in intybo dictum est.

ψύλλιον. Psyllium.
Officinis nomen retinet: nostri uulgo de badassos. ubiq; in
macilentis & arenosis prouenit.

ὀκύμην βασιλικήν. Ocymum
regale.
Duo ocymi genera: maius, & minus, cui caryophyllati nomen
officinæ indiderunt. Antiquis ocymum duntaxat dictum fuit:
posteriores Græci basilicum, id est, regium addiderunt, unde
euenit, ut basilici nomen apud uulgos obtinuerit. Nam Gallis

du basil: nostris basilico: aut basilici: Italici basilico gentile, no-
minatur.

Quia suis sedibus exciderant Leontopetalis & Lepidij annotationes,
eas hic attestandas duximus, ne forte prætermittas à scholiaste arbitra-
rere.

λεοντοπόδιον. Leontopodium, siue
Leontopetalon.

Ambiguum est quid sit. Nam Ruellio placet esse patam leonis
officinarum, quam Galli poumelée, Delphinates marfitre, no-
stri poumonlueyo nominant. Eandem rursus cum Plinij consi-
ligine confundit, non nominibus quidem, sed re ipsa, si dili-
genter consideretur. Fuchsius, ne ambagibus implicaretur,
eam plantam leonis patam officinarum uidelicet ad ellebo-
rum nigrum adulterinum syluestrem relegauit. Verum siue
consiligo Plinij, siue leontopetalon Dioscoridis, siue adul-
terinus Fuchsi elleborus censeretur debeat, iam in ellebori men-
tione diximus. Hoc tamen nunc addere præter rem ac institu-
tum non erit, uulgarem officinarum patam leonis (quam Gal-
lis poumelée, Delphinatibus, marfitre, nostris poumonlueyo
nominari diximus) tantillum attritam, horisq; aliquot aqua
maceratam, præcipuo ad omnis generis inflationes, præsertim
uenenosas, remedio esse, si ex ea aqua cyathi tres aut quatuor
ipsis inflatis ieiuno stomacho diebus aliquot continuis pro-
pinentur.

λεπιδιον. Lepidium.
Lepidium Galeno, cap. 2. lib. 10. compos. pharm. part. ea herba est,
quam Damocrates in Clinico (ut Archigenes apud Aëtium
cap. penult. lib. 3.) iberidem siue cardamanticen nominauit,
ac nasturtio per omnia fecit similitudinem. Paulus item cap. 77.
lib. 3. ex Galeni sententia: & lib. 7. iberidem syluestre nastur-
tium Græcis siue cardamanticam appellari commemorat: ean-
demq; genere cum Lepidio esse affirmat. Verum Græcorum
lepidio folia lauri ascribit, multo tamen ampliora ac mollio-
ra. Quinetiam Paulo assentitur Plinius, cap. 8. lib. 19. lepidium,
inquiens, in cubitalem exire altitudinem, folijs esse laurinis,
sed mollioribus. Ex quibus liceat duo lepidij genera statuere: ma-
ius scilicet & minus. Maiori radix satis longa, candida, intor-
ta, crassitudine digitali, gustus acris ac feruida, nasturtium re-
dolens. Caules in cubitalem, aut paulo ampliorem, exeunt
longitudinem, iuncto crassiores, læues, per summa brachiatæ,
ex candido cæsi ac tantillum per autumnum rubescentes. Fo-
lia longa, hortensis uulgarisque costi folijs similia, laurinis
multo ampliora ac molliora, primum uiridia, dein suppal-
lida, aut quasi cineritia, nasturtium redolentia. Flos summis uir-
gis insidet albus, racemosus oliuæ modo. Semen copiosum,
minutulum, gustu feruens. Minus autem lepidium ternos,
quaternos, plures aut pauciores cauliculos ab una radice fun-
dit, teretes, rectos, cubitales, sæpe breuioribus, ramosos, folia
nasturtij, gustus acris, nasturtij sapore, gustu, & odore. Florem
lacteum, copiosum. Semen exiguum, teres, oblongum, folicu-
lo lanceæ cuspidi simili geminatum contentum. Radix candi-
da est, oblonga, minimi digiti crassitudine, feruentis gustus,
odore nasturtij. Floret utrumq; æstate. Semen maturescit au-
tumno. Minus in uiarum marginibus, sepibus, rudibus, iuxta
parietes ac murorum ruinas, apricis & soli expositis locis lu-
xuriat. Maius in uuidis humentibusque, & in siccis nonnun-
quam ubique, potissimum in nostra provincia. Hoc à gustus
acrimonia nostris bon raphy, id est, bonus raphanus, dicitur:
Gallis anonymum. Minus officinis & uulgo adhuc igno-
tum. Ruellio tamen & Hermolao raræ eruditionis uiris, Rha-
phanus officinarum ueterum lepidium existimatur. Verum si
raphani nomine eam plantam intellexerint, quæ prælongis,
latis, in dorsum, ubi adoleuerint, quadatenus recuruis, herba-
ceisq; constat folijs, radice crassa, acris, caule cubito longiore,
flore quasi brassicæ, & in hortis inuenitur: certum est illos
cum sibi, tum alijs imponere. Sin uero eam notent, quæ no-
stris bon Rraphy nominatur, repræhensione omnino carere
debent. Nam quod maius lepidium nostræ provincie uulgo
bon raphy appelletur: ueri simile est, eam nomenclationem
ab herbarijs in uulgos nostrum manasse: ut inde duo rapha-
ni genera subindicari uideantur: Alterum laurinis folijs, gu-
stu & sapore nasturtij, & id uerum lepidium maius esse: Alte-
rum hesenij aut uerbasci folijs, gustu acris quidem, sed uulga-
ris raphani, quod non lepidium, sed raphani species existi-
mandum sit. Non desunt alij qui uulgarem piperellam lepi-
dium maius esse putent, sententia minimè probanda, nisi aliud
Italici (quod magis suspicor) aliud Gallis piperitidis piperel-
læque nomine intelligatur. Nam quæ harum gentium offici-
nis piperitis dici solet, Gallico & Delphinatico uulgo du coq,
nostris cost uocatur: folijsq; spectatur laurinis, multo tamen
amplioribus,

amplioribus, minimè crassis, in ambitu serratis, gustu cum quadā amaritudine acri ac suavi: caule cubitali: flore luteo, specioso, athanasie, aut foemine abrotoni floribus æmulo: radice numerosa, candida, acri. Quæ notæ si conferantur cum ijs, quas nostratum bon raphy inesse diximus: conspicuum, nō fallor, inter ambas plantas agnoscent discrimen: cum alterius flos candidus sit, racemosus, folia incana, læuia, pinguiuscula, gustus feruidi, & nasturtium, omnibus suis partibus, prorsum redolentis: quam ob id à Græcis cardamanticam & agriocardamon nominatam fuisse, constare, uel cuius mediocriter erudito, potest. Quare, ne longius excurrat oratio, in ea ipse sum sententia, ut nostratum bon raphy ueterum lepidium maius certò existimem. Nec obstat, quòd in pinguibus & humidis locis folia quæ radicibus propiora sunt, maiora aliquāto, quàm à Paulo Plinio que picta fuerint, nōnunquàm uisan-

tur: Alioqui eadem ratione, ea rutæ planta, quæ in Herodio Iudææ nobilissima atque munitissima arce, ingentem ficum arborem sua cum proceritate, tum magnitudine æquabat, (ut est autor Iosephus libris de bello Iudaico) ruta non erit, quòd in magnitudinem & altitudinem prorsus inusitatam adoleuerit: Nec ueratrum album, Dioscoridi pedalis altitudinis, ueratrum erit, quòd illud tricubitalem implere lōgitudinem, in alpihus, umbrosis & uuidis locis, oculis nostris sæpe (non tamen citra admirationem) uiderimus: Nec item sabinæ plāta una pedum dūm supra uiginti, alia quatuordecim longitudinis (quas ipsi superiore anno apud Delphinates conspeximus) sabinæ erit, quòd Dioscoridi arbor sit coactæ breuitatis.

FINIS LIBRI I.

H V G O N I S S O L E R I I

SANIONENSIS, MEDICI,

IN II. AETII LIBRUM

SCHOLIA.

*

Σφράγις λεμνία, Sigillum lemnium. Cap. 4.



HODIE ut plurimum desyderatur. Venditant tamen officinæ faciitiam terram, quam uocant sigillatā, pro lemnia terra: cuius uiribus & delineamentis parum respondet. Euenit tamen nonnunquàm, ut propter cōmercia, adulterina lemnia Constantinopoli in Gallias importetur. Siquidem affirmant docti bolum armeniam orientalem cognominatam esse, uerā lemniam terram, nullo sigillo impresso. Quæ uerò sigillata uisitur auaritia negotiatorum adulterata est.

μήτης, Rubrica. Cap. 5.

Vera desyderatur, quanquam est & Gallis rubricæ genus quod sinople appellant, fabris lignarijs egregiè cognita, quam nostras uulgo aucano nominat.

Σαμία γῆ, Samia terra. Cap. 6.

Ignoratur. putat tamen Musa Brassauolus officinis talchum appellari.

γῆ σελινούσια καὶ χία, Terra Selinusia & Chia. Cap. 7.

Non habetur.

κιμολία, Cimolia terra. Cap. 8.

Vera desyderatur, sigulina tamen eius uiribus respondet: atque ob id, quando cimoliæ inopia premit, usurpari in usus medicos potest.

ἀμπελιτὶς, Ampelitis. Cap. 9.

His regionibus desyderatur, quanquam si etymon spectes, ubiq; inueniri poterit.

κρητικὴ, Cretica. Cap. 10.

Putant eam esse, quam Galli de la croye nominant. uerum uulgaris croye lapis est cādidiissimus, friabilis, & è fodinis eruitur.

βόλος τῆς ἀρμενίας, Armenius bolus. Cap. 11.

Facilius tantum his in regionibus habetur. Is attamen præparatus contra pestilentie contagia usurpari felici successu à multis solet: propinata nimirum ipsius præparati drachma una, ex stillatitij liquoris oxallydis cyathis tribus, diebus sex aut septem in aurora. Eruitur hodie è monticulis quibusdam prope cœnobium Montis maioris, nō procul ab Arelatis urbe nobilissima & antiquissima nostræ prouinciæ, & uulgo boli armeni dicitur. quæ autem terra boli armenie orientalis uenditur uerissima, Galeni terra lemnia est.

λίθος ἡματιτὶς, Hamatites lapis. Cap. 13.

Quibusdam sanguinarijs dicitur: quod nomen ambiguum est: officinis hamatites, sicideo dictus, quòd in aqua dissolutus colorem sanguineum reddat. Est & alijs hamatites, qui cotti attritus, colorem quendam sanguini non absimilem remittit.

σχιστὴ, γαλακτὶς, μελιτὶς. Scistus, Galactites, Melitites. Cap. 14.

Schistus est officinarum & lapidarium specularis. In gypsarijs inuenitur, reliqui duo ignorantur. uolunt tamen nonnulli eū ignotū esse: sed quòd hamatitibus uiribus respondeat, hamatitem eius loco substitui.

λευκογραφὶς ἢ μίροφος, Leucographis aut Moroxus. Cap. 16.

Dioscoridi morochthus & galaxias dicitur: quis autem sit ignoratur.

γαλακτὶς, Galactites. Cap. 17.

Aëtio duo galactitis genera, sed ambo nostris temporibus sunt ignota.

θυίτης, Thyites. Cap. 18.

Lapis mortariorum alioqui dicitur, ignotus tamen est.

τεκολίθος, Tecolithus. Cap. 19.

Galeno Iudaicus dicitur, eoque nomine officinis cognitus est.

πυρίτης, Pyrites. Cap. 20.

Officinarum & solidariorum marchasitam utramq; ad ueterum pyriten referri uolunt: Mesuæ stellatus lapis dicitur. Est & silicis quoddā genus igni excutiendo efficacissimum, quod nostrates peyrart, corruptā tantillum pyritis nomenclatione, appellant: quod an ad pyriten reuocari possit, pluribus non contendo. Molaris tamen pyriti substituitur cap. 4. lib. 15.

φρυγίς, Phrygius. Cap. 21.

Ignoratur.

ἀγρίστατος, Ageratus. Cap. 22.

Desyderatur.

ἀσσις, Assius. Cap. 23.

Assius lapis, & ipsius flos desyderantur. lapidis tamen loco substituitur pyrites, capit. 34. lib. 15. floris autem inopiam emendat sal ammoniacus ustus pari ad florem pondere, cap. 45. lib. 12.

γαγάτης, Gagates. Cap. 24.

Officinis ignotus. Gallis du geet: Delphinatibus, nostris & Aquitanis iayet, ex quo texuntur precule mulierum. Extant nobilissimæ gagate lapidis fodinæ in montibus Pyreneis, è quibus maximæ glebæ eruntur, & in uaria utensilium genera tū scalprio, tum torno ab indigenis conformantur. nomen priuatim genti est la conté de foy.

μαγνήτης, Magnetes. Cap. 25.

Vulgo de l'aymant: Marinarijs autem calamita.

σμύρις, Smiris, Pumex. Cap. 26.

Smiris uulgo esmerit: Italis femrighio. Pumex, pierre ponce.

λίθοι ἐν τοῖς σπγγῆσι, Lapides in spongijs. Cap. 27.

Nomen retinent, & uulgo pharmacopolarum notissimi sunt.

Cc 4 ἡσφαλίτης,

ὄστρακις, γέοδες. Ostracites, Geodes. Cap. 28.
Ostracites lapis durus est, quo marmora poliuntur: geodes autem sic, quod terram in medio sui corporis contineat, dicitur. An habeatur, necne, compertum nondum mihi est. E cote naxia lapis uulgo un acueur: mola est qua rasorij gladij acuantur, nostrisq; molo dicitur.

ὄφρας. Ophites. Cap. 29.
Coloris propè terreus est, serpentinae entis æmulus, punctis creberrimis ac minutissimis notatus. uulgo lapidariorum serpentine appellat.

ἱεράκις, ἰνδύς. Hieracites & Indicus. Cap. 30.
Ignorantur, aut saltem alijs longè diuersis nominibus uenduntur.

ὕαλλος. Vitrum. Cap. 31.
Nomen retinet. Gallis uerre. nostris ueyre.

ἀέτης. Aëtites. Cap. 32.
Duo eius genera, colore, magnitudine ac forma inter se distincta. Nam quidam maiores sunt, subrotundi, coloris penè terrei aut ex terreo pallidi, tuberculis quibusdam inæquales, ouo Gallinaceo magnitudine pares, interdum maiores. Alij rubiginoso colore, oblongi, amigdalæ aut oui figura, quodammodo pressi, & subasperi. Officinis lapis aquilæ: lapidarijs & uulgo pierre d'aigle nominatur.

ἀλαβάνδιος. Alabandinus, Cap. 33.
Quis sit ignoratur,

ἤλυντρον ἢ λυγνέριον. Succinum seu Lincurium. Cap. 34.
Electri nomen à solis colore sortita est hæc lacryma. Vulgus & rura ambram citrinam appellant, ambre: officinæ autem charabe, more Arabum. Diuersa tamen res est à recetiorum ambaro seu amparo: cuius tria habentur genera: fuluum & præpingue, supallidum, & nigrum, quod è piscium uentribus e-rui prædicant: cuiusque portio, quæ dorsi spinæ adhæsit, ambræ gryseæ nominatur. Tradunt recentiores Græci fontes quoidam esse, qui ambarum, ut sulphur, bitumen, & picem eructent, multisque in locis seaturire. De his tamè plura apud doctissimum Ruelliū legito cap. 27. libr. 1. & cap. 29. eiusdem.

ἰάσπις. Iaspis. Cap. 35.
Tria hæc statuit Aëtius iaspidis genera: uiridem, subuiridem, & iaspachatem. Duo priora genera habentur, & nomen retinent: Iaspe: Italis diasprio. Iaspachatem faciliè crediderim esse eum lapidem, quem nonnulli magna religione uelut thesaurum preciosum seruant, uocantq; agathe. Aiunt enim eum lapidem pestilentibus carbunculis admodum ægotantes à perniciè uendicare: uiridem autem Iaspidem collo appensum sanguinis è naribus profluvia sedare.

Σάφειρος. Saphirus. Cap. 38.
Habetur, nomenq; retinet, sapphyr. Italix saphyro.

Σμάραγδος. Smaragdus. Cap. 39.
Nomen retinet: esmeraulde. maximæ nobilitatis est, & uulgarè notitiæ. Sunt & alijs multi lapides non contemnendæ autoritatis, Aëtio & uetustioribus medicis aut incogniti, aut inditi, ut granatus, chalcedonius, turcicus, & alijs còplures: quos, quia de illis autor nullam fecit mentionem, silentio præterimus.

ἀδάριος. Adarces. Cap. 41.
Spuma est, ut quidam uolunt, lacustrium harundinum, in alarum cauis concreta, spongijs non absimilis. Inuenitur æstiuus solibus, exiccatis, ob ardores, stagnorum, palustriumue locorum aquis. Faciliè ubique haberi potest. officinis ignotus.

ἀλκυονίον. Alcyonium. Cap. 42.
Quinque Dioscoridi Alcyonij genera. Si, ut quidam uolunt, alcyonium est maris spuma in corpus spongiosum concreta, atque in litus uí undarum & perpetui motus eiecta, duo priora genera in littore mediterranei maris passim inueniuntur, reliqua minus nota sunt, etsi quidam uolunt quatuor alcyonij species inueniri. Brassauolo placet maris spumam, quam Ferratienses officinæ dant uenum, uerum alcyonium esse.

ἅλς. Sales. Cap. 43.
Sal fossitius, qui mineralis est, officinis sal gemmæ nuncupatur, Armeniacus officinarum factitius est: uerus antiquorum, ut & Cappadocius, ignoratur: ueri tamen Armeniaci loco usurpatur communis albißimus, lotus, & exiccatus, cap. 97. libr. 13. Indus olim excidebatur è monte Oromeno Indiæ. Est tamen sal Indus Arabū saccharū candum naturale: cuius loco nos cando factitio utimur. Factitius duplex est, ex aquis nimirum, ut mari: puteis, ut in Hispania: spon-tib, ut in Burgundia:

è nitroforū lignoru cineribus. Nā è quereu aut corylo adustis, donec carbo appareat segregatus, deinde pfula aqua interdū salia, interdum dulci, sal fit. Siquidem cinis ille qui postea relinquitur, còsumptis penè carbonibus, sal est. Verum sal omnis è stirpium materia factus nigrescit. Salis flos ignoratur. Salis spuma haberi maritimis locis potest.

ἀρμενιάκιον. Armeniacum pictorum.

Cap. 47.
Desyderatur, nisi sit officinarum lapis lazuli, quem docti ceruleum Dioscoridis lapidem uolunt. Is ad melancholicas affectiones accommodatur, ut pictorum armeniacum: adstipulatur & color, qui, Dioscoride teste, ceruleus in armeniaco expetitur ac còmendatur. Quidā uolunt, nos armeniaco lapide carere. Color tamen & facultates conuincunt aliquid esse, quod ceruleo (qui lapis lazuli transmarinus nominatus est) lapidi uiribus respòdeat. Quibusdam placet lapidem inueniri in fodinis metallicis, qui armeniaco ueterum respondeat. Is uerdasur nominatur.

ἀργυρίον. Auripigmentum. Cap. 48.

Arsenicum officinis nomen retinet. Vulgo de l'arsenic. Vocatur & auripigmentum. Gallis de l'orpin, du realgar, aut risagal. Sublimatum enim ab arsenico diuersum est. Est & apud officinas auripigmentum rubrum, quod putatur ueterum sandaracha. Aduertendum est recentiores chymistas arsenici nomine tria intelligere, auripigmentum rubrum scilicet, risagalum, & quod peculiari nomine arsenicum uocatur. Nam chymistarum nomina hæc sunt. Arsenicum croceum, quod est auripigmentum: arsenicum rubrum, quod est sandaracha: & arsenicum album, quod priuata appellatione sic uulgo dicitur. Discrimen hoc faciunt docti nonnulli inter auripigmentum & sandaracham ueterum: quod sandaracha, magis auripigmentum, minus in terræ uisceribus coctum est, & ideo minus rubicundum uideri.

ἀσφάλτης. Asphaltus, bitumen.

Cap. 49.
Officinis omnibus bitumen iudaicum nominatur. Duo iudaici bituminis genera: liquidū, quod Musa officinis petroleum dicitur, & stercus demonis. Liquidum bituminis fontem admirandum esse aiunt in Aruernia: siccus idem uult officinarum & uulgi mummiæ censeri. Alij uolunt mummiæ esse ueterum pissasphaltum.

ἀφρονίτης. Aphronitrum, & Nitri spuma. Cap. 50.

Nitrum, aphronitrum, & nitri spuma obsoleuerunt, & in tantam uenerunt desuetudinem, ut, quid nunc fient, penitus ignoretur. Horum loco supponunt officinæ salem petrae purgatum, in panes coactum. Id, inquit Syluius præceptor meus, mentiri satius esset cineribus betæ, brassicæ, & aliorum nitroforum. Aliorum quorundam sententia baurach nitri loco à pharmacopolis substituitur: mentiri tamen posse sale, uini faece, aut aceti faece torrefactis. Aëtius cap. 56. libr. 2. uult salis fossilis (quem gemmam appellari diximus) inopiam pari nitri pondere emendari. Quod si illius loco hoc substituatur: pari ratione, ille huius pernuriæ supplere poterit. Sal quoq; nitri loco sufficitur cap. 66. libr. 8.

γύψος. Gypsum. Cap. 51.

Latinis & officinis idem nomen seruat. Gallis & Delphinatibus du plastre: nostris de gyp. Musæ Brassauolo gypsum nondum coctum alumen scaiole officinarum est: cum uero decoquitur, id alumen in gypsi naturam transit.

διφρύς. Diphryges. Cap. 52.

Nisi sit scoria lota fusi eris, ignoratur. Quidam se uidisse in fodinis Tridentinis aiunt, nullum tamen uulgi nomen afferunt.

ἀσπράς. Lapis specularis. Cap. 53.

Habetur hodie specularis lapis, in gypsarijs inuentus, quem tamen ad scisthum lapidem referri contendunt.

θίον. Sulphur. Cap. 54.

Duo sulphuris genera: uiuum, & ex uiuo fractitium uulgarissimum, ambo nota. officinis nomen retinent, Vulgo du soulfhre. Italix solfo.

ῥίσα ῥαῖς. Aerugo rasa. Cap. 55.

Viride æris à recentioribus appellatur: uulgo du uerdet: Italix uerde rame. Vermiculata autem duplex est: naturalis, & factitia, ambæ tamen ignotæ.

καδμία. Cadmia. Cap. 57.

Barbaris catimia: officinis climia nuncupatur. Contendunt tamen multis argumentis docti quidam, ueram cadmiam esse officinarum tutiam,

κυανός, Cyanus. Cap. 58.
Dioscoridi cæruleus: officinis & barbaris lapis lazuli (unde sunt Mesuræ catapotia de lapide lazulo tam celebra ad melancholicas affectiones): uulgo da l'azur. Agricola tamen, libello, quem de metallis edidit, putat lazulum lapidem cæruleæ argillæ speciem esse. Nos, cum ex scriptis ueterum constet eadem penè vires inesse huic lazulo atq; antiquorum armeniaci pictorum, suspicamur lazulum armeniaco congenerem esse, liberum interim suum cuiq; iudicium relinquentes.

ἀργύρεα, Squama æris ac ferri.
Cap. 59.
Obsoleuit utraq; quamquam haberi, si opus fuerit, potest.

ἀργύρεα, Argenti spuma.
Cap. 60.
Arabibus merdasengi: officinis lithargyrus: uulgo du litharge. fuit & auri plumbiq; spuma quædam, quam antiqui improprie lithargyri nomine appellarunt: officinis siquidem hæc nomina seruantur, lithargyri auri, & lithargyri argenti.

νίτρον, Nitrum. Cap. 61.
Galeno & antiquioribus nitrum: nostris temporibus nomine tenus cognitum. Quid autē litri loco substituāt officinæ, quidq; aptius suffici possit, dictum est in aphrolitro.

μελαντερία, Melanteria. Cap. 62.
Atramentū metallicum dicitur. Scribonio Largo medicorum Latinarū antiquissimo, & Galeno celebratissimo, sutoria creta est. Agricola argentum quoddam rude esse in fodinis ait. Hodie Parisijs ostenditur quidam lapis colore uehementer atro, denigrandisq; calceis aptissimo, quem uulgo de la pierre noy re: fabri autem ferrarij de l'armarie nominant: qui an ad ueterum melanteriam referri possit, aut debeat, non contendo. Nonnulli se uidisse melanteriam in fodinis Tridentinis affirmant, nec tamen quæ, qualisq; sit explicant.

μυσκήριον, Atramentum scriptorium. Cap. 63.
Habetur. Sed an idem sit cum atramento ueterum, iudicari non potest. Dioscorides de eo satis abundè tractat cap. ult. lib. 5. Deq; fuligine Vitruuius cap. 10. lib. 7.

μύσι, σόρι, χαλκίτις, Myssi, sori, chalcitis. Cap. 64.
Pro ueterum myssi uitriolum Romanum in usum uocatur: quod uulgo coupe rose appellat. Serapioni zeg uiride dicitur: Sori autem eidem zeg rubrum. ueterum sori, ut & chalcitis ignoratur.

μολύβδαινα, Plumbago. Cap. 65.
Duplex est: alia flaua: alia plumbea. Plumbea uidetur is pharmacopolarum lapis, quem pro minio ostēdunt: qui quidē molybdæna non est: nam ea funditur ac colliquatur: hic autem nequaquam, nec ex eo confari potest argentum aut plumbum, sed minium duntaxat. De molybdæna tamen uide Plinium cap. 6. lib. 33. cap. 16. lib. 34. & cap. 18. lib. 24.

μολύβδος, Plumbum. Cap. 66.
Habetur, nomenq; retinet uulgo du plomb.

πομφόλυξ, Pompholyx. Cap. 67.
Officinis thutia nominatur: Germanis (ut Manardus epistola 5. lib. 12. est auctor) uulgo nil. Alij negant thutiam pompholygem esse, sed ueram cadmiā eam multis argumentis esse affirmant: *Σανδαράχη*, Sandaracha.

Cap. 69.
Galeno lib. 9. simpl. *σανδαράχη*, id est, sandaracha. Alia est ueterum, alia recentiorum, siue Arabum sandaracha. Ad ueterum sandaracham referunt docti auripigmentum rubrum, Arabum autem sandaracha gummi siue resina iuniperi est, quæ alio nomine officinis uernix dici solet: uulgo autem eam du uernix aut de la glasse appellat.

σανδία, Sandix. Cap. 70.
De sandice agetur in cerussa.

σκόρια, Scoria. Cap. 71.
Recrementum metallorum est: officinis generis nomen seruat, Ferri recrementū uulgo mache fer, quasi magma ferri dicitur. Plumbago, si desit argenti recrementum, eius loco admittitur. cap. 38. lib. 15.

στίβιον, Stibium. Cap. 72.
Syluio nostro, & reliquis doctis penè omnibus, officinarum antimonium est.

σπγγίς, Spongia. Cap. 73.
Nomen retinet uulgo esponge.

στονίδια, Alumen. Cap. 74.
Tria aluminis genera: rotundum, quod habetur, & aluminis nomine uenum datur: liquidum, quod alumen rochæ: scissile quod alumen plumæ officinis dicitur: quamquam non de-

sint, qui alumē plumæ ad amianthū lapidem referri uelint, qui amianthus lapis uulgo Gallorum meche sans fin nominatur, & propè solus pro alumine scissili magno errore uenditur.

καλκίτις, Calx. Cap. 75.
Officinis Latinum nomen insedit: Gallis de la chaux: nostris de caulx: Italis calcina. Viuæ autem calcis præparatio dilucidè explicatur Dioscoridi cap. 80. lib. 5.

φύκος, Fucus. Cap. 76.
De fuco infra in cerussa agetur.

χαλκανθίς, Atramentum sutorium. Cap. 77.
Colchotar Arabum est. Pro tribus chalcanti generibus ostendunt officinæ tria uitriolorum genera. Candicans, quod uulgo coupe rose blanche: uiride uersus cæruleum, quod uitriolum romanum: tertium solidius, & partibus quibusdam uiride aut æruginosum, quod citrium appellant. Ad quartum genus potest referri officinarum colchotar, quodq; zegis & dragantum nominant. Nonnulli tamē uolunt duo chalcanti genera haberi: naturale, coppa rosa dictum: & arte factum quod uitriolum nominetur.

χαλκίτις, Chalcitis. Cap. 77.
Volunt cholcotar Serapioni dici. Vera tamen ueterum chalcitis desyderatur. uerū cupam rosam candidam (quæ uitrioli species est) eius loco usurpare solent.

χαλκός πυρρὸς, Aes ustum. Cap. 79.
Officinæ, & reliqua barbarissimi familia, chalcumenon, pro eo quod est *χαλκός πυρρὸς*, id est, æs ustum nominant.

χαλκὸς ἄνθος, Flos aris. Cap. 80.
Vulgo Gallorum du uerd de gris: fiore del rame Italis.

χρυσόκολλα, Chrysocolla. Cap. 81.
putat Musa Brassauolus boracem officinarum ad chrysocollam referri. Omnium tamen fermè doctorum sententia ignota his temporibus est. Potest tamen haberi facticia, ut fusilimè docet Plinius cap. 5. lib. 33. & Vitruuius. cap. ult. lib. 7.

κεράσιον, Cerussa. Cap. 82.
Officinis cerussa: Gallis du sard aut ceruse: Delphinatibus & nostris ceruso. usta pura cerussa in syricum, quod medicis sandyx nuncupatur, transit. Ut autē fiant cerussa, crugo, & sandaraca, lege Vitruuium cap. 12. lib. 7.

M E T A L L I C I S absolutis pauca de piscibus, & alijs hoc libro secundo complexis sunt addenda, quod, quæ nouo lectori negotium facessere poterant, quàm fieri poterit breuissimè ac faciliè explicentur. Nam, ut sanis medico non est opus: sic, nec doctis, & his qui longè plura & accuratius elaborata præstare possunt, hæc scribuntur: quamquam nostram hanc diligentiam, & propensam in omnes studiosos uoluntatem, doctis quoq; (modo æquos se iudices præbeant) acceptam fore, ut spero, sic non dubito.

De cephalo seu mugile. Cap. 137.
Mugil nomen retinet. nostris muiau.

Lupus, Trigla. Cap. 139.
Ignorantur, aut reuera alijs nominibus cognoscuntur.

De petrosi piscibus. Cap. 140.
Scarus ignotus est: nisi sit Italarum zaphyrus. Merula Gallis ung merlang, aut merlan: atq; idcirco falluntur qui putāt esse uulgarem merlus. Turdus incognitus est. Iulæ, quanquam sint merulæ similes, uulgato tamen nomine carent. Perca Gallis esperlunge. duorum sunt generum: marinæ, & fluuiatiles, marinis bonitate longè inferiores.

Gobius. Cap. 141.
Gobij apud Gallos uocantur des gourgerons.

De piscibus mollis carnis. Cap. 142.
Aselli sunt uulgares merlus, qui idem cum merulis essent, nisi carnem haberent duriorē. Sub passerum autē genere tria piscium genera continentur. Rhombus, qui Gallis un turbot: nostris un rhomb nominatur. Solea uulgo cognita, une sole, sic à soleæ pedis similitudine appellata: quamque quidam eam ligulam, & Græci βόγλωσσον, id est, bouis linguam appellant. Qui uerò tertio loco complectuntur pisces, generis nomen sibi adoptarunt. passerēs enim dicuntur: qui, si magni sint, Gallis une pleye: sin parui, ung carrelet dicuntur. Est & apud Gallos piscis quidam barbue nominatus, qui toto corpore, & carnis duritie ad rhombum proximè accedit. Inter mollis carnis pisces etiam hi Galeno adnumerantur: hamia, quam uulgarem truttam esse uolunt. uulgo truitte. Iecorarius, Gallis aiglesin: cytharus Gallis rouffete: umbræ, une ombre.

De piscibus duræ carnis. Cap. 143.
Pelamides nomen retinent: nostris palamidos. Hi autem ex Galeno accedunt: galeria olim Romanis dicta, quam putant uulgarem lampetram esse, ea Gallis, & Delphinatibus lamproye, nostris

nostris lampresō uocatur. Delphinis Gallis marsuyn. Nostrates appellāt daulphins; pisces ē cetaceorum genere, magnos, oblongo rostro, dorso, ut cameli, multum protuberante: totōque corpore quasi in cemicirculi figuram conformato. Sardini pisces, des sardines: Iberici des enchoyes. reliqui sunt ignoti.

De crustatis. Cap. 145.

Gammari Gallis hommar & hammar. Locustæ nostris langousto de mar.

Molles. Cap. 146.

Polypus un pourpre. Sepia nomen retinet: Gallis seiche: Delphinatibus une seypo. nostris sepo, aut sipio. Loligines Gallis calamartz.

Echini marini. Cap. 148.

Gallis erissons: maritima nostra plebs orfins de mar nominat. Italia riccio marino.

De garo. Cap. 150.

Garum sanies est salitorum piscium, siue liquamen, quod ex piscibus aut carnibus sale maceratis defluit. Varias garorū compositiones habes cap. ultimo lib. 20. Dionysij Vticēsis de agricultura, qui, autoris suppresso nomine, Constantino imperatori attributi ac dicati fuerunt.

Adeps, Pinguedo, Scuum.

Cap. 152.

Adipis, pinguedinis ac seui uariæ sunt differentiæ, pro animalium, ē quibus extrahuntur, uarietate: quorum uicissitudines annotare necessarium instituto nostro duximus, quo nouum medicinæ tyronem rerum inopia non perturbaret, & à cœptis curationibus nōnunquā auocaret. Vrsini igitur aut uulpini adipis loco, si hi defint, suffici potest caprinus, taurinus, equinus, aut butyrum recens, cap. 125. lib. 13. Anserini inopia, gallinaceus aut phasianin⁹, cap. 118. lib. 5. Gallinace⁹ quoq; anserino, & gallinaceo porcinus succedit, cap. 4. lib. 15. Vrsino itē Vulpinus: amborum penuria taurinus, cap. 123. lib. 13. Adipum autem recentium gallinæ, anseris, phasiani, aut butyri, in infusis anodynis, inopiam emendat fœnogræcum, & althææ radices oleo incoctæ, cap. 5. lib. 11.

Medulla. Cap. 153.

Vitulina medulla ceruinæ inopiam sarcit æquo pondere, cap. 1. lib. 13. & cap. 83. lib. 16. Adhæc ceruinus adeps, ceruinæ medullæ penuriam reparat, cap. 42 lib. 12.

Succidælanæ. Cap. 159.

Lana succida deficiente, quæcunque alia usurpatur. cap. secund. libr. 15.

De terræ intestinis.

Cap. 168.

Intestina terræ, ut autor est Aëtius cap. 6. lib. 4. sunt lumbrici piscatorum, qui in limo fluminū inueniuntur. Hæc cocta, cumq; myrrha trita, ac ex passō sumpta icterum sanant, cap. 18. lib. 10. aquas hydropicorum ducunt, cap. 25. eiusdē. diabetem sanant, cap. 1. lib. 11. renum calculos comminuunt, cap. 5. lib. 11. uesicæ calculos atterunt, & urinam mouent, cap. 10. & 22. eiusdē. suppressas item urinas mouent ex hydromelite pota, cap. 23. eiusdē. podagricis opitulantur, cap. 35. lib. 12. mammarū profundas duritias sanant, cap. 37. lib. 16. earundem abscessibus, opitulantur, cap. 39. eiusdē. uberibus illita lac promouent, cap. 142. lib. 3. & lumbricos ducunt, cap. 156. lib. eiusdē. sumpta lac augent, cap. 6. lib. 4. Aurium inflammationes mulcent cum rosaceo cocta, & instillato deinde oleo, cap. 12. lib. eiusdē. earumque dolores leniunt eodem modo parata, cap. 120. lib. 5. Trita autem, & dolenti tempori adhibita, hemicranicos dolores mirè leniunt, cap. 49. & 50. lib. 6. Auriumque dolores instillata mitigant, cap. 80. lib. 6. & externas aurium affectiones imposita sanant, cap. 88. lib. eiusdē. in testa autē uista, trita, & præcussis pilis superspersa, eos renasci prohibent, cap. 67. lib. 7. Oculorum fluxiones & albugines sanant, cap. 99. lib. eiusdē. Dolores dentium mitigant, cap. 27. & 33. lib. 8. eosdēque dolentes citra doloris sensum extrahunt, cap. 34. libri eiusdē. Ad alia item multa utilia sunt, ut ex autoris contextu habere potes.

Draco marinus.

Cap. 169.

In littore Græco *δρακίνας*: Neapoli trachæna: Mafsilæ aragno de mar. Hunc uolunt nonnulli esse Gallorum niue. Draconem marinum uidere est Viennæ Allobrogum, in ædibus doctissimi Guidobaldi, medici: cuius uidendi ac tractandi copiam mihi fecit anno superiore.

Vipera. Cap. 170.

Vipera accuratè autori describitur, cap. 21. & 20. libr. 13. & Galeno in libr. de Theriaca ad Pisonem, iam in Italia recognosci cœpit, & à serpentarijs marasso nominatur.

Erinaceus marinus. Cap. 171.

Supra in echino marino dictum est, eum à nostris uocari oursin de mar. Pisciculus est magnitudine oui gallinacei, fusco colore, circinnatæ rotunditatis, spiculis quamplurimis horridus, qua uerò parte humi hæret, tantillū pressus. (nā ea parte humi pronus decumbit, & alimentū capeffit) caruncula intus humida, incundi cum salugine quadam saporis, intercurrentibus intus subrubētibus, per certa intervalla, mēbranis. Crudus coctusue estur, delectamq; mirè excitat appetitiā. Frequēs inuenitur in littore mediterranei maris ubiq;: saxosis præsertim locis: præcipuè in saxis Bergansonis arcis loci natura munissimæ, tribus circiter miliaribus à Stœchadibus insulis, quas uulgo les isles d'yeres nominant.

Erinaceus Terrestris.

Cap. 172.

Vulgo Erisson, animal omnibus notum, armentis bouum, pecorum gregibus, & non rarò ipsis mulieribus infestum ac noxium. Tradunt enim rustici (id quod experientia superioribus annis confirmauit (uaccam, ouem aut simile fœminei sexus animal, si herbas aut fructus, super quos genitale semen erinaceus effuderit, fortè fortuna pauerit ac deuorarit, erinaceum concipere, gestare, tandemq; parere, aut (si id ob spicula non possit) emori. Paucis enim ab hinc annis id compertum fuit in uacca, & oue (dissectis post mortem earum corporibus, & erinaceo in matrice inuento) in eo Delphinatus tractu, quem uulgo Royans appellant, non procul ab Isara flumine amplissimo, & antiquis scriptoribus celebratissimo. Fidem hisce rebus abrogandam censerem, nisi adhuc oculati ac fide dignissimi testes extarent, qui id ipsum in mulieribus hic accidisse, uel iureiurando affirmant. Nam uisæ sunt mulieres aliquot, quæ erinaceos multos, cum diu uterum gestassent, pepererint. Alia quæpiam nobilis genere in monte Cemenio (is enim est, qui Lugduno Belicadrum usq; ab occidente Rhodanum comitatur) cum alius mēsis iam nouem intumuisset, sperans egregiam se marito sobolem parituram, quatuor cuniculos infantis loco est enixa. Alia quæ scrophulā animal (sic enim uocant animalculum quod æstate in algidioribus fontibus inuenitur: oblongum est & gracile, semicirculare, multis pedibus præditum, colore quasi millepedum, quæ in hydrijs stabulantur) quæ cubitum longitudine, & brachium magnitudine æquaret, edidit. Alia postremo (dictu mirum & horrendum uisu) monstrum peperit triceps, cubitale, capitibus domestici felis, corpore lacertæ, colore uario, brachijs ac tibijs orbium, cauda breui. Nec item quæ sequuntur sua carent admiratione. Refert Plutarchus grauissimus autor cap. 9. lib. 8. symposiacan, quendam in dyloria hordeaceum culmum, geniculis aliquot cinctum, cum urinis expulisse. Alium uerò quendam hospitem ephebum Athenis bestiolam hirsutam, multisq; pedibus uelociter ambulantiem, unā cum multo semine excreuisse. Noui præterea ego, apud Aptam cognomento Iuliam, quendam ē primatibus urbis Bertrandum Rizium, qui deuoratis intempesta nocte, ad aluum largiter sollicitandam catapotijs, uenereo: quodam furore percitus, mox cum uxore rem habuit: undè accidit, ut, ui purgantis medicamenti cum uirili semine in uterum coniectā, indeq; per uniuersum mulieris corpus transfusā, illa plus minus decies aluum, intra horas pauciores septem, exonerarit: uir autem, qui catapotia deuorauerat, nihil omnino excreuerit. Id enim à medico primū: dein à uiro: postremo ab ipsa muliere, maximo risu simul & admiratione, anno abhinc quarto, didici. Quinetiam noui Aruer nam quendam iureconsultum, ætatis mediæ, claris ortum parentibus, qui, ob quendam infimorū intestinorum morbum, ab annis iam pluribus quatuor, nihil prorsus per sedem excreuerit. Verū præcluso inferiori meatu, immutatoq; naturæ ordine, quoties fecalibus excrementis grauatur, ea putria omnino & olentia grauitur, per os quasi uomitu expellit. Audio præterea quendam alium (id enim accepi ab ijs qui frequenter uiderunt) mensibus singulis, fœminarum more, largam sanguinis copiam per genitale membrum excernere cōsueisse. Quæ iam dicta omnia ideo adnotare & scriptis mandare uolui, partim quia rara aut inaudita: partim ut mecum discat beneuolus lector, multa quotidie in rerum euenire natura, quæ humanæ sagacitatis captum excedunt, fidemq; omnem superant.

Hippocampi marini.

Cap. 173.

Hippocampus Mafsilæ cheual de mar dicitur, quod capite & collo sit equino, rostro oblongo, fronte, ut equus, comosa, pilosa ceruice, cauda draconis: gallis une chenille.

Cantharides. Cap. 174.

Nomen ubiq; uulgo retinent cantharides.

Cancris fluuiales. Cap. 176.

Gallis escreuices: nostris chambres.

Locustæ. Cap. 176.

Locusta alia terrestris: marina alia. Terrestris multæ sunt species, magnitudine & paruitate distinctæ. uulgo langoustes aut sauterelles. Marina nostris langousto de mar.

De castoris testibus. Cap. 177.

Κάστωρ Græcis & medicis: Latinis fiber: Delphinatibus uibre. An cipitis uitæ animal, lutræ simile, crassum, longum, pilo ceruino, crassiore tamen & asperiore: capite breui, rotundiusculo, rostro simo, dentibus binis, tum superiorem, tum inferiorem maxillam armantibus, oblongis, robustis, & aliquantum incuruis, auribus contractis, rotundis, breuibus: tibijs anterioribus dodrantis longitudinem æquantibus, pedibus simiæ ursiæ æmulis: posterioribus autē breuioribus, & pedibus anserinis: cauda longa, satis lata, densa, solæ piscis æmula, squamosa, alpe ra, & ubi prouectioris ætatis fuerit animal, pilis quibusdā breuibus (presertim uersus eius summum) munita: testibus (quod falsū est à plerisq; putatum) nusquam foris prominentibus, quin potius ita retractis, ut egerime tractari (tantum abest, ut periculo urgente eius dētibus amputari) possint, corpore uni uerso graueolente. Mirum est, castorem nocturno tēpore, relictis fluminum ripis, in uicinos locos concedere: & arbores omnis generis, maxime salices (quia teneriores opinor) duobus supra terram pedibus, adeo circumrodere, ut breui temporis interuallo eas excindat, & in miserabilem ruinam adigat. Hominum tamen cōspectum & strepitum ualde pertimescit: atq; ob id, repente, si quid insidiarum sibi moliri suspicetur, in uicina flumina se recipiens, saluti fuga cōsulit. Inuenitur in Sa baudia: in Isaræ & Rhodani fluminū ripis, maxime in ea Rodani insula, quæ uulgo la Camargo dicitur: uicina enim est mari, & Arelatis urbi nostræ prouinciæ antiquissimæ & nobilissimæ. Multi de castore multa fabulantur: nos quæ urdimus, ea tibi bona fide liberoq; animo explicam. De fibro uide Aristotelē cap. 5. lib. 8. de historia animalium, Pliniū cap. 30. lib. 8. & cap. 3. lib. 32. & Solinum eiusq; enarratorem Camertem cap. 24.

De buccinorum testis uitis. Cap. 181.

Bij cornuti buccina uocantur in Gallia: in Hispanico mari thelamonas purpuras appellant. Apud officinas duo genera inueniuntur: dentale, quod quorundam opinione, os est buccinorum, ut entale purpurarum: Syluio tamen entale uox & res barbara est.

De galerita uolucris. Cap. 182.

Καγίδας Græcis: Latinis galerita, est ea auicula, quæ Galli aloëte aut cocheniz, nostri coculbado, quasi cuculatam, uocant. Meminit etiam Aëtius cap. 11. lib. 11. passeruli cuiusdam, cuius ea ro elidendis deturbandisq; renum calculis sit præcipuæ dignitatis: qui, inquam passerulus, quantum ex delineamenti colligere possum, nostris lardeyreto: Delphinatibus lardeo nominatur: quanquam multorum opinione ea est auicula, quam nostri gingno quouo: Galli branle queue appellant. Verum nō multum refert utranuis in usus medicos admittas.

Congeneres enim inter se uidentur, nisi huic tremula, illi firma cauda inesset. Ego tamen re uera priorem anteponendam ducerem: & posteriorem, prioris inopia, in usum uocarem.

De cochleari terrestri. Cap. 183.

Eius multa genera. Alia enim oui gallinacei magnitudinem implent, rotundæq; sunt, subcandidæ, syluis & aquaticis locis familiares. Aliæ depressæ: Aliæ candidæ, in uineis & nepris degentes, omnium delicatissimæ. Aliæ rotundæ quidem, sed magnitudinis mediæ, ac uulgares. Gallis limaces & escargotz: Delphinatibus & nostris limaces.

De mænulis. Cap. 184.

Mænulæ uulgo debogues. Mænularum item nomine completur, omnes pisciculi, qui Gallis de la menuyse, nostris menudalho dicuntur.

Torpedo. Cap. 185.

Piscis est Gallicæ plyæ similis, maior tamē, & laterib; magis pinatis, pressus, latus & penē circinnatæ rotunditatis, suo attrectu totus egelidus, naturalem eam uim habēs, ut stuporem repentinum manibus & toti brachio afferat, quemadmodum experiētia me, in mari Lygustico, docuit. Massiliæ un tourpilhon, quibusdā tremorfa, quod suo contactu tremorē inducat. Nautæ tamen qui mecum tum erant (erant autem Frontinianienses, patria Aquitani) gallino de mar, nisi me fallit memoria, appellabant. Venetijs autem tremolo: Romæ batti potta & forterigia nominatur.

Asellus. Cap. 186.

Vulgaris est merlus.

De ostreorum & purpurarum testis.

Cap. 187. & 188.

Ostreorum testæ sunt uulgares cocquilles. Testæ autem purpurarum uix inueniuntur.

Squatina. Cap. 189.

Ignoratur.

Scincus. Cap. 191.

Duo scinci genera: maior ignotus: minor officinis stincus.

Cicadæ. Cap. 193.

Vulgares sunt cigales. frigida loca horrent, calidis delectantur, æstiuis ardoribus prætereñtium aures suis clamoribus ac garulitate obtundentes. Hoc interim notatu indignum nō fuerit, cicadas in partu mori, discesso in foetus exitu parentis uentre, ut de uipera memoriæ proditum est. Id enim obseruatione multa ac longa cognouimus.

Hyæna. Cap. 194.

Quod qualēque sit animal tradit Aristoteles cap. 5. lib. 8. de historia animalium. Hodie, his saltem regionibus, ignoratur. Illius stercus olim in usu fuit, quo deficiente, suillum usurpari debet, cap. 6. lib. 13.

Hirundines. Cap. 195.

Nomen retinent. Gallis & Delphinatibus hirundelles: nostris dindoletos.

Scholorum in loca difficiliora libri secundi Aëtij finis.

[illegible]

"... (6) ..."

THESE BOOKS ARE
 THE PROPERTY OF
 THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

AETII MEDICI GRAECI CONTRACTAE MEDICINAE

TETRABIBLI PRIMAE SERMO

PRIMVS, PER IANVM CORNARIVM MEDICVM

PHYSICVM LATINÆ CONSCRIPTVS.

De simplicibus pharmacis ex plantis, iuxta ordinem literarum
Græcarum. Item de multorum oleorum præparatione.

DE SIMPLICIVM MEDICA- MENTORVM VIRIBVS.



DIFFERENTIAE particularum actionū in singulis pharmacis fiūt, ex eo quod singula ex ipsis ad tantam caliditatem, aut frigiditatem, aut siccitatē, aut humiditatem, aut partium tenuitatem, aut earūdem crassitudinem accedant. At uero ad quantā tandem accedant singula, enarrari non potest iuxta exactam sanē ueritatem. Sed nos tamē etiam hoc ipsum manifestis, & ad artis usum sufficientibus distinctionibus compræhendere tētauimus, unum quidem genus esse demonstrando, quod ad simile corporibus nostris temperamentum perueniat, ubi à caliditate quæ ipsis corporibus inest, transmutationis & alterationis principium quoddam assumpsit. Alterum uero calidius fieri quàm pro nostro temperamento. Atq; huius quatuor ordines facere mihi uisum est. Primū qui adhuc ad sensum obscurus est, ut ratione depræhendere oporteat. Alterū ab eo secundum, qui iam ad sensum manifestus est. Tertium qui fortiter calfaciat, nondū tamen urat. Post hūc quartum & ultimum qui ustorius sit. Sic & frigefacientium primum ordinem eorū quæ ratione indigent ad demonstrandum quod frigefaciant. Secundum eorum quæ sensibilibus frigefaciunt. Tertium fortiter frigefacientium, nondū tamen mortificantium. Quartum mortificantium. Iuxta eandē proportionem etiam humectantium & siccantium. Fiat autem clarioris doctrinæ gratia harum distantiarum à temperamento ordo, ita ut frigidiorū primus sit, in quo quis locauerit rosaceū oleum, aut ipsam rosam. Secundus ab eo sequens proximè, in quo rosæ succus. Deinde tertius & quartus, donec ad frigidissima perueniamus, cicutā & papaueris succum, & mandragoram, & hyoscyamum. Rursus in calidis anethum & fœnum græcum primo ordine ponamus. In secundo quæ secunda apparent: ita & tertia & quarta, donec ad uistoria deueniamus. Iuxta eūdem modū in humectantibus ac siccantibus medicamentis, initio rursus à temperatis sumpto, ordines consequenter usq; ad summa faciemus. huiusmodi enim cognitio non parum ad medendi methodū confert. Conuenit porro præexercitātū esse in sensu gustus, & proprietatem unicuiusq; qualitatis saporum in memoria habere, uelut uerbi causa: Quum corpus

aliquod linguæ admotū uehementer siccet, & constringit, ipsamq; ad multā profunditatē exasperat, uelut pira syluestria immatura, & corna, ac similia: omne tale Acerbum nominatur, hoc est intense austereum. Quæcunq; uero in contactu linguæ, ipsam non constringunt, neq; cōtrahunt, uelut adstringentia solent, sed contrarium facere uidentur, extergere & eluere, talia omnia Salsa appellamus. Quæ autem his adhuc amplius extergent, simulq; moleste exasperant, Amara uocantur. Quæ uero mordēt & cum ualida caliditate erodunt, Acria. Quæ uero absq; caliditate mordent, Acida dicuntur. Habētq; præterea uim fermentandi terram si ad ipsam effundantur. Quæcunque autem uelut sublinunt & replent & sedant exasperatas & quasi erosas linguæ partes, ipsas cum manifesta iucunditate contingentia, Dulcia nominantur. si uero sine manifesta iucunditate id faciant, Pinguia appellantur. Si quidē igitur Acrimoniam manifeste percipere uelis, in allio & cepis ac similibus frequēter degustatis ac diu cōmanducatis discas, ita ut affectus ex his sensum diligenter memoriæ commendes. Si uero adstringēdi uim palam percipere uoles, in Galla & Rhoē ac similibus assequere. si Amaritudinem, nitri ac fellis gustu. si Dulcedinem, sapæ ac mellis. Præterea siue qualitatis expers, siue qualitate ad gustū mediū cognoscere uelis, aquam accipe, elusq; gustum diligenter in memoria retine, & maxime purissimæ aquæ, & nullam prædictarum qualitātū resipientis, neq; dulcedinem, neq; acrimoniam, neq; acorem, neque amaritudinem, insuperq; neque multum calidæ, neque nimium frigidæ. Inde enim progressus, promptus ad obscurorum saporum cognitionem peruenies, & eorum quos ego mediocriter dulces, alij a quosos uocare malunt, qualis est harundinum uiridū & graminis succus, itē tritici & ordeī, & aliorum multorum moderate dulcium. & qualis est aqua qualitatis penitus expers, inter caliditatem ac frigiditatem manifestam, mediam quantū eius fieri potest constitutionem habens, aut etiam paululum ad frigiditatem declinans. Quod si quid eiusmodi sapore præditum, non liquidam sed siccam compagem habeat, id ipsum necesse est terreum esse, & citra mordacitatem siccare. Nominantur autem talia Emplastica Græcis, hoc est meatus obducentia, uelut est amyllum, & plurima ex metallicis diligenter lota, pomphilyx, cerussa, Cadmia, terra Cismolia, Samius Aster, & similia. Quædā uero ex ipsis non solum terrea, sed etiam aquosa natura sunt, aliqua

etiam aërem non modicum intra se habent, uiscosa quidem hæc, & ob id meatus oblinētia. Duplex est enim medicamentorum meatus obducentium natura. Altera terrea exacte & sicca, altera uiscosa penitus, uerum mixta ex aqua & terra, & plerumque etiam aëre, uelut oleum dulce. At uero candidū ouī simile quidem quodāmodo est, uerum magis terreum quā oleum. Caseosum etiā in lacte meatus obducit, & pinguedo suis. Tauri equidem & hirci pinguedo siue adeps, acris & magis terrea quā suis pinguedo est. Anseris autē & galli calidior quidem & siccior quā suum est, sed tenuiū partiū, & nequaquā terrea. Itaq; pinguedines si non acrimoniam aliquam habent, meatus obducunt, & magis sicciores, & amplius terrea. Talis est & cera probe Iota. Et talia quidem sunt medicamenta Emplastica appellata. Quæ uero adstringūt terrea sunt, & crassarum partiū cōpagis suę mole, frigida autē qualitate. At uero Arida tenuiū partiū corporibus sunt, frigida autē similiter ut adstringētia. Quæcūq; autē in sapore terreas partes repræsentant, quę colliquatæ & contrahunt & resiccant humectiores sensiles linguę partes, siquidē asperiora sunt, Acerba dicuntur; minus uero aspera, Austera: & rectē taliū saporum tēperamentū Frigidū dicemus. Quādoquidē autem inæqualiter resiccant, hoc est enim exasperare, fuerint utique omnino etiam terrea. Omne enim aquosum æqualiter permeat corpora, & diuulsum rursus facile unitur. Terreum uero diuellitur quidem, non tamen facile rursus cōit. Et sanē si sensus proprietatem in utraq; affectione in memoriā reuocaueris, nōdem testimonium præbebis. Etenim Acidorum saporū transitus, uelox est in sensilibus partibus: Acerborum autem, tardus. Et Acida per profundum corporū actionem suam magis ostendūt, Acerba uero in superficie. Cæterum ubi experiri uoles sinceræ acerbitalis actionē, si quidem eadē res gustanti tibi apparuerit acerba simulq; mordens, hanc speciem me monente relinques, & acerbum absq; mordacitate requires, & quod neq; acidum, neq; dulce, neq; amarum est, sed quātum eius maxime fieri potest, nullam omnino qualitātē & uim adstrictioni permixtam habēs. Superuacuum enim & uanum est, tale pharmacū experiri. Incertū namq; est an ob adstrictionem, siue aliam quādam ei permixtam qualitatem, siue per utraq; circa corpus cui admotum est, efficax fuerit. Chalcitis igitur & misy, atramentū sutorium, & squama æris, sorī, & Armeniacum pictorium, argentū uiuum, & innumera alia adstringentia, simulq; mordētia, iuxta utraq; qualitates in singula corpora quibus adhibentur agunt. & tamen impossibile sit docere palam, num per adstrictionem, an per acrimoniam, urendi uim habeant. Nam si intra corpus sumatur talia crassarum partium existentia, & uiribus magis calida, & propterea temporis progressu in permutatione intra animalis corpus ignescentia, ad cādefacti igne lapidis aut ferri similitudinem exulcerant & urunt uētris partes, & neq; distribui in corpus possunt, ob grauitatem. Præstabilius igitur est plura alia consequenter degustare, ac diligenter cōsiderare sincerā adstrictionem seorsim per se, quantum eius fieri potest, atq; ubi talē repereris, iam tan-

dem ad iudicandum illud medicamentū iuxta prædictā methodum progredere. Velut si gustanti tibi balaustium, aut gallam, aut cytinum, aut hypocyttidem, aut acaciā, aut rhoēm, aut aliud quid eiusmodi, appareat exacte acerbum esse, ita ut palam sit nullam aliam qualitatem habere, in eiusmodi iam expendere ac explorare adstrictionis actionē oportet. Acerbum itaq; corpus terreum est & frigidum. Resoluetur autē necessario tripliciter, aut calefcens, aut humescens, aut utrumque simul perpetiens. Si igitur calefcet solū, non euadet neq; humidius, neq; mollius, sed durius existens dulcedinem acquireret: quemadmodū quercinæ glandes, & præsertim quę castaneæ nominantur. Si uero humescat solum, & humiditas crassarum partiū ac aquosa existat, austerum euadet. Nam acerbū exolutum, austerū producit saporem. Omnis enim saporis uim aquosa humiditas hebetat. Si uero humiditas tenuiū partiū & aërea accedat, Acidū reddetur. Frigiditas enim tenuiū partium existens, acidam qualitatem efficit. At uero si humescat simulq; calefcet, cū aquosa quidem humiditate, in dulcedinem transibit, cum aërea uero in pinguitudinem. Etenim arborum fructus qui natura iā facti dulces nobis apparent, acerbam primum & siccam compagem habent, singuli iuxta arboris suę naturā, progressu uero temporis fiunt quidem humidiores. uerum aliqui aciditatem insuper ad acerbitalitatem assumunt, quam paulatim deponentes, rursus dulces euadunt maturitatē adepti. Quidam neq; in arboribus, sed decerpti post tēpus aliquod dulcedinem acquirunt. Alij quidam neq; media interueniente aciditate, sed statim ab acerbitalitate in dulcedinem transeunt, quemadmodum oleæ fructus. Ceterum calore maturi fiunt omnes, qui duplex natura existit: Alter proprius & singularis à natura insitus: Alter forinsecus à sole allatus. Atqui si ab initio quidē acerbiores sunt, maturi autem dulces fiunt, ex caliditate utiq; dulcedo, ex frigiditate aciditas & acerbitas ipsis adest. Et sanē manifestum iam factū est, quod fructus ab initio acerbī existentes, progressu temporis partim dulcescūt, partim acescunt, partim austeri fiunt. Aliqui uero semper acerbī permanent. Quidam etiā redduntur pingues. Quin & iuxta dictarū qualitātū mixturas, multiplicem habent uarietatem. Acerbī itaq; in finem usq; permanēt, illicis, arbuti & corni fructus, & cōsimiles. quoniam frigidi & sicci, uelut ab initio erant, permanent, nullam aliā alterationem præterquam solius augmenti acquirentia. Acerbus autē simulq; dulcis est, myrti & piri syluestris & glandis fructus. Austerus tantum, uitis amineæ uua, & uinum, & quę his similia. Austerus simulq; dulcis, palmæ fructus, & uinum Surentinū, & quęcūq; dulcedinem adstrictione permixtam habent. Dulce autem solum est Theræum & Scybelites, & Sirēū, siue hepsēma quod nos sapam appellamus, & quęcūq; alia his similia. Pinguis uero exacte tum fructus, tum succus oleæ est: Imò etiam alij omnes ex quibus oleū paratur. Quemadmodum autem acerbus succus progressu tēporis dulcior primum, deinde etiam acrior & amarior euadit, & postremū penitus amarescit. Eodē modo etiā frigidus succus acidior statim fit, & si perfectē perfrigescat, citius

adhuc acescit: fructus quoque statim inter colligendum multa humiditate repleti, item qui alias aquam adsumpserunt, promptè ex leuissima occasione acidi fiunt. Si enim uua immatura acida est, matura uero dulcis, & maturum fieri fructibus omnibus ex solari caliditate contingit. Manifestum est imperfectiorem ac frigidiorē, acidum esse, perfectiorem uero & calidiorē, dulcem. Quum igitur uinum ex perfrigeratione acescat, conspicuum est quod ad eundem rursus redit saporē, ex quo prodit, uuae immaturae inquam. Distat tamen acetum ab uuae immaturae succo uiribus, in eo quod acetum acrimoniam quandā ex putredinosa caliditate adeptum est. Uuae autem immaturae succus non habet acquisitiuā caliditatē, & propterea neque acetū acridinem: Vnde etiam magis tenuium partium est acetū quam uuae immaturae succus, uelut sensus quoque testatur. At uero acrimonia acetū frigiditatem aciditatis euincere non potest, uerum ad penetrandi celeritatem ipsi inseruit. Quanto enim citius meatus penetrat calidum quam frigidum, tanto promptius acris sapor quam acidus sensilium corporum meatus pertransit, ut acris uelut praeuius iter struat, frigidus uero non ita longe post sequatur. Et propterea sanè sensus mixtus ac ægre explicabilis non permittit pronuntiare, Acetū simpliciter frigidum esse. Percipimus enim in ipso igneam quādam acrimoniam. Verum frigiditas ex sequenti aciditate destruit & exstinguit euestigiū acrimoniam, quare etiam multo maior sensus frigiditatis quam caliditatis nobis cōtingit. Porro quidam aestatis tempore poscam bibentes palam refrigerantur, & sine siti permanent. Quādoquidem uero sitis dupliciter fit, altera ex humiditatis inopia, altera caliditatis redundantia: eam quae ex siccitate oboritur non sanat acetum: eam uero quae ex caliditate oborta est, sanat. Humectare enim non potest acetū per se, sed non ingenerose perfrigerat. Igitur neque sitim ex sicca interperle, neque ex calida & sicca obortam, acetum potum unquam sanare potest. Si uero concurrant aliquādo simul humiditas cum caliditate, eiusmodi sanè sitis optima medela acetum erit, aliter sitiētibz, tum in febribz ardentibus alijsque omnibus adurentibus, tū in aestate ac calore uehementi, cōposita affectio est ex caliditate ac siccitate, ut merito cōpositam medelam requirant ex aceto & aqua: Acetū quidem ut non instrenue refrigeras, & partium tenuitate facile penetrans, Aqua uero ut quae supra id quod refrigerat, & humidissima omniū existat. Nihil enim humidius aqua. Cæterum in ardore prae cordiorum potior aceto est uuae immaturae succus forinsecus impositus, tum quod nullam habeat uolentā & offendentem frigiditatem, tum quod neque permixtam mordacem caliditatem. Qui enim ita affecti sunt, lenimento inuolento opus habent, quod forinsecus nullam mordacem acrimoniam inducat. Uuae itaque immaturae succus, non solū acidus est, sed etiam acerbus. Nam ut dictum est, omnes ferè arborū fructus circa primam generationem gustu acerbi sunt. Non autem acidum solum frigidum est, sed etiam acerbum ac austerū. Et si quis aliquādo gustauit mala cydonia, aut myrti baccas, aut mespila, is sanè manifestè nouit aliū esse sensum ab acidis in lingua nostra productum, alium ab acerbis aut austeris. Acerba enim intus protrudere particulā uidentur, quam ex omni

parte æqualiter contingunt, uelut exprimentia constringentiaque ac contrahentia. Austera uero in profundum subire uidentur, & asperum quendā ac inæqualem sensum inducere, ita ut resiccando omnem sensilium partiū humiditatem expellant. Quare alia est affectionum proprietas, non satis clare explicabilis, & in acerbis, & in austeris saporibus. Sed non puto tamen hominē esse qui non ex iam relatis incitatus intelligat quid dicam. Omne igitur corpus acerbum & ab alijs qualitatibus purum, omni experimento facto frigidum inueni. Omne autem dulce calidum est, & non immodice superexcellit caliditatē quae in nobis existit: Sed quemadmodū calidae aquae contactu delectamur, et maxime ubi fuimus frigefacti, donec corporis partes à frigore congelatae diffundantur, exalfacit enim nos, & neque dissoluens, neque scindens partium continuitatē, iucundissima est & utilissima. Sic etiā omne dulce edulium, calidum quidem omnino est, non tamen ad tantam caliditatem peruenit ut offendat, sed intra terminos diffundendi & æquandi demulcēdi ac molliēdi manet. Omnia enim alimenta his quae aluntur natura conuenientia & tota substantia familiaria existit. Statim autem oportet & moderate calida esse haec, iuxta corporum quae aluntur proportionem. Et propterea eduliorum ac medicamentorum non una species omnibus hominibus cōuenit. Vnusquisque enim iuxta propriam substantiam simulque affectionem, ab utrisque tum utilitatem, tum uoluptatē percipit. Verū quum haec ita habeant, Edulium sanè minus dulce, minus calidum est: magis dulce, tanto calidius est, quāto dulcius. Si uero modū caliditatis excedat, neque dulce tale est, sed iam amarum apparet, uelut mel inueteratū, & quod diutius coctum eorum est, & singula alia dulcia. Quae enim temperamentis corporum quae aluntur similia sunt, citra cocturam & preparationē, iam dulcia apparent. Quae uero dissimilia, omnia iniucunda sunt prius quam praeparentur. Opus est autem calida castigare frigiditate, frigida uero calfaciētiū condimētorum mixtura, & igne. Eodē modo per humiditatem emendantur quae terrea sunt & sicca, magis quam cōuenit. Siccitate uero quae plus humida & aquosa. Dulci igitur supra hoc quod calidum magis aut minus existit, necessariō etiam humidum magis aut minus est. Quod uero uelut superassatum amarum euadit, simile calci & cineri, siccū & calidum necessariō redditur. Et sanè ob id omnia amara extergere solēt, scindere dissecareque uiscosos ac crassos humores, quae admodum cinis & nitrum. Quod autem amarus sapor siccus ac terrei temperamentis est, tum ex eo quod ægerrime omnium amara putrescunt, tum quod nequaquā uermes & alia animalia gignant, qualia uidelicet in radicibus & herbis & fructibus putrescentibus innasci solēt, colligere datur. Nam in humidis corporibus maxime uermes & putredines gigni uidemus. Porro exacte Amara (uoco autem sic quae nulla alia sensibili qualitate participat) omnia ferme animalia, non homines modō, in cibis auersantur. propterea quod omne animal humidum magis aut minus existat, Amara autē sicca sint ad cineris ac calcis similitudinē. Quemadmodū igitur exacte quidem Dulce nutrit, exacte autem Amarum non alit: sic quod inter haec medium est nutrit quidē, sed minus quam dulce. Propinquus autem amaro est sapor sal-

sus, nam & terrei utriq; sunt & calidi, differunt tamē
 inter se non obscura differentia, quod amarus à cali-
 ditate & siccitate magis sit attenuatus & elaboratus
 ac quasi subactus. Sed & in salis generibus sic habet.
 Quæ enim dura sunt & densiora & magis terrea,
 qualia fere omnia fossilia existūt, minus calida ac te-
 nuīū partiū sunt. Quæ uero friabilia ac laxa, magis
 tenuium partiū & uiribus calidiora sunt, & aliqua
 ex ipsis subamara, mediū quodammodo obtinentia
 inter salē & spumā nītri. Et sanē quicquid salsum diu-
 tius calfeceris, statim amarum euadet. Atq; sic etiam
 Asphalticidis stagni aqua, quam mare mortuū appel-
 lāt, in cauo & calido loco cōtenta, & à sole exarsata,
 amara redditur: & ob id etiā æstate magis quā hyc-
 me amara existit, & si haustā eam in uase cauo ad so-
 lem exponas tēpore æstiuo, confestim magis amara
 seipsa facta tibi apparebit. Quare in illa aqua neque
 animal innasctur, neq; plāta. Sed & quum flumina
 magna multumq; piscosa in ipsam influant, & præ-
 sertim id quod prope Hierichuntē est, quod Iordanē
 appellāt, nullus piscis oras fluminū superegreditur:
 & si quis captos stagno immittat, statim corrumpi
 ipsos uidebit: & propterea stagnum mortuum, siue
 mare mortuū appellāt. Adeo exacte Amarū omni-
 bus plantis & animalibus inimicū est, squalidumq;
 ac siccum natura, uelut fuligo ex adustione factum.
 De Amarorum igitur saporum uiribus satis dixisse
 uidemur, dissectorios & extensorios ac attenuato-
 rios ipsos esse declarantes, atq; adeo calidos in tantū,
 ut nondū urant. Ad Acres tam sermonem conuerta-
 mus, eosq; primū calidos exacte esse dicamus, deinde
 erosiuos & ustorios, crustāq; inducētes, & colliqua-
 torios, forinsecus cuti impositos. si uero intra corpus
 assumantur, qui tota substantia quibuscūq; animalibus
 aduersantur, eos omnes putrefactorios esse, & infe-
 ctorios illorū animalium, uelut cantharis & bupre-
 stis hominis. Qui uero secundū solius caliditatis ex-
 cessum, si quidem crassiores sint & terrei, uelut auri-
 pigmentū & candaracha, ac similia, eos exulcerato-
 rios internarū partium pronūciamus, si uero tenuiū
 partiū sint, qualia familiaria nobis semina existunt,
 daucus uidelicet & anisum, ac similia, urinam ciētes
 & exudatorios, & simpliciter ac summam loquen-
 do, sectorios ac discussorios. Conferunt etiā quidam
 relectionibus ex thorace, & mēstruorum fluxioni-
 bus. Cæterum acres sapores, non solū fortī caliditate
 ab amaris differre uidētur, sed etiā in eo quod amarū
 omnes non modo calidi sunt, sed etiā sicci ad cineris
 similitudinē. At uero in acris, quicq; nō sunt ama-
 ri, multa aliquando permixta est humiditas, & pro-
 pterea nō pauca acris nobis in ciborū usum ueniūt.
 Quando uero tam & de saporibus, quæ dici par erat
 relata sunt, reliquū utiq; fuerit & de uaporibus dice-
 re. Pleriq; certe uapores similiter ut sapores nos affi-
 ciunt. Nam acida omnia ipsumq; etiā acētū, & olfa-
 ctum & gustum eodē modo excitant. Acris autem,
 uelut alliū & cepa & consimilia, non minus olfactū
 quā gustū stimulant & recitāt. Eodem modo & in
 singulis alijs, similis ferme odoratus ac gustus sensus
 est, adeo ut quorundā corporum quæ nunquā gusta-
 uimus, ueluti stercoreis, persuasum habeamus nō scire
 qualitātē. & ob id neq; omnino talium rerū gustū
 attentamus, quod olfactui ualde multū fidei habea-
 mus. Quin & odorata edulia quæ cōputrefacta mo-

lestum odorē nobis afferunt, statim abijcimus, ne tē-
 tato quidē gustu. Et ferme in omnibus mutuo cōspi-
 rant odoratus & gustus. Ad duas autē appellationes
 pleraq; odorabilia reducimur, odorata aut foetida no-
 minātes. Odorata quidē iuxta proportionē dulcium
 ad linguā, foetida uero non dulcium. Videtur porro
 de corporibus non odoratis aut omnino parū quid
 uaporis defluere, aut multo minus quā pro molis
 symmetria, uelut in salis & maxime acerbis. Crassa
 rum enim partiū & frigida est substantia acerborū,
 quare uerisimile est etiā quod defluit ab ipsis, modi-
 cū esse & crassum, & mole uelut terreū, ut neq; cere-
 brū sua respiratione petere possit. Quare nihil certi
 ex odore coniectare licet de ipsorū tēperamento, ue-
 lut ex gustu. Nam inodora crassarū partium substan-
 tiam habent, sed inde nō manifestū est, quārum calidi-
 tatis aut frigiditatis possideant. Odorata autē tenuiū
 partiū aliquo modo sunt & calida, quantitas tamen
 tenuitatis aut caliditatis, nō etiā ex odore indicatur,
 sed ex gustu. Quod uero nihil certi de temperamēto
 indicent odorata, in causa est inæqualitas substantiæ
 ipsorū. Et propterea in Rosa ex odore coniecturam
 facere non possumus de omnibus in ipsa qualitati-
 bus. In gustu uero omnes gustabiliū corporū partes
 æqualiter linguæ obueniūt, mouentq; singulæ sen-
 sum iuxta suam ipsarū naturā. nimirum Acerbū in
 ipsa, quod est terreum & crassarū partiū ac frigidū.
 item Amarū, quod tenuium partiū est ac frigidū. Et
 tertium insuper Aquosum, necessariō frigidū: ut nō
 sit certum, uelut dictum est, de simplicium pharmaco-
 rum uiribus omnibus ex odore cōiectare. Amplius
 uero nihilo magis ex coloribus conijcere possumus,
 de ipsē. In singulis enim coloribus inueniūtur et ca-
 lida & frigida, & sicca & humida. Possibile tamen
 est in singulis generibus aut seminū, aut radicū, aut
 succorum, etiā ex colore indicationē quandā sumere
 temperamenti. Velut uerbī causa, cæpa & scilla &
 uinum, quanto fuerint albiore, tātō minus sunt cali-
 da. subflaua uero & fulua, calidiora. Quin & triticū
 & cicera, & phaseoli, ac cicera. iridis quoque radix &
 asphodell, & multorū aliorum, simile quiddā perpe-
 tiūtur. In singulis enim generibus in uniuersum quæ
 fulua & ruffa & flaua sunt, calidiora albis existunt.
 Quare si quid etiā inde de medicamētorum uiribus
 coniectare licet, etiā hoc auctarium habes. Optimum
 quidē igitur, ut dictum, & sepe demonstratū est, sin-
 gulorū uires ab exacto experimēto inuenire. neq;
 enim in hoc falli potes. Priusquā tamen experimen-
 to uim cognoscas, gustus multum indicat, cui attesta-
 tur paululum etiā ipse odor. Horum autem omniū,
 quemadmodum etiam aliorum quorundā utilissi-
 morum, in summa cōpendium contrahā, postquam
 sanē speciatim quantū possibile fuit, uniuersales uir-
 tes & uniuscuiusq; actiones explicui. Quandoquidē
 uero medicamenta partim ex animalibus sunt, par-
 tim plantæ aut fructus, aut horum succi siue liquores
 existunt, partim uero ex metallicis sumuntur. Præsta-
 bilius mihi uisum est de plantis primū differere, non
 omnibus scilicet totius terrarū orbis, sed de quibus
 compertum per experientiam habemus inam & plu-
 rimum ipsarum genus prouenit, facultateq; potens-
 tissimum habetur (atq; id iuxta ordinem literarum
 Græcarū) Deinde consequenter etiam de metallicis
 dicere, atque sic ad animalium partes peruenire.

Abrotonum.

Abrotonum calida & sicca ut prædictum est, in tertio ordine & discessu à moderatis locatum, gustu multum amaro, qui sapor indicatus est terreæ substantiæ esse, & à largo calore attenuatus esse, ut non instrenue calfaciat & siccet. Quare coma huius herbarum una cum floribus in oleo coquitur, quo illito ante accessionem his qui rigore per circuitum repetente apprehenduntur, minus rigebunt. Eiusdem decoctum potum aut per elytherem infusum, lumbricos occidit amplius quam absinthium. Modica autem participat acerbitate abrotonum, & ob id stomacho incommodum est. Species habet duas, marem & foeminam.

Abrotonum ustum.

Abrotonum ustum calidum & siccum uiribus est, magis quam cucurbita sicca usta, & anethi radix: illa enim ulceribus humidis & sine inflammatione perfectis conveniunt, & propterea maxime ulceribus præputij pudendi apta videtur. Abrotoni autem usti cunctis omnibus ulceribus mordax est, quare alopecij confert, oleo cicino, aut raphanino, aut sicyonio, aut lentiscino, aut ueteri dilutus.

Agnos, Vitex.

Huius arbuti folia, flores & semine tertio ordine calida & sicca sunt, & multum tenuium partium. Fructus in cibo assumitur, calfacitque manifeste, simulque capitis dolorem infert. Frictus minus caput tentat, sed modicum alimentum corpori sufficit, atque id siccans ac calfaciens, minime uero flatuosum. Et propterea etiam impetus uenereos inhibet. Unde non solum in cibo ac potu acceptus ad castimoniam conferre creditus est, sed etiam substratus. Et ad hepar ac splenem indurata ac obturata, uicinis semen magis conuenit quam ruta.

Agrostis, Gramen.

Graminis radix moderate frigida est & sicca, & ob id cruenta uulnera glutinat, ipsa herba imposita cataplasmatibus uice non fortiter frigefact, uerum in medio humiditatis ac siccitatis consistit. Mordacitas & partium tenuitas in radice modica est, ut aliquando calculos conterere cognita sit decoctum eius bibentibus. Semen uulgo nascentis debile est: Parnasiacæ autem urinam det, et fluxiones uentris ac stomachi siccant: Estque uis ipsius siccatoria, tenuium partium, & subacriba.

Anchusæ quatuor.

Non eiusdem facultatis omnes Anchusæ existunt. Quæ enim Onoclea appellatur adstringentem simulque subamaram abunde radicem habet, ut etiam corpora densare, & moderate attenuare, extergereque ac abluere biliosos falsosque humores possit: atque sic & ictericis & splenicis ac nephreticis utilis existit. Frigefact etiam multum, unde cum polenta in cataplasmate imposita, erysipelatis medetur. Exterget autem non solum pota, sed etiam forinsecus imposita, & ob id uirilignes & lepras sanat cum aceto. Folia huius herbarum debiliora radice sunt, non tamen siccandi & adstringendi uis carent. unde & uentris profluuium sanant cum uino pota. At uero Lycopos appellata similiter erysipelatis conducit & radicem habet magis adstringentem quam onoclea. Onochilos autem quæ etiam Alcibiadium appellatur, uim habet magis medicatam, & morsus à uiperis multum conducit in cataplasmatibus imposita appensaque, & in cibo sumpta. Quarta parua est & fere sine nomine, consimilis Alcibiadio, uerum plus amara & magis medicata, & propterea ad lumbricos latos

apta, acetabuli mensura cum hyssopo & nasturdo pota.

Agaricum.

Agaricum uim habet calfactoriam & discussoriam & dissectoriam crassorum humorum, & obturationes in uisceribus repurgat, & ob id arquat morbum sanat, in his qui ex hepatis obturatione eum morbum contraxerunt. Prodest & comitiali morbo laborantibus, & rigoribus per circuitum repentibus, qui ex crasis & uiscosis humoribus sunt oborti. Prodest & commotis aut punctis à bestiis quarum frigidum uenenum existit, forinsecus ad locum affectum impositum, itemque potum hexagii pondere, hoc est drachmæ unus ex uino. Est & purgatorium.

Ageraton.

Ageraton facultatis est discussoris, & leniter quodammodo inflammationem arcentis.

Adianton.

Adianton siccant, attenuat, discutit. Nam & alopecias densat, & strumas & abscessus discutit, & calculos frangit in potu sumptum, & reiectionibus crassorum ac uiscosorum humorum ex pectore ac pulmone non parum confert, & fluxiones alui sistit. Medij temperamenti inter caliditatem & frigiditatem existit.

Aizoon, Semperuium.

Semperuium utrumque & paruum & magnum modice siccant, moderate item adstringit. Verum non moderate frigefact: est enim tertij ordinis frigefacientium, & propterea ad erysipelata ac herpetas, & inflammationes ex fluxionibus conducit.

Aegilops.

Aegilops discutendi uim habet. Itaque inflammationes induratas & ægilopas ac alopecias mirabiliter sanat.

Aera, Lolium.

Lolium calfacit & siccant efficaciter, ut propè ad acrum uim accedat, & magis quam iris: non est autem uelut illa tenuium partium, sed ab illa longè præuerditur, & propterea locauerit ipsam quis in principio tertij ordinis calfacientium, & in fine secundi siccantium.

Aegiros, Populus nigra.

Populi nigrae flores calida ut prædicti sunt, in tertio discessu à temperatis ordine. In differentia autem siccandi & humectandi paululum à temperatis ad siccantem populus secessit, & magis tenuium quam crassarum partium existit. Folia fere floribus simile uim habent, sed ad omnia debiliora & inefficaciora. Resina etiam similem floribus uim possidet, & est adhuc aliquanto calidior. Semen magis tenuium partium & siccatorium est, quam resina & flores: calidum autem non adeò ualide.

Acacia.

Acacia tertij ordinis siccantium est, & secundi frigefacientium, si quidem lota fuerit: illa enim primi est. Nam quum non sit similium partium, partes quasdam dispersas habet tenues & calidas, quæ ab ipsa per loturam decedunt.

Acalyphe, siue Cnide, Vrtica.

Vrticæ folia & semen multum discussoris facultatis habent, citra uehementem calfactionem. Sanant itaque panos & parotidas, & crassos ac uiscosos humores ex pectore ac pulmone educunt. Habent autem & flatuosum quiddam, ut etiam impetum ad Venerem excitent, & præsertim semen si cum passo bibatur. Alium subducit moderate, uelut extergendo ac titillando,

do, non purgando. Gangrænoſa item & cancroſa, & omnino quæ ſiccari opus eſt, abſque mordacitate conuenienter ſanat.

Acanthus, Melamphyllon, Pæderos.

Acanthus, quem alij *Melamphyllū*, alij *Pæderota* appellant, folia habet diſcuſſoria ui moderatè prædita. Radicem uero ſiccatoriam & tenuium partium.

Acantha leuce, Spina alba, Leucacantha.

Spina alba, quam aliqui *Leucacantham* uocant, radicem habet ſiccantè moderatè & adſtringentè. Quare & coeliacis & ſtomachicis prodeſt, & ſanguinis reſectionem cohibet, & tumores tæxos in cataplaſmate impoſita coërcet: Item dentium doloribus conducit, ſi quis decocto eius colluat. Semen tenuium partium & calidum eſt, unde in potu ſumptum conuulſis medetur.

Acantha Aegyptia, Spina Aegyptia.

Spina Aegyptia ex qua acacia præparatur, adſtringendi ac ſiccandi uim habet: quare & fluxui muliebri prodeſt, & ulcera ſedis inſufflata ad cicatricem perducit.

Acorum.

Acori radix tertij ordinis calfacientium ac ſiccantium eſt, & tenuium partium compagem habet. Ciet itaq; urinas, & ſplenes iuuat induratos. Succus eius deterget & depurgat craſſitudinem corniformis oculorum tunicæ.

Aconitum, Pardalianches.

Aconitum, ſiue *pardalianches*, ſimile quidem eſt ſecondi ſylueſtri, uerum putrefactoriam & uenenatam uim habet. Quare uitandum ne in cibo aut potu accipiaſtur. Attamen ad erodendum ac putrefaciendum externas corporis partes, aut circa ſedem utile eſt, & ad hanc rem commodior eſt radix eius. Dicitur herbæ ſuccus, pilorum exortum inhibere.

Acte, Sambucus, Ebulus, Chamaecte.

Sambucus magna & arborea, quæ *acte* appellatur. itemq; *humilis & herbacea*, quæ *Ebulus & Chamaecte*, ambæ ſiccantis facultatis ſunt, glutinatoriæq; ac moderate diſcuſſoriæ. Decoctum radicis in potu hydropicis prodeſt.

Halimon ſiue halmyrh.

Halimi fruticis germina quidā comedunt, & recondita aſſeruant. Vim habet lactis & ſeminis generatiuam. In ſapore ſaliſum quid & adſtringens habet, ex quo manifeſtum ſit diſſimilariū partium eſſe: plurima tamen eius ſubſtantiæ pars tēperatè calida exiſtit, cum humiditate imperfecta ac incocta, leniterq; flatuoſa. Radicis drachma una ex aqua mulſa pota, cōuulſa, rupta, ac tormina mitigat, & lac attrahit & auget.

Aloë.

Aloë tertij ordinis eſt medicamentorum ſiccantium, primi autem intenſi, aut ſecundi exoluti calfacientiū. In guſtu mediocriter adſtringit, et fortiter amareſcit. Subducit uentrè ex genere eorum medicamentorum exiſtens, quæ ſtercorū eductiua appellantur. Eſt autē medicamentum ſtomacho commodū ſi quod aliud, & ſinus glutinat. Sanat ulcera ægrè cicatricè recipiētia, maximè circa ſedē & pudenda, propter uim ſiccandi citra mordacitatem: prodeſt etiam inſtāmationibus earundem partiū aqua diluta, & uulnera glutinat, iuxta eundem modum. Simili modo conuenit & ad inſtāmationes in ore. & naribus atque oculis, & omnino repellere ac diſcutere ſolet, ſimulq; ex terget paululum, quantum ſanè puris ulceribus citra

offenſionem commodum exiſtit. Oculis propterea iugè humore madentibus, maximè puerorum, præter opinionem medetur. Debet autem craſſiore modo dilui, & oculorum angulis adhiberi.

Alyſſon.

Alyſſon alunt eſſe *Sideritim heracleum* appellatā, quæ iuxta uias naſcitur ubiq; purpureum florem habēs, & folia craſſiora. Nomen inuenit ex eo, quod com morſis à cane rabido mirabiliter ſuccurrit. Vim habet moderatè ſiccantem & diſcuſſoriam. Habet etiam quiddam exterſorium, quo uſtiligines & maculas faciei à ſole prouocatas depurgat.

Alſine.

Alſine ſiue *Auricula muris*, herbula ſimilè habet uim helxinę frigefaciētē ac humectantem. Eſt enim ſubſtancia eius aquoſa frigida, quare etiam citra adſtinctionem frigefacit. Ideoq; ad ſeruētes inſtāmationes conducit, & ad mediocria eryſipelata.

Amaracum.

Amaracum calfacit non ingeneroſe, ſiccatur autem non uehementer. Verum in caliditate eſt tertij ordinis, in ſiccando ſecundi.

Ambroſia.

Ambroſia pro cataplaſmate impoſita, uim habet adſtringentem & repulſoriam.

Ammium, Ammi.

Ammi ſemen maximè in uſum uenit, calfactoriæ & ſiccantis facultatis in tertio ordine. Eſt & tenuium partium, & ſapore ſubamarum ac acre, atque adeo urinam ciet, & diſcuſſorium eſt.

Amarantum.

Amarantum uim habet attenuandi ac diſſecandi. Quare menſes ducit coma eius ex uino pota. Grumos etiam ſanguinis liquare creditur, non in uentre modo, ſed & in ueſica, ſi cū uino mulſo bibatur. Omnes autem in uniuerſum fluxiones reſiccatur in potu accepta: uerum ſtomacho incommoda eſt.

Amurca.

Amurca ſecundi ordinis eſt calfacientium ac ſiccantium intenſi. Atq; hinc ſanè corporum tēperamento ſiccorum ulcera ſanat, reliquorum omnium exacerbat.

Ampelopraſon, Porrum ſylueſtre.

Ampelopraſon uim inter allium & porrum mediam obtinet. Stomacho magis incōmodat quàm ſatiuū. uiſcoſos quoq; humores amplius eo diſſecat, & organa obturata ab obſtuctione liberat. Quapropter etiam urinas & menſes ſæpe mouit, ubi uiſcoſorum & craſſorum humorum culpa fuerunt ſuppreſſa.

Ampelos leuce.

Ampelos leuce, quæ & *bryonia*, itemq; *psilothrū* appellatur, & Latinis *Vitis alba*, germina habet quæ recens producta omnibus familiarem cibum exhibent uerno tempore, tãquam edulium ſtomacho cōmodum propter uim adſtringendi. Habent autem ſubamaram & acrem leniter adſtinctionem, quare etiam urinam ciet. Radix uero exterſoria & ſiccatoria tenuiumq; partiū facultate prædita eſt, & moderatè calida. unde etiam lienes induratos eliquat, tū in potu accepta, tum forinſecus cum ficibus impoſita. Item ſcabiem & lepras ſanat. Vitis porro nigra, per omnia ei conſimilis eſt, ſed debilior.

Amygdala.

Amygdala amara attenuatoriam uim palam præ ſe ferunt, ut etiam maculas ſolares depurgent, & ad reiectiones

etiones ex pectore ac pulmone uiscosorum & crassorum humorum plurimum conferant. Sed & obstructione liberant ac depurgant hepar, splenem, colum, ac renes. Latrum item dolorem sedant. Arbor quoque uniuersa similem uim habet, ut eius etiam radices coctas, maculis solaribus in cataplasmatibus modum imponentes, eas depurgent. At uero dulcia amygdala amariora debilia sunt.

Ammoniacum.

Ammoniacum molliendis intense facultatis est, ut etiam articulorum callosas duritias dissoluat, & lenes induratos sanet, & strumas discutiat.

Amomum.

Amomum uiribus acoro simile est, preterquam quod siccior est acorum, magis autem concoctorium est amomum.

Anagallis.

Anagallis utraq; & quae caeruleum, & quae puniceum florem habet, absterforia uim abunde habet, & praeterea subcalida ac attractoria quippiam, quo etiam aculeos e corpore euellit. Succus ipsarum caput per nares purgat, ob eandem causam, & in summa fiocandi uim habent citra mordacitatem, unde & uulnera glutinant, & putrescentibus ulceribus auxiliantur.

Andrachne, Portulaca.

Portulaca in frigefaciendo tertij ordinis est, in humectando secundi. Modicam autem austeritatem complectitur, quapropter fluxiones repellit, maxime biliosas & calidas, earum qualitatem transmutans, alterans, & multum frigefaciens. Atque ea gratia etiam aestuosis febribus, ut si quid aliud commodat, super os uentris totaque praecordia imposita. Sed etsi probe teratur, adiecto quo crudo una cum uistello ac candido, amixtoque modico rosaceo, aceticque momento, euestigio non uulgarem lenitudinem inducit in ardentibus febribus, si corpus uniuersum inde illinatur, imò penitus exstinguit, ut neque amplius ulla exacerbatio contingat. Dentium quoque stuporis medela est. Succus eius similem uim habet, quare non solum forinsecus impositus, sed etiam in potu sumptus perfrigerat. Quod ipsum contingit etiam, si quis totam herbam in cibo sumat. At uero propter uim subastringendi, etiam dysentericis commodum edulium est, & fluxui muliebri & sanguinis refectioni: uerum ad haec omnia multo efficacior est ipsius herbae succus.

Anemone.

Anemonae omnes acris & extensoriae attractoriaeque ac uenarum oscula aperiendis facultatis sunt, unde radix quoque commansa pituitam prouocat, & succus ex naribus purgat, et cicatrices in oculis attenuat. Quin & sordida ulcera Anemonae purgant & lepras remouent, & appositae menses prolestant, & lac attrahunt & augent.

Anethum.

Anethum calfacit in tantum ut aut secundi ordinis intensius, aut tertij exolutius esse deprehendatur. Verum secundi ordinis principio est inter siccantia, aut primi fine. Si in oleo incoquatur, discussorium est, & dolores sedat, & somnum inuitat, & crudos ac incoctos tumores concoquit. Vsum tertium ordinem calfacendum ac siccantium obtinet, & propterea ulceribus humidis inspersum prodest, & maxime in pudendo. Nam in praeputio etiam inueterata ad cicatricem perducit. Porro uiride humidius est ac minus calidum,

utpote adhuc succulentum, quare magis concoctorium est ac somnificum quam siccum, minus autem discussorium.

Anthemis, Chamamelum.

Anthemis, quae & Chamamelum appellatur, calfacit ac siccant in primo ordine. Est autem tenuium partium, & propterea discussoria & rarefactiua ac laxatoria uis praedita: si quidem igitur fuerit uiridis, in oleo ipsam incoquere oportet, non praesente uidelicet oleo chamamelino, in quo maceratus flos insolarus est. Si uero sicca fuerit, modico aceto premadefacta, deinde in oleo cocta, comoda sit his in quibus nondum desint materia ad caput afferri. Nam ea quae iam adest, discutit, & alteram non attrahit, quae commoditas nulli alteri medicamento contigit. Necheption Aegyptius ipsum Chamamelum florē purum in summo uigore colligere iubet, & in mortario tundere, ac probe conterere, ac pastillos mediocres fingere, eosque in umbra diligentissime siccare ac reponere. Vsum autem reponere unum ex ipsis terere, oleo primario quod satis est affuso, indeque uniuersum corpus a capite usque ad pedes illinere, in omnibus febrilibus, ac egrum stragulis coopertum fouere: sudor enim inquit mouebitur bonus in his qui euasuri sunt, & a febre liberabuntur. Nam in plurimis experimento hoc cognitum est, & in peregrinationibus maxime congruum existit, ob circūferendi facilitatem. Praecipit etiam in potu pastillos exhibere febricitantibus fabae quantitate ex aqua calida.

Anisum.

Anisi semē maxime in usu est, acre & subamarum existens, ut propè accedat ad caliditatem uisteriorum. Est enim in tertio ordine calfaciendum ac siccantium: ob id & urinam ciet, & discussorium est, & inflationes circa uentrem sedat.

Aparine, Philanthrophos, Omphacocarpos.

Aparine, quam alij philanthropon, alij omphacocarpō uocant, moderate extergit ac siccant. Habet etiam quid tenuium partium.

Apios, Pirus.

Piri folia & ramuli austeri sunt, fructus dulcedinem quandam aquosam habet, ex quibus manifestum sic temperamentum inaequale iuxta partes existens. Quare propter in cibo quidem stomacho commodant, & sitim sedant: uerum in cataplasmatibus imposita pira, siccant & medioeriter frigefaciunt, ut uulnus per ipsa conglutinatum esse sciam.

Achrades, Pira syluestria.

Quae uero syluestria pira nominantur magis adstringunt & siccant, & ob id uulnera maiora glutinant, & in cataplasmatibus imposita fluxiones reprimunt, quae admodum in malorum tractatu absolutissime traduntur.

Aristolochia.

Aristolochiae radix ad medicinam commodissima est, amara & subacris existens. Rotunda ex his maxime omnium tenuium est partium, & ad omnia efficacior: ideo ubi crassus humor fortiter attenuandus est, rotundae usus expetitur, atque inde adeo dolores ex oburatione, aut crudorum crassitie obortos curat, & infixam extrahit, & putrefactionibus medetur, & sordida ulcera purgat, & dentes ac gingiua illustrat. Auxiliatur etiam anhelatoribus & singultuentibus comitialibusque morbis ac podagricis, ex aqua pura, ruptisque ac conuulsis medicamentum, ut si quod aliud, commodum est. Ex reliquis duabus clematidis odorator est, ut etiam unguentarii ea in ungenta assumant: uerum ad

medendum minus ualet. Longa autem Aristolochia minus tenuiū partium est quā rotunda, non tamen inefficax, sed extersoriā ac calidā uim habet, & ob id ulcera incarnat, & ad uterī fōtus cōmodior habetur.

Aracus.

Aracorum semē simile est cicerculis & usu & uiribus, uerum durius quā cicerculae, & propterea etiā ægrius concoqui potest.

Arceuthos, Iuniperus.

Iuniperus calida est & sicca tertiū ordinis in utroq; genere. Fructus eius calidus quidem similiter est, sed in primo ordine siccatur.

Arnoglossum, Plantago.

Arnoglossum frigefacit & siccatur in secundo ordine. Habet & austeri quippiā, quare fluxionibus & putrefactionibus ulceribusq; malignis conuenit, atq; ea gratia etiam ad dysenterias; nam sanguinis eruptionem compescit, & si quid perustum est frigefacit, & sinus glutinat. Est præterea etiam aliorum ulcerum recensium ac ueterum curatrix. Citra mordacitatē enim siccatur, & frigiditatem possidet nondum stupefacientem. Semen eius itemq; radix similem uim habent: uerum sicciorē & minus frigidam. Et semen quidem tenuissimarū partium est, radices uero crassiorum. Ipsa autē folia siccata, tenuiorum partiū uim, sed minus frigidam acquirunt. Propterea radicibus etiam ad dentium dolores utimur, tum commanducantes, tum decocto ipsarum colluentes. Ceterum ad hepatis ac renum obturamentā & radicibus, & folijs, & multo magis semine utimur.

Aron.

Ari radix primi ordinis calfacientium ac siccandum est. Habet & uim extersoriā, sed non adeo fortiter uelut draconion. Radices etiā in cibo acceptæ humorum crassidē moderatē dissecat, ut etiam ad reiectiones sputorum ex pectore commodet. Verum draconion in hos usus præstabilius est. Aliās præparatur ac editur eo quo draconion modo seruesacta.

Artemisia.

Artemisiz ambæ calfaciunt in secundo ordine, siccant autem uel in primo ordine intenso, uel secundi principio. Sunt autem moderatē quoq; tenuium partiū, quare ad renum lapides moderatē conueniunt, & ad uterī fōtus.

Afarum.

Afari radices in usu sunt, acori radicibus uiribus cōsimiles, uerū magis intensæ, quare ex his quæ de acoro diximus, etiā de afaro nouionem sumere oportet.

Aspalathus.

Aspalathus ex dissimilaribus uiribus constat, acris & adstringentibus. Et acris quidem partibus sulcalfacit, austeris uero frigefacit, utrisq; siccatur, & propterea ad putrefactiones & fluxiones utilis existit. Ad putrescentes in ore gingiuas in uino cocta utiliter colluitur.

Asparagus, siue Aspharagus iuxta Athenienses.

Asparagus petreus siue Myacanthus, extersoriā uim habet, nec tamen ualidē calfacit, nec frigefacit. Idcirco renes & iecur obstructione liberat, maximē radices herbæ ac semen. Et sane etiam dentium doloribus medetur siccando citra calfactionem.

Aster Atticus, Bubonium.

Aster Atticus, quem alij Bubonium appellant, quod non solum in cataplasmate impositus, sed etiam ad-

alligatus bubonas ac inguinum tumores sanare creditur. Habet etiam quid discussorium, ut mixtarum uirium sit, uelut rosa, sed bubonium non ita adstringit.

Astaphis, Vua passa, Carica.

Vua passa satua concoctoriā simulq; adstringentē & moderatē discussoriā uim habet: eadē enim est ratio uuarū passarum ad uuas, quæ est caricarū ad ficus. Et dulciores quidē calidiores sunt; Austeriores uero frigidiores, & adhuc magis acerbæ. Stomachum itaq; roborant austeræ, & aluū adstringunt, atq; his amplius etiam acerbæ. Medium uero statum inter has dulces tenent, neque palam exolūente stomachum, neq; aluum subducentes. Vim tamen contemperandi humores semper habent dulces, itemq; moderatē extergendi, unde paruos circa os uentriculi morsus obtundunt. Nam maiores morsus generosioribus morsibus opus habent. Præstant uuæ passæ pinguis- simæ & tenui cortice præditæ. Cæterum uuæ passæ minus quā caricæ aluū subducunt ac extergent: uerum stomacho commodiores quā caricæ existūt.

Astaphis agria.

Staphis agria ualde acrem uim habet, ut fortiter pituitam de capite trahat ac extergeat. Quare & ad scabiē confert. Et uistoria quadam ui participat.

Asphodelus.

Asphodeli radix in usu est, uelut ari, & afari, ac draconij. Vim habet extersoriā ac discussoriā. Vnde in uino albo uetere cocta, & uino calido meraco ciathi mensura hausto, menses suppressos celerrimē ciēt. Vitz cinis calidior & siccantior, magisq; tenuium partium ac discussorius euadit, & ob id etiam alopecias sanat.

Atractylis, Cnicus syluestris.

Atractylis, siue Cnicus syluestris, uel Androsæmon, ut alij uocant, ex spinosarum plantarū genere est, & siccantis ac moderatē calidæ facultatis existit.

Atraphaxis, Atriplex.

Atriplex secundi ordinis est humectantium, primi frigefaciendum, adstrictionis nihil habet, sed aquosa est uelut malua, & faciliē uentrem permeat. Hortensium genus humectius & frigidius syluestri est. Quapropter inflammationibus ac furunculis incipientibus & augescentibus hortenses, uigentibus & declinantibus syluestres commodiores sunt. Semen extersoriā uim habet, unde ad morbum regium ex iecoris obstructione obortum utile existit.

Absinthium.

Absinthium calidum est primo ordine, siccum tertio. Succus eius multo calidior quā herba est, participat & adstringendi ui non obscura, maximē Ponticum, quare extergit, roborat, siccatur, & propterea biliosos uentriculi humores ad infernam excretionem deducit, & per urinas euacuat. Magis autē biliosum intra uenas humorem per urinas expurgat. Idcirco ubi pituita in uentre continetur, nihil conducit. Sic etiam si eadem circa pectus aut pulmonem hæreat. Adstrictoria enim facultas in ipso fortior est quā amara. Quoniam uero acrimoniam quandam possidet, calidum amplius quā frigidum existit.

Balanos myrepfica, Glans unguentaria, Myrobalanum.

Glans unguentaria quæ myrepfica balanos, & myrobalanon appellatur, extersoriā & incisoriā uim habet.

habet cum aliqua adstrictione, & propterea extensoriam ac adstringentē contrahentemq; ac coactoriam habet actionem, quapropter & ad uaros & lentigines, maculasq; solares, pruritus, lepram, scabiem, achoras & manantia capitis ulcera, ulcerosascq; papularum eruptiones, & omnia crassi succi uitia conueniens est, maxime cum aceto. Cicatrices etiā illustrat. Facit quoq; ad hepar induratum in cataplasmate imposita, & lienē consumit, praesertim si farina aliqua siccatoria ipsi commisceatur, uelut est foliacea ac eruiua. At uero cortex ualde efficax est, ut eius usus ubi uehementi adstrictione opus est requiratur. Si uero quis carnis eius drachmam unam bibat cum aqua mulsa, facile uomet. Saepē & per inferna aluū largē subducit. Vnde si hepar aut splenem purgare uoluerimus per huius medicamenti usum, in posca ipsum exhibemus. Stomacho enim incommodat. Verum aceto gaudet tum forinsecus impositum, tum per os acceptum.

Balanos siue Glans quercina.

De quercina glande in quercus tractatu commode dicemus.

Balsamum.

Balsamum calfacit & siccatur secundo ordine, est & tenuium partium. Liquor eius adhuc magis tenuium partium uim habet, non tamen adeo calidus est, uelut quidā opinantur per partium subtilitatem decepti. Fructus eius consimilem iuxta genus facultatem obtinet, sed partium tenuitate ab illis prauegitur.

Balaustium, Cytinus.

Balaustium syluestris mali puniceae flos est, uelut satiuæ Cytinus, gustum autem fortiter adstringit, & sanē siccantis ac frigefacientis facultatis est: quare si intertriginibus ac alijs ulceribus ipsum aridum tenuissimè tritum insperferis, citissimè uidebis ipsa cicatricem recipere citra mordacitatem. Idcirco nō est medicus quispiam qui non hoc pharmaco & in his qui sanguinem reiectant, ac dysentericis, uentrisq; ac uteri fluxionibus utatur.

Batos, Rubus.

Rubi folia maxime tenera siueq; germina mediocriter adstringunt, ut commanfa oris ulcera cum alia, tum quæ aphthæ appellantur, curent. Imo & uulnera glutinant. Fructus maturus moderatam quandā caliditatem habet. Immaturus frigidam terreā substantiam possidet, & propterea acerbus & ualde siccatorius est. Siccatus autem reponi solet, & humido magis siccatorius euadit. Flos eandem uim quam fructus immaturus habet. Itaq; ad dysenterias & uentris fluxiones ac debilitatem, & sanguinis sputum commodus est. Radix supra uim adstringendi, etiam tenuium partium substantiam habet, quare renum lapides atterit.

Batrachion, Ranunculus.

Batrachion quatuor speciales differentias habet, omnes autē fortiter acrem uim possidet, ut cū dolore exulcerent. Quare si quis moderatē utatur, scabies ac lepras excoriant, ungues item leprosos remouent, & stigmata siue notas incussas discutiunt & uerrucas ac myrmecias ex earū gente dictas, auferunt. Quis & alopecij profunt modico tempore impositae. Nam si diutius sinantur, non solum excoriant, sed etiam crustam cui inurunt, atque hæc quidem folia uiridia unā cū cauliculis imposita faciunt. Radix

autem siccata sternutatorium est medicamentum, quomodo omnia alia fortiter siccantia. Sed & lentum dolores mitigat, simulq; ipsos confringit.

Bdellium.

Bdellium Scythicum appellatur quod et nigrius & resinosis est, mollientē abunde & efficacē uim habet. Alterum Arabicū, quod etiā pellucidius est, magis siccatur quā mollior. Vtuntur aliqui his, & maxime Arabico, ad ramices gutturis ac hernias aquosas, bronchocelas & hydrocelas Græci appellant, ieiunij hominis saliuā ad emplastri compagem redigētes. Arabicum etiā calculos renū atterere uidetur, urinasq; clere in potu acceptum. Sed & crudorum flatuum insultus, & laterum dolores, ac rupta sanat.

Blitum.

Blitum olus est cibarium, temperamento humidum ac frigidum in secundo ordine locatum.

Bulbus.

Bulbus comestus frigidioris & crassioris uiscosiorisq; humoris genitor est: nam & aegrē concoquitur, & inflat, ac uenerem stimulat. In cataplasmate impositus glutinat & siccatur. At uero qui uomitorius Bulbus dicitur, multo calidius temperamentū quā prædictus habet.

Buglossum.

Buglossum humidum & calidum temperamentum habet, unde uino iniectum læticiam facere potantibus uidetur. Conducit & rursientibus propter gutturis asperitatem, in aqua mulsa decoctum.

Bupthallon.

Bupthallon appellatur uidetur a floribus, qui figura oculi bouis similitudinem referunt. Nam colore chamæmeli floribus quā similibus existunt. Multo autē maiores ipsis sunt, & acriores, & propterea magis discussorij sunt, usque adeo ut etiam duritias sanent ad ceratum permixti.

Bunion, Arction, Pseudobunion.

Bunion quod quidā Arction appellant, calfactorij generis in tantum est, ut urinā cieat, & menses ducat. Sed & Pseudobunion similiter ipsi calidum est.

Brathy, Herba Sabina.

Herba Sabina calefacit & siccatur tertio ordine: est autē tenuium partium, & propterea discussoria, & mensium ductrix si quid aliud, & per urinas sanguinē trahit, & uiuētes foetus perimit, ac immortuos eiecit. Conuenit putrefactis maxime malignis & inueteratis. Nā quæ diu durauere citra molestiā pharmaci uim tolerat. Quin & denigrata ac ualde sordida, cū melle expurgat, & carbunculos destruit. Quidā etiam duplum ipsius pro cinamomo coniungunt.

Britannica.

Britannicæ folia adstringunt, & uulnera glutinant, suntq; similia folijs syluestris rumicis, præterquam quod nigriora & hirsutiora existunt. Succus foliorū similiter adstringit, quare quidā coctū ipsum reponunt, ut pharmacū ad putredines oris efficacissimū.

Bromus, Avena.

Bromos paulo frigidiorē temperamento præditus est, & adstrictionis nonnihil habet, ut etiā uentris profluuijs commoder.

Bryon Thalassion, Muscus marinus.

Muscus marinus adstringit et frigefacit, unde in cataplasmatibus uicem impositus, ea quæ calida sunt manifestè perfrigerat, ac iuuat.

Bryon

Bryon, Muscus arborum, Splanchnon, Hypnon.
Muscus arborum qui Bryon & Splanchnon ac Hypnon Græcis appellatur, adstringit & frigefacit moderate, ut propè ad temperata accedat. Quare & discutiendi ac emolliendi facultatis particeps est, maxime qui in cedrinis lignis reperitur.

Bryonia.

Dictum est de Bryonia, quum de uite alba nobis sermo esset,

Bubonium, siue Aster Atticus.

De Bubonio dictum est in secunde appellatiōis elemēto, *Gentiana.*

Gentianæ radix efficax est, ubi opus est attenuare & depurgare, extergereq; ac ab obstructionibus liberare,

Gigarta, Vinacea.

Vinacea sicca sunt in secundo ordine, frigida in primo. Acerba autem gustu sunt, proptereaq; fluxidus ventris affectionibus plurimum prosunt.

Gingidium.

Gingidium ut gustu amaritudinis & ad strictionis particeps est, ita temperamento caliditatis & frigiditatis. Iuxta utranq; autē qualitatem siccatorium est, imò etiam stomacho ualde commodum, ob adstrictionis non modice participationem. Euadit autē multo magis stomacho commodum, feruifacit & ex aceto comestum, Caliditatem itaq; non ualde manifestam obtinet, uerum in secundo ordine siccatur,

Glaucium.

Glaucium adstringit cum quadam iucunditate, sed & frigefacit manifestè, adeo ut erysipelata nō adeo fortia sanet,

Glechon, Pulegium.

Pulegium calfacit & attenuat uehementer, unde humoribus crassis ac viscosis ex pectore ac pulmone reiectandis facilem uiam facit. Menses ciet cum uino albo coctum, ita ut uinum ipsum meracum bibatur. Forinfecus cataplasmati modo impositum, tum ischiadicos, tum alios perfrigeratos rubificat.

Glaos, Sordes balnearum.

Sordes balnearum moderate emollic.

Glycyrrhizon, Radix dulcis.

Glycyrrhizæ fructus radicū succus maxime in usum uenit, dulcis existens cū modica quadā adstrictiōe, quapropter asperitates lenit nō solum arteriæ, sed etiā scabiosæ uesicæ. Quandoquidē uero omne dulce moderate, etiam humido temperamento prædictum est, pro eius sanè ratione, suū quoq; eximit.

Glycyfide, Pæonia, Pentorobos, Ephialtia.

Glycyfiden etiā pæoniā, & pentorobon, & ephialtiā nominant. Radix eius tenuiū partium & siccatoria ac mediocriter calida est: habet enim uim adstringentem leniter, cū aliqua dulcedine. Quod si quis eam diutius mandet, etiā acrimoniā subamarā percipiet, ideo sanè & menses mouet, magnitudine amygdali contusa cū aqua mulla pota. Expurgat quoq; iecur obturatum, lienemq; ac renes. Per adstrictionem autē fluxiones uentris sistit, in uino quopiā austero generis cocta, & uino pota. In summa resiccandi uim fortiter possidet, ut non improbauerim id quod à multis rationabiliter creditū est, eā uidelicet etiā ad alligatā puerorū morbum comitiale sanare. Aliquando enim puerulo octimestri comitiali apprehenso, magnā radicis recens partē de collo sus-

pēdimus, iussione facta ut perpetuò eā cōtineret appensam, & de cetero ex hoc facto puer pfectè sanus euasit, neq; amplius apprehensus aut conuulsus est.

Gnaphalium.

Gnaphalium adstringentis moderate facultatis est, & propterea dysentericis ipsum cum uino aliquo austero potandum exhibent.

Gongylis, Rapum.

Rapi semen ad re uenerē stimulos addit, flatuosi spiritus generatiuū existens, sic & radix ægrè concoctilis, & flatuosa, ac seminis gignitiua est, succū autē in corpus distribuit crassiorē. Quare si quis in nimio eius usu perduret, & maxime si ipsam nō probe in uentriculo concoquat, humorē crudum appellatum congregabit, si uero crudior in coctura maneat, ægrè cōcoctilis & flatuosa & stomacho incōmoda existit, quandoq; etiam morsus circa uentrē excitat: melior autē fit si bis coquatur, multa enim coctura opus habet. Porro ad uentris deiectionem neque conducit, neque officit.

Damasonium, Alisma.

Damasonium etiā Alisma appellatur. Eius radicem experti sumus coctā in aqua, & aqua pota, calculos in renibus consistentes ac coactos confringere.

Daucus, Pastinaca, Staphylinus.

Daucus quē & staphylinum ac pastinacam appellat, duorum generū est. Alter syluestris minus comestilis quā satius, uerū in omnibus uehementior. Satius autē in cibi usum aptus est, sed aliās imbecillior existit, facultatē habent acrem & calfactoriam, & propterea etiā attenuatoriam. Radix itaq; possidet etiam flatulentum quippiā, & ob id Veneris stimulatium. Semen satius quidē habet item aliquid in se uenerem stimulare, sed syluestris omnis flatu expers est, quare & urinam ciet, & menses mouet.

Daphne, Laurus.

Lauri arboris folia & fructus siccant & calfaciunt uehementer, & magis ipse fructus. Cortex radicis minus quidem acris & calidus est, magis uero amarus, & aliquid adstrictionis habens, ideo & lapides atterit, & hepaticis conducit. Bibitur in uino odorato pondere obolorum trium.

Dictamnus, Pseudodictamnus.

Dictamnus magis tenuium partium est quā pulegium, in cæteris ipsi cōsimile. Quod uero Pseudodictamnus dicitur, debilius est.

Dipsacos, Labrum Veneris.

Dipsaci radix secundi ordinis est siccantium. Habet etiam quid extersorium.

Dorycnion.

Dorycnium temperamento simile est papaueri & mandragoræ, & alijs eodem modo frigefacientibus. parum itaq; ex eo sumptū soporem inducit, amplius occidit.

Dolichi, Lobi, Smilax hortensis, Phaseoli.

Qui nūc ab omnibus Lobi nominantur, apud omnes ueteres dolichi & phaseoli appellabatur, & ab aliquibus smilax hortensis, nutriunt quidem non minus quā pisa, consimiliterq; flatu expertes sunt, uerum iucunditate & in alui deiectione illis cedunt. Appellantur autem Lobi, hoc est, siliquæ præ alijs præcipuè, quoniam ex omni siliquarū genere quæ indumento intectæ sunt, hæ solæ unæ cum siliquis siue tegumentis suis, ut plurimum comeduntur.

Dracon

Dracontion.

Dracontion acrius est quam Aron, & amarius, & magis caloricum ac tenuium partium. Habet autem quandam breuem adstringendi vim, cum acrimonia & amaritudine permixtam, ut uel inde efficacissimum pharmacum existat. Nam radix uiscera & omnes crassos ac uiscosos humores expurgat, & malignorum ulcerum optimum medicamentum est. Depurgatque ac extergit generose cum alia extersione indigentia, tum uilignes cum aceto, folia autem ulceribus & uulneribus recētibz conueniunt, quantoque minus fuerint sicca, tanto magis glutinant. Quae enim sicciora sunt, acriora quam uulneribus conueniat existunt. Creditur etiam caseum a putredine asseruare forinsecus ipsi circumpositum. Semē autem radice fortius, cācros & polypos cōsumere creditur. Succus seminis oculorum albugines deterit.

Drys, Quercus.

Vniuersae quercus partes adstringentis qualitatis particeps sunt. Amplius autem omnibus membranae quae sub cortice trunci reperitur, & quae sub cortice glandis super fructus carnem inducta est. Quare & ad fluxum muliebrē, sputaque sanguinis ac dysenterias & uentris fluxiones diuturnas, utilis esse creditur. Vruntur autem ipsa decocta. Vehementius adhuc adstringit phagus & illex. Caeterū folia ex omni quercus genere pro cataplasmate imposita, uulnera recētia glutinant, quēadmodum ego ruri expertus sum. Glandes quercinae comestae alimentum quidem abunde corpori suppeditat. Sed tardi transitus est id ipsum, & crassum ac aegre concoctile. Ex omni glandium genere optimae sunt Castaneae, quae & Lopiae appellantur. Solae enim ex syluestrium fructuum genere, memorabile alimentum corpori sufficiunt. Sunt tamen etiam ipsae capiti graues, utpote dolorem eius inducentes, sed multo magis his supradictae.

E. Ebiscus, Althaea.

Ebiscus malua syluestris, est discussoria, laxatoria, inflammationem arcens, mitigatoria & concoctoria crudorum panorum ac tuberculorum. Radix eius itemque semen, reliqua similiter faciunt uelut herba. Verum facultatem magis tenuium partium, ampliusque siccatariam & extersoriam ex se ostendunt, adeo ut etiam uirilignes deterant, & semen calculos renum confringat. Decoctum radice & ad dysenteriam & alui profluuium, & sanguinis reiectionem utile est, ut quae vim quandam adstringentem habet.

Ebenus.

Ebenus lignū est ex eorum numero quae in succū resoluuntur, vim habet calfactoriam, extersoriam, ac tenuium partium. Vnde & ea quae pupillis tenebras offundunt uitia, extergere creditur, & in alias oculares compositiones ammiscetur, quae uidelicet ad ulcera uetera, & fluxiones, ac pustulas conueniunt.

Elea, Olea.

Olea germina tantū frigiditatis, quantum adstrictionis habent: fructus exacte maturus moderate calidus est, immaturus adstringentior est, & frigidior. Oliuae drupae pinguem succum habent, & modicum alimentum corpori praebent. Colymbades uero muriae innatantes, adstringentem succum habent, & stomachum corroborant, appetentiamque cibi excitant, & ad hoc commodissime sunt quae cum aceto sunt

asseruatae. Ex his enim quae ex aequo salubria sunt, id quod iucundius est facilius concoquitur.

Eleon, Oleum.

Oleum ex oleae fructu expressum, quod etiam propriissime oleū appellatur, humectans & moderate calidum est. Tale est dulcissimum ex oliua maxime drupa factū, quale est sabinum. Est autem calidum moderate mediū temperamenti, & magis discussorium quam quod ex crudis oliuis expressum est, quod omotribes & omphacinū appellatur. Nam hoc tanto frigidius est, quanto plus adstrictionis habet. Oleum autem uetus, si quidem ex dulci oliua factum uetustate contraxit, calidius est & magis discussorium. Si uero ex cruda, quousque sanè aliquid adstrictionis seruauerit, mixtae facultatis existit. Vbi uero adstrictionem penitus abiecerit, alteri assimilatur. Lucernariū autem a medio ac temperato, dulci inquam, in tantū ad calidiorē qualitatem progreditur, quantum omphacinum ad frigidiorē. Vtimur omphacino, capite calidiorē facto. Dulci, sicciore facto & circūtenso. Lucernario, eodem frigefacto. Manifestum est autem quod omphacinum aliquando etiam frigidum adhibere oportet, reliqua semper calida. Atque hic quidē usus ad caput est. Caeterū si uniuersum corpus praeter naturam siccius reddatur, dulce oleum commodissime illinitur. Sed & si defatum sit ex adstrictione, aut frigiditate, aut mordacitate, aut acribus pharmacis, aut humore, aut etiam pruritu, idem oleum omnium aptissimum est, maxime cum exercitationibus aut etiam post exercitia. At uero stomacho & iecori inflammatis maxime congruit omphacinum irrigatum, ob adstringendi facultatem. Reliquis partibus dulce magis prodest.

Oleum Cicinum.

Oleum Cicinum in Aegypto paratur, ex ricini arboris semine, quod croton appellatur, sicut arbor ipsa cici, tuso & expresso, & oleo ex aqua calida electo. Est autem tenuium partium ac discussorium, uelut oleum uetus. Exterit uirilignes, maculas solares, lentigines, asiduo illitu. Consimile raphanino est, quo etiam uiri licet, cicino aut uetere non praesente.

Oleum seminis Lini.

Sed & ex lini semine oleū preparatur, quomodo praedictū est. Et usus eius iam est pro cicino. Nam cicino non nō amplius affertur, sed hoc pro ipso afferunt.

Oleum Raphaninum.

Raphaninum oleum in reliquis simile cicino est, uerum calidius.

Oleum Populi nigrae.

Oleum ex nigra populo in estate paratur, quum multa circa semen est resina. Sumunt itaque eius grana modiceque confringunt, & ad podere expensum inde trientem, olei dulcis sextarium immittunt, & ad dies quadraginta insolant, atque ita excolatum reponunt. Est hoc oleum calfactorium, tenuium partium, mollitorium, cum odore iucundo.

Oleum Amygdalinum.

Amygdalinum oleum ex amygdalis amaris fit, estque tenuium partium, & calidius dulci uno gradu. Conuenit maxime auribus a crasis flatibus obturatis, & ad auditus grauitatē, & sonitui ex frigiditate. Vermes quoque aurium enecat. Experiētia enim nos docuit ipsum auribus maxime prodesse, reliquarum partium

partium comparatione.

Oleum nucum.

Nucis oleum similiter ut amygdalinum preparatur, nucibus aut tuis & expressis, aut post contusionē in aquam feruentē coniectis. Commodū est in eosdē quoq; usus. Insuperq; hoc priuatim habet, quod inaurantibus aut inurentibus conducit: Siccat enim & ad mulcum tempus inaurationes ac inustiones continet & adseruat.

Oleum Myrobalaninum.

Oleum ex myrobalanis uim habet depurgandi maculas faciei, lentigines, uaros, & omnem nigredinem. Sed & aluum purgat, prodest & aurium dolori, & ad sonitus, cum adipe anserino instillatum. Præparatur ut amygdalinum, glande unguetaria molita.

Oleum Laurinum.

Laurinum ex bacca lauri fit, quo modo iam dictum est. At uero mixtum hoc modo præparatur. Ad sextarios quinq; oliuarum maturarum, baccarum lauri pinguium & recedum sextarium unum adiungimus, atq; ita omnia simul conteruntur ac exprimuntur, uelut oleum aliās ex oliuis solet. Calidū ualde est & mollitorium quod purum ex solis lauri baccis factum est, quare uehementē perfrigeratis quadam corporis parte conducit. Multum quoque siccat, & propterea scabrosis, & asperæ cuti, impetiginibusq; asperis, in balneo illitum medetur. fuggiendum est autem in impetigine inflammata, aut scabie inflammata, & in temperaturis calidis ac biliosis. Humidis autem & pituitosis conuenit, & omnibus articulis à frigore infestatis. Est & ischiadicis ex coxendicibus laborantibus commodum. Occidit uermes & pediculos tum feros, tum mansuetos, itemq; lendes ac surfures capitis, & ophiases ac alopecias. Vtus est in balneo ieiunis, ita ut postea cū ouo ac melle & foeni græci farina detergeatur. Cauendum ne capiti calido adhibeatur.

Oleum Sesaminum.

Sesaminum oleum ex sesāpo fit cōtrito & in aquam iniecto. Viribus non longe abest ab oleo dulci. Caliditatē enim moderatam habet, & saporē omnino leuiter adstringentem: aptum est cibis, nam & saporis iucūdi est, & facile concoquitur, & aluum subducit. forinsecus illitū uim obstructoriam meatuū habet, propter crassitudinem. Cæterum ad præparationem oleorum quæ odoris gratia fiunt, aptius est quàm oleum commune, propter durabilitatem, & quod non facile putrescat.

Oleum Lentiscinum.

Et hoc ex lentisci fructu præparatur eo quo in alijs dictum est modo. Paratur etiam uelut in laurino diximus, fructu lentisci oliuis permixto. Vtile est purū & immixtum ori ex fluxionibus infestato, & gingiuis inflāmatis, calidum in ore detētum, tum in balneo, tum citra balneum, repellit enim & roborat citra exasperationem. Mixtum autem magis mitigat, simulq; robur conferuat: Quare in iecoris ac stomachi foris ac rigationes commodē assumitur.

Oleum Oenanthinum.

Oenanthinum eadem efficacia est cum melino & rosaceo, præterquàm quòd aluum non mollit. Compositur hoc modo. Oenanthē, hoc est uitis syluestris fructum florentem, accipe odorem & marcescere

sine, ac in nouū uas unā cum omphacino oleo mitte, & ad dies xl. quotidie agita, ac excolato utere. Sic oenanthēs sextans, olei sextarius unus.

Oleum Melinum.

Melinum paratur ex malis cydonijs, sic etiam ex alijs malis, corium habentibus acerbius & odoratius, hoc modo. Adimitur pediculus ad exortum, & festuca ad fundum, & pars interior unā cum seminibus granis, deinde secantur mala unā, cum adhærēte cuticula. Nā in ipsa & odoris gratia, & adstringendū uis cōtinetur. fiunt autem parua frusta, quorū quadrans in olei omphacini sextarium inijcitur, & insolata ad dies xl. reponūtur. Vis melini olei magis ad frigiditatem nutat, non tamē ualde, propter mali uinositatem. Adstringit autem multū, uelut lentiscinum. Magis uero stomacho familiare est, propterea quòd ex duplici materia nutritiua componatur, olei uidelicet ac mali. Quare consequens est ipsum stomacho inflammato ac debili competere, irrigatum, & in epithematis impositum, ac potum. Commodius est rosaceo, propter mali familiaritatem. Nam stomacho robur addit, & insitos in uentriculo acris humores uehementius propellit. Inijcitur etiam per sedem, quibus cōlum & crassa intestina ab acri bile uexantur. Cauendus est eius usus in affectionibus frigidis. In his enim magis conuenit, si absinthium habuerit simul incoctum.

Oleum Rosaceum.

Rosaceum oleum sic præparatur. Accipitur floris rosarum rubrarum exunguium, & per diem ac noctem siccatarum quadrās, olei omphacini sextarius unus: Rosas iniectis, os uasis ocludere oportet, intrinsecus linteolo, forinsecus pellicula, propter imbres repētinos, & insolare ad dies xl. atq; ita excolato reponere, uasis super tabulas locatis in domo temperata. Quidam alia quædā rosas adiungunt. Verum optima est præparatio ex solis rosas & oleo constans. Alij non insolant, sed uas in puteum aquæ frigidæ ad dies xl. suspendunt. Conducit capiti calfacto ex sole, aut febris, aut alia quadam eiusmodi causa, humectat enim & mitigat, ac somnium inducit. Et in febris excalfactis uisceribus, conuenit ceratum ex ipso paratum, lotum ex frigida aqua, in æstate sæpe alterata, ita ut ceratum hoc uisceribus imponatur. Præparatur autem hoc modo. Accipitur ceræ uncia una, rosacei quadrans: Cera liquefit cum modico rosaceo in duplici uase, & in aquam diffunditur, & manibus emollitur per aquam eluta, mox rursus, ac tertio liquatur, diffunditur, aquaq; eluitur: Deinde reliquum rosacei additur, liquatur, tollitur, agitur, frige fit, & in mortarium inditur ac teritur, & aquæ quantum expedierit instillatur, mox sublatum medicamentum in frigidam subinde permutatam reponitur. Si uero pro aqua acetum instillaueris in mortario ad ceratum, optimum medicamentum efficies ad erysipelata, carbunculos & herpetas. Habetur etiam hoc ceratum Sermone quinto, capite nonagesimo primo. Quin & potum optimum rosaceum cū aqua calida aut frigida, magnam utilitatem de se præbet his quibus stomachus ex acri bile, aut lubricis, aut ascaridibus infestatur. Verum ad lumbricos maxime puerorum, melius facit sapæ permixtum & potum

potum, ita ut sapa ex uino coctura ad tertias redacta sit præparata. Celerrime enim ipsos expellit. Infunditur etiam colo uexato ex prædictis causis. Cauendus usus eius est his, qui non multam caliditatem habent. *hæc & quædam superfluis excrementis repleantur.*

Oleum Chamæmelinum.

Chamæmelinum oleum sic præparatur. Olei dulcis sextarius Italicus unus, florum chamæmeli diem unum præficcatorum sextans, in uas mittuntur, cuius osculum raro linteolo integitur, quo perspirationem habeat oleum, & sic per dies x. insolatur. Etenim si non perfletur ac transpiret chamæmelinum oleum, odorem garo similem acquirit. Post insolationem seruari ipsum oportet excolatum, uase locato in tabulis in domo temperata. Usus eius est ad caput mediocriter densatum ac dolens ex febribus non ualde ardentibus. Rarefacit enim meatus, & uapores discutit, ac acrimonias contemperat, & in summa magis mitigatorium est quam rosaceum, in febribus non ualde calidis.

Oleum Anethinum.

Anethinum ex anethi coma fit adhuc uiride, prius quam semetfolium reddatur & acre, inutile enim ad usum hunc fit floribus abiectis: Resecare autem mollia tantum germina, & unciae unius pondere expensa, ad sextarium Italicum unum olei dulcis inijcere oportet, & osculum uasis probe obturare, & diebus x. insolare. Calidius hoc est quam chamæmelinum. Itaque fatigatis in hyeme commode adhibetur, mollit enim & humectat. Utendum est eo & in febrientibus leniter à pituita, & omnino ægrotantibus ex causis frigidis, maxime circa tendines ac musculos conuenit.

Oleum Liliorum, Liliaceum, Susinum, Lirion.

Liliaceum siue Susinum, aut Lirion oleum, fit ex albis lili folijs exunguibus: & solum iniectis, citra ipsorum croceum filamentum, ad sextarium Italicum olei dulcissimi, pondere sextantis. Siccare autem etiã hæc oportet in umbra per diem ac noctem: Deinde uasi inijcere, & diligenter obturata insolare per triduum: Deinde excolare, & alium sextantem foliorum immittere, prioribus uidelicet uelut inutilibus electis. Ternis enim alterationibus folia inijcere expediat, quare ubi rursus per triduum insolaueris, rursusque excolaueris, tertium sextantem liliorum immittes, similiterque per triduum insolabis, & sic excolatum in umbra repones. Si quis enim mox à principio sexuncem foliorum immittat, putrefacta oleum foetidum reddent. Commodum est affectionibus mulieribus. Soluit enim duritias, & morsus ex acrimonia obtundit, & robur utero addit. In Susinis testimonium præbent ipsi, quod prægnantibus facilem partum faciat. Sed & alijs illitum, lassitudines eximit fatigatis, & mollientibus medicamentis adiectum molliorium est. Et in summa tepefactorium est, & mitigatorium ac rarefactorium, odoratumque, ac facile partum procurat.

Oleum Telinum, siue ex fœno græco.

Oleum telinum ex fœno græco uim habet mollificandi. Commodum est ad furfuris, & achoris ulcuscula capitis manantia, depurgat & maculas solares, & faciem dealbat ac extergit & innouat, prodest & ad ueteri duritias ac abscessus, & ægre parientibus opistulatur. Facit & ad sedis intestinorumque inflammationes,

Infusum soluit renalimos, facit & ad perisiones. Præparatur hoc modo. Fœni græci libræ quinq; olei sextarii octo, cyperi libræ duæ, calami odorati libra una, macerantur hæc in oleo ad dies septem ter quoti die agitata, deinde expressa ac excolata reponuntur.

Oleum Narcissinum.

Ex albis Narcissi floribus fit oleum Narcissinum, nocte ac diem præficcatis, ita ut sextans ex ipsis in sextarium unum Italicum olei dulcis conijciatur, & uas diligenter obturatum ad dies quatuor insoleatur. Oportet autem & hos alterare quemadmodum in lilio diximus, & reddetur oleum magis odoratum, præsertim si moderate insoleatur. Nam si diutius insolaueris Narcissinum, aut etiam liliaceum, uel uiolatum, aut aliud quoddam eorum quæ non fortem & permanentem odorem habet, inoderatum euadet. Vim habet Narcissinum calidiorem anethino. Quare ad eandem conduit in reliquo corpore, capite excepto. Acris enim est Narcissini fragrantia.

Oleum Violatum.

Violatum oleum præparatur ex purpureis uiolæ floribus, itemque ex albis, quadrante ex ipsis in olei sextarium Italicum dulcissimi colecto, ac tertium alterato, uelut in lilio prædictum est. Vis eius paulo calidior est quam rosacei. Quare si quis æstate fatigatus & insolatus rosaceo careat, uiolaceo uti potest, maxime ex purpureis floribus præparato, ita ut in balneo ex eo illinatur. Nam supra hoc quod lassitudinem medetur, etiam squalorem ac situm animi, odore suo in mansuetudinem ac uoluptatem transmutat, & somnum imperturbatum inducit.

Lasmineum.

Oleum apud Persas lasine appellatum præparatur hoc modo. Candidorum nimirum uiolæ florum sextante in Italicum sextarium unum olei sesamini iniecto, ac alterato quemadmodum in lilio dictum est. Usus eius in epulationibus apud Persas odoris gratia receptus est. Conduit uniuerso corpori à balneis, in corporibus calore ac laxitate indigentibus. Grauiorem autem odorem habet, ut multi non libenter ipsum tolerant.

Oleum Myrteum.

Fit & hoc folijs myrti uiridibus pondere sextantis, in olei omphacini sextarium Italicum unum iniectis, addita uini odorati adstringentis quarta sextarii parte. Coquantur hæc ad lentam prunam, donec folia arescant ac confringantur, & uinum consumatur. Deinde oleum purum excolatur, & uitreo uase excipitur, ac reponitur. Adstringit & frigefacit hoc oleum, amplius quam lentiscinum ac melinum, & propterea irrigationibus stomachi & hepatis non competit, sed neque alia uiscera benigne tractat. Experientia plurima usum eius reperit in ceratis ac emplastris, per quæ densare ac repellendo adstringere oportet. Commodat allabentibus fluxionibus, & humectis ulceribus cicatricem inducit. Cohibet pilos capitis mulierum, & est odoratum.

Oleum Mastichinum.

Mastichinum oleum fit, mastiches uncia una, in olei ualde acerbis sextarium unum immissa. Coquitur autem in duplici uase. Calidum est moderate, & densandi ac obstruendi meatus uel præditum, si quidem partibus moderate firmari adstringitque ac cal fieri indigentibus adhibeatur.

Oleum Styracinum.

Styracinum præparatur sic: Olei dulcis optimi sextarius

id est oil of

id est oil of

rius unus, styracis pinguis sextans, coquuntur in duplici uase, donec styrax uim suam in oleū deponat. Paulo calidius hoc est quam anethinum. Verum ualde mollitoriu, & propterea corpora indurata prædare attenuat & emollit.

Oleum Sicyonium.

Sicyonium oleū sic præparatur. Olei dulcis sextarii decem, foenigræci sextarius unus, libanotidis quadrans, polij quadrans, sampsuchi quadrans, tædarū triens, aristolochiæ libra una, meliloti semissis, cucumeris syluestris radicis libræ duæ, aquæ quod satis est. Coquantur hæc uelut oportet, & excolata in usum uerantur.

Oleum Metopium.

In Aegypto præparatur oleum Metopium appellatū, propter galbani lignum, fit ex oleo omphacino & amygdalis amaris, cardamomo, iunco rotundo odorato, melle, uino, calamo odorato, carpobalsamo, galbano, & resina. Est calfactorium: Venarum oscula aperit, attrahit, & purgat ulcera, facit ad musculos ac neruos cōcisos, facit ad hernias aquosas, & in summa uim mollitoriam habet.

Oleum Mendesium.

Mendesium oleum maxime emollit, & corpora laxat, & pus facit. Componitur ex oleo myrobalano, & myrrha, casia & ac resina. Quidam spissandi gratia etiam cinamomum inspergunt.

Oleum Megaleum.

Quod Megaleum oleum appellatur, quondam præparabatur, nunc autem in usu non est, præparatur similiter ut amaracnum, nisi quod resinam recipit, & ad eadem efficax est.

Oleum Amaracinum.

Amaracnum oleū sic præparatur, herbæ sabina, ligni balsami, calami aromatici, floris iunci odorati, nardi celticæ, costi, singulorum libras v. amomi, casia, carpobalsami singulorum lib. i. i. myrrhæ lib. i. Vini odorati sextarios v. Coquito uelut Nardinū. Vis eius calfactoria sicut nardini, non autē adeo corroborat, uerum magis tenuiū partium est magisq; mitigatorium ac lenē, propterea quod opobalsamum non recipit. Mulieribus in uteri sinu iniectū menses ducit. Estq; omnino calidū, emollit, ac aperit ora uenarum. Commodat fistulis, & ramici aquoso post chirurgiam, facit ad crustas & ulcera efferata, facit ad urinæ difficultatem circumlitū sedi, facit ad uteri inflammationes ac duritias, & hæmorrhoidum oscula aperit.

Oleum Cyprinum.

Cyprinum oleum recipit olei sextar. x v. cyperi, helenij, iridis, singulorum libram unā, sampsuchi, hyssopi utriusq; quadrantē, seminis uiticis quadrantem, saluiae quadrantē, floris cypri siue ligustri libram unā. Et hoc duabus cocturis coquitur. Nam reliquæ omnes species uino odorato rigatæ pridie, postea oleo infarctæ coquuntur ad horas sex, sequenti die oleum excolatur, & affusa aqua pura tertia olei parte, flos cypri inijciatur, unā cū tenerioribus ramulis non cōtusis, si uero siccus sit, contusis, atq; ita coquitur hora una. Calfacit cyprinū non instrenuē, estq; tenuiū partium, & ad uteros amplius perfrigeratos ualde commodum. Nam crassos in ipsis humores attenuat. Cæterum ubi copia fuerit herbarū uiridum, cyprinum sic præparatur. Nimirum ex olei sextariis x v. cyperi, helenij, iridis, singulorum semisse. sampsuchi, hyssopi,

saluiae, singulorum sextante. uiticis foliorum uiridum sextante. citri foliorū uiridium quincunce. chamælibani uiridis triente. lauri foliorum uiridium quincunce, cypri florū dextate, opobalsami semisse.

Oleum Irinum.

Irinum oleum recipit iridis, aspalathi, cyperi, helenij, singulorum lib. v. opopanacis semissem, quidā uero quadrantē, anchusæ sextantem. Olei sextarios x x x. aquæ sextarios x v. Cōtunduntur omnia crassius, & macerantur biduo, deinde coquuntur horis sex, deinde inijciatur opopanax uino præmaceratus ac tritus. Aliquando ad prædicta additur floris iunci odorati semissis, casia quadrans, ligni balsami, nardi celticæ utriusq; semissis. Vis huius calfactoria est, sed non acris, propterea perfrigeratis partibus commodat roborandiq; ac molliendi uim quandam possidet.

Oleum Nardinum Cyzicenum.

Nardinum Cyzicenum quod in Alexandria præparatur, ualde commodum est, & recipit olei acerbi sextar. x i. Italicos, aspalathi, cyperi, iridis Illyricæ. Seminis cardamomi, aristolochiæ, casia lignæ, singulorum sexticem, helenij, ligni balsami, floris iunci odorati, casia, costi, singulorum semissem. amomi, folij malabathri, spicæ nardi, styracis, carpobalsami, singulorum quadrantē. opobalsami quadrantē. herbæ sabinae unciam unā. Præparatur hoc modo. Aspalathus, cyperus, helenium, xylobalsamum, iridē, aristolochiam, decorticato & crassius cōtundito, ac triduo aqua calida macerato. Deinde affuso oleo coquito assidue agitando, & aquā paulatim instillando, prout prior consumitur, & ubi tres aut plures coxeris horas, coniecta iam cocta pernoctare finito. Sequenti die extractis his quæ cocta sunt, & aqua ab oleo separata, rursus coquito alia aqua pura, ac modico uino affuso, et ubi ebullierint primum cardamomū adijcito, deinde florem iunci odorati, & casiam ligneam contusa, coquitoq; ad horas duas, ac rursus pernoctare finito. Tertia die similiter extractis his, & alia aqua rursus addita coquito, & quum efferbuerint, casia, costum & reliqua singula seorsim cōtusa ac trita, seorsim inspergito, postremum autem spicam nardi, & folium malabathri, & styracem, in tenuissimas partes cōminutum, & ubi eliquatus fuerit, statim ab igne tollito & opobalsamū addito, diligenterq; agitato, & operculo imposito ac probe uelatū ad biduū finito, atq; ita conchula excipito. Porro Secundarium sic præparatur. His quæ ex tertia coctura superfuerint, olei sextar. v i. adijcito, & duabus horis ebullire finito, deinde casia tenuissimè trita sextantē. nardi celticæ sextantē. herbæ sabinae drach. i. i. i. styracis unciam unam. opobalsami sextantem addito. Nardinū uim habet calfactoriam, roboratoriam, ac mitigatoriam. Quare stomacho perfrigerato, & inualido, item uentriculo atq; icori eodem modo affectis commodissimum est. Infunditur per sedem quoq; in intestinis perfrigeratis. Item in uteros muliebres. Vsus est omnino præstantis & eximij.

Præcoctura Nardini.

Vini ueteris lib. x v. foliorum dendrolibani lib. i. rasdi lib. i. i. i. calamocriini lib. i. i. i. brullocyperij. lib. i. i. i. Hæc omnia in præcocturā mitte, ferueant horis x i. & ubi euacuata fuerint in uas purū, & cacabus per spongiam deterfus, rursus infundis uini lib. x v. & illud oleum desuper.

Nardinū

Nardini præparatio alia.

Nardinum quod in Ecclesia præparatur. Tachis librā, cinamomi librā, caryophyllorum librā, amomi librā, florum iunci odorati librā, calami aromatici librā, ligni aloës librā, nucum myristicarū librā, cachrii librā, xantocaryorum, hoc est, nucum flauarum librā, maceris librā, galangæ librā, balsami librā, carpobalsami librā, xylobalsami librā, myrobalani librā, folij indicis librā, casia librā, ligni caryophylli librā, piperis longi librā, piperis albi librā, piperis communis librā, laseris chaldaici librā, nardi celticæ librā, thymiamatis librā, myrrhæ troglodyticæ librā, costi librā, musci librā, ambræ librā, gomphiti librā, ladanī librā, cerebindinæ librā, uini odorati quod satis est.

Nardini alia præparatio.

In præcoctura uini ueteris lib. xv. foliorum dendrobani librā i. foliorū myrti lib. i. rasdi lib. i. i. calamocrini lib. i. i. brullocyperī lib. i. i. i. Hæc omnia in præcocturā mitte ut ebulliant horis xii. & ubi euacuata fuerint in uas purū, & cacabus per spongiā deterfus, rursus infundis uini li. xv. & oleū illud desuper. Sit autē intrita siue intrimentū, cinamomi lib. i. i. galangæ semissis, caryophyllorū triēs, spicæ quadrans, nucū flauarū quadrans, ladanī puri quadrans, cerebindinæ uncia xvi. xyloaloës sextans, costi triens, laseris bucellarij libræ quatuor, thymiamatis regij quadrans. Hæc contusa & cribrata ac cum oleo præcocturæ unita coquito iuxta experimentum, ut neque comburantur, neque rursus defectuosa coctura fiat.

Alia Nardini præparatio, Ioe Vngentarij.

Olei sextar. xii. aspalathi lib. i. i. i. xylobalsami lib. i. i. costi quadrantem, casia lignæ trientem, carpobalsami semissem, amomi trientem, styracis calamitæ sextantem, opobalsami sextantem.

Alia præparatio Nardini, Ioe Vngentarij.

Costi sextantē. foliorū indicorum trientē. casia semissem. myrrhæ semissem. ligni caryophylli semissem. carpobalsami trientē. spicæ nardi trientē. calami aromatici unciam unā. iridis sextantē. styracis pinguis dodrantem. croci drach. i. i. i. olei sextarios vi.

Oleum Salcæ.

Olei Salcæ præparatio quā in Alexādrīa parauit, optima est, & recipit, Aspalathi semissem. xylobalsami dodrantē. cyperi trientē. helenij, iridis utriusq; semissem. calami aromatici uncias xvi. floris iunci odorati sextantem & uncia dimidium. styracis pinguis sextantē. nuces Indicas duas. folij uncias xvi. spicæ nardi unciam unā. caryophylli, arnabo, utriusq; sesquunciam. amomi quadrantē. casia sextantem, costi unciam unā. myrrhæ unciam unā. hypni, xylocasiae utriusq; quadrantē. Olei sextar. x. Coquitur modo relato in nardino, ita ut in prima coctura inijciatur xylobalsamū, iris, cyperus, helenium, xylocasia decorticata & crassius cōtusa, & aqua ad bīdium aut triduum macerata. In secunda autem coctura inijciatur calamus, flos iunci odorati, hypnon, prærigata uino ueteri odorato. In tertia reliqua: sit & secundariū hoc modo. His quæ à tertia coctura superfuerūt adijciuntur olei sextarij sex, & quantum satis est coquuntur. Deinde inijciuntur myrrhæ stactæ bonæ albæ quadrans. Siromatis, hoc est, aquæ opobalsami semissis. mastiches semissis. styracis boni uncia una. Vtuntur

oleo Salcæ mulieres caput ex eo ungentes. Est autem relata præparatio longe optima.

Foliati siue malabathrini præparatio optima.

Foliatum oleum recipit aspalathi uncias xviii. ligni balsami lib. i. i. cyperi lib. v. helenij lib. v. foliorū malabathri trientem. amomi semissem. xylocasiae trientem. myrrhæ trientem. costi dodrantem. styracis primarij lib. i. cassia siue carpobalsami semissem. calami aromatici lib. v. spicæ nardi sextantē. caryophylli trientē. Siromatis quæ est aquosa sex ac residentia opobalsami semissem. arnabo semissem. cardamomi semissem. iridis librā unā. Olei sextarios xx. Vini odorati quod satis est. Coquitur uelut Nardinum.

Vngenta odorata quibus commodent.

Vngenta odorata frigidioribus capitibus magis conueniunt, quā moderatē calidis, atq; illis hyeme. Nā calidioribus nō sunt apta. Si uero quis odoris gratia talibus uti uelit, rosacei parē modum ammiscet. sic enim par pari ammixtum non amplius nociuū est. Quandoquidem uero multæ mulieres tam calida capita habent, ut nullum calidū oleum perferre queāt, his consultum est solo omphacino uti, quandoq; uero etiā rosaceo. Quædam uero ex ipsis omnino non utuntur oleo, propterea quod capita ipsarum cito humectentur, & destillationibus obnoxie fiant, quas sanē ad unguentorum illitionem cogere non oportet. Nam hæc siccatione capitum opus habent, per commodas puluisculorum aridorum insersiones, non humectatione per illitionem oleorum.

Olei suffumigabilis præparatio.

Oleum quod suffumigabile appellatur sic præparatur. Vngulum aromaticorū magnorum quincuncē. thuris masculi, styracis primarij, bdellij puri, costi, singulorum quincuncem, olei boni dulcis sextar. v. hypni quod satis est. Costū in crassas partes secato, similiterq; styracē ac bdellium, deinde simul permixta in uas nouū testaceum ansis carens immittito, & osculū eius hypno integito, ac forinsecus ad hypnū aspalathi ligna, aut aliquid alterius odoratorū generis succulos addito ac obturato, ut nihil ex uasē excidere queat. Deinde aliud testaceū uas ansis carens, & longi colli osculū habens accipito, ita ut osculo eius congruat quod prædictas species in se continet, & in ipsum olei dulcis sextarios v. mittito, & effossa terra uas quod oleum habet usq; ad collum obruito, ut ne ignescat. mox alterū uas in caput resupinatu osculo eius quod oleū continet adaptabis, forinsecusq; totū circūcirca luto oblines, similiterq; oscula utriusq; compactata, & sicca resines, sequenti die carbones multos circūpones, integesq; ex ipsis undiquaq; totum uas, ignemq; accendes ac uentilabis. Ignem autem accensum marcescere ac extinguī sinito, ut paulatim cadescente per osculum uasis species oleum suppositum ipsis suffumigent, qua gratia suffumigabile appellatur. Deinde postera die aperito, oleumq; tollito ac seruatō in uitreo uasē, ac utitor. Hoc utuntur mulieres quibus menses retinentur, illinentes ex eo pectinem & lumbos. Conuenit etiā his quæ nō pro ratione in partu purgantur similiter illitum. Vtile est etiā perfrigeratum pectus habentibus, & tenasmiis infestantibus prodest, calidum lana conuoluta exceptum, & pectini ac lumbis impositum.

De ungentis reliquis.

Ex his iam facile est etiam de alijs oleis iudicare, quæ
b Vngen

Vngentorum quoque cognominationem habent. Etenim iuxta naturam eorum quæ iniiciuntur, oleū alterabitur, quorum singulorum uim in hoc sermone deinceps condiscas. Cæterum de reliquis remittentibus ac laxantibus unguentis, in sermone de medicamentorum compositione, post auxilia articularia dicetur, uelut est gleucinum & consimilia.

Elaphoboscon.

Elaphoboscon calidam & tenulum partiū uim habet, ideoq; secundo ordine siccatur. Conuenit ad uenenatarum bestiarum plagas, & in potu, & in cibo.

Elenium siue Helenium.

Helenij radix maxime in usu est. Dici potest calida & sicca, non tamen exacte uelut piper, sed cū humiditate superflua, & propterea in linctus ac eclegmata, ad crassos & uiscosos humores ex pectore ac pulmone educendos, commodè miscetur.

Eleliphacos, Saluia.

Saluia calfactoriā uim euidenter habet, & leniter subadstringentē. Quidam narrant sufficā super prunas, menses immodicè fluidos mulieribus sistere, itemq; muliebrem fluxum. Agrippa autē inquit, saluiā herbam sacrā leænæ prægnantes uorant. Nam uitalem conceptū continet. Quare si succi eius heminam unā cū modico sale mulier bibat, quarta à puerperij purgamentis die, & uiro condormiat, infallibiliter concipiet. Alii cum in Copto Aegypti pestis grassaretur, eos qui superfuerunt in ea regione coëgisse mulieres & uxores suas, ad huius succi potentem adeo usum, & ad plurimā sobolem peruenisse. Orpheus autē inquit, Sanguinem spuentibus succi saluiæ cyathos duos cum mellis uncia una dato, ieiunis in potu, & statim sistetur. Verum phthisicis ac tabidis ait, catapotia præpara hoc modo: Spicæ nardi drach. ii. seminis saluiæ tosti tusti ac cribrati drach. xiiii. piperris drach. xii. excipe succo saluiæ, & redige in catapotia, ac exhibe drachmam unā mane ieiunis, itemq; in uesperam, & aquam puram insuper bibendam.

Elleborus, Veratrum.

Veratrum album & nigrum extensoriæ ac calidæ facultatis sunt, quapropter & ad utiligines & impetigines psorasq; ac lepras conueniunt. Et sane ulrga etiā nigri in fistulā immissa callosam, in duobus aut tribus diebus callum consumit. Ponantur autem in tertio ordine calfacientium ac siccantium, purgat nigrū humorem atræ bilis, magisq; per uentrem infernē. Album uero per eundem supernē, crassos ac uiscosos humores per uomitum expurgās, mouet autem & uentrem infernē.

Elxine, Muralium, Parthenium, Perdicium.

Hanc aliqui parthenium, alij perdicium, alij muralium siue herbā muralem appellant. uis eius est extensoria, & leniter adstringens cum subfrigida humiditate, unde omnes inflammationes sanat in principio ac augmento usq; ad uigorem, & maxime calidas. Sed & furunculis incipientibus imponitur. Et succus ipsius cum rosaceo ad aurium dolores modicè inflammatos conuenit. Quidā succum gargarizant ad tonsillas inflāmas. Quidam medici etiā in tussi inueterata exhibuerunt, propter manifestam uim extergendi, facit & ad alopecias ac impetigines ipsa herba per se assidue affricta. Aperit & hæmorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit, cum modico sale trita & cataplasmati modo imposita.

Elymos, Panicum, Meline.

Panicum Græcis elymos & meline uocatur. Est autem simile milio forma ac facultate, parum nutrit & siccatur, & sanè uentris fluxiones sistit, quemadmodum etiā milium, si uero forinsecus in cataplasmate imponatur, siccatur & perfrigerat.

Empetrum siue Epipetrum, Prasoides

Empetron solis purgationibus comodum esse uidetur, pituitam ac bilem ducens. Saporem habet salsum, ut etiā ad alia eo quis uti possit, ad quæ uidelicet falsæ substantiæ usus est. Appellatur etiā prasoides.

Epithymum.

Epithymum per omnia fortiores thymo facultatem habet, siccans ac calfaciens in tertio ordine sine distantia à temperatis, purgat humorem atræ bilis.

Erebinthus, Cicer.

Cicer legumen est flatuosum, probe nutrit, uentri comodum, urinā ciens, lac & semen generās, mensesq; ducens. Decoctum ipsius etiā calculos in renibus attrahit, maxime nigri. Alterum ciceris genus oroblaetū appellatum, uim habet attractoriā, discussoriā, sectoriamq; ac extensoriam. Quare & lienem & iecur & renes expurgat, scabiemq; ac impetiginē exterit. Item parotidas ac testes induratos discutit, maligna quoq; ulcera sanat cum melle.

Erpilos, Serpyllum, Zygis.

Serpyllum calfactoriā uim usq; adeo habet, ut menses & urinas moueat. Est autem & gustu satis acere. Duæ eius species sunt. Altera hortensis sampsuchum odore referēs. Altera syluestris quæ & zygis appellatur, non serpens, sed ramulos erectos, tenues, sarmetosos habens, folia ferme similia rutæ, subangusta & longiora, ac duriora, flores gustu acres, odoris iucundi. Radix autē inutilis est. Nascitur in petris, efficacior & calidior quàm hortensis, itemq; ad usum medicū accommodatior. Menses enim & urinas cetera pota: Prodest & ad tormina, conuulsa, rupta, hepatis inflammationes, & ad reptilia ac serpentes, tum in potu accepta, tū cataplasmati modo imposita. Mitigat & capitis dolorem cum aceto cocta, capite ex ea irrigato, rosaceo ammixto. Maxime autem in lethargicis ac phreniticis inueteratis congruit. Sedat & sanguinis sputum, drachmæ unius pondere cum aceto pota.

Erysimon, Irio.

Erysimi semen uelut sapore nasturtio simile est, sic etiā facultate ipsi adsimilatur, feruens & calfactoriū existens. Quādo uero usus eius in eclegmate expeditur, præstat ipsum aqua maceratum torrere. Commodat in eclegmati ad crassorum ac uiscosorum humorū in pectore ac pulmone educationem ac per sputū expurgationem. Iuuat parotidas induratas, & duritias ueteres mamarum ac testium. Dioscorides ait in cataplasmate cum aqua aut melle impositum, etiā occultis canceris mederi.

Erythrodanum, Rubia tinctorum.

Erythrodanti radix rufa qua tinctorum utuntur, acerbā est & subamarā saporis, unde & iecur & splenē purgat, & urinas crassas, ac multas, aliquando etiā cruentas euacuat. Itemq; menses propellit. Moderatè quoque extergit ea quæ extersione opus habet. Itaq; utiligines albas exterit illita cū aceto. Quidā & in potu exhibent ipsam ischiadicis ac resolutis ex aqua mulsa.

Euzomon, Eruca.

Eruca olus palam calfacit, sed & semen generare credi-

tur, & impetus ad uenerem excitare. Capitis autem dolorem inducit, atq; hoc magis si quis ipsam solam edat. Quapropter cum lactuæ folijs ipsum edere oportet.

Eupatorium.

Eupatorium tenuium partiū uim habet, exterforiamq; ac sectoriā, citra manifestam caliditatem. Quare obturationes secoris expurgat. Est etiam modicę adstrictionis particeps, per quam hepatis firmitatem addit.

Euphorbium.

Euphorbium ustoriam & tenuium partiū uim habet, similiter ut alijs succi.

Zea.

Zea media quodammodo est inter triticum & hordeum, ut ex illis cognobilis fiat.

Zingiberi.

Radix zingiberis fortiter quidem calfacit, sed non primo statim occurſu uelut piper, propterea quod crassiorum partium uim; aquosamq; ac excrementitiam substantiam possidet, ob quam etiam facile a teredinibus perforatur.

Zythus.

Zythus acrior est quam hordeum ex quo fit, & mali succi, nimirum ex putrefactione factus. Est autem & flatuosus.

Zima, fermentum.

Fermentum tenuium partiū est moderate calidum, & propterea citra molestiam ac mordacitatem, ex alto extrahit simulq; discutit. Compositum est autem ex contrarijs facultatibus, aciditate frigida, & caliditate putredinosa, insuperq; salis & farinæ, iuxta utriusq; naturam.

Hedyosmon, Menta, Minthe.

Mentam Græci hedyosmon, aliqui minthen odoratam appellat, uim habet calidā ut propē attingat tertium ordinem, uerū ex hortensi cultu humiditatis superflue particeps est, quapropter & ad uenerem moderate stimulat, & ob hoc temperamentum etiā cum posca lenta in cataplasmata uenit. Cæterum ob amaritudinem lumbricos necat, & decoctum eius per triduum consequenter potū, colicis ualde prodest. Acerbitas porro ipsius recens sanguinis sputū cohibet; si cum posca bibatur. Tenuium partium ut si qua alia herba existit.

Edysarum, Securidaca, Pelecinus.

Hedysarum etiam pelecinus dicitur, itemq; securidaca, & inuenitur fuluum aut pallidum colore semen ancipiti acie ad similitudinem securis. Amarum autem & subacerbum apparet; unde in potu stomacho commodum est. Expurgat uiscerū obturationes, id quod & totius fruticis ramuli faciunt.

Emerocalles.

Hemerocalles radicem habet similem lilij radici figura ac uiribus, quare similiter ut illa ambustis prodest. Nam discussoriā leniter uim habet, simulq; repulsorium quiddam possidet.

Erigeron, Senecio.

Senecio uim habet mixtam, frigidā, simulq; moderate discussoriam. Et propterea medicamentis sedis commodè miscetur, cohibet & sanguinis sputum succus potus, & lumbricos occidit, & hepaticis prodest, & inflammatis efficax cataplasma est.

Eryngium.

Eryngium caliditate aut parum quid a temperatis, aut

omnino nihil abscedit, siccitatis autē tenuiū partium non modicę particeps est. Radix eius aqua feruefacta & ipsa aqua in potu sumpta, colicos sanat, cum aqua multa feruefacta, calculosos, urinae stillicidium, eiusq; emittendę difficultatem, & nephreticos curat. Bibendum est autē hoc eius decoctum per dies xvi. ieiunis, itemq; ad noctem dormituris. Si uero lauer simul cum ipsa incoxeris, & potandum dederis, melius res procedet. Affirmauit mihi quispdam se ex assiduo eius usu, calculos per lotium eijcere desinisse, cum antea frequentissime eo ultio diuexaretur.

Thapsia.

Thapsia acris & fortiter calfactoriæ unā cū humiditate facultatis est. Itaq; ex alto uiolenter attrahit, & attractum discutit. Verum longiore tempore opus suū perficit, propterea quod superflua humiditate largiter redundet, ob quam etiam facile corrumpitur.

Thermus satiuus, Lupinus.

Lupinus edulcatus per cocturā, in cibo acceptus ægrē cōcoquitur, & alimentū corpori præbet crassi succi, & crudos humores generat. Aluum autē neq; ducit, neq; sistit. At uerō ut pharmacū, edulcatus quidem, uim obducēdi meatus habet. Qui uero insitam a natura amaritudinē habet, exterforius & discussorius existit. Occidit lumbricos cū melle delinctus, aut cū posca potus. Sed & decoctū ipsius lumbricos expellere solet potū, & per clysterē infusum. Farina quoq; eius forinsecus cum bubulo felle umbilico imposita idē præstat. Et sanē decocti fomentum foris admotū utiliginibus prodest; & capitis ulcusculis manantibus, eruptionibus papularū, scabiei, gangrænis, ulceribus malignis, partim extergēdo, partim discutien- do, & citra mordacitatē siccādo. Expurgat etiā iecur, & lienē cum ruta & pipere, iucunditatis gratia adiectis. Extrahit & menses, & foetus, cū myrrha ac melle appositus. Farina etiam lupinorum discussoria est. Non enim liuida tantum, sed & strumas & tubercula dura sanat, sed tūc in aceto, aut aceto mulso, aut posca eam coquere oportet, iuxta ægrorū uidelicet temperamenta, & affectus differētiā opportuno liquore inuento. Discutit & liuida farina ipsa, reliquaq; omnia quæ prius in decocto relata sunt. Quidam & ischiadicis in cataplasmatibus imponunt.

Thermus sylvestris, Lupinus erraticus.

Sylvestris Lupinus amarior & fortior est ad omnia satiuo; aliās in genere eandem uim possidens.

Thlaspi.

Thlaspios semen uim acrem adeo possidet, ut etiam internos abscessus potum rumpat, & menses ducat, & foetus perimat. Per sedem immisſum coxendicū morbis prodest cruenta euacuando, & aliās quoq; purgatoriam uim habet supernē ac infernē humorū biliosorum, acetabuli mensura potum.

Thridax, Lactuca.

Lactuca humidū ac frigidum olus est, non tamē externē, sed iuxta fontanarū aquarum frigiditatē, quapropter ad inflammationes conuenit, & ad parua ac leuia erysipelata. Edulium est siuim sedans, & somnū concilians, maximē feruefacta cū posca diluta sola comesta. Sed neq; incōcoctilis est uelut alia olera, neq; excretionem per aluū inhibet, neq; promouet, & propterea neque mali succi sanguinē generat, non tamen perfectē boni succi. Semen potum seminis effluxum cohibet, unde & his quibus per somnum id effluit

datur. Cæterum syluestris lactucæ succus cum muliebri lacte illius, argemata & inustiones, quæ oculorum ulcera sunt, itemq; caliginem depurgat.

Thymus.

Thymus incidit ac calfacit manifestè ut tertij ordinis sit calfacientiū, & propterea urinas ac menses ducit, ac foetus detrahic, & uiscera purgat potu, adiuuat pectoris ac pulmonis excretiones. Atq; hæc quidē Galeenus. Verū experimento sequentia cōstāt. Arthriticis thymi sicci minutissimè triti drach. 111. cū aceti mulsi hemina dimidia dato ieiunis: purgat enim bilē, & acres serofos humores, & quæ circa uesicam herent. Ventre autem eleuato, quū intumescere iam incipit, drach. 1. cū aquæ mulsæ hemina exhibeto ieiunis. Ad lumborū ac coxendicum dolorem laterisq; ac pectoris, & præcordiorū eleuationes ac inflationes, drach. 111. cū aceti mulsi diluti hemina una dato ieiunis. Similiter & melancholicis & mente perturbatis, & timore perculsis drach. 111. dato cū aceti mulsi diluti hemina una. Lippientibus & in uehementi oculorū dolore similiter dabis ieiunis & ante coenā. In podagricis doloribus ita auctis ut moueri non possint ægri, similiter dato cū uino diluto. In testibus eleuatis similiter drach. 111. ieiunis dato cū hemina uini una. Verū tamen à nigro thymo elleboro appellato penitus abstinendū est. Corruptoriā enim uim habet, & bilē generat. Vtere autem eo qui florem purpureum habet ex natura, & album quid amplius complectitur.

Thymbra, Satureia.

Satureia hortensia consimilem thymo uim habent, sed sunt multò debiliora.

Intybi.

Intybi lactucis consimilem uim habent, sed tamen succunditate multum inferiores existunt: item ad reliqua omnia de lactucis relata minus efficaces sunt.

Viscum.

Viscum ex plurima aërea & aquea substantia calida, minima autē terrea constituitur. Itaq; plus acrimoniæ in se habet, quàm amaritudinis. Quapropter humores ex alto fortiter trahit, non tenues solū, sed etiā crassiores, eosq; diffundit ac discutit. Est autē ex medicamentis nō statim calfacientibus post primā impositionē, sed quæ tēpore indigent, uelut etiam thapsia.

Ion, Viola.

Violæ folia aquosam & subfrigidam substantiam prædominantem possident, propterea & per se & cū polenta in cataplasmate imposita, inflammationes calidas mitigant. Imponuntur & in ardore oris uentris, itemq; oculorum.

Hippuris, Equisetum.

Hippuris adstringentē cum amaritudine qualitatē habet, et propterea siccatoriā fortiter simulq; citra mordacitatem. Vulnere igitur maxima in cataplasmate imposita glutinat, etiā si nerui dissecti sint, itemq; herniam intestinorū. Sed & sanguinis sputū, & fluxum muliebrē, maximè rufum, insuperq; ad dysenterias aliasq; uentris fluxiones, generosum pharmacū existit herba ipsa cū aqua, aut uino pota. Quidam de ea produnt, uesicæ etiā aliquando ac tenuium intestinorum uulnera curasse. Succus eius sanguinis eruptiones iuuat, & foeda uentris uicia, cum uino aliquo austero potus, aut in febriculis cum aqua,

Isatis, Glastrum.

Isatis satua qua tinctores utuntur, fortiter siccantis fa-

cultantis est, nondū mordentis, amaræq; simul ac adstringentis. Quapropter magna uulnera durorū corporum glutinat, etiā si in musculorū capitibus existant. Sanguinis eruptionibus utile cataplasma præbet, & tumores laxos mirabiliter discutit, simul ac cōtrahit, & aduersus omnia maligna ulcera efficaciter resistit, siue cōputrescant, siue erodantur. Quod si pro ægri natura ac uiribus fortior appareat, ad folia ipsius trita, aut panē, aut ordeaceā farinā, siue triticeā, aut etiā polentā ammiscere oportet, iuxta prædominantē in unoquoq; dispositionem ac affectionem.

Isatis syluestris.

Syluestris Isatis acre quid habet manifestū sã in gustu & actione, & propterea magis siccatoria quàm satua existēs, aduersus humidas putrescēdas fortius reuoluitur. Verū ad alia prædicta deterior est: immodicè enim & cū mordacitate hæc siccatur, irritatq; & inflammationes excitat. Cæterum fortitudinis facultatis suæ gratia, etiam splenicis utilis existit, quibus satua non profuit.

Itea, Salix.

Salicis folijs uti quis potest ad uulnerū cruentorū glutinationē, imò & flore ipsius quo omnes Medici ferme utuntur ad emplastri siccantis compositionē. Est enim uis ipsorū siccatoria citra mordacitatē: habent autē & adstrictionis aliquid. Quidam succū ex ipsis exprimunt, eumq; pro pharmaco habent mordacitatis expertæ ac siccantē, ad multa utili. Cortex quoque arboris cōsimilem floribus ac folijs uim habet, præterquàm quòd siccore tēperamēto præditus est, quemadmodū omnes ferè cortices. Quidā hunc exurunt, & cinere utuntur ad ea quæ forti resiccatione indigent. Itaque clauos ac callos, insuperq; verrucas myrmecias appellatas, eo eximūt aceto acri subactis. Aliqui tēpore floris corticē incidunt, succumq; quēdam inde colligunt, quò utuntur ad uicia quæ pupilis tenebras obducunt: est enim medicamentū exterius forium ac tenuiū paruum. Quare etiā ad alia multius usus assumi queat, quum tali facultate præstet.

Calaminthe.

Calaminthe tenuiū partiū substantiā habet, estq; calida & sicca tertio ordine: sicca per se ex aqua mulsa pota manifestè calfacit, & sudores citat ac discutit, & siccatur totū corpus, quapropter aliqui ipsa uis sunt & ad rigores per circuitū repetentes, cocta in oleo, & illito inde toto corpore cū frictione strenua, intra corpus uero assumunt uelut dictum est. Quin & coxendicis cataplasma est in ischiadicis generoso omnino auxilio: trahit enim ex alto ad superficiē, & totū articulū calefacit, & cutem manifestè adurit. Insuper & pota apposita menses efficaciter prouocat. Bonū est & in elephantiasi medicamentum non solū ob id quòd tenues humores discutiat, sed & quòd crassos attenuet & fortiter dissecet, qui sanè hoc morbi genus generat. Sic & cicatrices nigras illustrat, & sugillata discutit. Præstat autē in talibus cocta in uino cataplasma: uice imponere, uiridē magis quàm arefactā: sicca enim fortior euadit & promptius inurit. Est & cataplasma in moribus animalium uirus eiaculantiū. Ac uero ob amaritudinē & ascaridas & lūbricos succus eius perimit tū potus, tū per sedē infusus, imò & uermes qui in auribus itemq; ulceribus nasci solēt. Prodest & anhelosis & ictericis extergendo ac expurgando iecoris obturationes. Cæterū ad omnia prædicta efficacior

efficacior est mōtana. Orpheus ait succū eius cū pari rosaceo & cerussa tritū ad strigmentitiā crassitudinē ac illitum, ambustis mederi, & quod omnē opīonem superat, neq; cicatricem apparere, & locū pilos producere. Si uero cū cimolia terra & aloē, paribus portionibus acceptis succus teratur, indeq; frons ac cēpora illinantur, capitis dolores euestigiō sanātur.

Calamus aromaticus.

Calamus aromaticus modicā adstrictionem & quāminimā acrimoniam possidet, maxima autem pars eius substantiæ terreæ ac aëreæ est, moderatæ caliditatis ac frigiditatis. Vnde & urinam moderatē ciet, & compositionibus stomachicis ac hepaticis quæ foris ipsis imponuntur ammiscetur, & in uterī fetus utiliter assumitur, qui inflammationibus, aut mensium irritationis gratia adhibentur. Ponatur itaque secundo ordine calfacientium ac siccantium, magis tamen siccantium quā calfacientium.

Calamus Phragmites, Arundo Sepiaria.

Calami phragmitæ radix exterforiam uim non modicam habet, minimē acrem, folia tamē uiridia moderatē perfrigerant, itemq; non modicā exterforiam uim possident. Cortex eius ustus tenuium partium ac discussoriam uim abūde acquirit, & exterforium quid habet, ut calfaciat ac siccet tertio ordine, plus tamen siccans quā calfaciens.

Cannabis.

Cannabis semen ægrē concoquitur, dolorem capitis inducit, & malum succum gignit. Si uero torreatur etiam sic caput tentat, multum calfaciendo, & uaporem calidum ac medicatum ad ipsum delegando. Ex eo uero quod sicco temperamento præditum est & flatus expers, genitale semen extinguit.

Capnion, Fumus terre.

Herba fumarīa acrem simulq; amarā habet qualitātē, neq; omnino expers est acerbæ. Quapropter urinam multā billosam promouet, & iecoris obturationes ac debilitates sanat. Succus eius uisum exacuit delascrymationē faciēs. Ipsa herba arida trita aque mulsæ inspersa ac pota, uētre mollit. Vīno autē diluto similiter inspersa, stomachum corroborat. Dato cōfidenter & decoctū ipsius quomodocūq; febriētibus.

Capparis.

Capparī radīcis cortex prædominantē habet amarā qualitatem, secundo loco acrem, & deinceps acerbā, ex quo palam fit ex diuersis ac pugnantibus uiribus ipsum compositū esse. Etenim extergere & expurgare ac incidere potest ob amaritudinē: calfacere autem & discutere ac attenuare per acrimoniam, cōtrahere uero ac cōstringere & cogere per acerbitatē, & propterea lienes induratos si quod aliud medicamentum curat, tum forinsecus cataplasmatibus convenientibus ammixtus, tum intra corpus acceptus, siue coquatur in aceto ex aceto mulso ac similibus, siue aridus tritus ipsidem inspersus: euacuat enim apertē uiscosos ac crassos humores sic acceptus, non per urinas solum, sed etiam per uentrem. Sæpenumero uero & cruenti egerunt hi in quibus lien opem sentit, & cōxendicū dolores minuuntur. Quin & menses ciet, & pluitā a capite per os detrahit, & malignis ulceribus inspersus minutissimē tritus commodum pharmacum est, utpote extergere ipsa ualēs & fortiter resiccare. Sed & dentium doloribus prodest cū uino coctus aut aceto. Strumas quoq; et tumores duros disc-

cutit, si aptis ad hæc medicamentis permisceatur. Folia porro & caulīs, itēq; semen siue fructus, consimilem cortici uim habent, nisi quod debiliora existūt. Et sanē ego memini me aliquādo folijs solis strumosa duritiē intra paucos dies discussisse. Ammiscetur autem ipsis aliquid quod uehementiam facultatis ipsorum obtundat. Nihil uero miri est, si etiam aurium uermes succus enecat ob amaritudinē. Ac uero fructus in muria cōpositus, deinde lotus ac maceratus, donec omnem salis uim deponat, medicamentum est ad excitandum appetentiam prostratā, extergendumq; ac subducendum uentris pituitam, & ad expurgandum obturationes lienis ac iecoris. Vtendum est autem eo cum commodo liquore, aceti mulsi, aut aceti oleo permixti, præ omnibus alijs cibis.

Cardamum, Nasturtium.

Nasturtij semen uisoriā uim habet uelut sinapi, & propterea ischiadicos, & capitis dolores, & quicquid rubefactione opus habet id ipsum calfacit, quēadmodū sinapi. Ammiscetur cōmodē & medicamentis ad anhelosos destinatis, nimirum ut medicamentū crassos humores dissecare potēs. Herba ipsa similem semini uim possidet: uerum imbecillior est. Quare comesta ualde calfacit. Capitis autē dolorem eadem inducit.

Cardamomum.

Cardamomum calidam facultatem abundē possidet, ut etiam exulceret in cataplasmate impositū, minus tamen quā nasturtiū. Habet & amaritudinis quiddam in sese, ob quam etiam lumbricos enecat, & scabiem fortiter extergit cum aceto.

Caroum.

Caroi semen siccatur & calfacit tertio ordine: acrem autem qualitatem moderatē possidet, & propterea flatus leuat discutitq; & urinam ciet, non modo semē, sed tota planta.

Casia.

Casia calfacit ac siccatur tertio ordine, estq; multū tenuiū partiū: in gustu autem plurimum acrimonie habet, paruamq; quandam adstrictionem. Quare propter hæc omnia siccatur simulq; discutit corporis superfluitates, & præterea robur organīs addit. Cōmodat & ad suppressos menses, ubi præ copia simulq; crassitudine superfluitatū, sufficienter euacuari prohibetur.

Carya, Nux arbor, Nux iuglans siue Regia,

Nux parua, Pontica, Auellana.

Nux arbor habet quiddē tum in germinibus, tum in folijs aliquid adstringens, uerum insigniter & copiose in ipso nucis suæ cortice, & recenti & arido. Vtūtur itaq; ipso etiam tinctores. Nos autem eūdem exprimentes, succumq; similiter ut mororū ac rubi, mororum cum melle coquētes, stomachicū præparamus oris uitij cōmodum medicamentum, quo etiam ad alia omnia uiuimur, ad quæ prædicti succi commodi existūt. Cæterū ipsius nucis nucleus qui in cibi usum uenit, oleosus est & tenuiū partium, particeps est autem & adstringentis qualitatis, sed modicæ & quæ temporis progressu euanescit, tota ipsius substantia in pinguem succum transeunte, qui oleo ueteri similis apparet, & propterea omnino tandem edi non potest. At uero uiridis adhuc & recens nucleus, neque adstringentem qualitatem manifestē possidet, neque oleosam. Vnde ad alui excretionem commodior est quā siccus, & maxime si cum garo, quēadmodum aliqui faciūt, accipiat. Sed & siccum

nucum in aqua maceraturū, uelut quidam facere solent, consimilis uis est ut uiridium. Concoquitur tamen melius nucis fructus, & stomacho commodior est, si cum caricis edatur. Aliunt si quis caricas cum nucibus ac ruta prae reliquis cibis comedat, eum non magnopere à letalibus medicamentis laedi posse. Porro ex inueterata nuce oleum quoque exprimi potest, quod abunde discutitorium existit, ut quidam eo etiam gangraenas & carbunculos ac ægilopas curēt. At uero putamen eius aridum ustum, tenuis parrium siccatoriumque & lene pharmacum euadit. Cæterum nux parua, quæ & Pontica, & Auellana appellatur, frigidior est & austerior, utpote magis terrea existens. In cæteris regiis, siue iuglandi similis est. Capitis autem dolorem in cibo sumpta inducit.

Castanea.

De castanea eiusque fructu dictū est in querci tractatione.

Cenchros, Milium.

Milium frigescit primo ordine, siccatur aut tertio exolutum, aut secundo intecto. Est & modice tenuis parrium. Vnde comestum instar edulij, omnium ferme eduliorum frumentacei generis minimi nutrimenti est, sed & aluum exiccat. Verum forinsecus impositum in marsupijs siue sacculis, fomentum est aptissimum his qui leni resiccatione opus habent.

Cedrus, Cedria, Septica.

Cedri species duæ sunt, utraque tertio calfacit ac siccatur.

Cedria uero quæ ex ipsis fit, etiam quartū iam ordinem attingit. Est autem primi ordinis erodentiū, septicæ Græci appellant, multum calida ac tenuis parrium existens, teneras sanè carnes promptè simulque citra dolorem corrodit caliditas ipsius, per caliditatem quæ in corporibus est aucta: uerū in duris corporibus longiori tempore & uix tandem efficaciam suam ostendit. Vnde mortuorum corpora incorrupta cōseruat, humiditates ipsorum superfluas depascēs, solida autem corpora nō attingens, propterea quod non tā fortem uim habet, uelut alia erosua appellata. Nihil uero miri est si eiusmodi ui pollet, quod etiā pediculos, & lēdes, & aurium uermes, & ascaridas in recto intestino enecare potest. Foetus insuper apposita uluos quidem necat, mortuos autem eijcit, quæadmodum etiam ipsum semen genitale, in coitu pudendo oblita, & propterea sic usurpata medicamentū conceptum impediens est nulli alteri posthabendum. Sed & dēdum foraminibus instillata dolores quidē minuit, ipsos autem dentes confringit. Attenuat & oculorum cicatrices, & hebetē uisum ob crassitudinem humorum sanat. Quod uero pinguisimū est ex ipsa & exacte oleosum, quod super extensis lanis dū coquitur colligitur, tenuiorū quidem partū est quam tota cedria, uerum minus acre ac mordax, quāquam nō minus, sed magis etiā quam cedria efficax sit. Vnde & hoc idiotæ utuntur ad uulnera ouium in tōsura per fordes illata, itē ad scabiem, & ad ricinos. Cedri porro baccae & fructus cedrides Græcis appellati, moderatiorem uim habent, ut etiā in cibi usum ueniant. Si quis tamē plures ex ipsis ingerat, & caput dolet, & excalefacit, & oris uētris morsum percipit.

Centaurea magna.

Centaureæ magnæ radix ex contrarijs uiribus cōposita est. Itaque in gustu acris simulque adstringens apparet, cum quadā dulcedine. In actione uero acrimonia caliditatis opera exercet, menses promouens, &

foetus mortuos detrahens, & uiuentes corrumpens, simulque eijciēs. Adstrictio autem frigiditatis crassioris ac terrea opera designat, tum uulnera glutinando, tum sanguinem spuentes iuuando. Dare autem oportet ex ea drachm. i. febrientibus cum aqua, febre carentibus cum uino. At uero iuxta omnium qualitatum actionem & ruptis, & conuulsis, & spirandi difficultatibus, & inueteratæ tussi conuenit; nō enim euacuare solum in his oportet quod præter naturam est, sed roborare etiam ac firmare expurgata. Succus ad eadem ad quæ radix ualet. Quidam etiam eo pro lyco utuntur, illo non præsentē.

Centaurea parua.

Centaureæ paruæ radix omnino inefficax est, ramuli uero & magis folia, & ipsorum flores in usum ueniunt. Dominatur in ipsis qualitas amara, parū quid adstrictionis possidens, & propterea fortiter siccatoriū est pharmacū absque mordacitate. Magna itaque & recensia uulnera glutinat herba ipsa uiridi in cataplasmate imposita. Vetera uero & ægrè cicatricem recipiētia, ad cicatricē perducit simili modo adhibita. Quin & sicca glutinatorijs ac siccatorijs cōpositionibus miscetur, quæ sinus ac fistulas curare solent. Sed & ueteres duritias mollire creditur, et maligna ulcera sanare. Miscetur & eis quæ fluidas affectiones sanant. Decoctum herbæ quidā ischiadicis infundunt per sedē, uelut quod biliosum & crassum humorē ducat. Nā & purgat, & sanè ubi uehementer operationē suam exercebit, cruenta euacuat, & magis prodest. Succus eius consimilem uim habet, hoc est, siccatoriā & exterforiā, & tum alia prædicta probè efficere solet, cū melle oculis sublinitur, & appositus menses ac foetus educit. Quidā ipsum bibendū dant in affectis neruis, uelut euacuantem ac citra molestiā siccantem infarcta. Cæterum & ad hepatis obturationes bonum pharmacū est. Bonum & lieni indurato, forinsecus impositus, neque minus si quis bibere uelit. Herba ipsa exsuccanda est circa summum uigorem, & flore prægnans. Datur succi cochleariū unum cū aqua calida, & sale modico, ac pauculo aceto, & purgat generose humorem atræ bilis. Coma eius contusa & cū melle cocta, aut sapa in collyriā formata, fistulas circumscribit, & callos eximit, collyrijs in fistulas immisis. Corymbi eius tussi ac eribrati cochlearij mēsurā ischiadicis datur ieiunis cū aqua calida, ad tri duū aut plures etiā dies. Eius certe pharmaci efficacia magno miraculo sæpe fuit. Et ad polypodas in naribus excrecentes idē medicamentū siccū inspergitur.

Cerasus.

Cerasus fructum fert moderatè adstringentē cum dulcedine; matura itaque cerasa & dulcia magis per intestina subeunt, minus uero stomacho commodant, immatura & austeriora uice uersa. Gummi arboris uino potum calculosis prodesse quidam tradiderūt.

Ceratonia, Siliqua.

Siliqua arbor siccatoriā & adstrictoriā uim habet, quemadmodum etiam fructus eius, ceratia Græcis, nobis siliquæ appellatæ. particeps est autem & alicuius dulcedinis. Siliquæ aliquam cum cerasis similitudinem habent. Virides enim & humidæ aluum magis subducunt: Siccæ magis sistunt.

Cestron, Betonica, Psychotrophon.

Betonica cestron & psychotrophon appellatū, uim habet sectoriā uelut gustus indicat: amara enim & acris herba

herba existit, uelut etiam particularis actio ostendit. Nam & rhenum calculos confringit, & pulmonem ac pectus & iecur purgat ac extergit, & menses mouet, & comitiali morbo prodest, & ruptis ac coeui- sis medetur. Acidum item ructum sedat, & ischiadici- cis conducit pota.

Cichs, Galla, Omphacitis.

Galla quæ omphacitis uocatur, ab uide acerbū pharma- cum est, substantiæ terreæ frigida plurimæ particeps, ob quam & siccatur, & fluxiones repellit, & cogit ac adstringit laxas ac inualidas partes. omnibus etiam fluidis affectionibus resistit. Ponatur autē in tertio ordine siccantiū, in secundo uero frigefacientiū. Al- tera galla flaua laxa ac magna siccatur quidē, sed tanto minus, quāto minus acerbæ qualitatē particeps est. Cocta itaq; per se ac trita, & in cataplasmate adhibi- ta inflammationū sedis ac prolapsus eiusdē insigne au- xilium est. Coquere autē oportet si moderata adstri- ctione opusest in aqua, si uehemēt in uino, maximē austero. Gallæ uim supprimēdi sanguinis habent, & manifestū satis est quod caliditatem et acrimoniam ex uisura acquirunt, & magis tenuiū partiū quā non uisæ euadunt, itēq; siccatoriæ amplius. Oportet autē eā defactas super prunas, aceto aut uino extinguere.

Cera.

Cera in medio quodammodo est calfacientium, frige- facientium, humectantiū ac siccantiū, habet & cras- sarum partiū quid & meatus obstructoriū, quapro- pter non solū siccatur, sed & per accidēs humectare ui- detur perspirationes prohibendo. Vnde & materia est aliorū pharmacorū. Ipsa autē per se ex concocto- riorū debiliū numero fuerit, quæ forinsecus imponū- tur. Habet enim parū ex discussoria ac calida faculta- te, cuius quā plurimæ mel ipsum particeps existit.

Ciborium.

Viridem fabarum Aegyptiarum fructum ciboriū ap- pellant. Quare in fabarum tractatione, etiam de hoc considerandum est.

Cinara.

Cinara mali succi eduliū est, maximē ubi durior euase- rit. Nam et biliosum humorē in sese tunc uberiorem colligit, & totā substantiā lignosiorē habet. Quare ex hac quidē humor atræ bilis generatur. Ex succo uero ipsius tenuis & amaræ bilis humor producit. Præstat igitur præcoctam ipsam in cibo absumere.

Cicis arboris fructus, Ricinus, Croton.

Cicis arboris fructus, quem aliqui crotonem ac ricinū appellant, quicq; purgandi uim habet, exterioria ac discussoria facultate præditus est, folia eius imbecil- liora sunt. Oleum quod ex fructu fit, calidius & ma- gis tenuium partiū est quā commune, & propter- ea etiam discussorium.

Cisthus siue Cistharus.

Cisthus frutex adeo adstrictorius est, ut & folia ipsius in cataplasmate imposita uulnera glutinent. Flores efficaciores sunt, ut cū uino poti dysenterias, & uen- tris imbecillitatem, ac fluxiones, & humiditates sa- nent, in cataplasmate autem impositi putrefactis ul- ceribus conducunt, propter generosam siccandi uim ferē in secundo ordine. Ipsius fruticis frigiditas tepi- da quoq; qualitatē particeps est. Cæterum quæ hy- pocysthis appellatur, multo magis quā folia ad- stringit, estq; efficax pharmacum ad omnes fluidas affectiones, uelut sanguinis refectionē, fluxum mu-

liebrem, coeliacas & dysentericas affectiones. Sed & corroborare partes solet, & à plurima humiditate exolutis firmitatē addit, atq; sic sanē & stomachicis & hepaticis conducit. Firmat enim ac roborat non instrēnuē, epithematis aut antidotis aptis ammixta.

Cisthus siue Ladanum.

Cisthus hic in calidioribus regionibus nascitur, nō ge- nere alius ab his qui in alijs locis nascuntur, sed à re- gione præcipuā quādam propriam discussoria qua- litatē adeptus est deposita frigiditate. In reliquis igitur consimilis est præcedenti. Verū ex ipso fit lada- num medicamentum calidū primo ordine iam com- plecto, ut etiā secundū attingat, particeps est autem & adstrictionis cuiusdā modicæ, & tenuium partiū substantiā habet, & propterea moderatē emollit, & similiter discutit, itēq; cōcoquit. Itaq; non mirum est uteri affectibus hoc præcipuē cōuenire, propterea quod aliquid adstringens habet, per quod etiam de- fluos capillos retinet. Nā & uitiatos humores iuxta pilorū radices attenuat ac cōsumit, & meatus quibus impacti erant, adstringendi uī cogit & constringit.

Cissos, Hedera.

Ex contrarijs facultatibus hedera cōponitur: habet enim quid substantiæ adstrictoriæ, quā frigidā ac terreā dicimus. Habet & quid acris, quā calidam esse gu- stus testatur, sed & aquosæ substantiæ tepidæ uiridis particeps est. Viridia itaq; folia cum uino cocta, etiā magna uulnera glutinant, & maligna ulcera sanant. Vlcerationes quoq; ex igne cicatrice includūt. Cum aceto autem cocta folia splenicis opitulantur. Flo- res eius fortiores quodammodo sunt, ut cum cerato triti ambusta curent. Succus ipsius per nares purgat, & antiquas aurium fluxiones sanat, & ulcera uetera tum aurium, tum narium ad cicatricem perducit. Si uero acrior appareat, rosaceo aut oleo dulci tempe- retur. Lacryma hæderæ pediculos necat, & pilis nu- dat, in tantum calidam uim habens, ut etiam leniter urat. Prodest etiam lacryma calculosis in potu.

Cnicus.

Cnici semine ad purgationes tantum utimur. Est au- tem tertij ordinis calfacientium, si quis forinsecus admoto ipso uti uelit.

Coccus enidius, Granum enidium.

Cnidius coccus purgatoriam uim habet, estq; faculta- tis acris & uisoria.

Coccus tinctorius, Granum tinctorium.

Coccus tinctorius adstringentem simulq; amarā qua- litatem habet, & per utranque leniter siccatur, & ob id ad magna uulnera conducit, & ad sauciatos nervos, cum aceto aut aceto mulso tritus.

Coccymelea, Prunus.

Pruni fructus recens magis aluū subducit, siccatus mi- nus. Sunt autem damascena pruna magis adstringē- tia, Hispana dulciora, & propterea magis aluum du- cunt. In folijs autem manifesta quædam adstrictio, apparet, unde decocta utiliter gargarissantur in in- flammationibus gurgulionis ac tonsillarum. Cæte- rum syluestrium prunorū fructus adstrictorius est & uentrem sistit. Et in Asia sanē hæc planta prunus nominatur. Gummi omnis pruni cum uino potum lapides frangere quidam produnt, uerum cum aceto impetigines puerorum extert.

Colocasion, siue Manxizanon.

Colocasion radice similis uis est rapis ac cepis, viscosum autem

autem corpus ipsius est. Vnde exterforiae facultatis particeps est, & uentri in cibo sumpta commodat.

Colocynthe, Cucurbita.

Cucurbita humidi & frigidi temperamentis est, utroque secundo ordine. Vnde & ramentorum eius succus auribus inflammatis & dolentibus conuenit cum rosaceo. Sic & tota in cataplasmate imposita, calidas inflammationes mediocriter refrigerat. In cibo accepta nimia humectatione corpus implet, & sitim eximit, & alimentum humidum ac frigidum, & propterea etiam modicum corpori praebet. Concoquitur autem non male, ubi non prius fuerit corrupta, id quod accidit ipsi propter malam praeparationem, & ubi uisiosus humor in uentre fuerit coaceruatus. Imò si etiam diutius in uentre moretur, quemadmodum reliqua quoque humida edulia. Gaudet organum coëstura propter aquosam in ipsa qualitatem. Omnia enim huius generis acris aut acidis, aut austeris, aut salis saporibus miscere oportet, si modo neque insuauiter sumi debeant, neque sumentes nauseabundos efficere.

Comarus, Arbutus, Memecylon.

Arbuti fructus memecylon appellatur, estque stomacho incommodus, & capitis dolorem inducit, arbor ipsa simul cum fructu acerbam qualitatem possidet.

Commis, Gummi.

Gummi uim habet siccatoriam, meatus obducit, & asperitates sanat.

Conia stacte, Lixiuum.

Quod uelut ablutio est materiarum ad cinerem redactarum, conia stacte Graecis, nobis lixiuum uocatur. Ex omnibus autem maxime exterforium est & siccandi uel praeditum, quod ex cinere ficulneo & rithymallis fit, ut ferè uim erosiuam sortitur. Verum ob substantiam tenuium partium citra dolorem urit.

Conyza.

Conyza & maior & minor consimilis temperamentis ac facultatis existunt, gustui acris & amaræ appaerentes. Calfaciunt & siccant euidenter, ut utriusque qualitatis tertio ordine locetur. Decocta itaque in oleo, rigoribus per circuitum repetentibus salutare medela praebent. Quidam flores ipsarum unà cum folijs terentes cum uino bibendos exhibent, ad menses ciendos ac fortis eiendos. Est & tertium conyzae genus, in humectioribus locis proueniens, magis foetidum & imbecillius.

Corianum, Coriandrum.

Corianon item corion appellatur, & ex contrarijs facultatibus compositum est, multum habens substantiae amaræ, quæ tenuium partium est & terrea, nec parum aqueae humiditatis tepida uel praedita. Habet & parum quid adstrictionis, ex quibus omnibus multifariam efficax est facere ea quæ Dioscorides prodidit, uerum non ob solam frigiditatem.

Colla, Glutinum.

Glutinum quod ex similagine aut polline ad libros coëficiunt, facultatem habet meatus obducentem & concoctoriā, At uero de taurino glutine ac similibus in sermone de animalibus agetur.

Coronopodium, Pes cornicis.

Coronopodij radix in cibo accepta coeliaci opitulari creditur.

Costus.

Costus modicæ amaritudinis, plurimæ uero acrimoniae ac calidæ qualitatis particeps est, ut etiam exul-

ceret. Vnde ex ipso cum oleo perfricant corpus ante accessiōem in rigoribus per circuitum redeuntibus. Alij idem & in resolutis ac ischiadicis faciunt, & omnino in his quibus aut partem aliquam calfacere uolumus, aut humorem aliquem ex alto ad cutem attrahere, usus eius competit. Ob eandem causam & urinam ciēt, & menses ducit, & ruptis ac coëuulsis, & laterum doloribus confert. Verum ob amaritudinem, etiam latum lumbricum necare creditur, & ad solares maculas ipso utuntur, cum aqua aut melle. Inest praeterea ipsius temperamento flatusosa quaedam humiditas, ob quam & uenerem stimulat cum uino mulso potus.

Cotyledon, Umbilicus ueneris.

Cotyledon mixtam uim habet, humidā & frigidam, & quandā obscure subadstringentē & modicē amarā. Vnde frigefacit, & repellit, & extergit, & discutit. Inflammationes itaque erysipelatas, & erysipelata inflammata sanat, & in stomachi ardore commodum cataplasma existit. Creduntur folia cum radice comesta lapides atterere, & urinam ciere.

Crambe, Brassica.

Brassica comestilis siccatoriam uim habet, & in cibo accepta, & forinsecus imposita, non tamen manifestè acrem, sed ut uulnera glutinet, & maligna ulcera sanet, & inflammationes curet iam induratas ac ægrè solubiles, eiusdemque generis erysipelata. Sed & epinyctidas ac herpetas sanat. Habet & quid exterforium, per quod etiam lepras exterit. Succus itaque ipsius quid purgatorium habet, corpus autem eius alui excretionem cohibet, eaque gratia in quibus humectum uentrē siccare uolumus, moderate ipsam coquimus, & priore aqua diffusa, statim in alteram calidā praeparatam immittimus ac seruescimus. Non oportet enim neque aërem, neque frigidam aquam contingere quod his coquitur. Neque enim exactè flaccidū fit, etiam si diutissime coquas. Itaque in aliam calidam immisam coquimus donec flaccida fiat. Nam si uentris subducendi gratia sumitur, non ualde discoquitur. Siccatur igitur brassica quemadmodum lenticula, & propterea uisum hebetat, & atrae bilis humorem generat. At uero asparagus brassicae minus siccatur, & magis urinam ciēt. Semen autem potum lumbricos enecat, & maculas solares ac lentigines, & quaecumque alia moderata extersione opus habentia exterit. Cauliculi eius usti cinerem efficiunt fortiter siccantem, ut & ustoriae facultatis particeps sit. Quapropter eo cum ueteri adipe ammixto, quidam ad ueteres laterum dolores, & sicubi eiusmodi alius dolor infestet, utuntur. Fortiter enim discussorium medicamentū efficitur. Brassica porro syluestris siccior & calidior multo est quam satiaua, quæadmodum omnia alia ferme syluestria satiauis fortitudine praestant. Vnde neque citra offensionē intra corpus sumuntur. Discutit autē & extergit uehementius quam satiaua. Cæterum marina brassica ultra hoc quod uentrē emollit, subsalsum nimirum ac subamarum saporem habens, commoda quoque fuerit ad externos corporis usus, ad quos sanè eiusmodi qualitates conueniunt.

Chrethmon.

Chrethmon salsum quodammodo in gustu est, unā cum modica amaritudine, propterea & uis ipsius exterforia simulque siccatoria existit. Vtraque tamen facultate amarior cedit.

Crithæ,

Crithe, Ordeum.

Ordeum primi ordinis est siccantium ac frigefaciendum, habet & modicum quid exterforium, & paulò magis siccatur quam fabarum farina à cortice depurgata. In reliquis omnibus forinsecus usu consimilia existunt. Verum in cibo acceptum ordeum, hoc amplius fabis habet, quòd in coctura flatuositatem deponit, fabæ autè quomodocumque coquatur flatuositas permanet. Crassioris enim substantiæ faba est quàm ordeum, & propterea etiam magis quàm ordeum nutrit. Ordeum uero succum generat tenuem & exterforium quid habentem. Nihil igitur calfacit corpus quomodocumque tandem præparetur. Verum humectat & siccatur diuersimodè præparatum. Etenim polenta ex ordeo tostò facta, manifestè apparet siccare. Psisana uero humectat, quòd uelut conuenit, præparatur. Panes autè ordeacei omnes minus nutriunt quàm triticeï, & magis uentrem subeunt quàm illi. Cæterum polenta ex ordeo tosta facta magis quàm ordeum siccatur, & modicum alimentum corpori sufficit quomodocumque coquatur. Eadem ex uino Amineo austero pota aluum siccatur. At uero maza (uocatur autè sic polentam ordeaceam liquore aliquo subactam, uelut sapa, aut melle, aut alio quopiam) quæ etià cruda comeditur, quomodocumque præparetur, minus quàm panes ordeacei concoquitur, & uentrè magis flatu implet, & si diutius in ipso moretur, turbationem efficit. Quòd enim ordeum ex natura non parum fursuraceum & siccum, & magis difficulter confringi potens habet, imò & id quod utile ex ipso in corporis alimentum cedit, siccius euadit. Quicquid igitur fursuraceum & durum in ipso est, quemadmodum forinsecus apparet quòd aqua non dissoluatur, eodè modo neque in uentre dissoluitur maceratum, sed permanet incoactum uelut est acceptum. Quòd igitur neque concoquatur neque in uenas distribuatur, per uentrè secedit, & præsertim quòd extergendi uim ex ordeo habeat: magis autem secedit infernè sepius subacta ac trita. Si uero & mel assumpserit, adhuc citius subit. Porro quod crimnò Græci uocant, crassiorque farina tum tritici, tum zæ existit, magis alit quàm polenta, sed ægrius concoquitur. Vocatur ex ea sorbitio puls, & quæ ex zæ fit uentrem lenius aliquanto sistit, magisque si torreatur.

Crinon, Lilium.

Lilij flos temperamentum mixtum habet, ex substantia quadam tenuium partium terrea, ex qua etiam in gustu amaritudinè offert, & quadam aquosa temperata, unde & oleum ex ipso lenis tum discussoriæ, tum mollientis facultatis existit, et ad uteri duritias aptum. Radix etià ac folia per se trita, siccant & extergunt ac moderate discutunt. Est enim radix primi ordinis exterforiorum, qua gratia & ambustis conducit. Radicem itaque assatam, deinde rosaceo trita ambustis imponunt usque ad cicatricis inductionem. Nam & alias omnia ulcera optimè cicatrice includit. Sed & uterum emollit, & menses promouet. Folia quoque præcocta usque ad cicatricem inducta imponunt, non ambustis solè, sed etià ulceribus. Reponimus aliquando & foliorum succum coctum cum aceto & melle ad liquidioris mellis copagem, ita ut succi partes quinque sumantur, mellis autem & aceti utriusque pars una, sicque commodum pharmaci ad omnia uehementi resiccatione indigentia citra mordacitatem, uelut sunt uulnera ma-

gna, & maxime quæ circa capitis musculos fiunt, itè ulcera inueterata, fluidaque ac egre recipiètia cicatricè.

Crocodilion.

Crocodilij semen acre est, & aromaticum, urinam densum, & menses ducens, ut & calidæ facultatis sit discussoriæque ac siccatoriæ. Succus caulis & seminis consimilem uim habet, & nephreticis prodest. Radix expunctiones à pectore fortiter adiuuat. Estque minus acris quàm semen, uerum non minus amara. Sanguinem quoque per nares ducit.

Crocus.

Crocus habet quidem aliquid modicè adstrictorium, quòd terreum frigidum esse ostensum est. Dominatur autè in ipso calfactoria uis ac qualitas, ut ex tota substantia sua secundi ordinis sit calfaciendum, primi siccantium, & propterea etiam concoctorium quid habet, quòd modica illa adstrictione adiuuatur.

Crommyon, Cepa.

Cepa quarti ordinis est calfaciendum, substantia ipsius magis crassarum partium existit. Vnde & hæmorrhoidas aperit apposita, & cum aceto illita in sole uiridines extergit, & alopecij affricta diutius quàm alcyonij pilos prouocat: comesta calfacit corpus acrimonia sua, & crassos ac uiscosos humores attenuat. Inflat autè uentrè propter crassarum partium substantiam.

Cyamus, Faba.

Faba frigefaciendo ac calefaciendo mediū temperamentum propinquissimè accedit, caro eius modicæ cuiusdam exterforiæ facultatis particeps est, quemadmodum cortex adstrictoriæ. Quapropter aliqui medici fabam integram cum corio suo in posca decoctam, dysentericis & coeliacis ac uomentibus exhibent. Est autem edulij ratione, si quod aliud, ægre concoctile & flatuosum, etiam si quàm diutissime coquatur, & quomodocumque præparetur, ad excreationes tamè pectoris ac pulmonis commodum. Et uiridis quidem faba comesta, magis aluum subit, uerum minus quàm arida ingesta nutrit. Torrefactæ tamè fabæ flatuosum deponunt, sed ægrius concoquuntur, & tardius comedantur, & crassum succum generant. Pharmaci autè loco fabæ forinsecus imposita, citra molestiam siccatur. Et sanè ad podagricos sæpe ea usi sumus cocta ex aqua, deinde adipe suillo ammixto. Ad neruos uero cotusos & ad ulcera, farinam eius imposuimus aceto mulso, aut uino mulso coctam, rosaceo etiam addito, si inflammatio adesset. polenta uero addita, ad inflammatos iam ex plaga. Est & testium ac mammarum uule cataplasma: Solet enim has partes inflammatas modicè perfrigerare, maxime ubi lacte in ipsis in casei speciem coagulato ubera fuerint inflammata. Nam lac ab eiusmodi cataplasmate extinguitur. Quemadmodum etiam puerorum pubes, farina fabacea cataplasmatibus modo interiecta, diutissime impubis permanet.

Cyclaminus.

Cyclaminus uariam uim habet: Nam & extergit, & discutit, & uenarum oscula operit, & attrahit, & discutit: Succus enim ipsius hæmorrhoidas aperit, & aluum irritat uiolenter, appositus. Sic & tubercula, & strumas, & alias duritias discutit, compositionibus discussorijs ammixtus. conuenit & suffusis oculis cum melle subtilitus, & præterea per nares purgat. Aded autem fortè uim præditus est, ut etiam imo uentri illitus, aluum subducatur & foetus corrumpatur, sed & in pessima forma appositus similiter foetum perimit. Tota radix succo

succo imbecillior est. Est tamen etiam ipsa uehementior. Nam pota & apposita menses ciet, & istericis confert, non uiscus solum ipsum uidelicet secur expurgans, sed bilem in toto corpore per sudores euacuans. Quare ab eius potu adiuuare omnibus modis oportet sudorum excretionem, corpore coniecto ac uberius calfacto. Copiam eius drachmas tres, aut summum quatuor excedere non oportet, ex passo aut aqua mulsâ. Exterget & cutem, quapropter maculas solares, & alopecias ac similia sanat, prodest & indurato lienî tum recens, tum sicca in cataplasmate imposita. Quidam aridam radicem etiam anhelatoribus exhibet. Eadem arida tusa & per tenuissimum cribrum excreta, unâ cum caryophyllis, ita utradicis sit uncia una, caryophyllorum grana x x i. naribus insufflata, crassos & uiscosos humores à capite purgat, unde antiquos capitis dolores sanat, & morbo comitiali magnopere optulatur.

Cuminum.

Cymini semine præcipue utimur. Est autem facultatis calfactoriæ, urinam ciet, & flatus dissipat, tertij ordinis calfacientium existens.

Cyparissus, Cupressus.

Cupressi folia & germina pilulæq; recentes ac teneræ, magna uulnera in duris corporibus glutinât, ex quo manifestum est quod siccatoriam uim habent, absq; manifesta acrimonia ac caliditate. Plurimam autem habet amaritudinem, & multo ampliorem acerbitatem uniuersa planta. Tantum uero est in ipsa caliditatis, quantum satis est ad deducendam acerbitatem in altum, citra calfactionis aut mordacitatis inductionem. quapropter humiditates in profundo, in humectis putredinosisq; affectionibus consistentes, citra molestiam simulq; securè depascitur, altera non amplius attracta. Atque sic herniosis confert in cataplasmate imposita. Siccant enim & robur addit corporibus ex humiditate laxis, mergense se nimirum in altum uel adstringendi, quum deducatur per ammixtam ipsi moderatam caliditatem. Vtuntur ipsa quidam & ad carbunculos ac herpetas polenta ammixta.

Cyperus, Tuncus quadratus.

Cyperî radices maxime in usum ueniunt calfacientes ac siccantes citra mordacitatem: Vnde & ulcera ob nimiam humiditatem ægre recipientia cicatricem, mirabiliter sanât. Habent enim quid adstrictorium, & propterea oris ulcerationibus commodant. Habent & uim quandam sectoriam, qua & calculosis prosunt, & urinas ac menses cident.

Cypros, Ligustrum.

Ligustri arboris folia & uirgulta ac flores in usum ueniunt, mixtæ facultatis ac temperamenti existentia. Habent enim quid discussorium ex aquosa substantia moderate calida; Habent & quid adstrictorium, ex terrea frigida. Vnde decoctum fori ambustis prodest. Commodat & ignitis inflammationibus ac carbunculis, citra molestiam ac mordacitatem siccans. Sed & commanducata ulceribus oris sponte productis, & maxime ignitas aphthas referentibus conducunt. Folia siccata in umbra tusaq; ac cribrata, mox in aqua ad calidum cinerem cocta, modico rhoë culinario inspersa, & aceti momento, bonum cataplasma præbent in podagricis ac chiragricis, in ipsis maximis inflammationibus imposita. Nam & inflammationes sedat, & fluxiones repellit, & quod iam in locis continetur

discutit per meatus oculos, quemadmodum per sudorem. Lædit tamen hoc cataplasma colorem, & maxime ungues. Quapropter prælinere locos oportet, liquido rosacco cerato. Ipsum autem cataplasma integendum est ricini folijs, aut carpasi, si adsint.

Cytisum.

Cytisi folia discussorij sunt facultatis ammixta tepida aquosa, quemadmodum folia maluarum.

Conion, Cicuta.

Quod cicuta extremè frigidâ uim habeat, omnes norunt, & propterea ex summa illa frigefactione etiam enecat ac occidit.

Coni fructus, Nux pinea, Cocalus, Strobilus.

Coni fructus, quem & Cocalum, & Strobilum, ac Pineam nucem appellant, integer quidem uiridis, amaritudinem quandam & acrimoniam cum humiditate habet, & propterea pectore suppuratis commodus est, itemq; alijs quibuscunq; ex pectore ac pulmone facilis screatus ac per tuisim relectio expectitur. Nucleus eius qui in cibi usum uenit, alimentum præbet ægre concoctile, ualidum, ac multi succi, propter oleositatem. Verum medicamenti loco asperitates læuigat, maxime ubi aqua maceratus omnem suam acrimoniam deposuerit.

Cancani radix.

Cancani radix uim habet moderate siccatoriam citra mordacitatem, substantiam autem crassarum partium meatus obducentem. Vnde uino macerata uelut tragacantha, & delineta, arteriæ asperitates sanat. Nihilominus si quis ipsam manducet, succus præterfluens arteriæ prodest, similiter ut glycyrrhizes succus.

Caucalis.

Caucalim aliqui daucum syluestrem uocant. Est autem similis ipsi & gustu & uiribus, calfacit enim uelut ille, & siccant, & urinam ciet, et muria cõdita reponitur.

Carpesium.

Carpesium simile est ei quod phu appellatur, & gustu & uiribus, uerum amplius tenuium partium existit, quapropter & magis quam illud extergit uiscerum obturationes, & urinas mouet, & renes expurgat calculosos. Non tamen in tantum tenuium partium est ut pro cinamomo in usum assumi possit, si cinamomum haberi nequeat, quemadmodum Quintus fecit. Præstat quidem igitur Ponticum Laertico, non tamen etiam hoc ipsum uiribus cinamomo par est, sed etiam ab optima casia non modico intervallo relinquitur. Vtraq; appellatio à quibusdam Pamphyliæ montibus est, in quibus plurimum prouenit.

A. Lathyri, Cicercule.

Cicerculæ consimilem ochris & phaselis substantiam habent, itemq; similem succum, sed compage crassior, & propterea aliquo modo magis hære quam illæ alunt.

Lathyris.

Lathyridem uithymalli speciem esse quidam aiunt. Semen eius purgatoriam uim habet.

Lapsana.

Lapsana in cibo accepta mali succi est, in cataplasmate imposita extersorium quid ac discussorium habet.

Lapathum, Rumex, Oxylapathum.

Lapathum moderate discussoriam uim habet, & sanè caliditatis particeps est. Renum calculos radix eius cõstringit, & scabiem ac corporis asperitates sanat ex aceto cocta & affricata. At uero Oxylapathum mixtam uim

uim possidet: Habet enim repulsoriam unā cum discussoria facultatē. Semen ipsorum manifeste adstringit, unde & dysenterias & alui profluvia sanat, præsertim oxylapathi. Cæterum Hippolapathum in paludibus nascitur, eadem ui præditū, uerum imbecilliore. Syluestris porro lapathi radix, quam mylen appellat, ex aceto cocta siue uino, dentes corroborat, eorūq; dolores sedat, si eo decocto calido colluatur.

Limonium, siue Cynoglossum.

Limonij semen austerum existens cum uino exhibens coeliacis, & dysentericis, & hæmoptoicis, conducit & ad fluxum muliebrem.

Lichen siue muscus petrarum.

Lichen petrarum exterforiæ simulq; frigefaciētis moderate facultatis est, & siccantis iuxta utramq; facultatem. Sanat impetiginem cognominem sibi apud Græcos morbum.

Leontopodium siue Leontopetalon.

Leontopodij radice maxime utimur, discussoria & calfactoria ac siccatoria, in tertio ordine.

Lepidium.

Lepidium quarti ordinis est calfacientium.

Leucoion.

Leucoij uniuersus frutex exterforiam & tenuium partium uim habet, maxime tamē flores præsertim sicciore. Quare & cicatrices oculorū crassas attenuant, & decoctum ipsorū menses ac secundas promouet, & foetus immortuos expellit. Nam & uisum perimit foetum in potu acceptū. Quod si quis uehementiam facultatis ipsius multæ aquæ mixtura aut aliquo alio eiusmodi liquore mitiget, habebit et ad inflammationes commodum medicamentum. Sic & decoctum ipsius si non meracū fuerit, fomento uteri inflammationes sanat, & maxime diuturnitate induratas. Idem cum cerato ulcera ægre cicatricem recipientia curat. Semen ipsidem uiribus prædictum commodissimū est potum duarum drachmarū pondere, aut appositum cum melle, ad ciendos menses, & foetus uiuos quidem corrūpit, mortuos autē eiicit. Radices cum aceto in cataplasmate impositæ, lienes induratos sanant, itemq; induratas inflammationes.

Leuce, populus alba.

Populus alba arbor temperamentum mixtum habet, ex substantia aquosa tepida, & terrea attenuata. Unde & exterforiam uim habet. Gustu autem subamarum existit.

Libanotus, Thus.

Thus calfacti ordine secundo, siccatur primo. Habet & quid adstrictorium, quod in albo ulx percipere est. Cortex ipsius uim adstringendi manifeste habet, ob quam etiam præclare siccatur, ut secundi ordinis siccantium completi existat. Est & crassarum partium & minime acrimonię particeps. Ob has igitur qualitates ac uires, usus eius frequens est medicis, in hæmoptoicis ac stomachicis, profluuijsq; alui, coeliacisq; ac dysentericis, nō solum his quæ extrinsecus imponuntur, sed & quæ intra corpus sumuntur ipsum ammiscuentibus. Fit ex eo & fuligo hoc modo. Granum thus singulatim forcipe apprehensum & à lucerna accensum, in uas fictile cauum nouū imposito, deinde aeneum operculum concauū probe detersum superposito, suppositis tamen ad utrumq; operculi labrū lapillis quatuor digitorū altitudinis, ut locus sit alterum supponendi granum, prius quā penitus

extinguatur, donec sufficiens fuligo fuerit collecta. Cæterū externa operculi ænei pars assidue per spongiā ex aqua frigida extergeatur, ita enim omnis fuligo adhærebit, operculo nimirum non ualde concalfacto. Derasa itaque priore fuligine per pinnam, idem facias, quousq; collibuerit. Sed & exusti Thuris cinerem priuatim colliges. Melior est autem fuligo. Vim habet mitigatoriam inflammationum in oculis, sedat fluxiones, repurgat ulcera, replet concaua, sistit carcinomata. Eodem modo parantur fuligines & ex myrrha, & ex styrace. Conueniunt ad eadem omnes. Quin & aliarum lacrymarum fuliginem eodem modo colligere licebit.

Libanotides.

Libanotides omnes similem uim habent mollitoriam ac discussoriam. Succus autem & radices & herbæ melle ammixto, hebetudinibus oculorum medetur ex humorum crassitudine oborris. Sunt enim libanotides participes exterforiæ ac incisoriæ facultatis.

Lignys, fuligo.

Omnis fuligo siccatur, quapropter & substantiā terream habet, & reliquas ignis à materia exusta, sed has tamen tempore modico. Tota autem natura ipsius siccatoria est, terrea & tenuium partium. Partiales eius differentiæ sunt iuxta materiam exustam, prout ea ipsa calidior aut frigidior aut mordacitatis experta existit. Thuris porro fuligine utuntur ocularibus compositionibus ammixta, maxime his quæ ulceribus conferunt. Nam & hæc expurgat ipsaq; carne explet. Terebinthinæ quoq; ac myrrhæ fuligo similiter ut thuris nihil offendit. Verum styracis his fordor est, atq; adhuc magis quæ ex pice liquida fit, quam superat adhuc cedriæ fuligo. Utuntur autem & acrioribus, & in palpebris glabris, & angulis oculorum corrosis, oculisq; humectis absq; inflammatione.

Ligusticum.

Ligustici radix & semen ex calfacientium ordine sunt in tantum ut & menses moueant, & urinas propellant, flatuq; discutiant.

Lini semen.

Semen lini comestum flatuosum est, etiamsi sit torrefactum, ita recrementosa humiditate plenum est. Est autem calidū in primo ordine, humiditatis ac frigiditatis in medio consistens. Stomacho incommodatur & ægre concoquitur. particeps est tamen saculratis cledi urinæ. & torrefactū uentrem aliquatenus sistit.

Lobi.

De lobis scriptū à nobis est quū de dolichis ageremus.

Linoxostis, Mercurialis.

Mercuriali utuntur omnes ad uentris purgationes, ueruntamē si quis eius usum in cataplasmatibus experiri uelit, reperiet eam multum discussoriam. Et semen huius nondum siccatum experientia docet, tubercula & eminentias in corpore, uulgo Carphia dicta, dissipare, si quis ipsa diligentius semine eo confricat.

Lonchitis.

Lonchitidis triangulare semen hastę simile habetis, radix urinam ciet. Eius uero quæ scolopendrio similis est, folia uiridia uulneribus glutinandis conducunt. Sicca eadem ex aceto pota, lienes induratos sanant.

Lycium, Pyxanthos.

Lycium siue pyxanthos spinosa est planta, ex qua quod Lycium appellat fit, quo ad sugillata utimur, & ad sedis ac oris inflammationes ac ulcerationes, c. herpe

herpetosq; ac putrefactiones, & ulcera maligna, & intertrigines ac paronychias qui sunt unguum abscessus. Habet enim vim siccandi ex secundo ordine, alias ex diuersi generis substantijs compositum: Altera tenuium partium, ac discussoria & calida: Altera terrea frigida, ex qua & moderata adstrictionem habet. Quapropter & ad diuersos effectus hoc medicamento utuntur, ut exterforio quidem, adsumentes ad ea quae pupillis tenebras offundunt, ut adstrictorio uero, coeliacis & dysentericis ac fluxui muliebri exhibentes. Caeterum Indicū Lycium ad omnia commodius existit.

Lysimachium.

Lysimachium predominantē habet qualitatem adstrictoriam, per quam & uulnera glutinat, & eruptiones sanguinis narium compescit inspersa, sed & alias sanguinis eruptiones supprimit tū ipsa, tū succus ipsius adhuc amplius. Quare & potus & infusus dysenterias ac sanguinis reiectionē, & fluxū muliebrem sanat.

Lotus, Trifolium.

Lotus satiuus, quem aliqui trifolium uocant, moderate extergendi vim habet, itemq; siccandi, uerum in conlugatione caliditatis ac frigiditatis temperatus est. Ac uero syluestris lotus in Aphrica plurimus prouenit. Semen eius secundi ordinis est calfacientium. Habet & quid exterforium, Semen autem Aegyptij etiam ad panificium accipitur.

Lotus arbor.

Lotus arbor adstrictoriae qualitatis non multae particeps est. Est autem tenuium partium ac siccatoria. Ramentum itaq; lignorum eius, & ad fluxum muliebrem, & dysenterias, ac coeliacas affectiones conducit. Coquitur aliquando in aqua, aliquando in uino, prout usus postulat. & non solum infunditur, sed etiam bibitur. Atqui & defluos pilos cohibet moderate adstringendo ac siccando.

M. Macer.

Macer cortex est qui ex India affertur, adstringens cum modica acrimonia, quapropter & siccatur: Est & tenuium partium, propter odorem. & propterea coeliacis ac dysentericis compositionibus ammiscetur, in tertio ordine siccantium locatus. Iuxta caloris & frigiditatis differentiam nihil insigniter praestans.

Malabathri folium.

Folium malabathri spicae nardi cōsimilem vim habet.

Malache, malua.

Malua syluestris leniter discussoria, & paululum mollioriae facultatis particeps est. Satiu pro eo quod aquosa humiditate participat, etiam uiribus debilior existit. Subit autem uentrem non solum ob humiditatem, sed & ob uiscositatē, maxime ubi cum oleo & garo accipitur, uino modico cibi tempore irrorato. Semen ipsorum tanto fortius est, quanto siccus. Quin & Dēdromalache appellata huius generis est, sed magis quam praedictae discussoria. Nominatur autem & Alhæa.

Mandragoras.

Mandragoras predominantem frigidam vim habet, ut tertij sit perfrigerandum ordinis. particeps est tamen & modicae caliditatis ac humiditatis in malis suis. Vnde & soporatoriam vim haec possident. Radicis cortex fortissimus existens, non solum frigefacit, sed etiam siccatur. Reliquum internū debile existit.

Marathrum, foeniculum.

Foeniculum fortiter calfacit, ut ex tertio ordine censi

possit. Siccatur ordine primo. & propterea etiam lac generat, & suffulsi oculis iuxta eandem rationem opitulatur. Ciet & urinas & menses ducit.

Mastiche.

Mastiche alba & chia, ex contrarijs quodammodo facultatibus composita est, adstringente & molliente. Quapropter & stomachi, & uetris, & intestinorum ac hepatis inflammationibus conuenit, secundo ordine calfaciens ac siccans. Nigra mastiche quae Aegyptia appellatur, magis exiecat quam illa, & minus adstringit, unde & commodior est quodammodo ad ea quae fortiore discussione opus habent.

Melanthium, Nigella.

Melanthium calfacit ac siccatur tertio ordine, apparet & in eo partium tenuitas. Sic itaq; & destillationes sanat, calidum linteolo illigatum naribus admotum, ut assidue odor eius nares percellat. Sed & potum flatus uel maxime discutit. Occidit & lumbricos, non modo comestum, sed etiam foris uentri impositum, ob amaritudinē. Lepras & clauos ac uerrucas myrmecias, hoc est, fornicarias dictas abolet, & menses promouet ob crassitudinem & uiscositatē humorum suppressos, prodest & alopecij uisum, & cum oleo tritum, ac illitum. Sic etiam recta ceruice spirantibus. Et in summa ubi disseccare & extergere ac siccare calfacereq; opus est, commodissimum medicamentum existit.

Melilotum.

Melilotum mixtas uires habet. Nam & adstringit, sed & discutit & concoquit. Amplius enim de calida substantia quam de frigida in se complectitur.

Mel.

Mel calfacit ac siccatur secundo ordine. Est autem simplicis quam maxime cum facultatis, cum temperamenti, exterforiae uidelicet appellatae. Estq; maxime tenuium partium, praesertim quod prouenit ubi thymus plurimus nascitur. Quum autem tenuium partium sit, necessario etiam quid acre possidet, per quod uentrē ad excretionem impellit. Diximus autem quod extergit, haec itaq; exterforia uis si ipsi adimatur, magis ad urinam ciedam commodum reddetur, itemq; ad alimenti distributionem ac nutritionem accommodatus. Adimi autem optime potest, aqua plurima ammixta, & cocto melle, donec spumare desierit, ita ut spuma assidue auferatur. Aqua uero mulsā non cocta uentrem subit antequam concoquatur. Itaq; senibus & frigidis corporis temperaturis mel commodum est. Verum in aetate uigente constitutis ac calidis, in bilem transit ante concoctionem. Mel porro coctum per se, minus acre ac mordax euadit, unde & magis nutrit, & ad sinus glutinandos commodissimum existit.

Melissophyllum.

Melissophyllum marrubio utribus simile est, sed multo tamē ipso inferius, & ob id neq; usus eius ualde expetitur: Quum enim ubiq; marrubium abundet, superuacaneum est melissophyllo uti. Si tamen non adsit marrubium, pro ipso succedere potest in eisdem usus, ut tamen efficaciae eius manere memores simus.

Mecon, Papauer, Thylacitis, Rheum.

Papauer omne perfrigerantem vim habet. Sed hortensis, thylactidis Graecis appellatae, semen moderate somniferum est. Verum Rheodis semen fortius frigefacit. Quare citra laesionem eo quis non utitur. Syluestris autē semen nigrum existens, medicatum iam est multum

multiū frigidificans, maxime Thebanī. Sed & succus fortiter perfrigerat, usq; ad stuporē & mortificationē. Est enim quartū & extremū ordinis perfrigeratiū.

Mecon ceratitū, Papauer cornutum, Paralium.

Papauer cornutum Græcis etiam paralium uocatur, quoniam ferē circa mare nascitur. Vim habet sectoriā & extensoriā. Quare radix eius cocta in aqua ad dimidiās, hepaticis affectionibus prodest, folia & flores sordida ualde & maligna ulcera luuāt. Sed ab ipsorum usu recedendum est, ubi ulcera fuerint depurata. Nam usq; adeo extergere solent, ut & depurata carne aliquid eliquent ac consumant, & ob id etiam crustas ulcerum tollunt.

Mespilum.

Mespilī arboris fructus acerbus est, & uentrem plurimum supprimit.

Melea persice, Malus persica.

Malus persica & folijs & ramis amaram qualitatem prædominantem habet, quare & lumbricos occidit trita umbilico imposita, & aliās discussorium medicamentum existunt. Fructus eius persicum appellatum, humidioris & frigidioris est temperamenti. Caro eius comesta facile corrumpitur, & omnino uisidosa est. Quare nō oportet ipsa, uelut aliqui faciunt, à reliquo cibo ingerere. Corruptur enim & uentri innatant. Porro uniuersalis huius regulæ perpetuū memoriē esse oportet: Quod quęcūq; malī succi sunt, humida autē & lubrica, & quæ facillē alio secedere possunt, ea prius quā alia comedere oportet. Sic enim & ipsa cito subeunt, illisq; uia præstruunt. Quæ uero postrema sumuntur, etiā alia simul corrumpunt.

Melea Armeniace, Malus Armeniaca.

Armeniace malī fructum præcocia appellant. Est autem humidus ac frigidus hic fructus secundo ordine, ubi sanē fuerit maturus, à persico in hoc differt, ipsoq; præstat, quod non similiter in uentre corrumpitur, neq; accedit. Multis uero et succundior apparet, & propterea stomacho accommodatior.

Malus medica, siue citrea.

Malī medicæ fructus ab omnibus citrium appellatur. Id in femine acidam qualitatem & uim siccatoriam prædominantem habet, ut tertij ordinis sit siccandiū ac perfrigerantium. At uero in cortice habet quidem siccatoriam uim in secundo ordine, nō tamen frigidam qualitatem, propter aromaticitatem. Caro ipsius crassi succi est & frigida, ob duritiem: semen autem penitus edi non potest, neq; quod acidum esse diximus, neq; eius nucleus qui reuera semē existit, amarā qualitatem, & discussoriam ac siccatoriam uim in secundo ordine habens. Sed & folia siccandi ac discutendi facultatem habent.

Mala omnia.

Cæterū in alijs malis magna est differentia. Quæcūq; enim adstringunt, frigidum ac terreum succum habent; Quæ uero acida apparent, frigidum quidem, sed tenuium partium habent, mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, ad caliditatem repentiā. Austerorū igitur malorum usus est, quum aut ob intemperiem calidam aut humiditatem multam, ueter debilis est. Acerborum uero, ubi eadem multum fuerint aucta, nam adstringentiā quantum in ipsis est, supprimunt infernas excretionēs. Acida autem cient. Quum igitur suspicio fuerit crassum humorem in uentre collectum esse, non ualde frigidum, hæc exhibebis. Nam

& hunc diffecant & infernē subducunt, & propterea excrementa humectant. Vbi uero purum repererint uentriculum, ipsum amplius supprimunt.

Mecon.

Mel radices in usu sunt in tertio ordine calfaciētes. Siccant in secundo, humiditatem retrimentitiā in sese complexæ. Urinas itaq; cient, & menses prouocant potius: Amplius acceptę capitis dolorem inducunt, & propter humiditatem, flatus.

Morus, Mora, Sycamina, Sycomora.

Mori arboris fructus, sicamina & sycomora frequenter à plerisq; Græcis uocantur. Si quidem igitur matura & ante reliquum cibum in uentriculum purum ingerantur, celerrimē per intestina secedunt, & alijs cibis uiam præstruunt. Verum post cibum acceptæ, aut uisidum humorem in uentre reperientia, celerrimē corrumpuntur, & peregrinam quandā, quæ dici commodē non possit corruptionem inducunt, similiter ut cucurbitæ & pepones, ubi non fuerint cōcocti. Tempus usus moris est itidem ut peponibus & cucumeribus, ubi siccum & calidum fuerit uentriculi corpus, & ex necessitate etiā hepatis. Tunc enim solummodo omnibus huiusmodi utiliter quis utetur, & ubi quis lōgo itinere aut multo ardore fuerit defatigatus. Tunc enim prosunt squalorem corporis rigantia, & moderatē perfrigerantia. Mora immatūra sole siccata diligenter ac reposita, cōmodum adstrictorium medicamentum exhibent, ut etiam dysenterias sanent, & affectiones coeliacas, & alias fluidas. Tunduntur autem & obsonijs miscētur, quemadmodum Rhōis fructus. Bibuntur etiam cum aqua & uino. Cæterum cortex radicis arboris purgatorium uim habet cum quadā amaritudine. Quare & latum lumbricum occidit seruesactus cū uino, eoq; calido meraco poto cyathi mēsurā, & diu suppressos menses prouocat.

Mycetes, Fungi.

Fungi frigidum ac humidum abunde edulium sunt, unde & propē ad uenenatricem uim accedunt, & sanē quidam ex ipsis occidunt.

Myos otis, Auricula muris.

Muris auricula siccatur ordine secundo, nullam manifestam qualitatem habens. Succus eius cyathi mēsurā cum zytho potus, lumbricū latū efficaciter expellit.

Myrica, Tamarix.

Myrica incisoriam & extensoriam uim abunde possidet, citra manifestam siccationem. habet & quid adstrictorium, & ob has facultates lienibus induratis conducit, radicibus aut ramulis aut folijs cum aceto aut uino coctis. fructus & cortex non modicæ adstrictionis participes sunt, simulq; extergent, & tenuium partium existunt. Vtæ myricæ cinis siccandi uim acquirit.

Myrsine, Myrtus.

Ex contrarijs hæc planta composita est substantijs, prædominatur tamē in ipsa terreum frigidum. Habet & quid tenuium partium calidum, unde fortiter siccatur, & omnes partes ipsius restringendi uim habet, tum forinsecus corpori impositæ, tum intrā assumptæ.

Moly, Ruta syluestris, Harmala, Besasa.

Moly aliqui rutam syluestre uocant, aliqui harmala. Syri Besasa. Vis eius tenuium partium & calida est tertio ordine. Vnde & secat & discutit crassos & uiscosos humores, & urinam promouet. Qui ruri ha-

bitant utuntur eo in diuturno capitis dolore, aqua coquentes, & caput inde rigantes. Similiter & ad reliquas corporis partes perfrigeratas.

N Nardostachy, Nardi spica.

Nardi spica primo ordine calfacit, siccatur secundo completo. Composita est ex substantia multum adstringente, & acri calida non multa, & quadam modica subamara. Quare & ad secur & ad stomachum merito conducit, pota & forinsecus imposita. Urinas citi quoque, & stomachi morsus sanat, & fluxiones ventris ac intestinorum resiccatur, ite capitis & pectoris. fortior est Indica, nigrior quam Syriaca existens.

Nardus Celtica.

Celtica nardus consimilem in genere uim cum praeditis habet, sed ad omnia debilior est, praeterquam ad urinas citandas. Est enim calidior illis, sed minus adstringit.

Narthex, Ferula.

Ferulae semine attenuat & calfacit. Interna eius pars, medulla appellata, adstringentis cuiusdam qualitatis particeps est, ob quam haemoptoicis & coeliacis prodest.

Napy, Sinapi.

Sinapi calfacit ac siccatur quarto ordine. Optimum est Aegyptium aut Syriacum, & quod mole minus est, & minus cruentum coloratum.

Narcissus.

Narcissi radix siccatoriam in tantum uim habet, ut uulnera magna glutinet, etiam si tendines sint concisi. Habet & quid exterforium ac attractorium.

Nerium, Rhododaphne.

Nerium aut Rhododaphne frutex est omnibus notus, qui si forinsecus corpori in cataplasmate imponatur, discussoriam uim habet. Si uero intra corpus sumatur, perniciosus & uenenatus non solum hominibus, sed & plurimis pecoribus existit.

Nymphaea.

Nymphaeae radix & semen uim habet siccatoriam leuem: Itaque & ventris fluxiones, & seminis per somnum effluxum, aut si etiam alias immodice feratur, sistunt. Prosumt & dysentericis. Caeterum Nymphaea quae albam radicem habet, uehementioris facultatis est, ut & muliebrem fluxum sanat. Bibitur & ipsa & quae nigram radicem habet, in uino nigro austero. Possident & quid exterforiae facultatis, unde & uirilignes sanant aqua rigatae, & alopecias cum liquida pice, praestat ad haec quae nigram radicem habet, ad reliqua quae albam.

X Xanthium, Lappa, Phasganion, Philantropos, Choeradoethron.

Xanthium, quidam phasganium, quidam philanthropon, alij choeradoethron appellant. Semen eius discussoriam uim habet. Decoctum corticis radicis positum lienes consumit, & detes motos firmat eiusdem decoctum ex uino collutum.

Xiphion, Gladiolus.

Gladioli radix praesertim superior, uim attractoriam, discussoriam, atque adeo siccatoriam habet.

O. Oenos, Vinum.

Vinum ex secundo ordine est calfacientium. Antiquum ualde, ex tertio, quemadmodum nouum mustum, ex primo. Eadem proportio est siccitatis ad caliditatem. Quandoquidem uero plurimas in uino differentias reperimus, distinguendum est de ipsis quam breuissimis id fieri potest. Rufa itaque & crassa ex

omnibus ad sanguinem generandum commodissima sunt, ut quae parua egeant in sanguinem transformatione. Deinceps nigra simulque dulcia ac crassa. Deinde colore quidem rufa aut nigra, compage uero crassa & habentia simul adstringentem qualitatem. His minus ualent alba, simulque crassa, ac acerba, ad nutritionem: Minime uero omnium aliter colore alba, compage tenuia, & quodam modo aquae similia. Concoquantur autem in uterulo & magis distribuuntur dulcia quam austera, utpote calidiore ut praedita, sed & uentrem magis subducunt. Caeterum ualde crassa, & tardius concoquantur, & tardius in corpus distribuuntur, ubi autem uenter robustum nactus fuerint, ut probe concoquantur, amplius nutrimentum corpori praebent. Manifestum est autem quod & aluum sistunt, & urinae citandae incommoda existunt, in quibusdam crassum succum generantia. Quaedam ex ipsis etiam secur & lienem acres obturant, atque inde aliqui in aquam inter cutem incidunt, aliqui calculo laborant ex nimio ipsorum usu, & praesertim senes. Optimum uinum est, & sanis, & ex morbo se recolligentibus commodissimum, quod colore rufum, compage tenue, & leniter subadstringens existit.

Oxos, Acetum.

Acetum mixtas substantias frigidam & calidam, utraque tenuium partium habet. praedominatur tamen in ipso frigida substantia, quemadmodum in principio huius libri praediximus. Est autem medicamentum abunde siccatorium, ut tertij ordinis sit completi, ubi sane forte exiterit.

Opos, Laser, Succus Cyrenaeus.

Laser siue succus Cyrenaeus, omnibus alijs calidior & magis tenuium partium existit, & ob id etiam magis discussorius. Verum tamen & alij calidi sunt ac flatuosi, hoc est Medicus & Syriacus, quem Laser appellant.

Origanum.

Origani herbae tres sunt species, omnes incisoriae & attenuatoriae, siccantisque ac calfacientis facultatis in tertio ordine. Tragoriganus autem aliquid adstrictorium assumpsit.

Oxyphoenos, Iuncus acutus.

De iunco acuto dicitur in schoeni, hoc est, iunci mentione.

Orobis, Eruum.

Eruum siccatur secundo ordine intenso, calfacit primo. Quantum autem amaritudinis particeps est, tantum siccatur, & extergit, & obstructione liberat. Amplius sumptum sanguinem per urinam expellit.

Orobanche.

Orobanche frigidi ac siccis temperamentis in primo ordine est.

Oryza.

Oryza habet quid adstrictorium, quapropter uentrem suppressit. Et est edulium aegre concoctile.

Orchis cynos, Testiculus canis.

Orchis herba, quae cynos orchis, hoc est canis testiculus dicitur, duplicem radicem bulbosam habet, humidam & calidam, quapropter etiam sapore dulcis est, & maior quidem radix ob multam humiditatem, ad uenerem stimulat pota. Minor uero ad siccitatem repens impetus uenereos compescit.

Orchis altera.

Orchis altera, quam serapiada uocant, siccioris prioris uim habet: quare ad uenerem non similiter comoda est, Laxos

est. Laxos autem tumores in cataplasmate discutit, & ulcera sordida purgat, & herpetas sanat. sicca uero & putrefactis & malignis ulceribus medetur. Nā & subadstringens quid habet, per quod aluum superimit cum uino pota,

Osyris.

Osyridis herbæ ex qua scopæ fiunt, amara est qualitas. Verum uis obturatione liberans. unde & malignas circa iecur obstructions resoluit.

Pancration.

Pancratij radix & sapore & uiribus *Scillæ* similis est: quare aliqui etiam utuntur ipsa, scilla non præsentem. uerum multo debilior existit.

Paliurus.

Paliuri folia & radix adstringentem non obscure uim possident, quapropter & fluidum uentrem sistunt. *Discussoriam* autem in tantum habent, ut & tubercula curent, quæ sanæ non ualde inflammata ac calida existunt. fructus incisioris facultatis eousque est particeps, ut uesicæ calculos & confringat, & expurgat, & reiectionibus ex pectore ac pulmone auxilietur.

Panax Hercules, Opopanax.

Panaces Hercules est, ex quo *Opopanax* appellatus sit. qui succus calidus est & discussorius in tertio ordine, sicca in secundo. Cortex radicis siccatur & calcificatur, sed minus quam succus. extergit tamen, & propterea ad ossa denudata, & ulcera maligna conducit. Exterget enim & siccatur, & carne replet citra mordacitatem. Semen calidum existens menses ducit.

Pentaphyllum, Quinquifolium, Mercurij herba.

Quinquifolium, quæ *Mercurij* herba dicitur, radicem habet siccantem in tertio ordine, minime uero acrem. quapropter multi usus est & tenuibus partibus præditum.

Peplion.

Peplij semen in usu est: Ducit bilem unā cum pituita. flatus quoque discutit uelut Hippocrates scribit.

Pepon.

Pepon maturus substantiæ tenuioris est: Immaturus crassioris, absterforia autē et incisoria facultate participat. Vnde & urinā ciet, & corpus illustrius reddunt, præsertim si quis semen siccet, deinde tuso & cribrato pro smegmate utatur, ad maculas solares, & faciei lentigines, ac uuliginēs in superficie herentes. Dominatur in ipsis humida & frigida temperatura, suntque secundi ordinis in utraque. semen & radix sicca secundi ordinis initio consistunt. Vis exterforia amplior est in radice quam carne. Caro comesta unā cum extersione & urinas ciet, & infernè secedit magis quam cucurbitæ: at uero semen magis extergit, ut etiam calculosis renibus conducat. Cæterum uisiosum succū in corpore gignit pepo, magisque si non probè concoquatur. Tunc enim cholericos quibus & supernè & infernè bilis prorumpit, efficere solet. Nam & prius quam corrumpatur ad uomitum aptus est, si amplius edatur, & si quis non ab eius esu boni succi edulium ingerat, omnino uomet.

Piper.

Piper recens pullulans, longum est, quapropter & humidius existit. Quod uero uelut fructus immaturus est, album piper est, acrius nigro existens. Nigrum enim uelut superassatum iam & superreficatum est. Vtrumque autem fortiter calcificat ac siccatur.

Peristereon, Verbenaca, Veneris herba, Sacra herba.

Verbenaca, quam *peristereona*, & *ueneris* herbam, ac *sacram* herbam appellant, capitis dolorem egregiè tollit, inquit Archigenes, coronæ modo imposita, trita quoque cum aceto & rosaceo illita, & cocta cum oleo, indeque rigato capite, omnem ueterē capitis dolorem sanat, & defluos capillos cohibet. Decoctū radicis calidum ore retentum, dentium dolorem sedat. & motos dentes firmat, & oris ulcera sanat. Cæterū ad colicos radicem crassius tufam ex aqua ad dimidias coquito, & ad dies quinque potui dato. Constat hoc experimento. At uero calculosis & incipienti elephantiasi, decoctum similiter dato ex aqua mulsæ. Vtere similiter & ad comitalem morbum, & ad febres quotidianas ac quartanas. Verū ad podagricos & Ischiadicos in uino decoctā exhibebis. Radice exuata fistulæ optime colluuntur, maxime mori succo & melle ammixto. Eadem radix usta itemque sicca inspersa, fistulas sanat. Quin & melle cocto excepta, fistulæ collyrii modo inditur, & præter opinionem opitulatur.

Persea.

Perseæ folia astringentis facultatis moderate participia sunt, ut & partibus è quibus sanguis erumpit, commodè imponi possint. Eadem arida trita pruritus sedant affricta.

Perdicias.

Perdicias relata est in quinto elemento, ubi *Elxinen* ipsam appellauimus.

Pæonia.

Pæonia relata est in tertio elemento, ubi *glycysiden* ipsam appellauimus.

Petroselinum.

Petroselinij semen maxime in usu est. Herba ipsa imbecillior existit. Semen calidum est & siccum tertio ordine, & incidendi uis præditum. Itaque menses ciet & urinas ubertim, insuperque flatus discutit.

Peucedanum.

Peucedani radice maxime utuntur, liquoreque ac succo eius. Omnia eandem uim habent, fortior est autem succus multum calcificans ac discutiens. Vnde & nervorum affectionibus conuenit, & morbis pulmonis ac pectoris, ex crassitudine aut uiscositate humorum abortis, tum intra corpus sumptus, tum odoratu. Quo modo & lienes induratos sanat. Radicis usus ad eadem competit, sed & ossium squamas celerimè disparat. & sicca malignis ulceribus inspersa optime medetur. purgat enim & incarnat, & usque ad cicatricem perducit, calcificans quidem ordine secundo, siccans autem tertij initio.

Peganum, Ruta.

Ruta syluestris quarti ordinis est calcificantiū ac siccantiū, salua tertij. Estque non solum acris, sed & amara, unde & uim secandi ac discutiendi crassos & uiscosos humores habet, & per urinas euacuat. Et sanè tenuiū quoque partium est, & flatus discutit, & ob id inflationibus conducit, & uenereos impetus suppressit, ac præclare siccatur. nā inter medicamenta fortiter siccantia censetur. Rufus hæc uerba prodit: Syluestris rutæ uis ignea est & ulceratoria, maxime uesicæ. Quapropter etiam qui podagricum pharmacum bibunt, ex ruta syluestri cōstans male affectam uesicam acquirunt. quicunque tamen hoc medicamentum sustinuerint, manifestam opem ferunt. Nam ad arthriticos præci-

puè cōmodum, est. Quod si de satua ruta quid am-
miscueris, securius erit, quanquam & ipsa satua ue-
fica incōmodet, sed minus quàm syluestris. Vtūtur
syluestri in quibus perfrigeratum quid resouere vo-
luimus. prodest & hydropi flatuoso, & ei qui sub-
tercus appellatur, prodest & morsis à uispera aut mu-
re araneo, & magis si prægnaus mus araneus mo-
morderit, & præsertim animalia subiugalia. Est &
forte medicamentū ad papaueris succū potum, & ad
aconitū cū uino. Satua ruta rigores per circuitū re-
petentes mitigat pota ante accessiones. mitigat & co-
licos dolores potū & infusum, itemq; uteri strangu-
latus. Vīsum acuit in cibo sumpta, & propterea pl-
etores assidue eam degustantes, acutius cernūt. Quin
& melle mixtus succus ipsius, medicamētum euadit
uisum exacuēs. Auxiliatur & urinæ difficultati cō-
eta ex oleo, indeq; uelica fota, neq; est aliud medica-
mētum quod huic hac parte prætuleris. Cæterum in
lumborū dolore & spirādi difficultate, data ex aqua
mulsa confestim opitulatur. In lethargicis pota &
infusa per clysterem, ualde cōmodat. Sed & tritam
cum rosaceo & aceto capiti ipsorū illinere oportet.
Solut & coxendicum dolores pota, & in cataplas-
mate imposita, & infusa per sedem. In cataplasmate
imposita podagricis genua inflata habentibus, cito
auxiliatur, & dolores mox lenit. Crustas etiam car-
bunculorum cito disparat, in cataplasmate imposita
cum melle aut uuis pallsis.

Pix.

Pix arida siccatur & calfacit secundo ordine, plus autem
siccatur quàm calfacit. Liquida cōtra plus calfacit quàm
siccatur. Habet & quid tenuiū partiū, quod & anhelos-
sis, & suppuratis pectore opitulatur. Satis est delin-
xisse cyathi unius mensuram melle ammixto. Habet
utraq; & extersorium quiddam, & cōcoctorium, ac
discussorium. Quare & scabros ungues extrahunt
addita cera, & impetigines exterunt. Cōcoquunt &
duros ac crudos tumores omnes cataplasmatīs am-
mixtæ. Ad omnia hæc præstat liquida. Sicca ad hæc
deterior est, sed ad uulnera glutināda accōmodatior.
Fuligo ex liquida pice sic paratur. In lucernā nouam
funiculo instructā ellychnio, liquidā piceā mittes,
incensamq; ac fictili uase opertā, uelut in thure dictū
est, fines, & priore cōsumpto liquore, aliū infundes,
donec fuliginē sufficere collegeris. Vīsus est ad palpe-
bras ornādas, & ubi pilos producere oportet, & ad
oculos imbecillos ac lacrymosos & ulcerosos.

Pistacia.

Pistaci fructus substantiam tenuiū partiū habet, quæ
& subamarum quiddam & aromaticum. in se com-
plectitur. Quapropter obturata expedit & expur-
gat, præsertim circa secur, imò & pectus & pulmone.

Pityides, Nux pinea, Nux picea.

Pityides appellantur fructus pinorū, quidam etiam
picearum sic appellant. Sunt autem mixtæ facultatis,
nimirum & adstringentis, & acrimoniā quandam
cum amaritudine possidentis. Vnde & refectionibus
ex pectore ac pulmone conferunt.

Pini cortex.

Pini cortex prædominātem uīm adstrictoriā habet,
in tantum ut intertrigines inspersus optime sanat, &
ambusta ad cicatricem perducatur, & alium fluidam
supprimat si potetur. Sed & piceæ cortex huic simi-
lis est, uerū uiribus debilior. Virtusq; arboris folia

uīm glutinandi uulnera habent. Fuligo porrò ex his
ad palpebrarū defluuia, & humectos acerosos ocu-
lorum angulos, itemq; lacrymosos utilis est.

Platanus.

Platanus humidior ac frigidior substantia non mul-
tum à moderatis abscedit. Vnde et folia uiridia trita
in cataplasmate imposita, inflammationibus quæ ad-
huc generantur non obscure opitulatur. Cortex eius
& pilulæ sicciorē uīm habent. Quare cortex quidem
aceto coctus, ad dentium dolores adhibetur. Pilulæ
uero cum adipe, ad ulcera ambustorum. Quidā cor-
ticem exurunt, & medicamentum extersorium effi-
ciunt, quod cum aqua quidem sanat lepras. Ipso au-
tem cinere per se insperso, ulcera uetera & ob nimiam
humiditatem sordida curantur.

Polygonum.

Polygonum habet quidē & adstrictorium quiddam.
Dominatur autē in ipso aquosa frigiditas, ut secūdi
ordinis sit completi, aut tertij incipientis inter frige-
facientia. Vnde et stomacho exusto prodest, foris in
cataplasmate imposito, quemadmodū & calidis in-
flammationibus. Fluxiones enim repellit. Quare &
herpeti commodum pharmacum est, & ulcerum o-
mnium, maxime inflammationum & fluidorum, item
quæ in auribus sunt, nam pus resiccat. Sistit & flu-
xum muliebre, & dysenterias, ac sanguinis re-
fectionem. Ad omnia uero masculinum ualidius est &
præstantius.

Polemonium, Philetæron, Chiliodynamon.

Polemoniū aliq; philetæron, aliq; chiliodynamon uocat,
tenuiū partiū & siccatoriā uīm habet. Quare qui-
dam radicem ipsius cū uino ischiadicis, & dysenteria-
cis, & ad induratum lienem bibendam præbent.

Polium.

Polium amarū est & mediocriter acre, itaq; omnia ul-
cera obturatione liberat, & menses ac urinas ciet, &
uiride quidem glutinat uulnera, siccum autem mali-
gna ulcera sanat. Præsertim minus poliū, quo & ad
antidotos utimur. Nā & amarius est, & acrius quàm
maius, ut tertij ordinis sit siccantium, secūdi comple-
ti calfacientium.

Potamogeton.

Potamogeton adstringit & frigefacit, similiter ut po-
lypodium. Verum crassiorum partiū substantiam
quàm polygonum habet.

Polypodium.

Polypodium dulcem simulq; austeram qualitatē præ-
dominantem habet, ut uīm habeat multum siccātem
circa mordacitatem.

Prasion, Marrubium.

Marrubium calfacit secundo ordine cōpleto, siccatur ter-
tio cōpleto. Iecur & lienem obturatione liberat, pec-
tusq; ac pulmone expurgat, & menses prouocat,
& ietericos per nares purgat. Facit & ad aurium do-
lores iam inueteratos. In cataplasmate impositū ex-
terget & discutit.

Prasum, Porrum.

Porri acré uīm possident uelut cepæ, & iuxta propor-
tionem calfaciūt corpus, & crassos in ipso humores
attenuant, & uiscosos secant. Cient & urinā & san-
guinem expurgant. Optimus usus est ipsorū bis co-
ctorum. Nam sic comesta acrimoniā exuunt, & suc-
ei uisum non amplius habent. Abstinedum est autē
à frequēti usu omnium acrium, & præsertim si is qui
accipiat

accipiat natura biliosior existat. Solis enim his qui pituitosum humorem, aut crudum, aut crassum, aut viscosum coaceruarunt, hæc edulia comoda existunt.

Propolis.

Propolis exterioriam uim non ualidam habet, attractoria autem satis ualentem. Est enim substantie tenuium partium, & calfacit secundo ordine completo, aut tertio initio.

Ptelea, Vlmus.

Vlmi folijs aliquando uulnus recens glutinauimus: adstringunt enim & extergunt. Cortex eius amarior est, & magis adstringit, quare & lepram sanat cum aceto. Radices eandem uim habent. unde quidam decocto earum fracturas fouent ad callum recipiendum.

Pteris, Filix.

Filidis radix in usum uenit: occidit enim lumbricos latos quatuor drachmarum pondere in aqua mulsâ posita. Fœtus quoque uiuos quidem enecat, mortuos uero expellit, sed & ulceribus inspersa, ea citra mordacitatem siccatur.

Pyrethrum.

Pyrethri radix maxime in usu est, uisoria uim habens, per quam dentium perfrigatorum dolores lenit, affricatur & cum oleo in rigoribus per circuitum repetentibus, ante accessionem. Stupefactis etiam ac resolutis conducit.

Pyri, Triticum, Amylum.

Triticum extra impositum primi ordinis est calfacientium, & tamen neque siccare manifeste neque humectare potest. Quod ex ipso fit amyllum, frigidius & siccius ipso euadit. Amyllum ideo dictum, quod sine mola fiat. Panis triticeus cataplasma discussoria uim habet, nimirum quum sal & fermentum panis assumplerit. Habet enim fermentum uim attractoriam ex alto, simulque discussoriam.

Rhamnus.

Rhamnus secundo ordine siccatur, frigefacit primo completo, aut secundi initio. unde & herpetas sanat, & erysipelata non ualde calida.

Raphanus.

Raphanus calfacit tertio ordine, siccatur secundo. Discussoria uim habet adeo ut sugillata diuturna, aliaque liuefacta sanet cataplasmatibus modo impositus. uerum ut obsonium magis quam alimentum, attenuantis facultatis est simulque calfacit. Quare merito mirari subit illos qui a coena ipsos crudos edunt, bonæ coccionis ergo. Etenim ipsi magnam eius rei experimentum se fecisse iactant, uerum nemo citra læsionem ipsos imitatus est.

Rheon Ponticon, Rha.

Rheon ponticon aliqui rha appellant, mixtam autem facultatem habet, adstringentem & calfacientem, & tenuium partium. Vnde & rupta, & couulsa, & erecta ceruicis spirationem emendat potum. Hæmoptoicis item ac coeliacis & dysentericis prodest. Impetigines quoque & liuefacta per sanat, cum aceto illitum.

Resinæ omnes.

Omnes resinæ siccant & calfaciunt. Differunt inter se secundum quod magis aut minus habent acrimoniae in sapore, & calidæ facultatis, & simili modo iuxta alias qualitates, quod aliarum magis, aliarum minus participes existunt. Omnibus autem præfertur lentiscina, mastiche appellata, propterea quod parum adstrictionis possidet, ut & stomachi & uentris ac hepatis debilitati conducatur, insuperque & citra molestiam siccet. Est autem maxime tenuium partium, mi-

nimeque acris. Inter reliquas terebinthina principatum obtinet, non similiter ut mastiche adstringens, sed discutit magis quam mastiche, & extergit in tantum, ut & scabiem deterat, & ex alto attrahat, magis quam cæteræ resinæ, quod etiam magis tenuium partium existat. Habet & quid mollitoriū amplius quam mastiche. Aliæ porro omnes resinæ acriores hac sunt, pro maioris ac minoris acrimoniae ratione. Siccissima omnium resinarum est sicca pinus resina, quam priuatim pinus physema appellant.

Resinæ quomodo urantur.

Vritur omnis resina liquida in quadruplici uase, liquoris infundendi respectu. Oportet enim resinæ quidem congium unum, duos uero pluuialis aquæ in cacabum diffundere, & ad prunas leniter coquere, assidue agitando, donec resina odorem perdat, friabilisque fiat, & penitus exarescat, ut etiam digitis confringi possit. quod ubi contigit, refrigeratam in fictili uase repones. Fit autem hoc modo excellenter alba. Oportet tamen urendam resinam prius excolare, & sordes ab ipsa separare. Vtuntur & citra aquam, primum quidem eliquatæ ac colatæ, deinde coctæ ad prunas per totum diem, assidue agitando, & ubi penitus expirarint tolluntur, ac reponuntur uelut dictum est. Excipitur ex resina etiam fuligo, uelut in thure prædictum est, & confert ad calliblephara, quæ ornatis palpebris deseruiunt, & ad lacrymosos oculos, & corrosos ipsorum angulos, & glabras oculorum genas. Torrefacta uero resina utilis est ad odorata malagmata iteque acopa appellata.

Rosæ.

Rosarum facultas ex aquosa calida, duabus alijs qualitatibus ammixta, adstringenti uidelicet & amaræ, composita est. Flos ipsarum adhuc magis quam rosæ adstrictorius est, & propterea etiam siccandi ui præditus.

Rhododaphne.

De rhododaphne diximus, ubi nerion ipsam appellauimus.

Rhoa, malum punicum.

Omne malum punicum adstringentis facultatis particeps est, non tamē ut ea omnino prædominetur: sunt enim aliqua ex ipsis acida, quædam dulcia, quædam austera. Quare ex his quæ in malorum tractatu diximus, etiam de his cōflectare licet. Succum autem uberiores habent quam mala aut pira, saporemque insuper iucundiores quam illa habent, & aliquando ad plures affectiones quam illa comodant, cum aliis, tū si quando stomachus ob uitiatorum humorum redundantiam morsum percipit. quo sanè tempore succus ipsorum cum polenta exhiberi debet, uelut Hippocrates in foemina cardialgus facendum præcepit, quæ uidelicet oris uentris morsum & dolorem percipiebat. Acini puniceorum magis adstringunt quam succus, magis quoque siccant. his uero amplius adhuc cortices. Quibus consimilem uim etiam cytini possident.

Rhus.

Rhois folium adstringit et siccatur, hoc coriarum tinctores utuntur. Medicis fructus & succus magis in usum ueniunt, multum austeram qualitatem habentes. Siccant enim ordine tertio, perfrigerant secundo.

Rhypos, Sordes, Patos.

Sordes à statuis gymnasiarum discussoria est & mollitoria crudorum tuberculorum. Quæ uero in palæstris colligitur, patosque Græcis appellatur, optimū

medicamentum est inflammatarū mammarum. Nā & feruorem extinguit, & influentia reprimi, & cōtentum discutit.

Sagapenum.

Sagapenum succus est calidus & tenuium partium, uelut reliqui succi. Habet & quid extensoriū, per quod cicatrices in oculis depurgat & attenuat. Quin & suffusionibus & hebetudini uisus, ex humorū crassitudine obortis commodum pharmacum existit.

Sampfuchum.

Sampfuchum tenuium partium ac discussoriam uim habet: siccatur enim & calfacit tertio ordine.

Saprotes xylon, Caries lignorum.

Caries ac putredo lignorum, maxime eorum quæ adstrictionis simulq̃ extersionis participia sunt, uelut est ulmus, humida ulcera optime purgat ac replet.

Sarcocolla.

Sarcocolla lacryma est arboris persicæ, mixtis uisibus prædita, ex substantia quadam meatus obducēte, & modica quadam amara. Vnde leuiter siccatur, & sic uulnera glutinat.

Satyrion.

Satyrion quidā etiam trifolium uocant, humidum est & calidi temperamentī, quapropter & gustantibus dulce apparet. Superflua tamen & flatuosam humiditatem possidet, & propterea ad uenerē stimulat. Quod etiam radix herbæ facere solet. Quidam tradunt etiā opisthotonum, hoc est, neruorum retrorsum distentionem per ipsam sanare ē uino austero potam.

Selinum, Apium.

Apium in tantum calidum est, ut & urinas & menses cieat. Flatus quoq̃ discutit, & magis ipso semine.

Seris, Cichorium, Picris.

Seris siue cichorium subamarum olus est, & magis uicq̃ syluestre, quod propterea picris Græcis appellatur. Est autem syluestris, frigida ac sicca temperaturæ primo ordine. Satiua magis frigefacit quā syluestris, uerum ob multæ humiditatis mixturam, siccandi uim perdit. Viraq̃ autem adstringentis qualitatis particeps est, quēadmodum & chondrilla. Nā & hæc seridis species existit.

Seseli.

Seseli & radix & semē in tantū calfaciūt, ut urine ciedæ sufficiant. Est autē tenuiū partiū, ut & morbo commitali, & spirationi quæ recta ceruicē sit, conducatur.

Sesamum.

Sesamum nō modicā uiscositate & pinguitudinē in se habet, unde & meatus obducit & mollit, & moderate calidū est. Eandē uim habet & oleum ex ipso.

Sideritis.

Sideritis habet quidem quid extensorium, sed maior pars ipsius humida est, & moderate frigida, estq̃ modicæ cuiusdā adstrictionis particeps. unde & inflammationes arceat, & glutinandi uim habet.

Sicya, Cucumeres.

Cucumeres satui urinā cieūt, uelut etiā pepones, sed minus quā illi, propterea quod & substantia ipsorum minus humida quā illorū existat, & ob id neq̃ ita facile corrumpuntur in uentre uelut pepones. Quidā ipsos cōcoquūt familiaritate quadā naturæ ad ipsos, & ubi in hoc consiliū securē eos ingesserint, ignorant quod tēporis progressu uitiosum & moderate crassum succū, ex ipsorū esu in uenis coaceruarūt, qui sanē succus ubi putrescere inceperit, febres malignas

inducit. Quapropter ab omnibus mali succi edulq̃ abstinere cōsultū esset, etiā si aliq̃ facile ipsa cōcoquāt. Sicyos agrios, Cucumis syluestris, Elaterium.

Cucumeris syluestris seminis succus siue liquor, qui elaterium appellatur, imō etiam radicis & foliorū succus, utiles sunt ad medendum. Elaterium itaq̃ menses cieat, & foetus appositum perdit. Summe enim amarum est, & modicē calidum, ut secundi ordinis sit calfacientium, & ob id etiam discussoriā uim habet. Itaq̃ & angina laborantes quidam ex ipso illinunt. Infunditur & ictericis in nates cum lacte muliebri, atq̃ hoc modo etiam capitis dolores sanat. Ceterum succus radicis & foliorū imbecillior est quā seminis. Sed & ipsa radix consimilem uim habet. Nam & extergit, & discutit, & mollit. Verū cortex ipsius maiori siccatoria uī præditus est.

Silphium.

Silphij calidissimus quidē succus est, sed & folia, & caulis, & radix generose calfaciūt. Suntq̃ omnia flatuosioris & aëreæ substantiæ, & propterea etiam ægre cōcoquuntur. Forinsecus tamē imposita efficaciora sunt, & maxime omnīū succus, attractoriā uim habens, corporis itē molem consumens ac colliquans.

Sinon.

Sinon calidi & subamari saporis est, unde & urinam cieat, & cōcoctorius existit, & menses prolicit, & oburationes uiscerum expedit.

Sion.

Sion in quantum aromaticum saporem habet, in tantū calfacientis & siccantis facultatis particeps est. Discutit autem, & urinam cieat, & calculos renū atterit, & menses ducit.

Sisymbrium.

Sisymbrium tenuium partium & discussoriam, calfacientiamq̃ ac siccatoriā uim tertio ordine habet. Semen quoq̃ ipsius tenuium partium & calidum est. Quare quidam id cum uino singultientibus & torminosis bibendum præbent.

Scandix.

Scandix syluestre olus est consimile gingidio, subacre & subamarum, ut in siccādo ac calfaciēdo tertij ordinis sit exoluti. Urinam etiam cieat, et uiscera obturatione liberat.

Scilla.

Scilla incisoriā uim abunde possidet, non tamen fortiter calidam, sed in secundo ordine calfaciendum.

Scolymus, Carduus.

Cardui radix multam urinam foetidam ducit, si uino decoctam quis bibat, & propterea alarum & totius corporis foetores sanat. Calida est tertij ordinis initio, sicca secundo.

Scordion.

Scordiū ex multiformi facultate constat. Nam & amarum quid & acerbū & acre habet. Expurgat itaq̃ simulq̃ calfacit uiscera, & menses & urinas mouet, & uulsa & rupta ac laterum dolores ex obturatione factos sanat potū. Viride cataplasmatibus modo impositum, uulnera magna glutinat. Aridū inspersum, sordida repurgat, & maligna ad cicatricem perducit.

Scorodon, Allium.

Allium calfacit ac siccatur quarto ordine. In cibo sumptum flatus dissipat, & sitim extinguit, & crassos uiscososq̃ humores secādo obturatione liberat. Habet & quid medicatum & mali succi, quod abijcit aqua coctum,

coctum. Fuglendus est eius assiduus usus, praesertim in calidioribus habitudinibus.

Smyrna, Myrrha.

Myrrha secundi ordinis est calfacientium ac siccantium. Insuper capitis uulneribus, ea glutinare potest. A maritudinis autem non modicae particeps est, per quam & lubricos, & foetus occidit ac eijcit. Habet & quid exterforium, unde & ocularibus compositionibus additur, quae ad ulcera & cicatrices crassas compositae sunt. Miscetur & in anhelosorum ac tussientium auxilia, item in arteriacas compositiones: non enim exasperat arteriam.

Smyrnium, Hippofelinon.

Smyrnium, alij hippofelinon uocant, ex eodem genere est cum apio & petroselino, uerum semine nigrum & multo maius habet, & est aplo ualentius, petroselino imbecillius: calfacit ac siccatur ordine tertio, menses ducit, & urinas ciet.

Sonchus, Cicerbita.

Sonchus uiridis adhuc & tener, uelut alia syluestria olera, comeditur. Cōponitur ex aquosa & terrea substantia, utriusque frigidis, & adstrictionis quid habet. Manifeste itaque perfrigerat, tum stomacho cataplasmatibus uice impositus, tum in cibo acceptus.

Spartum, Genista.

Sparti quo uites apud nos ligant, & fructus, & uirgarum succus attractoriam uim non instrenuam possident.

Stacte.

Stacte appellatur recentis myrrhae pinguitudo, si cum aqua modica tūdatur, & per organum exprimatur. Est autem ualde odorata & preciosa, & per se unguentum, quod stacte appellatur. Probatum quae nihil olei admixtum habet, & modica sui parte multam uim calfactoriam possidet, ad proportionem myrrhae & unguentorum calfacientium.

Staphylinus, Pastinaca, Daucus.

Pastinaca satua imbecillior est, syluestris, quae et daucum appellant, ad omnia fortior, urinas mouet, & menses prouocat. Habet & quid exterforium in sese.

Stoechas.

Stoechas amaræ & adstringentis qualitatibus particeps est. Est & tenuium partium ex odoris argumento. Itaque & obturatione liberare, & attenuare, & roborare, tum uiscera omnia, tum totum corporis habitum potest.

Struthium, Herba lanaria.

Struthii radix in usu est, calida & sicca quarto ordine existens. Est autem exterforia & irritatoria, propterea quae sternutamenta mouet.

Syrax.

Syrax mollit, calfacit, cōcoquit. Quapropter & tussis, & destillationes, & grauedines ac rauedines sanat, mensesque promouet potius & appositus. Fuligo ex ipso fit uelut ex thure, quae eandem quoque uim habet.

Staphyle, Vua.

Vua magis quam omnes temporarii & subcanculares fructus, horum Graecis appellati, nutrit, & maxime ubi probe fuerit concocta. Minus autem nutriunt uuae quam ficus, & quod in ipsis precipuum est cito secedunt. Quare si quando retineantur, satis multum offendunt. Neque enim probe concoquuntur retentae, sed & iuxta distributionem in hepar ac uenas, crudum succum generant, qui non facile in sanguinem transmutantur, tum propter externam cuticulam, tum propter uinacea, quorum substantia sicca & adstrictio-

ria existit. Quapropter recte faciunt qui haec ipsa uelut inuilia expuunt, & omnem internam carnem una cum succo exugunt, & sane uenter his magis subit. Reponuntur autem uuae in hyemem uariis modis. Alij in olla cōponunt, olla uidelicet diligenter operata, & operculo pice oblito, ut nullatenus perspiraret aut persfletur. Atque talis uua exolutum uentrem firmat, & deborum appetentiam excitat, non tamen aluo secedit, & uberius ingesta, caput tēat. Sed adhuc magis capitis dolore inducit quae in musto seruatur. Pensilis autem caput nihil omnino laedit, uentrem uero neque sistit, neque promouet. Similiter neque infirmam appetentiam excitat, neque firmam exoluit. Uuae quidem igitur dulces calidiorē succum habent. Quapropter sitim inducunt, & uentrem subducunt, praesertim ubi humectiores fuerint. nam inter calfacientia ac perfrigerantia medio modo habent. At uero acidæ & austeræ, & quae cuticulam crassiorē habent, non solum praedicta uitia habent, sed & concoctionē in uentre & distributionē ac nutritionē impediunt. Ceterum in summa de escariis fructibus id nosse oportet: Humidos, humidum & tenue alimentum corpori praebere, & quod uniuersum corpus transeat ac cito penetret, facileque & per urinam & per eum euacuetur. Contra solidorum compage fructuum, alimentum quod corpori accedit crassum est, & transitus tardiores, praesertim ubi crassum aut uiscosum aut adstringentem succum in se habuerint.

Syca, Ficus.

Quod non solum autumnales, sed etiam temporarii ac aestiui & subcanculares fructus, horum Graecis appellati, comune habent, id & ficibus adest. nam neque ipsae succi malitiam effugere potuerunt. Verum hoc commodi ficibus inest, quod facile per uentrem transeat, & totum corpus penetrēt. Nam & uim exterforiam memorabilem habent, & nephritici ex ipsarum esu multa arenosa excernunt. Alimentum autem praebent corpori non solidum, sed laxum, & ipsum uentriculum flatu implent. Verum ob transitus celeritatem, flatu illi non durant, & ea gratia minus quam reliqui fructus nocet. Et sane ficus exacte matura ferè nihil noxii habet. Ficus uero siccae calidiorē uim possident secundi ordinis initio. Habent & quid tenuium partium, quod ad multa conducit. Illud tamen mali ex nimio ipsarum esu accedit, quod non ualde bonum sanguinem caricæ gignant. Vnde & pediculorum copia ad earum esum consequitur. Si uero uiciosus succus iam tum in uentre contineatur, caricæ comestae extreme laedunt, augent autem humorum maliciam in uentre corruptae, & inferne non secedentes. Vim habent attenuantem & incisoriā, ob quam etiam uentrem ad excretionem incitant, & renes expurgant. Iecori & lieni inflammatis quidem noxiae sunt, quae admodum etiam uirides ficus, iuxta communem rationem omnium dulcium. Iisdem uero obturatis aut induratis, cum thymo aut pulegio, aut thymbra, aut calamintha, aut origano, aut pipere, aut zingibere, multo ante reliquum cibum tempore intercedente medici praebent. Qui uero cum aliquo crassiore edulio ficus edunt, itemque caricæ, non paruam lesionem incurrunt. Ficus siccae duros tumores concoquunt ac discutunt, ob partium tenuitatem, si in cataplasmate imponantur. Decoctum quoque ipsarum cōsimilem uim habet. Ceterum ubi concoquere uelis, triticeam farinam ammisceris, ubi discutere, ordeaceam.

cream. Et pinguiore quidem caricæ, tumores concoquunt, acriori uero sapore præditi extergent ac discutunt. At uero mellitum ex ipsarum in aqua coctura paratur, uim mellis similem habet.

Symphytum petreum.

Symphytum petreum ex contrariis facultatibus constat: habet enim quid incisoriū, quo pus in pectore ac pulmone contentū expurgat. Habet & quid adstrictorium, quod ad sanguinis reiectiones auxiliatur. Verum ob humiditatem, commanducatum suū extinguit, & arteriæ asperitates lenit. At uero ob omnes prædictas facultates, etiā intestinorum herniis imponitur, & ad cōuulsa, ac rupta cū aceto mulso bibitur.

Sycomoræ.

Sycomorum fructus forma ficibus similis est, sed acrimoniam nullam possidet, modicæ dulcedinis participes, humectior & frigidior quodāmodo uis sua exstans, uelut mora. Et sanè in medio mororū ac ficū merito locatur, unde etiam nomen habet.

Schinus, Lentiscus.

Lentiscus arbutum ex substantia aquea leniter calida, & terrea frigida nō multa compositum est, propter quam etiam moderate adstringit. Siccat igitur tertij ordinis initio, iuxta caliditatem uero & frigiditatem temperatū est. Simile uim in omnibus suis partibus possidet, unde & per se, & cum alijs medicamentis bibitur, ad coeliacas affectiones, & dysenterias, & sanguinis sputa, & sanguinis ex utero eruptiones, prolapsæ quoque sedis ac utero præcipitato commodat, propemodum uelut hypocystis.

Schœni siue iunci rotundi odorati flos.

Iunci odorati flos calfacit moderate, & adstringit moderatius, participes est & tenuium partium facultatis, unde & menses ciet, & urinas ducit, in fomentis, & potu, & cataplasmaris adhibitus. prodest & hepatis & uentris ac stomachi inflammationibus.

Schœnos lea, Iuncos leuis, Oxyschœnus, Holoschœnus.

Iunci leuis altera species oxyschœnos, id est, acutus iuncus; altera holoschœnos, hoc est, tota iunce appellatur. Gracilior quidem & durior est iuncus acutus, crassior autem holoschœnus, & laxior. Huius fructus somnum inducit. Iunci acuti species duæ sunt. altera sterilis, & medicinae inuutilis. Altera fructifera, cuius item fructus somnum conciliat, sed minus superiorem. hæc & capitis dolorem inducit. Vtraque species torrefacta ex uino pota, fluxiones uentris siccat, & fluxum muliebrem rufum sistit. Et propterea temperamentum ipsarum terreum leniter frigidum esse indicatur, & aqueum leniter calidū, quapropter inferna siccat, & leniter ad caput decurrēs perfrigerat, atque sic somnolentos eos qui utuntur facit.

Terebinthus.

Terebinthi folia, cortex & fructus, habent quid adstrictorium, sed & calfaciūt ordine secundo. Fructus est propinquus tertio ordine siccantium. Quapropter & urinam ciet, & lienem prodest.

Teutlon, Beta.

Beta nitrosam quandam uim possidet, qua extergit & discutit, & per nares expurgat. Cocta nitrosam & acre deponit, & ad discussoriā leniter facultatē, uis arceendi inflammationes ipsi accedit. Alba extersioni ac disculsiōni efficacior. Nam nigra adstrictionis participes est, & magis in radice. Quum autē extersorium

succum habeat, etiam uentrem ad excretionem excitat, & stomachum quandoque mordet, præsertim illis quibus subtiliore sensu præditus est. & propterea incommodum stomacho eduliū est, si uberius ingeratur. Præstantior autē est quam malua ad hepatis oburationes, atque id magis ubi cū sinapi, aut aceto edatur, quomodo comesta etiam splenis conducit.

Tephra, Cinis omnis.

Lignorum exustorū aut aliarum materierū reliquiae, cinis appellantur. Constat ex contrariis substantiis & qualitatibus. Habet enim in se quiddam terreum, & quid fuliginosum. Fuliginosæ itaque partes tenuium partium sunt, & ubi cinis aqua maceratur & excolatur, simul decedunt. Quod autē relinquitur terreū, debile ac lene euadit, ut quod calidā uim in aqua deposuit. Porro non omnis cinis eandem uim exacte habet, sed iuxta uisæ materie differentiam uariant. Nam ex lignis acerbis, uelut quercinis & similibus, nō parum adstrictionis habet in terrea sui parte, unde & sanguinis eruptiones cohibet. Cæterum ficulneus cinis multū acrimoniæ ac uistoriæ facultatis in fuliginosa sui parte possidet. In terrestri uero parte uim extersoriam. Cōsimilis huic est & cinis ex thymallis. Est autem & itanus, hoc est, calx cineris species, magis tenuium partium existens, quam is qui ex lignis reliquus est. Calx itaque aqua exacte ter aut quater lota, & aqua diffusa, medicamentum euadit siccatorum citra mordacitatem. Quod si eadē aqua marina lauetur, discussoriam uim acquirit.

Telis, Fœnumgræcum.

Fœnumgræcum calidum est ex secundo ordine, siccum ex primo, participat & extersoria facultate, & propterea feruentes inflammationes exacerbat. minus calidas & induratas discutit. In cibi usum uarijs modis uenit, sed caput tentat amplius sumptum, præsertim absque pane ingestū. quibusdam etiā stomachum subuertit. Succus decocti fœnogræci, cum modico melle acceptus, omnes uisidosos humores intestinorū commodè subducit. Sed parum omnino mellis ammisceri debet, ne mordax existat. Cæterum in uetustis pectoris doloribus citra febrē, palmulas pingues simul cū fœnogræco decoquere oportet, & expressum succū ammixto melle rursus decoquere ad prunas donec moderate crassescat, atque ita eo uti multo tempore ante reliquum cibum intercedente. Vitādus tamē eius usus est in his qui caput læsioni obnoxiiū habet. Nam & palmulæ ipsæ caput tentant.

Tithymalli, Galactides, Characias.

Tithymalli omnes, qui & galactides appellantur, acris & calidam uim habent prædominantem. Inest ipsis & amaritudo. Fortissimus igitur est succus, deinceps fructus & folia. participes est & radix prædictarum facultatum, sed non ex æquo. Ipsa quidem igitur cū aceto cocta, dentium dolores & maxime erosorum sedat. succus quard ordinis est calfaciendum, qui iam uistorius existit. Quapropter illud succi pilos denudant, sed uehemens ipsorum uis oleo ammixto mitigatur, & si frequenter id fiat, radices pilorum exuste penitus extirpantur, & corpus glabrū redditur. Eodem modo & uerrucas, ac thymos ex eadem uerrucarum gente appellatos tollunt. Impetiginē quoque ac scabiē extergit. Cortex radicis eius qui priuatim Characias appellatur, in umbra siccatus, tussis & cribra tus, generose purgat potus. Oportet autem quatuor scrupu

serupulorum pondus à uespera in uino dulci mace-
rare, & manè excolatum uinum per panniculum te-
pessatum potandum exhibere.

Tragacanthus.

Tragacanthus succus est plantæ spinosæ, similem gum-
mi uim habens, quæ & meatus obducit, & acrimo-
niam obtundit, & sanè siccatur quoque similiter illi.

Tribulus.

Tribulus ex moderata humida, & frigida ac sicca sub-
stantia constat. Cæterum in terrestri terrea frigiditas
prædominatur, ob quam & magis adstringit. In a-
quatili uero aquositas, & propterea feruentibus in-
flammationibus conueniunt. Terrestris fructus renū
calculos atterit potus.

Triphyllon, Trifolium.

Trifolium Græci asphaltion è bituminis odore appella-
nt, estque calidæ ac siccæ facultatis in tertio ordine
ueluti bitumen, & propterea potum laterū dolores
ex obturatione obortos sedat, & urinā ac menses ciet.

Trychnon, Solanum.

Trychnon aliqui adiecto ad caput uocis litera τ *stry-*
chnon appellant, & hortense quiddam adstringit & frige-
facit ordine secundo. Quod uero *halicacabon* ap-
pellatur in foliorū facultate simile est hortensi, uerū
fructus eius urinā ciet. At uero cortex somniferi ap-
pellati de radice detractus, frigefacit similiter ut pa-
paueris succus, ut tertij sit ordinis perfrigerantium.
Fructus etiam huius urinam ciet, sed si plures quàm
duodecim corymbi sumantur, furorem inducit.

Yacanthus, Hyacinthus.

Hyacinthi radix bulbiformis primi ordinis est siccan-
tium, secundi perfrigerantium. Creditur pueros diu
impueres adseruare, si cū uino in cataplasmate im-
ponatur. Semē moderate adstringit & extergit, unde
ictericis datur ex uino. Siccatur ordine tertio, uerū
caliditatis & frigiditatis in medio consistit.

Ydna, Tubera.

Tubera terream substantiam prædominantem possi-
dent, modica tenuium partium ammixta.

Ydropiper, Hydropiper.

Hydropiper herbula est in aqua nascens, & folijs & ra-
mulis mentæ similis, maior tamen, gustu acris ue-
lut piper. semina fert parua iuxta singula folia, herba
calida quidem est, sed non quantū piper. Viridis im-
posita sugillata & duritias sanat. Utuntur quidam
ipsa unā cum semine pro condimento piperis loco.

Yoscyamus, Hyoscyamus.

Hyoscyamus cōmodissimus est ad medicinas, qui flo-
rem & semen album habet tertij ordinis perfrigeran-
tium existens; Reliqui uenenati sunt.

Ypericon, Hypericum.

Hypericum calfacit ac siccatur, substantiam tenuium par-
tium habes, ut & urinas & menses prouocet. Ad hæc
uero non modo semen, sed etiam folium conducit.
Viride in cataplasmate impositum, ulcera ad cicatri-
cem perducere potest, præsertim ambustorum. Siccū
tritum inspersum, humore flaccida & putredinosa ul-
cera sanat. Quidam etiam ischiadicis ipsum bibe-
ndum præbent.

Yssopus, Hyssopus.

Hyssopus calfacit ac siccatur ordine tertio. Estque tenuium
parium substantiæ.

Phaci, Lentesc.

Lentes nō ualide adstringūt, in caliditatis autem & frige-

giditatis medio consistunt. Siccant ordine secundo.
Itaque corpus ipsarum siccatur ac sistit uentrem. Deco-
ctum autem promouet. Quapropter ubi sistendi uē-
tris gratia sumuntur, prima aqua diffunditur.

Phacos palustris, Lens stagnorum.

Palustris lens humidæ & frigidi temperamenti est, ex
secundo ordine.

Phaseli.

Phaseli itemque ochri, mediæ quodāmodo edulia sunt,
inter ea quæ boni sunt, aut mali succi, facileque con-
coquantur aut ægrè, tardèque commeant, aut citò,
flatus expertia aut infantia, parum nutriencia aut
multum.

Phlomos, Verbascum.

Verbascum tres species habet, quarū radix acerba est,
unde & fluidis affectionibus auxiliatur. Quidā de-
coctus dentes in dolore colluunt. Folia omnium
discussoria & extensoria uim habent. Tertie u-
sus est lucernarum lumina, quæ propriè thryallis ap-
pellatur.

Phoenix, Palma.

Palma arbor abstringentis qualitatis particeps est in
omnibus suis paribus, ramorū succus austerus est.
similiter quod cerebrū uocatur, quod in cibi usum
uenit, fructus ipsius maximè dulcis, non modica ca-
lidityte participat, escarius & multi usus, tum forin-
secus adhibitus, tum intra corpus sumptus, ubi robo-
rare, & siccare, & cōstringere ac densare, & obtura-
re opus est. Omnes palmulæ ægrè concoquantur, &
capitis dolorem inducunt amplius comestæ. Qui-
dam ab earum esu morsum perdpiūt in ore uentris,
qui sanè etiam magis capite dolent. Succus qui ex ip-
sis in corpus distribuitur, crassus penitus est. Habet
& uiscosum quiddam, ubi pinguis palmula fuerit.
Quando autem crasso & uiscoso succo dulcedo per-
mixta fuerit, iecur celerrimè ab ipsis obturatur. Si
uero aut inflammatum fuerit iecur, aut induratum,
ab ipsarum esu extremè læditur. Consequenter autē
cum locinore etiam lien obturatur, ac læditur. Cæte-
rum multò magis lædunt palmulæ ulrides etiā pau-
lò uberius ingestæ. nam & flatu uentrem implent, &
crudis humoribus, & qui esitarunt rigoribus ægrè
calescentibus corripuntur. Porro germen tenerum
quod *Elaten* uocant, uim eandem cum cerebro ha-
bet. Quod uelut tegmen & uelamen ipsius est, adstri-
ctorium quidem est, uerum magis prædictis siccatur.
Est autem & radix arboris siccatorie citra mordaci-
tatem facultatis, & modicè adstrictoria.

Phu, Nardum creticum.

Phu radix nardo similem uim habet, debilior tamē ad
alia est, uerum urinam magis ciet.

Phycos, Alga, Fucus.

Fucus siue alga, muscus est marinus, qui uiridis exem-
pius frigefacit & siccatur ordine secundo. habet & quid
adstringens moderatè.

Chalbana, Galbanum.

Galbanum succus est ferulaceæ plantæ, mollitoriam &
discussoriam uim habens. Calfacit ordine tertio, sic-
cat secundo.

Chamedrys, Trixago.

Chamedrys amaram qualitatem prædominantem habet,
est & aliquo modo acris, unde & lienem colliquat,
& urinas & menses mouet, & crassos humores se-
cat, & uiscerū obturationes expurgat. Tertij ordinis
est

est calfacientium ac siccantiū. Decoctum ipsius diu-
tius coctum, & assidue potum, febre quartana corre-
ptos liberat.

Chamelæa.

Chamelæa amaram qualitatem prædominantem ha-
bet. Quapropter & sordida valde ulcera, & quæ ma-
ximas crustas habet, cum melle repurgare potest. Est
& pota ex purgantium numero.

Chameleuce.

Chameleuce calidam uim habet ordine tertio, siccam
primo. Vnde suffusa super carbones manifestè opitu-
latur ægrè spirantibus, si per infundibulum fumum
inde hauriant.

Chameleon.

Chameleonis nigri radix uenenosum quid habet, unde
eius usus forinsecus receptus est ad scabiem & im-
petiginem, ac uirginitē, & in summa ad ea quæ ex-
terfioe opus habet. Particeps est & mollitoris ac dis-
cussoriae facultatis. Siccatur ordine tertio, calfa-
cit secundo completo. At uero albi chameleonis ra-
dix pota ex uino austero, acetabuli mensura, latum
lumbricum expellit. Dant ipsam & hydropicis.

Chamæpitys.

Chamæpitys tertij ordinis est siccantium, secundi calfa-
cientium. Quum autem plurimum amara sit, & ter-
get uiscere magis quàm calfacit. unde in regio mor-
bo exhibetur, & omnino quibus secur facile obtura-
tur, commodum medicamentum existit. Ducit & men-
ses pota & cum melle apposita. Ciet quoque urinam.
Quidam ischiadicis ipsam præbent coctam in aqua

mulsa. herba ipsa uiridis magna uulnera glutinare
potest, & putredinosa ulcera sanare, & mammarum
duritias discutere.

Chelidonium magnum.

Chelidoniū magnū exterforiā & calidam uim abunde
possidet, succus eius uisum exacuit, his quibus cras-
sum quid quod discedi oporteat, circa pupillā colligi-
tur. Quidā radice usi sunt in morbo regio ex iecino-
ris obstructione oborto, ex uino albo dātes cū aniso.

Chelidonium paruum.

Chelidonium paruum maiore acrius est, unde in cata-
plasmate impositum cutem exulcerat, & ungues le-
proso extēit. succus eius per nares fortiter purgat
est enim quarti ordinis calfacientium ac siccantium.
Malus tertij in utrisque.

Chondrilla.

De chondrilla diximus quum de seride ageremus: est
enim seridis species.

Psyllium.

Psyllij semen maximè in usu est. Secundi ordinis est fri-
gescientium. Verum in siccando & humectando
medium locum occupat.

Ocymum Basilicon, id est, regale.

Ocymum secundi ordinis est calfacientium, habet & hu-
miditatem superfluam, unde neque utile est ipsum in-
tra corpus sumere. uerum forinsecus in cataplasmate
impositum ad discutiendum ac concoquendum cō-
modat. Decoctum ipsius lippiētibz ob crassioris
materiæ copiam, calidum pro fomento adhibuitum,
magnopere prodest, præsertim pueris.

AETII TETRABIBLI PRIMAE, SERMONIS PRIMI, FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN SECUNDO SERMONE AETII CONTINENTVR.

D e terra differentijs.	Caput 1.	Lapis Ageratus.	cap. xxii.	Salustus.	cap. xliiii.
Quomodo terram lauare oportet.		Lapis Asijs, & flos ipsius.	cap. xxiii.	Salis flos.	cap. xlv.
Cap	ii.	Gagates.	cap. xxiiii.	Salis spuma.	cap. xlv.
Quas medelas agrorum terra præstet.		Magnetes lapis.	cap. xxv.	Armeniacum pictorum.	cap. xlvii.
Cap.	iii.	Smirk, pumex, testæ clibani.	ca. xxvi.	Auripigmentum.	cap. xlviii.
De terra Lemnia.	cap. iiii.	Lapides in spongijs.	cap. xxvii.	Bitumen.	cap. xlix.
Rubrica.	cap. v.	Ostracites, geodes, Naxiae cotis retri-		Apbronitrum & litri spuma.	cap. l.
Terra Samia.	cap. vi.	mentum.	cap. xxviii.	Gypsum	cap. li.
Terra Selinusiæ & Chia.	cap. vii.	Ophites lapis.	cap. xxix.	Diphryges.	cap. lii.
Cimolia terra.	cap. viii.	Hieracites lapis & Indicus.	cap. xxx.	Diaphanes, lapis specularis.	cap. liii.
Terra Ampelitis.	cap. ix.	Vitrum.	cap. xxxi.	Sulphur.	cap. liiii.
Terra Cretica.	cap. x.	Lapis ætites.	cap. xxxii.	Acrugo rasa.	cap. lv.
De omni terra uisita.	cap. xi.	Alabandicus lapis.	cap. xxxiii.	Acrugo uermiculata.	cap. lvi.
De bolo Armenia.	cap. xii.	Electrum siue succinum seu lyncurium.		Cadmia.	cap. lvii.
Lapis hematites.	cap. xiii.	cap.	xxxiiii.	Cyanus.	cap. lviii.
Lapis schistos, galactites, melitites.		Iaspis uiridis.	cap. xxxv.	Squama eris ac ferri.	cap. lix.
cap.	xiiii.	Iaspis subuirdis.	cap. xxxvi.	Argenti spuma.	cap. lx.
Communis doctrina de omnibus lapi-		Iaspachates.	cap. xxxvii.	Litrum.	cap. lxi.
dibus.	cap. xv.	Sapphirus lapis.	cap. xxxviii.	Melanteria.	cap. lxii.
Leucographis aut moroxus.	cap. xvi.	Smaragdus lapis.	cap. xxxix.	Atramentum scriptorium.	cap. lxiii.
Galactites.	cap. xvii.	De metallicis & quæ ex aqua generan-		Misy, Sori, & chalcitis.	cap. lxiiii.
Thyites lapis	cap. xviii.	tur.	cap. xl.	Molybdæna.	cap. lxv.
Tecolithos.	cap. xix.	Adarces.	cap. xli.	Plumbum.	cap. lxvi.
Pyrites.	cap. xx.	Alcyonia.	cap. xlii.	Pompholyx.	cap. lxvii.
Lapis Phrygius.	cap. xxi.	Sal.	cap. xliii.	Rhoidarij preparatio.	cap. lxviii.

Sandaracha.	cap. LXIX.	De renibus.	cap. CXXV.	De canis fluuiatilis testibus.	cap. CLXXVIII.
Sandyx quæ & Syricum.	LXX.	De cerebro.	cap. CXXVI.	De canis terrestris catulo.	cap. CLXXIX.
Scoria.	cap. LXXI.	De terrestrium animalium uisceribus.	cap. CXXVII.	De Cygni pullo.	cap. CLXXX.
Stibium.	cap. LXXII.	De aluo, intestinis ac utero terrestrium animalium.	cap. CXXVIII.	De buccinorū testis ustis.	cap. CLXXXI.
Spongia.	cap. LXXIII.	De syluestrium animalium carne.	cap. CXXIX.	De galerita uolucris.	cap. CLXXXII.
Alumen.	cap. LXXIII.	De uolucrum animalium carne.	cap. CXXX.	De cochlea terrestri.	cap. CLXXXIII.
Calx.	cap. LXXV.	De anseribus & struthocamelis.	cap. CXXXI.	De menulis.	cap. CLXXXIII.
Eucus.	cap. LXXVI.	De gruibus.	cap. CXXXII.	De torpedine.	cap. CLXXXV.
Atramentum sutorium.	cap. LXXVII.	De partium uolucrum animalium differentia.	cap. CXXXIII.	De asello marino.	cap. CLXXXVI.
Chalcitis.	cap. LXXVIII.	De ouis.	cap. CXXXIII.	De ostreorum testis.	cap. CLXXXVII.
Aesustum.	cap. LXXIX.	Ouorum uis medicamentaria.	cap. CXXXV.	De purpurarū testis.	cap. CLXXXVIII.
Aeris flos.	cap. LXXX.	De alimento ex animalibus aquaticis.	cap. CXXXVI.	De squatinamarina.	cap. CLXXXIX.
Chrysocolle.	cap. LXXXI.	De cephalo.	cap. CXXXVII.	De sepia.	cap. CXC.
Cerussa.	cap. LXXXII.	De lupo.	cap. CXXXVIII.	De scinco.	cap. CXCI.
Psoricum.	cap. LXXXIII.	De trigla seu mulo.	cap. CXXXIX.	De tellinis.	cap. CXCI.
De materia medica ex animalibus.	cap. LXXXIII.	De piscibus petrosus.	cap. CXL.	De cicada.	cap. CXCI.
De sanguine.	cap. LXXXV.	De gobio.	cap. CXLI.	De hyena.	cap. CXCI.
De lacte.	cap. LXXXVI.	De piscibus mollis carnis.	cap. CXLII.	De harundinibus.	cap. CXCV.
De lactis differentia.	cap. LXXXVII.	De piscibus duræ carnis.	cap. CXLIII.	De electione optimorum medicamentorum.	cap. CXCVI.
De lactis differentia ab animalium habitu.	cap. LXXXVIII.	De piscibus testa intactis.	cap. CXLIII.	Ex Oribasio. quæ sint media inter calfacientia ac frigefaciētia.	cap. CXCVII.
De lactis differentia à temporibus anni.	cap. LXXXIX.	De crustatis.	cap. CXLV.	Quæ moderate calfaciūt.	cap. CXCVIII.
De lactis differentia à pabulo.	cap. XC.	De piscibus mollibus.	cap. CXLVI.	Quæ calfaciunt primo ordine.	cap. CXCVI.
De lactis differentia ab ætate.	cap. XCI.	De piscibus chartilagineis.	cap. CXLVII.	Quæ calfaciūt secundo ordine.	cap. CC.
Quibus lac conueniat.	cap. XCII.	De echinis marinis.	cap. CXLVIII.	Calfactoria tertij ordinis.	cap. CCI.
De modo, tempore, ac mensura utendi lactis.	cap. XCIII.	De falsamentis omnium animalium pedestrium, uolucrum & aquaticorum.	cap. CXLIX.	Calfactoria quarti ordinis.	cap. CCII.
Quibus lac noceat.	cap. XCIII.	De garo.	cap. CL.	Quæ frigefaciunt.	cap. CCIII.
De lactis coctura.	cap. XCV.	De muria.	cap. CLI.	Quæ frigefaciunt primo ordine.	cap. CCIII.
De sero lactis.	cap. XCVI.	De adipe pinguedineq; ac seuo.	cap. CLII.	Quæ frigefaciunt secundo ordine.	cap. CCV.
De his quæ iucunditatis gratia cum lacte coquuntur.	cap. XCVII.	De medulla.	cap. CLIII.	Frigefactoria tertij ordinis.	cap. CCVI.
De lacte acido.	cap. XCVIII.	De pulmone.	cap. CLIII.	Frigefactoria quarti ordinis.	cap. CCVII.
De primario lacte.	cap. XCIX.	De capitibus.	cap. CLV.	Quæ siccant citra mordacitatem.	cap. CCVIII.
De lacte concocto.	cap. C.	De cornibus.	cap. CLVI.	Quæ simpliciter siccant.	cap. CCIX.
De caseo.	cap. CI.	De ungibus.	cap. CLVII.	Quæ primo ordine siccant.	cap. CCX.
Pharmacum ex caseo uetere ad callosas concretiones podagricorum.	cap. CII.	De impetigine in pedibus equorum.	cap. CLVIII.	Quæ secundo ordine siccant.	cap. CCXI.
De efficacia recentis casei foris adhibiti.	cap. CIII.	De lanis succidis & puris & ustis.	cap. CLIX.	Quæ tertio ordine siccant.	cap. CCXII.
De butyro.	cap. CIII.	De pilis ustis.	cap. CLX.	Quæ quarto ordine siccant.	cap. CCXIII.
De coagulo.	cap. CV.	De osibus ustis.	cap. CLXI.	Quæ media sunt inter siccantia ac humectantia.	cap. CCXIII.
De felle.	cap. CVI.	De pellibus & corijs.	cap. CLXII.	Quæ primo ordine humectant.	cap. CCXV.
De sudore.	cap. CVII.	De uentriculo mergi.	cap. CLXIII.	Quæ secundo ordine humectant.	cap. CCXVI.
De urinis.	cap. CVIII.	De uulpibus.	cap. CLXIII.	Quæ aquosam frigiditatem habent.	cap. CCXVII.
De saliuā.	cap. CIX.	De aranearum telis.	cap. CLXV.	Quæ tenuiū partiū sint.	cap. CCXVIII.
De stercore.	cap. CX.	De ranis.	cap. CLXVI.	Quæ crassarū partiū sint.	cap. CCXIX.
De stercore canino.	cap. CXI.	De mustela.	cap. CLXVII.	Corroborantia.	cap. CCXX.
De stercore humano.	cap. CXII.	De terre intestinis.	cap. CLXVIII.	Concoctoria.	cap. CCXXI.
De stercore lupino.	cap. CXIII.	De dracone marino.	cap. CLXIX.	Suppuratoria.	cap. CCXXII.
De stercore caprino.	cap. CXIII.	De uipera.	cap. CLXX.	Mollientia.	cap. CCXXIII.
De stercore bubulo.	cap. CXV.	De herinacio marino.	cap. CLXXI.	Quæ indurant.	cap. CCXXIII.
De stercore ouillo.	cap. CXVI.	De herinaceo terrestri.	cap. CLXXII.	Extensoria.	cap. CCXXV.
De stercore columbino.	cap. CXVII.	De hippocāpis marinis.	cap. CLXXIII.	Quæ uasorum oscula aperiant.	cap. CCXXVI.
De gallinaceo stercore.	cap. CXVIII.	De cantharidibus.	cap. CLXXIII.	Rarefacientia cutem.	cap. CCXXVII.
De stercore anseris, accipitris, ciconia, & terrestriū crocodilorum.	cap. CXIX.	De cancris fluuiatilibus.	cap. CLXXV.	Densantia cutem.	cap. CCXXVIII.
Sordes ouium ex qua asypus.	cap. CXX.	De carabo siue locusta.	cap. CLXXVI.	Corrodentia.	cap. CCXXIX.
De carnibus.	cap. CXXI.	De testibus castoris.	cap. CLXXVII.	Reprimentia eminetias.	cap. CCXXX.
De extremis terrestriū animalium partibus.	cap. CXXII.				d Cica
De glandulis.	cap. CXXIII.				
De testibus.	cap. CXXIII.				

Cicatricem induentia. cap. CCXXXI.	CCXLIII.	Quae stomacho incommoda sunt. cap. CCLVII.
Exulcerantia in superficie. cap. CCXXXII.	CCXLIV.	Flatus expertia. cap. CCLVIII.
Vstoria. cap. CCXXXIII.	Quae atrabiliarium succum generant. cap. CCLVI.	Flatuosa. cap. CCLIX.
Attractoria. cap. CCXXXIII.	Quae biliosum humorem generant. cap. CCLVII.	Quae extergent, secant, obturatione liberant. cap. CCLX.
Discussoria. cap. CCXXXV.	Quae superfluitatibus redundant. cap. CCLVIII.	Quae obturant. cap. CCLXI.
Adstringentia. cap. CCXXXVI.	Quae superfluitatibus careant. cap. CCLIX.	Quae tardi transitus sunt. cap. CCLXII.
Quae semen generant ac prouocant in cibis ac medicamentis, & cibis medicamentarijs. cap. CCXXXVII.	Multum nutriunt. cap. CCL.	Quae facile corrumpuntur. cap. CCLXIII.
Quae semen inibeat. cap. CCXXXVIII.	Quae parum nutriunt. cap. CCLI.	Quae difficilius corrumpuntur. cap. CCLXIII.
De alimentorum uiribus. cap. CCXXXIX.	Quae boni succi sunt. cap. CCLII.	Quae uentre subducunt. cap. CCLXV.
Attenuatoria alimenta. cap. CCXL.	Quae mali succi sunt. cap. CCLIII.	Quae uentrem supprimunt. cap. CCLXVI.
Craffi succi alimenta. cap. CCXLI.	Quae facilia concoctum sunt. cap. CCLIII.	Quae calfaciunt. cap. CCLXVII.
Media inter attenuatoria & crasseficientia. cap. CCXLII.	Quae agre concoquuntur. cap. CCLV.	Quae frigesaciunt. cap. CCLXVIII.
Quae uiscosum sanguinem generant. cap. CCXLIII.	Quae stomacho commodant eumque corroborant. cap. CCLVI.	Quae siccant. cap. CCLXIX.
Quae crudum humorem generant. cap. CCXLIII.		Quae humectant. cap. CCLXX.
		Quae caput ledunt. cap. CCLXXI.


AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE ME-

DICINAE TETRABIBLI PRIMAE

SERMO SECVNDVS.

Quaecunque sunt plantarum partes, & fructus, & succi, & liquores, superiore sermone relatum est. Nunc uero de reliquis medicamentis, terrae uidelicet speciebus, & metallicis iuxta propositum agemus: Deinceps etiam de animalibus.

DE TERRAE DIFFERENTIIS. Cap. I.



TERRAM omnes homines familiariter usurpatione illam substantiam solum nominant, quae liquore subacta, lutum euadit. Nam quae inter metalla reperitur, non liquefcit, dico autem liquefieri, per totam substantiam in humorem resoluti: madescenti autem in superficie, rigari tantum humore ad corporum profunditatem non penetrante. Omnis terra uim siccandi habet, quoniam corpus ipsius natura durum existit, & ubi penitus nulla igneae substantiae mixtura habuerit, leuissimè citra omnem mordacitatem siccatur. Conducit ipsi ad hoc praestandum lotura. Itaque quaedam lotura non habent opus, quaedam iterum atque iterum lauare expetunt. Quod si circa sensum gustus fueris exercitatus, ipse iudex esse potes, num lauare oporteat, siue non, id quod ex acrimonia aut adstrictione depræhendes. Quandoquidem uero impossibile est inuenire substantiam penitus immixtam ac simplicem, amplius considerare ipsam mixturam oportet, ex his quae accidunt ipsi, iuxta leuitatis ac grauitatis, itemque saporis differentias. Siquidem enim adstringens apparuerit, tanto magis particeps est frigiditatis, quanto plus habuerit adstrictionis. Si uero acrimonia praese tulerit, tantum habet caliditatis quantum acrimoniae. Et leuis quidem terra sit, quum per omnem suam temperaturam, aëreae substantiae multae particeps est. Contra grauis, quanto fuerit grauior, tanto magis sine cera terra existit. Calida quidem igitur terra calfacit, frigida & adstringens, perfrigerat & repellit. Quae uero extensorium quid possidet citra manifestam caliditatem, leniter siccatur. Quae autem glutinositate amplius

rem habet, non extergit, sed glutinosas substantiam meatibus obducendis aptior efficit, ut extergere non possit, ubi nulla alia acrimonia uiscositati affuerit, uelut in ouo uidere est. Porro necessarium est neque hoc ignorare, sed eius per omnem materiam quae in medicum usum uenit meminisse. etenim plurimi opinantur, omnia uisita frigidiora seipsis euadere, quidam uice uersa calorem in uisitis augeri putant. Vtrique autem errant. Acria quidem igitur omnia uisita, multum de calore suo perdunt. Quae uero talia non sunt, uisita caliditate acquirunt. Nullum autem uisitum penitus frigidum euadit. relinquitur enim in ipsis uelut igniculus quidam tenuis partium, atque hoc est quod per loturam uisita deponunt, quo per aquam decedente, quod reliquum est uisiti, substantia terrea frigida fit, quae citra mordacitatem siccare potest. Aqua uero in qua medicamentum lotum est, calidam uim tenuis partium acquisiuit. His itaque declaratis, tempestiuum iam est dicere, quo modo omnem terram non uisitam lauare oporteat, si quidem lotura indigeat. Nam quaedam, uelut dictum est, lotura non egent.

Quomodo terram lauare oporteat. Cap. II.

Omnis terra hoc modo lauatur. Aqua primum subigitur, quae nullam medicamentariam qualitatem praese ferat, deinde ubi lutum defecit, aqua superflans diffunditur, postea reliquum a subsidibus inferne calculosis ac arenosis repurgatur.

Quas medelas agrorum terra praestet. Cap. III.

Agrorum terra quae colitur, omnis quae pinguis est, utilis est ad curationem omnium partium resiccatione indigentium. Quare & in Alexandria & Aegypto ipsa utuntur. In Alexandria itaque uidi hydropicos & lienosos aliquos terrae Aegyptiacae luto uti.

Muldi

Multi uero etiā furas, & femora, & cubitos, & brachia, dorsumq; ac latera & pectus, eius terræ luto illinentes, opem senserunt. Quin & ueteres inflammationes & laxos tumores hoc luto sanat. Et sanè noui quosdam toto corporis habitu aquosos, ex immodica hæmorrhoidum euacuatione redditos, inde manifestū auxilium sensisse. Quidam etiā diuturnos dolores iuxta partem aliquam firmatos, hoc luto perfecte sanarūt. Atq; hæc quidē Galenus. Verum Strato de terra sic scribit, Ad uetustū capitis dolorē, sordes balnearū aut aquæ calidæ, cum terra nigra lota misceto, ac utitor. Aut terram cū decocto caput rosarū subigito ac utitor. Aut testam amphoræ acetariæ tritam terræ addito, cum lauri decocto. Aut disbanī testam cū nigra terra cōmittito, affuso sampsiuchi decocto. Cæterū ad pustulas ex corpore erumpentes scabiosas ac impetiginosas, terrā nigram cum amygdalarū aut lupinorum amarorū decocto subigito, ac utitor. Aut amphorā aceti cū rutæ decocto eluito, eoq; terram subigito, ac utitor similiter. Aut glebularum salis quæ in fundo amphorarū garī reperiuntur terito, ac terræ ammisceto, & utere uelut efficaci. Aut columbinū simū terræ misceto, & cū halicabab decocto subigito ac utitor. At uero ad tulsim uetustam unā cū uisitato corporis habitu, terrā olisum uisulinarum decocto subigito, & pectus illinito. Aut amphoram mellariā eluito, & terrā subigito ac utitor. Potes & cumini, & nigellæ, ac sampsiuchi decocto similiter terram subigere ac uti. Porro ad lenosos, cinerem sarmentitiam, & grumos fecis uini cum terra subigito, ac utitor. Aut foliorum capparis decocto subigito. Aut cremētum argenti leuissimè tritum, cum luto permisce ac utere. Aut decocto heribæ serapiadis tritesticularis subigito ac utitor. Ad hydropicos aut testas amphoræ muriariæ inueteratas terito, ac terræ ammixtis utitor. Aut suillæ carnis siue uisulinæ garum ammisceto, ac similiter utitor. Aut sampsiuchū aqua marina coquito, eoq; terram subigito ac utitor. Aut salsamentum cū lupinorū amarorū decocto conterito, terræq; ammisceto ac utitor. Aut alumen ustū, & pulegij usti cinerē, cū luto committito, & cum aceto mulso subigito ac utitor. Aut bubulū simum siccū tritū terræ ammisceto, & aceto mulso subactis utitor. Ad Ischiadicos, & omnes neruolarū partiū perfrictiones, sampsiuchum uisulinarū olisum decocto coquito, eoq; terram albam subigito ac utitor. Aut anguillam cū sale & nitro coquito, & decocto terram subigito ac utitor. Aut sordes strigmetitias cum calce uiua terræ ammisceto ac utitor. Aut porri siue allij decocto terrā subigito ac utitor. Aut costum, cassiam, iūcum odoratum, aspalathum, xylobalsamum, & sampsiuchum contusa, in aqua & oleo coquito, lutoq; permisceto ac utitor. Aut caprarū simum ac bubulum, simul cum sorde cerati raphanini terito, ac ad terram ammixtis utitor. Ad podagram, à capite usq; ad inguina ex prædictis æger integatur, ab inguine autem infra usq; ad digitos pedū & ungues, ex subscriptis. Vituli pedes posteriores unā cum ungulis exurito, terito ac terræ misceto, & utitor. Aut lapidē leucographidem cum aqua in qua ferrū sæpius extinctū est terito, & aluminis unciam unam addito, ac cum terra subigito & utitor. Aut decocto foliorum cypri, id est ligustri terram subige ac utere. Aut gallas

donec flaccescat coquito, & terram eo decocto subigito ac utitor. Aliud. Aluminis liquidī uncia unā, aluminis scissi unciam unā, gummi sexcūcē, cerussæ dodrantē, melantheriæ quincuncem, misyos sexcuncem, foliorum salicis dodrantem, olei myrtel aut cini uncias x x i i i i. aceti sexcūcem, terito simul ac tū terra subactis utitor. Aliud. Acaciæ, atramentū sutorij, utriusq; drach. i i. aceto trita siccato, & ad terram ammixtis utitor. Aliud. Aluminis, spumæ argenti, misyos assati, singulorum drach. i i i i. excipiente cerato myrteo liquido, & cum terra subige ac utere. Aliud. Cerussæ, spumæ argenti, utriusq; drach. x x i i i i. olei myrtel drach. x x x i i i i. aquæ quod satis est subigito cum terra ac utitor. Aliud, quo curatus est præses Philinus. Succī mororū, aluminis scissi, ligustri, uisicis, gallarum, croci, fructus myricæ, thuris, singulorum sexcuncem. Omnia simul tenuissimè trita reponito. Vsu expetente necessario aqua dilutis ac cū terra subactis utitor. Cæterū lauari non oportet, sed persicorū immaturorū decocto persundi ac foueri. Atq; hæc quidē de agrorū terra sufficiunt.

De terra Lemnia, Sigillum Lemnium, Sphragis

Lemnia,

Cap. i i i i.

Lemniā terrā, quam & lemnium sigillū, siue sphragidem uocant, præparatam accipere est, semel lotam in patrio loco, ut altera lotura non habeat opus. Verum aliās alio liquore dissoluta, diuersimode operatur. Et sanè in malignis ac putredinosis ulceribus semper feliciter & magno fructu, lemnia terra usus sum. Vsus est pro magnitudine maliciei ulceris. Quod enim ualde foetidū est, humectumq; ac sordidum & inueteratū, lemniam requirit acerrimo aceto dissolutā ad lutosam compagem. Vīno autē diluta, recentia uulnera glutinat, pota ad sanguinis reiectiones conducit, & ad letalia medicamenta, & ad morsus uenentorū animalij. Infusa quoq; per dysenterem cū plantaginis succo, dysentericis magnopere auxiliatur, præablotis uidelicet ulceribus muria infusa. Datur isdem & sanguinem spuētib; in potu cum posca.

Miltos, Rubrica,

Cap. v.

Rubrica siue miltos uim habet adstringendi, meatus obducendi, resiccandi, quapropter etiam emplastris ammiscetur ac pastillis siue trochiscis siccantibus ac adstringentibus. Sistit aluum cū ouis in sartagine frictis accepta, itemq; infusa. Lumbricos etiā pota destrahit, primas omniū habet Sinopica appellata, uerum in Cappadocia nascens, densa existens & grauis, & colore locineris, unicolor, & quæ diluta in multum succum diffunditur.

Terra Samia,

Cap. vi.

Samia terra non lauatur. Vtūmur autem altera eius specie frequēius, quam sanè Samiam Asterem siue stellam uocant, quæ ad sanguinis spurum facit pota, & undecūq; feratur idem, & pota & apposita. Vtūmur & ad exulcerationes dysentericas & nomas serpēdo depascentes, infundentes eam cum plantaginis succo, maxime in ulceribus quæ inflammatio præoccupauit, & acriora pharmaca non sustinet, & in corporibus molli carne præditis. Mitigat enim humectiores præsertim & laxiores partes. Vnde in māmārū ac testium inflammationibus adhibetur, trita cum aqua, rosaceo tanto adiecto, ut pharmacum exarescere non sinas. Bonum est hoc modo præparatum medicamentum

mentum etiam ad alias inflammationes calidas, & ad inguinum abscessus incipientes, ac fluctiones podagricas, & in summa ubi moderate frigefacere unaq; mitigare volumus: ut ex hoc adeo manifeste appareat, famia terrae uim moderate frigefactoriam esse. Est enim aërea & glutinosa. praestat autem stella famia, terrae famiae: eo quod glutinositatem & uim obducendi meatus ampliorem possidet.

Terra Selinusia, & Chia. Cap. vii.
Selinusia & Chia terra extensoria uim ualde moderate habent. Quapropter aliquae foeminae ad faciem his utuntur. Verum cum leui siccatione ac extersione, neque caliditatis neque frigiditatis manifeste participes sunt. & propterea ad ulcera in superficie corporum commodae existunt, qualia sunt ambustorum. Ceterum quae substantiam meatuum ualde obductoriā habent, non extergēt, prohibet enim hoc ipsum glutinositas.

Cimolia terra. Cap. viii.
Cimolia terra mixtae facultatis est, habet enim uim frigefactoriam & repulsoriā, habet & modicā discussoriā. Lota discussoriā deponit. Verum iuxta naturā eorū quae ipsi ammiscentur, manifeste utraq; uim demonstrat. Nam repulsorijs ac frigefacientibus permixta, lutum quod inde fit perfrigerans ac repulsorium efficit, discussorijs discussorium, atq; ita ambustis conducit aceto subacta & illita. Memineris tamen commune hoc in omni leui terra esse. Omnes enim ambustis profunt euestigio ex posca illita, bulas exurgere prohibentes.

Terra Ampelitis, Pharmacitis. Cap. ix.
Ampelitis terra etiā pharmacitis appellatur, eo quod efficaciorē alijs uim possidet, & quod agricolae uere appetente ipsam diluant, ex eaq; radices uitium quae germen emisserūt illinant, ut animalcula uiribus noxia eas non cōtingant. Ex eo uero quod cnipas uermiculos perimat, satis indicat quantū medicamentariae facultatis possideat. At uero lenitatē & uim mitigatoriā non habet, sed magis siccatur. Quapropter & mixtam his medicamentis reperies ipsam, quorū scopus est siccare quippiam ac discutere.

Terra Cretica siue Creta. Cap. x.
Cretica terra similis quodam modo est famiae & consimilibus. Sed ualde debilis est, multum aërositatis habens, quapropter etiam uim extergendi citra mordacitatem magis habet, per quam etiam argentum exterit ac depurat.

De omni terra usta. Cap. xi.
Quandoquidem uero quidam medici terrā urunt, neque id male excogitatum in usum ulcerū quae leniter resiccari oportet. Nolle expedit quod ustu terra tenuiorū partium & acrior euadit, ut ad discussoriā facultatem delabatur. Si uero usta lauetur, acrimoniā quidem in aquam deponit, uerum partium tenuitatem ex ustura conseruans, magis siccatoria fit. Quapropter quum omnis terra non usta ulceribus commoda sit, ea quae post usturam lota est, magis adhuc ad ulcera aëre carnē ac cicatricē recipiētia cōducit.

De bolo Armeniae. Cap. xii.
Data nobis est in hac magna peste etiam alia quaedam terra ex Armenia Cappadociae cōtermina, maxime siccatoriā uim habens, colore pallida. Qui dabat ipsam, lapidem appellabat. Est autem friabilis, uelut calx & stella famia, non tamen similiter stellae leuis. Nā & magis densa est, minus aërea, quapropter qui

negligētius inspiciūt, imagine lapidis offertur. Valde autem siccatur, tum in dysentericis, tum in fluxionibus uentris. Insuperq; sanguinis sputo, & destillationi, & putredinosis oris ulceribus conducit. maxime autē defluxionibus a capite ad pectus prodest. Quare etiam his qui ob eam causam aëre spirant ualide auxiliatur, necnon his qui tabe laborāt, sic enim resiccatur ulcus, ut ne tussiant quidem amplius. Ceterum si forte quis a malo liberatus, per licetiorē dietam recidivam sentiat, is itidem ex Armeniae bolo opem sentiet, praesertim difficili anhelitu tam diuturno. Porro in magna hac peste omnes qui de hoc pharmaco biberūt, celerimē sanati sunt, quibus uero nihil profuit, omnes mortui sunt, neq; ab alio quopiam opem senserunt, ex quo palam cōstat, quod solis his qui incurabiles erant non profuit. Bibitur cum uino substantia tenui, mediocriter diluto, si febre penitus caereat homo, aut parum febricitet, sin ualde, cū aquato penitus, sed neq; sunt adeo uehementer feruidae pestilentes febres. At uero quid attinet dicere quantam uim habeat haec Armeniae bolus siue gleba in ulceribus siccatione indigentibus. Appellatur autem illorū lingua uernacula zarinaca, Syrorū uero zarnacha, mons in quo nascitur, iuxta urbem est appellatā Bagana. Ager in quo mōs est, nominatur Agaraces.

Lapis haematites. Cap. xiii.
Haematites a coloris similitudine nominatus est, affricus enim ad cotem, uel in pila tritus, sanguinolentū succum remittit. tātae autem frigiditatis particeps est, quantae adstrictionis, merito itaq; ausi sunt medici haematitem lapidem ocularibus cōpositionibus addere. Ego uero etiam solo per se usus sum ad aspretudines palpebrarum, si una cum inflammatione essent oborra, per oui candidum diluto, aut potius per fenograci decoctum. si uero citra inflammationē, per aquam. Inidum semper faciendum est a moderate liquido per specillū infuso, deinde ubi aeger ferre uim eius potest, crassitudinem augere oportet, & postremum ita crassum facere medicamentū, ut specilli nucleo subdito palpebrae illinere possis, aut eueris affricare. Idem lapis ad cotem tritus ac potus, sanguinis sputo omnibusq; ulceribus conducit. Aridus autem tritus & ad puluillum reductus, reprimat carnē exerescētem, nemo autem ipso per se utitur. ego uero ad ea quae dixi usus sum, uiribus ipsius ex saporis qualitate cognitis. Quin & ipsa ulcera oculorum ad cicatricē perducit per se solus tritus, uelut paulo ante dixi, siue infundatur, siue sublinatur. Nam & hoc ipsum experimento cognoui.

Lapis schistos, galactites, melitites. Cap. xiiii.
Consimilem haematitae, sed debiliore uim schistos, hoc est, scissilis appellatus lapis habet. Ad cotē tritus colorem pallidum reddit. Ab eo consequens est Galactites, lactis colorē dilutus reddens, melitites autē caliditatis cuiusdam particeps est. Nam a similitudine saporis mellis nomen inuenit. Singuli itaq; hi paululum ab haematite uiribus descuerunt, & ad oculos similiter in usum ueniunt, sed leniores existunt. Leniora autē medicamenta semper sunt inflāmati partibus accommodatiora, uerū debiliora quā ut depulsa inflāmate ad perfectā sanitatē perducere queāt.

Communis doctrina de omnibus lapidibus. Cap. xv.
Quum communis sit omnibus lapidibus uis siccandi, quicunq;

quicunque ex ipsis aut in succum resoluti, aut alijs tri-
di, nullam manifestam gustui qualitatem exhibent,
eos putandum est debilissimos esse & leuissimos, &
mordacitatis penitus expertes. Qui uero manifestā
qualitatē gustantibus offerunt, iuxta qualitatis pro-
portionem cuiā uim habent. si quidem enim adstrin-
xerint, ad reprimendū, & constringendum spissan-
dumq; ac cogendū commodi erunt. si uero momor-
derint, ad calfaciendū & discutiendum ac colliquan-
dum ualebunt. Inter hos medijs sunt qui solummodo
extergent, citra adstrictionem ac mordacitatem.

Leucographis aut moroxis. Cap. xvi.

Ex lapidum qui in succum resoluuntur numero est &
qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad linthea illu-
strāda, quē alij moroxum, alij leucographidem uo-
cant. Nam quum subuiritidis appareat hic, si ad cotem
affricetur, aut asperius pallium, locum inalbat. Ex-
pers est autem omnium qualitātū magis quā prae-
dicti, non adstrictionem, neq; extersionem, neq; mor-
dacitatem in gustu exhibens. Vnde hoc tantum ipsi
adest quod citra mordacitatem siccatur, & propterea
cerato ipsum ammiscet, & ad ulcera cicatrice inclu-
denda utuntur in corporibus mollibus. miscet eun-
dem & ocularibus compositionibus. Quanto uero
mollior est & qualitatum magis expert, tanto mo-
deratior & mitior existit.

Galactites. Cap. xvii.

Galactites quoq; consimilem praedicto colorem subui-
ridem habens, lacteum succum remittit. Est autem al-
bior leucographide. Mulieres lacte multo implet, si
a balneo tritum lapidem cum aqua aut uino dulci bi-
bant. Miscetur & ocularibus compositionibus. Tra-
dunt eundem dentientium puerorum collo adalliga-
tum, facilem dentium exortum efficere.

Thyites lapis. Cap. xviii.

Omnibus relictis lapidibus fortiolem uim habet, lapis
qui ex Aethiopia apportatur subuiritidis aliquo mo-
do uelutiaspis, nominatus thyites. Dilutus hic succū
reddit lactei coloris, saporis mordacis, & propterea
solum ad repurganda & extergenda ea quae pupillis
tenebras citra inflammationem offundunt, cōducit,
ex quo numero sunt & recētes oculorum cicatrices,
quas attenuare solet, extergit & pterygium, oculorū
uitium Vnguem Latinis appellatum, si nō ualde du-
rum existat.

Tecolithos quem Syriacum appellant. Cap. xix.

Est & alius lapis fortis facultatis in Syria Palaestinae na-
scens, colore albus, figura cōcinnus, lineas habens ue-
lut a torno exsculptas appellatur Iudaicus & tecoli-
thos. Cōstringit calculos in renibus natos, dilutus in
cote, & ex aqua calida potus. Verum in uesicae lapi-
dibus nihil eximij praestat. Nechepson tradit hec uer-
ba: Tecolithum lapidem cū aqua terito ad sordium
strigmentorum tenuium crassitudinem, & derafia
circa uesicam ac pubem pilis illinito, & cōstringet ac
liquefaciet calculos in uesica. Vnde & canilena or-
ta est.

Salue pelagus Arabiae,

Cladum medelam proferens

Insigniter, tecolithum.

Idem oleo myrteo dilutus, podagricis commodē il-
linitur.

Pyrites. Cap. xx.

Est & pyrites ex lapidum numero qui fortem uim ha-

bent, colore argēto similis, cuius usus est discussorio
emplastro ammixti, adijcitur ipsi etiam schistus. hoc
pharmacum saepe pus, saepe & grumosas concretio-
nes, in medijs musculorum regionibus consistentes
disculsit. Oportet autem lapides qui in usum uertun-
tur omnes laeuissimos facere, ac conterere consimili-
ter ut eos qui in oculares compositiones miscentur.

Lapis Phrygius. Cap. xxi.

Phrygius lapis fortiter siccatur, habēs quid adstrictionis
simulq; mordacitatis, unde et repellit ac discutit. Ego
autem uiso semper usus sum, ad putredinosa quidem
ulcera aut per se, aut cum aceto; aut posca, aut uino
mulso. Ad oculos uero siccum ex ipso facio medica-
mentum, de quo in opere ubi de compositione medi-
camentorum dicitur, agam.

Lapis Ageratus. Cap. xxii.

Lapis Ageratus quo coriarij utuntur, gurgulionem in-
flammatum euidenter sanat.

Lapis Alsus, et flos ipsius. Cap. xxiii.

Est & lapis Alsus in Asso nascens, unde & nomen in-
uenit, rosacei coloris ac cōpagis, friabilisq; ac laxus.
Innuitur autem in ipso quippiā simile tenuissimo
pollini, qui parietibus molendinorū inhæret, quod
petrae Alsiae florem appellant. Est autem tenuiū par-
tium, ut humore flaccidas carnes eliquet ac resiccat,
citra fortē mordacitatem. habet & quid salsum in sa-
pore: ut coniectare liceat generationem ipsius salsum
esse, rore quodam ex mari petrae insidente, qui post-
ea a sole siccetur & obarescat. Similem flori uim ha-
bet & petra in qua nascitur, sed efficacia debiliorem.

Gagates. Cap. xxiiii.

Estq; alius quidam lapis colore niger, qui igni admo-
tus, bituminis odorem de se praebet. Hunc tradit re-
periri in Lycia circa fluuium Gagen, unde etiam Ga-
gates appellatur. Ceterū ego crustaceos & planos
lapides nigros, debilem flammā generantes igni ad-
motos, ex Cana Syria attuli prope Hierichuntē, qui
pari erant in uertice mortuū mare ambiente, ad partē
eius orientalem, ubi & bitumen prouenit, unde &
odorem huiusmodi acquisierunt. Vsum sum autē his
ad inflationes genuum diuturnas & aegrē sanabiles,
compositionibus ad hoc accidēs experimento cogni-
tis ipsos ammiscens, & sanē uisi sunt mihi uim illarū
longē efficacissimam reddidisse. Ammiscui eisdem
& emplastro Barbaro appellato, & euasit pharma-
cum manifestē amplius siccatoriū, ut & sinus cōmita-
teret ac contraheret, non solum cruenta uulnera glu-
tinaret, ad quae barbarū emplastrum maximē com-
modum esse creditur. Aiunt Gagaten aqua coctum,
& cū aqua potum, lumbricos expellere, adalligatū
autem capitis dolores inueteratos sedare. Accelerat
partū mulieribus aegrē parientibus, si parturiētis mā-
nu contineatur. Admiranda uis gagatae igni admodū
& accensi, deinde uino extincti existit. Nam uinum
hoc cardiacis in potu datum, statim ipsos leuat, & su-
dore cōpresso, & pulsu excitato. Alij in puluillū con-
terunt gagatē lapidem, & per dies septem cū uino co-
licis exhibent, & penitus malū tollunt. datur in diem
drachma una. Quin & poculum ex ipso suffumigā,
ex quo cum uino bibendus datur. Idem praestat effi-
caciter bitumen quoq; potum, fugat serpentes ac re-
piles bestias suffitus gagates, & menses ac secundas
detrahit, depræhendit item ac arguit comitiales mor-
bos. Strumas quoque dissoluit tritus, commodis ad
d i ipsa

ipsas medicamentis ammixtus sanat & sedis affectio-
nes, quam leuissimè tritus, & uuarum acerbarum
succo ad tertias decoctus. Quo modo etiam alias om-
nes corporis fluxiones compescere potest.

Magnetis lapis. Cap. xxv.

Magnetis lapis qui & Heraclius appellatur, consimi-
lem hæmaticæ uim habet: participat & attractoria
facultate. Tradunt de renetum manu chragricorum
ac podagricorum, dolores ipsorum sedare, æque &
conuulsis opitulari.

Smiris, pumex, testa elibani, & similia. Cap. xxvi.

Smiris exterforiam uim habet. Dentes itaq; mûdos fa-
ci si ex ea confricentur, uelut experientia cognoui-
mus. Et pumex exterforiam uim habet uelut smi-
ris. Et figulina testa eadem uim præstat, maxime dila-
torum. Cæterum smiris etiã acie quippiam habet,
& propterea ustorijs ac siccatorijs compositionibus
miscetur. Item eis quæ curant humore flaccidas gln-
giuas. Sed & pumex affricus dentes illustrat, non
solum extergendo, sed etiã per asperitatem. Vltus au-
tem pumex nihilo inferior est smiride, ad eodẽ usus.
Locus idem post uisturam, caua ulcera optime carne
replet. At uero elibanorum testa, una cum extergen-
di facultate & siccatoriam possidet. Quapropter em-
plastra ephelias & magos, ex hac testa composita,
optime elatricem ulceribus inducunt.

Lapides in spongijs. Cap. xxvii.

Lapides qui in spongijs reperiuntur uim atterendi ha-
bent, non tamen adeo ualidam ut uellicæ lapides co-
fringere possint, uerum renum calculos cõminuunt.

Ostracites, Geodes, Naxie cotis retri-
mentum. Cap. xxviii.

Ostracitem lapidem quosdã laudare audio, uelut qui
mulcam siccatoriam uim habeat ex adstrictione &
aerimonia permixta, quemadmodum & eum qui
Geodes appellatur, ita ut pupillas depurget, & mam-
marum ac testium inflammationes sanat aqua dilu-
tus. Naxie tamen cotis retriamentum frigefactoriam
uim habet, ut etiam podagris opituletur, cum cerato
rosaceo adhibitur.

Ophites lapis. Cap. xxix.

Ophites lapis uisus extergendi ac atterendi & confrin-
gendi uim habet. Quare potus ex uino albo ac tenui,
lapides uellicæ cõfringit. Adalligatu ad uiperæ mor-
sus conducit.

Hieracites lapis & Indicus. Cap. xxx.

Hieracites & Indicus lapis hæmorrhoidas resiccât dex-
tro foemori adalligatus, cotus rei & nos periculum
fecimus. Diogenes autem de lapidibus libro sic ait.
Lapis hieracites subutridis est ad nigredinem uer-
gens, & alijs coloribus respersus, ut uariis existat.
Vim autem habet hæmorrhoidas resiccâtem dextro
ægri foemori adalligatus. Probatio ueri hæc est. Vbi
habueris ipsum in manibus, melle manus inunge, &
mulcæ non appropinquabunt tibi lapidem ferenti.
At uero Indicus colore subfuluus est, tritus autem
purpureum colore succum remittit, & neque densus
neque rarus est, & cum uino potus hæmoproicis
prodest. Qui uero ex albidis coloris est & cineris ima-
ginem repræsentat, etiam alias sanguinis eruptiones
sistit.

Vitrum. Cap. xxxi.

Vitrum tenuissimè tritum, ex uino albo tenui potum,
uelicæ calculos potenter confringit.



Lapis Aëtites. Cap. xxxii.

Aëtites lapis agitatissimè edit, uelut ex altero lapide
prægnans, foetus uuluarum lubricarum retinet sinis-
tro brachio adalligatus. Verum tempore partus ad-
mendus est de brachio & foemori adalligandus, pa-
rietq; prægnans citra dolorem. Fures deprehendit,
si quis ipsum in panem qui comeditur imponat. nã
qui furtum fecit, commansa deuorare nequibit. Tra-
dunt etiam simul cum eduljs coctum fures arguere.
Neq; enim poterit fur deuorare quæ cum ipso cocta
sunt. Tritus autem & cerato cyprino aut gleudino
exceptus, aut alio quopiã calfaciente, magnopere pro-
dest arthriticis ac paralyticis.

Alabandicus siue Alabandinus lapis. Cap. xxxiii.

Alabandicus coloris subnigricatis est fuluo ammixto,
pellucet quasi segmentis quibusdam aut fissuris dis-
criminatus. Tritus hic superficiem pilorum alborũ
nigram efficit.

Electrum siue succinum, seu lyncurium. Cap. xxxiiii.

Electrum quod & succinum, & lyncurium appellant,
potum dysenterias sanat, & stomachicis opitulari.
Chryselectrum quoq; cum mastiche potum doloris
bus stomachi medetur.

Iaspis uiridis. Cap. xxxv.

Viridis iaspis proprietate quadam, uelut alia quedam,
auxiliatur stomacho & ori uentris pro amuleto ap-
pensus. Quidam & anulis ipsum includunt, & dra-
conem radios habentem in ipso sculpunt, quemad-
modum Nechiplos rex scripsit. Huius itaq; lapidis
etiam ego experimentum ingens habeo, & sanè ca-
tenulam ex talibus lapidibus concinnatam de collo
suspendi, ea commensuratione ac modo ut lapides
os uentris contingant. Cognoui autem nihil minus
ualere ac prodesse eodẽ qui sculpsuram non haberent,
quam Nechipson tradidit.

Iaspis subutridis. Cap. xxxvi.

Iaspis subutridis adalligatus, stomachi dolores sedat, et
paralyticas resolutiones ac dolores mitigat. Qui uen-
ro capnias appellatur, hoc est fumosus, turbulētum
ualde habens colorem, magna tutela ægrè parientes
mulieres asseruat. Sed & hydropicis adalligatus cõ-
modat, & maxima uulnera ab inflammationibus
asseruat, eosq; qui uulneratur dolore liberat itidem
adalligatus.

Iaspachates. Cap. xxxvii.

Iaspachates ex iaspide smaragdeno, & achate compo-
situs est. Vim habet leniendæ sids, & hydropicis au-
xiliatur, hepaticisq; ac peripneumonicijs & pleu-
riticis potus. corpus quoque floridum ac speciosum
facit.

Sapphirus lapis. Cap. xxxviii.

Sapphirus cum lacte tritus potus, omnes internas ulce-
rationes sanat, & sudores sedat. Externas ulceratio-
nes idem cum lacte illitus curat. fissuras quoque lin-
guæ aridus tritus inspersus sanat. In summa siccato-
riam uim habet.

Smaragdus lapis. Cap. xxxix.

Smaragdus assatus & tritus cum melle Attico permi-
xtus, oculorum hebetudines sanat. Cum melle uero
& gummi illitus, elephantiasis laborantibus utilissi-
mus est, idem quoq; potus ab eo malo in totum libe-
rat, sistit & sanguinem undecunq; feratur.

De metallicis, & quæ ex aqua generantur. Cap. xl.

Metallica appellare mos est medicis ea quorum gene-
ratio

ratio in metallis est, siue sponte naturæ, siue per for-
nacem producantur, insuperque terij generis quæ
rursus ex illis ipsis homines suo ingenio faciunt, ue-
lut est cerussa, ærugo, sandix, & similia. Itaque con-
sequenter de omnibus iuxta literarum Græcarum
ordinem trademus.

A. Adarces.

Cap. xli.

Adarces acerrimus ac calidissimus est. Quapropter
hebetantibus uim ipsius miscetur, & sic multus usus
fit, affectionibus calidioribus indigentibus forinsecus
admotus.

Alcyonia.

Cap. xlii.

Alcyonia omnia extergent, ac discutiunt, habentque acrem
qualitatem aliqua magis, aliqua minus. Quod ex
hoc genere Asperum appellatur, externam superfi-
ciem leuem habet, & internam substantiam asperam.
estque calidissimum omnium Alcyontorum, ut etiam
pilos exurere possit. Quapropter ad lepras, uiriligi-
nes, scabies ac impetigines, alijs mioribus medica-
mentis utimur. Nam Asperum Alcyonium non so-
lum extergit ac depurgat cutem, sed etiam exco-
riat ac ulcerat. Quod uero Miliolum uocatur, figura uer-
mi simile, purpurei coloris, & compage substantiæ
molli, omnium tenuissimum est. Quare uisum alo-
pecias sanat, cum uino fuluo ac tenui illitum.

Ales, Sal.

Cap. xliii.

Sal omnis & fossilis & marinus, eandem in genere uim
habet. Differentia in eo est quod ex terra effossi sub-
stantia magis sit coacta, quapropter crassitudo par-
tium, & uis adstringendi, in his maior existit. Fossi-
lis generis optimus est Ammoniacus & Cappado-
cicus. At uero marino specie similis est qui in qui-
busdam stagnis generatur. Omnis tamen sal in com-
muni calfacit, discutit, adstringit, siccit, cogit ac den-
sat substantiam corporum quibus adhibetur. Nam
quicquid est in corporibus humiditatis id ipsum de-
pascitur, & quod reliquum est solidæ substantiæ ut
adstrictoria spissat. Vnde & siccant, & incorrupta
adseruant, quæ ob superfluum humiditatem putref-
cere solent.

Sal ustus.

Cap. xliiii.

Sal ustus discussoria uim magis habet quam non u-
stus, quanto sanè tenuius corpus ex ustura acquirit.
Non tamen similiter ut non usta cogere ac densare
solidam substantiam ualet.

Salis flos.

Cap. xlv.

Salis flos compage quidam liquidus est, colore uero cro-
ceus, partium tenuitate uisum saltem superat, & acrem
qualitatem ac uim multum discussoriam habet. Col-
ligitur sub æstum cantharæ. Est enim uelut flos qui-
dam talibus aquis superflans.

Salis spuma.

Cap. xlv.

Salis spuma spumofus quidam flosculus salis est, uicinis
petris adherens. multo autem tenuiorum partium
naturam habet quam ipse sal, quare & attenuare &
discutere multo magis potest, uerum quod reliquum
est substantiæ densare uelut sal non potest.

Armeniacum pictorum.

Cap. xlvii.

Armeniacum quo pictores utuntur ex Armenia ap-
portatur, unde quoque bolus Armeniæ, de quo di-
ctum est, affertur. Vim habet Armeniacum exterfo-
riam cum modica acrimonia & paucissima adstri-
ctione. Itaque quum tale sit ocularibus medicamentis
ammiscetur. Quin & ipsum per se terunt in tenuissi-

imum puluillum, utunturque sicco ad augmentum pi-
lorum in supercilijs, ubi ob quandam humorum acri-
moniam aliqui ipsorum excidunt, aliqui uero non au-
gescunt, sed ob alimenti inopiam marcescunt. Nam
acrimonia consumpta, particulam ad naturalem ha-
bitum reducit. Etenim uitioso humore consumpto,
natura ad proprias actiones redit, quum nihil sit am-
plius quod ei impedimento sit. Nechepsus de eo sic
tradit. Armenium quo pictores utuntur, duodecima
drachmæ parte melancholicis & crassum sanguinem
habentibus dato. Datur & pueris pectoris morbo in-
flatis, reuomunt enim, nam uomitorium existit. Da-
tur & morbo sacro obnoxijis, ac furiosis, hoc modo:
Centaurij fasciculos manipulares tres in aquæ mari-
næ heminis tribus coquito, donec una supersit, &
cum excolato decocto Armeni lapidis quæ Græci
Armenium uocant, tertiam drachmæ partem terito,
ac confidenter exhibeto. Nihil enim periculi est. Ita-
que nosse operæ precium est quod Armenium peni-
tus reuomitur, nihil memorabile sursum efferens, sed
& inferne modicum quid paulatim, & in pluribus
secessibus effert.

Arsenicum, Auripigmentum.

Cap. xlviii.

Arsenicum uisoria uim habet tum uisum, tum non
uisum. Manifestum est autem quod uisum tenuio-
rum partium euadit.

Asphaltus, Bitumen.

Cap. xlix.

Bitumen ex numero eorum est quæ in aqua marina aut
consimili generantur. Optimum est quod in mortuo
maris iuxta Hierichutem provenit. Vis est omni bi-
tumeni siccatoria ac calfactoria, ordine secundo. Me-
rito itaque ad cruenta uulnera glutinanda adhibetur,
itemque ad alia quæ siccari expetunt cum moderata cal-
factione. Quapropter in tenasmi ad egerendum irri-
tamentis, in quibus pituita crassa infarsa est ut ægre
auelli queat, ipsius utimur suffitu. Similiter et ad dy-
sentericos ex tali causa intestinis ulceratis. Potum
bitumen nucis ponticæ aut fabæ magnitudine cum
uino tritum, cardiacis qui animo linquuntur, ma-
gnopere euestigio prodest. Maxime autem foemina
& pueris & corporibus mollioribus conducit. Eodem
modo datum & quartana citius liberat. Experimento
constat uis eius potius ex aqua, in his qui a rabioso
cane morfi sunt: præseruat enim eos ne in timorem
aquæ delabantur, & eos qui iam inciderunt cõseruat.

Aphronitrum, Litri spuma.

Cap. l.

Aphronitrum, hoc est, litri spuma, & litri spuma inter
se differunt, quod litri spuma medicamentum est ma-
gis siccatorium, aspectu farinæ triticæ simile. Nam
alba quoque existit. Aphronitrum autem non farino-
sum neque dissolutum, sed compactum est. Differt au-
tem a sale aphronitrum, in quantum unum solum
prædominantem saporem manifestè in ipso uidere
est, amaram uidelicet, qui discussoria uim habet, den-
satoriam uero non habet, quemadmodum sal possi-
det. Aphronitrum itaque exterforiam uim habet ut
non solum sordes depurget, sed pruritus quoque sa-
net. At uero litri spuma eandem uim quam litrum
habet, sed tenuiorum partium existit.

Gypsum.

Cap. li.

Gypsum una cum siccatoria facultate, uim quoque ob-
ducendi meatus assumpsit, lapidescit enim aqua ma-
ceratum, quapropter puluillo farinæ triticæ molen-
dini parietibus adherenti mixtum, & oui candido
sub

Pueris

cardiacis

subactum, ac pillis leporinis exceptū, sanguinis erup-
tiones præclare sistit.

Δ *Diphryges.*

Cap. LII.

Diphryges mixtam facultatem adstringentē cum acri-
monia habet. Quapropter & malignorum ulcerum
bonum medicamentum est, & ad putredinosa oris
ulcera, tum per se, tum cum melle despumato: Item
ad anginam, maxime ubi iam per adstringentia hu-
morū influxus fuerit repressus. Quin & gurgulio-
ne relecto, ipso solo mox usq; ad cicatricem induc-
tæ saepe usus sum, utpote pharmaco omnia ulcera exa-
ctè cicatrice includente.

Diaphanes, Lapis specularis.

Cap. LIII.

Diaphanes siue lapis specularis appellatus, vultus tritus
fistulosis ulceribus inspersus celerimò incarnat.

Θ *Theion, Sulphur.*

Cap. LIV.

Sulphur omne vim attractoriā habet, temperamento
calidum, substantia tenuium partium existens, ut &
ad multa venenum efaculantia animalia resistat. Ego
autem & ad pestinacæ marinæ & draconis morsus
ac ictus eo saepe usus sum, arido vulnere insperso, ali-
quando etiam salina ammixta, aliquando oleo vete-
re, aut melle, aut terebinthina. Sed et scabies ac lepras
& impetigines saepe cū eo curavi addita terebinthi-
na. Deterit enim tales affectus, nec materiā in altum
repellit, quemadmodū multa medicamenta faciunt.

Ι *Ios xystos, Aerugo rufa.*

Cap. LV.

Aerugo rufa acrem qualitatem habet, discutitq; ac con-
sumit & liquefacit omnem carnē. Quod si ad muls-
tam ceram ammiscetur, extensorium & cicatricem
inducens pharmacum.

Κ *Aerugo vermiculata.*

Cap. LVI.

Aeruginem vermiculatam ita facies. In pilam cyprī
aeris, quæ & pistillum æreum habeat, aceti albi aeris
dimidiam heminā infundito, & in sole terito donec
stringentiam spissitudinem acquirat. Deinde alu-
minis rotūdi drach. 1. & salis fossilis pellucidī albiq;
ac solidi drach. 1. addito, aut si hoc nō adsit, nitri tan-
tundem, & postea ad solem sub canticulæ æstum te-
rito, donec colore æruginosum, compage vero stris-
gumentosum evadat, atq; sic ad vermicularem figurā
effingito, ac reposito. Efficacior sit ærugo, si acetī
partem unam, urinæ veteris duas contriueris.

Λ *Cadmia.*

Cap. LVII.

Cadmia optima est botrytis. Vim habet omnis cada-
mia siccatoriam, participans & extensoria. In calidi-
tatis ac frigiditatis differentia moderata est. Vsta ue-
ro & lota medicamentum siccans & extergens citra
mordacitatem evadit, ad ulcera explenda tum ocu-
lorum, tum totius corporis commodum.

Μ *Cyanus.*

Cap. LVIII.

Cyanus acrem & discussoriam ac demolientem cōsu-
mentēq; carnē vim habet, participat & adstrictoria.

Ν *Ad Lepi, Squama æris ac ferri.*

Cap. LIX.

Squama alia æris est, quæ sanè heliis vocatur, alia fer-
ri. Helitis itaq; in siccando primas habet, utpote te-
nuiorū partium, & quæ aliquid æruginis assumpsit,
verum ferri squama maiore adstringendi vi partici-
pat, atq; ea adhuc amplius ferri stomomatis appella-
ri, hoc est, chalybis, siue in aciem efformati. Quapro-
pter hæc abæ ad maligna ulcera meliores quàm squa-
ma æris existunt. Aeris autē squama cōsumit & eli-
quat carnes. Omnes vero squamæ multum mordax
eas sunt.

Lythargyros, Argenti spuma.

Cap. LX.

Argenti spuma moderate siccatur, quemadmodum alia
omnia consimilia, calfacit quoq; partimq; perfrige-
rat, ac extergit, atq; hæc omnia moderate facit. Qua-
propter velut materia saepe ipsa utimur, eamq; alijs
ammiscemus, quemadmodum etiam cera velut ma-
teria quadam utimur.

Litrum.

Cap. LXI.

Litrum inter aphronitrum & salem mediam vim ha-
bet. Vstum autem ad spumę litri substantiam propè
accedit. Siccatur itaque & discutit, & si quidem intra
corpus sumatur, secatur & attenuat crassos ac viscosos
humores, multo magis quàm sal. Aphronitrum au-
tem nisi magna urgente necessitate, nemo deuorari-
t, ut quod stomacho incommodum existat. Et tamen
ruralis quidam in strangulatu fungorum ipso ute-
batur magno successu.

Μ *Melanteria.*

Cap. LXII.

Melanteria medicamentum adstringens est, simulq; te-
nulum partium, serè omnium maxime pharmaco-
rum quæ adstringunt.

Melan, Atramentum scriptorium.

Cap. LXIII.

Atramentum scriptorium abunde siccatur aqua dilu-
tum, aut potius posca, & ambustis euestigio illitum
prodest.

Misy, Sori, & Chalcitis.

Cap. LXIII.

Iuxta Cypri metallum in Solorum montibus, magna
quædā domus erat in monte effossa, iuxta cuius de-
xtram parietem, ad ingrediētes uero sinistrū, introi-
tus erat ad ipsum metallum, in quo quædā uidi, plu-
rimum extensas uelut zonas alternatim positas tres
numero, infimā quidem foreos, supra ipsum chalcid-
idis, deinde misyos. Et progressu sanè tēporis chalcid-
is paulatim transmutatur in misy, & diutius adhuc
tempore potest etiam sori in chalcididem permutari.
Quare nihil miri est, tria hæc eiusdē generis vim ha-
bere, & tenuitate ac crassitudine partium ita cum dis-
ferre. Crassissimarum enim partium inter ipsa est so-
ri; tenuissimarum misy. Mediam uero inter ambo-
rum vim chalcitis possidet. Vsta hæc tenuiorum partium
sunt, sed minus adstringunt.

Molybdæna, Plumbago.

Cap. LXV.

Molybdæna siue plumbago similem argenti spumæ
vim habet, ad frigiditatem uergentem, sed neq; ex-
tensoriæ facultatis particeps est.

Molybdos, Plumbum.

Cap. LXVI.

Plumbum vim habet frigefactoriā, nam liquidā sub-
stantiam possidet a frigiditate coactā. Vnde & mo-
le & pondere augetur plumbum, in domibus sub-
terraneis turbidum aërem habentibus repositū. Itaq;
si pilam plumbeā unā cum pistillo plumbeo para-
ueris, & in ipsam uinū tenue, & oleum rosaceū, aut
myrteum, aut melinū infuderis, et ad solē siue ignem
triueris, ut succum quēdam plumbū remittat. Opti-
mum pharmacum habebis, si eo succo ad sedis inflā-
mationes ulceratas, aut pudendorum, aut testiu, aut
mammarum uteris. Item ad omnes influxiones quæ
inguinibus, aut pedibus, aut alijs articulis incum-
bunt. Est & mirabile medicamentum ad maligna &
cancrofa ulcera. Ad multos usus idem commodum
erit, si ex adstringentibus ac perfrigerantibus succum
aliquē addideris, uelut est seridis, coryledonis, seme-
peruiui, portulacæ, psyllij, uuxæ acerbæ. Quæcūq; ue-
ro ex his succū non facile remittunt, uelut portulaca,
his alijs

his aliorum succū ammiscere oportet, uelut uis acerba. Lamina porro ex plūbo facta & lūbis imposita, ueneris impetus cohibet in his qui exercitare se uolunt. At uero uisū & lotū plumbū, ad maligna ulcera, & chironia, & cancerosa, optimū pharmacum est cicatricē inducens tum per se, tum alijs ammixtum.

Pompholyx. Cap. LXVII.
Pompholyx loca ferē omnium primas obtinet quę dētra mordacitatem siccant. Vnde ad cancerosa ulcera commoda est, & alia omnia maligna, & corrosas dentium.

Rhoidarij preparatio. Cap. LXVIII.
Rhoidariū uariē preparatur. Optimus modus hic est. Rhun olus accipito, & in aqua macerato, & lapidem eupholithon appellatū terito, rhois cremore affuso, siccari finito. Deinde anchusæ radicem cum oleo coquito donec oleum rufescat, & ex oleo parum addito ac terito, & ad dies xv. siccari finito, & tūc rursus ex cremore rhois affundito ac siccari finito. Deinde in uas testaceum mittito, obturato ac assato, & erit bonum rhoidarium. Cæterū eupholithos à Cæsarea Palæstinæ affertur. Qui eupholitho carent, calcē uiua ad medicamentum preparandum utuntur.

Sandaracha. Cap. LXIX.
Sandaracha uisoria uim habet uelut arsenicum, unde in compositiones discussorias & extersorias ipsam ammiscunt.

Sandyx que & Syricum. Cap. LXX.
De Sādyce siue Syrico ubi de cerussa agemus dicetur.

Scoria. Cap. LXXI.
Scoria omnis multum siccet. Si itaq; ferri scoriā siue recrementum quā leuissimē contriueris in acerrimo aceto, & postea coxeris, pharmacum maximē siccatorium ad inueteratas aurium purulentias habebis. At uero argenti scoria appellatur helcysma, itidem siccandi uim habens.

Stibium. Cap. LXXII.
Subium ultra siccatorium uim omnibus metallicis cōmunem, habet & adstrictoriam facultatē. Quapropter & ocularibus medicamentis ammiscetur.

Spongia. Cap. LXXIII.
Spongia pice liquida ac bitumine imbuta & uisita, acē & discussoria uim habet, sanguinemq; sistit. Spongia noua aqua frigida aut posca, aut uino madefacta, pro corporum uidelicet differentia, uulnera cruenta glutinat, uelut alia ad hanc rē idonea medicamenta.

Stypteria, Alumen. Cap. LXXIII.
Alumen omne uehementissimam adstringēdi uim habet. Scissile omnium maximē subtilium partū est. Deinde rotundum. Crassarum partium est liquidū, itemq; crustaceum ac laterarium, placiū & plintia in Græci appellant.

Titanos, Calx. Cap. LXXV.
Calx uiua uehementer urit, ut crustam inducat. Extincta euestigiō quidem & ipsa crustam infligit, uerum post unam aut alterā diem, & minus urit, & minus crustam inducit. & progressu temporis penitus crustam non infligit. Calfacit tamen adhuc & carnes cōsumit. Si uero lauetur, mordacitatem deponit, & lixiuium facit: ipsa uero citra mordacitatem siccet, & si bis aut ter, aut pluries lauetur, penitus lenis euadit, & generose citra mordacitatem siccet.

Phycos, Fucus. Cap. LXXVI.
De fūco referam ubi de cerussa tractabo.

Chalcanthus, Atramentū sutoriū. Cap. LXXVII.
De hoc pharmaco merito mirari licet, quomodo fortissimæ adstrictioni caliditas non ignaua in ipso mixta sit. Quare manifestum est quod omnium maximè humiditas carnes siccare potest, humiditatē calore consumēs, adstrictione uero densans ac spissans substantiam. Fit & hoc in Cypro prope locum ubi misy, chalcitis, ac fori reperiuntur, ut ex his intelligi possit, aquam pluuialem per collem illum excolaram, omnem illam terram circumluere ac abluere. Vidi autē hanc paulatim coaceruari quotidie in lacu quodam, & erat sanē tepida ac uiridis, chalcitidem & ruginem odore repræsentans. Quidam autē ipsam exhaurientes aquam, in urnas quadrangulares fictiles transfundunt, in quibus plurimis diebus coacta ac densata chalcāthus fit. Verum temporis progressu etiam chalcanthus in chalcitidem transit.

Chalcitis. Cap. LXXVIII.
De chalcitide iam diximus ubi de misy egimus. Nunc satis est illud tantum dicere, quod adstrictoriam & acrem uim mixtam habet. Prædominatur autē acris, uehemens adeo existens, ut & carnem inurat, & crustam inducat. Vistā chalcitis mordet quidem minus, sed non minus siccet. Deponit & adstrictionis non nihil. Quare penitus melior est uisita chalcitis quā non uisita, tenuiorum partium uelut alia uisita euadēs, acrimoniam autem non adsumens. Nam quæ natura acris sunt, uisita mitiora fiunt, reliqua acriora. Loca insuper chalcitis adhuc lenior euadit.

Chalcos, Aes uisum. Cap. LXXIX.
Aes uisum habet quiddam acre in se, sed & adstrictoris particeps est. Et propterea si lauetur, optimum pharmacum est ad ulcera cicatrice includenda. Verū ante uisuram, in his qui duras carnes habent uisus elius assumitur.

Chalcu anthos, Aeris flos. Cap. LXXX.
Aeris flos tenuiorum partium uim habet quā aërium, & squama eris, participat & extersoria uim, unde ad magnas asperitudines palpebrarum conducit, sycofes Græci appellant.

Chrysocola. Cap. LXXXI.
Chrysocola ex eorū numero est quæ carnes eliquant, non tamen fortiter mordet, discussoria uisq; satis est & siccatoria. quidam eam solam ita appellant quæ inter metalla reperitur. Verum præstat arte parata, in pila ænea eris rubri, pistillo quoq; similiter eris, urina pueri impubis addita, ita ut diutius in sole calido teratur. Nam quod inter terendum resoluitur, id siccatum commodissimum medicamentum fit ulceribus malignis, tum per se, tum idoneis ad eandem rem pharmacis ammixtum.

Psymnithium, Cerussa. Cap. LXXXII.
Cerussa ex plumbō acris aceto dissoluto paratur, & tamen neq; acris neq; mordax est, neq; discussoria, sed & meatus obducit, & perfrigerat. Vistā autem pura cerussa, in id quod Syricum appellatur trāsit, medici sandycem nominant. Et uisita quidem cerussa tenuiorum partium euadit, non tamen calfactoria. Ac uero succus frigiditatem cerussæ seruans, partium subtilitatem insuper assumpsit, ut per ipsam in altum corporum penetrare queat.

Psoricum. Cap. LXXXIII.
Psoricum, sic dupla chalcitide ad argenti spumam ammixta, ita ut hæc primum acerrimo aceto terantur,

rantur, deinde in ossam nouam indantur, quæ media æstate per dies quadraginta in sterquilino defodiuntur. Hoc medicamentum magis siccatorium, & minus mordax sit quàm chalcis, palam est autem quod & tenuiorum partium euadit.

De materia medica ex animalibus. Cap. lxxxiiii.
Plantarum materia explicata, non omni uidelicet per totum terrarum orbem, sed quantæ nos experientia habemus. Imò & terrea & lapidea materia medica enumerata, superest adhuc materiam ex animalibus persequi, siue ea in aqua, siue in terra uitam degant. Quemadmodum autem in plantarum materia, etiam de succis qui ex ipsis fiunt mentionem fecimus, sic etiam nunc non solum solidarum in animalibus partium uim trademus, sed etiam in ipsis contentorum, uelut sanguinis, bilis, urinae, stercoris, et similia, relictis tamen abominandis ac detestandis, & quibusdam lege prohibitis, de quibus cum alij quidam, tum Xenocrates scripsit, uelut est homines comedere, urinas bibere, ac menses muliebres, et similia. Imò relictis quoque medicamentis certa morbum genera inducentibus, itemque compositionibus uenenosorum pharmacorum. Qui enim talia scribunt non minori sed maiori odio digni sunt, quàm qui perpetrare, quanto maior insuria est cum multis malum aliquod quàm unum solū perpetrare: Et cum actore quidem flagitiosarum speculationum experientia commoritur: Scribendum uero malefactū immortale est, arma maliciæ improbis suppedians. Dicemus itaque nos de commodis hominibus rebus, quarum experientiam habemus, & sanè primum humorum in animalibus mentionem faciemus,

De sanguine. Cap. lxxxv.
Columbinum sanguinem solent hi qui ossa capitis fracta perforant, crassæ membranæ infundere, quod si columbinus non adsit, palumbi aut turturis sanguine uti licebit. Quidam & ad sugillatos oculos eodem uuntur calido instillato de recens macerato animali, aut de uentis alarum dissectis. Ego uero sexcetos uidi ossibus capitis perforatos, & nihil laesos ex rosaceo usu, circa sanguinem columbinum. Sunt autem & sugillatorum oculorum medicamina multa ex collyriorum genere, & maxime Damocratis ex myrrha, si quod ex thure constet, & quod ex croco. Sed et sœnigræd succus in hunc usum potior est sanguine columbino. At uero caprinum sanguinem quidam hydropticis pharmaci loco dederunt, & ad uentris fluxiones aut dysenterias eodē assato uti sunt. Hircinum quoque sanguinem aliqui siccant, & alij ad hanc rem commodis ammixtum, calculosis exhibent. Itaque licebit rursum degeni & alij auxilijs carere, etiam hunc in usum uertere, nam experientia periculo uacat. Quin & hordinus sanguis in usum uenit, de quo Xenocrates sic scripsit: Hordinus sanguis spuentibus sanguinem ualde commodus est. Oportet autem nondum congelato dimidia hemina mensura, aceti acerrimi tantundem ammiscere, deinde seruens in tres partes diuidere, & singulis diebus partem unam absorbendam præbere. Vesperilionum porro & ranarum ac ricinorum sanguinem pilos extirpare falsum reperit, quum experientia id explorarem. Quemadmodum etiam aliorum animalium sanguinis uanas promissiones cõperit, & partim experiri ne tentauit quiddam, quum pharmaca haberet aptiora & parabiliora ad singulos affectus. cauebã autem

simul ne præstigatoris opinionem incurrerem.

De Lacte, ex Rufo & Galeno. Cap. lxxxvi.

Duplex lactis utilitas est, altera ut alimentum, altera ut medicamentum, saluberrimum lac est purum ac syncerum, neque amaritudinis, neque additatis, neque salsedinis, neque acrimoniæ, neque graueolentiæ pariceps, sed ut ita dixerim, odoratum, aut odoris expers, aut si quidem modice odoratum fuerit, palam est quod & gustantibus dulce erit, utpote modicæ dulcedinis particeps. Primum autem differentias ipsius considerare oportet. *quasi odor dulcis*

De Lactis differentia. Cap. lxxxvii.

Quantum natura inter se distans uacca & equa, ac alia animalia, tantum & lac ipsorum inter se differt. Bubulum enim crassissimum est ac pinguisimum, comodeque nutrit ac partes subit. Liquidissimum autem & tenuissimum ac minimè pingue camelinum est, & uentrem minus subit, quamuis multum feri habeat. Sed uice uersa equinum magis aluo secedit, similiter & asinum, quod minimè pinguis succi possidet. Quapropter etiam rarò in uentre in calcem mutatur. Caprinum moderatè compagem habet, & ad purgandum debilius bubulo est, de cætero æque commodum & multum nutrit. Ouillum hoc crassius est, uerum utiligines albas sub cute inducere solet, si quis assidue ipso utatur. Suillum crassissimum est, ut neque coagulo opus sit ad id coagulandum, & serum modicum seernat, & in coctura celerrimè coctat. Quare nec ad alui excretionem commodum est, & uentriculo nauseam mouet.

De lactis differentia ab animalium habitu. Cap. lxxxviii.
Manifestum est autem quod omne sanum animal melius lac quàm morbidum præbet. At uero morbos animalium ex tenuitate cutis deprehendere licet, & pili raritate, tuberculis, impetigine, scabie & inedia. Nigriora quoque in brutis serè in totum foruora sunt. Quod & carnes ipsorum testantur, utpote iucundiores. Alba contra imbecilliora.

De lactis differentia à temporibus anni. Cap. lxxxix.
Iuxta anni tempora liquidissimum & tenuissimum est lac uernum, hoc est, post partum: spissatur autem temporis progressu, ut media æstate siccus ac crassius reddatur. Laudatur æstiuum ut concoctu facilius, & iucundi odoris.

De lactis differentia à pabulo. Cap. xc.
Quin & circa pabulum plurima differentia in lacte reperitur. Nam alias alia herbam animalia depascuntur. & uiridis quidem herba, & iuxta aquas nascens, liquidius & modicum lac suggerit. Durior uero & montana, apta est ad boni ac multi lactis generationem. Omnia pabula adstringentia, acerbum & aluum sistens lac præbent. Acris uero & præsertim purgantis, uelut est scammonium, & ueratrum, & uithymalli, uentrem turbans lac exhibent. Cytisus autem pingue ac dulce,

De lactis differentia ab ætate. Cap. xc i.
Animalium in uigore ætatis consistendum lac optimum est. Iuniorum liquidius, seniorum siccus.

Quibus lac conueniat. Cap. xc ii.
Ex omnibus serèedulij optimum lac optimi succi est ac alimentum ex contrarijs substantijs ac facultatibus compositum, subducenae ac sistente aluum, obdurante ac attenuante. Et sanè ubi qualitas ipsius nihil contrarium uti nature habuerit, & uiscerum ipsius exitus ob uas

ob uasorum amplitudinē spatiosi fuerint, utilitas ex lacte consequetur, & nihil mali ille ex eo experietur. Utilitates autem lactis etiā ueteres medici recensuerunt. Ventrīs moderatā subductionem, succi bonitatem, & alimoniam, & quod cōcoctum probē carnem meliorē reddit, & mordaces succos expurgat. Vnde in urinæ difficultate, & acri egestione alui, nō solum bibere conducit, sed etiā infernē per clysterem infundere. Ad acres enim & mordaces fluxiones cōmodissimū est, non solum abluens ipsas de partibus infestatis, atq; hoc per extersoriā humiditatē, quam in serosa sui parte complectitur, sed etiā crassitie ac pinguedine sua corporibus oblitū ac inductum, nō sinit influxum acrē nudis ipsis allabi. Ad pulmonis itaq; ac intestinorum ulcera, item renum, uesicæ ac uteri, & ad papularum eruptiones, ac furunculos, & alias cutis asperitudines, conuenientissimū est in potu. Item ad eos qui cantharidas hauserūt, aut buprestin, & in summa ad medicamenta erodētia ac exulcerantia, & ad hyoscyamum uelut peculiare remedium est. Non statim resipiscere affectos facit. Cæterum in gutturis exulcerationibus, quæ cum ob alias multas causas, tū ex anginis fiunt, & his qui ephemerum sumpserunt, lac gargarissare conducit. Idem potum magnopere prodest alimentum non sentientibus, & siccoribus, ac qui ægrē uires recolligunt. Commodum est & ad oculorū fluxiones acres, & ad oculos sugillatos. Quin & forinsecus palpebris impositum lippiensum, ubi dormire uolens, cū rosaceo & ouī candido, inflammationes ipsorum concoquit. Eodē modo utimur & ubi sedis ulcera mitigare uolumus, propter acres serosos humores ac inflammationes dolore affecta, similiterq; ad pudendorū ulcera, & in summa ad omnia lenimento opus habētia, ob inflātionem, aut mordacitatē, aut ulceris malignitatē. Quapropter et cancerosis adhibetur ulceribus in medicamēta dolorē eximentia ammixtū, qualia maximē sunt quæ ex pompholyge fiunt. In uniuersum igitur mitigatoriū est lac, leuē naturam habens, atq; multo magis, ubi serosi humoris maior pars per cocturam, aut aliā artem fuerit consumpta.

De modo, tempore, ac mensura utendi.

Lactis. Cap. xciit.

Omnis qui lac bibere uolet, à reliquis cibis ac potibus abstineat, donec concoctum sit ac secesserit: si enim ante eius concoctionē, alium cibum quis sumat, necesse est & ipsum lac corrumpi, simulq; corrumpi & cibum qui superingestus est. Præstat autē mane bibere recens mulctum, & tunc plures labores detrāhere, quietē ac sensim ambulare, & interim cessare citra somni admissionem. Qui enim hoc modo se gesserit, potum lac excernet, idēq; inutilia secum educet. Opus est enim si quid aliud, primum acceptum secedere, quo facto aliud bibere. principio igitur secedit aluo cōmode purgans, non totam corporis mōlem, sed quæ in aluo & intestinis sunt partibusq; uicinis. Post hæc iā in uenas desertur optimeq; nutrit, & nō amplius secedit, sed uentrem sistit. Mensuram sumēdi definire omnibus, impossibile est, quēadmodum in alijs quoq; edulijs, satis est igitur quantum facile quisq; ferat. Cæterū ad mordaces humores & maximē infartos, cū modico melle bibere conducit. nā sic & utilius & magis extersoriū est, & citius aluo secedit, ammiscenda est & sapa & uinu dulce. Ita enim

vinu' dulcu' lacti admiscet

commodius stomacho euadit. Quod si salem accipiat, magis etiam aluo secedit, sed insucūdius existit.

Quibus lac noceat. Cap. xciiii.

Lac quod plurimū seri habet, periculo maximē uacat, etiam si quis semper ipso utatur. quod uero modicū serosi humoris, nō parū autem caseosæ crassitudinis habet, non securi usus omnibus est, qui frequenter id sumunt. Renes enim lædit qui apti sunt ad calculorū generationē, obturationes quoq; & affectiones circa hepar efficit, in his qui prōptē affici possunt. Eiusmodi sunt quibus angusti fines sunt uasorum trāssumētium alimentum ex sima hepatis parte in gibbosam. Sed neq; capiti cōmodum est, nisi quis ipsum ualde ualidū habeat. Quemadmodū neq; præcordijs quæ facile inflantur plerisq; omnibus enim in uentre inflatur, ut paucissimi sint qui non hoc perpetiantur. Assiduus quoq; eius usus dentes lædit, unā cū circūstita carne gingiuarū. Hanc enim humore flaccidam efficit, dētes uero putredini & erosioni obnoxios facit, id quod crassiori lacti maximē inest. Nā asininū lac propterea quod ualde tenue existit, non solū non lædit dentes, sed etiā ipsis cōmodat, propter uim extergēdi. Oportet itaq; ab esu lactis, uino mulso aqua diluto dentes colluere: ita enim omne caseosum dētib; ac gingiuis infartū extergetur. Cæterū qui caput non facile læsioni expositū habent, cōmodius est uino mulso meraco citra aquæ mixturā os colluere.

De lactis coctura. Cap. xc v.

Si quis præcocto lacte serū consumpserit, omnino uentrem nō subducit. dant autem hoc ipsum his quibus uenter ac intestina ab acribus superfluitatibus mordētur, & qui ielunum intestinū biliosis fluxionibus infestatum habent, & dysentericis. Modus præparandi duplex: Aut enim diutius cocto lacte serū infumitur, aut silicibus infectis, sed quod per silices infectos fit, crassius preparatur, & propterea uitiolius euadit cum alijs, tum quod cinis ex ignitis lapidibus lacti cōmiscetur. Habet autem tale lac aliquid commoditatis in putredinosiis ulceribus, quare his exhibere oportet lac per silices præparatum, reliquis coctum. Coctura fit ad ignem assidue agitando ne dirimatur, & si quid ollæ labro adhæserit, etiā id spongia munda auferre oportet. Nā sæpe hoc ipsum lacti ammixtum totum corrumpit. Porro per silices sic præparatur. Lac præcoquitur donec plurima humiditas consumatur, deinde lapides silices igniti in lac mittuntur, quot omnino suffecerint ad serū cōsumendum. Nec minus, imò magis idem efficiunt laminæ ferri ignitæ lacti immerse. Est enim ferrū adstrictoriæ facultatis particeps, & proinde plures cylindros ferreos parauit, qui uerū ad finem aditū habent, ut hac quasi ansa facile quis ferrum ignitū tollere queat panniculis detentum, uelut in cauterijs facere solemus. Lac tamen hoc modo præparatum facile in uentre casei figuram accipit. quapropter securius est aquā affundere, quemadmodum Medici non pauci faciunt, ubi serum primum consumptum est, rursus aquam puram affundentes: non enim humiditatem seri fugiūt, sed acrimoniam per quam uentrem subducit.

De sero lactis. Ex Galeno. Cap. xcvi.

Serum lactis extersoriā uelut uim habens, subducendi uentris gratia assumitur, tum in potu, tum per clysterem immissum. Nam acrimoniam intestinorū citra mordacitatē abluat & extergat. Potest & pro aqua commo

agua affundenda

commodissimè assumi ad ulcera acri sanie infecta eluenda. Quin & medicamēta discussoria ad sugillata liuores, & ac nigredines, ex corpore melius eluuntur per serum quam per aquam. Sic quoque eodem ad contusa fustula ac liuefacta uidetur, cōmodis ad hanc pharmacia ipsū ammiscētes. Serum autē sic pręparare oportet. Lac in ollam funditur, sed nō ouillū neque suillum, utrūque enim ineptū est ad serum detrahendum, coquiturque igne concitatore, & assidue ac æqualiter mouetur, & ubi efferbuerit, à motu cessatur, & ubi adhuc amplius efferbuerit, aqua frigida in promptu sit in profundiore quodā uasculo sita, in quam olla in qua lac coquitur immittitur: statim enim sedatur. Sedato autē seruire, rursus coquitur, et ubi effruescit, acētū mulsum aut aqua mulsa bis aut ter irroratur, quo facto caseus statim a sero disparatur, serum itaque mox per panniculū excolatur. Vbi igitur crassas & pituitosas superfluitates abundare suspicatus fueris, acētū mulsum irrorabis, ubi acres & biliosas, aquam mulsam. Quin & immisso in ollam, postquā lac bis aut ter efferbuerit, uase frigidissimā aquam habente, fissuram ac secretionē facimus. Vtēdum est sero ad debiles & cibos auersantes. Oportet autem sero quod primum bibitur salē ammiscere, ubi uero purgare cōperit citra salē dato: atque hoc per interualla quādam lacto, donec satis æger purgatus fuerit. Copiā iuxta vires expendere oportet, neque tamen magnopere deliqueris etiam si quid amplius prębueris. In summa autem copiā sit seri potus heminarum quinque. Et modus quidē parandi seri talis est. Cares autem sic pręparant. Onici semen contundunt, eoque lac coagulat, & ualidum serum efficiunt. Deinde excolant, & salē aut aquā marinā addunt, rursusque coquunt ac exhibēt. Forūter itaque hoc purgat, sed omnium suauissimè bibitur. Omnino autem longæ cocturæ medicatius serum efficiūt. Et his quidem qui fortī euacuatione indigēt, thymi drachmas tres aut quatuor unā cū sero dabis in prima portione. Si uero adhuc amplius purgare uelis, epithymi tussiac cribrati drachmas tres dabis. Viāre tamen medicamēta oportet in quibus non magnū est id quod molestiat. Ceterū simplicius pręparato sero uel oportet in corporibus molibus, & in quibus euacuare & eluere solū ea quæ in uentre ac intestinis hærent uolumus, & in quibus intestinū exulceratur à quibuslibet uulgaribus purgatoris medicamētis, & in quibus bilis pura uentrem intecat, & in quibus Inanes uentrē ad egerendū simulant cupiditates, & in quibus periculum est renes aut uelicā aut uterum exulcerari, & in macilentis ac tenuibus, purgatione tamē egentibus. Maximè omnium autem sero uel oportet in his qui imbecillum stomachum habent, & tamen purgatione indigent. His omnibus exhibendum est serū, neque salē, neque alio quopiam medicato ammixto. Sed & puero, & mulieri, & senī, hoc serum citra omnne periculum exhibetur, & in caniculæ æstibus intrepidè datur, quāquam tunc temporis alia medicamenta suspecta sint. At uero fortiori sero uti quis potest, & ad corpora & ad uita uehementioribus medicamentis egentia. Præsertim ad inueteratas papulas, & uaros liuidos & uitiatos subcute humores, uelut lepras & similia. Item ad ulcera uetera & effe-rata, & ad ulcera capitis manantia, ac similia. Ad oculos quoque assidua fluxione uexatos, et ad scabiem

palpebrarum, & maculas solares in facie, potest & quis eo in longis febrium circuitibus uti, & in quibus periculum ut ex morbis in aquam intercutē delabantur. Atque hæc quidem de sero sufficiunt.

De his quæ iucunditatis gratia cum lacte

coquuntur. Ex Gal.

Cap. xcvi.

Lac cum aliquo crassi succi edulio diutius coctum, flatuositatē deponit, & magis nutrit, & alui fluxionibus, & tenuibus ex capite in pectus destillationibus conuenit, sed & in hoc considerandū est, ne etiam nobis alia quādam uiscera lædat. Quorundā enim natura ab hoc abhorret, et aliis periculo eiusmodi edulia non uacant. Nam & secur obturant, & calculos in renibus generant. Quæ autē cū lacte coquuntur hæc sunt: Amy. ū, similago, alica, tragus, oryza, lagana, placentæque & panes quidā, neque probe assati, neque probe pręparati, neque fermenti, neque salis participes.

De lacte acido. Ex Galeno.

Cap. xcvi.

Lac acidum oxygala appellatum, dentes quidem non lædit qui naturali modo habent. Qui uero frigidiores aut debiliores sunt, uelut ab alijs frigidis, sic etiā ab hoc læduntur. Aliquādo autē & dentium stupor inde oboritur. Et uenter quidem frigidus, nō probè concoquit lac acidū, qui uero moderate habet, ægrè quidem sed tamen concoquit. Qui uero calidiores æquo sunt uentres, supra hoc quod nihil læduntur, etiam commodi nonnihil ex eiusmodi edulij percipiunt. Atque tales uentres etiam per niuem circumdatam perfrigeratum oxygala citra molestiam ferunt, nisi pectus frigidū fuerit, aut caput aut alia particula. Neque enim calidā & acrem seri qualitatem oxygala habet, neque pinguem & calidā butyri. Sed solū in ipso reliquum est caseosum, unde frigidum est & crassi succi, & crudos humores generat, & in frigidioribus uentriculis etiā calculos in renibus gignit.

De primario lacte.

Cap. xcix.

Primum lac appellatur quod statim à partu mulatū est, id calido cinere modicè calfactū, citra coagulum statim coagulatur. Veteres Pyriaton hoc uocabant, alij pyriplethon, comeditur hoc ipsum cum melle. Melle enim non addito, ægrius cōcoquitur, & crassioris succi est, & tardius transit.

De lacte concreto. Ex Galeno.

Cap. c.

Quidam lac etiam concretum exhibent, per coagulum uidelicet coactū, & sero ablato, melleque addito. Quidam uero etiam seri plurimam partem absorbent, & contingit sanè his uentrem magis aut minus subducere, pro absorpti serosi humoris quantitate.

De caseo, Galeni.

Cap. ci.

Casei omnes mali sunt, excepto oxygalactino qui ex acido lacte fit: nullum enim laudare possum, omnes ægrè cōcoquuntur, acidū ructum generant, & flatu uentrem implent, improbe alio secedunt, pituitā & æstum uentri inducentes. Nam in pręparatione ab immisso coagulo acrimonia allumunt, & omnē humorem deponūt, præsertim inueterati, qui & aciores sunt, & sepius calidiores & æstuosiores, sumēque amplius inducentes, & ægrius cōcoctiles, & peioris succi euadūt. Quapropter illud cōmodi quod crassi succi edulia attenuantibus medicamentis ammixta attrahunt & acquirunt, neque caseus obtinet citra detrimentū. Maius enim ex succi malitia & æstiosa humiditate damnum accedit, quā uilitas ex crassitudine attenuata emērgat. Itaque fugiendus maximè talis caseus

caseus qui penitus nihil boni in se habet. At uero recens caseus appellatus oxygalactinus, omnium optimus censendus est. Nam & in cibo lucidissimus est, & stomacho innoxius præ omnibus alijs caseis existit. minus ægrè concoquitur, & minus egrè transit, neque uero ualde crassi succi est, quo crimine in comune omnes casei sunt infames. Inter reliquos porro caseos recens melior uetere est, & mollis durior, & rarus ac laxus ualde denso & coacto, & qui præcellentem dulcedinem habet falso præstat, & qui moderate falsus est, potior est eo qui plurimum salis, aut penitus nullum saltem accepit, iucundus iniucundo, asfatus crudo præfertur. Caseus coctus multo solidior est, sunt tamen omnes mali.

Pharmacum ex caseo uetere ad callosas concretiones podagricorum. Galeni. Cap. cii.

Quum arthriticus in sella ad me delatus esset, qui callosas duritias in articulis haberet, statim in mentem uenit mihi ut pernam suillam ueterem falsam coquerem, eiusque decocto caseum uetustissimum rigare subigeremque ac in pila probe unire, & duritiibus callosis imponerem, quo facto sponte rupta cute citra sectionem, quotidie callorum particulae emergebant, & quum commoditate homo ille experiretur, tale de cætero sibi parans caseum adseruabat, & inueterato utebatur, atque sic in eius usu pseuerabat. Quin & alios similiter asfectos ex amicis suis medicamenti eius uim edocebat.

De efficacia recentis casei foris adhibiti.

Galeni. Cap. ciii.

Recens & humidus caseus magnopere auxiliari uideatur his qui spumam argenti hauserunt, si quis ipsum in cibo accipiat. Potest & uulnera cruenta simpliciora glutinare in cataplasmate impositus, superimpositis solis uitis, aut lactucæ, aut betæ. Caseus autem oxygalactinus etiam magna uulnera glutinat. nam & discussoria ui participat.

De butyro. Galeni. Cap. ciiii.

Butyrum ex pinguisima lactis præsertim bubuli parte fit, concoctoria autem uim habet, modica quoque discussoria participans. Has uires tamen in medijs inter molliorem ac duritiem corporibus exercet. Nam ubi hæc fuerint inflammata, concoquit ac facile discutit. Quare parotidas aurium, & bubonas inguinum abscessus, ipso solo sepe perfecte sanauimus, puerilibus corporibus ac muliebribus affectis. Durorum enim penitus corporum tumores præter naturales butyrum discutere non ualet. Idem reiectionibus ex pulmone, in pulmonis ac lateris affectionibus magnifice confert cum melle datum, easque concoquit. Si itaque solum delingatur per se, magis concoquit, minus educit. Si uero una cum melle & amygdalis amaris, magis sursum educit, minus concoquit.

De coagulo. Galeni. Cap. cv.

Coagulum omne acre & attenuatoria uim discussoriaque & siccatoria habet. Optimum coagulum est leporinum, dissoluit omne coagulum cum aptis ad hanc rem medicamenti potum, sanguinem in uentre in grumos concretum. Cætera quæ de coagulo à multis prodita sunt, superuacaneum adscribere existimo.

De felle. Galeni. Cap. cvi.

Humorem qui in uesica bilis susceptrice coaceruatur, nunc fel ac bilem nomino, non quam atram, sed quam flauam appellant. Et est sanè humor hic omnium animalis humorum calidissimus. Differentiæ sunt in ipso

plurimæ, tum iuxta naturam animalium, tum iuxta uictum. Nam pallidior colore bilis moderate calida est, subalbida uero in quantum colorem exolutum habet, tanto caliditate inferior est. Flaua autem tanto calidior quam pallida est, quanto crassior & flauior existit. Etenim flaua fit ex pallida amplius calfacta. Si uero adhuc amplius superincalescat, ad atriorum colorem transmutatur, qui aliquando eruginosus fit, aliquando cæruleus, interdum etiam ad isatidis colorem transit. Itaque & tu colorem bilis expendes, ubi pharmacum præparas in quod fel recipitur. Fit & bilis differentia circa corpus utentium ipsa, prout subtili aut hebetes sensu præditum est. Et suillum quidem fel omnium aquosissimum est, & propterea debilissimum, exceptis agrestibus suis. Vtuntur autem felle suis domesticæ ad ulcera aurium, non contemnendo pharmaco, quo & tu uti poteris, si non aliud compositum adfuerit. Fel ouillum paulo acrius suillo est, atque eo adhuc magis caprinum. Consimile huic est ursinum & bubulum. Taurorum his fortius est, sed inferius hyenarum felle. Callyonimi piscis & scorpij marini ac testudinis fel hoc etiam superant. Est & uolucrum animalium fel omne acrius ac siccius quam in quadrupedibus. Ex uolucris gallinarum ac perdicum fel in usum medicum præstat. Accipitrum & aquilarum fel multum acre est & corrosiuum. Has itaque ubi noueris fellis differentias, sciuerisque quæ affectiones magis, quæ minus siccatione opus habent, uix contingere potest ut circa curationem aberres.

De Sudore. Cap. cvii.

De sudoribus aliqui superuacanea conscripserunt, quæ per aliam materiam parabiliorum fieri possunt. Ammiscetur autem sudor eorum qui in palæstris exercentur, substrato pulueri, atque hoc paton Græci uocant. Estque pharmacum discussorium. Itaque inflammationis mammis auxiliū efficacius est solus is paton impositus. Si uero aridior est, cyprino aut eo non præsentem, rosaceo emollire ipsum. Hoc pharmacum illitum lac in uberibus redundans extinguit. Et ego sane aliquando ipso in inguinum abscessu usus sum, & breui tumorem sedatum uidi.

De Urina. Cap. cviii.

Urina hominis ferè omnium aliarum debilissima est, excepta suilla porcorum domesticorum castratorum. Vim habet extergendi hominis urina, si quod aliud urinae genus, quod satis indicant fullones. Vnde & medici ad scabies ac lepras adhibent, ulceraque multa humiditate sordetque ac spurcitia plena, ea perfundunt, idque multo magis si quid putredinosum habuerint. Manantia item capitis ulcera & porriginem eadem fouentes curant. Nos autem abominati sumus talia facere, quum alia pharmaca sint ad manum. Cæterum ulcera in digitis pedum præsertim ex offensione, ubi non fuerint inflammata, etiam ego sæpe urina curavi, & sanè iter facientibus ac peregre proficiscentibus linamentum urina tinctum in ulcus imposui, deinde foris secus linamentum circumdedit, & quoties meiere uellet, urinam ad digitum demittere præcepit, & non soluere priusquam exacte curati essent. Permissi & ruri degentibus non præsentem medico ulcera urina perfundere, ubi in partibus infernis essent à pectore usque ad summos pedes. At uero bibere urinam, in difficili spiratione quæ erecta ceruice contingit, quemadmodum aliqui prodiderunt, non est necesse, quum sint plurima

e alia

alia pharmaca, quæ huic malo opitulantur. Et sanè quidam etiam pota urina ab effectu non conualuit.

De Saliva. Cap. cix.

Salivæ vires diversas esse nosse oportet, tum iuxta animalium species, tum prout singula ex his sana sunt aut morbida, prout comederunt aut jejuna sunt, potaruntq; aut non potauerunt. quemadmodum enim urinæ & fel & sudores, sic & saliva, debiles quidem sunt eorum quæ cibum & potum sumpserunt. fortes autem & acres eorum qui sitim nimiam itemq; famem tolerarunt. Medium locum occupant eorū quæ probè quidem concoxerunt, nondum autem cibum aut potum ingesserunt. Hac itaq; saliva postremum relata, nutrices infantium impetigines curant, madefacto ex ea paruo digito, deinde loco perfricto, atq; hoc assidue faciunt. Sed & triticum quidam rurales manducant, & furunculis imponunt, qui sic ex salivæ viribus discutuntur & cito concoquuntur. At vero iuxta omnem suam substantiam saliva siue spiritum hominis reptilium venenatorum generi maxime contraria est. Ego enim citra omnem incantationem, ex solo jejuni sputo, scorpionem pereuntem vidi.

De stercore. Cap. cx.

Stercus summam discutiendi vim habet. Humanum ob foetorem abominamur. Verum boum, caprarū, ac canum, ubi ossa comederint, neq; foetidum est, & magna experientia commendatum non nobis solū, sed multis veteribus medicis existit. Ego itaque mirandam vim humani itemq; canini stercoreis experimento cognovi.

De stercore canino. Cap. cx i.

Dicendum autem primū de canino stercore, quo frequenter quidam ex præceptoribus nostris utebatur. dabat autem canis ossa tantum bido comedere, tertia die excretum stercus accipiebat, siccabat ac reponerat, & usus tempore terebat. Utebatur autem ad anginas alijs huic malo commodis pharmacis id ammiscendo. Dysentericis idem aridum tritum in lac per filices coctum inspergebat, & præbebat multos ita salutes. Hos itaq; duos canini stercoreis usus multa experientia, velut mirabilis medicamenti, didicerat. Sed & in malignissimis ulceribus parum de eo stercore addebat in pharmaca alias ad eiusmodi ulcera comoda, & palam fortius seipso redditum pharmacum videbatur. Quin & si quid discuti ac siccari opus esset, etiam illis medicamentis ammiscibat.

De stercore humano. Cap. cx ii.

Stercoris humani eiusmodi experimentū habeo. Quidam faucibus assidue inflammatis vehementer vexabatur, ut periculum suffocationis ipsi immineret. & sanè uenam secare propter periculū cogebatur. Huic quidam obuiam factus promisit se pharmacū datum experimento constans, & vocari se iubebat ante uenæ sectionem, si rursus fauces essent inflammatae. Itaq; accersitus, & illito pharmaco quodam, celeriter hominem sanauit. Erat autem pharmacū stercus pueri aridum, quod cum melle Aulco illinebat. Nutrebat autem puerum cuius stercus accepturus erat, velut idem ille medicus docebat, lupinorū esu, eorum uidelicet qui in frequenti cibi usu sunt, cum optimo pane. Dabat & uinū bibendū uetus. Omnia hæc moderata mole, ut probè concoquere puer posset. Tertia die excretum pueri stercus sumebat, siccabat, ac utebatur velut de canino stercore prædictū est.

De stercore lupino. Cap. cx iii.

Lupinum stercus quidā colicis bibendū dabat, non solum in exacerbationibus, sed etiam in intervallis, si quidem citra inflammationem affecti erant, uidelicet quosdā non amplius morbo hoc correptos, & correptos etiam non ita fortiter afflictos, neq; frequenter. Sumebat autem & ille albius luporū stercus, quod ab ossium esu excreuerat. Sumebat autem nō quod in terram cecidisset, nam in fruticibus ac floridis herbis hoc stercus sepe reperitur. Miratus sum porro de ipso, quod etiam adalligatū sepe prodesset. Inuenitur & in ipso quid ex ossibus deuorati animalis quod manducationem effugit, itemq; cōcoctionem, quod ipsum etiam tundens ac conterens colicis bibendum dabat, sale & piper aut tale quippiam ammiscens odoris commendandi gratia. Dabat autem cū uino substantia tenui, aliquādo cum aqua. Quod uero lūbis ægri ex stercore adalligaretur, id ligamentū habere iubebat ex lana agni a lupo discepti, aut si id haberi nō posset, ex corio ceruino. & sanè tum lorum quod lumbis circumdaretur, tum id in quo stercus inuolueretur, ac contineretur, ex eo parare iubebat. Nos autem in ollulam argenteā stercoreis lupini fabæ magnitudinem iniecimus, & quibusdam experimenti gratia appendimus, & ammirati sumus quā uideremus manifestam opem inde eos consequi.

De stercore caprino. Cap. cx iiii.

Stercoris caprini usus frequentissimus est, ac & discussoriam vim habet, induratis tumoribus cōuenit, non lienis tantum, sed aliarum partium. Itaque ego in genuum tumore inueterato & ægrè solubili, ipso usus sum ex posca, cataplasmate parato ex ordeacea farina stercore, ammixto & qui curabatur homo mirifice sanatus est, erat autem ruralis. Nam mollibus corporibus pharmacum acrius est. Equidem uisum tenuiorum partium redditur, quare ad alopecias competit, & omnia quæ extergentibus indigent medicamentis, uelut lepras, impetigines, & similia. Quin & cataplasmatibus ad parotidas et inguinum abscessus ammixtum, discussorium existit. medicus certe quidam ruralis ipso ad uesperarum morsus, multoq; magis aliarum bestiarum utebatur cum aceto, & ualde multos seruauit. Idem ille etiam eiusdem stercoreis pilulas istericis ex uino bibendas dabat, & ad muliebrem fluxum cum thure apponebat.

De stercore bubulo. Cap. cx v.

Boum stercora exigua habent inter se pro pabuli ratione differentiā. Nam & ipsa siccandi vim habent, possident & attractoriam. Medicus quidam rei medicamentariæ expertus hydropicos stercore bubulo oblitos ad solem exponebat, & multis opitulatus est. Accipiebat autem humidum adhuc uere quum boues herbā depascunt, & exiccatum reponebat. Utebatur eodem & ad strumas, & ad omnes induratos tumores cum cataplasmatibus modo imponebat.

De stercore ouillo. Cap. cx vi.

Idem medicus & ouillo stercore utebatur ad uerrucas, & specialiter myrmecias appellatas, thymos itē uocatos, & clauos, aceto autem id diluebat. Sed & amibustorum ulcera ad cicatricem eodem perducebat, rosaceo cerato ammixto.

De stercore columbino. Cap. cx vii.

Columbarum foris uictum quærentiū stercore, uelut calfactorio pharmaco, ego ipse sæpe ad multa uxor

cum

cum nasturtij semine, quod leuissimè tritum pro sinapi admisceo, in ueteribus affectionibus rubificatione opus habentibus, qualis est, coxendicium morbus, hemicrania, cephalæa, uertigo, & inueterati dolores iuxta spurias costas, aut scapulas, aut tendines, aut lumbos. Item renum, pedum & articularum, ubi callosæ concreciones nondum fuerint coactæ.

De gallinæo stercore. Cap. cxviii.

Gallinarum stercore usus sum etiā ipse, ad eos quibus strangulationis periculum ex esu fungorum imminabat, inspergebam autem ipsum tritum cyathis tribus aut quatuor poscæ aut acetij mulsi, & breui conspicuam opem senserūt. Paulò post enim pituitosum crassissimum humorem euomebant, à quo perfectè suffocationis accidens conquieuit. Medicus qui me hoc remediij docebat, etiā inueterato colico dolori id ipsum stercore ex uino mulso dabat. Quidā & in angina bibendum præbent. est autem gallinaceum stercore debilius colubino. sed & hoc ex gallinis in agris uictū querentibus, & non inclusis, accipere oportet.

De stercore anseris, accipitris, ciconiæ, &

terrestrium crocod. Cap. cxix.

Stercus anseris, accipitris, ciconiarum, & reliquorum de quibus quidam delirantes scripserunt, ipso experimento cognitum est inutile esse. terrestrium uero crocodilorum etiam ægrè parabilis est.

Sordes ouium ex qua œsypus. Cap. cxx.

Sordes quæ ouium lanis innutritur, ex qua œsypum fit, concoctoriā uim similiter ut butyrū habet, & parum quid de discussoria. Oesypus uelut Dioscorides tradit sic præparatur: Sumito lanas sordidas ex alis ouium tortas, crispas, & molles, & calidā aqua eluto, omni sorde ipsarū expressa, deinde ipsam loturā in craterē amplioris mitito, & alia feruente aqua affusa cōturbato, ita ut poculo uel alio simili uase haurias, & ex alto uolēter illidas donec spumescat. Deinde aquam marinam, uel frigidam illa non præsentē, irrorato. & desidere finito, atq; ubi perfrigeratū fuerit id quod superstat conchula tollito, & in aliud uas mitito. & affusa modica frigida aqua manibus subigito. Deinde diffusa aqua, aliā calidā affundito, & similiter ut prius cōturbato, & aquā maris uel frigidam irrorato. & desidere finito, atq; ubi perfrigeratū fuerit, rursus id quod superstat cōchula tollito, & similiter manibus subigito. Rursusq; tertio calidā aquam affundito, & idem uelut prædictū est facito, donec cādidus & pinguis œsypus reddatur, & nihil impurū habeat, atq; ita fictili inditū ad dies aliquot in solem exponito ac adseruato. Sed & omnia prædicta ad solē æstiuum facito. Sic enim commodior reddetur, & albus, nihilq; durū ac contorū habens. Quemadmodum qui cerato, aut adipe adulteratur. Facit ad ulcera fedis & uuluarum cum meliloto ac butyro, itē ad plurima alia. Oesypus ustus fuliginem ex se reddit cōmodissimā ad erosos ac scabros oculorum angulos, & ad palpebras callosas & pilorum defluuio laborantes. Vritur autē in testa noua, donec in cinerem reductus omnē pinguitudinē deposuerit: Testa ipsa carbonibus imponitur, deinde exustū colligitur, teritur, et ad prædictos usus adhibetur.

De carnibus. ex Galeno. Cap. cxxi.

Non omnes animalium carnes hominē alunt, sed aliquæ etiam sunt letales. Quædam uero non solū ut cibus, sed etiam ut auxiliare medicamen assumuntur. Et ex

his quæ alunt non omnes eandē uim habent. Omnium quidem igitur eduliorum caro ouilla maximè alit, boni succi est, & melius omnibus concoquitur, cum alijs, tum ob similitudinem ad homines. Carnes bubulæ non modicum & ipsæ alimentū præbent, neq; facile transpirans, sanguinem tamen crassiorē quàm conuenit generant, & si quis natura atrabiliarium habuerit temperamentum, affectu quoque melancholico corripitur, ex frequenti bubulæ carnis esu. Tales affectus sunt, cācer, elephas, impetigo, scabies, febris quartana, & quæ priuatim uocatur melancholia. Sed & lien quibusdam ex eius succo intumuit, unde deprauatus corporis habitus & hydropisis sæpe insequuntur. Siccioris enim & multo calidioris temperamenti est bos quàm porcus. Cæterū uituli carnes concoctu faciliores habent quàm perfecti boues, sunt enim temperamenti humidioris. Sic etiam hœdi capris præstant. Et capra quidem minus sicco temperamento prædita est quàm bos, sed hominī ac sui comparata multū euariat. Humidissimā autē & pituitosam carnem agni habent, uerū ouilla caro magis superfluitatibus redūdat & peioris succi est. Mali succi est caprina, cū acrimonia, hircina autē pessima est & ad boni succi generationem, & ad cōcoctionē. Deinceps est arietina, deinde taurina. In omnibus autem his castratorum melior est. Vetusorum pessima est concoctu, succo & alimento. Quare & sues quamuis humidum temperamentū habeant, senescentes fibrosam, & duram ac aridam, & propterea ægrè concoctilem carnē habent. Leporina quoq; caro crassiorē sanguinem generat, sed melioris succi quàm bubula aut ouilla. mali succi est & ceruina, duratq; ac ægrè cōcoctilis. At uero asinorum syluestrium caro: Nam & hanc quidā comedūt, uelut domesticorū asinorum in Alexandria: crassissimi succi est & ægerrimè concoquitur, & stomacho incōmodat. Insuperq; esu iniucūda est. quemadmodū etiam equina & camelina. nam & horum animalium carne, tum animam, tum corpus, asinini ac camelini homines uescuntur. Quidam etiam ursinas carnes edunt, & quæ his adhuc deteriores sunt, leoninas ac pātherinas. Quid uero atinet dicere de canibus, quorum catulos pingues, pleriq; homines edūt. Horū omnium animalium carnes siccissimæ natura sunt, & acre alimentum corpori apponunt. Et pro modo præparationum etiā magis aut minus nutriunt, & magis aut minus cōcoquuntur. Nā quæ assatæ aut in sartagine frictæ comeduntur, siccius alimentum corpori sufficiunt. Quæ coctæ, humidius. Quæ uero conditæ sumuntur, mediū inter utraq; locū obtinent. Sed & harum ipsarū non parua differentia est iuxta cōdituræ modum. Quapropter ubi siccare corpus uoles, sicciorum temperatura animalium carnem dabis, ubi calfacere, calidiorum, frigidiorū item & humectiorum similiter conuenienti proportionē exhibebis.

De extremis terrestrium animalium partibus. Cap. cxxii.

Hæc itaq; in summa de terrestrium animalium carne dixisse satis est. Verum de alijs partibus consequenter quam uim habeant discere. Extremas partes appellat in familiari usu homines, rostra, pedes, & aures. nam hæc minimè pinguedinem habent, minimè item carnosam naturā. prædominatur autem in his neruosa & coriacea species. Suntq; hæ partes multo motu

e a magis

magis exercitatae, & propterea etiā uiscosiores. Merito itaq; paucius nutrimentum corpori praebent, & ob uiscositatem facilius aluo secedunt. Praestant autē pedes suilli rostro, quemadmodū hoc auribus. Lingua laxioris & exanguioris carnis substantiam habet. Venter uero adhuc laxior & exanguior est quā lingua, & propterea etiā friabilior, & concoctu faciliior, citra adiacentium intestinorum ammixtionē.

De glandulis.

Cap. cxxiii.

Omnes glandulae hoc commune habent, quod iucundae & tenerae edentibus appareant. Mammariū uero glandulae quum lac habuerint, etiā illius dulcedinis nobis quid repraesentant, maximē in suis. Alimētum ex ipsis probē concoctis, ad carnū naturā propē accedit. Si uero defectuose cōcoquantur, crudum siue pituitosum humorē generant, & humidā quidē glandulae pituitosum, siccae crudum producent.

De testibus.

Cap. cxxiiii.

Ex glandulosis corporibus sunt etiā testes. Suilli itaq; & ouilli & hircini comesti aegrē concoquuntur & malum succum gignunt, propter uiscositatem quē in ipsis existit. Quāto autem suilla caro alijs melior est, tanto testes probē concocti magis alunt. De cætero soli gallorum testes per omnia optimi & iucundissimi sunt, & bonum alimentum corpori sufficiunt, praesertim saginatorum,

De renibus.

Cap. cxxv.

Renes palam est mali succi esse, ac aegrē concoqui, quādo etiā in gustu urinæ qualitatem nobis repraesentant.

De cerebro.

Cap. cxxvi.

Pituitosius edulium cerebrum est, crassiq; succi ac tardi transitus, & aegrē concoquitur. maximē uero sto macho incommodum est omne cerebrum. Quidam autem mollitie eius decepti infirmis ipsum exhibēt, quum sit praeter alia etiā nauseosum. Itaq; potius ubi uomere aliquem uolueris ab accepto cibo, cerebrum ipsi pinguius conditum postremum exhibebis. Verum uitabis ne cibum auersantibus praebas. At uero cum calefacientibus ac incisuiis medicamentis praeparatum, melius seipso euadit.

De terrestriū animalū uisceribus.

Cap. cxxvii.

Iecur omnium animalium crassi succi est, difficilis concoctionis, ac tardi transitus, praestat ex ipsis non solū ad uoluptatem, sed ad alia quoq; porcinum, eorum uidelicet porcorum qui ficibus aridis sunt saginati, quod iecur propterea Graecis sycotum, hoc est ficatum appellatur. Lien mali succi esse creditur, ut qui atrabiliarium sanguinem generet. Pulmo utroque facilius cōcoquitur, quanto etiā rarior est. Verum multo minus quā iecur alit. Alimentum igitur quod corpori inde accedit pituitosius est, propter cartilagineum asperae arteriae corpus in ipso sitū. At uero cor aegrē concoquitur ac tardi transitus est. si uero concoquatur probē, alimentum non modicum neque mali succi corpori exhibet.

De aluo, intestinis, ac utero terrestrium animalium.

Cap. cxxviii.

Aluus & uterus & intestina, in terrestribus animalibus, duriora carnibus sunt, propterea etiā si probē concoquantur, non exquisitum & inculpatum, sed frigidiorē accrudiorē sanguinem gignunt.

De syluestrium animalū carne.

Cap. cxxix.

Omnium animalium per montes ac syluas uictū quē

rentium caro durior est, & paucissimae pinguitudinis particeps. quapropter alimentum minus excrementitium ex ipsis quā ex domesticis animalibus corpori accedit.

De uolucrum animalium carne.

Cap. cxxx.

Omne uolucrum animantium genus minus alimentum corpori suppeditat, si terrestribus, & maximē suis bus comparetur, faciliior tamen cōcoctu uolucrum caro est, maximē perdicis, & atragenae, columbae, gallinae q; ac galli. Verum turdorum, & merularū, & paruorū passerulorum, item eorū qui in turribus degunt, durior est, atq; his adhuc amplius turturris, & palumbi, & anatis. Gallinarū carni similis est phasianorum, quantum ad concoctionē & alimentum attinet, sed iucunditate cibi praecellit. His durior est & aegrē concoctilis magis ac fibrosior pauonis. In cōmune autem in omnibus uolucris animantibus, uelut etiam in quadrupedibus, id nosse oportet: Quod caro crescentiū adhuc multo melior est quā decrecentiū. In uigore consistentium medium locum obtinet. Mala item est caro uetustorum, & infantium adhuc siue paruulorum. nam haec mucosa, & humida & excrementis redundans est, & facile aluo secedit. Vetustorum autē dura, & sicca & neruosa est, & propterea concoctioni resistit. Atq; huius memineris in uniuersum de omnibus animalibus. Neq; uero parua differentia est eorū quae in stagnis, aut paludibus siue palustribus locis degūt, ad ea quae per montes ac siccos locos uictum quaerunt. Etenim iuxta locorum proportionem, carnes animalium aut sicca, & superfluitatibus carentes, & cōcoctu faciles, aut contra humidā & superfluo excremento refertae & aegrē concoctiles redduntur.

De anseribus & struthocamelis.

Cap. cxxxi.

Harum caro excrementitia est, & difficilius concoquitur quā praedictarum uolucrum, non tamen alas praedictis peiores habent.

De gruibus.

Cap. cxxxii.

Gruum caro tota dura est & fibrosa, alae uero adhuc carne ipsarum duriores existunt.

De partium uolucrum animalium differentia.

Cap. cxxxiii.

Viscera in auisbus eandem proportionē habent ad carnes, quā in pedestribus habere dictū est. Intestina uero omnium ferme ad esum inepta sunt. Ventres uero esiles sunt & bene nutriunt. Quidam ipsorum etiam in cibo iucundi sunt, uelut anserinus, deinde gallinaceus. Aliqui falso collaudant struthocameli uentriculum, uelut pharmacum concoctorum. Alij multo magis praedicant praefereuntq; huic mergi uentrem. Verum neque ipsi faciliē concoquuntur, neque aliorum ciborum concoctionem uelut pharmacum adiuuāt. Alae in iuuenibus ac pinguibus uolucris optimae. In macilentis contra ac uetustis pessimae existunt. Testes optimi gallorum praesertim saginatorum, atque adhuc magis eorum qui ex seroso lacte cibos sumūt. Sunt enim boni succi, probēq; nutriūt, ac faciliē concoquuntur. Cæterum alui excretionem neque proritant, neque inhibent. Cerebrum porro in uolucrum genere longē praestantius est quā in pedestribus, quanto sanē etiā siccus est, praesertim auicularum montanarum.

De ouis.

Cap. cxxxiiii.

Oua gallinarum & phasianorum meliora sunt, deteriora

riora anserum & stirothocamelorum. Optima ad corporis alimoniam sunt tremula appellata. Sorbilia minus nutriunt, sed facilius aluo secedunt. Iguigant autem faucium asperitudines ex clamore, aut humoris acrimonia obortas. nam affectus partibus oblinuntur & adherent uelut cataplasma quoddam, & substantiae totius lenitate asperitatem curat. Eadem ratione etiam stomachi ac uentris & uesicae asperitates sanant. Ouum in aceto coctum & comestum, uentris fluxiones reficit, quod si ammiscueris ipsi quid ex medicamentis ad dysenteriam uel coeliacam affectionem commotis, deinde ad prunas in sartagine frixeris, & in cibo praebueris, non parum egris opitulaberis. Commoda ad hanc rem medicamenta sunt, uuae acerbae succus, & rus inspersus, & cinis cochlearum integre ustarum, uinaeque uuarum, & myrti baccae, ac similia. Oua cocta aegre concoquuntur, tardi transitus sunt, & alimentum crassum corpori praebent. His autem adhuc magis tardi transitus sunt, crassiorisque succi, in calido cinere assata. Fricata pessimum ad omnia alimentum praebent, nam in concoctione in nidore transiunt, & crassum humorem gignunt uisiosumque ac excrementitium, coctis & assatis meliora sunt quae desata, uel, ut alij malunt, suffocata appellantur, cum oleo & garo, & uino modico subacta, & in duplici uase ad moderate desam copagem cocta. Quae enim amplius spissantur, coctis & assatis similia euadunt. Idem facere oportet & in ouis quae patinis infunduntur, nam dum adhuc succulenta sunt, patinam ab igne tolles.

Ouorum uis medicamentaria. Cap. cxxxv.

In coeliacis ac dysentericis affectionibus, ouum praedicto modo datum, commodum pharmacum existit. Candidum & tenue in recentibus ouis leuissimum & omnis mordacitatis expers medicamentum est, non solum oculis adhibitum, sed etiam alijs omnibus partibus leuibus pharmacis indigentibus, uelut sunt sedis & pudendorum ulcera, omniaque maligna, si ad ea quae circa mordacitatem siccare illa solent ammisceatur, qualis est pompholyx, & similia. Vitellus eandem facultatem habet, & propterea lenibus ceratis additur, ouis praecoctis aut assatis. Quanto autem siccora fiunt, tantum de leniendi ui perdunt. Testae ouorum uistae medicamentum sanguinem sistens euadunt.

De alimento ex animalibus aquaticis. Cap. cxxxvi.

Animalium in aqua degentium & genera multa, & species differentiaeque plurimae existunt. Hoc loco referetur, uelut in superioribus fecimus, ea saltem quae ad usum medicum & ad sanitatem conseruandam assumentur. In uniuersum igitur illud scire oportet, quod optima caro est piscium in puro mari degentium, magisque ubi locus is uentorum procellis agitur, & neque terrea, neque leuia littora aquam ambient, sed arenosa aut aspera & lapidea. Si uero etiam ad aquiloniares uentos loci conuersi sint multo melius est. manifestum est autem mare mari praestare, in eo quod aliud perfecte purum est, aliud magnos et multos fluctus excipit. Nam pisces qui in eiusmodi mari degunt, quanto meliores sunt palustribus, tanto deteriores sunt his qui purum mare incolunt, nam & hi qui in protecto tranquillo mari degunt, peiorem carnem habent. At uero in stagnanti mari uiuentium piscium caro, medium inter fluuiatiles & marinos locum obtinet. Recrementitia uere & multum mucosa est caro eorum qui in limosa ac sordida aqua degunt, hac ad-

huc deterior est caro in stagnis degentium. Si uero & parua sint stagna, neque magnos fluuios suscipiant, neque fontes habeant neque effluxum largum, multo sane deteriores piscium carnes sunt. Si uero in totum nihil aquae defluat, sed stagnum perpetuo stans sit, omnino deterrimae. ceterum in paludibus & coenosis locis degentium extreme uisiosa caro est. Porro ex fluuiatilibus meliores sunt, quae eiusmodi flumina incolunt, quorum uelox est & multus fluxus, nam stagnantium fluminum pisces carnem habent concoctu difficilem, & bonum alimentum quam paucissimum habent, pessimi autem sunt qui in ostijs fluminum degunt, quae sterquilinia, aut balineas, aut culinas, & uestium ac linteorum sordes expurgant, & si quae alia sunt recrementa urbis quam praeterlabuntur, & quae in ipsa flumina expurgantur, maxime si populosa urbs existat. Ceterum & iuxta nutrimentum pisces meliores & deteriores fiunt. Quidam enim herba & optimis radicibus abundantes, & propterea meliores sunt. Quidam & limosam herbam & radices mali succi edunt, & aliqui in fluminibus magnam urbem praeterlabentibus degentes, stercore hominum & quosdam consimiles cibos uorant, atque hi omnium pessimi, uelut dixi, existunt. & si paulo ampliori tempore mortui permanerint, euestigio computrescunt, ac pessime olent. Suntque hi omnes esu iniucundi, & aegre concoquuntur, & bonum alimentum paucissimum habent, sed non modicam recrementitiam superfluitatem, & uisiosum succum in corporibus eorum coaceruant qui ipsis quotidie uescuntur.

De cephalo siue mugile. Cap. cxxxvii.

Cephalus maxime omnium piscium utriusque aquis utitur, fluuiatilibus & marinis. Qui igitur in mari uersatur, paruas & multas spinas non habet, iucundiorque est, & pinguitudine carens ipsius caro. Verum in fluminibus degentes cephalis, spinis referti sunt, & pinguem saporem habent, esuque & concoctu deteriores sunt, stomacho incommodant, mali succi & uisiosi existunt. At uero sale inueteratus cephalus melior seipso euadit.

De lupo. Cap. cxxxviii.

Lupus ex pelagiorum piscium numero est, hoc est eorum qui in profundo mari degunt. huius itaque caro, uelut reliquorum pelagiorum piscium, tenuior rem sanguinem generat. Si uero ad flumina ascendat, cephalo similis euadit.

De trigla siue mulo. Cap. cxxxix.

Ex pelagijs piscibus est & mulus. Aestimatione apud homines reperit, tanquam excellenter iucundus in cibo sit, habet autem duriores omnibus pelagij generis carnem, non pinguem, & friabilem, & propterea magis quam alij pisces nutrit, ubi probe concoquatur. Quidam secur eius & caput, uoluptatis gratia magni faciunt. At uero muli qui carcinadas animalcula sunt haec, ualde minutis caneris similia, colore fulua, uorant, foetidi sunt, & iniucundi, aegreque concoctiles ac mali succi. Cognoscuntur hi ex odore & sapore, sed si quis uentrem ipsorum discepar, carcinadas in ipso inueniet. Quod si quis in frequentum mulorum marinorum esu perseveret, hebetudinem uisus incurret.

De piscibus petrosis. Cap. cxl.

Petrosos & saxatiles appellant pisces, degentes ubi petrae sunt & littora saxosa. In hoc genere optimus esse

setur uoluptatis gratia scarus, deinde merula & turdi, & postea iulides, phucæq; ac perca. Alimentum ex his non modo concoctu facile est, sed & saluberrimum, sanguinem generans compage mediocrem.

De Gobio.

Cap. cxli.

Gobius litoralis piscis est, semper parvus manens, sicut etiam alij plures. optimus est & ad uoluptatem & concoctionem, distributionemq; in corpus ac humoris boni generationem, qui circa arenosa ac petrosa littora capitur. Qui uero in fluuiorum ostijs, aut stagnis degit, neque similiter iucundus est, neq; boni succi, neq; concoctu facilis. Si uero aqua uitiosa sit, etiam in ipsa pessimus gobius euadit. Si iure albo decoctus sit donec flaccidus fiat, ius ipsius potum aluum subducit. Assatus citra salem comestus, promptitudinem egerendi inanem sanat.

De piscibus mollis carnis.

Cap. cxlii.

Ex piscium mollis carnis numero sunt, aselli, murænae, buglossæ ac passeræ, & ex his aliqui in fluminibus & stagnis degunt, aliqui in mari. Et propterea aliquando iucundi & probe nutrientes reperiuntur, aliquando uitiosi & mali succi.

De piscibus duræ carnis.

Cap. cxliii.

Ex duræ carnis piscibus sunt dracones, cuculi, scorpij, orphi, glauci, congri, pagri, amia, & parui thunni ac pelarnides, ægrius concoquuntur quam pisces mollis carnis, & crassum humorē generant, & propterea fortiore uentre indigent ad concoctionem.

De piscibus testa intectis.

Cap. cxliiii.

Buccina & purpuræ & reliqua ostrea ac chamæ, ostracoderma, hoc est, testa intecta appellantur. his omnibus cōmune est, falsum saporem & qui uentrem nostrum molliat, in propria carne habere. Verum in unoquoq; genere magis aut minus talis actio inest. Nam ostrea siue conchæ inter alia mollissimam carnem habent & magis uentrem subducit, & quidam ipsa citra cocturam edunt. At uero paruræ chamæ, & purpuræ, buccinæq; ac murices & similia, duram & ægrius concoctilem carnem habent, & minus quam illa uentrem subeunt. Quemadmodum autem ægrè concoctilem carnem habent ostracoderma duræ carnis, sic etiam ægrè corruptilem habent. Quapropter exhiberi ipsa solent sepe his qui ex humorum prauitate cibum in uentre corrumpunt, coquunt autem ipsa, & aqua iterum atq; iterum diffusa, donec falsa qualitas deponatur. Sic præparata etiam uentrem sistunt. Si uero coquas & primam aquam diffundas, deinde sale aut magis garo condias, & ius bibendum præbeas, aluius bibentis multum subducetur.

De crustatis siue molli testa intectis.

Cap. cxlv.

Gammarj, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, & quæcunq; alia crusta intecta, tenuem quidē habent amabilem testam, uerū durā, minus superioribus falsum saporem habent, habent tamen, eumq; non modicum. Omnia autem carnis duræ sunt, ægrè concoquuntur, & multum alimentum, præcocta uidelicet. Horum caro uelut etiam ostreorum uentrem sistit, ubi præcocta falsum humorem in aqua deposuerit. Sed & hæc ægrè corruptilem carnem habent, similiter ut duræ carnis ostracoderma.

De piscibus mollibus.

Cap. cxlvi.

Molles appellantur pisces, neq; squamas habentes, neq; cutem asperam aut testaceam, sed mollem. Suntq; tales polypi, sepia, loligines, & qui his similes sunt.

Habent autem carnem duram, ægrè concoquuntur, & falsum humorem modicum in se continent. Si tamen concoquantur, alimentum non modicum corpori præbent. Plurimum autem crudum humorem hi ipsi gignunt.

De piscibus chartilagineis.

Cap. cxlvii.

Asperam & nocte splendidam cutem hoc genus piscium habet, quapropter aliqui à Græcis selachia appellata uolunt, quod selas, hoc est, splendorem emittat. Mollem in se carnem habent, corpedo & pastinaca, alio moderatè subeunt, & non ægrè concoquuntur, & moderatè quoque alunt.

De Echinis marinis.

Cap. cxlviii.

Echinos siue herinaceos marinos quidā ex uino multo præsumunt & garo, subducendi uentris gratia, sed & patinas ex ipsis præparant. Referuntur autem inter edulia modici alimentum, & quæ mediam facultatem inter spissantia & attenuantia humores habent.

De Salsamentis omnium animalium, pedestrium, uolucrum, & aquaticorum.

Cap. cxlix.

Non modica differentia salsarum carnum est, prout quædam ex ipsis saliantur. Nam adeo immutantur, ut sæpe animalis temperamento humidi caro salita longè siccior euadat, quam caro animalis natura sicci non falsa. Aptæ itaq; ad falsuram sunt animalium corpora, quæ duras simulq; superfluitate redundantes carnes habent. Quæ uero aut ualde mollem, aut ualde durum, aut siccum & superfluitatū expertem corporis habitum habent, ad falsuram ineptæ sunt. Quemadmodum enim sicca corpora salita corijs similia euadunt, sic ualde humida diffluunt, & salis familiaritate colliquescunt. Itaq; manifestum est, quod dura & neruosa, & uelut pelliculosa ac coriacea omnia, salita ægrè concoquuntur. quæ uero ad falsuram idonea sunt, tenuim partium sunt, & comesta crassos ac glutinosos humores attenuant. Cæterum uetera salsamenta omnia uitiosa sunt.

De garo.

Cap. cl.

Garum uim habet multum calidam & siccam. Et propterea quidam medici usi sunt ipso ad putredinosa ulcera. Quin & dysentericis & ischiadicis per clysterem infundunt.

De muria.

Cap. cli.

Muria salsorum piscium, similiter ut garum, putredinosis ulceribus conuenit, & ad ischiadas ac dysenterias per clysterem infusum. Acrimonia enim sua humores coxendicem infestantes attrahit, & per intestina euacuat. In dysentericis autem putredinosa ulcera abluit & siccatur. Maxime uero filicorum salitorum & mænularum muria ad talia medici usi sunt, & nos ad putredinosa oris ulcera adhibuimus. At uero oliuarum colymbadō muria frequenter in dysentericis utimur, præmittimusq; eam hora una ante quam crustifica infusa immittamus, ad ulcera uidelicet præmundanda.

De adipe pinguedineq; ac seuo.

Cap. clii.

Omnis pinguedinis uis est humana corpora humectandi ac calfaciendi. Verum singulæ inter se differunt, prout magis aut minus eas uires habent. Differunt pinguedo à seuo crassitudine. Quapropter animalia tota natura magis terrea, seuum habent, uelut humectiora pinguedinem. Et propterea adeps siue pinguedo

guedo facile liquefcit ab igne, non facile autem congelatur. Seuum contra non liquefcit facile, & liquefactum celerrimè cōgelatur, & multo durius adipe apparet. Humidissima omnium ferme animalium pinguedo est suilla, magis molliens ac cōcoquens oleo, quare cataplasmatum inflammationum ammiscetur. Ceterum his qui in recto intestino aut colo morsum percipiunt, item in dysentericis & egerendi cupiditate inani, caprinū seuum magis iniijimus, non quod acrimoniam obtundat, sed quod congeletur ob crassiciem. Nam suillus adeps defluit uelut oleū. At uero anserinus adeps suillo quidē calidior est, & ualde tenuium partium, & propterea infundimus ipsum his qui in alto corporū morsum sentiunt. Nam paritū tenuitate tota corpora penetrat, & omnibus mordentibus serosis humoribus ammiscetur, & mordacitatem hebetat. Medium inter suillum & anserinū locum obtinet gallinaceum ac gallorum. Porro taurorum seuum multo calidius & siccus est pinguedine suilla. Vitulinum inferius taurino est caliditate & siccitate. Similiter hoedinum inferius est caprino ac hircino. Rursus hircinum inferius est leonino. Maxime enim discussorium est leoninum, & tenuissimarum partium ferme præ omnium quadrupedum seuo. unde tumoribus inueteratis induratis, & cōtractis articulis adhibitu, ualidissimam uim discutiendi habet. Taurinum medium locum obtinet inter suillum ac leoninum, & propterea utriq; medicamento rum generi miscetur, tum his quæ induratis medentur, tum quæ inflammata cōcoquunt, quale est tetrapharmacum & regium appellatum. Quidam uiperarum adipem in principio suffusionum cōuenire tradunt. Verum ursinum alopecijs prodesse uere scripserunt. Quidam piscium pinguedinem collaudant ad suffusiones & auriū dolores, aiuntq; omniū piscium adipem ad hæc pollere. Omnis adeps ueterascens calidior ac tenuiorum partium euadit, & ob id etiam magis discussorius, id quod omnibus ueterascensibus contingit, quæ non putredo præoccuparit. Summa autem huius sermonis in commune hæc est, cuius meminisse oportet. Nempe iuxta animalium temperaturam, semper differentias adipis ac seui in ipsis fieri. Item iuxta differentiā generis. Nam masculum semper siccus & calidus est foeminino. mas autem castratus similis est foeminæ. Ita etiam omne iuvenile animal foeminæ assimilatur. Sic autem & syluestre calidius est & siccus domestico.

De medulla. Cap. CLIII.

Omnis medulla uim dura & indurata corpora emolliendi habet, siue muscoli, siue tendines, siue ligamenta, siue uiscera, hoc modo sint affecta. Optimam autem semper expertus sum esse ceruinam, deinde uitulinam; taurorum & hircorū acrior est magisque siccatoria, & propterea duritias in scierhū induratas dissoluere nequit. Cæterum methodum reliquarum differentiarum, ex his quæ de adipe relata sunt, conlectare potes.

De pulmone. Cap. CLIII.

Pulmo agninus & porcinus usti ac triti impositi, attritus calcamentorum sanant. Vulpis pulmo siccatus & tritus paulatim potus, anhelosos sanare creditur.

De capitibus. Cap. CLV.

Capita mænularum salfarum urebat quidam, utebaturq; ad rimas sedis, & putrescentes gingiuas, & ad

gurgulionem induratum. Vis ipsorum siccatoria est non ualde acris, alius quidam caput integrum leporis urebat, & utebatur ad alopecias cum adipe ursino. Viperarum capita usta in olla ad cinerem, deinde trita cum decocto lupinorum amarorum crassissimo, & temporibus illita, fluxum oculorū diuturnum sistunt. Cinis ipsorum per se leuissimè tritus, & ut aridum collyrium adhibitus, hebetem uisum magnopere corrigit.

De cornibus. Cap. CLVI.

Cornibus cerui ac capræ ustis sæpe uisi sumus ad illustrandos dentes, gingiuas quoq; flaccidas adstringunt. Aiunt cerui cornu si post usturam lauetur, dysenteriam ac sanguinis sputum, & coeliacas affectiones sanare. Ictericis quoq; utiliter præbetur. Datur omnibus duorum cochleariorum mensura. Vstum & lotum collyrijs ocularibus ad fluxiones oculorū destitatis ammiscetur. Est autem horum collyriorum uis siccatoria. Capræ cornu ad pruritus facere aiunt, itemq; ad scabiem, ulcera, affricatum.

De unguibus. Cap. CLVII.

Quidam ungues caprarum urunt, deinde cinerem aceto subigunt, & alopecijs illinunt. Sunt autē attenuatoris facultatis. Alij suum ungues urunt, & cinerem colicis in potu præbent. Aliqui asinorum ungulas ustas, comitalem morbum sanare aiunt, si assidue bibantur. Eisdem oleo subactas, strumas discutere. Cinerem quoq; earundem cum muliebri lacte probe tritum, & in collyria redactum, oculorum cicatrices detergere, si cum lacte item illinatur.

De impetigine in pedibus equorum. Cap. CLVIII.

Impetiginem equorum aceto uritam ac potā, comitalem morbum curare aiunt. Aliqui & ad omnis reptilis bestię morsum eadem uti iubent.

De lanis succidis, & puris & ustis. Cap. CLIX.

Lanæ sordidæ ac succidæ appellatæ, utiliter adhibentur ad contusas aut quomodocunq; percussas partes, fomentis excipiendis aptæ, quanquā non desit & ipsis sua utilitas, ob sordium efficaciam. Quomodo autē ex his cespum parare oporteat, iam dictū est in hoc sermone secundo, ubi de ouium sorde tractauimus. Lanæ lotæ ad suscipiendas fomentorum humiditates materia apta existunt. Eadem uisæ uim habent acrem & calidam, cum quadā partium tenuitate, ut etiam humectas in ulceribus carnes celerrimè consumant. Conijciuntur & in pharmaca siccatoria. Vritur in fictile nouū missæ, operculo addito mulra foramina habente.

De pilis ustis. Cap. CLX.

Pili usti consimilem lanis ustis, calfactoriā ac siccatoriā uim habent.

De ossibus ustis. Cap. CLXI.

Ossa usta omnia discussoriā & siccatoriā uim habent. Quidam tamen de hominū ossibus id maxime prædicant. Talium utiq; suillum ustum, deinde potum, inflationes ac tormina sanare prodiderunt. Er noui fanè ego quendam nostrorū hominum, qui ossa usta potanda dabat, ignorantibus bibentibus quid potarent, ne abominarentur, atq; sic in multis & morbum comitalem ac articularem curabat.

De pellibus & corijs. Cap. CLXII.

Pellis ouilla recens excoriata, flagris caësis circumdata, manifestè auxiliatur præ omnibus alijs auxilijs, ut in una die ac nocte ipsos cures, concoquit enim &



discutit subcruenta. Hyænæ pellem quidam domi repositam adseruant, & usu experere ipsam à rabioso cane commorsis circūdant. Nam proprietate quadam prohibet ne commorsus in aquæ timorem delabatur, sed & iam illapsis auxiliatur. Coria uetera maximè solearum usta, cinere ipsorum trito insperso, attritus calceamentorum non inflammatos sanant. Nam inflammatos exacerbant.

De uentriculo mergi.

Cap. CLXIII.

Mergi uentrem correfactum & salī modico ammixtū, crudis bonam concoctionem facere tradunt.

De uulpibus.

Cap. CLXIII.

Quidam uulpes uiuas in oleo coquunt, eoque articulares morbos sanant. Solia enim oleo calido replent, atque sic arthriticos totos insidere faciunt, & diutius immorari iubent. Maximè autem discussorium fit hoc oleū, ut ad superficiem trahat in alto corporum contenta, isticque dolores facientia, aut ob substantiæ crassitudinem, aut ob frigiditatem, aut uehementem acrimoniā, aut ob flatuosum spiritum egressum non habentem. Ex hoc enim non solum tumores in articulis ipsorum, sed etiam totum corpus repletionē affectum euacuari cōtingit, & propterea maxima utilitas inde cōsequitur, nimirum quā causæ in articulis contentæ discutiantur, & nihil amplius affectis partibus influat, toto corpore à superfluitatibus liberato. At uero si quis improba digta utatur, affectio redire solet, non tamen ita uehementer uelut antea. Nā & antea quā illæsum ab eo affectu esset corpus, uisiosa digta malum id induxit. Idem facit & hyena tota oleo uelut uulpes cocta.

De araneorum telis.

Cap. CLXV.

Araneorum telis quidam scripserunt ulcera in superficie ab inflammatione adseruare.

De ranis.

Cap. CLXVI.

Ranæ palustres coctæ, & modico sale ac oleo modico conditæ, magnā medelam afferunt à reptilibus uenentis cōmorsis, si ius ipsum in potu sumatur. Aliud, Rana in oleo cocta, & oleo pro fomento admoto, diuturni tendinum dolores sedantur. Idem oleum articulare morbum mitigat, & duritias emollit. Ranæ ustæ cinis membranæ cerebri fauciatæ, aut uenæ raptæ inspersus, sanguinis eruptionem sistit.

De mustela.

Cap. CLXVII.

Mustelam arefactā & potā, morbum sacrum curare aiunt. Si tota uiua uratur in olla, cinis eius strumas sanat cū melle, aut terebinthina, aut buryro impositus.

De terræ intestinis.

Cap. CLXVIII.

Terræ intestina trita & neruis dissectis imposita, euestigio mirabiliter auxiliantur, omnē quoque ferri aut lapidis aut alterius rei plagā glutinant, præsertim in neruosis & ægrè glutinū admittentibus partibus, aut naribus, aut auribus, & similibus. Oportet autē ea se uigare cū terra in qua reperiuntur, si non acrem aut saliam habeat qualitatē. Terræ intestina pota numero quinq; aut septem, cū passō urinam ciēt, & omne genus lumbricorum eijciunt eodem modo pota, aut quocunq; uelis. Verum latū lumbricū expellunt cū aceto mulso pota. Sed & morbum regiū ægrè curabilem per urinas expurgat, similiter eū passō septem numero pota, aut etiā per se, & cū myrrha troglodytide magnitudine ciceris. Vtere confidenter. At uero in rosaceo cocta, aurium dolores sanat, oleo calido infuso. Oportet autē terræ intestinorum drach. vi. esse,

& rosacei librā unam. Dentium quoque dolores idem oleū sedat, propinquo dolenti denti auri calidū instillatum. Eadem super prunas suffita dentium dolores sedant, ægro per infundibulū fumum suscipiente ad dolentem dentē. Molares quoque quos tollere oportet, citra forcipem tollunt usta trita, circum dolentē dentem inspersa, prius tamen dentē exacte circūscarificare cōuenit. Cinis eorundem in testa exustorū leuissimè tritus, & ut collyriū aridum admotus, incipientibus suffusionibus magnificè opitulatur. Auxiliatur idem palpebris in pilos eluxuriantibus, præeuulsis antea superfluis pilis, deinde insperso cinere in loca ipsorum per specillum. Prohibet enim pilorum præternaturā regenerationem. Septem autē terræ intestina trita, ex uino mulso ad plures dies pota, calculos in uesica cōstringunt, & paulatim emingere faciūt. Rumpunt & internos abscessus, & ad excretionē deducūt septem aut nouē pota pro uiribus, trita in aquæ cyathis tribus. Si uero quis ipsa trita in melle reposita asseruet, optimū auxiliū ad percussos à scorpione habebit. Neruorum nodos quos gāglia uocamus, eadē perse trita in cataplasmate imposita dissoluūt. Itē māmārum abscessus per se cataplasmatibus uicē imposita: suppurat enim attrahūtque, & rumpunt, & ad cicatricē perducunt. Prosumt & erysipelatis usta trita cū aceto illite. Podagrarū inflammationes soluūt trita cū melle, ad cerati crassitudinē, locis illita & tertia die soluta, locis rosaceo antea sublitis. Sed & rosaceo cerato trita excepta, optimè pedum dolores mitigāt. Cæterū in capite nō sinūt leucas, uirilignes albas alius insidentes nasci, si fuerint cōsuetis medicamentis præadstrictæ, & pili postea ex ipsis tritis cum urina pueri illinantur. Oportet autē in testa prius exurere ipsa, et sic in urina uti. Dato & hydropicis septem cū uino mulso, uerum exulceratæ uesicæ aut renibus, septē item dato trita cum sapa diluta. Strumas porro paulatim minuunt, uiua locis adalligata tot numero in pāniculū illigata, quot strumæ existūt. Sedāt omnē capitis dolorē et hemicranīā trita tēporibus illita. Subterranea autē sunt hæc terræ intestina, prodeuntia igitur & ad solem conspicua, tempestates ac pluuias significant.

De dracone marino.

Cap. CLXIX.

Draconis marini squamas urito, et tenerrimè tritū cinerem sublinito, & turbatos ac hebetes oculos sanabis, item eos quibus animalcula uelut culices, præ oculis uolitare uidentur.

De uipera.

Cap. CLXX.

Viperæ caro comesta palam calfacit ac siccatur, oportet autē capite & cauda amputatis ipsam excoriare, & omnia interanea eximere, aqua que triplid carnē eluere, deinde in aqua uelut anguillam coquere, addito marrubio, & anetho modico, paucoque oleo. atque ubi iā cocta fuerit, moderato sale cōdire, & edenda præbere, itemque ius absorbendū. Quod autē uiperæ carnes sic comestæ purgent per cutē totū corpus, ex his cognoscere licet, quæ quādhuc iuuenis essem, expertus sum. Homo quidā elephantiasī correptus abominabilis erat & graueolens. Itaque casa prope uicū exstructa in ipsa degebat. Metebant autē in uicino messores, quibus uinū in amphora apportabatur. Vbi ergo tēpus bibēdi adesset, messores uinū in craterem effundebant, atque sic mortua uipera simul excidebat. Itaque plenum humanitatis opus se facturos rati, uinum ægro ad elephantiasī largiuntur: melius enim esse

numero, ut
erit ut
de Cicadis

esse iudicabant ipsum mori, quàm talem uiuere uitâ. Verum is epoto uino mirabili modo sanatus est. Et enim uniuersa eius tumescens cuticula. uelut ostreorum testorium decedebat, & quantum eius reliqui fieret, satis molle apparebat, uelut in locustis ac cancris uidere est, ubi testam exuerunt. Quin & in alijs plurimis cõsimiliter accidisse, ueteres memorię prodiderunt. Et nos multos ex uiperis curatos uidimus, unde etiam theriacę ipsas miscemus.

De herinaceo marino.

Cap. CLXXI.

Herinaceus marinus comestus superiori uentriculo cõducit, & cibos auersantibus, appetentiã excitat. Vrinam laxat idem uescicam expurgans, unaq; aluum leniter emollit.

De herinaceo terrestri.

Cap. CLXXII.

Herinacei terrestris caro siccata & paulatim pota, elephantiacis auxiliatur, & uitiatu corporis habitu prædijs, conuulsisq; ac nephreticis, insuperq; aqua subtercutē laborantibus; habet enim uim discussoriã ac siccatoriã. Sed & iecur ipsius sole siccatur ac potu, elephantiacis opitulatur. Cæteru utriusq; herinacei terrestris ac marini ustoru cinis exterforius est ac discussorius, & carnē consumit. Quapropter & ulceru superexcrecentē carnē demolitur ac cõpescit, & sordida ulcera expurgat. Veru herinacei terrestris usti cinis pice liquida exceptus alopecias sanat. Eiusdē cinis potus cū uino mulso calculosos renes sanat. & aqua intercutē. Bibitur cineris cochlearij dimidij mensura. Omnē urinq; difficultatē ex quacunq; causa obortā, soluit herinaceus, si intestina ac interanea ipsius suffiatur, ægro undiquaq; cooperto: celerrimē enim sic malū soluitur. Ad hãc rē interanea inueterata esse oportet, & sicca asseruata: quibus nō præsentibus caro aut pellis sicca sufficēda est. Multa urinā ciēt interanea sicca trita pota, quantū tribus digitis apprehendi potest, ex uino. Eiusdē caput ustu, & cū adipe ursino illitū, non modo alopecias persanat, sed etiã pilos excicatoribus producit. Corium autē ustum itidem cū adipe, maximē ursino illitū, similiter alopecias sanat. Totus porro terrestris herinaceus uiuus in oleo ad mollem ac lētum ignem coctus diutiusculē, oleū ex ipso coxendicum dolores ueteres, illitu sanare facit. Fit ex ipso & psilothrū pilis denudandis hoc modo. Herinaceū uiuū in ollam densissimum operculū habentē, & duodecim sextarios capientē mitrito, & ad ipsum olei sextarios sex tantū affundito, & ollæ osculū diligenter gypso oblinito, ut nullatenus transpirare possit. deinde ad dies x l., ad solē sub caniculæ æstibus exponito. Postea apertā tudicula noua diligenter agitato, & mox excolato per panniculū, uitior. Illinatur ex eo locus in sole, & diu cõfricetur donec exudent. postea aqua dulci affusa proluet. Cauendū autē ne alios locos cõtingat, quos depilare nolis.

De Hippocampis marinis.

Cap. CLXXIII.

Hippocampi marini & assati comesti, & morsui impositi, à cane rabioso commorsos sanant. Verum cum aceto mulso & melle ipsos conterere oportet.

De cantharidibus.

Cap. CLXXIII.

Cantharidum magnificū experimentum habemus ad scabros ungues. Extrahunt enim ipsos cõmodis medicamentis ammixtæ. Miscentur autem alijs erodentibus compositionibus, & excoiatorijs leprosorū. Quidam ex præceptoribus nostris in pharmacum urinam ciens parum de cantharidibus addebat, reie-

ctis alis ac pedibus. Ad hos usus commodiores sunt, uelut ego expertus sum, quæ in tritico reperiuntur, & uirgulas transuersales melini coloris in alis habet. Magis autem adhuc idoneæ fiēt, si uiuas ipsas in uas fictile mittas. Deinde osculo uasis rarum linteolum obducas, deinde acetū in olla feruefacias, & uas cantharidum inuersum supra ollam detineas, ita ut uaporem ab aceto elatum, per linteolū cantharides excipiant, donec emorianiur.

De cancris fluuiatilibus.

Cap. CLXXV.

Cancros fluuiatiles crudos tritos & lacti mixtos in potu præbe, & omnis reptilis morsum curabis, & præsertim scorpionis plagæ medeberis, & cum qui potu lepore marino iam perit, statim restitues. Manifestum autem est, quod internam eius carnem cum lacte terere oporteat. Similiter exhibitū auxiliantur etiam phthiricis cõtabescentibus. Itemq; iure albo cocti & comesti, absorpto insuper iusculo. Cæterum cinis cremati cancri similiter ut alia uita siccatur. Veru quædam totius substantiæ proprietate, ad rabiosi canis morsum efficax est, tū solus, tum multo amplius gētiana & thure additis, ita ut sit thuris pars una, gētianæ quinq;, cineris cancrorū partes decem. V si fumus autē ustis aliquando quidem alio modo, ferē tamen quomodo præceptor noster utebatur. Patinam habebat is ex fere rubro, in quam uiuos cancos missos urebat, lignis uitis maximē subiectis, donec ad cinerem redigerētur, ut cõmodē teri possent. Atq; sic habebat semper præparatum domi suæ pharmacum. Vtebatur autē ipsos cancos mense Augusto sub caniculæ æstibus luna decima octaua. Ex eo uero quotidie à rabido canē cõmmorsis dabat usq; ad quadragessimū diem cochlearium satis amplum in aqua inspergens. Si autem nō à principio, sed post aliquot dies à morfu commorsi curam suscipiebat, bina cochlearia quotidie dabat, ut quadraginta dierū exhibitio expleretur. Vtebatur uero & ad uulnus ipsum medicamēto ex brutia pice, in quod recipiebat pice libram 1. aceti acerrimi sextariū 1. opopanacis quadratē. Porro cinere cancri fluuiatilis usti melle addito, plantas pedum à frigore ruptas, & digitorum rimas sanabis. Eodem etiam maligna & cancerosa ulcera curabis.

De carabo siue locusta.

Cap. CLXXVI.

Locustæ testam uistam ac tritam cum meraco bibendā dato, & alui infernum fluxum compescet. Expurgat eadem & calculosos renes, multam arenosam urinam deducens.

De testibus castoris.

Cap. CLXXVII.

Castoris testes castoriū appellant, celebrē et multū usus medicamentū, hic in uniuersum uim eius referemus, ad quā si quis respiciat, particulares usus sibi ipsi exquirere poterit. Calfacit itaq; & siccatur, estq; multum tenuis partium medicamētum, siue quis humido corpori adhibeat egente siccatione, siue frigido indigendo caliditatis, siue his qui ex repletionē conuelluntur, ubi ea quæ præter naturam in neruis cõtinentur euacuare oportet, magnam quidem utilitatem ex se ostēdit, & nulli parti ullum aliquod detrimentum affricat, præsertim si homo non uehementi aliqua febre laboret. Eadem ratione & tremulis ob crassorum ac uiscosorum humorum multitudinem, commodissimum est potum, utile est & singultui, ex humorū frigidorum ac uiscosorum copia osculo uētris infarta oborto,

aborto. Si uero ex siccitate, aut immodica euacuatione, aut acriū humorum mordacitate, singultus aut conuulsio oriantur, castorij usum uelut infestissimū fugere oportet. Sed & febrientibus non adeo calida febris, sed ut ita dixerim tepida, uelut in altiore sopore, ac lethargo fieri solet, ualde multis castorij exhibuimus cū pipere, utriusq; cochlearij ex aqua mulsa, & nemo ex ipsis ulla parte laesus est. At uero in lethargidis ac alti soporis febribus, castorium rosaceo dilutū capiti imposuimus ac ceruici. Ad suppressos autem menses ob copiam ac crassitudinem sanguinis, sanguine à talo moderatè detracto, cochlearium castorij cū pulegio aut calamintha exhibui, cognoui q; medicamentum ipsum purgationem menstruam clere. Eijcit & secundas detentas, & morantes, similiter cū aqua mulsa potū. Inflatos uētres & torminosos propter crassum ac flatuosum spiritū conclusum, ex posca potum sanat. Datur & orthopnoicis recta ceruicē spirantibus, cū aceto mulso aut posca. Suffitur & in carbonibus, hiantē aegro & uaporem excipiente.

De canis fluuiatilis testibus. Cap. CLXXVIII.

Canis fluuiatilis testes ad eadem cōmodū ad quē castorij testiculi existunt, sunt tamen debiliores, eiusdem canis pellis ad calceamentum redacta, pedum ac neruorum morbum egregiē mitigat.

De canis terrestris catulo. Cap. CLXXIX.

Catulus canis terrestris probè saginatus iuxta aegrum accliuatus, siue stomacho, siue alia interna parte egrotet, morbum eximit ac sanat, affectu in ipsum transeunte. Aiunt eundē mortuū diligenter lepelli oportere.

De cygni pullo. Cap. CLXXX.

Cygni pullus tener in oleo coctus, neruis affectis præter omnem opinionem medetur.

De buccinorum testis uitis. Cap. CLXXXI.

Buccinorum testæ ustæ uim multum siccatoriam habent, unde commodis medicamentis ammixtæ inflammationes induratas discutiūt. Consimilem uim habent purpurarum ac ostrcorum testæ.

De galerita uolucere. Cap. CLXXXII.

Corydalis Græcis appellatur, & Latinis galerita, uolucere animal paruū, quod sæpe iuxta uias uidemus. id simplici iure coctum ac comestū colicis prodest. Oportet autē assidue & frequēter id edere, unā cum iure. Nam utilitatem ex ipso sæpe expertus sum. Habet autem eminentiam quandam in capite uelut cristam, ex primis sponte naturæ productam.

De cochlea terrestri. Cap. CLXXXIII.

Cochlea terrestris durā carnem habet, & propterea comesta aegrè concoquitur. Verum iusculū ipsius coctæ ex aqua & anetho, oleo q; ac garo, alio secedit si potetur. Si uero prima & secūda aqua in qua coquitur diffusa, in tertia coxeris donec exacte flaccescat, & in fluxione uētris exhibebis, uentrē sistet. At uero cochlearum humiditas sola per se citra carnē accepta (uocāt autē eā ipsam cochleæ mucū) & thuri ammixta, aut aloæ, aut myrrhæ, aut aliquibus ex his, aut omnibus, donec ceratū crassitudinē habeat, pharmacum euadit glutinatoriū, & submucosos auris tumores probè siccāt. Glutinat itē ac siccāt oculorū fluxiones frōti impositū. Quum itaq; multū eius mucī colligere uoles, carnē ipsarū stylo perforato. nō modicā enim humiditatē emittunt, præsertim si nō ante multos dies capte fuerint. Hæc autē humiditas palpebrarum pilos reglutinat. Ego autem aliquando in agro

cuidam neruos sauciato unā cū tendinis contusione, carnē cochlearum imposui cū farinæ polline qui molendinis adheret trita, & citra inflammationē uulnus glutinātū est. Erat autē homo duræ carnis. Quod si ad manū sint, præstat ammiscere in talibus myrrham aut thus, aut resinā frictam leuissimè trita. Cæterum caro ipsa in pila prius cōtusa, deinde trita & imposita, omnes partes superfluam humiditatē habētes siccāt, ut etiā hydropicis prodest. Sed & unā cū testis suis tritæ cochleæ uentri uniuerso hydropicorū imponuntur, & super articularū tumores in arthriticis, & appositio quidē ipsarum difficulter auferri potest, uerū multum siccāt, & sanè sinendæ sunt donec sua sponte decidant. Idem facere expedit & in tumoribus aegrè solubilibus ex plaga, aut cōtusione factis in auribus. Nam omnes hos exiccat, etiam si uiscosum & crassum in alto cōtineatur. Integræ porro cochleæ unā cum testis ustæ, galla omphacitide ac pipere ammixtis, magnopere prosunt dysenterijs, in quibus ulcera nondum sunt putredinosa. Oportet autem esse pipers partē unā, gallæ duas, quatuor cineris cochlearum. Quæ omnia exacte leuigata ac mixta, reposita seruabis, & usu expetente cochlearij plenā mensuram obsonijs insperges, aut cum aqua calida aut uino bibendam dabis. Citra uero ullam admixtionē ipse cinis cochlearum ustarum siccandi uim habet, cui & quiddam caliditatis propter usturam inest.

De menulis. Cap. CLXXXIII.

Menulæ salsæ caput ustum, excrecentes in ulceribus carnes, maximè in dentiū gingiuis, reprimūt inspersum, & callos eximit, quos clauos uocant, & extuberrantes sedis eminentias tabefaciunt ac consumit.

De torpedine. Cap. CLXXXV.

Torpedo usua apposita, diuturnum capitis dolorem depellit, & prolabantem sedem intro pellit. Mortua uero aut omnino non, aut modicè hæc facit.

De asello marino. Cap. CLXXXVI.

Asellus marinus aqua coctus cum anetho, & modico sale conditus, oleo q; pauco, omnem interaneorum morbum sanat, maximè alui ab acris humoribus infestatæ.

De ostrcorum testis. Cap. CLXXXVII.

Ostreorum testæ omnes leuissimè tritæ & ad puluillū redactæ, ulceribus malignis conueniunt, & præsertim in ulceribus corrodentibus labiorum optimum pharmacum sunt, citra mordacitatem ad cicatricem perducentes: participes enim sunt facultatis adstrictoriae, per quam duræ ac terreae existunt. Eam autē per usturam amittūt. Eadem cum aceto aut posca aut uino mulso tritæ, putredinosis commodè fiunt, pro habitu uidelicet aegroti, cōueniente humore ammixto. Quod si uratur ostrcorum testa, tenuiorum partiū euadit quā buccinorum testa. nam & minus durū est ipsarum corpus. Si uero lauetur hic cinis, commodus fit ad humectiora ulcera explenda & ad cicatricem perducenda. Atque ego sanè ostrcorum testa hoc modo præparata semper utor, ad cauitates ac fluxiones diuturnas & aegrè carnem recipientes, etiam si fistulosæ essent ac profundæ. Circumpono autem eam forinsecus cum adipe suillo uetere, & in ipsum sinum quid indo ex his quæ talia carne replere solent, quale est pellucidus lapis, specularis appellatus. Quin & dentes ostrcorū testa illustrat, uelut etiā buccinorū, & purpurarum, nō solum uel extersoria, sed

etiam substantiæ aspretudine. Quapropter nō est necesse ad hanc rem ipsas ualde leuigare, eadem lotę ac tenuissimē tritę humore flaccida ulcera exiccant.

De purpurarum testis. Cap. CLXXXVIII.

Purpurarum testę cum aceto potę lienes tumentes sanant. Suffitę uero uteri strangulatus curant, & secundas morantes detrahunt. Vistarum cinis ad eadem facit ad quę buccinorum adhibetur.

De Squatina marina. Cap. CLXXXIX.

Squatinam marinam uistam crassioribus corporibus in balineo inspergito.

De Sepia. Cap. CXC.

Sepia suffocata in aceto, si cum oleo acetum bibendum dederis, cum qui hippocampi marini uenenū sumpsit seruabis. Testa septę exterioriam & siccatoriam uim habet, estq; tenuium partium. Quapropter uita utimur ad uirilignes, maculas solares ac lentigines, & scabiem. Sed & sale ammoniaco ammixto, oculorum ungues exerit. Eadem non uita, dentes illustrat, & affricta oculorum cicatrices deterit, & ulcera in ipsis siccant. Magnas quoq; palpebrarum aspretudines, sycofes Gręcis dictas, consumit.

De Scinco. Cap. CXCI.

Scinco circa renes partes, ad lentiginem pudendorum ciendam bibuntur. Neq; aliud magis contrariū huic facultati destruendę uidetur, quā lactucę semen ex aqua potum. Quidam etiam lenticulę decoctum cū melle potum, lentiginem sedare tradunt.

De Tellinis. Cap. CXCI.

Tellinarum salinarum uistarum cinis cum cedria adhibitus, superfluos palpebrarum pilos renasci prohibet.

De Cicadę. Cap. CXCI.

Cicadę siccis quidam utuntur in colicis affectionibus, cum parī numero granorum piperis, exhibentq; aut tres, aut quinq; aut septem, tum in interuallis, tum in exacerbationibus. Alij tostas in uesicę dolore, ac calculosis, edendas præbent.

De Hyena. Cap. CXCI.

Hyena uiua in oleo cocta, uelut de uulpe dictum est, oleum discussorium efficit, arthriticis utilissimū, Vnus fiat uelut de uulpe indicauimus.

De Hirundinibus. Cap. CXCV.

Hirundinū uistarum cinis cū melle illitus, anginā sanat, & omnino omnes affectiōes quę in faucibus ac gurgulione cū tumoribus fiunt. Quidā & ad acuendum uisum cinerę utuntur, collyrii sicci modo adhibentes.

De electione optimorū medicamentorū. Cap. CXCVI.

Agaricum præstat quod strias rectas habet.

Acadam elige fuluam & odoratam.

Aloēn elige purā, non lapidosam, ualde splendidam, densam, subflauā, friabilem, hepatis colore, facile liquecentem, odoratā, amaritudinis intensę. Nigra uero & ualde dura reprobatur.

Amomū elige recens & albū aut subruffum, non coactū, sed soluiū & diffusum, semine plenum, simili racemulis, ualde graue et odoratū, nō cariosum, acre & gustu mordax, colore simplex nō uariū. Adulterat qdā id amomide simili existēte. Sēper aut fragmēta reprobāda sunt, electis ramis pfectis ab una radice.

Ammoniācū thymiāma eligēdū est nō lignosum, granis thus referens, purū, densum, nihil sordidū habens, castorei odorē præ se ferens, gustu amarum.

Aspalathus bonus est grauis, & post decorticationem subruber aut purpuram referens, densus, odo-

ratus, saporis amarī.

Abfinthium melius est quod in Ponto & Cappadocia nascitur.

Bicumen optimum est purpurei coloris, splendens, intenti ac grauis odoris. Nigrum autem uitiosum est. Nam pice ammixta adulteratur.

Bdelliū præstat gustu amarū, colore glutinis, pingue in altum & facile molliri potens, nō lignosum, non sordidum, iucundi odoris in suffitu, & unguis simile aromatico, onychi appellato.

Elleborū nigrum eligito probē coactū, tenuem habentem medullam, acrem gustu ac feruidum. talis est qui in Helicone prouenit ac Parnaso & Andicyra.

Elleborū album elige moderatē extentū, & albū fragilemq; ac carnosum, nō acuminatū & iunceum, aut puluerulentā lanuginē remittentē dum frāgitur. quiq; medullā tenuē habeat, gustu feruido nō ualdē neq; acruatū, saluā attrahentē: qui enim talis non est suffocatorius existit. Primas obinet Cyrenæicus.

Euphorbiū elige pellucidum & acre.

Viscum optimum est recēs, coloris prasinī intrinsecus, foris subflauum, nihil asperum aut furfuraceū habens, colligitur ex quercu, maloq; ac pyro, & alijs arboribus.

Gluten piscium bonum est non glaucum, subcrassum, non scabrum, facile liquecens.

Calamus aromaticus bonus est fuluus, dēis geniculis, & qui in multas scissuras & segmenta assulose frangitur, fistula telis aranearū repleta, subalbidus, in manducando uiscosus, adstringens, & subacris.

Cardamomū optimū est quod ex Armenia afferatur. Elige quod ægrē frangitur, plenū & conclusum.

Cassiam elige fuluā, boni coloris, corallium referentem, arctam ualde, longam, crassam, fistulis plenam, gustu mordacem, & adstringentem cum quodam aromatico feruore, uinum redolentem, uerum purpurea & crassa zigir appellata, rosam odore referens, ad medicum usum maximē apta est.

Cera optima est subpinguis, odorata, pura, pōtica.

Glutinū quod aliqui xylocollam uocant, optimum est Rhodianum, estq; album & pellucidū. Nigrum uero deterius est.

Gummi elige uermiculatum, uiriforme, pellucidum, non lignosum. ab eo proximum est album, resinofum uero ac sordidum inuile est.

Costus optimus est Arabicus, albus existens ac leuis, plurimum habens & iucundū odorē. secundum locū obtinet Indicus densus existēs ac leuis & niger uelut ferula. Tertius est Syriacus coloris buxi, odore nares percellens. Optimus est recens, albus, plenus ex toto, densus, siccus, teredinem non sentiens, gustu mordax ac feruidus. Quidam adulterant ipsum heleni radicem ammiscentes, facilis est cognitio. Nam helenium linguam non seruefacit, neq; odorem intentum & nares percellentem exhibet.

Crocus optimus corycius est, recens ac boni coloris, parū albedinis in capreolo habens, oblongus, integer, probē coactus, plenus, nō friabilis, nō pinguis, & tamen in attritu digitos facile tingens, non cariosus, imperuosi odoris, & acris. Qui enim talis nō est, aut uetustus est, aut maceratus. Quo uero facile teri possit, in sole ac fictili nouo siccare oportet.

Crocomagma sic præparatur: Croci drach. centū, rosarū siccarū drach. quinquaginta, amyli drach. 1. myrrhæ

myrrhae troglodyticae, gummi utriusque drach. l. uno odorato terito, & pastillos formato, eisq; in umbra siccat, utitor.

Cyperi radix optima est quae grauiissima & densa ac plena, ægre friabilis, aspera, odorata, cum quadam acrimonia.

Thus primas obtinet masculum, rotundum, non scissum, album, & ubi incisum est intus pingue. Adulteratur resina pinus aut gummi, facilis est cognitio.

Thuris cortex præstat crassus ac pinguis; odoratus, non scaber aut pelliculis refertus; adulteratur cortice strobili aut pini ammixto. deprehenditur id igne; alij enim cortices suffiti fumum edunt. Verum hic ardet odore sucundo uelut thus.

Malabathri folium bonum est recens, in nigrore subalbidum, non friabile, integrum, odore nares percipiens, & dum diluitur odoratum, nardum sapore non falsuginem referens, quod uero in tenues partes contusum cariosum odorem repræsentat uitiosum est.

Medulla optima est ceruina, deinde uitulina, post taurina. Bona est quae æstate accedente ad autumnum colligitur: alij enim temporibus cruenta uestigia in ipsa reperiuntur. curatur ad repositionem, recens molitus aqua affusa, deinde per lintheum excolatur, rursusq; lauatur, donec aqua pura fiat, postea in duplici uase liquatur, sordibus innatantibus penna ablatis, postquam autem congelata fuerit, in fistili nouo reponitur, derasa diligenter fece quae post liquefactionem & excolationem subsidet.

Panacis radices meliores sunt siccae & albæ, extentes, & incorrosæ, gustu feruidæ, & aromaticæ. Succus panacis commodus est gustu amarissimus, forinsecus uiridis, intrinsecus albus, pinguis, citò solubilis, grauis odoris, & gustu calfaciens.

Myrrha primaria est Troglodytica, subutridis & pellucida, odorata, acris. quae uero colore picea est, inutilis existit.

Statte myrrha bona est odorata, leuis, oleum admixtum non habens.

Styrax præfertur flauus & pinguis, resinosus, grumosus habens subalbidus, ualde odoratus, & dum molitur, humiditatem melleam remittens.

Tragacantha optima est pellucida & leuis, tenuissima & pura, subalbida.

Hyoscyamo utendum est eo qui albos flores producit.

Galbanum optimum est thuriforme, grumosum, purum, non lignosum, quod & ex semine quid ammixtum habet, odore graue, & neq; summe liquidum, neq; ualde siccum.

Gagates lapis præfertur qui facile accenditur, & odorem bituminosum repræsentat.

Melanteria optima est sulphurei coloris, leuis, æqualis, pura, & contactu aquae citò nigrescens.

Pompholyx optima est Cyprica, & quæ aceto subacta aeris odorem refert, colorem autem picis. Est autem & coenosi saporis, & carbonibus ignidis imposita, ardet colorem aëreum repræsentans.

Ex Oribasij libris ad Eustathium & Eunapium, de simplicium pharmacorum facultatibus.

Quae media sunt inter calfacientia ac frigefaciencia.

Cap. cxcvii.

Adiantum, asparagus myacanthinos, muscus qui &

splanchnon dicitur, glycyrrhizae succus, oleum dulcissimum, cera, faba, lycium, lotus siue trifolium, citri cortex, filicis radix, nuclei nucis pineae, lentiscus, lès, terra chia & samia, cadmia, spuma argenti.

Quae moderate calfaciunt.

Cap. cxcviii.

Vitidis folia & semen, urticae semen & folia, amygdala dulcia, anagallides ambæ, atractylis, glycyrrhizae radix, oleae radix, & fructus maturus, fermentum, eryngium, resinae omnes, cicerbita sicca, funi odorati flos, palmae fructus, cochlearum cinis, cynocrambe, batrachij herba & radix, pulegium, lauri folia, & magis baccæ, minus autem radices cortex, dictamnium, pseudodictamnium, salvia, erysimum, lanae uisæ, bryoniae radix, aristolochiae radix, asphodeli radix, daucus, chamædaphne, dracunculi radix, oleum raphaninum, cicerum species tres, uiscum, caucalis, ligusticum, ferule semen, sagapenum, satyrion, apium, sion, sinon, styrax, hydropiper, hypericum, sal, sanguis, fel, urina, salina, sulphur, uiperarum carnes, adeps, salorum piscium muria.

Quae calfaciunt primo ordine.

Cap. cxcix.

Aloë, chamæmelon, agaricum, absinthium, ladanum, lini semen, malabathri folium, spica nardi, nardus celtica, uinum nouum, serum lactis, calcus, ficus sicca.

Quae calfaciunt secundo ordine.

Cap. cc.

Amurca, anethum siccum, sed uiride minus, artemisia, balsamum, elaphoboscum, calamus aromaticus, crocus, thus, mastiche chia, mel, uinum, pix, melissophyllum, marrubium, propolis, cucumeris syluestris succus, scandix, scilla, cardui radix, myrrha, terebinthi cortex foliaq; ac fructus, foenum graecum, chamæleontis utriusq; radix, chamæpitys, ocymum.

Calfactoria tertij ordinis.

Cap. cci.

Abrotonum præsertim uisum, lolium, populi nigrae flores & resina, acorus, amomum, amaracum, ammiu, anethum uisum, anisum, juniperus, asari radix, sabina herba, ueratrum utrunq; epithymum, menta, calaminthe, thymbra, harundinis uallatoriae cortex uisus, caroum, calia, cedrus utraq; cnicus semen, conyzæ, cuminum, thuris fuligo, feniculum, melanthium, mei radices, moly siue ruta syluestris, aut besasa, rhododaphne, uinum uetus, origanum omne, opopanax, petroselinum, ruta, symyrium, hyssopus, galbanum, chamædryas, raphanus, sampsuchus.

Calfactoria quarti ordinis.

Cap. ccii.

Adarce, ampeloprason, euphorbium, oleum cedrinum, costus, cepa, lepidium, sinapi, allium, sthruthij radix, tithymallorum succi, & omnia uisoria uel prædicta.

Quae frige faciunt.

Cap. cciii.

Gramen moderate, auricula muris, citra adstrictionem, pira in cataplasmate imposita moderate frigefaciunt, balauitium, rubi folia & germina & fructus uiridis ac flos ipse. Avena moderate, muscus marinus, glaucum moderate, dorycnion ualde frigefacit, harundinis sepiariae folia moderate, cicuta summe, lichen in petris nascens, papauer omne, mali fructus, oleae fructus & folia, oleum myrteum, sesaminum, balaninum, helxine siue perdicia moderate, panicum, uioleae folia & succus, mali persici & citri caro, fungi multum frigefaciunt, item omphacii succus, amyli moderate, rosaceum mediocriter, sordes ex palæstra, cicerbita non sicca, tribulus uterque, ramorum palmae succus. Samia terra moderate, cimolia terra, naziae cotis detritum siue retrinectum, plumbago mediocriter,

diocriter, plumbum, cerussa, sandyx, caseus mollis recens coactus moderatè perfrigerat.

Que frigefaciunt primo ordine. Cap. ccciii.

Acacia illota, atriplex citra adstrictionem, uinacea, milium, ordeum, platanus, rhamnus, seris.

Que frigefaciunt secundo ordine. Cap. ccv.

Acacia lota, plantago, blitum, galla, omphacitis, cucurbita, cucumis, pepo, solanum hortense, lens palustris, alga uiridis, circa prærupta maris littora collecta, psyllii semen.

Frigefactoria tertij ordinis. Cap. ccvi.

Semperuium utrunq, portulaca, mandragora, citri pars acida, polygonum, potamogeton, hyoscyamus qui & florem & semen album habet.

Frigefactoria quarti ordinis. Cap. ccvii.

Succus papaueris, cicuta.

Que siccant citra mordacitatem. Cap. ccviii.

Vitice semen & folia, amurca, anagallis utraq, auena, plantago, oleum dulce insulsum lotum, fermentum attrahit ex alto ac discutit. Lupinus amarus, hippuris fortiter, isatis, salicis flos & folia cum quadà adstrictione. Quidam & succum ex ipsis faciunt, & phar macum habent citra mordacitatem siccans ad multa cōmodum. Verum multò amplioris usus est phar macum siccans & adstringens, nucis cortex ustus, si mulq, tenuiū partium existit, miliū, centauriū tenue fortiter siccant, cerasi gummi, liliū, faba, forinsecus imposita, cupressi folia ac reliquæ partes, cyperi radix, nucis pinæ nuclei aqua macerati, nymphææ radix, siræū siue sapa, quinquifolij radix, polypodiū, myrrha, sarcocolla, stoebe, tragacantha, terra omnis, cadmia, aliæ petrae flos humore flaccidas carnes consumit, pompholyx sæpe usta, calx strennuè, oui candidum ac tenue, eadem uis & uitellorum est.

Que simpliciter siccant. Cap. ccix.

Viticis folia & semen, graminis radix moderatè, adianthum, semperuium utrunq, amarantum fluxiones sistit potum, bryoniæ radix, anagryi folia sicca, pira in cataplasmate imposita moderatè, aristolochia, asparagus myacathinus, asphodeli radix, & magis cinis, balauustum ualde, ruborum fructus immaturus, quercus partes omnes, phagi similiter, bulbus in cataplasmate, eryngium, isatis, salicis corticis cinis uehementer, cannabis semen, pæoniæ radix, lauri folia uehementer, & magis baccae, oleum cyprinum, laurinum, panicum in cataplasmate impositum, nasturtiū, caucalis, pastinaca syluestris siue daucus, lixiuiū, præsertim ex cinere ficulneo, brassica, caules autem eiusdem cinerem fortiter siccantem faciunt, crethmū, lilij folia & radix, omphacium, platani cortex & pilulæ moderatè, polypodium, amyllum, sal, nitrum, gypsum præcipuè ustum, cadmia omnis, omnia metallica & lapidea ac terrea, testa clibanorum, coagulum omne, sterus, anserum tamē & accipitrum inutile est propter multam acrimoniam, sordes, siue strigmenta, carnes uiperarum, capita menularum, salसारum, cornu cerui ac caprae, castorium, ossa usta fortiter, capilliusti, sepia testa, lanæ usta, cancrorum cinis, garum abunde, muria.

Que primo ordine siccant. Cap. ccx.

Chamaemelum, iuniperi baccae, caroum, ordeum, polenta, crocus, thus, foeniculum, rhododaphne, uinum nouum, cucumeris & peponis semen, & radix sicca, foenum græcum.

Que secundo ordine siccant. Cap. ccxi.

Lolium, amaracus, bitumen, anethum, balsamum, uinacea, gingidium, elaphoboscum, calamus aromaticus, thuris cortex, & folia arboris, itemq, semē, meū, mastiche, mel, spica nardi, nardus celtica, uinum, eruum, opopanax, pix, rhamnus, raphanus, scandix, cardui radix, myrrha, lentiscus, terebinthi fructus & folia, lentes, alga humida & uiridis, malabathi folium, galbanum.

Que tertio ordine siccant. Cap. ccxii.

Abrotonum præsertim ustum, acacia, acorus, aloë, ammiū, anethum ustum, anisi semē, iuniperus, asarū, absinthium, herba sabina, ueratrū, epithymū, thymbra, calamintha, harundinis sepiaariæ cortex ustus, caroum, casia, cedrus, conyzza, thuris fuligo, nigella, citri semen, uinum satis uetustum, acetum, origanum, quinquifolij radix, petroselinum, smyrnium, ruta hortensis, marrubium, rhus, sampsuchus, seriphium, hyssopus, chamaedrys, chamæleontis utriusq, radix, chamaepitys.

Que quarto ordine siccant. Cap. ccxiii.

Ampeloprason, oleum cedrinū, sinapi, ruta syluestris, allium.

Que media sunt inter siccantia & hume-

stantia.

Cap. ccxiv.

Graminis radices in cataplasmate impositæ, oleū dulcissimum.

Que primo ordine humectent. Cap. ccxv.

Auricula muris, buglossum, succus glycyrrhizæ, lactuca moderatè, uiolæ folia moderatè, mali persicæ fructus, fungi, rosaceum, satyrium, stratiotes fluuiatilis.

Que secundo ordine humectent. Cap. ccxvi.

Portulaca, atriplex, blitum, cucurbita, mali armeniacæ fructus, cucumis, pepo, lens palustris.

Que aquosam frigiditatem habent. Cap. ccxvii.

Acacia, auricula muris, portulaca, plantago, atriplex, rubi folia, blitū, muscus marinus, glauciū, dorycnū, uiscum, salix, cucurbita, cotyledon, cicuta, picea arbor, malua satiuia, papauer, mala præcocia, fungi, platanus, polygonum, potamogeton, sideritis, cucumis cibarius, holoschoenus, cicerbita, tribulus, lenticula palustris, psyllii semen, plumbum.

Que tenuium partium sint. Cap. ccxviii.

Abrotonum ustū, uitex, scandix, populi nigre flores et folia, urticæ semen & folia, amomum, acorus, asari radix, bryoniæ radix, chamæmelon, aparine, aristolochia, plantago sicca, asphodeli radix, præsertim usta, balsamum, herba sabina, sinapi, rubi radix, glycyrrhizæ radix, oleum uetus, oleum cicinum, elaphoboscum, euphorbium, fermentū, salicis succus, calamintha, calamus aromaticus, harundinis sepiaariæ cortex ustus, casia, carpesion, miliū, oleum cedrinum, pruni gummi, mastiche, nigella, succus cyrenaicus, opobalsamum, ruta, pistacii fructus, propolis, terebinthus, rosaceum oleum, sagapenum, sampsuchus, sescelis, cucumeris semen, ficus aridæ moderatè, flos iunci odorati, cinis, calx, salis flos, hyssopus, sal, alcyonium milesium, nitrum, auripigmētum ustum, gypsum ustum, sulphur, cadmia, pumex ustus, lixiuiū, aliæ petrae flos, melanteria, misy, æs ustum, chrysocola, scandix, fucus, adeps leonis ac pardi, iteq, hyænz ualde, castorium, sepia testa usta, lanæ usta.

Que crassarum partium sint. Cap. ccxix.

Plataginis radix, balaustiū, uinacea, zingiber, cucumis, fcepe,

cepe, squamæ omnes, sorì, alumen.

Corroborantia.

Cap. cccxx.

Calia, galla omphacitis, storchas, palmæ fructus, absinthium, mastiche.

Concoctoria.

Cap. cccxxi.

Amomum, uua passa, cera, ladanum, glutinum libanum, crocus, thus, pix, mastiche Aegyptia, rosaceum oleum, myrrha, styrax, galbanum, alica, adeps suillus & uitulinus, butyrum, œsypus.

Suppuratoria.

Cap. cccxxii.

Aquæ temperatæ affusæ fomentum, aqua & oleum temperata, farina triticea, panis, alica, adeps porcini & uitulini, butyrum, thus, pix, resina.

Mollientia.

Cap. cccxxiii.

Quæcunque calfaciunt non tamen uehementer, simulque non uehementer siccant: sunt autem talia, seuum caprinum, adeps gallinaceus, & porcini, seuum taurinum & hircinum, medulla ceruina, uitulina, ammoniacum thymiana, styrax, galbanum, bdellium, oleum sicyonium, oleum liliorum, oleum dulcissimum, chamæmelum. althææ radix, cucumeris syluestris radix, maluæ syluestris folia, mastiche chia, & Aegyptia, terebinthina, resina colophonina, opopanax, sordes statuarum in gymnasijs, sordes palestrarum, butyrum, œsypus.

Quæ indurant.

Cap. cccxxiiii.

Semperuiuum, portulaca, psyllium, lens palustris, solanum. Indurantur autem corpora & partes aut ob siccitatem, aut ob plenitudinem, aut ob congelationem. Si quidem igitur ob siccitatem pars dura fiat, humectare omni modo ipsam oportet. Si uero ob plenitudinem, euacuare eam ipsam oportet. Si uero ob congelationem fuerit indurata, congelationem moderate calfacientibus dissoluere oportet. Nam congelatio ex frigore est, quæ autem uehementer calfaciunt, magis congelant.

Exterforia.

Cap. cccxxv.

Stercus caprinumustum & nonustum, omnes testæ, testa intertorum, sepiæ testa, herinacæ terrestres ac marini cinis, serum lactis, bryoniæ radix, mel, amygdala dulcia elui apta, & ipsorum arbor, anagallis utraq, anemonæ omnes, plantaginis folia, maxime arida, aristolochia, aron, asparagus myacathinus, staphis agrestis, asphodeli radix, atriplicis semine, absinthij succus, bulbus impositus, ueratrum utrumque, helxine, siue perdicias, salicis semine, calami sepiarij radix trita moderate, fabæ caro, lapsana in cataplasmate imposita, lichen petrarum, leucon partes omnes, platani radicis cortex, marrubium, meum, propolis moderate, ulmi folia, & cortex ac radix, pißana, terebinthina amplius quam mastiche, sagapenum moderate, cucumeres, peponis partes omnes, cucumeris syluestris radix, beta, tithymallus, phu, chamæpitys, alcyonia omnia, terra chia & samia moderate, smiris abunde, cornu cerui, & capræustum, & quæcunque inueneris nitrosa & amara, ea omnia meatus expurgare possunt. Quæ uero tenuium partium sunt dulcia, extergent moderate ulcerum sordes, & totius cuticulæ, uelut sunt fabæ, eruum, ordeum, lupinus, & similia.

Quæ uasorum oscula aperiant.

Cap. cccxxvi.

Quæ oscula uasorum aperiunt, calida sunt non ualde, & crassarum partium; quæ enim uehementer calfaciunt, urunt & crustam inducunt, anemonæ omnes, cepa, allium, fel taurinum, irini & amaracini olei siue unguentum sex,

Rarefacientia cutem.

Cap. cccxxvii.

Rarefactoria sunt quæ moderate & citra molestiam calfaciunt, nequaquam uero siccant. Chamæmelon, althæa, cucumeris syluestris radix, costus, libanoddes, nitrum, abrotonum, oleum uetus.

Densantia cutem.

Cap. cccxxviii.

Aqua frigida, semperuiuum, portulaca, tribulus uiridis, psyllium, lenticula palustris, mandragoræ mala, & summatum omnia quæ frigefaciunt non siccantia.

Corrodentia.

Cap. cccxxix.

Auripigmentum, sandaracha, chrysocolia, cantharides, erucæ pinus, cedria, ueratrum nigrum.

Reprimentia eminentia.

Cap. cccxxx.

Elaterium, cucumeris syluestris radix, ochra, mandragoras, althææ petrae flos, ostreorum testæ, herinaceus uterque ustus unâ cum testis suis, hematites lapis siccus tritus et ad puluillum redactus, faba, squama æris, chrysocolia.

Cicatricem inducentia.

Cap. cccxxxi.

Quæcunque adstringunt & siccant, alumen, galla omphacitis, æsustum, præsertim lotum, mali corium aridum, cremetum plumbi, spuma argenti, helcysma, id est, argenti cremetum, plumbumustum, testa, intertorum omnium testæ, uiltrum, pumex præsertimustum, & uino extinctus, specularis lapis ustus, cerussa, pompholyx, spodium lotum, chrysocolia, stibiustum, diphryges, sarcocolia. omnia prædicta si ulceribus insperferis, ipsa cicatrice includes. Verum cum mordacitate cicatricem inducit atramentum sutoriumustum, cadmia, squama æris ac ferri, præsertim stomomaris, ærugo, calx usta & lota.

Exulcerantia in superficie.

Cap. cccxxxii.

Rubi canini folia, betæ radix, allium, pulegium, hyssopum, origanum, sepiæ testæ, asphodeli radix, semen lini, & salsa, & acris, & amara.

Vistoria.

Cap. cccxxxiii.

Cantharis, diphryges, sex acetum usta, anemona puniceum florem habens, allium, cinis, præsertim ficulnus, nitrum allatum, æsustum, alumen, buccinorum testæustæ, menularum capita, auripigmentum, staphis agrestis, granum cnidium, sinapi, pyrethrum, calx non extincta urit, extincta crustam inducit.

Attrahitoria.

Cap. cccxxxiiii.

Anemonæ omnes, anagallis utraque, dictamnus, ciccer, thapsia, cyclaminos, narcissi radix, propolis fortiter, fermentum, stercus omne, sagapenum, succus cyrenalcus & medicus, silphij succus & radix, spariti quo aucupes utuntur, & semen, & uirgarum succus generose, terebinthina magis quam althææ resina, sulphur, stercus bubulum, præsertim si eruo boues pascantur, calaminthe in cataplasmate imposita, costus contritus cum oleo, fortiter autem attrahit uiscum.

Discussoria.

Cap. cccxxxv.

Abrotonum, agaricum, adiantum, ægilops, urticæ semen & folia, sambucus, ebulus, chamæmelon, anisi semen, aristolochiæ radix, asphodeli radix præsertim usta, atriplex, bulbus, herba sabina, muscus qui splanchnon & hypnon. Græcis appellatur, daucus, althæa, oleum dulce, oleum uetus, oleum raphaninum & cicinum, & thapsia, calami sepiarij cortex ustus abunde discutit, brassicæ folia, lilij folia & radix, ladanum, mercurialis, malua syluestris, mel, mali plicis folia, & germina, rhododaphnæ, grosi ficus, ficus syluestris, mastiche

maſtichechia, opobalſamum, ſuccus cyrenaiſcus uehementiſſime, paliuri folia & radix, ruta, pix, marubium, terebinthina, roſaceum oleũ moderate, ſordes à ſtatuis, ſordes palæſtrarũ, quæ patos Græcis dicitur, ſampliſchum, cucumeris ſylueſtris radix, myrrha, caricæ acriores amplius quàm groſſi, beta citra caſfactionem, fortior eſt autem alba, galbanum, ſal præſertim uſtus, ſalis flos, nitrum, halcyonia omnia, terra ſamia, hyoſcyamus, caſeus tener ex acido lacte moderate, butyrum, coagulum omne, ſtercus omne ualde, ceſipus moderate, carnes uſperarum fortiter, adeps præſertim leoninus, oſſa uſta eorundem leonum, & omnium aliorum cinis.

Adſtringentia. Cap. cccxxvi.

Oleaſter, piſtaſter, lentilſcus, apiũ, ſemperulium, papa-uer, cytiſus, aloẽ, urtica, uinacea, pira, crocus, althea, terebinthus glans, hyoſcyamus, hederæ, nymphæa, palmæ, oul uſtellus aſſatus, pallurus, hiſpuris, ſanguis concretus, liguſtrũ, oxanthe, braſſica bis cocta, coagulũ leporinũ, ſpõgia uſta, rhamnus. ſunt & multa alia adſtringentia, quæ omnibus nota exiſtunt.

Quæ ſemen generant ac prouocant in cibis ac medicamentis, & cibis medicamentis.

Cap. cccxxvii.

Ex edulijs omnia quæ amplius nutriũt & inflant, item medicamenta omnia flatuofa & calida. Itaque bulbi & cicer, & nuceſ pineæ, fabæq; ac ficus, edulia ſunt multum ſemen generantia. Scincus autem, & ſatyriõn, ac ſimilia, medicamenta ſunt. Edulia autẽ ſimulq; medicamenta ſunt, lini ſemen, eruca, & horminum.

Quæ ſemen inſibitant. Cap. cccxxviii.

Semen inſibitant omnia quæ frigefaciunt edulia ac medicamenta, itemq; quæ craſſefaciunt & condensant, uelut lactuca, cucurbitæ, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones. Quæ uero ſiccant, ne ab initio quidem generari ſemen permittunt, etiã ſi caſſaſtoriam naturam habeant, uelut eſt ruta. Si uero calida non fuerint, multo magis ſiccant, & ſemen generari non ſiunt, uelut nymphææ radix.

De alimentorum uiribus. Cap. cccxxix.

Sanitatis ſtudioſum ſi quid aliud, alimentorum uires noſſe oportet. Itaque ea quæ attenuatoriã uim habent, anguſtos tranſitus obturatione liberant, & uiſcoſa infarta expurgant, ac craſſa ſecant. Verum qui in ipſorum eſu perſeuerant, ſeroſas & biliſas ſuperfluitates congregant, & ſi quis adhuc amplius perſeueret, atrabiliarium ſanguinem reddet. Quare ab aſſiduo ipſorum uſu abſtinere oportet, præſertim eorum quæ temperamentum biliſum habent. Solis enim hiſ qui pituitam & crudum humorem uiſcoſumq; ac craſſum coaceruant, talia conueniunt. Ac uero craſſefaciente uel prædita, multum alunt, & ſi in uentre ac iecore probe concoquantur, ſanguinem boni ſucci generant, lienem autẽ & iecur obturant. Ex hiſ uero quædam craſſi tantum ſucci ſunt, uelut lentacula. Quædam uero uiſcoſi, ut malua. quædã craſſum ſimulq; uiſcoſum ſuccum poſſident, uelut eſt caro teſta inteſtorum. Securior itaque eſt diæta & uictus attenuatorius ad ſanitatis conſeruationem, præ craſſefaciente, uerum quum modicè alat, firmitatem non addit corporibus neque robur, & oportet aliquando etiam multum nutriẽtia moderate aſſumere, ubi firmitatem acquirere uoles. Cæterum citra

periculum craſſa diæta uti poſſunt, qui exercitijs deſecti ſunt, & qui dormiunt, quantum uolunt. Omnes autem qui ante ciborum acceptionem exerceri non poſſunt, alimenta craſſi ſucci uidentur maximum enim ad ſanitatis conſeruationem malum, perpetuum oclũ exiſtit, quemadmodũ contra moderatus motus maximum bonum. Omnium porro eduliorum optima ſunt, quæ inter attenuantia ac craſſefacientia medium locum obtinẽt, & ſanguinem ſubſtantia ac coage moderatum generant. Itaque tale alimentum corporibus noſtris cõueniens eſt, nociuũ uero craſſi ſucci, & propterea ſemper fugiendum. Quin & alimentorum uarietatem fugere oportet, præſertim ſi ex contrarijs uiribus ac facultatibus conſiſterint, itaque enim aſſumpta probe concoquantur.

Attenuatoria alimenta. Cap. cccx.

Allium, cepe, naſturtium, porrũ, ſinapi, piper, ſmyrnilum, pyrethrum, origanum, calamintha, hyſſopus, ſiſymbrium, pulegium, thymus, ſaturcia uiridis accepta, ſicca enim medicamentum eſt. Ab hiſ proxima ſunt eruca, ſion, apium, petroſelinum, ocymum, raphanus, braſſica, beta, ſcenculum, coriandrum, ruta, anethum, liguſticum, eumimum, capparid & terebinthi fructus, carui ſemen, aniſi, dauci, & omnium odoratorum & acrium ac palam calidorum ſemina, uerum fortiter attenuat rutæ ſemen, & cannabiſ, ut medicamẽta de cætero exiſtant. Ex cerealibus ſemina nibus attenuandi diæta ſolum ordeum conuenit, deinde panes clibano cocti triticeĩ, à reliquis abſtinendum, præterquam ſi quis per longius interuallum piſum, aut lentem guſtare uelit; plurimum autem eduliorum uſum pro attenuantis uictus ratione ſupereditant piſces petroſi & montanæ uolucres parue, in uniuerſum enim omnia exercitata meliora ſunt inexercitatis, & ſiccior uictu uentia, & purum ac tenuem aërem inſpirantia, & ex piſcibus qui mollem ſimulq; friabilem carnem habent reliquis præſtant. Nam qui duram aut uiſcoſam habent, ab hiſ penitus abſtinendum eſt. Habes autem notas carnis omnis animalis, friabilitatem ac mollietatem, & quibus ſanẽ utraque affuerit, ad ſatietatem edere licet; quibus altera tantum, edere quidem expedierit aliquando, ſed uitanda ſatietas eſt. Neque gallinas prohibeo ſi quis exercitio utatur, neque columbas, neque turtures, maxime ſi in agro degant, ac montanis locis. Oportet autem non recens maſtatas, ſed unam minimum diem ſeruatas à maſtatione edere, non ſolum turtures & gallinas, ſed etiam perdices, & omnia quæ moderate duram carnem habent. Sed & ſalſi piſces abunde attenuant, & craſſos ac uiſcoſos humores ſecant, eligendi ſunt autem & ex hiſ qui mollem carnem habent. Nam ceracei generis uitandi ſunt. Præſtat & plurima edulia aceto & aceto mulſo præparata accipere, & ſale prius condire quantum ei uſ fieri poteſt. Neque læſionem incurrerit, qui fructus pomorum alium mollientes acceperit. Verum tarde tranſeuntes deteriores ſunt, & magis ſi duri fuerint. Quare ex hiſ ne guſtare quidem oportet, præter eos qui reſpoſitioni apti ſunt, uelut pira & mala, & uuarum nõ pauca genera: molliores autem magis edere expedierit, qui uero ualde aſteri & acerbĩ ſunt, ad hanc diætam inepti exiſtunt. Omnium maxime autem aptæ ſunt caricæ, & nuceſ, & piſtacia, & amygdalæ ſubamaræ. Cæterum oliuas neque laudo, neque

ſ uilupero.

olus

ut cupero. Verum ex dulcibus non solum edulibus, sed etiam potionibus, mel ferè solū exacte tenuem succum generat: Vina quoque tenuia & alba crassos humores secant, & per urinas expurgant. Vtilissimum uero ad extenuantem uictum est acetum mulsum.

Crassi succi alimenta.

Cap. cxxli.

Panes furnacei, & siliginis, & non probè preparati, placenta ex musto & similagine, itemque liba, & omnis placenta non fermentata ex tritico, & quęcunque eius generis inde parantur. Sunt etiam similago, ac alica, satis crassi succi, amyllum uero moderate. Sunt & dolichi crassi succi, & lupini, & interna lents caro, nam cortex exterioriū quid possidet, itemque fabæ frictæ, & pisces molles appellati, loligines, septæ, polypodes, & cetacei generis, ex quo sunt & thunni, moderatiores autem ipsis sunt pelamides. Multum crassi succi sunt ostrea, & buccina, purpuræque ac chamae, patellæ, pectines, pinnae, & omnia testa infecta, anguilla licet ac cochleæ, bubulæ carnes, caprinae, ceruinæ, leporinae, suilla hepar, renes, testes, moderate lacte coctum, casei omnes, uerū recentes & ex acido lacte minus, oxygala, protogala quod & pyrlepton uocatur, qua ad perfectam concretionem cocta & magis adhuc assata, atque amplius etiamnum fricta in sartagine, palmarum, castanearum, bulbi, rapa, fungi, tubera, nuxes pinæ, coni ac strobili appellati, ficus non probè maturæ, citrini caro, cucumeres præsertim uberius ingestis, mala nondum matura, uina dulcia quoque sanguinem crassum generant, & his amplius sapa, & uinum nouum, uinaque crassa ac nigra.

Media inter attenuatoria & crasse scientia.

Cap. cxxlii.

Panes optimè preparati, carnes gallinarum, phasianorum, perdicum, columbarum, attagenarum, & paruarum auicularum omnium, optima edulia sunt. Insuper piscium petras ac littora & altum pelagus incolentium, gobiorum, murenarum, buglossorum, & omnium consimilium, qui neque uiscositatem neque graueolentiā in cibo representant. Item ficus, pepones, & ex syluestribus oleribus seris, id quod cōmune pluribus genus existit, singulorum autē speciales appellationes sunt apud Atticos, uelut lactuca, chondrile, gingidium, & alia infinita syluestria olera quę seridis nomine ueniūt. Eius generis est & asparagus palustris, itemque myacanthinus, & chamædaphnes, ac bryonia. Vinum licet fuluum simulque dulce ac pelucidum, quale est aruissium, & lesbium, & dulce fallernum, ac molites. Hæc enim bonum & moderate crassum sanguinem generant.

Que uiscosum sanguinem generant.

Cap. cxxliii.

Triticum graue, densum, & in alto flauum, uiscosum succum generat: leue autem & raram & intrinsecus album, minus uiscosum humorem generat. Est & similago itemque halica satis uiscosa. Item redines, præsertim in musculorum extremitatibus, aponeuroses Grecis appellati, & partes circa labra, & lingua, suilla quoque caro, & agnina, sesami item semen, & palmulæ pinguiore.

Que crudum humorem generant.

Cap. cxxliiii.

Palmulæ uirides uelcentes crudis humoribus implent, & rapa, & testa interiorum caro, si diutius cocta saluum humorem deposuerit, & pisces molles appellati, uelut septæ, polypi, & alia huius generis: item cetaceum genus in mari, quapropter antea salsa hæc in

usum cibi ueniunt. Talia sunt & intestina, & uetres, & uulua quadrupedum, & acidum lac, lupini, uua in uentre retenta.

Que frigidum humorem generant.

Cap. cxxlv.

Qui se cucumeribus ualde explici, frigidum humorem coaceruat. Insuper & qui uentres ac intestina & uulua quadrupedum animalium ingerunt, & lac acidum, & mala nondum matura.

Que atrabiliarium succū generant.

Cap. cxxlvi.

Carnes bubulæ, caprinae, & magis taurorum ac hircorum, & adhuc amplius ouium ac leporum, ac suum syluestrium, carnes item salse quadrupedum animalium. Ex marinis piscibus thunni, balænae, & omnia cetacei generis, cochleæ, brasiæ, arborum germina, muria, & acida muria condita, uelut lenusca & terebinthi. Item cinarum caro, & lens edulium est maxime atram bilem gignens, & post hanc furfuracei panes, & qui ex typha ac alijs uitiolis seminibus fiunt, & casei antiqui, & uina crassa ac nigra.

Que biliosum humorem generant.

Cap. cxxlvii.

Siliquæ, licet cinarum succus amaram bilē gignit, præstat itaque ipsam seruesactā in cibo sumere. Mel quoque facile in bilē transit. Omnes quoque dulcis saporis succi, materiam flauæ bili præbent, itemque dulcia uina.

Que superfluitatibus redundant.

Cap. cxxlviii.

Palumbes, anseres, pisces, exceptis petrosi, uiscera omnia, medulla, spinæ dorsæ, cerebrum, auriculæ palustres & stagnorum, cicer, fabæ uirides, faba Aegyptia, porcelli recens nati, ouilla caro, & omnium uulnorum animalium, & ociose uiuentium, pisces fluuiatiles & palustres, & qui in limosa aqua degunt, item omnia cetacei generis in mari.

Que superfluitatibus careant.

Cap. cxxlix.

Colla animalium, caudæ, alæ, syluestrium animalium caro, & eorum quæ siccis locis degunt.

Multum nutriunt.

Cap. ccl.

Suum domesticorum carnes ex omnibus edulibus optime alunt, cerebrum bubulum, testes, cor, medulla spinalis, itemque reliquæ, anserum alæ, & magis gallinarum, omnium uolucrum uentres, cochleæ præsertim ter coctæ. Ex testa infectis quæ duras carnes habent, uelut purpuræ, buccina, & similia, gammari, paguri, cancri, locustæ, squillæ, & consimilia. Item molles appellant pisces, uelut polypi, septæ, loligines, & cōsimiles. Ex carulagineis, torpedo et palinaca moderate, squatina uero magis, mulli & gobi minus. Lac crassius quidem magis, & liquidius minus. Ex panibus siliginis maxime alit, deinde similagineus: tertio loco est cui fursures non decesserunt, triticum coctum, siligo, alica, fabæ carnis habitum non adstrictum & densum faciunt, sed laxiorem. Cicer magis nutrit, phaseli & ochri magis xenogracum, dolichi quos lobos uocant Greci non pisces minus nutriunt, castanæ, lens, palmulæ dulces, uua passæ dulces, ac pingues, rapa, bulbi maxime alunt & præsertim his cocti. Mel despumatum & ad distributionem & ad nutritionem aptum est, uinum omne nutrit quod crassum est. Rubra itaque & crassa ac adstringentia, magis alunt. minus uero his alba simulque crassa & austera. Omnium minime alba & tenuia, omnia item crassi succi si probè concoquantur, ualde alunt.

Que parum nutriunt.

Cap. ccli.

Extremæ animalium partes, uulua, uenter, intestina, caudæ, aures, pinguedo, adeps, omne uolucrum genus

genus minus alit, terrestrium generi comparatum, caro quoque animalium annosorum minus alit quam augescens. Piscium esus sanguinem tenuiorem generat. Ex testa insectis quæ mollem carnem habent, uelut ostrea minus alunt, panes ordeacei, polenta ordeacea, panes furfuracei & sordidi omnes ac loti, amyli, masa ex polenta ordeacea, auena, milium, eoque magis panicum, oryza, fabæ uirides, semina papaueris, mora, amygdala, pistacia, pruna, persica, armeniacæ, præcocia, oliuæ maxime drupæ, nuges auellanae, & magis adhuc regie, serica, corna, pruna sylvestria, mora rubi, capparis & magis sale condita, terebinthi summitates, brassicæ, betæ, raphanus, sinapi, asparagi omnes, pastinaca, daucus, carus, cepa, allium, porrum crudum quidem nullum penitus alimetur præbet, bis uero aut ter coctum paucissimum, punica mala, pira, cucurbitæ, uue passæ austeræ & non pingues. Porro media quodam modo sunt inter parum nutritia, phaselii, ochri, cicerculæ. ficus autem non similiter ut reliqui fructus parum nutriunt, uerum laxam carnem faciunt. Uuæ uero minus quam ficus laxam & humectam carnem alunt.

Que boni succi sunt. Cap. CCXII.

Optimi succi est optimum lac ferè inter omnia quæ in cibo accipimus: optimum autem lac est animalium bonæ habitudinis, statim ubi multum fuerit calidum adhuc potum. Oua tremenda & sorbilia gallinarum ac phasianorum. Volucres & pisces ferme omnes boni succi sunt, exceptis his qui in paludibus ac stagnis & fluminibus limosis ac turbidis degunt. Verum odore & gustu cognobiles fiunt: Nam foetidi & insuauis ac mucosi sunt, propterea quod in uitiolosa aqua degunt. Carnes autem quadrupedum animalium si probè concoquantur, optimum sanguinem generant, maxime si bono succo prædita sint, uelut est suillum genus. at uero omnes circa labia partes, aliaque extremitates, & alæ uolucrum, intestinaque & uulue ac caudæ, minus boni succi sunt quam carnes, glandulae autem probè coctæ, similiter ut caro boni succi sunt. Cor non est mali succi, pedes suilli meliores sunt quam rostrum & aures: syluestrium quoque animalium carnes meliorem succum quam domesticorum habent, panis purus probè præparatus boni succi est, alica item, & pistana probè præparata, fabæ, castaneæ non habent malum succum, ficus maturæ, & uua matura itemque pensilis reprehendi non merentur. carica statim quidè in corpus digestæ ac distributæ, boni succi sunt: uerum si in uentriculo morantur, mali succi fiunt, & pediculos generant. si uero cum nucibus edantur, bonum edulium existunt. Cæterum si quis ficus & caricas assidue in cibo sumat, non parum lædetur. Lactuca ut olus sanguinem bonum gignit, & ab ea intubi. Vina odorata boni succi sunt, sed omnium optimi succi est salernum dulce & unolites.

Que mali succi sunt. Cap. CCXIII.

Ab omnibus mali succi edulis abstinendum censeo, etiam si facile concoquantur. Latenter enim diutiori tempore uitiolus humor in uenis ex ipsis congregatur, qui leuissima putrefactionis occasione arrepta, malignas febres gignit. Est autem maxime uitiolus succi caro ouilla ac caprina, pessima uero hircina, deinde arietina, postea taurina. In omnibus his præstant castratorum carnes. Seniorum autem animalium pessimæ sunt: Caro leporina crassiorem quidè sanguinem

generat, uerum meliorem ad succi bonitatem quam bubula & ouilla. nihilominus tamen & ipsa mali succi est, itemque ceruina. renes & testes perfectorum animalium mali succi sunt, exceptis gallis. Item cerebrum & medulla spinalis, exceptis gallis. lien, oua in sartagine fricta, casei ueteres, boletii, amanitæ, scenogrecum, lens, auena, cicor non est boni succi. olyra uero tanto deterior est tritico, quanto melior est quam titha & auena. panicum, milium, & similia non sunt boni succi. dracones, callionymi, scorpij, trachuri, muli, orphi, glauci, zygænæ, congrî, phagri, & quæcunque alia cetacei generis in mari animalia, omnia mali succi sunt. Item omnes fructus subcanculares mali succi sunt, mala nondum matura, pira prius quam concoquantur, persica, mala punica, mespila, corna, pruna sylvestria, siliquæ, & terebinthi fructus, cinara præsertim ubi dura fuerit, cucumeres, pepones, cucurbita his quidem melior est, sed & ipsa in uentre corrupta satis mali succi euadit. ficus et carica minus quam alij subcanculares fructus malum succum habent, uerum his qui in ipsarum esu perseverant, non ualde bonum sanguinem gignunt, unde & pediculorum copia ex ipsis consequitur. Ex oleribus nullum boni succi est. in medio boni ac mali succi sunt lactuca, intubi, malua, blium, atriplex. Radices plantarum olerum generis mali succi sunt quæcunque acres, uelut ceparum, porrorum, alliorum, raphanorum, & dauci. Medio loco sunt raporum & cari appellati radices. Ocymum pessimi succi est. rapum crudum, brassica, bulbi non probè cocti. At uero allium & cepæ ac porrum bis cocta humoris malignitatem deponunt. Cæterum extreme mali succi sunt olera quæ sylvestria appellantur. Vina crassa simulque foetida & iniucunda ac austera mali succi sunt, quale est bithynum quod in magnis dolis apponatur, nam quod in paruis affertur, neque boni succi neque mali existit.

Que facilia concoctu sunt. Cap. CCXIII.

Panes bene præparati, pisces petrosi omnes, gobio, torpedo, pastinaca, si uolucrum generi comparata concoctu facilius est, præsertim perdices, auagænæ, columbæ & phasianorum, alæ anserum, magisque gallinarum, & in summa præstant alæ saginatorum & iuniorum, pessimæ autem sunt gracilium & seniorum. iecur anserum sero lactis saginatorum, itemque testes gallorum similiter nutritorum facilius concoquantur. Carnes suillæ coctu idoneæ sunt, in uigore ætatis consistentibus & laborantibus porcorum uigoro forum, reliquis eorum qui adhuc crescunt. Vituli meliores concoctu sunt quam boues perfecti, & hordi quam capræ. In uniuersum autem omnium adhuc augescendum caro facilius concoctu est quam decrescendum, & animalium in siccis locis degentium facilius concoquitur quam aliorum. Nux regia magis concoquitur quam auellana, bulbi bis cocti melius concoquantur, oua tremenda & sorbilia, lactuca, intubi, malua, cucurbita cocta, si non corrumpatur, uina dulcia facilius quam austera. Facilius autem coctu est quicquid unicuique iucundum est.

Que agere concoquantur.

Cap. CCXIV.

Caro caprina, bubula, ceruina, pessime autem concoquitur hircina, deinde arietina, postea taurina. pessima est & seniorum animalium caro, suæ quæ senes siobrosam & siccam, & propterea agere concoctilem carnem

carne habent. Venterculus aegre concoquitur, intestina, uulua, cor, iecur, aures, caudae, renes, cerebrum, medulla spinalis, & perfectorum animalium testes, anseres, exceptis alis, palumborum & sturnorum ac merularum & paruorum uolucrum caro durior est, atque his magis turturis antiqui, & anatis, aegrius tamen adhuc concoquitur, & fibrosior his est paronis & otidiu caro. uentriculi quoque uolucrum omnium aegre concoquuntur, propter substantiae duritiam. falso enim quidam laudant uentrem struthionis camelii ac mergi. Cochleae item & lac acidu, caseus uetus, recens autem & maxime ex acido lacte melior est, purpurarum caro ac buccinorum, aliorumque testa interiorum duram carnem habentium. gammari, locustae, cancri, paguri, squillae, & omnia huiusmodi. polypi, sepias, loligines, & omnia molli cute praedita, rasa, leuifera, squatina, dracones, cuculi, callionymus, scorpius, trachuri, oua cocta, fricta, triticu coctum, polenta, tithymalus, auena, fabae, dolichi, phaseli, cicercula, cicer, oryza, lupini, panicu, miliu, & quaecumque huiusmodi lens, sesamum, castaneae, mala, praeter nondu matura, ficus non maturae, uuae acidae & austerae, palmarum omnes, siliquae, ocymum, rapu crudius, bulbi crudiores, pastinaca, daucus, carus, & omnes olerum radices, ipsaeque olera uniuersa, excepta lactuca & intusibus. uina crassa & noua aegre concoquuntur, uerum multo magis concoctioni resistit aqua.

Quae stomacho commodant, eumque roborant.

Cap. cclvi.

Palmulae austerae, mala cydonia, oliuae muria conditae, apud omnes tamen sunt aceto compositae uuae passae austerae. uua in uinaceis reposita, nux regia hac parte auctantiae praestat, multoque magis si cum caricis sumatur, gingidiu scandici simile, est ualde stomacho commodum, tum crudu, tum coctum comestum, longior autem coctura non sustinet. cinara, sinapi, raphanus, rapum, nasturtiu, asparagus palustris, chamædaphnes, oxybathæ & bryonice, bulbus appetentia cibi excitat, itaque capparis sale condita, citra pars externa corroborat stomachum medicamentu loco sumpta. Vinum austereum os uentris roborat itemque uentrem ipsum praesertim calida intemperie affectum.

Quae stomacho incommoda sunt.

Cap. cclvii.

Beta stomacho incommoda est, adeo ut & morsum inducat si uberius comedatur, ocymum, rapu crudius, blitum, atriplex, si non cum aceto ac oleo & garo sumatur, foenum graecum stomachum subuertit, itemque sesamum. Lac frigidum habentibus uentrem acescit, calidum habentibus in nidorem transit. Merito itaque nocuum est febricitantibus, & si quis amplius cum melle sumat, uomitu dicitur. Pepon non probe concoctus, cholericos, id est bilem superne ac inferne eicientes facere solet. Similiter & melopepon, omne cerebrum stomacho incommodum est, & nauseosum, uelut etiam ossium medulla. Vinum nigrum & austereum facile acescit, & uomitum concitat. Item crassum & nouum.

Flatus expertia.

Cap. cclviii.

Cuminum, ligusticum, uulcis semen, cannabis semen, fabae frictae, bulbi diutius atque iterum cocti & ex oleo cum uento comestum, mel quod in coctura omnem spumam deposuit, flatus discindunt panes ordeacei. Media porro inter flatus expertia ac flatuosa, sunt pisae, phaseli, odori, cicerculae.

Flatuosa.

Cap. cclix.

Cicer, lupini, panicum, milium, & huiusmodi, fabae, lobii siue dolichi, minus tamen fabis, maza ex polenta, succi omnes, praecipue cyrenaicus, silphii succus ac radix, ficuum flatus modico tempore durat, propterea quod facile alio subeant. quae uero exacte maturae sunt, propemodum nihil offendunt, similiter ut caricae, palmulae uirides flatuosa sunt, rapum crudius, lac facile in uentre inflatur, bulbi crudiores, mel non perfecte coctum. uina dulcia flatum tarde transeunt generant, item dulcia simulque austera, mustum iude, hoc est uinum nouum.

Quae extergent, secant, obturatione liberant.

Cap. cclx.

Pulsana extergit, itemque foenograecum, melopepon, uuae passae dulces, fabae, cicer, magisque nigrum, capparis satis tenuium partium est, & extergit, & expurgat ac obturatione liberat, maxime ex aceto mulso aut ex oleo & aceto, praeter reliquis omnibus cibis comestis: betae succus extergit, & magis ubi cum sinapi & aceto comedatur. bulbi attenuatoriam uim habet & obturationes aperientem, cepae, allia & porri attenuant & secant crassos ac uiscosos humores. serum quoque lactis humorum crassitatem attenuat. ficus extergit, quapropter multa arenosa de renibus expurgant. Caricæ attenuant ac secant & renes expurgant. amygdalae extergent & attenuant, purgantque uiscera, & humorum per sputum reiectiones ex pectore ac pulmone expeditores faciunt. pistacia robori ac sanitati locineris conducunt, & ad purgationem humorum id obturandum iuxta exitus ipsius, raphanus attenuatoriam uim habet. Mel tenuissimarum partium est, maxime quod ex calidis ac siccis plantis natum est, quapropter etiam aqua mulsa ad sputorum educationem commodat. Acetum mulsum non penitus uiscosa ac crassa facile educit, & uiscera citra molestiam expurgat. Valde autem commodat his qui crassum humorem in pectore ac pulmone coaceruant. Vina tenuia ac uetera cum acrimonia ad idem conferunt. At uero aquosum, hoc est albu & tenuissimu aptum est ad humorum ex pulmone educationem: roborat enim & humores humectiores reddit ac moderate scindit. Vinum dulce in morbis acutis reficiendis uiribus accommodatum est, uelut in peripneumonia & pleuritide, concoctione morbi iam facta.

Quae obturant.

Cap. cclxi.

Lac modicum seri habens, & multum de caseo, non satis rudis usus est, si quis in eius usu perseveret. Nam laedit renes, qui alias ad calculorum generationem aptitudinem habent, & locineris obturationes facit his qui eas pati alias solent. Caricae hepati ac spleni inflammato nocuae, uelut etiam ficus. omnia quoque dulcia splenem ac secur laedunt. Aqua mulsa incommoda est his quibus uiscera indurata, aut laxo tumore occupata, aut inflammata in tumorem eleuata sunt. Palmulae pingues obturant, & praesertim crudae, omnia item liborum genera, & ex similagine preparata, obturant & splenem augent, & calculos in renibus generant. Similiter & triicea farina cum lacte. Alica quoque inepta his qui secur obturationi obnoxium habent, & renes calculo generando aptos. Vinum dulce obturat, & uiscera auget siue inflat.

Quae tardi transitus sunt.

Cap. cclxii.

Omnia liborum ac placeniarum genera ex similagine facta

facta, trāsitus tardī sunt, fabae frictae, panes puri, lens cortice detracto, cerebrum, medulla spinalis, iecur, eor, triticum coctum, oua assata, fricta, lupini, phaseli, pisa, sesamum, mala, pira nondum matura, siliquae, uina dulcia, & magis austerum & nigrum, citra dulcorem. item omne crassum ac nouum. Aqua autem adhuc tardius transit.

Que facile corrumpuntur. Cap. cclxiii. Persica, armeniaca, praecoda, & omnes subcuniculares fructus, qui humidum temperamentum habent, in uentriculo corrumpi solent, ubi non probe & cito aluum subierint. Omnia porro mali succi, humida autem & lubrica, ac facile subire potentia, praeter alijs edere oportet. Sic enim & ipsa cito subeunt, & alia deducunt. Si uero postremum accipiantur, etiam alia simul corrumpunt.

Que difficulter corrumpuntur. Cap. cclxiiii. Chamulae paruae, purpurae, buccina, & quaecunque testa intacta duram carnem habent, dantur corruptentibus cibum praeter humorum utilitatem, ita ut bis aut ter aqua optima coquantur, semper in aliam puram feruentem translata, ubi prior salsa reddita fuerit. Sed & gammari ac paguri cancrique ac locustae, & squillae, & quaecunque eius generis, carnem habent aegre corruptilem, similiter ut testa intacta durae carnis.

Que uentrem subducunt. Cap. cclxv. Lenticula, brassica, ex marinis testa intacta, & cochlear compositam naturam habent ex contrarijs facultatibus. Ipsum enim solidum uniuscuiusque corpus, transiit tardum est, & uentrem sistit, uerum humiditas ad excretionem irrat. Si quis igitur lenticulam aut brassicam, aut aliud quid ex praedictis coquat, deinde decoctum ipsum oleo & garo ac pipere condiat, & postea aut uelit bibendum praebere, palam conspiciet ex ea potione uentrem subduci. Sed & herinaceorum marinarum ac conchularum omnium, itemque gallorum ueterum iuscula uentrem subducunt. At uero si brassicam aluum subducere uelimus, cacabo in quo cocta fuerit propere posito statim extracta, in oleum ac garum mittimus. Neque enim ualde ipsam coquere oportet. Panes fursuracei uentrem subducunt. foenigradi succus coctus cum melle acceptus, commodus est ad subducendum omnes uitiosos humores in intestinis contentos, sed modicum esse oportet mel quod ammiscetur, ne morsum stomacho infligat. Oliuae salsa subducunt praeter reliquis cibis comestae. Lac quo liquidius est, eo magis subducit. crassum, minus. Serum uero lactis ualde emollit uentrem. Inijciendum est ad ipsum mellis optimi tantum quantum satis est ad condiendum solummodo, ne stomachus subuertatur, iuxta eandem rationem & salem indere oportet, ne gustus offendatur. Animalium ualde iuuenum carnes facilius aluo secedunt, similiter & charulaginei piscium generis torpedo & pastinaca moderate secedunt. beta quoque moderate subit, & recens caseus cum melle, atriplex, cucurbita, pepones, melopepones, ficus, caricae, uuae passae dulces, praesertim humidae, mora ante reliquum cibum sumpta, nux adhuc utridis, ad excretionem comoda est, imò etiam sicca, aqua praemacerata, et pruna sicca similiter aqua, aut aqua multa praemacerata edantur. etenim plus mellis habentia uentrem multum molliunt, etiam si quis sola ipsa comedat, sed multo amplius si aquam multam insuper sorbeat, uentris subductioni conferent. caeterum

à sumptione talium, uinum dulce bibere oportet, & pauco tempore interiecto prandere. Porro mora, cerasa praecoda, persica et omnia humecta, & aquosula, & in totum quaecunque nullam sortem qualitatem gustui aut olfactui offerunt, ea mediae quodammodo facultatis inter subducenda ac supprimentia aluum existunt. Mel solum non coctum si quis deslingat, probe aluum ducit. aqua multa item parum aut omnino nihil cocta aluum subit. uinum dulce confert ad uentris excretionem. Mustum aluum emollit ac subducit.

Que uentrem supprimunt. Cap. cclxvi. Palmulae austerae, uuae passae austerae, mora rubi, pruna syluestria, poma adstringendi uel praedita, pira, mala punica, similiter gammari, paguri, cancri, locustae, squillae, & quaecunque alia eiusmodi molli testa intactorum, minus quidem quam testa intacta uentrem supprimunt. uerum habent etiam haec ipsa salum in se humorem, quem ubi in aquam deposuerint, uentrem sistunt uelut ostreorum & testa intactorum caro. Lenticula item & brassica bis coctae uentrem sistunt. & ubi humectam aluum siccare uelimus, quum iam moderate cocta esse uidetur brassica, prima aqua diffusa, aliam calidam statim assumimus, deinde rursus in illa ipsa coquimus, donec flaccida fiat. Oportet autem neque aerem, neque aquam frigidam attingere quod bis coquitur. non enim amplius exacte flaccescit, etiam si diutissime postea coquatur. Caeterum lenticula decorticata forte adstrictoria uim perdit, & non similiter siccatur uentris humiditates. Si tamen ipsam bis coquas, prioremque aquam diffundas, deinde parum salis aut gari addas, & aliquid ex sistensibus uentri immittas, ita ut gustus non laedatur, iucundissimum simulque utilissimum pharmacum simulque edulium efficies. Polenta ex uino austero pota uentrem siccatur, oryza sistit, panicum item & milium, carnes leporinae, uinum austerrum, & nigrum citra dulcedinem, & album ac austerrum, & fuluum ac austerrum.

Que calfaciunt. Cap. cclxvii. Triticum coctum, & panes ex illis, tripha, auena, feno-graecum, palmulae dulces, mala dulcia moderate, sesamum, uuae dulces, quapropter & sium inducunt, uuae passae dulces magis mediocriter, apium, symphyonium, eruca, raphanus, rapum, sinapi, nasturtium, pyrethrum, pastinaca, caros, allium, caepa, porrum, caseus uetus, uinum dulce, moderate calidum est, & propterea sium inducit. Fuluum uero calidius est nigro, flauum calidissimum est extreme, deinde fuluum, deinde rufum, postea dulce, postremo album omnium minimè calfacit. Vinum uetustissimum multum calidum existit.

Que frigesaciunt. Cap. cclxviii. Ordeum iuxta omnes utendi modos, milium, panicum, tubera, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cucumeres, pruna, mora, uuae austerae & acidae, uuae passae austerae, mala adstringentia, & acida ac teneriora, & pira eiusmodi, et mala punica adstringentia, palmulae frigidum succum habent, lactuca, intuba medicus, portulaca, papaueris semen, aqua, uinum aquosum non manifestè calfacit, idcirco etiam febrientibus citra periculum datur. uinum album & austerrum minimè ut uinum calfacit. uinum uero album simulque austerrum, & crassum ac nouum sensibilibiter frigesacit. friges-

facit autem & acetum. nam tenuiū partium existit. quapropter nervos amplius quam alia frigefaciētia lēdit. Media porro quodammodo inter calfaciētia ac frigefaciētia sunt, panes loci, amyliū, uux uinosae.

Quae siccant.

Cap. cclxix.

Lenticula, brasiica, polenta, uiticis semen, eruū bis coctum & aqua saepius edulcatum, praestat autem album, sed & assatum aut frictum sicclis alimentum corpori praebet, item quod simpliciter garum & uinum habet, sicclis est non habente, maxima autem est differentia & seminum, & olerum, & plantarum omnium plus aut minus siccantium, iuxta eorū quae ipsis adiunguntur uires.

Quae humectant.

Cap. cclxx.

Pissana, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cucur

bitae, nuces uirides, pruna, mora, fycomora, lactuca, intuba, malua uero & blicū ac atriplex aquosissima olera sunt. fabae uirides humectant, et dcer aqua calida humectat & calfacit, frigida humectat & frigefacit.

Quae caput ledunt.

Cap. cclxxi.

Palmulae omnes, cruca, foenum graecum, mora rubi, uinum quoque fuluum capitis dolorem inducit, & mentem tentat magis quam nigrum. Austerum etiam & odoratum caput tentat, aquosum uero neque capitis dolorem inducit, neque nervos lēdit. Vinum autem modicum aquae mixturam ferens, capitis dolorem ex humoribus in uentre ortum sedat, lac non est commodū capiti, nisi quis ualde forte ipsum habeat. cremor uuarum, quem fecem dicunt, dolorē capitis inducit. item uua ipsa in uinaceis reposita.

AETII TETRABIBLI PRIMAE, SERMONIS SECUNDI, FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

TERTIO SERMONE AETII CONTINENTVR.

*

D e frictione preparatiua. Cap. i.	Elaterium. cap. xxxviii.	Absinthium flauum bilem ducens. cap. lxx.
De exercitationibus. cap. ii.	Granum enidium. cap. xxxix.	Absinthium ad pituitosos. cap. lxxi.
De exercitationum speciebus. cap. iii.	Agaricum. cap. xl.	Rosatū flauū bilem ducens. cap. lxxii.
De frictionum speciebus. cap. iiii.	Cnici semen. cap. xli.	Rosatū pituitum, & serosum ac atrae bilis humorē euacuans. cap. lxxiii.
De uociferatione. cap. v.	Lathyri. cap. xlii.	Mellis rosacei purgatorii preparatio. cap. lxxiiii.
De gestatione. cap. vi.	Aristolochiae clematidis semen. cap. xliii.	Aceti purgatorii preparatio. cap. lxxv.
De equitatione. cap. vii.	Mercurialis. cap. xliiii.	Aceti mulsi purgatorii preparatio. cap. lxxvi.
De re Venerea. cap. viii.	Cucumis syluestris. cap. xlv.	Acetum mulsum purgans omnes vitiosos humores. cap. lxxvii.
De insolatione. cap. ix.	Styrax. cap. xlvi.	Acetum mulsum quod colicis ac nephriticis per sedem infunditur. cap. lxxviii.
De uenae sectione. cap. x.	Thymus. cap. xlvii.	Acetum mulsum amarū. cap. lxxix.
De euacuationis mensura. cap. xi.	Cyclaminus. cap. xlviii.	Posca uentrem molliens. cap. lxxx.
Quales uenae secandae. cap. xii.	Scordium. cap. xlix.	Alia posca ualde clara. cap. lxxxi.
Quomodo uena secanda est. cap. xiii.	Chamaepitys. cap. l.	Gari purgatorii preparatio. cap. lxxxii.
De magnitudine sectionis. cap. xiiii.	Bdellium. cap. li.	Mellis emollientis preparatio. cap. lxxxiii.
De figura sectionis. cap. xv.	Aquam ducentia. cap. lii.	Garum aquosum. cap. lxxxiiii.
Quod sit opportunum tempus. cap. xvi.	Squama aris. cap. liii.	Garum uinosum purgatorium. cap. lxxxv.
De repetita detractione. cap. xvii.	Euphorbium. cap. liiii.	Garum acetosum purgatorium. cap. lxxxvi.
De arteriarum sectione. cap. xviii.	Chamaelea. cap. lv.	Iuscula emollientia. cap. lxxxvii.
Medicamentum sistens sanguinem arteriarum. cap. xix.	Sanguinem purgantia. cap. lvi.	Lac purgatorium. cap. lxxxviii.
De cucurbitarum usu. cap. xx.	Methodus componendi purgantia phar- maca. cap. lvii.	Oliue purgatorie. cap. lxxxix.
De scarificatione. cap. xxi.	Vini purgantia bilem preparatio. cap. lviii.	Oxyporia purgatoria. cap. xc.
De sanguisugis. cap. xxii.	Vinum pituitam ducens. cap. lix.	Oxyporium ex palmulis. cap. xc i.
De purgatione. cap. xxiii.	Vinū melancholicis commodum. cap. lx.	Purgatorium ex cotoneis malis. cap. xc ii.
Bilem flauam purgantia. cap. xxiiii.	Vinum polypodites. cap. lxi.	Purgatorium ex citrio. cap. xc iii.
Scammonia. cap. xxv.	Vinū mulsum stercus exigēs. cap. lxii.	Purgatorium ex farniculo. cap. xc iiii.
Peplium. cap. xxvi.	Vinum mulsum flauam bilem ducens. cap. lxiii.	Aliud ualde stomacho gratū. cap. xc v.
Veratrum nigrum. cap. xxvii.	Vinum mulsum atram bilem euacuans. cap. lxv.	
Bilem atram purgantia. cap. xxviii.	Conditum ad flauam bilem. cap. lxvi.	
Epithymum. cap. xxix.	Conditum pituitosis. cap. lxvii.	
Polypodium. cap. xxx.	Conditum melancholicis. cap. lxviii.	
Pulegium, tragoriganum, leucanthemon, alysson. cap. xxxi.	Absinthii preparatio statim & stercora euacuans. cap. lxix.	
Armenium. cap. xxxii.		
Centaurium minus. cap. xxxiii.		
Pituitam ducentia. cap. xxxiiii.		
Colocynthis. cap. xxxv.		
Tithymalus. cap. xxxvi.		
Isum. cap. xxxvii.		

Purgato

Purgatorium ex foeniculo quod parari solet ad atram bilem. cap. xcvi.
 Purgatorium atræ bilis. cap. xcvi.
 Aliud purgans atram ac flauam bilem cap. xcvi.
 Pastillus flauam bilem purgans. cap. xcvi.
 Buccella purgatoria. cap. c.
 Aloëdaria citra modestiam purgantia. cap. ci.
 Pharmacum pituitam ducens. cap. cii.
 Purgatorium atræ bilis. cap. ciii.
 Bilis et pituitæ, et atræ bilis de reliquorum humorum commune purgatorium. cap. ciii.
 Aloëdaria emollientia ex rosaceo melale. cap. cv.
 Aloëdarium ex Philagrio. cap. cvi.
 Aloëdarium Oribasij. cap. cvii.
 Sal purgatorium. cap. cviii.
 Purgatorium pituitam ducens. cap. cix.
 Purgatorium aquam ducens. cap. cx.
 Hieris. cap. cx.
 Purgatorium citra molestiam purgans. cap. cxii.
 Hiera Galeni. cap. cxiii.
 Hiera Archigenis. cap. cxiii.
 Hiera Rufi. cap. cxv.
 Hiera Iusti. cap. cxvi.
 Quomodo auxiliari oportet his qui pharmacum biberunt, et non purgantur. cap. cxvii.
 Cura excessus purgationis. cap. cxviii.
 De vomitu. cap. cxix.
 Preparatio raphanorum cum ueratro albo. cap. cxx.
 Quibus dandum sit ueratrū. ca. cxxi.
 Quid ueratrū facere possit. ca. cxxii.
 Quod multi accepto ueratro nihil quidem uomuerunt; nihil tamen minus quam purgati utilitatem perceperunt. cap. cxxiii.
 Qui sint apti ad ueratrū. ca. cxxiiii.
 Tempora uniuersalia ac particularia ad somnandū ueratrū apta. ca. cxxv.

Veratri probati nota. cap. cxxvi.
 Victus ratio ueratro purgandorum. cap. cxxvii.
 Differentia exhibitionis ueratri. cap. cxxviii.
 De cremore ueratri. cap. cxxix.
 De ueratri decocto. cap. cxxx.
 Deramentis ueratri, item de contuso ac cribrato. cap. cxxxi.
 Quæ preparare oportet exhibitionis tempore. cap. cxxxii.
 Quomodo post potum curandi sint. cap. cxxxiii.
 De purgationis excessu. ca. cxxxiiii.
 Epithemata purgatoria. cap. cxxxv.
 Compositio olei siue ungenti purgatorii. cap. cxxxvi.
 De localibus euacuationibus. cap. cxxxvii.
 Quæ oculos purgant et lacrymas prouocant. cap. cxxxviii.
 Quæ aures purgant. cap. cxxxix.
 Quæ per nares purgant. cap. cxli.
 Quæ humiditatem ex ore trahunt. cap. cxli.
 Quæ lac generant ac mouent. cap. cxlii.
 Pulmonem ac pectus purgantia. cap. cxliii.
 De suffitionibus. cap. cxliiii.
 Quæ tenuia intestina euacuant. cap. cxlv.
 Quæ sima hepatis purgant. cap. cxlvi.
 Quæ gibba hepatis purgant. cap. cxlvii.
 Splenem euacuantia. cap. cxlviii.
 Rhenes purgantia. cap. cxlix.
 Vesicam purgantia. cap. cl.
 Quæ glandi induntur ad urinas prolestandas. cap. cli.
 Lapides in renibus ac uesica euacuantia. cap. clii.
 Vterum euacuantia. cap. cliii.
 Quæ in potu sumpta menses ducunt.

cap. cliiii.
 Quæ stercora euacuant. cap. clv.
 Lumbricos educentia. cap. clvi.
 Sudores excludentia. cap. clvii.
 Quæ euacuant ac corrumpunt pediculos omnis generis circa superficiem corporis. cap. clviii.
 De infusionibus sedis. cap. clix.
 De glandibus. cap. clx.
 De tomentis siue floccis. cap. clxi.
 De aëre. cap. clxii.
 De uentis. cap. clxiii.
 De accessione ac significatione stellarum. cap. clxiiii.
 De aquis. cap. clxv.
 De balneis. cap. clxvi.
 De balneis naturalibus. cap. clxvii.
 De frigida lotionē. cap. clxviii.
 De infessu solij ex oleo. cap. clxix.
 De spongie usu. cap. clxx.
 De aspersioibus. cap. clxxi.
 De irrigationibus. cap. clxxii.
 De infessionibus. cap. clxxiii.
 De humectationibus. cap. clxxiiii.
 De fomentis, perfusione, cataplasmatibus, ac cucurbitis. cap. clxxv.
 De cataplasmate ex fermento. cap. clxxvi.
 De cataplasmate ex pane. cap. clxxvii.
 De cataplasmate ex fursuribus. cap. clxxviii.
 De cataplasmate ex ficibus. cap. clxxix.
 De dropace ac picatione. ca. clxxx.
 De sinapismo. cap. clxxx.
 Quod caprarum fimi pilula cum aceto impositæ, priuatim coxædicum morbo conueniunt. cap. clxxxii.
 Quæ sint alia rubificantia. cap. clxxxiii.
 De iberide, siue cardamine, quæ etiam lepidiū uocatur. cap. clxxxiiii.
 De euocantibus ex alto auxilijs. cap. clxxxv.

AETII MEDICI GRAE-

CI CONTRACTAE ME-

DICINAE TETRABIBLI PRIMAE

SERMO TERTIVS.

*

De his quæ per chylum infunduntur, euacuantur, et exhibentur. Et de aëre, uentis, locis, aquis, rubificationibus, sinapismis, ac similibus.

DE FRITIONE PRÆPARATIVA. Cap. i.



in molem eleuetur.

ANT E exercitacionem corpus calfacere oportet, frictionis tum per lintea, tum per oleum, usu, fricandūq; est corpus nudis manibus donec probe caleseat, & molliatur, ruborq; floridus efflorescat, & conficta paricula

De exercitationibus.

Cap. ii.

Exercitatio est motus uehemens. Vehementiæ autem terminus est respirationis alteratio ad celeritatem ac densitatē. Exercitatio ipsa partes instrumentales preparat, ut non facile affectionibus impetantur; & ad actiones obeundas robustiores reddit, & alimentum attractionem fortiolem, & nutritionem meliorem, propter excitatum calorem facit. Sed & sensibiles itemq; obscuros meatus propter fortē spiritus motum

rum expurgat. Quandoquidem igitur distributioni alimentum opitulatur, oportet sane neque humorum crudorum, neque ciborum inconcoctorum copiam, neque in uentre, neque in intestinis contineri: periculum est enim ne ad omnes animalis partes deducantur antequam probe concoquantur. Manifestum igitur est etiam ante cibos exercitari corpora oportere. Oportunitatis nota ex bonitate coloris urinarum sumitur. Aquosa enim urina, humorem ex uentre in corpus digestum ac distributum, inconcoctum esse significat. Fulua uero & biliosa iam dudum perfectam concoctionem notat. At uero moderate pallida, signum est concoctionis nuper factae. Tunc itaque ad exercitia procedendum est, uentris ac uesicę excremento prius deposito.

De exercitationum speciebus. Cap. III.

Comune est omnibus exercitationibus, caloris innati corporibus augmentum. Ceterum singulatum robur ista exercitatio, hoc est, uiolenta, musculos ac nervos ualidiores reddit. Tales sunt, fodere, onus maximum leuare, & aut in loco permanere, aut paululum progredi & uelut deambulare. Huius generis est & per funem manibus apprehensum repere ac ascendere, & plurima alia eiusdemmodi. At uero ueloces exercitationes, citra contentionem & uiolentiam, cursus sunt, & summarum manuum luctus ac exercitia, & parua pila. Ceterum robustis exercitationibus uelut uehementibus uel quis potest, si celeres motus addat. Insuper exercitorum aliqua lumbos aut manus aut crura magis exercent, aliqua spinam, aut pectus, aut pulmonem solum. Exercendum est autem donec corpus in molem eleuetur, & floridum euadat, motusque expediti ac aequales & ualidi existant. In hoc autem corpore etiam sudorem conspicias calidum uapore permixtum. Cessandum uero tunc primum ubi quid ex praedictis fuerit alteratum, uelut si corporis moles contrahi uideatur, statim quiescendum est. Similiter etiam si coloris floriditas contrahatur. Quia & si motuum uigor remitti uideatur, statim cessandum est, & si circa sudorem mutatio aliqua apparuerit iuxta multitudinem siue qualitatem. Si enim paucior aut frigidior prodeat, euestigio desinendum est, oleumque affundendum, indeque corpus recurandum, moxque frictione recuratoria, quae post exercitationem adhiberi solet, utendum quemadmodum praedotribus in usu habent.

De frictionum speciebus. Cap. IIII.

Frictio dura corpora constringit, mollis soluit. Quare quae supra modum exoluta sunt corpora, frictione dura, quae contra adstricta, molli fricanda sunt. Si uero aequaliter habeant, palam est quod neque molliter neque dure, sed quantum eius fieri potest, utroque excessu uitato. Frictio multa gracilitatem inducit, pauca uice uersa, media mediocritatem.

De uociferatione. Cap. v.

Uociferatio exercitatio est pectoris & uocalium instrumentorum, insuperque caloris naturalis purgans, attenuans ac roborans, & corporis partes solidas & robustas reddens, ut non facile affectionibus impetantur. Utendum est uociferatione in anhelosis, & recta ceruicę spirantibus, tabidisque ac doloribus diuturnis pectoris ac dorsi, & in pectoris abscessibus post rupturam, & ad raucam uocem ex plurima humiditate factam, & in febribus quartanis. Nam concretum humorem convenientissime excutit, &

stomachi humiditatem, quam priuatim quartana febris inducere solet, expellit. Conuenit etiam stomachicis praesertim assidue uomentibus, & acidum rusticantibus. At uero capitis affectionibus incommo- dissima uociferatio existit. Ceterum qui uociferatione usus est, alio prius exonerata, & infernis partibus sensim confectis, lotaque facie placide perfusa, & ubi mox a somno se moderate loquendo & deambulando praeparauerit, ita tandem ad uociferationem progredi. In ipsa autem uociferatione concinnitas, & uocis bonitas, ac iucunditas, nihil conu- lerint ad sanitatem. Verum grauiorum uocum sonus utilis existit, quare in hoc se exercere oportet. Sic enim plurimus aer in respiratione attractus, pectus distendit, & aluum ac totius corporis meatus dilatat ac disparat. unde in uociferationibus, & concinnis lectionibus redundantium humorum excretiones contingunt, & his quidem qui concinnius legunt, magis & per sudores, qui uero minus uocem intendunt, per oculi transpirationem. Nam tota corporis moles in lectionibus ac uociferationibus intenditur. Contingit item propter attenuationem ex motu factam, multa sputa resoluta, mucumque ac pituitam excerni. Porro his qui propter frigiditatem caliditate opus habent, quoddam commodius auxilium afferri queat quam actio per respirationem. Oportet itaque saepe legere, & uniuersum corpus relaxare, fusaque carne, ad corporis rarefactionem, asperam arteriam, & alios spiritus exitus commodè distendere, & grauissimas uoces concinne sonare. Utendum autem uocis actionibus neque temere, neque inconsiderate, sed neque prauis ac corruptis humoribus corpore repleto, neque in magnis ac manifestis cruditatibus ad uocis exercitium progrediendum, ne amplior distributio corruptorum humorum aut uaporum in corpus fiat.

De gestatione. Cap. vi.

Reliquae quidem exercitationes in motu corporis sitae sunt, gestatio uero mixta est ex motu & dispositione quieti simili, quum plurimae corporis partes quiescere uideantur, uniuersum uero gestationis tractus moueatur. Atque hinc adeo utilissima simulque lenissima exercitatio est gestatio, ut quae neque lassitudinem corporibus inducat, ipsaque cosimiliter uelut magna exercitia moueat. Omnis autem gestatio insitum calorem uentilare & excitare potest, & materiae multitudinem dispergere, habitumque corroborare, & actiones stupidas suscitare. Differentiae gestationis multae sunt, uerum peculiare hae sunt. Prima quidem in lecto, eoque aut pensili, aut fulcra mobilia iuxta angulares pedes habente. Altera in lectica, quae & ipsa duplex est, ita ut qui gestatur uel desideant uel decumbant. Tertia in curru. Quarta in nauigio. Ponenda etiam equitatio est inter gestationis partes. Itaque gestatione in lecto utendum in febricitantibus, aut diuturno morbo decumbentibus, in quorum corpora consumpta se erigere non ita ualeat. Item in his qui uires recolligere a febrili afflictione iam incipiunt, & in his qui ueratrum sumplerunt. Utendum & phreneticis. Nam spiritus perturbatione placide lenit, & ad somnum illicet. Utendum & in lethargicis, & appetentia ciborum deiecta. At uero in lectica siue ferculo decumbentes gestamus, febris lethargica aut semiteriana, aut quotidiana correptos. Item hydropicos, stupore

pore attonito percussos, resolutos, nephriticos, podagricos. Desidentes autem in lectica gestamus, eos in quibus febris exactè remisit. Cæterum gestatio in curru cōcussorium quiddam habet, & diuturnos morbos cōmouet. Est autem & in hac alia uehementior, alia mītiore. Mītiore itaq; utendū in capitis affectionibus, & his quibus intestina fluxione laborāt. Vehementiore, in affectionibus pectoris ac stomachi, & in tumoribus laxis, hydropicisq; ac stupore attonito percussis. Verum uertiginosos & dimidia capitis parte affectos, auersos ab itinere retrorsum de sidere in curru oportet, eosq; leniter mouere. Etenim multos nouimus hoc modo curatos, qui nullo alio auxilio indiguerunt. Sed tamen sedem aliquāto supīniorē ipsis esse oportet. Porro gestatio in nauigio si iuxta terram fiat, & in mari tranquillo, hydropicis conuenit, & elephantiasī laborantibus, syderatis, tumidis. Et stomachum quidem ab initio subuertit, paulò autem postea in aduetudinem uenit. Verum gestatio per pelagus uehementissima est, & mutationes plurimas ac maximas facit. Nimirum quū anima mixtos affectus habeat, ex tristitia, & spe, timoreq; ac periculo, modò gaudentibus & lætis, modò in agone existentibus nauigantibus. Omnia autem hæc composita sufficientem uim habent omnem ueterem morbum exigendi & e corpore excludendi. Quin & mixtura ex quiete ac motu corporis, si quid aliud, probè corpus nutrit.

De equitatione.

Cap. vii.

Equitationis usus modicus est in ægrotis: neque enim multam utilitatem opus ipsum præbet. Nam si leniter impellatur equus, nihil aliud quàm lassitudinem facit, maximè inguinum, iuxta crurum explicatōnem ac dependentiam. Si uero agitetur equus, uniuersum corpus dolorose concutitur. Et tamen etiam hic motus aliquid utilitatis habet in ualētibus. Suprà enim alia exercitia, & spiritū & corpus, & maximè stomachum firmat, sensusq; purgat & acutiores reddit. Verum pectori pessimum est hoc exercitium. Cæterum in omni gestatione omniq; exercitatione, curandum est maximè, ut in salubri loco fiat, & in aëre puro, nec solum de alijs exercitijs hoc accipiendum est, sed etiam de nauigatione.

De re uenera.

Ex Rustico. Cap. viii.

Naturale opus coitus est. nullū autem ex naturalibus operibus nocuum est. Verum iuxta immodicū & assiduū usum, itemq; iuxta tēpus non conueniens assumptus, noxius euadit. Multò autem magis noxius fit assiduus usus, his qui neruos, aut pectus, aut renes, aut lumbos, coxendicesq; ac pedes, imbecilles habēt. Cuius rei coniecturam hinc facere licet, quòd omne hominis robur in coitus usu debilius redditur. Robur autem, est insitus in nobis calor. Vnde sanè concoctiones coeuntibus non integrè contingūt, & pallidi fiunt, & neq; exactè uident, neq; ut oportet audiūt, neq; alios sensus integros possidēt. Quin & obliuiosi tales & tremuli existūt, & articulis maximè coxendicum dolent, & alijs ex ipsis renum, alijs uellicæ morbos incurrunt. Quibusdam etiam oris graueolentia, & dentium dolores, & gurgulionum inflammationes oboriūtur. Et uisi sunt iam uiri muli qui ex multa uenere sanguinem exspuerunt, partim ob uolentam spiritus compressionem ac intensiōnem, partim ob uenarum ac arteriarum quæ ex pul-

mone ad testiculos deferuntur communionem. Cæterum foemina ex coitu sanguinem non spuit, cum propter reliquam corporis humiditatem, tum quòd in mixtione minus laboris perfert. Imò etiā propter consuetas infernas purgationes. quare si coningat etiam foeminam spuerē sanguinem, magnam ex purgationibus medelam acquirit. Itaq; propter iam reatas causas medici boni iubent uenere abstinere, siue adsit quis ex prædictis morbis, siue timeatur, ob naturalem corporis debilitatem, atq; hætenus quidem. Offensiones & consensus coitus, quantū uires nostræ tulerunt, paucis retulimus. Restat ut etiā utilitates recensamus, neque enim penitus inutiles & omnibus nociuæ res ueneræ existunt, si & usus, tempus, & modum, & sanā utentis constitutionem inspicere uelis. Utilitates ex coitu hæ sunt: Repletionem euacuare, & leuius reddere uniuersum corpus, idēq; ad augmentum promouere, & uiribus efficere. Duris habitudinibus ex longioribus interuallis usus eius cōmodat: mollit enim organa, & meatus dilatat, & pleuitam expurgat, & impeditam rationis uim explicat, & maximas iras remittit. Quapropter et atra bile percit, subtristibusq; & hominum consortia suagentibus, uelut magna quædam medela, cōmodissimus existit: sed et iuxta alium modum furiosos, ad saniores mentem reducit, & quosdā comitiali morbo præhenso sanat, & capitis grauitatem ac dolorē ad uigorem ac integritatem permutat. Hippocrates summam morbis à pituita rem ueneræ optimam esse pronunciauit. Multi quoq; ex morbis alimentū non sentientes, ex usu ipsarum resecti sunt, alijs bene spirantes ex ægrè spirantibus euaserunt, alijs cibos auersantes, appetentiam edēdi assequuti sunt, quidam à frequentibus seminis per somnum effusionibus liberati sunt. Naturæ ad uenerem appositæ sunt calidiores & humidiores. nā rursus usum plus quàm aliæ ferre possunt: minimè autem siccae & frigidae. Est & uigētum natura ad eam accōmoda, senum uero nequaquam. Ex temporibus uer aptum est, ineptus autumnus & æstas, sed neq; hyems cōmoda est propter frigiditatem. Et sanè diæta quoq; calidior & humidior ad coitum idonea est, contra siccans & frigefaciens inutilis. Humidæ enim diætæ etiam impotenti ad coeundum cōmodant. Oportet igitur humidum & calidum esse uictum, cui accedere debet labor moderatus, & cibus boni succi. Vinum itaq; sit colore fuluum, substantia tenuē, panes puri furnacei recentes, carnes hœdorum, agnorum, & porcorū. Ex uolucris gallinæ, attagenæ, perdices, anseres, anates. Ex piscibus polypi, & molli carne præditi. Olerum horminum, irio, eruca, rapum bis coctū & flaccidū factum, hæc enim medicamētū loco exhibentur. Leguminum fabæ, cicer, ochri, phaselī, pisa, dolichī. nā & flatu corpus implent, & luculēter alunt. Magnopere etiam optimam uiam laudo, quod ad hanc uictus rationem attinet: humectat enim & sanguine ac spiritu corpus replet. Cæterum qui uenere uti uolet, recentes repletiones uitabit, cruditates item ac ebrietates, similiterq; famem. Malum est enim repleto corpore coire, item à gymnasijs & à balneis. Vitandæ lassitudines, & prægressi uomitus, & alui profluuiā recentia. nam inueterata aliquando per uenerē resicantur. Commodissimum coeundi tempus est à cibo non nīmiū ingesto, nam & ad robur conducit, &

frigida

frigiditates euenire solitae minus sunt. Et si quidem à prandio quis ad uenerem incitetur, quiescere oportet donec tibus desideat. Si uero à coena, necesse est paululum antea dormire. Porro uehementes impetus ac cupiditates ad uenerem non probo, sed eis resistere suadeo, praesertim si cui morbus sit qui ex uenere facile offensionem perceptet.

De insolatione, & arenae aggestione, ac alijs

uaporatorijs fomentis. Ex Antylo. Cap. ix.

Quidam se ad solem exponunt, partim non uncti, alij etiam uncti, & alij desidentes, aut decumbentes, alij stantes & deambulantes aut currentes. Ex decumbentibus aliqui in strato, aliqui super corio, alij in arena, aut sale decumbunt. Solaris itaque inustio citra unionem, moderate adhibita, perspiratione occultam auget, & sudores elicit, aluum autem sistit, et carnem conseruat, pinguitudinem uero abolet, & tumores laxos cum alios, tum maxime hydropicorum deprimit. Spiritum autem desiozem ac uelociorem reddit, & propterea anhelos & recta ceruice spirantes exacerbat. uerum capiti diuturna frigiditate laboranti commodat. nam & firmum & egritudinibus minus obnoxium efficit. Oportet tamen in his aluum praecauere. Inimica est enim insolatio capiti, euacuatione inferne non praemissa. At uero insolatio cum unctione, eadem similiter potest. Verum corpus magis siccatur, uelut unguine assatum, quapropter & superficiei magis denigrat. Caeterum per occultam transpirationem haec minus discit, nimirum ad cauterij similitudinem densans carnem. Qui uero desidentes aut stantes insolantur, uehementius quam deambulantes & magis quam currentes inuruntur. Decumbentes autem in strato, non magnopere suuantur, sed capite magis replentur. Qui super corio se soli exponunt, magnam utilitatem consequuntur, praesertim hydropici & ischiadici, nephritici, resoluti, elephantiasi laborantes, intumesceres circa refectionem, coeliaci, & qui circa uesicam ueterem morbum habent: itemque syderati, foeminae quoque quae ab utero strangulantur, & adhuc amplius quae alba uteri fluxione infestantur. Oportet autem magnū esse corium, & oleo perunctum, & super tenuem arenam cribratam extectum, & ubi praecalfactum est corium, tum demum aegrum super id decumbere, capite cum crudo linteo uelato. Permanendum est autem diutius in eadem decubitus figura, & postquam corpus multum fuerit seruesactum, uertere subendum ac deuoluendum, & postea rursus in alterum latus reuoluendum, ac quiescendum, atque hoc ipsum saepius facere oportet. Idem modus etiam in arena adhibetur, loco assidue permutato. oportet autem ministrum adesse, qui calentissimam arenam colligat, & corpori defossi ac obruti superingerat. Si quidem igitur mare affuerit, utendum est eius arena. Nam & leuior & magis resiccans huius arenae fomētatio ac feruor est, quam eius quae per corium contingit. Si uero fluuialis arena fuerit, praestat corio uti. Nam & arena fluuiatilis, & aer humectior est ex euaporationibus. Quod si salis copia adsit, multo prestabilius est tenui sale subtrato hominem decumbere. Oportet autem altitudinem esse non minorem tribus palmis paruis: si enim non fuerit altus sal, caliditas ipsius facile diffatur, utpote quae ex alto emersum ac progressum non habeat.

De uenae sectione. Ex Galeno. Cap. ix.

A similaribus corporis partibus primas actiones per-

fici, alibi demonstratum est, itemque per instrumentales, secundas. Itaque humores in corpore contenti considerandi sunt, quam tandem utilitatem aut cladem partibus afferant, per quas corpus actiones suas facit. At uero plenitudo colligi dupliciter dicitur. Aut enim uirium respectu plenitudinem dicimus, aut respectu capacitas uasorum humores continentium. Quoadmodum enim is qui onus gestat, non statim ut grauatur & laborat, iam etiam concidit & uincitur ab ipso onere. Iuxta eundem modum ubi uires a plenitudine grauantur, possibile est ipsas diutius resistere, & nondum hominem aegrotare, ubi uero quis diutius negligatur, uires concidunt. His itaque magnopere prodest uenae sectio priusquam uires uincantur. Sed & plenitudine ac copia sanguinis in corpore non existente, uenae sectio utilis sit, inflammatione incipiente, ob praegressam plagam, aut ob particulam debilitatam, humoribus ex corpore aceruatim in ipsam congregatis. Aliquando enim sanguis aceruatim ad particulam quandam irruens, aut stupefacit eam, ut actio ipsius corrumpatur, aut memorabilem cladem inducit, uelut in syderationibus contingere uidemus: quandoque uero etiam ipsum uas perurum pit, uelut in sanguinis sputo contingit. Conandum itaque est ut redundantem sanguinem euacuemus quam citissimè, priusquam magnum aliquod malum circa aliquam corporis partem operetur. Quin & magni alicuius morbi timore uenam secamus. Atque ego sane multos podagricos annis tribus aut quatuor infestatos ex interuallis, aut purgato redundante humore in principio ueris, aut sanguine detracto curauis. nam & podagricis et arthriticis, comitialibusque ac atrabilarijs morbis, item sanguine spuuentibus, uertiginosis, & his qui frequenter angina arripiuntur, peripneumonijs, pleuritidis, lippitudinibus uehementibus, & in summa his qui magnos morbos frequenter incidunt, uenae sectionem omnibus auxilijs potiorē pronuncio. Consideranda porro ueniunt in omni uenae sectione, plenitudinis quantitas ac qualitas, morbi magnitudo siue praesens sit, siue timeatur, aetas uigoroſa, & praehis omnibus uirium robur aut debilitas, deinde naturalis habitus totius corporis, hora ac tempus anni, regio, praesens ambientis constitutio, praegressus uictus & diæta, copia ciborum & potus, & maxime an multum nutriendos cibos homo ingesserit, & an consueta exercitia reliquerit, & an consuetae excretionis suppressae sint. At uero aggrauante & infestante plenitudine, non omnino sanguis detrahendus est. Aliquando enim crudus quidam humor in corporibus coacervatus est, quapropter diligentem animaduersionem opus est, quantopere uires ualidae sint, & quantopere humor ipse perfrigeratus est, quod ipsum ex urinis & alijs signis cognoscas. Nam in eiusmodi affectionibus praexolutae uires, in uenae sectione extremè concidere solent, ut resocillari amplius non possint, quod ubi contingit, periculum non paruum consequitur, praesertim incidente febre, in constitutione aestiua, stomacho male affecto, aut corpore uniuerso molli & temperamentum humidum ex natura existente. Exoluuntur enim tales, & celerrimè in animi deliquium collabuntur, etiam si non magna febris in ipsos irruat. Sed & si hyems fuerit, aut regio frigida, & natura hominis frigidior, minimè uenae incisionem admitteremus: tales enim hoc modo dispositos moderatis frictionibus, et unctionibus moderate calfacien-

facientibus, & portionibus incisoria ui prædictis facienda.

De euacuationis mensura.

Cap. xi.

Magnitudo morbi & uirium robur principales scopi sunt incidendæ uenæ, qui ubi aucti fuerint, maiorem euacuationem fieri oportere indicant, sicut cōtrā ubi non fuerint aucti, euacuationis quantitatem imminuere oportet, in quantum uires imminutæ sunt, itemq; morbi magnitudo. Consequenter autē simul consideranda est hominis natura. Nam eos qui moderate graciles sunt & magnas uenas habēt, multūq; sanguinis, largius euacuabis. qui uero uenas angustiores habent, & corpore albi & carne teneri sunt, parce. Sanguinem enim modicum hi habēt, & facile humores ipsis transpirant. Iuxta eandem rationem, neq; pueris uenam secabis, usq; ad quatuor et decem annorū ætatem, imō neq; senibus, præsertim uiribus debilibus existentibus. Quod si uires fuerint fortes, & necessitas urgeat, etiā septuagenarijs uenā secabis.

Quales uenæ secandæ.

Cap. xii.

Reuulsionis gratia semper uenas in directum secabis in his à quibus sanguis erumpit. Nimirū ut sanguis ne à dextro nare fluente, uenam dextræ manus seces: à sinistro uero, sinistræ. Quod si splen patiatur, uenā inter anotarem & paruum digitorum manus secas, aut in cubito internā. Sed & in pleuritidis uenam e directo affecti lateris secas. Grauißimos item oculorū dolores mirabiliter mitigat, uenā e directo affecti oculi secas in cubito, quæ humeralis appellatur. Nā interiores uenæ secæ, utilitatē præbent in partibus infra collum affectis. Externæ uero faciei & capiti: Mediæ utriusq;. Si autē in uenæ sectione error contingat, in mediā quidem uena neruus subiacens diducitur. In interna uero, arteria substrata. Et uitandum est ne hæc secemus citra magnam necessitatem. Nam minoris periculi est humeralē secare. Et sæpe facta in hac fissura magna, neq; inflammationes sequutæ sunt, neq; dolores. Quare hanc cōfidenter secare licet. Internam uero cum multo metu. Vitandum item ut ne tentemus mediam. Quemadmodū autem prædictæ partes ex uenarum cubiti sectione opem sentiunt, ita inferiores his, hoc est, coxa, & uterus ac uesica, ex uenarum poplitidis ac talorum sectione. Rheneß autem utrinq; opem ferunt, & ex cubiti & ex infernarum uenarum sectione. Scio autem coxædūm affectionem in una die sanatam, per euacuationē à cruribus, quæ sanè non propter frigiditatem, sed uasis coxæ sanguine impletis facta erat. Oportet autē in omnibus inflammationibus incipientibus, reuulsorie facere uenæ sectionem, uelut pede inflammato ex manu. Verum in affectibus diuturnis, maxime quidem ex ipsis affectis partibus, sin minus, ex propinquis.

Quomodo uena secanda est. Ex Antylo. Cap. xiii.

Punctim quidem uenæ incisionem facimus, ubi uasa fuerint obscura: Cæsim uero, ubi fuerint manifesta, ita ut firmemus manum in obscurioribus, & his qui ad iētum flectere solent cubitum. Oportet autem nō totum uas diducere. Nam dum labia ipsius eueruntur, fluxus non fit cum elaculatione. Neque uero infernam uasis partem ad radiū diuidere oportet, sed supernam ad brachij exortum tendentem. Superna enim secta, speciosa sanguinis elaculatio contingit. Et ad hæc commoda est supernæ partis uenæ sectio, quoniam è uase quis aberrare non potest.

De magnitudine sectionis. Ex Antylo. Cap. xiiii.

In his qui aceruata euacuatione opus habent, magna fissura facienda est. itemq; in quibus crassitiem sanguinis contineri coniectabimus. In quibus uero reuellere & auertere uolumus lationē sanguinis, uelut in reiectantibus sanguinē, aut quibus de naribus aut alia quadā parte sanguis erumpit, parua uulnuscula incurimus. Non enim indigent euacuatione (quum euacuetur ab affectione) sed retractione ac reuulsionē. Oportet igitur in his permitttere ut sanguis fluat multo tempore per uenā. Paruis item fissuris utendū est in phreniticis aut mēte motis, aut aliis delirantibus, quo cito cōglutinatio uulnusculi fiat: contingit enim ut deliri sæpe latenter uinculū manus soluant. & si quidem cōtigerit magnā esse fissuram, sequitur periculū ex sanguinis eruptione. In parua uero, etiā grumus uulneris osculo insidēs, sanguinis eruptionē prohibere poterit. Insuper, & paruis fissuris utendum est in paruis uasis, magnis uero in maioribus. Nam si in magnis uasis paruum uulnusculum fiat, necessariò grumi collecti fluxum sanguinis impediunt.

De figura sectionis. Antyli.

Cap. xv.

Sectionis figuræ tres sunt: transversa, recta, non puniens sed findens uenā in directū, & inter has media, quæ appellatur obliqua. Transuersa igitur utendum est in quibus detractionem omnino non repetere uolumus: Curuato enim cubito oscula fissuræ cōponuntur. Et commoda est hæc figura, ubi magnā fissuram facere uoluerimus. Obliqua uero figura utilis est in quibus detractio repetenda est. Et eò quod à uase nō aberramus dum sic secamus. Sed & sanguinis elaculatio ex obliqua fissura pulchrior aspectu est uidentibus, dū uelut obtorquetur & obuoluitur sanguis in saltu. Oblonga uero in directum figura commoda est in his quibus non solum eadem die sectionem reiteramus, sed etiā post unam aut duos dies. Incuruato enim cubito disparantur oscula fissuræ. Commoda est item in directum fissura his in quibus prouaricatio labiorū fissuræ fieri solet. At in hac figura minus speciosa sanguinis elaculatio contingit.

Quod sit oportunum uenæ secandæ tempus.

Galen.

Cap. xvi.

In omni diei ac noctis hora, necessitate urgente, uenam secabis: ita ut scopum habeas in his qui febriunt, exacerbationis declinationem: in his uero qui aut propter applitudinem, aut aliud quid eiusmodi absq; febre, uenæ sectione indigent, magnitudinem doloris aut inflammationis. Qua enim hora uideris dolorē mitigari, uenā secabis. At uero si nihil tale urgeat, melius est mane uenā secare, non statim ubi à somno surrexeris, sed ubi uigilaueris ad horā unā. Sed et quosdam prælauare præstat & prædeambulare. In quibus uero præseruationis gratia uenam secamus, licet etiā ab actu consuetarū operationum uenā incidere.

De repetita detractione. Galeni.

Cap. xvii.

In quibus simpliciter euacuare uolumus, eadē die iterata detractio fiat. In quibus autem reuellere, præstat ut post duos dies fiat. Et in quibus quidem opus est multa euacuatione, uires autem nō sunt fortes, in his euacuationē reseruare oportet, & prima detractione defectuosiore facta, rursus iteratō detrahare, aut si uoles tertium, Quum uero seruentis sanguinis multitudo febrem acutissimam incēderit, uelut in synochis, siue cōtinētibus, ibi aceruata euacuatione opus

est. Et oportet tentare ut euacuemus usque ad animi deliquium, uirium robore ex pulsibus considerato. In aliquibus enim noui sex libras statim esse detractas. Fluente itaque sanguine attendere oportet semper pulsum tractui, ut ne citra animaduersionem, pro deliquio animi mortem inducas.

De arteriarum sectione. Galeni. Cap. xviii.

Arterias secant medici in temporibus quidē, ob oculorum fluxiones, quum calidae & flauosae fuerint. Eas uero quae sunt retro aures, in uertiginosis, & his maxime qui ex diuturnis morbis capitis calidis ac flauosis laborant. Iam uero & ob alias plurimas affectiones circa caput consistentes diuturnas, quidā secant arterias retro aures. Verum aliqui arteriarum sectiones uerentur, propter sanguinis retinendi difficultatem, & quod dum fissura in cicatricem abit, dilatio uasis ipsius arteriae fit, quae aneurysma Graecis dicitur, & inter tumorum genera recensetur.

Medicamentum sistens sanguinem arteriarum.

Cap. xix.

Quum igitur sanguinis eruptio ex incisa arteria consequatur, oportet hanc hamulis attractam totam transuersim dissecare. Deinde aloem & mannam thuris terere, & ouorum albumine subigere, & tenellis pilis leporinis medicamentum excipere, & fissuram imponere. Dicitur autem de hoc amplius, in loco de sanguinis eruptione, inter uulneraria medicamenta.

De cucurbitularum usu. Ex Antylo. Cap. xx.

Nec in morborum principijs, nec in corporibus repletis, cucurbitis utemur, sed quum euacuatum fuerit totum, & non amplius influxerit parti cui cucurbitae sunt adhibendae, & opus fuerit mouere ac excutere & attrahere reliqua in parte inutili fluxione. Cauendum est autē ne cucurbita prope mamas affigamus. Nam illabentes in cucurbitas mamas & tumescētes, non facile sinūt illas tolli. Tūc uero spōgij ex calida expressis cucurbitis circumdare oportet; licenim remittere solent. Si uero non sic remiserint, cucurbitae perforandae sunt. Illud porro nosse expedit, quod non solum localis uenae sectio detrimento est, antequam uniuersum corpus euacuatur, per affectas partes sanguinem detrahens, sed etiam cucurbita. Et uenae quidē sectio minus est periculosa: pro ratione enim allationis materiae, etiam sanguinis excretionē facit. Cucurbita uero tū impetū affectionis uolenter materiam attrahens, tū multum locum occupans, & tamē nec uasis sensibilem fissuram facies, attrahit quidē memorabilem materiam, non euacuat autem pro ratione attractae. Et praecordij quidē intestini uē affixa, praesertim in continētibz febribz aut semitertianis, & maxime si etiā mēs egri fuerit turbata, & sensus sic obtusus, stragulus et morē eadē die inducit. Capiti uero intestini uē adnota, lethargos, & corporis ac mentis stuporē, & oculos prociuos facit. Quibus autem contigerit ut hec effugiant, hi omnino in diuturnum capitis affectum hic incidunt.

De scarificatione. Ex Galeno. Cap. xxi.

Venae secare sepe in anno non arbitror commodum esse: simul enim cum sanguine multus uitalis spiritus excernitur. Quum autē hic frequentius consumatur, & tota corporis moles perfrigeratur, & omnia naturalia opera deteriora sunt. Probo igitur ut ab ignobilioribus partibus, uelut sunt crura, per scarificationem detractio fiat. Optimū autem est hoc auxiliū ad conseruationem sanitatis, & ad eandem recuperandam,

si fuerit praeuaticata. Prodest autem scarificatio etiam oculis diuturna fluxione affectis, & alijs capitis affectionibus, itemque thoracis, & anginis. Oportet autē in unoquoque membro factas sanguinis inspersiones, post uniuersalem corporis euacuationem, soluere per localem scarificationem.

De sanguisugis. Galeni. Cap. xxii.

Sanguisugas captas una die seruire oportet, easque paulatim sanguine alere, usus autē tempore pars cui admoenda sunt nitro preparatur, & aqua dulcissima exacte abluatur. Postea ē fomēto sanguis illinatur. Atque sic accipiatur sanguisuga ac mittatur in aquam parum, & fuligine ipsarum per spongiam deterfa sic admouebis: inhaerentes enim non cessant trahere, donec salē aut nitrum aut cinerem ori ipsarum inspergamus. Postquam uero exciderint, fouēdi sunt loci per spongiam. Et si sanguis erumpat, gallam ustam, aut linēum ustum, aut spongiam liquida pice imbutā ac ustam, insperge, & superne chartam aceto madidam impone.

De purgatione. Ex Antylo. Cap. xxiii.

Eos qui sana habent corpora purgare difficile est. Nam & uertiginosi ac uolubulosi sunt ac torquentur, purgatioque difficulter ipsis procedit. Et ad hec cito exoluuntur tales dum purgantur. Quum igitur purgare uolueris, praetenuare oportet ac secare crassos ac uiscosos tumores & meatus aperire, per quos humores transferuntur ac trahuntur a purgatorijs medicamentis.

Crassos quidē ac tenues humores in principio morborum euacuare oportet; in crasis uero ac uiscosis cocto expectanda est, qualis est pituita, & bilis atra.

Sed & in omnibus diuturnis morbis semper coctionem expectare conuenit. In acutis uero quum commotae fuerint materiae, etiam in principio pharmatum exhibe, & tamē cum multa cautione. Nam quum humores sunt in motu, lationeque ac fluxu, timor est ne quod ex uisceribus natura debile existens materiam commotam excipiat, & praesertim thorax. At in una aliqua parte firmatos humores, uelut in uiscerum inflammatione contingit, medicamentis aggredi non oportet, priusquam concoquantur: quicumque enim inflammata in principijs per medicamenta soluere conatur, inquit

Hippocrates, a distento quidē & inflammato non auferunt quicquid: nihil enim remittit cruda affectio: uerum sana & morbo resistentia consumunt; dum enim debile sit corpus, morbus dominatur, quum autē morbus dominatur, perniciēs adest. Proinde materiae remouendae gratia utimur purgatorijs medicamentis in cephalaea, uertigine, hemicrania, comitiali, anhelatione, erectae ceruicis spiratione, coxedice, arthritide, podagra, nephritide, & in affectionibus uescicae ac uteri diuturnis. Similiter autē etiam ubi fluxus assidue in festauerit aures, aut nares, aut oculos, aut os, aut stomachum, aut totā superficiē: & nec reficetur ab alijs auxilijs, nec aliter sisti poterit: solet enim purgatio per alium fluxiones cohibere. Et in hoc ordine locari potest etiam humoris atrae bilis purgatio, quae hemorrhoidarum suppressarum gratia assumitur post uenae sectionē. At antiquae affectionis emouendae ac expurgandae gratia, utimur purgatorijs in resolutione, si deratione, alimentum non sentiētibz, torpore, sopore, grauitate perseverante in quacumque corporis parte. Ceterum ob corporis reperimentum transmutandum, utimur purgatorijs in diuturnis febribz, nimirum quotidianis ac quartanis, insania, atra bile, mentis excessu, malo

malo habitu corporis, his qui alimentum non sentiunt propter vitiosum humorem. Insuperque in elephantiasi, scabie, lepra, pustulis, morbo pediculari, & in ulceribus spontaneis ac grauisbus, & affectionibus fluidis. At uero quo circumsitus & infestus humor educatur, utimur purgatorijs, in aqua inter cutem, & regio morbo. Et hoc loco ponendæ sunt etiam uentris fluxiones, in quibus purgatoria assumimus: aliquando enim acris & inutilis humor uentris tunicis insidens aut intestinorum, similiter uelut acres glædulae aut infusiones per antrum, irritat intestina, & simul ipsa stimulat, & promptitudinē efficit ad excretionem, simulque per acredinem suam ex circumferentia corporis ac totius molis humorem attrahit. In his igitur consentaneum est purgatorijs uti, quo talis humor ex corpore expellatur, & uenter ac intestina pura fiant. In summa utendum est purgatorijs medicamentis, in his quibus uires ualidae sunt, & uoluntas prompta est, & qui stomachum robustum habent, & multam inutilem materiam in corpore colligunt. At pigres & praegraciles ad purgationem inepti sunt. Insuper & qui multo sanguine abundat, & qui assidue animo linquuntur, & egrè reuocantur, & qui cito uomunt ex omni occasione. Pueri itē ac senes, & mulieres quibus menses ualide purgantur. Et qui ualde purum habent corpus. Et qui certam habent uisum rationem. Et quibus aliud est natura adstricta. Et qui dysenteria & coeliaca affectione facile corripiuntur. Omnes hi ad purgationem inepti sunt. Incipiendum est autē à bilem purgantibus.

Bilem flauam purgantia. Aloë. Cap. xxiiii.

Aloë totum quidem corpus non purgat, uerum sitam in stomacho & uentre ac intestinis bilem, citra molestiam educit, ac placide unā cum subiectis excrementis. Datur itaque his quibus caput affligitur, propter assiduas fientes ad ipsum de stomacho euaporationes. Excindit enim inutilium uaporum allationem. Danda est & lippientibus, propter eandem causam, & his qui ob bilis augmentum siccant, quibus lingua & os facile resiccatur: & qui circa stomachum ardorem, aut nauseam, aut molestiam aliquam euerforiam percipiunt. Praebetur & his qui praeter rationem pallidiores facti sunt, & in quibus superfluitates educatione indigent, & clyster adhiberi non potest ob aliquam causam. Dantur autē aloës drachmae ii. cum aqua mulsa. Comoda est etiam si quis ipsam quotidie sumat, aut à coena, aut mane ante cibum potius. Tritam itaque aloem corticis citri succo excipe, aut si is desit, succo brassicae utere. Habeant autē hinc formatae pilulae ciceris magnitudinem. Et dato tria aut quinque quotidie ei qui opus habet. Potes & cum cerebynthia ipsam efformare, & cum melle cocto. Oportet autem in deglutendo, aut postea absorbere aquam mulsam. Purgatoria equidē medicamenta omnem causam ex corpore extrahunt, instar cucurbitae, principalibus partibus inhaerentia, ipsa quoque per uentrem euacuantia.

Scammonia. Cap. xxv.

Scammonia flauam bilem maxime educit. Inducit autem stomachi dolorem, & graue olet, ac iniucunda est, & ualde siuculosa. Quum enim omnia purgatoria stomachum infestent, aloë excepta, scammonia plus omnibus illi molesta est. Vitanda igitur est his qui debilem stomachum habent, & febricitantibus: quum enim leuissima sit, facile abripitur in corpus, & omnem in ipso immundiciam commouet, prohibetur autem à febrili calore, ut ne superfluitates ad excretionem ducat.

Danda igitur est his qui bonum stomachum habent, & non feбриunt, atque non facile uomunt, & non facile animo linquuntur. Dantur ex ea scrupuli duo plus minus, pro uirium ratione. Ammiscetur ipsi sal, & thymi coma, aut pulegiū. In his uero qui ferre possunt, praestat aloem miscere. Datur & per se cum melle, aut pitanae succo, si clanculum exhibere uolumus.

Peplium. Cap. xxvi.

Peplii semen, aliquando uero & ramulos simul, in umbra siccata, tusa ac cribrata dato, scrupulorum quatuor pondere, in aqua mulsā, adstillato modico aceto. Nam post flauam bilem, etiam nigram & pituitam ducit. Et flatus dissipat, quemadmodum etiam Hippocrates alicubi dicit. Maxime igitur conuenit flatuosis affectionibus, quae sane atram bilem lacessunt & aspiciantur. Conuenit etiam splenis inflationibus diuturnis, uteri itē ac coli, & laxis abdominis tumoribus.

Veratrum nigrum. Cap. xxvii.

Veratrum nigrum atram & flauam bilem ex toto corpore trahens, inferne expurgat, non tamen cum ulla difficultate. Quapropter etiam febricitantibus per circuitum, & diu, ipsum exhibemus. Datur & furiosis, & hemicranicis, ac diuturno capitis dolore afflictis. Maxime uerò idoneum est uisceribus, & utero & uescicae, si purgatorio medicamento opus habent. Maxima uerò ipsius uis est, priuatim educere si quid corruptorium sanguini fuerit ammixtum. Vnde etiam in diuturno regio morbo commodum est, & ad asperitates cutis, uelut sunt leprae, impetigines & similia. Est & elephantiasi utile. Datur ex eo scrupuli tres plus minus, ita ut tenuia circa radices lignula paululum in aqua madefiant, deinde auferatur cortex, et siccetur in umbra tūdatūque accribretur. Datur cum passo aut aceto mulso. Condimenti porro gratia addere oportet ipsi, petroselinū & dauci parum. Si uero efficacius purgare uolueris, misce & de scammonia parum.

Bilem atram purgantia. Cap. xxviii.

Atram bilem ducentibus utendum est praecipue in melancholicis atra bile uexatis, stomachicis, his quoque facile irritantur, iracundis, homines auersantibus, secessum querentibus, & his qui in refectione uirium, purgatione opus habet, & in habitibus obaridis & parum musculosis, & praesertim in autumno feruente.

Epithymum. Cap. xxix.

Epithymum atram bilem inferne purgat. Dantur ex ipso contuso accribrato perfectis scrupuli xii. cum passo & aceto mulso ac modico sale. Confert affectionibus flatuosis & hypochondriacis praecordiorum, & quibus secur grauat, & difficulter spirantibus. Similiter autē uelut epithymum purgat flos in stoebe enascens, & flos qui in thymbra nascitur, atque epithymbrō appellatur, uerū uterque uiribus debilior est.

Polypodium. Cap. xxx.

Polypodium bilem maxime nigram ducit & pituitam. Dantur radicis purgatae scrupuli vi. affusa aqua mulsā diluta. Potest & super balsamentum deradi, ac comedi ante pradium. Purgat etiam mediocriter ac citra molestiam, radix cocta in iure gallinaceo, & in pitana.

Pulegium, Tragoriganum, Leucanthemum, Alysson. Cap. xxxi.

Pulegium ducit atram bilem acetabuli mensura potum in aqua mulsā. Similiter & tragoriganum, & parthenium, quod & Leucanthemum uocatur. Dantur singulorum scrupuli sex. Sed & Alysson similiter purgatum

gatiuum est. Danturq; etiam ipsius scrupuli sex. Præstat autem hæc dare cum aceto, & modico sale, ex aqua, ita ut arida trita potui inspergantur.

Armenium.

Cap. xxxii.

Armenium quo pictores utuntur purgat atram bilem, & quicquid crassi ac viscosi sanguinis ammixtum est. Datur melancholicis, & elephantiasis laborantibus, ac consimilibus, & in renum affectionibus, & anhelosis. Dantur ex eo scrupuli plus minus quatuor.

Centaurium minus.

Cap. xxxiii.

Centaurium minus crassissimam bilem purgat & mucum. Quare convenienter datur splenicis & coxendicis morbo affectis. Bibitur eius decoctum, ubi coctum fuerit in aqua. Sint autem centaurii scrup. vi, aquæ mensura hemina. coquatur ad medietatem.

Pituitam ducentia.

Cap. xxxiiii.

Pituitam ducentium usus est in habitibus frigidioribus, ætatibus scilicet ac morbis frigidioribus, uelut fune resoluti, siderati, & qui laxis tumoribus tument. Et in his qui multa & crassa emungunt, & qui ex coxendicis morbo à pituita infestantur, & in aqua intercuti.

Colocynthis.

Cap. xxxv.

Colocynthis purgat pituitam & bilem & mucosa. Vnde nervorum nervosorumq; corporum purgatiua est. Datur igitur convenienter in omnibus capitulis affectionibus, & in erecta ceruice spirantibus ac similibus. Et in coxendicum morbo & arthriticis. Et ad diuturnas renum ac vesicæ affectiones. Est & alijs morbis comoda qui ægre excuti possunt, & induratum affectionem habent. Dantur ex medulla eius scrup. ii. in aquæ mulsæ cyathis duobus. In debilioribus scrupulus i. Eligenda est alba & tenera medulla. Nam aridior & nigra mala est. Tundatur autem & teratur diligenter, & cribretur sæpe. Et usus tempore leuigetur ualde bene in mortario cum aqua mulsæ. Solet enim tale quiddam pati. Nam tusa priusquam madefit, tenuissima apparet, ubi uero in aquam mulsam injecta fuerit ac macerata, intumescit adeo ut uix cribratam esse credas. Itaq; tumidæ ipsius partes aliquando inhaerent uentri aut stomacho, & præsertim inuolueris intestinorum, propter molliciem: & quia acres sint natura ac mordaces, adherentes ulcerant intestina, & affectiones nervorum per consensum inferunt, torminaq; ac contractiones. Quare multa animaduersione opus est, ut leuissimam ipsam faciamus cum aqua mulsæ. Quod si magis purgare uolueris, sumito colocynthidē iustæ magnitudinis, eamq; aperito superne, & semen totum eximito. Deinde quicquid comesti speciem præ se fert in ipsa, rursus citra semen in ipsam indito, & repletam ipsam sapa aut uino dulci ueteri, per diem ac noctem macerari sinito. Deinde excolatū per pannū uinum calefactū bibendum dato. Purgat optime & morbum regium, & eos qui pustulas liuidas circa cutem habent.

Tithymalus.

Cap. xxxvi.

Tithymalus pituitam & bilem ducit. Dantur ipsius ramuli uirides accepti, & in testaceo quopiam uase parum fricti, deinde triti. Miscetur autem ex ipsis scrupuli quatuor aut tres cum polenta in aqua, & bibuntur. Nam aridiores ramuli impotentiores sunt. At uero tithymali charactæ radicem accipe, & siccato in umbra. Deinde usus tempore corticē detrahito, tundito ac cribrato, & quatuor scrupulorum pondus in uinum dulce uetus mittito, & per diem ac noctem macerari sinito, & excolatū per pannū uinum calefactū bibendum

dato. purgat maxime, ut aliqui in omnibus ipso utantur uelut quopiam arcano. Bene & citra molestiam purgat etiam succus tithymali circa aquas in humidis locis ac syluis nascētis, exceptus sale, aut pane arido trito, ita ut ex hoc nucis auellana magnitudo detur cum frigida aqua. At succus tithymali à quibusdā datur, aut cum caricis, aut cum polenta, gutt. quatuor aut quinque. Verū ualde exulcerat linguā, & partes circūcirca fitas, & potus multum calorem in uentre facit.

Isum.

Cap. xxxvii.

Isum corticem siccato, tundito, ac cribrato: & ex eo scrupulos v. aut vi. dato, macerans uelut dictum est in passo, & excolans, ac passum ipsum exhibens. Purgat autem magis pituitam. Quam diu uero uolueris ferri uentrem, ne ablues anum aqua, sed linteo deterge. Quum autem satis purgatum te putaueris, laua anum aqua frigida, & manuum ac pedum extremitates aquæ impone, & sistetur fluxus.

Elaterium.

Cap. xxxviii.

Elaterium purgat pituitam & bilem. Dato obolos tres cum lacte recens multo heminae unius mensura. At obolus habet siliquas tres.

Granum cnidium.

Cap. xxxix.

Granum cnidium purgat magis aquosa ac serosa. Purgat etiam pituitam & bilem moderate. Est autem feruens & acutissimum. Dantur ex eo grana triginta. Si uero mitius purgare uoles, dato grana uiginti, aut quindecim. Dato autem internam granorum partem tritam cum polenta, & uino immixtam bibere iubeto, à potu uero parum olei rosacei aut melini absorbere oportet, ne fauces exurantur. Præstat autem terere & efformare catapotia cum cocto melle.

Agaricum.

Cap. xl.

Agaricum purgat pituitam & bilem, sed non acutè. Dantur drachmæ duæ cum aqua mulsæ aut aceto mulso. Est autem stomacho incommodum, eo quod leue sit, & in ipso supernatet.

Cnici semen.

Cap. xli.

Cnici semen purgat pituitam, non tamen fortiter. Huius seminis drach. v. tritas mitte in ius gallinae aut pitisanæ, & excolatum bibendum præbe. Quidam internam Cnici partem drachmæ pondere accipiunt, & terunt cum amygdalis & aniso, & cum melle cocto catapotia formant ac exhibent arguato affectis. Et conueniens quidem, sed leuius est hoc.

Lathyrus.

Cap. xlii.

Lathyrus pituitam magis ducit. Danda sunt eius grana xv. maiora, aut uiginti de minoribus. Et qui quidem efficacius purgari debent, his præcipiendum est ut manducent. Qui uero non ualida neq; multa euacuatione opus habent, integra deuorēt, maxime si uisio sum stomachum habet is qui accipit.

Aristolochie clematidis semen.

Cap. xliii.

Aristolochie clematidis semen siccum tritum duarum drachmarum pondere bibitur, & purgat pituitam ac bilem. Est autem stomacho gratum.

Mercurialis.

Cap. xliiii.

Si mercurialis tenera folia cocta comederis, abunde sterqus expellunt. Si uero decoctum uino mixtum biberis, moderate sterqus educit.

Cucumis sylvestris.

Cap. xlv.

Cucumeris sylvestris radice cortex, duorum obolorum, hoc est, siliquarum sex pondere, potuscum aqua mulsæ, ducit pituitam multam citra molestiam, ita ut neq; stomachum

machum lēdat.

Styrax. Cap. XLVI.

Styrax pinguis flauus datur drachmarum duarum pondere, cum quo pondere terebinthinæ in pilulas coactus ducit pituitam multam citra molestiam.

Thymus. Cap. XLVII.

Thymi cacumina tusa trita dato cum posca, & modico sale: ad drachmarum quatuor aut trium pondus, purgat enim citra molestiam & abunde pituitā ac bilē.

Cyclaminus. Cap. XLVIII.

Cyclamini radice leuissime trite drachmæ tres aut quatuor pro utribus cum aqua mulla potæ, purgant pituitā & bilē. Maxime uero per sudorem purgant. Quare qui bibit reclinari debet, & corpus integumentis ponere, & sudorum exclusionem iuuare.

Scordium. Cap. XLIX.

Scordium tenuissime tritum, duarum drachmarum pondere ex aqua mulla potum, ducit pituitam.

Chamæpitys. Cap. L.

Chamæpityos drachmæ duæ tritæ, & cum ficibus aut cocto melle in catapotia coactæ & exhibitæ, multam pituitam ducunt.

Bdellium. Cap. LI.

Bdellium arabicum pellucidum & flauum, drachmarum duarum pondere tritum potum, cum aqua mulla, purgat pituitam.

Aquam ducentia. Cap. LII.

Aquam ducentibus utendum est, & in hydropicis qui ex ascite intereunte aqua laborant, & in foeminis quæ diuturno albo fluxu uexantur, & ad fluida ulcera.

Squama æris. Cap. LIII.

Squama æris aquam purgat. Datur drachma una & dimidia cum aqua mulla. Non solum autem aquam ducit, sed etiam pituitam. Ducunt porro aquam etiā aliqua ex relatis, uelut granum cnidium, & enicis.

Ac cucumeris syluestris radice conuenientissima est hydropicis minimeq; molestiam affert.

Euphorbium. Cap. LIV.

Euphorbium ducit quidem pituitā, magis uero aquā. Est autem acutissimum inter ea quæ ego noui & feruentissimum. Vnde & colicis datur, & his qui frigidiiores uētres habent. Reliquos fortiter turbat, & ualidā siūm inducit. Miscebis cū ipso aliqua odorata semina, dās ex eo obolos tres cū aqua mulla. Præstat autem cū melle cocto in catapotia ipsum efformare.

Chamelea. Cap. LV.

Chamelea cocta in aqua mulla & pota, aquosa magis ducit. Purgat autē etiam pituitā & bilē. Immittitur ex ea drachmæ quinque in duas heminas aquæ, & fiat coctura ad dimidias. In fine cocturæ mellis moderata portio addatur, & modica facta coctura, coletur ac bibendū præbeatur. Aliqui cotulæ tritæ chameleæ drachmas duas cū duplo comæ absinthij committunt, & cum melle formata catapotia præbent.

Sanguinem purgantia. Cap. LVI.

Sanguinem purgat porri capitati succus, mercurialis, uiola alba, malua syluestris, saluia.

Methodus componendi purgantia phar-

maca. Cap. LVII.

Quæ quidem per se purgare possunt simplicia pharmaca, talia sunt uelutiā expressimus ac præscriptimus. Non fuerit autem difficile etiam mixturas ipsorum facere, his qui ex iam prædictis singulorum uires didicerunt. Si quis enim ex relatis duo miscere ue-

lit, dimidium pondus de dosi singulorum accipere oportet. Si uero tria, tertiam iusti ponderis partē. Si uero plura, iuxta eādem proportionem. Facimus aut ipsorum mixturas, ubi non fuerit unus humor qui infestat uelut pituita, aut bilis, aut aqua, sed omnia simul. Et si quidē putauerimus æqualiter redū dare humores, æqualiter ipsa miscemus in cōpositiōne. Vbi uerō unus plus alijs redundarit, amplius ammiscemus de his quæ talem humorem euacuare possunt. Primum igitur uolo ea molliencia pharmaca aluum subducentia subiungere, quæ in cibo sumuntur. In cibo enim medicamentum optimū est, inquit Hippocrates: quo etiā sanis naturaliter adstrictam aluū habentibus, hæc speculatio utilis fiat. Fortassis autē & his qui se ex morbo recolligunt. Insuper & his qui ex diuturno morbo ægrotant, hæc pharmaca auxiliaria fient, si unum aut alterum simplex pharmacū iucundis eduljīs fuerit ammixtū, aut ad uentrē molliendum, aut si etiam redundantem humorem paulatim & latenter euacuare uolumus. Incipiamus igitur à potionibus propomata appellatis.

Vini purgantis bilem preparatio. Ex

Theone.

Cap. LVIII.

Cassia unc. i. scammonia unc. i. uini sextar. vi. Hæc tenuissima trita linetolo illigentur, & hoc exacte constrictum in uinū suspendatur, ac sinatur ad dies quinque. Deinde ex hoc uino dato ante cibū potionē perfectam, cum aqua calida. Creditur bilem purgare.

Vinum pituitam ducens. Cap. LIX.

Lachrydum purgatorum unc. i. spicæ nardi drach. iii. uini sextar. v. præpara uelut prædictum est, & utere. Creditur pituitam leuare.

Vinū melancholicis cōmodum. Cap. LX.

Polypodij unc. i. tusa, cribrata, & linetolo illigata in uini sextarios v. suspendito, & ad dies septem finito macerari. Et dato potionem uelut dictum est.

Aliud Vinum polypodites. Cap. LXI.

Vini dulcissimi sexta. vi. mastiches sextantem, epithymi drach. iii. radicum polypodij non ueterum de rasarum lib. ii. radices polypodij purgatas tunde in crassiores partes, & coque cum passo, immisso etiā epithymo ac mastiche. Quū autē ad tertias redactū fuerit, aufer ab igne, & frigesieri sine, & ad excolatū spicæ nardi contusæ ac cribratæ scrupulos iii. insperge. præstat autem hanc in mortario cōnire, deinde fistulibus paruis picatis excipere, & osculo uasorum obliato adseruare. Dabis autem in prandio potionē magnam inter medios cibos, aqua calida teperatam. Est hoc iucundissimum & efficax. Preparatur hoc in Babylone Phœnices, laudaturq; ac quoquò uersus nauibus aduehitur.

Vinū mullum stercus exigēs. Cap. LXII.

Vini sextarios v. mellis sextar. i. mastiches quadrantē. Mastichen tritam & linetolo illigatam in uino mullo suspende, & ad dies septem macerari sine. Et dato ante cibum potionem unam calida aqua temperatam. Optime hoc stercus educit, & stomacho commodū est. Euacuat etiam pituitam.

Vinum mullum flauam bilem ducens. Cap. LXIII.

Scammonia dra. i. spicæ nardi drach. i. tusa cribrata & linetolo illigata, in uini sextarijs v. macerato, & mellis sextar. i. & utitor.

Vinum mullum pituitam ducens. Cap. LXIII.

Cnici seminis purgati drach. iii. & uini sextar. v. &

g 3 mel

mellis sexta. i. accipito. Et cnicum in crassas partes co-
tusum ac lincod illigatum macerato, utitorq; uelut di-
ctum est.

Vinum mulsum atra bile euacuans. Cap. lxxv.

Polypodij drach. iij. Vini sextar. v. mellis sextar. i. tun-
de, cribra, macera, & utere.

Conditum ad flauam bilem. Cap. lxxvi.

Piperis drach. iij. scammoniae unc. i. seminis apij drach.
i. uini sextar. v. mellis sextar. i. terito species per se pri-
mum, deinde etiam cum melle, & postea uinum ad-
de, & sine ad dies quinq; & utere.

Conditum pituitosis. Cap. lxxvii.

Lathyridum unc. i. piperis unc. i. seminis anisi, apij, sin-
gulorum unc. i. uini sextar. v. mellis sextar. i. prae-
para uelut dictum est, & utere.

Conditum melancholicis. Cap. lxxviii.

Polypodij unc. i. piperis unc. i. seminis apij drach. i. Vi-
ni sextar. v. mellis sextar. i. prae-para uelut dictum est
& utere.

*Absinthati preparatio flatui & stercora
euacuans.* Cap. lxxix.

Ligustici drach. i. s. cumini drach. i. spicae nardi scrup. ii.
floris iunci odorati scrup. vi. mastiches scrup. vi. Vini
sextar. v. mellis sextar. i. tusa ac cribrata terito cum
melle, & uinum ammisce, excipe & utere post dies
quinque ante prandium.

Absinthatum flauam bilem ducens. Cap. lxxx.

Costi drach. i. mastiches drach. iij. rosarum siccarum
drach. ii. spicae nardi drach. ii. floris iunci odorati dra-
chma i. aloes unc. i. scammoniae unc. i. mellis sextar.
i. uini sextar. v. prae-para & utere uelut dictum est.

Absinthatum ad pituitosos. Cap. lxxxi.

Mastiches drach. iij. costi drach. iij. folij indici drach.
i. spicae nardi drach. i. floris iunci odorati drach. i.
casiae drach. i. polypodij unc. i. mellis sextar. i. lathy-
ridum purgatorium unc. i. uini sextar. v. prae-para &
utere uelut dictum est.

Rosatū flauā bilē ducens. Cap. lxxxii.

Rosarum exungulum recentij lib. i. uini ueteris sex-
tar. v. mellis sextar. i. Rosae ad diem unam praesicca-
tae mittuntur in uinum, & macerantur per dies no-
uem. Deinde uinum excolatur & adijcitur melli prius
trito cum scammoniae unc. i. oportet autem tundere
ac cribrare scammoniam, atq; sic leuigare cum mel-
le. Postea uero recondatur in uasa, quae exacte coo-
perta suspendes in puteum aque frigidae, & fines per
dies septem aut nouem. Deinde extrahe & alios tri-
ginta dies sine, & sic propomate utere.

*Rosatū pituitam, & serosum de atra
bile humorē euacuans.* Cap. lxxxiii.

Si praecedens descriptio acceperit granij enidij unc. i. abs-
que scammonia, euacuat serosum humorem & pi-
tuitam. Si lathyrida solum, pituitam euacuat. Si epi-
thymum solum, atrae bilis humorem expurgat.

*Mellis rosacei purgatorii prae-para-
tio.* Cap. lxxxiiii.

Mellis lib. i. succi rosarū lib. i. mastiches drach. iij. pi-
peris drach. ii. zingiberis drach. ii. scammoniae scrup.
v. coquito mel cum rosarum succo ad compage
mellis liquidioris. Deinde insperge scammoniam &
mastichen leuissime trita, & parum coque, & ablata
ab igne cum reliquis in mortario unito & sepōito,
& dato cochlearium. Euacuat flauam bilem. Quidā
uero simpliciorē prae-parationem facere uolentes,

praemacerant modica aqua scammonia, deinde seruata
ciunt, & detracto superstate ipsius cocremēto excolat,
& leuigata ad mel rosaceū adijciunt, & simul coquunt
uelut dictū est. Si uero lathyridū unc. i. acceperit prae-
dicta prae-paratio mellis rosacei, absque scammonia,
purgat pituitam. Si uero polypodij acceperit unc. i.
atrae bilis humorem euacuat. Verum efficacior fit, si
pro polypodio epithymum acceperit.

Aceti purgatorii prae-paratio. Cap. lxxxv.

Scammoniae unc. i. aceti sextarios v. terito simul, & si-
nito ad dies quinque, & dato ad intinctus cum cibo
cochlearium i. aut ii. purgat flauam bilem. Si ue-
ro pro scammonia, inieceris lathyridū un. i. purgat
pituitam. Si uero epithymi unc. i. inieceris, euacuat
atrae bilis humorem.

Aceti mulsi purgatorii prae-paratio. Cap. lxxxvi.

Mellis despumati sexta. i. aceti acerrimi sextar. i. coqui-
to simul usque ad mellis compagem, deinde adijce
epipetri trid ac cribrati unc. i. utere ad intinctus: aut
cū aqua dato bibere cochlearia. i. circa horam tertiā
ieiunis. Euacuat bilem, si uero non affuerit epipetri,
scammoniae inijce unc. i. Aliud acetum mulsum. Mel-
lis despumati sextar. i. aceti sextar. i. coquito simul
ad compagem. Deinde inijce cnici internam partem
purgatam & tritam pondere unc. i. & sine ad dies
quinque, et utere ut uoles. purgat pituitā. Aliud. Mellis
& aceti singulorū sextar. i. coquito, & thymi leuissi-
mē trid un. i. addito, & sinito per diem, ac uitor, eua-
cuat atrae bilis humorem. Omnia uero quae prae-
dictis aceti mulsi prae-parationibus inijciuntur, li-
neolo illigata macerentur.

Acetum mulsum purgans omnes uitia.

neque tos humores. Cap. lxxxvii.

Comae hyssopi sesquiunciam, origani un. i. pulegij ses-
quiunciam, marrubij un. i. epithymi, seminis cnici, cacu-
mini thymi, agarici singulorū un. i. polypodij sexta-
rē, scammoniae un. i. scrup. v. aceti sequisextariū, aque
sexta. i. mellis lib. ii. sapē sexcūcē. Herbas praemacera-
tas aceto & aqua ad tertias decoquito & excolato,
& mel addito, ac rursus coquito ad bonā copagē. Et
scammonia, epithymum, agaricū, trita ac tenuissimo
tribro exereta, in mortario ammisce. Et ubi mode-
rate purgare uolueris, scrupulos x. exhibeto, medio-
uere modo scrup. xx. At uero fortibus perfecta, do-
sim exhibere potes, unciam i. Quidā etiā alypiadis un-
ciā i. addūt. Aliud flatu euacuans. Aceti sextar. i. mel-
lis sexta. i. bacarū luniperi drach. iij. piperis un. i. zin-
giberis un. i. petroselinij drach. iij. seminis apij, am-
mij, ligustici, anisi, epithymi, singulorū drach. iij.
cumini drach. i. seminis anethi drach. ii. polypodij
unc. i. prae-para & utere uelut praedictum est. Con-
uenit colicis.

Acetum mulsum, quod colicis ac nephritis.

licis per sedem infunditur. Cap. lxxxviii.

Centaurij unc. i. alypiadis recentis sextatē, rutae uiri-
dis sextantē, marrubij, agarici, casiae, iridis, hyssopi,
pulegij, singulorum drach. iij. scillae unc. i. aceti sex-
ta. i. mellis sextar. i. omnia aceto macerata ad ter-
tias coquito & colato, & adiecto melle ad mellis li-
quidioris copagē coquito. Deinde scammoniae tenuis-
simē trita un. i. spicae nardi unc. i. purgatorii medica-
mentū ex foeniculo unc. i. inspergito, & unitis uitor
hoc modo, ubi puacuaris colicū per clysterē stercora
educētē, accipe aceti mulsi cochleariū, & dissolue

cum succo pituitae, & infunde. Vtere similiter & in nephriticis pituitosioribus. Euacuat pituitam citra molestiam & sanat.

Acetum mulsum amarum.

Cap. LXXXIX.

Foeniculi viridis una cum radicibus fasciculū .i. apij cū radicibus, rutae viridis singulorum fasciculum unū. acetū sextar. .ii. & dimidium, hoc est libras .v. mellis sesquilibram. Coquito herbas cum aceto ad tertias & excolato, & mel ad acetum indito, & coquito donec mellis liquidioris copagem habuerit. Deinde aloes primarie unc. .i. in mortario terito ac cribrato, & ad ipsam paulatim acetū mulsum addito, unito, excipito ac utitor: exhibetur ex eo cochlearium unum, ita ut ab ipso absorbeat aqua calida. Caput egregie purgat. Est autem & stomacho gratū. Acetum mulsum ventrem emolliens, Prosofilitate, pulegij, origani, thymbræ sylvestris, polypodij, singulorum unc. .i. radicū apij drach. .ii. radicū anethi scrup. .vi. agarici, epithymi, scammoniae, singul. unc. .i. mellis sextar. .i. acetū sextar. .i. macerato species & coquito uelut acetum mulsum. Vbi uero deuenierit ad bonam compagem, tollito ab igne, & adijce scammoniam, epithimum, & agaricū. Et dato quadrantem cum aqua calida.

Posca aluum emolliens.

Cap. LXXX.

Cymini quadrantem, hyssopi sesquifundam, ammiij sexquifundam, pulegij sesquifundam, petroselini drach. .ii. cacuminum thymi drach. .ii. zingiberis unc. .i. seminis enici unc. .i. piperis drach. .ii. epithymi drach. .ii. salis capadocici dodrantem. Tundito & cribrato, & aridum seruato. Vbi tempore dato cochlearium .i. ex posca.

Alia posca ualde clara.

Cap. LXXXI.

Cumini quadrantem, pulegij sesquifundam, foeniculi sextantē, seminis apij sextantem, anisi sextantē scrup. .viii. scammoniae trientem, epithymi quadrantem, salis communis bessem aut libram .i. Tundito, cribrato, & dato cochlea. .i. ex posca, purgat imperuerse.

Gari purgatorij preparatio.

Cap. LXXXII.

Scammoniae drach. .ii. piperis grana .i. gari nigri quadrantem, misce, utere ad indictus, aut quomodo uoueris, purgat bilem. Aliud. Enici grana .xx. piperis grana .i. gari quadrantem. Internam enici partem tritam unito ac utitor, purgat pituitam. Si uero pro enico adieceris lathyridas, efficacius facies. Si uero polypodij drach. .ii. inieceris, atrae bilis humorem euacuat. Efficacius autem euadit, si pro polypodio, epithymi drach. .ii. aut tres inieceris.

Mellis emollientis preparatio.

Cap. LXXXIII.

Foeniculi viridis manipulū, aquae sextar. .ii. coquito ad tertias, colato, & adijcito mellis lib. .i. & coquito ad copagem mellis, et dato ex eo cochlearia. .ii. purgat bilem flauā. Si uero pro foeniculo, seminis enici internam partē adieceris unciae .i. pondere, purgat pituitam. Si uero polypodium aut epithymū eodē pondere simul coques, purgat atrae bilis humorem.

Garum aquosum.

Cap. LXXXIII.

Gari unc. .i. piperis grana .i. seminis apij obolum .i. hoc est siliquas .ii. mellis cochlea. .i. aquae quadrantem, scammoniae scrupu. .i. s. aut .ii. Reliquis coctis & ab igne ablatis ammisceto scammoniam, & dato antedictum. Si uero pro scammonia, seminis enici granorum uiginti internam partem adieceris, purgat pituitam. Si uero polypodij drach. .ii. adieceris, purgat

atrae bilis humorem.

Garum uinosum purgatorium.

Cap. LXXXV.

Gari conchulas .ii. uini conchulam .i. piperis grana .xx. ligustici scrup. .i. scammoniae scrup. .i. mellis parū, utere. Purgat bilem. Si uero enici granorum .xx. internam partem inieceris pro scammonia, purgat pituitam. Si polypodij drach. .ii. atrae bilis humorem euacuat.

Garum acetosum purgatorium.

Cap. LXXXVI.

Seminis apij drach. .i. piperis grana .i. cumini obol. .i. succi cyrenaei siue laseris tantundē, scammoniae scrup. .i. gari unc. .i. acetū quadrantem, utere, purgat bilem. Si uero pro scammonia, enici granorum uiginti internam partem adieceris, purgat pituitam. Si uero polypodij drach. .ii. atrae bilis humorem euacuat.

Iuscula emollientia.

Cap. LXXXVII.

Aquae sextar. .i. olei conchulae .i. gari parū, salis pauhilum, anethi modicū, omnia donec succulenta fiant coquito. Deinde granorū enici .xx. internam partem indito, & dato. Euacuat pituitam. Si uero polypodij drach. .ii. contusas ac cribratas insperseris iusculo perdicis aut phasiani, purgat atrae bilis humorem. At uero scammonia non probo in iuscula coiectam, eod quod experimento compererim inidoneam esse.

Lac purgatorium.

Cap. LXXXVIII.

Lactis asinini aut caprini heminam .i. scammoniae scrup. .ii. misceto ac exhibeto, purgat bilem. Si uero enici granorū .xx. internam partē inieceris, euacuat pituitam. At uero polypodium aut epithimum non probō ut lacti misceantur, eod quod tingant lac, & nō potest hoc latere accipientem. Plerique enim ob timiditatem purgari non uolunt.

Oliue purgatorie.

Cap. LXXXIX.

Piperis drach. .i. epithymi drach. .ii. silphij drach. .i. mentē uiridis drach. .i. comae pulegij drach. .i. cymini drach. .i. rutae drach. .i. scammoniae unc. .i. palmularum pinguium sextantem, mellis sextar. .i. acetū sextarij dimidium, oliuas muria conditas .xx. numero, omnia praedicta per se tenuissimē terito, & deinde cū aceto mulso. Postea oliuas singulas ter lacinatas inijcto, & finito ad paucos dies, ac utitor. dato in cibo oliuas tres, & iusculi cochlearium .i. aut .ii. pro utribus.

Oxyporia purgatoria.

Cap. XC.

Si ad concoctorium medicamentum quod ex malis cotoneis parari solet, cochlearij unius mensura accipitur, ammiscueris scammoniae scrup. .ii. flauā bilem citra molestiam euacuabis. Si uero lathyridum granorū .xx. addideris, purgat pituitam. Si polypodij aut epithymi drach. .ii. addideris, purgat atrae bilis humorem. Similiter autē si quoque diosporidico concoctorio phar maco uteris, idem efficies, & maxime in quibus pituita in thorace residet. Si uero ad concoctorium ex calaminta pharmacum ammiscueris medicamenta purganda, euacuabis omnem citra cutē corporis uliosum humorem, lepras, impetigines, & similia.

Oxyporium ex palmulis.

Cap. XCI.

Zingiberis, piperis, cumini, petroselini, singulorū unc. .i. scammoniae in fermento assatae ac tenuissimē tritae unc. .ii. s. palmularū pinguiū carnis tritae, foliorū rutae unc. .i. mellis lib. .i. acetū sextar. .i. Coquito mel & acetum & palmulas, donec reliqua fiat tertia acetū pars. Deinde rutam cū palmulis terito, & arida leuissimē trita inspergito ac unito, & paulatim acetū mulsum coctū addito, unito ac utitor, uelut admirando & multa experientia cognito pharmaco. Perfecta dos

non in omnibus, sed in quibus coniectaueris omnes humores æqualiter in corpore redundare.

Aloëdaria emollientia ex rosaceo melle. Philagrij.

Cap. cv.

Aloës sexcūcem, costi, spicæ nardī, carpobalsami, floris iunci odorati, singulorum unc. i. casia unc. i. agarici drach. iiii. croci drach. iiii. s. comæ centaurij scrup. iiii. mellis sextantem, succi rosarū trientē, epithymi unc. i. rhei scrup. vii. asari scrup. iiii. ligni balsami scrup. vi. mastiches scrup. vii. excipe melle rosaceo, & da pro uiribus. Aliud ex rosaceo melle, molliens uē trem sine omni molestia. Vtere uero ipso ad articulo- rum, & maximē coxendicū dolores, itemq; lumbo- rum. Aperit etiā fæcoris obstructions. Isij scrup. vii. agarici drach. iiii. aloës sextantē, spicæ nardī scrup. vii. floris iunci odorati scrup. vii. croci scrup. iiii. ca- siae scrup. xvi. costi scrup. vii. carpobalsami scrup. vii. mellis rosacei quadrantē & scrup. vii. terito & for- mato catapotia cū melle rosaceo, & quinq; exhiben- to, post cœnam quotidie si uoles, aut alternis diebus, aut prout uisum fuerit. Exterget enim stomachum & articulos, præcipue uero purgat pituitam. Est au- tem consuetū more prandendū ac cœnandū. Aliud bilem & pituitam ducens. Absinthij comæ tusæ ac cribratæ, aloës tenuissimē tritæ, utriusq; unc. i. exci- pe succo tithymali, maximē myrsinitæ, & efformā- to catapotia phaselī magnitudine. & dato iiii. tātum.

Aloëdarium ex Philagrio.

Cap. cvi.

Purgat hoc bilem & pituitā. Colocynthis medullæ, aloës, scammonie, singulorū drach. v. succi aut comæ absinthij drach. v. excipe succo brassicæ, & fac cata- potia ciceris magnitudine, & exhibe perfectis xxi. Aliud, & ipsum multo experimento cognitum. Eua- cuat autē tres humores. Aloës, epithymi, scammo- nie, singul. drach. ii. colocynthis, agarici utriusq; drach. i. excipe succo brassicæ. Et dato catapotia x v. Aliud quod in Tyro præparatur. Scammonie sextan- tem, aloës drach. i. mastiches, bdellij, piperis, absin- thij, singulorum drachm. i. excipe succo mediij citrij ac corticis, & fac catapotia. Et dato septem aut nouē. Si uero uoles probe purgare, habeant catapotia ex- hibenda pondere scrup. iiii. s. & amplius.

Aloëdarium Oribasij.

Cap. cvii.

Conuenit hoc maximē lippientibus. Euacuat autē ma- gis bilē flauā & atram. Scammonie unc. i. corticis ue- ratri nigri unc. i. salis ammoniaci drach. i. radice pa- naci drach. iiii. piperis, pulegij, utriusq; drach. i. effor- mato cū aqua pilulas fabis græcis similes. Et dato ex eis septē mediā dosim, ita ut habeāt septē, drachnam unā & obolos duos. Aliud, Oribasij. Aloës sextā- tem, spicæ nardī, asari, mastiches, croci, xylobalsami, sing. drach. vi. casia drach. xii. epithymi drach. xii. for- mato catapotia erui magnitudine, cū decocto pule- gij. Et dato xxi. Hoc quartanarios sanat. Possunt etiā cum melle cocto efformari.

Sal purgatorium.

Cap. cviii.

Salis ammoniaci sexcūcē, silphij drach. ii. seminis apij drach. ii. zingiberis drach. i. piperis drach. ii. folij in- dicti, spicæ nardī, pulegij, singu. drach. i. scammonie unc. i. Datur cochleariū unū. Euacuat bilem. Aliud. Salis ammoniaci sexcūcē, seminis apij drach. i. zingi- beris drach. ii. piperis drach. ii. spicæ nardī drach. i. pulegij scrup. iiii. s. folij scrup. i. lathyridū unc. i. dato cochleariū. Euacuat pituitā. Aliud. Salis ammo-

niaci sextuncē, zingiberis drach. iiii. piperis drach. ii. anisi, seminis apij, utriusq; drach. ii. folij scrup. i. epi- thymi unc. i. dato cochleariū. Euacuat atræ bilis hu- morem. Sal subducens & euacuans circūsitam in uentre ac intestinis pituitam, & reliquos humores. Purgat moderatē etiā bilem. Cōueniētiſs. est archri- tids, uertiginosis. hoc usus est quidā stomachicus, & frequēter ex comitiali morbo cadere solitus, & in- gentes gratias egit. A morbis uero præseruat fami- liariter ipso utentes. Petrosellini drach. iiii. mastiches scrup. iiii. zingiberis drach. iiii. piperis, euphorbij, u- triusq; scrup. vi. salis ammoniaci drach. x v. scammonie drach. vi. Datur cochlearij dimidiū in prædio, cū carni- bus uolucris aut gallinæ, aut piscis, ad intinctus. Sit autē pondus scrup. iiii. s. Si uero efficacius purga- re uoles, dato seluno mane cū succo ptisanæ, aut cum aqua mulsa, scrup. vi. fortioribus etiā vii. dare potes. Debilioribus uero scrup. iiii. aut iiii. s. Aliud purga- toriū purgās citra periculū non euertens stomachū. Datur in omni tempore, & omni ætati, & pueris. Educit stercus & omnē materiam corruptā, a capite usq; ad ungues. Remouet fures & reliquas circa caput nascētes pustulas. Facit ad uertiginē, lippietes. Medetur omnibus circa cutē pustulis. Sanāt terda- nam, quartanam, quotidianā, in interuallis exacerba- tionum datum, ubi concoctio bona in urinis appa- ruerit. Bilem autē præcipue euacuat. Habet hoc mo- do. Zingiberis, petrosellini, epithymi, sylphij, ammi, seminis apij, cumini, ligustici, piperis, singul. drach. iiii. scammonie quadrantem & uncia dimidiū, sa- lis ammoniaci tosti septuncē. Torreto salem ac tun- dito cū reliquis. Scammonia uero tritam cribratam unito in mortario, & dato scrup. ix. cū succo ptisanæ aut aqua mulsa meraciore. Aliud cōsimile, acutius experimento constans, imperuersum, euacuat magis bilem. Ammi scrup. vi. seminis apij scrup. iiii. pipe- ris, petrosellini, epithymi, cumini, singulorum scrup. iiii. s. scammonie unc. i. salis cōmunis quincuncem, salis ammoniaci trientem, datur cochlearium cū ptisana. Aliud experimento constans ualde bonum. Epithymi scrup. x vii. cacuminū thymi scrup. vii. salis ammoniaci scrup. vii. piperis scrup. ii. cumini Aethiopici, anisi, utriusq; scrup. ii. mastiches scrup. xii. confusa trita adseruato. Vtus autē tēpore scammo- nie scrup. ii. sumito, ac terito cū modico melle, et adij- cito aridi triti adseruati medicamēti scrup. ii. tantū, & unito ac dato cum ptisanæ succo aut aqua mulsa.

Purgatoriū pituitam ducens. Diogenis.

Cap. cix.

Euphorbij, piperis, salis ammoniaci, singulorū unc. i. terito & redigito in puluillum, & dato in ouo sorbi- li cochlearij dimidiū. hoc purgat pituitam solum. Dosis perfecta sunt scrup. iiii. s. Aliud flauam bi- lem purgans. Scammonie unc. i. costi, spicæ nardī, utriusque scrup. iiii. s. radice rubiæ leuissimē tritæ scrup. ii. perfecta dosis sunt scrup. iiii. media ii. mi- nima i. Aliud atram bilem euacuans. Scammonie in malo assatæ drach. v. costi, spicæ nardī, utriusque scrup. iiii. s. carlophylli scrup. i. s. radice rubiæ scrup. ii. epithymi scrup. ii. perfecta dosis scrup. vi. media iiii. s. minima iiii.

Purgatorium aquam ducens. Oribasij.

Cap. cx.

Ducit hoc item pituitam, piperis, seminis rutæ, scobis siue ramentorum eboris, euphorbij, æquales partes. Dantur scrup. iiii. cū aqua mulsa aut cōdito, facit & ad colicos

colicos & hydropicos. Aliud aquam ducēs. Petroselinī, anisi, cacuminū thymī, singulorū drach. iiii. foliorum chamelææ siccorum drach. x. mellis quod satis est ut eclegma fiat. Dato perfectā dosim cochlear. iiii. s. Si uero efficacius facere uoles, ammisce prædictis squamę æris drach. vi. Et dato perfectā dosim cochlear. iiii.

De Hieris.

Cap. cxi.

Hiera Logadij. Medullę colocynthidis sextantē & uncie dimidium, scillæ assatæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, thymī, scamoniæ, singulorū drach. x. corticis ueratri nigri, hyperici, utriusque drach. x. epithymī, bdelli, polypodij sicci, aloës, chamædryos, marrubij, calicis, singulorū unc. i. myrrhæ troglodyticę, piperis albi, longi, nigri, cinamomi, croci, opopanax, sagapeni, castorij petroselinī, aristolochiæ longę, singulorū drach. iiii. excipe melle. Dosis perfecta sunt drach. iiii. media iiii. minima ii. adijce ad dosim dum exhibiturus es salis tenuissimę triti cochlearij dimidium.

Purgatorium citra molestiam purgās. Cap. cxii.

Facit ad ischiadicos, & qui per circuitū diurne uexantur. Medullę colocynthidis unc. i. niri sextantē. refito probe, & dato robustis drach. i. cū aquę mulsę potione magna selunis. Debilibus uero siliquas nō uē. Vtere cōfidenter. Aliud eximū. Ad principia infantię, melancholicis, paralyticis, ischiadicis, uertiginosis, comitiali morbo laborantibus, alopecis, capitis doloribus. Veratri nigri, scamoniæ, utriusque drach. viii. salis ammoniaci drach. iiii. gummi drach. i. efformato catapotia ciceris magnitudine cū succo brasiliæ, & dato pfectis scrup. v. Media dosis sunt scrup. iiii. Minima iiii. his qui ualde debiles sunt. Est hæc descriptio Oribasij, cap. lxxvii. desunt autem huic species tres. Purgatoriū medicamentū, Profomilitæ, epithymī quadrantē, isij unc. i. agarici drach. iiii. euphorbij drach. vi. spicę nardi, folij, costi, piperis, singulorum drach. x. x. caryophylli scrup. vi. Datur ex hoc scrup. vi. cum aqua mulsā. Si uero bilem flauam reperiis cum alijs duobus humoribus redundantem, adde ad hanc dosim usus tempore etiam scammoniam, quantum satis esse iudicaueris pro uiribus. Habet autem hæc dosis, isij siliquas quinque, epithymī scrup. i. s. agarici siliquas ii. s. euphorbij siliquas iiii.

Hiera Galeni.

Cap. cxiii.

Medullę colocynthidis sextantē & uncie dimidium, chamædryos, agarici, scillæ assatæ, ammoniaci thymiamatis, scamoniæ, corticis ueratri nigri, stœchadis, hyperici, singulorū sextantē, epithymī, euphorbij, utriusque drach. viii. polypodij sicci, bdelli, aloës, marrubij, calicis, singulorū sextantē, myrrhæ troglodyticę, sagapeni, croci, aristolochiæ longę, piperis albi, longi, cōmunis, cinamomi, opopanax, castorij, petroselinī, singulorū drach. iiii. Mellis quod satis est. Dato perfectā dosim drach. iiii. Mediam iiii. Minimam ii. cū aqua mulsā & salis tenuissimę triti cochleario dimidio. Maxima porrō est huius utilitas; purgat enim ex profundo uarios humores excellentē, ita ut neque exolutionē, neque tribulationē, neque debilitatē, neque inappetentiā, neque aliā angustiam ægro accipienti exhibeat. Sed potius facile sperantes & hilares & robustos efficit, ut mirabilis sit ipsius excellentia. Sanat itaque hemi cranicas affectiones, uertigines, comitialē morbū, infantiā, melancholiā, lethargum & similia, hebetudinē uisus, grauitatē auditus,

uocem interceptam, anhelosos, stomachicos, affectiones antiquas, splenicos, nephriticos, colicos, ischiadicos, arthriticos, podagricos. Ducit menses. Conuenit tremulis, & resolutis, impetiginem feram, & omnes circa cutem corporis nascentes pustulas, & elephantiasim, & febres diurnas per circuitum repetentes sanat, & omnia maligna ulcera.

Hiera Archigenis, ex epistola ad Marsum de atrabile.

Cap. cxiiii.

Medullę colocynthidis sextantē & uncie dimidium, chamædryos, agarici, marrubij, stœchadis, singulorū drach. x. opopanax unc. i. sagapeni unc. i. petroselinī, aristolochiæ rotundę, piperis albi, singulorū drach. v. cinamomi, spicę nardi, myrrhæ troglodyticę, polij, croci, singulorū drach. iiii. excipe melle despumato, ut habeat strigmetidā crassitudinē, & reponē in uitreo uase, perfecta dosis sunt drach. iiii. (In alio exemplari additur scrup. iiii.) cū aqua mulsā adiecto salis cochleario paruo. Quū enim sordibus inquinatus & male affectus fuerit æger, strenuā cōstitutionē inducit, non solū ob multitudinē eorū quę per aluū subducuntur, sed etiā quod priuatim bilē atram imminuit. Pleuritidi itaque primū præparata est, & flatuosis affectionibus cōuenientissima est, & facilē spirationē facit, & impedimentis nutritiū aduersatur, & colorem cutis depurgat, sanguinē quidē defecās, male uero ardētē spiritū lucidius accēdēs. Sed nō est propositū nobis encomiū dicere eius, quæ nō frustra hiera, id est, sacra appellata; longū enim sermonē res ea regrat. Ad melancholicas autē affectiones nō est aliud pharmacū quod huic cōparari mereatur. Et noui multos p assiduū eius usum nullo alio opus habuisse, etiā si nullā omnino bilē excreuissent; nō em̄ q nigrā excernūt bilē solī melancholici uocantur, sed q etiā iā habēt in solidis mēbris talis cōstitutionis structurā. Sed & pāniculorū siue membranarum cerebri malos habitus ualdē bene exterit; unde morbū comitialē & infantiā inde oriētes mirabiliter remouere uidetur. Ego reperi hanc descriptionem in medicamentario libro de Roma mihi allato ualde laudatā ad infanos, melancholicos, ischiadicos, paralyticos, uertiginosos, comitialē morbū, alopecias. Non habebat autē opopanax, neque piper, neque pulegiū. Hiera Antiochi. Chamædryos, agarici, medullę colocynthidis, stœchadis, singulorū drach. x. opopanax, sagapeni, petroselinī, aristolochię, piperis albi, singulorū drach. v. cinamomi, spicę nardi, myrrhæ troglodytidis, croci, folij, singulorū drach. iiii. Mellis quod satis est. Facit ad melancholias, infantiā, morbū comitialē, & oēs feculētū sanguinē habentes.

Hiera Rufi, ad melancholias.

Cap. cxv.

Medullę colocynthidis sextantē & uncie dimidium, chamæpityos drach. x. chamædryos drach. x. calicis drach. v. agarici, marrubij, utriusque drach. x. opopanax unc. i. sagapeni, petroselinī, aristolochiæ rotundę, piperis albi, singulorū drach. v. cinamomi, spicę nardi, croci, myrrhę troglodytidis, polij, singulorū drach. iiii. Excipe melle, et exhibe drach. iiii. perfectā dosim cū aqua mulsā, & sale. Habet aliquid ad intelligentiā utile, eod quod a capite plurimā ducit. Vnde uertiginosis, & capitis grauitati, & glaucomatis fieri minantibus, comitiali morbo, paralyticis affectionibus, hoc pharmacū priuatim adhibere soleo, et si opus fuerit memoriā reuocare. At melancholico nō parua nec uulgaris utilitas ex ipso cōtingit. Quare sæpe per ipsum purgāus est.

Etenim

Etenim alia medicamenta aliter alibi præparantur, & ad alios quosdā morbos magis apta sunt. Si uero quæ ad arrambilem uti uoluerit, hoc utile existit. Vtatur autem singulis diebus ex hac antidoto fabæ magnitudine, non purgationis gratia: magnopere enim confert ad concoctiones, & flatus discutit. Videtur porro mihi conducibile esse, ut ob strenuas purgationes maluæ seminis drach. ii. bibantur.

Hiera iusti, faciēs ad eadē uelut relatæ. Cap. cxi.
Epithymi trientem & uncie dimidium, marrubij, stoechadis, chamædryos, corticis ueratri nigri, scammoniae, agarici, piperis albi, cōmunis, longi, scillæ assætæ, singulorum sextantē, medullæ colocinthidis, euphorbij, aloës, croci, gentianæ, seminis petroselin, ammoniaci thymiamatis, sagapeni, singulorū uncia i. opopanax, poli, cinamomi, casiae, myrrhæ troglodyticæ, spicæ nardi, floris iunci odorati, pulegij, singulorum drach. iiii, aristolochiæ longæ, & rotundæ, utriusq; drach. ii. mellis despumati quod satis est. Perfecta dosi drach. iiii. s. cum aqua mulla & salis tenuissimè triti cochleario uno.

Quomodo auxiliari oportet his qui pharmacum biberunt, & non purgantur. Cap. cxvii.
Si uero quis potio pharmaco non purgetur, aquā mulsam meraciore assidue absorbendā dato, & nitri parū in aqua liquefacti. Optimū autē cognoui multo experimēto maltichen, ut datur eius seru. xii. leuissimè trita cū aqua tepidiore. Optimū est & glādē anodindere, ex sale, nitro, ac melle. Et malū aliquādo māducatum efficit quod debuit: corroboratū enim os uentris, superfluitates infernè protrudit. Ob quos causas nō exercuit uenter purgatorio dato: ob quinque causas. Aut propter naturæ ægri proprietatem, aut ob datū pharmaci paucitatem, aut propter stercus durū impactum in quibusdā intestinis, aut quod natura impetū per urinas fecit, aut propter errorē, pars quidē purgantis, ad hoc ut nihil lædat corpus, alimētum sit animalis, pars uero in pharmacū uenenosum eueritur. At uero Hippocrates de purgationis excessu sic dicit: Quum purgationis excessus hominem arripuerit, statim in balneū ipsum inducito uinūq; bibendum & ante balneū & post dato, fuluū colore, & albū substantia. Et mea experientia comperit hoc præstantissimum omnium, quare ne contempseris.

Cura excessus purgationis. Oribasij. Cap. cxviii.
In his qui nimium purgantur, potū contrahere oportet, & somnum procurare, dandū est autē uinum austereum paulatim, cū aqua fontana. Bonū est & erasiiorem polentā torrere ac potui inspergere. Aut parū de calice papaueris, & gallæ parū. Facit etiā probè lentis decorticatæ farina cū aceto & beta nigra cocta, rhoë adiecto aut parū de calice papaueris. Cōducunt & pira sicca expressa, & mala cotonea. Si uero adhuc perseverat lacionis impetus, utendū est efficacioribus ad coeliacos descriptis. In his uero qui facile uomunt, aquam tepidā multam bibendā dato, & uomere iubeto, digito aut penna immissa. Atq; hoc facies bis & ter consequenter. Deinde oleum melinum & uinum calefacto, & in hoc lintē tinctum uentri adinoueto. & post modicū interstitiū antidoti theriacis fabæ magnitudinem cum uino bibendum dato.

De uomitu. Rufi. Cap. cxix.
Quandoquidem in uolentis uomitibus sæpe absurda quædā sequi solent, operæpretiū fuerit prius modos

referre, quomodo quis facile uomat. Nā pituitā mouet uomitus, & caput leuat: & cū qui auertus cibum ingessit, aut plus uini hausit, lædi prohibet. Auxiliatur autē purgatio per uomitus nimio corporis molli. Opitulatur item excellēter gracilibus. Omnes autem fluidas affectiones uomitus sanare solet, uelut ulcerationē renum, uesicæ, & ani, & aliarū partiū, elephantia sim, caneros, malos corporis habitus, articulorum affectiones. Cōuenit & hydropicis, maxime aqua inter cutē laborantibus, regio itē morbo, & comitiali in his quibus à stomacho initium affectionis accepit. Nam his qui in capite affecti sunt comitiali morbo, incongruus est uomitus. Cōducit itē tremulis, resolutis, siderationibus, spirationibus erecta ceruice, melancholijs, impetiginosis. Cōtrarij uero sunt uomitus sanguinis reiectioni, stragulationibus uteri, naturis nausabundis, animi deliquijs, his qui à suffocatione assidue uexantur, & qui ex qualibet occasione caput dolēt, & qui suffusionē suspectam habēt, & in summa omnibus oculorū affectiōibus. Sint autē uomitoria nō acerba & arida, sed parim dulciora, parim acriora. Videtur autē inter hæc raphanus probari, & eruca, & salsamentū uetus, origanū uiride, cepe & porrū. Coadiuuat uomitus etiam pūsana adiecto modico melle, & pingues carnes. Attamē nō oportet prædicta aut huiusmodi decoquere, & succos ipsorum solos accipere, uerū totā molē deuorare. Neq; uero circa māducationē diu immorari oportet, si quis uomere uelit. Sint tamē omnia ex coctura emollita. Manifestū est autē ex uinis quoq; dulciora esse eligenda: hæc enim magis in uētre supernatāt. Et calidæ potu utendū est. Oportet & amygdalas melle tinctas edere, & placetas gustare, & cucumeris semē maceratū cū melle offerre. Sed & cucumeris satui ac peponis radix trita cū melle uomitū mouet, & Celicæ radix trita septem drachmarū pōdere in aqua mulla ac pota fortiter sursum purgat, ut aliquādo etiā excessus purgationis consequatur. Qui uero fortioribus uti uolūt, narcissi bulbū in aqua coquūt, & cū decocto quidē tēperāt uinū: Ipsum autē bulbū edūt coctū, cū oleo & modico sale. Mouet etiā uomitū ungentū irinū, & plus adhuc cyprinū, si quis illis ex his digitis iriter. Citra molestiā mouet uomitū etiā hyslopi decoctū, & thymi, & cnicī semē tritū cum sesamo, ac cū aqua mulla plurima potū. Et nasturtij semen. Similiter oleū sesaminum, raphaninū, narcissinū. Daphnoidis folia uiridia tria comesta. Optimū est & hoc raphani decoctū, & caricarū cremorē simul misceto, tepesacito, & bibendū dato. Pleraq; igitur & curiosiora uomitoria reprobanda sunt. Dandi uero sunt raphani leiunis qui in ediam tulerunt, & à coena prius uomuerūt. Sint autem raphani ualde acres, & secantur in tenues laminas, macerentur autē hæc frustula à uespera in aceto & melle. Edat autem uomiturus ex his magnā copiam, & assidue superingerat acetum mullum. Deinde ad horas duas lentè obambulet, & plurima aqua tepida hausta uomat, per digitū aut pennæ iritamentum.

Preparatio raphanorum cū ueratro albo. Cap. cxx.
Præparantur etiā alio modo raphani ad diuturnas affectiones, & fortiore exagitatione indigentes. Veratri enim albi & opulmi festucarū drach. vi. in raphanos figuntur, ita ut raphani prius harundine compungantur, & deinde festucæ ueratri in foramina immittantur.

tantur. Hæ festucae ubi totam noctem in raphanis mās-
serint, sequenti die eximuntur, ut ipsarum in rapha-
nis relicta. Postea uero raphanos conscindere oportet
& in aceto mulso macerare, & similiter edendos
exhibere. Diligenter autem considerandum est, ne quid
ex cortice ueratri in raphanis permaneat.

Quibus dandum sit ueratrum, & quibus non. Ex
Antylo & Posidonio. Cap. cxxi.

Ipsum ueratrum dandum est his qui diuturno ac forti
morbo laborant, & qui in alijs auxilijs spem non ha-
bent. Dandum est hydropticis, elephantiosis, malo ha-
bitu præditis, resolutis multo tempore, comitialibus
& melancholicis, arthriticis & ac podagricis. Ag enu-
merare in quibus affectionibus probetur ueratrum,
non facile est propter multitudinem. Præstat itaq; di-
cere qui morbi à ueratro lædantur. Incommodum est
itaq; ueratrum, sanguinis reiectioni, spirationi ere-
cta ceruice strangulationem minanti, & in suffusione
imminente, capitisq; affectibus qui ex intervallis uo-
lentis dolores inducunt, cum rubore faciei & uaso-
rum distensione; & in uteri strangulationibus, & his
qui assidue animo linquantur.

Quid ueratrum facere possit. Cap. cxxii.

Veratrum potest corpora transmutare ac permutare,
temperaturam ipsorum recedentem ac robustiorem
efficiens.

Quod multi accepto ueratro nihil quidem uomue-
runt, nihil tamen minus quam purgati utilita-
tem perceperunt. Cap. cxxiii.

Multi accepto ueratro ipsoq; concocto, omnino qui-
dem non sunt purgati, utilitatem uero non minorem
perceperunt quam hi qui purgati fuerant.

Qui sint magis apti ad ueratrum. Cap. cxxiiii.

Viri aptiores sunt ad ueratrum mulieribus, & ex ipsis
uiris hi qui fortorem habitum possident. At mulie-
rosi, & habitu ualde pingues, aut graciles, aut thora-
cem non carnosum habentes, & longam ac angustam
ceruicem habentes inepti sunt. Pueri quoque ac senes
inepti sunt; & qui ualde frigidam temperaturam ha-
bent, & qui sana corpora habent, & multo sanguine
abundant, inepti sunt. Item difficulter uomentes &
pusillanimes.

Tempora uniuersalia ac particularia ad sumen-
dum ueratrum apta. Cap. cxxv.

Tempus uernum aptissimum est ad sumendum ueratrum.
Deinde autumnus. Aestas incognua est, & nimirum
hyems quoq; nisi ualde magna urgeat necessitas. Et
tunc hyeme quidam qui ualde calidum temperamentum
habent aptiores sunt. Aestate uero senes. Constitutio
idonea est serena & calida & insolara. At in morbis
in quibus intervalla sunt, dandum est in intervallis.
In alijs, quandocumq; cogerit. In quartanis uero &
intestinalis fluxione uexatis, in ipsis accessionibus.

Veratri probati nota. Cap. cxxvi.

Optimum est ueratrum quod ab una radice plures festu-
cas siue surculos habet, eosq; paruos & extentos, &
non rugosos, & non in acutum desinētes, neq; caudam
muris referentes. Intus uero ualde albos, foris autem
pallidiores, profundam medullam habentes, friabi-
les, qui non flectuntur ob molliem, sed franguntur
transuersim instar caulis, & qui in fractura fumosum
quid continent ac remittunt, atq; hoc purum. Nam si
puluerulentum id fuerit, uetustate ueratri indicat. Bo-
num porro ueratrum mansum primum dulcedinis in-

dicationem de se præbet, deinde modicæ acrimoniæ,
postea feruorem fortem inducit in ore, & saluam
multam ducit, & stomachum evertit. Oportet autem
uere colligere ueratrum radice adhuc prægnante.

Victus ratio ueratro purgandorum. Cap. cxxvii.
Victus ratio accuratissima constituenda est his qui ue-
ratro purgandi sunt. Attenuatis enim corporibus non
citra periculum exhibetur. Diebus tribus antea absti-
neat à carnibus aut reliquis crassi succi eduljjs ac po-
ribus. Adsuefaciat autem seipsum ad uomitum, & ter aut
quater prius uomant à coena, & aluus subducatur.
Oportet autem declarata antea domesticis anxietate
certaminis futura, sic ad hoc auxilium procedere.

Differentie exhibitionis ueratri. Cap. cxxviii.
Datur diuersimode ueratrum. Alij enim decoctum ue-
ratri dant, alijs cremorem, alijs ipsam eius substantiam.
Et alijs forpice in ramenta confectum exhibent. Alij
tustum & cribratum. In ramenta igitur confectum di-
to incipit purgare, post horas in totum duas, bilem &
pituitam educens citra multam lacerationem. Et ipsum
simul uomitu reiectum, in quatuor aut quinque horis
purgationem sedat. At in puluillum redactum ualde
tarde operatur, ut post quatuor aut quinque horas sæ-
pe incipiat. Verum omnes species bilis & pituitæ edu-
cit, & ad periculum contractionis & nimis purga-
tionis deducit. Ad longum etiam tempus producit
purgationem, sed utilitatem multiplicem exebet.

De cremore ueratri. Cap. cxxix.

Cremor in quo maceratum est ueratrum, datur senibus &
pueris, & his quibus habitus defluxit, & qui morbum
facile solubile habent. Datur & his qui elephantiasim
futuram timeant. Oportet autem drach. v. ramentorum, in
aquæ pluuiæ hemina dimidia macerare ad triduum,
deinde colare et calfacere, atq; exhibere totum cremorem.

De ueratri decocto. Cap. cxxx.

Decoctum ueratri dandum est tum prædictis, & qui illis
adhuc sunt robustiores, infanientibusq; ac atra bile
percitis. Præparatur hoc modo. Veratri libræ i. concis-
sam in aquæ pluuiæ sextar. ii. macerato ad triduum.
Deinde ad prunas mitiores coqto ad tertias. Postea
colato & adiecto ad decoctum, mellis despumati pris-
marij lib. ii. & coquito usq; ad mellis compagem.
& cochlearium magnum delingendum dato. Licet etiā
aqua calida miscere, & dare cum sorbitione quadā,
hoc neq; conuulsiones, neq; contractiones, neq; ni-
miam purgationem facit. Exercitium autem est uo-
lenti ad ipsum ueratrum transire, ut etiam confiden-
ter ramenta eius confecta accipiat.

De ramentis ueratri, item de contuso ac cri-
brato. Cap. cxxxi.

Cæterum his qui maiori molimine ac exagitatione o-
pus habent, fortioribusq; ac confidentioribus, & fa-
cile uomētib; ramenta concisa danda sunt. At uero his
qui adhuc audientiores sunt, aut etiā consuetudinē ha-
bent, contusum & tenuissimo cribro excretum dabis.
Ramenta uero sic exhibe. Accipe festucas, conscinde
forpice ad polentæ aut fursurum magnitudinē. deinde
puluillum linteo exterge, & detractis omnibus tenui-
bus particulis, ut ne strangulet, dato; timidioribus
quidam cum pisanæ aut alicæ succo, ubi parum decoxe-
ris; fortioribus uero cum aqua calida, aut aqua mulsa,
ita ut cogas ipsos insuper sorbere aquam mulsam puram
aut aquam, ut ne relinquatur quid in faucibus aut sto-
macho. Dosis perfectissima fortibus, de ramentis con-
cisis,

cilis, sunt drach. ii. de puluere crassiore, drach. una & oboli ii. de puluillo drach. i. & oboli ii. Cōtundimus autē crassiorē eius farinam in mortario, & per angustissimum cribrum excernimus, & tenuissimū auferentes, id quod crassius est, exhibemus cum succo alicæ, aut mazzæ ex polenta factæ. Tenuem uerò puluillum tundimus, & exactē cribramus. Et postea cum cocto melle solidissimo in catapodia coactuum ac efformatum exhibemus.

Quæ præparare oportet exhibitionis tem-

pore. Cap. cxxxi.

Præparantur porrò ipsis ad opem ferendam laniationibus, animi deliquijs, & conuulsionibus hæc: Aqua calida & frigida, & decoctum hyssopi, mel, ruta, pulgium, acetum, mala, panis calidus, uinum, pullus gallinaceus coctus, oleum commune & sicyonium, sal, galbanum, castorium, cremor ueratri, oleum cyprinum, aut irinum, aut narcissinum, pennæ, sternutatorium, cucurbitulæ diuersæ, lectica siue ferculum, lectus stratum molle habens, elyster.

Quomodo post potum curandi sint. Cap. cxxxiii.

Si quidē facile purgētur postquā biberunt medicamentū, dabimus ipsis aquā frigidā absorbendā aut colluendā. Deinde odorem quoddā corroborans. Et iubebimus ipsos sedere aut reclinari, & in quiete manere ad horas duas, ut ne citius quā oportet pharomacū reuomatur. Postea iubebimus ipsos moueri. Prima perceptio caloris circa stomachū & fauces cōtingit. Deinde salua multa in os colligitur. Postea pars alimentū & pharmaci cū pituita uomūt: deinde pituita & bilē cum pharmaco. Mox purā bilē. Sæpe uero eū uēter inferne subducitur, quādo sanē etiā tolerabilior purgatio cōtingit. Singultus leuiter, & facies rubicūda est. Si uerò facile procedit purgatio, & facies bonū colorē habebit, & singultus cessabit. His uerò qui circa mediā purgationē singultuē, aquam mulsam dabimus, aut decoctū rutæ, & aquā tepidam in potū. Deinde purgatos lauabimus, & alimentum stomacho gratū exhibebimus. Perseuerāte uerò purgatione, oportet dare aquā mulsam calidā absorbendā in qua decocta estruta, aut aquam cū oleo. Penna quoque cyprino aut irino oleo, aut aliquo simili tincta iritentur, & lecto pēsili reclinati cōmoueantur. Si uerò ualde uexētur à stragulatione, cremoris ueratri cyathos tres offeremus. Nā ex qualitate adiuuat purgationē. Quod si neque sic stragulationis periculū leniatur, acerrima infusione per elysterē euacuabimus. Dabimus ipsis etiā galbani obol. iiii. deuorandos, nō ut uomitū cōctemus, sed ut stragulationē sedemus. Aut sternutatoriū forte admouebimus, assidue per lectū pensilē agitates, & pēnarū immisione irritantes. Vbi uerò incipiūt purgari, mitigandus est singultus, uelut antea dictū est. Si uerò uolētus fuerit singultus, sternutatorio utemur, & cucurbitis per totā spinā, & maxime circa magna scapularū uerticula, detrahentes, ipsas ad spinā perseuerantes enim cucurbitæ sæpe corrigūt stomachū cōtractū & uelut cōtortū à singultu. Ligabimus eū extremas partes, & fouebimus immisas in aquā calidā. At uero succedētes in quibusdā contractiones, eturū maxime & manū: (solēt em̄ pleriq; hæc accidere) leniemus fortiter illinendo, fouēdoq; ac calfaciēdo & fricādo extrema & musculos in furis. Sit autē oleū sicyoniū, aut quoddā ex molliēdibus & lassitudinē ac dolorē extirpantibus,

singultui remedia

acopis appellatis. Sed & castoriū unguēto ammiscerimus, et in potu exhibebimus. Maxime uero pdest cōtractis balneū si affuerit. Sin minus, in scaphā aut in solū immitemus, ita ut oleo multo dulci totū corpus, maxime uerò cōtractas partes illinamus. Sit autē aqua probe tēperata, ut in ipsa diutius manere possit. Porro ubi cessauit cōuulsio ac purgatio, statim nitrite oportet, panē exhibēdo uino diluto madefactū, aut in omphacomeli, his qui ualde sunt euacuati. Si uero caloris sensus circa stomachū post cibū contigerit, ipsum omphacomeli aquā calidā tēperatū bibendum dabimus. Aliquando uerò etiam cum frigida mixtū secunda die dabis. Cibi uerò postea boni succi omnes sint, & uinum tenue ac ualde uetus.

De purgationis excessu.

Cap. cxxxiiii.

Nimias purgationes sistemus aquæ calidæ potu, & extemarū partiū ligatura, & frictione uehementi, & turbitis ad præcordia & dorsum affixis. At absinthij potus egregie supprimit uomitū. Si uero adhuc perseuerari, utemur somniferis dolorē sedantibus. Nam talia resiccandi uel prædita purgationes sistunt. Et somnus excretionē sistendū uim habet. Succedat tamē somnus sua sponte probe purgatis per ueratrū, multus & profundus, si nō periculū imminet. Quibus sane in tantū cōcedere oportet, quantū somno tenentur.

Si uero sudores immodici consequantur, dabimus ipsos corporis uentilatione, & spongiæ ex frigida aqua aut poscæ expressæ deterfione. Utemur etiā puuillorum adstringentium & meatus obducentium insperfione, & reliqua cura in cardiaca referenda.

Epithemata purgatoria.

Cap. cxxxv.

Medullæ colocynthidis, seminis erucæ, rutæ syluestris, elaterij, grani cnidij, lathyridū purgatarū, galbani, ceræ, nitri rubri, singulorū drach. iiii. popanacis drach. ii. terebinthinæ drach. vi. Tunditur hoc pharmacum adiecto paulatim felle taurino, quantū satis est. Et si quidē super umbilicū positū fuerit usq; ad pubē, inferiorē aluū mouet. Si uero super uentrē, superiorem purgat per uomitū. Aliud: Nitri rubri, seminis feruridacæ, medullæ colocynthidis, fellis taurini, staphidis syluestris, stercoris columbini, radicis cucumeris syluestris, scillæ, mercurialis, singulorū æquales portiones, tūditur, cribrato, & felle excipito ac melle sufficiēti, & ubi ad malagmaris formā redēgeris, utitor.

Aliud quod pollicetur sanguinis per nares educationē, si frōis imponatur. Vbi uero sistere uolueris, inquit, sanguinē, ablato ipso locū diligēter deterges per spongiā ex poscæ aut frigida aqua expressam. Si uero imo uentri impositū fuerit quadrāgulari nouē digitorū figura, ciet mēses, & foetus corrūpit. Imponitur & renibus in exacerbationibus. Cōpositio hæc est: Ceræ, galbani, euphorbij, radicis lanatæ herbæ, sing. unc. i. aliorum ceruinorū ustorū drach. iiii. succi absinthij drach. iiii. terebinthinæ liquidæ drach. iiii. Sicca trita cribrata, rursus terito, cū felle uitulino, ad strigmentū crassitū, & liquida ac liquata affundito, & unīto ac utitor, inquit, uelut admirando. Aliud emplastrū purgatoriū, quo utor, Chezananze appellatū. Hoc impositū umbilico, mouet inferiorē uentrē: thoracē uero & stomacho impositū uomitū ciet, donec splenū cui illitū est tollatur. Menses autē foeminarū ducit, & foetus corrūpit imo uētri & lūbis impositū. Cōpositio hæc est: Grani cnidij drach. iiii. lapidis alij drach. x. ueratri albi drach. iiii. adpis ca-

h

primi

primi drach. v. elaterij drach. iiii. succi stithymali drach. iiii. amurcae drach. iiii. fellis taurini drach. iiii. spumae nitri drach. v. farinae lupinorum amarorum sextantē, eodem ablinthij drach. i. Reliqua tundito ac cribrato; deinde fel tritū adjicito, mox amurcā, & postea adipe liquefactū affundito, & unitis utitur. Aliud umbilicariū. Et hoc uomitū ciet uentri impositū. Et mēse seducit nō ob uasorum conclusionē suppressos, foetusq; corrūpit, imo uentri ac lumbis impositū. Absinthij, succi radicis cyclamini, artemisiae, elaterij, singulorum drach. vi. medullae colocynthidis drach. x. radicis cucumeris syluestris, farinae lupinorum, chelidoni, seminis uiolae albae, singulorum drach. vi. opopanax drach. ii. ceræ drach. c. terebinthinae drach. l. cyprini drach. l. aut quantū satis est. Impositū autē ubi aluū commouit, mox ipsum tollere oportet. Aliud, facit & ad colicos. Nitri scrup. i. x. terebinthinae scrupu. vi. elaterij scrup. iiii. staphidis syluestris scrup. i. s. castorij, seminis rosmarini, sampuchi, baccarū lauri, granij endij, lupinorum siccorū, medullae colocynthidis, singulorum sesquialunciā, scammoniū unc. i. fellis taurini unc. i. ceræ sextantē, adipis anserini quadrantē. Aliud. Cucumeris syluestris succū, & cyclamini succum; paribus portionibus, cū melle misceto, & hanc exactē unito in sole aut calido cinere, & uitor illinens ab umbilico usq; ad pubē. Aliud. Elaterij drach. iiii. colocynthidis drach. i. scamoniū, squamę aeris, radicis cucumeris syluestris, singulorum drach. i. lathyridū drach. i. aut pro ipsis succis stithymali rāundē. Tūdito, cribrato ac terito cū oleo plurimū salis habēte, & hapsū lanae magnū facto, ipsumq; pharmaco imbutū imposito ubi uolueris, umbilico inquā, aut uentri, aut imo uentri & lumbis. Aliud. Mespilorū exēptis nucleis scrup. x. scamoniæ scrup. x. ii. atramenti suiorij scrup. x. vi. sagapeni scrup. x. x. lathyridū scrup. x. ii. colocynthidis seminis scrup. x. ii. Trita excipe oleo & utere. *Cōpositio olei siue ungti purgatorii.* Cap. c. x. x. vi. **Fellis taurini sextantē, elaterij unc. i. granij endij utridis trientē, lupinorum utridij succi sextantē, euphorbij unc. i. medullae colocynthidis unc. i. adipis uulpini recentis sextantē, adipis uiperæ sesquialunciā, stercoris muris drach. iiii. succi pæoniæ drach. iiii. castorij drach. iiii. olei cyprini sexcuncē, olei ueteris lib. i. arida tūdito ac cribrato per tenuissimū cribellū. Adipes autē præmolito in mortario, præsertim uulpinū: fibris enim refertū est, deinde ad lentas prunas liquefacito cū oleo, & ipsū reliqua omnia inspergito, & parum ad prunas coquito ac seponito in stanco uase, diligenter operto, ut ne trāspiret, & deponito in domo superiore nō humecta ad dies x. x. Et postea utere in omnibus & ad omniē affectionē: Citra molestiā enim purgat. Sanata autem cū reliquis etiā mentis perculsionem. Mensura quę in usum assumitur ut plurimū est cochleari otū duorū, in quibūdā etiā unū solū. Inuncto em̄ umbilico pfectā feci euacuationē. Si uero immodicē feratur uenter, & uoles suppressere, spongiā uino tepido imbutā ac expressā adhibe, & siste uir. Aliud epithema. Hoc umbilico imponitur, & splenem purgat. Marari nigri quadrantē, uerari albi trientem, ammoniac thymiamatis, nitri, utriusq; trientē, scamoniæ sextantē, piperis grana x. x. cōtusa cribrata excipe terebinthina ut malagmatis formā induat. Et ubi præfricueris locū ac fomēto præparaueris, formato quadrangulārī quinq; digitorū**

figura splenium, & imposito. At pectini impositū, fortius corrūpit. Epithema sanguinē ducens, ut hæmorrhoidas iritet, & mēses muliebres. Elaterij, myrrhae, galbani, farinae ordeaceae, singulorum drach. iiii. foliorum rutae uiridis drach. i. fellis taurini quod satis est. Singula seorsim tenuissimē terito, deinde unito, & fellis quod satis est affundito. Vfus uero tepore locū sub umbilico, & partes circūcirca sitas illinire. Aliquando etiā lūbos. Ducit menses & hæmorrhoidas.

De localibus euacuationibus. Cap. c. x. x. vii.

Et de his quidē quæ superfluitates quæ in toto corpore sunt, purgare possunt, sufficiūter elata. Tempus est autē trāseūdi ad locales euacuationes. Verū illud meminisse uolo per totā tractationē, ut primum totū corpus purges, & a superfluitatibus liberares per prædicta purgatoria medicamentā. Et postea per localia euacues. Si enim ante totius corporis euacuationem aut purgationem, per localia auxilia uolueris partium affectiones curare, in magna mala immiseris egrotū. Ampliorem enim materiā ad debiles locos attrahes.

Quæ oculos purgant & lacrymas prouocant.

Cap. c. x. x. viii.

Lacrymas prouocantibus utemur ad oculos diu resictos, & palpebras scabras ac pruriginosas. Extergentibus uero & repurgantibus ad hebetē usum & suffusionis principiū. Prouocat autem lacrymas & extergent omnia hæc: mel, oleū uetus, ricininum, amygdalinū, ex nucleis regijs, ex foeno græco, lenūscinū, laurinum, anethinum, sulinum, nardinum, opobalsamum. Ex succis autem oculos purgant, succus uuae acerbae, lactucae syluestris, lycij, radicis acori succus, lte chamædryos, centaurij, chelidoni, ocymij, eeparū, rutę hortēsis ac syluestris, quæ etiā besasa appellantur, lte mali punici succus, foeniculi, utriusq; anagallidis, marubij, trifolij, uerari albi, et anemones. Ex liquoribus uero spissis, myrrha, sagapenū, opopanax, tyrenaticus, & Medicus, ammoniac thymiamatis, galbanū, thus: ex animalibus, testudinis terrestriis sanguis hepatis caprini cruor, itemque siluri. Sed & siluri fel, & hyenæ, capræ, gallinæ, perdids, uulturis, ursi, scari, callyonymi, & coracini. Ex adipibus, uiperæ adeps, gallinarū, pisciū fluuiatiliū, castoris testes. Ex cineribus, hirundinū pulli exusti, lacertæ uistæ, tornu cerui ustum. Ex metallicis, lapis hæmatites, & scissilis, res ustum, atramentum suiorum, chalcitis, misy, alumen omne, squama aeris, rubrica, lapis phrygius, laspis, magnes, moroxus qui & leucographis appellatur, lapis galactites. Ex plātis, cortex thuris, arisæ fructus, & quæ eiusdem generis sunt.

Quæ aures purgant. Cap. c. x. x. ix.

Mel, uinū mulsum, uinū dulce, oleū nucū regiarū, amygdalinū per se, & cū anserino adipe, tritū cum aceto, myrrha cū alumine, acetoq; ac aqua: spuma nitri cū melle & aceto, alumē cū aceto, senecta serpentis cum aceto, fel bubulū, suillū, & omne fel pisciū, betæ succus, foliorū capparis succus, corticis raphanis succus, mercurialis succus, bdelliū, galbanū, castoriū, castia, uerariū albū & nigrū, herba lanaria, capparis folia cū oleo cocta, aceti mulsum & nitri cum aqua calida infusum. Cæterū ex prædictis quædam ad pruritū, quædā ad ulcera, quædā ad ea quæ in meatum inciderunt, aliqua ad sordis duritiē, item ad sonitū, & grauē auditū ac surditates tōmoda sunt. Capitis itē doloribus antiqs, & morbo comitali hæc profunt.

Quæ

Que per nares purgant. Cap. cxi.
Per nares purgat caput, radicis betæ succus, elaterium, anagallidis ceruleū florē habentis succus, oleū irinū, amygdalinū, cyclaminī radicis succus, & ipsa arida trita insufflata, piper, nitrū, atramentum sutorū, mel, thlaspi, ueratrū albū, euphorbium, herba lanaria, castoriū, calamintha, melanthiū, iris, marrubium, anemone. Hæc uero manibus admouentur, propter diuturnas capitis affectiones, & ad morbum comitalem, & oculos arquato morbo infestatos. Item ad obtusum auditum ac uisum, & ad narium obstructions antiquas, & in laeso olfactu, & ad eos qui caninam conuulsionem passi sunt.

Que humiditatem ex ore trahunt. Cap. cxli.
Lētiscus & ipsius folia, & quod ab ipsa resinaceum defluit, mastiche appellatū, cū staphide syluestri, piper, granum cnidiū, sinapi cum aceto mulso, ac nitrō gargarisatum multā pituitā euacuat: rumicis radix cum aceto cocta, pyrethrū, capparis cortex, tæda, mel, oryganū, thymus, pulegium, hyssopū, rhus cū melle, alumen, chalcid, misy, myricæ fructus, terebinthina cū melle, omphacī succus cū silphio, cyrenæicus succus, calia, & omnia quæ ori illini solent. Ceterū quæ ualde efficacia sunt, in diuturnis affectionibus assumenda sunt, ore prius ex oleo colluto, ut ne acrimonia impediatur usum. Adhibenda uero sunt hæc omnibus diuturnis capitis affectionibus, & hebetudini uisus, & graui auditui citra dolorē. Ad linguę itē ac gustus resolutiones, ad parouidas, anginas, pustulas capitis aut faciei, ad caninā conuulsionē. At uero recurationis gratia, adhibenda est postea aqua calida, sapa, aqua mulsa, lac mīcarum, panis cremor, aut pisanæ succus.

Que lac generant ac mouent. Cap. cxlii.
Generant ac mouēt lac in potu accepta, pūsana cū foeniculo cocta præsertim uiridi: sin minus, cū semine. Sed & ipsum foeniculū per se comestū, & anethū, sesamū, anisum, semen lini, cuminū, milij farina cocta, tritici decoctum, eruca uiridis, cucumeris semen: foris autē illita uberibus prouocant & mouēt lac, intestina terræ, nigella, fel tauri, ordeī macerati succus, portulacæ succus, adeps anserinus, cera, sulphur, recrementum ferri. Hæc adhibentur in his quibus lac deficit.

Pulmonem ac pectus purgantia. Cap. cxliii.
Semen urticæ, dauci, apij, thymus, semen raphani, in potu ac cibo accepta, item sinapi, sesamū, nasturtiū, erysimum, cardamomū, cucumeris semen, nigella, piper, ruta, polij, marrubium, baccæ lauri, calia, aron, dracūculus, bulbus, cepe, alliū, costus, amomum, spica nardi, sulphur, styrax, galbanū, terebinthina, myrrha, opopanax, scilla, origanū, pulegium, hyssopū, abrotonū, bryoniæ radix, amygdalæ amaræ, caricæ, uuæ passæ, nuce pīnæ, maximè recentes, mel, sapa, uinū dulcē, castoriū, farina erui, picearū nuclei, ammoniacū, bdelliū, thus, silphij, & succus æris, aristolochia, baccæ iuniperi, stœchas, porrū capitatū, cū pūsana coctū in cibo acceptū, ouū recēs absorptum, butyrum per se, & cum melle, glycyrrhizæ succus & ipsa radix. His utendū est ad anhelosos & erecta ceruice spirantes, & ad ueterem tussim. Pleraq; uero ex ipsis etiam phusicis & suppuratū pectus habentibus conueniunt, propter educationē eorum quæ in thorace collecta sunt, & ad ulcerum repurgationem.

De suffitionibus. Cap. cxliiii.
Suffitus nō commodi sunt omnibus affectionibus circa

thoracē consistentibus: neq; enim in sanguinis spūto idonei sunt, quū per acrimoniā eorū quæ suffiuntur uasa rursus aperiātur: neq; his qui siccū morbum circa thoracē habent; uerū solis anhelosis & erecta ceruice spirantibus, & quibus thorax ob copiā frigidorū humorū infestatur. Utendū autē est suffitionibus toto corpore euacuato. Collocandus est homo, & ubi uestibus cōtectus fuerit, subendus est crura disparare, & deorsum nuere, ut facies prope genua existat, atq; ita os aperire, quo suffimēto inter crura posito, fumum ore suscipias. Præstat tamen per infundibulū fumum suscipere. Sunt autē suffimēta hæc, Castorium suffitū humidā & frigidā affectionē pulmonis ac cerebri sanat. Similiter aristolochia, bitumē, sandaracha, ladanum, loliū, paleæ antiquæ, funiculus uetus marina, aqua maceratus, terebinthina, chamæleuce, calaminthe, styrax, mastiche, thus, erysimū, leporis stercus ac pili, dorcadis stercus, cucumeris syluestris radix, centauryū, feniculi semē. At nos habemus suffumigium per experiētiā cognitū, quatuor specterū, nimirū styracis, terebinthina, sandarachæ, mastiches, æqualibus portioibus cōmixtis. Hoc fidē reperit quod anhelositas, & suppuratas, et pleuriticas affectiones sanat, itēq; tussim, quemadmodum & quæ prædicta sunt.

Que tenuia intestina euacuant. Cap. cxlv.
Tenuia intestina purgat fructus tithymali, & semen ipsius quātū guttē quicq; caricis aut palmulis excepte, atriplicis semē, brasicæ succus, cicerū decoctū, thymbræ & polypodij decoctū, pulegij decoctū, uiticis folia, thymij decoctū, chamæptys, butyrū recēs assidue delinētū, chanæ ualde coctæ ac comestæ, fuscū infusum per absorpto, oleū omphacini potatū, rosaceū, itē ac riciniū. Agaricū cū aqua mulsa, sed hoc cū molestia purgat: est enim stomacho incōmodū, eod quod leue sit, & stomacho innatet, aloē cū aqua frigida, aut aqua mulsa, aut lactosa siue lactei teporis pota, itēq; cocto melle excepta ac deuorata, citra molestiā purgat, styrax terebinthina exceptus ac deuoratus, absinthium & abrotonū similiter. At uero tenuiū intestinorum purgatio recētes obturationes, & crudorū humorū generationes, & lubricos rotundos curat. His uero purgatis, etiā uesicæ bilem suscipiētis meatus, qui ieiuno intestino inseritur, propriā actionē minime impediēte perficit. Quin & inflationes & tormina uertiginosa ac uoluulosa horū purgatio per sanat.

Que sima hepatis purgant. Cap. cxlvi.
Polypodiū, mercurialis cocta comesta, lathyrides cum aceto mulso, chamæla cū absinthio & aqua mulsa pota, brasicæ succus, cyclaminī radix, lactis serū, heliotropij, scorpiuri appellati succus, galli ueteris iusculū. Hæc auxiliatur diuturnis inflammationibus circa sima hepatis. Nā incipientibus profunt mitiora.

Que gibba hepatis purgant. Cap. cxlvii.
Amomi decoctū, flos iunci odorati, acori radix, gentiana cū aqua, agaricū cum uino mulso. Est autē stomacho incōmodū, radicis lauri cortex cū uino, rheō Ponticum, glycyrrhizæ succus, amygdalæ amaræ præsertim, absinthij coma, anisum, foeniculi semen, spica nardi, radicis quinquefolij succus, uiticis semē, dauci semen, petroselinum, cētaurij decoctū, pæoniæ fructus, sesamū torrefactum, lauri, palmularum ossa uista, symphyton, polygonū, erigeron, smyrniū, hipposelinum, anagallis ceruleū habens florem, sumaria siue chelidonia quæ in sepibus nascitur, securidacæ

h a semen,

ad anhelositas
suppuratas
pleuriticas
affectiones tussim

semen, cornu cerui usitū, mentae succus & decoctū, calamintia, costus, foenum graecum modice frictum, bacanum, opobalsamū, radicis myrti sylvestris cortex, ordeii cremor, lupini, phu, asarū, meon, plex. Hæc sanant diuturnos circa gibbā hepatis morbos, siue cū tumore aliquo sint, siue sola intemperatura adsit cū dolore, siue obturatio.

Splenem euacuantia.

Cap. cxlviii.

Veratrum nigrum, epithymum, polypodium, scolopendrium, pæoniæ radix, chamædryos decoctum, item chamæpitios, centaurii præsertim minoris, pulegii decoctum, capparis cortex, colocynthidis cremor potus, mercurialis comesta, & decoctum ipsius potum, latyrides cum aceto mulso potæ, chamælea, aqua marina calida pota, ericæ fructus cum petroselino, uitis semen, Hæc omnia splenem purgantia, etiam hepatis ab obturatione liberant, & malos habitus, & hepaticas ac splenicis, morbiq; regni & aquæ inter ceteras affectiones generari prohibent.

Renes purgantia.

Cap. cxlix.

Omnia incisoria ut prædicta, plantaginis radix & folia & semen, arida trita pota, asparagus myacanthinus, pæoniæ radix, cicerum nigrorum decoctum, amygdalæ præsertim amaræ, eryngii radicis decoctum, damasonium, adiantum, apii semen, fœniculi, dauci, petroselinum, ammi, anisi, ligustici, asari decoctum, meon, phu, flos iunci odorati, seseli, acori radix, gramme, uitis lacryma & cortex, sanguis hirci aridus. Auxiliantur autem hæc pota post remissum inflammationum vigorem: dissoluunt enim duos tumores qui fieri parant, & lapides generari prohibent.

Vesicam purgantia.

Cap. cl.

Vrinas à vesica ducit, acori decoctū potum, itemq; asari, oleū amaracinum, amygdalæ amaræ cū passio potæ, radicis althææ decoctū, adianti decoctum, hæmatites lapis tritus cum uino potus, gallinarum sterces siccatæ, anchusæ decoctū, abrotoni, anisi semen, sanguis hirci aridus, atriplicis semen, artemisiæ decoctū, aristolochiæ decoctum, sabinae leuissimè tritæ drachma una cum aqua mulsa, in nō febrientibus cū uino, balsami semen, gladii decoctū, bdellium, apii semen, bryoniæ radix, glycyrrhizæ succus, pulegium, pæoniæ fructus, dictānum, dracunculus, abietis decoctū, rubiæ decoctum, serpyllum, eryngii radix, heliotropium, senecio, menta, saluia, foliorum olei decoctum. Hæc non sinunt lapidum generationem in vesica fieri. Et crassities ac feculentas subsidētias. Insuperq; scabiosas & ulcerosas affectiōes sanare solent.

Quæ gladii indantur ad prolestantes urinas. Cap. cli.

Postquā uero repleta fuerit vesica urina, & contrahi nō poterit, neq; urinā exprimere, in gladem hæc indere solemus, nitrū aqua dilutū, muriā, fel, cyclaminum.

Lapides in renibus ac vesica euacuantia. Cap. clii.

Hæc lapides frangunt, cardamomum cum cortice radicis lauri potum, cyperus, oleum amygdalinum, paliuri semen, bellium, fœniculi radix, libanotis, myrti sylvestris folia, cerasorum fructus, prunorum succus, amygdalæ amaræ, rumicis radicis decoctum, seminis althææ decoctum, triboli uiridis decoctum, adiantum decoctum, uitis lacryma, apri vesica sicca, lithospermum, tecolithos, betonica, saxifraga, lapides in spongijs, electrum.

Vicium euacuantia.

Cap. cliii.

Sanguinē ab utero ducit insecta & apposita hæc. Cap.

lia cum myrrha, calami aromatici decoctum, oleum amaracinum, uiola alba, thymi ac thymbræ decoctū, centaurii radix, & ipsum centarium, opopanax, uitis semen, amygdalæ amaræ, nucum regiarum nucleis usitū cum uino appositū, decoctū absinthii, itemq; succus, sampuchus, scilicet, galbanum, liliæ radix, chamæpitrys, artemisiæ decoctum, dictānum, conyza foemina, rubiæ radix, urticæ semen cum myrrha, clariterium, ueratrum nigrum, lupinorum decoctum, raphani cortex, herba lanaria, adeps cerui recens, adeps anseris, resina terebinthina, fel taurinum cum mastiche, muscus qui & splanchnum & hypnon dicitur, cyperus, ungentum irinum, succus cyclamini, anchusa, quinquefolium, cuminum, syymbrium, heleniū, saluia, heliotropium, mercurialis, granum cnidium, uua exemptis granis, foenum graecum, sesamum, nucleus baccarū lauri, amygdali amaræ radix, cochleæ paræ, lanæ succidæ, cœsypum, lactucæ sylvestris succus, porrum, ceparum succus, calamintia folia. Tot quidem sunt quæ in pessos, hoc est, talorum formas excipiuntur, inijciunturq; ac apponuntur. Vitæ tamen est assiduus usus eorum quæ inter ipsa sunt acriora. Solent enim ulcerationes inducere.

Quæ in potu sumpta menses ducunt. Cap. cliiii.

At uero in potu accepta sanguinē ab utero ducunt pleraq; quidem ex prædictis, & omnia quoq; urinam cientia. Sed & erysimū & asarum cum aqua mulsa, calamus aromaticus, alumē, castoriū, cicerū decoctū cum pipere & ruta, radicis asphodeli decoctū in uino elixatæ, itē pulegii in uino cocti, radicis eryngii decoctū, abrotoni semē, origani, thymi, thymbræ, rutæ decoctū, fœniculi decoctum, crethmō, cuminum, sinapi, marrubii semen, & succus & decoctum, smyrnium, lion, oreoselinon, dauci semen, thlaspi, nigella, uiolæ albæ semen, carpobalsamū, pæoniæ semē, baccæ lauri, myrrha, cardamomū, cyclaminus, sagapennū, galbanū, semē fœniculi, spica nardi, mercurialis, costus, styrax, centaurii magni radix, sabina, iris, aristolochia, bryoniarū flos & succus, radicis rumicis decoctū, artemisia, dictānum. Singula ex his cocta cū uino, aut trita et pota, sanguinē ducere creduntur. Cōueniūt autē hæc his in quibus purgationes impediuntur, uel guttatim purgantur, aut oclusio uteri adest. Auxiliantur autem & declinationibus, & recursibus sursum uersus, & strangulationibus uteri.

Quæ stercora euacuant. Cap. clv.

Stercora euacuat styrax deuoratus, mastiche cū aqua frigida trita pota, scrupul. xii. pondere, aloës drach. i. terebinthinae cochlearium, sinapi, allium cum oleo & garo seruefactum, ficus cum nitro, cnici seminis medulla. Omnia uero prædicta ad tenuia intestina commoda, etiam magna intestina purgant.

Lumbricos educentia. Cap. clvi.

Lumbricos rotundos & largos & ascaridas expurgant ea quæ de tenuibus relata sunt, in potu accepta. Proprie uero expellit ipsos, auriculæ muris succus cum melle potus, aut cum zytho, utriusq; cyathi mensura. Senecio in cibo acceptus, sanoniscum cum fico comestum, abrotoni decoctum, intestina terræ trita cocta cum passio pota.

Sudores excludentia. Cap. clvii.

In potu accepta sudores excludunt, cuminū, baccæ lauri, anisum, uirga, serpillum, calamintia, poliū, raphani cortex comestus, costus, syymbrium, dictānum, artemisiæ,

artemisia, cardamomū, libanotis, mel, lac bubulum, calia, iunci odorati decoctū, succus cyrenaicus ciceris magnitudine deuoratus in frigidioribus morbis, chamædrys, castoriū cū aqua mulsa, centaurij magni radix, radice capparis cortex, ligusticum, petroselinū, nigella. Hæc aliquādo cū uino, aliquādo cum uino mulso bibuntur, & sudores mouere creduntur. Sed & pistacia comesta sudores citra molestiā dant. At uero forinsecus illita sudores mouent, nitrū cū oleo, ungentū irinū, anethinū, chamæmelinū, laurinū, raphantinū, lycionū, myrobalaninū, alihæa, costus, balsamū, aristolochia, calia, calamus aromaticus, libanotis, singula cū oleo cocta. Suffita uero sudores mouet, castoriū cū pulegio, semē balsami, bdelliū, uitis semē. ut edum est his ad morbum regium, & ad eos qui ob frigiditatem, aut cutis adstrictionem, nō sudant.

Quæ euacuant & corrumpunt pediculos omnis

generis circa corporis superficiem. Cap. CLVIII.

Sandaracha, aristolochia, staphis sylvestris, sulphur uiuum, cinamomum, calamus aromaticus, calia, pyrethrum, cinis quercinus, cucumeris sylvestris radix.

De infusionibus sedis. Cap. CLIX.

Plurima mala quæ in perniciem animalis generantur, propinat uentris suppressio. Sequitur enim ad ipsam uentris adstrictionem, capitis grauitas & uertigo, euerio stomachi, lancinatio uomitoria, nausæ & ac prostratus appetitus, oris siccitas & amaritudo, ructus inuicundi, ac uirosi, spiritus graueolens, somni suspensio, ac inuicundi, inflationes, tormina, uoluuli. Generat itē plenitudinis, et articulares, podagricos & acetoxendicū morbos, omniaq; auget, & maligniora ac diuturniora mala efficit. Aliquando uero etiā perniciofa ac letalia. Contingit autē infusionum per sedē usus etiā in alijs affectionibus, quarum ex parte mentionē faciam. Ex infusionibus igitur quæ iniiciuntur, aliæ simplices sunt & teneræ, aliæ acres, aliæ uero aliū usum ac uim habent. Ex simplicibus igitur, aqua calida ipsa per seipsam facit, eliciendorum stercorum gratia, in cōtinuis febribus, malignisq; ac æstuosis, & in his qui ex lōga imbecillitate uires recolligunt, in quibus difficiles secessus fiunt. Calidiorē autē immittimus, inflat enim tepida. Verū aqua & oleo utimur in detentione duriorū stercorū, & in his qui ulcerosum ac mordacē sensum circa intestina habent. Vitare tamen aquam & oleū oportet, ubi capitis grauitas fuerit, aut stomachus subuertitur, aut prostratus appetitus obtinuerit. Rosaceū autem pro oleo cū aqua infectum, aptū est in æstuosis febribus, & feruoribus excellentibus circa mediā, & maxime circa colū. Caput autē complet, & minus lubricum est quā aqua & oleū. Immittēdum est autē rosaceū quarta aquæ parte. At uero cū ouo & ptisanæ succo iniicimus rosaceū in æstuosissimis febribus, aut ubi mordacitas circa intestina adest. Chamæmelinū uero oleū, & ouū luteū ac candidū, cū ptisanæ succo infundimus ad noctē, in ardentibus febribus, subentes ipsum cōtinere per totā noctē. Nam & somnū lucundum inducit, & causas febris sequenti die secum educit. Butyrū uero cū aqua infectū morsus & tormina mitigat. Modicū autē esse oportet in his butyrū. Facit et ad eos in quibus propter inflammationē intestini recti detinētur stercora, & in sordidis ulcerationibus circa intestinū. At foenigræci decoctū ex aqua citra pinguedinē infundatur in febribus ex pituita accen-

sis, & in mollibus ac mulierosis corporibus, et in intestinorū morsu. Caput autē abūde cōplet. Quapropter nō utendū est eo, nisi caput a læsione fuerit alienū. Maluæ autē decoctū conuenit in torminibus ac morsibus, & præsertim si durū subest stercus. Seminū linū uero decoctū in corporibus ac morbis siccis cōuenit. Vtile est & morsibus, & nausæbundis, & ualde sitiētibz. Caput autē cōplet quidē, nō similiter autē uelut foenumgræcū. Ptisanæ uero succus stercora dura dissoluere potest, & intestina extergere, & morsus mitigare. Alicæ succus morsus quidē mitigat, maxime uero cōuenit cardiacis, & qui ex animi deliquio exoluuntur. Nam ad hoc quod nutrit, etiā uires reficit infusus. Insuperq; lubricitatem subiectis stercoribus exhibet. Fursurū succus febribus siccis, & doloribus colicis, & intestinorū ulcerationibus cōmodus est. Exterget enim absq; morsu. Portulacæ succus febribus accommodatissimus est, in morsibus ac feruoribus, tū alijs, tū in quibus propter durorū ac acriū stercorū excretionē, anus aut intestinū rectū læsum, ignis sacri affectionē incurrit. Verū in his miscere ad succum oportet & ouum, & rosaceū. Sed & per se succus portulacæ cōmodus est, ubi sacri ignis ardor in profundo circa intestina cōsistit. Lac iniicitur, ulceratione & inflammatione circa intestina consistente, itemq; in renibus & uesica atq; utero. Serum lactis infusum, egregiē stercus educit, & omnes superfluitates in intestinis repertas expellit. Exterget etiā sordidiora intestinorū ulcera. Verū citra coagulū paratur. Oleum per se immisissum calidum, cōmodum est inflammationis intestinis. Idoneum est etiā in extremis senibus, in quibus stercus induratur. Aqua mulsa cōuenit infusa in mitioribus febribus, & in mulierosis corporibus, & in decrepitis, quibus intestinū rectum aut colū perfrigefactū est. Rutæ decoctum, itē anethi, et cumini cū oleo, dissoluit flatum. quapropter colicis immittitur. Oportet autē in his esse duas partes decocti, & unā olei. Foenigræci succus butyro & terebinthina ammixtis, ita ut sit de utrisque quarta pars succi, maxime mitigat tormina, siue concussionē circa intestina. Nā & diu intus manet, citra mordacitatē, & superfluitates educit citra turbationem. Vtilissimus est etiā ad uteri morsus. At ptisanæ succo miscetur butyrū & mellis ualde parū, & sit cōmodus in detēdis stercoribus propter intestinorū ulcerationem, & in sordidis intestinorū ulceribus. Rutaceum oleū cum butyro & terebinthina, utiliter infunditur in colicis doloribus. Aliquādo uero picis liquidæ drach. III. aut bituminis drach. III. cū rutaceo oleo terentes infundimus, & sedat dolores, & pituitā euacuat citra molestiā. Aliquando uero lanæ sordidas in uino dulci coquimus & excolamus, atq; hoc ipsum oleo rutaceo ammixtū infundimus, & colli dolores sedat, ita ut sint uini mēsuræ tres, olei uero duæ. Si uero neruorū ex quibus testes pendent, aut uesicæ dolor affuerit, etiā petroselinū leuissimē tritū rutaceo oleo inspergatur. In doloribus uero abscessuum, aut doloribus ulcerosis in intestinis, butyrum cū māna thuris immittimus, aut medullā cerui aut uulū cū oleo. Vbi uero frigidi fuerint morbi, & dolores lenti, galbanū cū butyro iniicimus, ut sit galbani drach. una, butyri sexcūx. Aut styracis oboli tres cū butyro. Cæterū acris infusus utimur in ischiadicis, lethargicis, erecta ceruice spirantibus, & frigidis morbis,

morbis, & ad eos qui letale pharmacum acceperunt, & in his quæ propter frigiditatem, aut concretionem in grumos, occidunt. Proinde in frigefactis toto corpore, syderatis, ischiadicisq; ac nephriticis, castorei obol. iiii. tritos cum oleo immittimus addito modico sale. Verum pro sale nitrum addimus, quum bis aut ter promptitudinem ad excernendum facere volumus. Sal etenim acervatim quidem mordet, non perseverat autem diu ipse morsus. At nitrum caput male afficit ac replet, & stomachum evertit, quale nihil salis adest. Efficacia autem sunt ad paulum ante relatos, garum a siluro, marina aqua, muria, decoctum centaureæ, colocynthidis, aristolochiæ, cucumeris sylvestris radicis, agarici, thymi, chamæpitios, seminis rosmarini. Hæc enim & sanguinem ducunt, & hoc ipso affectiones leuant.

De glandibus.

Cap. CLX.

Glandibus subditis utimur, aliquando ob egrorum imbecillitatem, qui infusis uri non possunt. Aliquando propterea quod stercorea sint apud intestinum rectum, & infuso non habeant opus: præsertim in febribus vehementibus ac ardentibus, & materiam sursum repente habentibus, in quibus nocivus est infusionum usus. Nam in his absque omni molestia educuntur superfluitates insitæ, per glandes subditas. Commodæ sunt etiam omnibus frigidis capitis affectionibus, altiore somno pressis ac deliris. Contingit etiam ipsorum usus sæpe in his quibus non excernitur id quod per clysterem immisum est. Preparatur autem diversimode glandula ipsæ. Nam & ex melle cocto, & sale tosto, & nitro præparantur. Et ex cumino & ruta nitroq; ac melle cocto, in quibus inflatio magis infestat. Sed & thymus tritus cocto melle excipitur. Et cyclaminus trita cum melle. Et absinthium, aut abrotonum, aut lupinorum farina cum melle. Hæc autem glandula ad lumbricos comoda est. Aut hyssopum & tragoriganum & epithimum cum melle. Hæc in stomachi subuersione utilis est. Aut granum enidi cum resina sicca siue melle cocto. Aut pyrethrum cum resina sicca. Aut sinapi cum sicca resina. Aut centaurium cum pice & cera. Hæc comode sunt in partium resolutione. Aut bitumen, radicis panacis parum, hyssopum, galbanum, & resina sicca. Utilis est hæc glans ad resolutos toto corpore, & propterea facultatem excernendi debile habentes. Facit & in resolutione intestini recti. Facit ad ascaridas. Potest autem pro melle resina sicca in usum assumi, aut pix, aut ficus pinguis trita, aut uva passa expulsa granis, aut sapo. Optima uero glandula fit ex foliis mercurialis viridibus tritis ac efformatis & siccatis. In infantibus autem etiam grumus salis inditur, cepæq; ac porrum capitatum.

De tomentis siue floccis. Cap. CLXI.

Sæpe etiam opus est aliquid subdere, in his qui scissuras aut condylomata in ano habent. dilantantur autem hæc a glandium duritie. Vnde cogimur tomentis pro illis uti. Materia uero horum sunt omnia ante relata, quæ trita cum melle, & tomento siue flocco excepta ano induntur.

De aere. Galeni. Cap. CLXII.

Bonus est aer in omni tempore qui exacte purus est. Talis autem fuerit is qui non ex stagnorum aut palustrium locorum euaporatione turbatur, neque ex barathro quopiam uenenosam auram concipit. Velut uerbi gratia. Si ex quibusdam cloacis magnam cluitatem expurgantibus coërbatur, malus est. At uero & qui nebulosus est, non est bonus. Quemadmodum etiam qui in regione

caua undique aliis montibus includitur, malus est & æstuosus ac strangulatorius. Qui uero in montibus altisq; regionibus est, & nullam auram suscipit, salubrior est, commodus erecta ceruice spirantibus & tabidis, & omnibus thoracis ac capitis affectionibus. At qui in humilibus regionibus purus est, commodus est animo deliquentibus ac senibus. Marinus uero hydropicis et fluidis affectionibus, & præsertim frigidioribus utilis est, & nervis per consensum affectis, & prostrata appetentia. Qui uero in petrosis locis est, hyeme quidem gravis est, frigidus enim est: æstate uero æstuosus est. Malus est etiam qui ex metallis exhalat. Qui uero ex argillosis, stomachum exoluit. At ex locis terræ fuluæ, magis priore siccatur. Optimus autem est ex terra nigra. Sed & circa anni tempora, mutationes aeris fiunt. Et uerno quidem tempore humidus & calidus est aer. Aestate uero siccus & calidus. Autumno frigidus & siccus, hyeme frigidus & humidus. Rursus autem in singulis temporibus tres differentie fiunt, prima, media, & ultima. Media itaque sincerissimum temporis temperamentum habet. Prima uero & ultima a uicino tempore imminuuntur. Sed & luna secundum mensem quatuor differentias in aere operatur. Primus igitur septenarius a nouilunio usque ad septimam diem, similis est ueri, humidus & calidus existens. Secundus uero septenarius usque ad plenilunium, æstat similis est. Tertius sextenarius decrescere luna, autumno. Quartus et ultimus, hyemini. Sed & singulis diebus differentie aeris fiunt. Matutinum enim tempus humidum est & calidum, uelut uer: Quapropter etiam corpora tum sanorum, tum ægrotorum remittuntur, ut etiam febrientibus hoc tempus facillime tolleretur. At medium diem, æstat assimilatur. Crepusculum autumno, uespera hyemi. Quin & noctis prima pars ueri assimilatur, media æstat, & reliqua cōsequenter.

De uentis, Adamantij Sophiste. Cap. CLXIII.

Quandoquidem uero ex terræ exhalationibus uenti generantur, etiam de his paucis tractandum est. Ventos quidem parturit terra. parit autem fuliginosas exhalationes. Nam caliditas humiditatem inuoluta, sicciores exhalationes, & uelut fuliginosas facies, uentos generat. Siccam autem exhalationem nunc accipe ad cōparationem aliorum, uelut si uinum siccius dicamus. Vniuersales uenti duodecim sunt numero. Orientales tres, eurus, subsolanus, cæcias. Occidentales tres, aphricus, fauonius, thrascias. Vnus autem meridionalis appellatur auster, & unus septentrionalis boreas: ut sint relati octo. alij uero quatuor inter relatos medij sunt, et ab angulis mundi excitantur. Inter orientem & meridiem, Euroauster. Inter meridiem & occidentem, Aphricoauster. Inter orientem & septentrionem, Aquilo. Inter septentrionem & occidentem, Argestes, siue Circius: ut sint omnes uniuersales xii. Alij uero qui uernaculi sunt singulis regionibus, spiritus existunt. At uero alie exhalationes ex terra fientes, humidiores his sunt quæ uentos generant. Si quidem igitur modica & tenuis fuerit exhalatio, uapor nubilosus generatur. Si uero amplior & crassior, caliginosus. Si uero adhuc crassior, tenebrosus. Plurima uero ac crassissima humiditate exhalante, uapor diffunditur in ambientem rosclus. Ex his quatuor exhalationibus coërentis rores & imbres fiunt ac deferuntur: congelatis uero pruinae, & nix ues, & grandines, pro frigoris qualitate ac quantitate. Nulla uero harum uentum generare solet, quum segnes sint & impetu careant. Et humida quidem exhalatio quæ uapor

uapor appellatur, rores & imbres facit. Siccior autē facit uentos, & est sicca humidę contraria. Quomodo uero sepe simul imber & uetus fit, dicimus, quia ex alto atq; alto loco afferuntur. Quū enim ex diuersis latitudine locis contrarię exhalationes fiunt, tunc & pluit & flatus fit. Cur autē aliquando post pluuiā ueniunt, aliquādo post uentos pluuiā sequitur, dicimus, Quoniam caliditas in terra nō habet in illo tempore humorē quē accēdat, & propterea manet ociosa, ubi uero arripit pluuiā humiditātē, efflorescit: et per materię incensionē fuliginē excitans uentos efficit, qui iam sanē cōsumpta pluuiā nube, manēt in serenitate spirantes, aut impellunt id quod ipsos genuit. Pluuiā itaq; hoc modo uentos generat. Ventus autē pluuias hoc modo generat. Ostendimus quod cōmunis est caliditas utriusq; exhalationibus. Verū humiditas quātitate diuersa est. Quum igitur multa fuerit caliditas, larga uero humiditas, tūc appropinquatē humiditātē in superficie exurit, & fuliginē simul ac uapores facit. Transpirans autē caliditas ex multa humiditate paulatim imminuitur, & non amplius humiditātē exurit, sed diffundit, & uapores pro fuligine facit. Atq; sic succedit imber post. Et sepe ad multos dies obuiet pluuiā calido exoluta, & non amplius materiā exurere potente. Cur autem multū & assiduū boreales ac anniuersarij uenti in æstate fiunt? Quoniam sol sub boreali polo plurimā reperiens humiditātē, partim in niue, partim in aquis cōgelatis, & hāc paulatim eliquās, diuidit quidē in fluuiorū ac stagnorū generationē, effundit autē & fontes in terra. Et propterea multas exhalationes efficit, quas in flammā exurēs, unā cū caliditatibus multo tempore in terra occultatis, fuliginosas ipsas reddit, & quod exurit ad uēti diuturni fluxū paulatim redigit. In cōmuni igitur omnis uentus longiorē aëris frustionem exhibet corporibus, uiolēto motu aërem inducēs. Porro locales ueni similes sunt locis ex quibus spirāt, à salubribus locis, salubres, à morboris, morbosī. Quare ex relatis de aëre, etiā de his coniectare oportet. Quo uero in summa dicamus, omnes locales uēti uniuersalibus morbosiores sunt. Nā corpora inæqualiter afficiūt, neq; totum aërem cōmouentes, neq; per totū diem spirantes. Maximē enim locales uēti circa matutinū solū tempus spirāt, quos nautę Apogeos, uelut ē terra eleuatos appellāt. At ex uniuersalibus uentis hi qui à meridie spirant Austrī appellati, calidū temperamentū habētes semper, ferme etiā humidi sunt. Trāsmutantur autē ad tempora anni, & fiūt calidi ac sicci. Et propterea uarios morbos generant. Boreales uero frigido sunt temperamēto, & ideo omnium uentorum saluberrimi, & præsertim in calidioribus ac carnosīs corporibus. At uēti orientales uehementissimī sunt, & morbos à siccitate contingentes efficiunt. Occidentales autem humidi sunt ac lenes, et corporibus nostris magis familiares.

De accessione ac significatione stellarū. Cap. c l x i i i. Quandoquidem etiā stelle in cœlo orientes iuxta tempora à deo ipsis ordinata, & similiter occidētes, aërem mutant, ut contingat ex hoc etiam uentos aliā aliter spirare: necessarium duxi hic tempora indicare, in quibus earum quę palam aërem alterant, ortus & occasus fiunt. Nam sanorū corpora, & multo magis ægrotorum iuxta aëris statū alterātur. Mense Martio qui Dystrōs Græcis est, equus mane oritur decima nona die. Mense martio die x x i i i. æquinoctiū

uernū est, & maxima aëris turbatio. Mense aprilis hoc est Xanthico, prima die intempesta nocte pleiades apparēt. Mensis april. x i x. pleiades uesperī occultantur. Mensis april. x x i. pleiades cum solis ortu oriuntur, & est maxima circa aëre turbatio. Mensis aprilis x x v i i. orion uesperī occultatur. Mense Artemisio, hoc est Maio, prima die hyades simul cum solis ortu oriūtur. Mensis maij quarta, lyra uesperī oritur, & aër multū alteratur. Mensis maij sexta, capra mane oritur, & ualde alteratur aër. Mensis maij septima, pleiades mane apparēt, et aër sedari incipit. Mensis maij x i x. hyades mane apparēt, & aër ualde alteratur, pridie aut nudiustertius eius diei. Mensis maij x x i i i. capra uesperī occultatur, & nudiustertius eius diei aër mouetur. Mensis iunij secunda, aquila uesperī oritur. Eiusdem sexta arcturus occidit. Nona delphin uesperī oritur. Vigesima quinta oriō mane oriri incipit. Sunt autē solstitia æstiuā, & aër tribus diebus antea ualde alteratur. Mensis iulij tertia oriō totus oritur. Decimaquarta procyō, siue canicula mane oritur. Decima nona canis oritur, & contingit maxima aëris turbatio, aliquando etiā nudiustertius eius diei. Vigesima quinta aquila mane occidit. Mensis augusti decima quinta lyra mane occidit, decima nona delphin mane occidit. Et est mutatio æstatis ad frigiditātē. Vigesima octaua uindemiator mane oritur, & malus nauis occidit. Et est finis dierū post exortū canis. Mensis septembris septima capra uesperī oritur. Decima septima arcturus oritur, & alterat sequenti die aërem. Decima nona spica mane oritur. Alteratur aër duobus diebus antea. Vigesima quinta æquinoctiū fit autumnale, & est maxima aëris turbatio tribus antea diebus. Quare cauendum est ne uenam secemus, neq; purgemus, neq; aliis corpus uehementi motu moueamus, à decima quinta septēbris usq; ad uigesimalam quartā eiusdem mensis. Mensis octobris sexta corona mane oritur, & est uehementis aëris mutatio. Septima hœdi uesperī oriuntur. Decima septima hyades uespere oriūtur, & magna fit aëris turbatio. Vigesima tertia unā cū solis ortu pleiades occidunt. Et cōtingit pridie maxima aëris turbatio. Mensis nouēbris sexta pleiades mane occidunt, & incipit aër sedari. Undecima lyra mane oritur. Vigesima prima hyades mane occidunt, & sequenti die turbatio fit circa aërem. Vigesima septima orion oritur, & corona occidit. Mensis decembris prima, canis mane occidit. Obseruatū est autem à multis, quod si tempestuosa fuerit hæc dies, perseverat plerūq; turbatio aëris ad dies x x x v i i. Si uero serena fuerit, per tot dies serenitatem fore significat. Decima hœdi mane occidunt. Undecima capra mane occidit, & perturbatio aëris fit postridie. Vigesima tertia solstitium est hybernū. Mensis Ianuarij quarta delphin oritur. Quinta aquila uespere occidit, & fit turbatio uehementis post duos dies. Vigesima quinta illustris stella in leone occidit. Mensis februarij sexta fauonius spirat. Vigesima secunda malus nauis uesperī occidit, & est turbatio aëris magna. Vigesima quinta arcturus uesperī oritur. Vigesima sexta hirundines uolant & apparent.

De aquis, ex Ruso.

Cap. c l x v.

Aquarū potabiliū quinque sunt uniuersales differentię, pluuiā, fontana, puteana, fluuialis, stagnina. Ex his apparet aqua pluuiā leuissima et facillimē murabilis, & in alijs affectionibus potu optima, si statim excio-

piatur ac coletur. Verum febribus & his qui bilem supernè ac infernè reddunt, & regio morbo incòmoda est. Mutatur enim facile & in bilem trāsīt. Idonea uero est ocularis medicamentis, ad fluxus aut ulcera destinatis. At his quæ uisum acutiorem reddunt, inepta est. Itemq; ad metallicorum pharmacorum loturam. Adstringit enim amplius quàm fōtana. Quare neq; extergit, neq; concoquit, neq; madefacit, & excretionem impedit. Diuturnior autem acerbior fit, & difficilius transit, & ægrius secernitur, tardius item concoquitur ac digeritur. Generat autē destillationes, præsertim si frigida bibatur. Fōtanæ uero aquæ, quarum fontes ad septentrionem erumpunt ex petris stillantes solē auersum habent, incoctiles ac tardi trāsitus sunt, & tarde calefiunt, ac frigescunt. Quarū uero fontes ad orientes erūpunt, & per meatū quendā aut terram purā excolantur, calefiuntq; ac frigescunt cluissimè, hæc optimæ sunt, nisi ex cloacis quibusdā uitium ipsis accedat. At puteana frigida est, terrea, difficulter excernitur, ægre digeritur, & propterea æstus stomacho aut uentri cōmodior est quam fōtana. Fluuiiales autē aquæ & stagninæ omnes malæ sunt. Nisi aqua excepta, hæc enim omnibus uirtutibus exornata est. Nam & in potu succūda est, & moderato tēpore in aluo moratur, si uisq; extinguit, & si quis frigidā bibat, minimè molestat, & ad cōcoctionem ac digestionē utilis est. Vnde concinnū, & robustū, & bene coloratū corpus facit. At aliorū fluuiorum aqua ægre cōcoquitur, siccatur, & siticulosa est, & præsertim si uiduas aliquas regiones pertranseat. Meliores autē sunt fluuij, qui per fontes perpetuos fluunt, & alijs fluuijs non miscentur. Stagnina uero aqua, propter coenotam circūferentiā, limosa & grauis est, & propter stationem ac immobilitatem, uelut mortua & putrefacta. Quare nunquā alia præsentē aqua, exhibēda est hæc debilibus. Porro iuxta terrā quoq; ac regiones, plurimæ aquarū differentiæ sunt. Verū ut in summa dicā, quæ gustui congrua est, & cui inhabitatorū experientia testimonium præbet, optima censenda est. Nam quæ cito calefcit ac frigescit, & facile carnes ac alia omnia coquit, ea etiā cibos in uentre concoquit. Quancūq; uero aquæ adstrictionem, aut falsedinem, aut nitrositatem, aut crassitiem, aut aliud quid in gustu detegunt, malæ sunt. Ite quæ graue olent, & quæ concretionem superstantem habent, & subsidentiā forēdam ac solidam, & quæ instar lapillorum æreis uasis adherent, & quæ hircudines nutriunt, aut talia quædā praua animalia, & stantes, & palustres, & quæ sunt in metallis auri & argenti, aut aluminis, aut sulphuris, aut similibus. Et quibus radices insitæ sunt, incommodæ sunt. Ex quibus uicinas sunt calidæ aquæ siue spontanee erumpentes, omnes tales malæ sunt. Optimum igitur fuerit talem aquā præcoquere in fictilibus uasis, & frigefacere, & rursum calfactā bibere. Cæterum in peregrinationibus aut exercitijs, fossæ consequenter faciendæ sunt, ab altissimis locis ad decliues, & per has ducenda est aqua, ita ut in tota fossa terra dulcis ac pinguis miscetur, ex qua fictilia fiunt. Semper enim in fossis relinquitur aquæ malitia. In summa, omnis aqua tarde transit, ægre concoquitur, & flatuosa est, & præsertim frigida destillationē facit. Si uero ab acceptis in cibo olcribus quis aquam bibat, malus est periculum, ne homo tenuia capitis ulcuscula, & scabiē, &

lepras, pustulas, impetigines, furfures, putrida ulcera, herpes, satyriases, aut ex his aliqua incurrat, & ad hoc urinas mordaces talesq; etiam egestiones habeat, & præsertim si nitrosa fuerit aqua. Incòmoda est etiā thoraci, arteriæ ulceratæ, nitrosa aqua, renibus item ac uesicæ & omnibus ulceribus. Emendant autem nitrosam aquā, cibi heberantes ac uinum. Crassam uero, secantes & attenuantes, uelut sunt allia & similia. Aluminosam, uinum tenuissimum, omnia urinam cienda, & omnia excretionem impellentia. Videtur porro aqua cōuenire capitis doloribus, herbeti uisui, comitiali morbo, articulari morbo, tremulis, resolutis, per se, & cum melle pota. Commodior est autem his quæ ab utero strangulantur, & qui bilem generant nigram siue flauā, à quibus os uentris roditur & robusto uentri, ac intestino iceluno, & iuuenibus exudantibus carnosiss, & omnibus pingulibus, & nimium purgatis, & ex uulnere sanguinem fundentibus, aut ex naribus, aut alio loco. Commodat & æstuosæ febrī tempestiuè data. Cōuenit etiam his qui assidue in somnis semen effundunt, & qui alia seminis profluuiolo laborāt, in potu acceptat quāquam proficit etiā in ipsa natate, ex eaq; perfundi conuenit mulieribus à fluxu, aut pica laborantibus. Cōuenit singultientibus, & oris graueolentiam habentibus frigida pota. Tepida uero cōuenit morbo comitiali, capitis doloribus, lippientibus, gingiuis dentium corrosis, dentibus perforatis, gingiuarum abscessui, & gingiuis cruentis, faucibus ulceratis, consillarum morbis, fluxioni capitis, atræ bilis feruori, bili superne ac infernè erumpenti in principio, & uomentibus in febrī biliosa. Conuenit etiā tepida aqua quā frigidæ impedimentū fuerit, & his qui ulcera habent circa septum transversum, & sanguinem spuētib, & rupturis in succingēte costas membrana. At uero calida aqua conuenit, ubi oportet excretionem præparare, & ubi quid attenuare, & ubi diffundere, aut liquefacere, aut mollire, aut eluere, aut concoquere, aut discutere uolumus. In uniuersum igitur calida pota hæc potest. Particulatim uero, mucum ducit, & secretum adiuvat, & dolorem omnē mitigat, & præsertim in præcordijs ac intestinis, ructum mouet, & flatum prouocat, urinam ac secessum ducit. Bona est etiā ad cōcoctionem, ac digestionem, & nutritionem, atq; augmentū. Menses ducit, neruis & cōuulsionibus idonea est. Pleuritidi itē ac peripneumoniæ & anginæ. An uero nutriet, aut non nutriet, & an sit alimenti uehiculum, non est propositum hic quæresse. Quod uero dicere necessarium est, hoc est, quod sine aqua alimentum concoqui non potest; Sicut neque citra aquam quicquam commodè roqui potest.

Cæterum aqua lixiuij pota splenicis prodest. Et si quis panem cum tali aqua præparatum ipsis præbeat, multum prodest.

De Babieis. Ex Galeno.

Cap. CLXVI.

Balnea quædam sunt dulcia, quædam qualitatis exortia, quædam qualitatem aliquam habent. Et quæ aliam quandam qualitatem habent, partim ex nostro studio uim habent, partim naturalem uim per se possident. Primum igitur de dulcibus dicendū est, quādoquidem horum usus frequētor existit. Dulcium itaq; aquarum uis humida et calda est, si quidem fuerint tēperatæ. Si uero tepidæ fuerint, humida & frigida. Si uero calidiores æquo factæ fuerint, calida

quidem ipsarum vis est, non autem similiter humida. Inhorrescere enim cogunt corpora, & meatus ipsorum densari, ut neque extrinseca humiditate fruantur, neque ex internis superfluitatibus quid euacuetur. At enim à temperatis incipiendum est. Temperatę itaque semper humectant per se ipsas ac calefaciunt. Contingit autem ipsas aliquando aut discutere humiditates ex corporis quibusdam partibus, aut mollire, aut concoquere, aut corroborare uirtutem, aut dissolvere. Ad hæc tamen etiam quantitas ipsarum non parum confert. Commoda uero sunt talia balnea, dulcia inquam & temperata, in febribus siccis & humoris exortibus, & præsertim in immodicè sitientibus, & in foris insolatione, & in pustulis scabiosis. Oportet autem & aërem balnei humidum efficere paupimento & parietibus atque conspersis. At uero calida ex nostra industria parantur balnea, quum frigiditatem infestatem sedare uolumus, aut lassitudinis affectum, aut conuulsionem, aut dolorem mitigare. Fiunt autem calida, calfactorijs quibusdam aque immixtis, uelut pulegio, origano, hyssopo, thymo, thymbra, salvia, folijs lauri, pyrethro, chamæpity, panacis radice, rosamarinis semine, & similibus. Balneis autem discussorijs utimur, aut habitum corporis graciliorem reddere uolentes, uelut in pinguibus, & ex affectione tumefactis, aut toto corpore, aut aliqua parte, uelut ab domine, testibus, pedibus, uelut in hydropicis contingit. Utimur etiam in fluidis ulceribus, propter subiectam in toto corpore multitudinem, aut uaricibus ulceri subiectis. Fiunt autem discussoria balnea, infectis aque talibus quibusdam, qualia sunt, sal, nitrum, aqua marina calefacta, & mel aquæ ammixtum, aut staphis syluestris cocta cum aqua ex cinere ficulneo aut uitis percolata. Item bacce iuniperi cum eadem aqua coctæ, & sulphur eadem aqua elutum, adarce & alumen cum eadem coctum. At uero mollibus, & lenibus balneis utimur, in inflammatione ac duritie quadam partium. Talia autem sunt malua in aqua cocta, tum hortensis, tum syluestri, & semine lini, & foenisgræci, & meliloti. In fluidis autem inflammationibus, plantago aut polygonum aquæ incoquitur, aut malicorium, aut rubi folia. In conuulsionibus autem inflammationem minantibus, utimur his quæ iam relata sunt in inflammationibus absque fluxionibus. Maxime uero prodest his aqua & oleum, in quibus malua, foenumgræcum ac semen lini sunt incocta. Si uero duritia est citra inflammationem, prædictis discussorijs utemur.

De balneis naturalibus. Archigenis. Cap. CLXVII. Ex balneis naturalibus quedam sunt nitrosa, quedam salia, quedam aluminosa, aliqua bituminosa, aliqua sulphurulenta, aliqua ferri, aliqua aeris qualitatem habent. Quedam uero ex his composita sunt. Horum autem omnium vis est siccare. Aliqua uero una cum hoc quod siccant, etiam strenue calefaciunt. Quedam una cum siccando etiam adstringunt, uelut aluminosa, ex parte uero etiam salia, & quæ aeris qualitatem habent. Omnia autem sunt commoda humidis & frigidis præter naturam corporibus, & talibus morbis diuturnis. Quapropter conueniunt morbo articulari, podagræ, resolutionibus, nephritidi, anhelosis, fracturis calli inductione egentibus, ulceribus fluidis, inflammationibus diuturnis & iam induratis. Et nitrosa quidem ac salia capidi conueniunt,

& thoraci fluxionibus uexato, & stomacho humido, & hydropicis, & tumoribus omnibus. Aluminosa uero, sanguinis refectioni, stomacho uomentis, & his qui immodice ab hæmorrhoidibus euacuantur, & foeminis quæ inordinate purgantur, aut nimium purgantur, & quæ citra manifestam causam frequenter abortiunt. Prosumt & his qui immodicè exudant, & tarde concoquunt, & tumoribus surarum. Commodant etiam uaricibus. At sulphurulenta & neruos molliunt, & tenasmi dolores mitigant. Verum stomachum exoluunt ac subuertunt. Purgant autem cutem, & propterea conferunt uirilagini albe ac nigre, lepræ, scabiei, impetigini, & ulceribus antiquis, articularum fluxionibus, spleni indurato, hepaticis ac utero, resolutis, coxædicum morbo, & pruritui. Bituminosa uero caput replent, & sensum instrumenta lædunt. Perseueranter autem calefaciunt, & cum tempore molliunt, & præsertim partes circa uterum & uesicæ ac colum. Quæ uero aeris qualitatem habent, ori & tonsillis, & uis, atque oculis excellenter commodant. Ferri uero qualitate prædita stomacho & spleni conuenientissima sunt. Porro quæ mixtam qualitatem habent, iuxta dominium mixtorum operantur. Oportet autem ingressus ad naturalia calida balnea citra turbationem facere, quo uis ipsorum remisso corpori allabens immergatur. Nam qui perturbationi ingrediuntur, eorum corpus horrescens densatur, & non suscipit ab aqua qualitatem. Cæterum bituminosis & sulphurulentis aquis salientibus, caput supponere non oportet, facile enim inde læditur.

De frigida lotione. Ex Galeno. Cap. CLXVIII. Frigida balnea conueniunt inculpatè sanis. Corroborant enim totum corpus, & cutem duram ac densam efficiunt. Optimum est autem hoc præsidium contra læsionem ab externis. Non autem dico conferre frigida lotionem his qui uulgari uictu temere utuntur, sed solum his qui exactè uiuunt, & laboribus ac cibis conuenientibus utuntur. Sint autem neque ex uenere, neque aliàs lassati, neque crudi, neque prius uomuisse debent, neque uentre malè affecti esse, neque uigilasse. Alioqui periculosus fuerit eius usus. Oportet autem insuetos ad frigida lotionem paulatim adsuafacere. Et primum quidem in æstate ipsius usum auspicari, & primum non in sinceram frigidam ingredi, sed quæ superficiem habet exolutam. Deinde ubi paulatim per totam hyemem adsuauit quis, ita ad frigidam accedere. Sit autem dies in qua auspiciatur, à uentis tranquilla, & quam maxime pro illo tempore calida, & in meridie initium faciat. Qui uero frigida usus est, sit græte circa quintum & uicesimum annum, sit animi alacris & ualde uirilis. Et primum fricet corpus linteis diutius frictione durioris. Deinde per oleum fricetur consuetum, postea exerceatur, atque ita in frigidam descendat, non lenitè, sed confertim insiliens, quo in uno tempore omnibus corporis partibus aqua circumfundatur. Nam quæ paulatim appropinquat, horrorem inducit. Sit autem aqua uelut dictum est, neque tepida, neque pure frigida. Postquam autem egressus fuerit ex aqua, à pluribus per oleum fricetur, donec cutis incallescat. Et postea cibos plures quam solet ingerat. Nam plures appetunt à frigida lotionem, & melius concoquunt, & minus siccant. Quare etiam paucior potus ipsis dandus est.

De infessu

De infessu in folium ex oleo. Galeni. Cap. CLXIX.
 Infessus in folium ex oleo, conueniunt diuturnis cum frigore febribus, & lassatis, & dolentibus nervos ossibus incumbentes, & conuulsis, & urinæ suppressæ. Oportet autem quintam olei partem ad ignem calfacere; Reliquum uero in folium immittere. Satis autem calidum fit, quod in parua folia balneorum immittitur. Quinta uero pars ad reliquum calfacta adijciatur, atque sic æger inducatur.

De spongiæ usu. Archigenis. Cap. CLXX.
 Spongiæ usum assumimus in alijs quidem partibus, aut ad sordes incumbentes detergendas, aut ad sanie, aut sanguinem, aut pus, aut ipsa medicamenta, aut ut corpora à mordacitate aut pruritu uexata mitigemus. Verum in facie, ut spiritum renouemus ac resuscitemus, uelut in his qui animo linquuntur aquam adhibemus æstate quidem frigidam, hyeme uero lactosam siue lactei teporis. In ægrotis autem caute hoc faciendum est, non in principio, neque in augmento exacerbationis, sed in uigore ac declinatione. In principijs enim impetuum refocillamus per odoramenta. Vult autem Archigenes in febris ardentis excessu iuxta ipsum uigorem, ut non solum faciei spongiam adhibeamus, sed etiam pectori.

De asperisionibus. Cap. CLXXI.
 Sed & asperisiones faciei assumimus in ægrotis, ob prædictas causas. Et æstate quidem in ardentissimis febribus frigidam adhibemus, hyeme uero calidiorem. Verum in simplicioribus febribus, & in stomachi subuersione, etiam poscam aspergimus. Cauendum autem ne diutius immoremur, & præsertim in his qui caput quod facile leditur habent. Nam delationis in soporem grauiorem ac periculosam frigiditatis initium præbet. Utimur etiam asperisionibus in oculis fluxione infestatis, ocymi decoctum uelut efficacissimum adhibentes, & ramulorum pinastrorum contusorum decoctum. Subijciatur autem mento spongia sicca, ut ne defluat aqua ad pectus.

De irrigationibus. Cap. CLXXII.
 Irrigationibus utimur ubi ob aliquam circūstantiam balneum adhibere prohibemur. Et in uigilijs, in febribus, & ad delirantes ipsis utimur, uelut est decoctum chamæmeli, aliquando etiam calicum papaueris. Quin & decoctis in oleo calicibus papaueris, caput irrigamus, & statim iucundus somnus sequitur. Archigenes autem præceptorem suum Agathinum ex uigilijs delirantem, cōfestim à delirio ac uigilijs liberauit, capite eius multo calido oleo irrigato. At in conuulsionibus caninis oleo sicyonio calido, aut aliquo consimili caput perfundendum est. Item in his quibus nervi fortiter sunt afflicti. Si uero frigiditas & tremor ad afflictionem nervorum consequatur, etiam castorium ad sicyonium ammiscendum est. Podagricos uero marrubio in aqua aut uino cocto irrigamus.

De infusionibus. Cap. CLXXIII.
 Infusiones assumimus in partibus inflammatis, aut ob balnei penuriam, aut propter uirium debilitatem, aut ob aliud quoddam impedimentum. In inflammatis igitur renibus, utimur decocto scenigræci, maluæ hortensis ac syluestris, seminis lini. In calculosis uero, ipsidem propter inflammationem, & artemisiæ decocto, ac rosmarini, & petroselinæ, ac spicæ nardi. Ipsidem etiam utendum est in uesica, adiecta etiam ruta,

Ad uterum uero, artemisiæ decocto, saluæq; ac lauri, & similibus. Ad colum autem, sinonis & panacis decocto, & lauri ac similibus. Ad sedem, meliloti, calicum papaueris & rosarum decocto. Ad fluxiones autem uteri & hemorrhoidas ani, plantaginis decoctum conuenit, & polygoni, malicorni, rosarum, ruborum, ac similibus. Ad uulnera uero cōuulsionem denuntianda, aqua & oleum. Omnes igitur illinendi sunt, & inducendi usque ad imum umbilicum. Oportet autem & partes quæ non madefiunt, prius inungere, & præsertim caput, & tegere ut ne repleatur.

De humectationibus. Cap. CLXXIII.
 Humectatio differt ab irrigatione, eo quod perseverantem ex adhibito auxilio habet utilitatem. Nam aut lanam aut linteum humectantes imponimus partibus affectis post perfusionem siue humectationem. Habent igitur minorem uim quam cataplasmata. Utimur autem ipsis ad caput, quod non probe ad cataplasmata dispositum est, & ad eos qui ob debilitatem ferre non possunt cataplasmatum grauitatem, & ad præcordia inflammata, circa morborum principia, quum intempestiuus sit tunc cataplasmatum usus. Utimur etiam ad fracturas ac contusiones necessitate experiente, quando emplastica pharmaca assumere non possumus.

De fomentis, perfusione, cataplasmatibus, ac cucurbitis. Ex Galeno. Cap. CLXXV.
 Fomenta cutem rarefacere solent, & facile transpirabilem efficere, & sanguinem in inflammationibus attenuare ac discutere, toto nimirum corpore tunc superfluitatibus carente. Nam superfluitas quæ redundat in quibusdam per omnem cutem, plus ad calefientem partem trahetur quam discutietur. Quapropter ante fomenta totum corpus euacuare oportet. Humida itaque fomenta inflammationibus conueniunt à biliosioribus humoribus factis. Sicca uero his quæ à tenui & aquoso sanguine productæ sunt. Et leuia quidem fomēta mordacibus humoribus conueniunt: Mordacia uero & attenuantia, crassis ac uiscosis. At uero calfacere præcordia cataplasmatibus aut irrigationibus, non semper tutum est. Sed in illis solum ægrotis, in quibus nulla superfluitas in toto corpore oberrat. Alijs omnibus extremum malum est. Cōtingit autem in plenitudinis morbis, ut diuites magis quam pauperes male curētur. Plerique enim ipsorum præ delictis non sustinent uenæ sectionem, & quidē quum magis quam pauperes plenitudinis affectionibus corripiantur, ut qui etiam magis impleantur, & ociosius usuant. At qui curant ipsos medici, eo quod relictum est maximum auxiliū, arbitrantur se aliorum usu expleturos esse quantum deest. Et sanē ipsi etiam ægri putantes quietum uictum, negligentiam esse, & quodcunque tadem facere, curationem esse, cōgunt medicos quotidie aliquid præcordijs adhibere, consentientibus sanē etiam medicis in hoc ipsum, ut semper aliquid facere uideantur. Hinc enim sperant se plus lucri facturos esse. Atque sic ipsi efficiunt inflammationes per ea quæ faciūt, semper aliquid præcordijs adhibentes. Proinde contingit in illo tempore inflammationes incipere in diuitibus, in quo iam in pauperibus morbus est prope solutionem. Vena enim secta in principio præsertim continens febris, & pauperes, & serui diuitum plerique in quinta die iudicati sunt, aliqui uero in septima. At uero diuites, plenitu

pleni tudinem & superfluitates plures quam ferul & pauperes habentes; & uenæ sectionis auxiliū transferebat, & postea quotidie per calidū oleū fortī, & laxatoris cataplasmatibus intesti, inflammationem quandam conflata habent, aut circa hepar, aut uentrē, aut alia uiscera, aliqui in quarta die, aliqui in quinta, aut omnino in sexta. Vidisti autem etiam tu qui eodem tempore dum fomentum adhiberetur difficulter spirauit, omni superfluitate ad præcordia attracta à caliditate. Hic itaq; mortuus est, & alij innumerī quotidie moriuntur, quū cataplasmata instar cucurbitæ attrahant ad uiscera superfluitates ex toto corpore. Quidam uero etiā ipsa cucurbita usi sunt in præcordiis, hoc unum etiam illi cogitantes, ut uiderentur aliquid semper facere circa ægrotum. In principijs igitur dum adhuc feruntur fluxiones ad affectum locum, melius est repellere ac reprimere, non attrahere ad ipsum. Commoda autem sunt in principijs adstringentia cum oleo adhibita: quæ simul & firmitatem addunt partibus affectis, ut ne facile affluentes superfluitates suscipiant, & simul iam in ipsis contentarū temeritate intus reprimunt. Postquam uero latio quiescit per repulsoria auxilia, & densitas ex adstrictione inducta partibus affectis, continet superfluitates, tunc iam tempus est laxare, quo contentæ superfluitates euacuentur: præsertim uero ubi ad hepar aut uentrē impetū fecerint superfluitates, moderate adstringentibus uel conuenit in principio. Valde enim principales sunt hæ partes. Imò ubi etiam tempus iam fuerit discutiendi firmatas, tunc quoque partes hæ adstrictione opus habent. Quare decocto in oleo absinthio irrigabimus. In quibus autem fortiore adstrictione opus est, omphacinum sit oleum, in quo decoquitur absinthium. In penuria uero absinthij, menthani aut mastichinum aut lentiscinum ad hoc sufficere. Si uero minor fuerit febris, etiam nardinū unguentum addatur. Si uero declinatio febris nō ualde mitis fuerit, à nardo cauere oportet, uel uero meli no. Quo non præsentē, rosaceum ad nardinum miscendum est. Similiter etiam cataplasmata compositam uim habeant, ex laxatoria ac tenui, & ex amara ac adstringente. Quod si colum fuerit affectum, aut alia intestina tenuia, aut musculi præcordiorum, aut pellicula alui & intestina amplectens, nequaquam miscenda sunt adstringentia. quemadmodum nec si uelica aut uterus, quum uelut dictum est, nec influxerit quid amplius, neque superfluitas fuerit in toto corpore. At uero renes & thorax in medio relaxatorum sunt: Neque enim multa adstrictione in his opus est, neque tamen extoluerē conducta. Splene uero inflammato, in principijs adstringentia miscenda sunt. Euacuato uero corpore, etiam discutienda. Quin & si cucurbitis opus fuerit, præuacuato toto corpore utemur ipsis, non in principio affectionum.

De cataplasmate ex fermento. Ex Ly.

co.

Cap. c lxxvi.

Hoc cataplasma diffundere ac eliquare compacta facile potest, & aculeos infixos extrahere, & tumores induratos mollire. Oportet autem fermentum dissolvere in oleo sufficienti, atq; sic imponere. Quod si uehementius efficere uolueris, nitrum modicum admisce. Si uero etiam aceto dissolueris fermentum, & rursus coctum per cocturam spissaueris, conuenientissimum erit ad induratos tumores in splene ac he-

pate. Si uero thymum & pulegium, aut absinthium, aut abrotonum fermento miscueris, optimum efficies pharmacum.

De cataplasmate ex pane. Cap. c lxxvii.

Cataplasma ex pane efficacissimum est ad omnes inflammationes. Multis autem modis paratur. Nam & frigida aqua madefactis, & tritis, & adiecto modico rosaceo, & coriandri succo, commodum fit cataplasma inflammationibus ignis sacri. Aut pro aqua, ex aceto paratur, atq; sic magis conducit igni sacro. Verum si pro oleo, butyrum addatur, commodum fit cataplasma ad inflammationes ægre concoctiles. Paratur etiam sic. Panis multa aqua dissoluitur, ut succi spissitudinem habeat, & huic miscetur oleum aut butyrum. Deinde coquitur ad compagem. Hoc præstantissimum omnium est ad uulnere inflammationes, & ut citius suppuretur. Hoc utimur ubi neruus aut neruosum quid intus contusum fuerit. Ego uero etiam picis liquidæ parum ammisceo, & utile cataplasma expertus sum. Hoc et podagricis inflammationibus idoneum est. Alia præparatio panis cum melle. Pridiani panis medullam manibus conterimus, & ubi uelut similago dispersa fuerit, in olla calefacimus, & sic tritum panem inspergimus, ac coquimus ad moderatā compagem, deinde oleum moderatum adijcimus, & unctā imponimus. Hoc cataplasma commodum est inflammationibus præcordiorum. Præstat autem parum aquæ mellis ammiscere. Sic enim in coctura diffunditur. Farinæ quoq; triticæ cataplasma eadem ferme facere potest, & eodem modo præparatur.

De cataplasmate ex fufuribus. Cap. c lxxviii.

Furfures in mortario tridimus ac cribramus ut tenuissimi fiant, & utimur ipsis ad tumorem induratum in omni corporis loco consistentem, & præsertim in hepate aut splene. Oportet autem ipsos præparare cum aceto mulso. Aut ammoniacū thymiana cum aceto mulso terimus, & furfures ammiscemus, & cataplasma imponimus, atque adhibemus lentū ulata uasa uaporatoria aqua calida plena, ut ne frigeat cataplasma. Aliquando uero ad testes inflammatos utilissimum est hoc cataplasma. Verum ad hos sine aceto paratur, cum aqua mulsa uidelicet. Commodum est hoc cataplasma etiam furunculis, & alijs duris tumoribus ac tuberculis. Verum ad uenentū iaculantes bestias, furfures aceto imbuti commodius cataplasma efficiunt.

De cataplasmate ex ficibus. Cap. c lxxix.

Ficus pingues exactissime conuaduntur, ut nihil inalteratum in ipsis appareat. Deinde ungenti trini parum additur, & cataplasma imponitur. Facit autem ad duritias neruorum, & ad articulos contractos, aut plus iusto laxatos: & ad duros tumores, præsertim hepatis ac splenis. Vbi uero ad relatum cataplasma nitri parum additum fuerit, rumpit abscessus & aculeos extrahit. Si uero ad ficus ita paratas ammiscueris pulegium, aut origanum, aut thymū, aut absinthij comam tenuissimè cribratam, hydropicis confert. Sed & si coquantur ficus probe, & deinde cum decocto terantur, & ordeacea aut triticea farina ammiscatur, & rursus coctura fiat ad compagem, eodem modū fit cataplasma abscessibus qui non facile maturi fiunt. Si uero uoles pinguiudinem adijcere, aut butyrum ammiscere, aut rutæ folia trita, dolores intestino

Intestinorum à flatu factos sedabis. Miscetur autem similiter & cuminum & oleum.

De dropace ac picatione, Archigenis, Cap. CLXXX.
Dropax à quibusdam etiam picatio appellatur, diuturnis autem maxime morbis conuenit. Omnino autem & ante sinapismum assumitur, ut corpus ad sinapi præparetur, & post sinapismum, ut reliquæ affectionis excindatur. Simplicissimus itaque dropax est qui picatio uocatur. Pix arida cum ualde modico oleo liquatur. deinde calida adhuc cuti illinitur, & præralis locis agglutinatur, & priusquam perfecte frigescat auellitur. Et rursus calefacto emplasmate ad ignem agglutinatur, & similiter priusquam frigescat auellitur: atque hoc sæpe repetitur. Utillissimus est assidue uomentibus & crudis ac non concoquentibus, & coeliacis affectionibus, & reliquis partibus alimentum non sentientibus. At uero ad hunc communem dropacem, calfaciendi gratia adiungitur piper, pyrethrum, semen rosmarini, bitumē. Si uero siccare opus fuerit, sulphur uiuum, sal, cinis sarmentorum, Sin facinare, limnecitis, quæ & adarce uocatur, adiungitur, aut euphorbium. Singula autem hæc trita liquefactis insperguntur. Est autem dropax qui à multis in usum assumitur & Gallas appellatur, hinc Colophoniz thus redolentis, & resinæ sordidæ lignosæ quæ in dolis affertur, resina nauibus derafæ, quam Græci aliqui apochyma uocant, picis siccæ, singulorum lib. i. s. picis liquidæ brutæ lib. ii. ceræ lib. iiii. nistri lib. i. bituminis, galbani, adarces, piperis, singulorum tridentem, sulphuris uiui quadrantem, castorei, ammoniaci thymiamatis, staphidis syluestris singulorum sextantem, olei sicyonis lib. i. opobalsami sexuncem. Alius dropax optimus & probatus. Picis, ceræ, colophoniz, singulorum lib. i. nistri sexuncem, bituminis quadrantem, sulphuris uiui sciquidam, piperis, euphorbi, adarces, singulorum unciam i. Cantharidum drach. iiii. olei cyprii tridentem. Vtere. Oportet autem, uelut prædictum est, dropacem calidum illinere, crassitudinem habentem pro ratione uirtutis aegri, præralis pilis in locis quibus adhibetur. Eos uere qui robusti dropace utuntur, etiam lauare conuenit incumbente dropace, & si fieri potest, etiam exerceri. At dropax conseruatum auulsus, remissum spiritum firmare potest, & ad superficiem reuocare, & propriorum operum commonescere.

De sinapismo, Archigenis. Cap. CLXXXI.
Cataplasma ex sinapi sinapismum uocare omnes solent. Est autem efficacissimum auxilium. Verum in acutis morbis non ualde probatur, paucis exceptis. Nam in solis seignioribus ac pigrioribus, & in acutis affectionibus immersis, sinapi utimur. At in diuturnis ferme omnibus, postquam reliqua auxilia nihil profuerunt, sinapismus efficacissimus reperitur. Quandoquidem igitur in omnibus fere diuturnis conuenit, præstat ut dicamus in quibus non utendum est ipso. Itaque in ulceratione pulmonis sinapismus non assumitur, neque in alia in profundo exulceratione. Effertur enim ulcera & exacerbantur, ob acrimoniam. Sed neque in exulcerata cutis superficie, neque in cartilaginosis parubus, uelut sunt aures aut natus summus. Exuruntur enim ab ipso, et nigrescunt partes quæ ualde sunt excarnes. At reliquæ partes corporis itæque affectiones, hoc auxilio gaudent, præ-

cipue uero caput, in diuturnis capitis totius itemque alterius partis doloribus, & in uertiginibus, comitialique morbo ac infania. Sed & thoraci commodus est in erectæ ceruicis inspiratione, anhelationibus, rursus diuturna. In destillatione uero caput una cum thorace sinapismo integendum est. Stomachus autem & intestina in omnibus diuturnis affectionibus, & maxime prostrato appetitu, & in renum affectionibus ac lumborum, & in spinæ colicis ac uellicæ resolutionibus. Quin & omnes resolutæ ac frigefactæ partes hoc auxilio gaudent. Commodum est & arthriticis & ischiadicis ac podagricis. Inditur & in intestinum rectum glans ex sinapi, ubi illud fuerit resolutum, & post morsum ablata glande, infunditur aqua mulla. Modus autem præparandi hic est.

Sinapismi præparatio.
Caricæ pingues in aqua tepida pridie macerare oportet, frequentius autem die fortiter expressas probe conterere, deinde acris sinapi acceptum per se terere, & inter terendum paulatim de caricarum cremore asfunderere, quo facilius teri possit, non tamen aquosum fiat. Deinde utrunque per se in massas redige, & inter se misce prout usus postulat. Si quidem fortiter sinapissare uoles, duas sinapi partes ad unam caricarum, Si uero mediocriter utriusque parem portionem. Sinapius, tertiam partem sinapis, & duas caricarum. Ceterum in corporibus molli sensu præditis, & in quibus circa superficiem est affectio, panem pro caricis ad sinapi ammiscere oportet. Sed & hoc noscendum est: Si in aceto maceretur sinapi inefficacius redditur. Acetum enim sinapis uim discutit. At ubi tenuer factum est cataplasma, in omnibus prædictis infarciatur in lintheum, & locus adhibeatur. Temporis porro longitudinem in omnibus decernere impossibile est. Quare frequenter leuandum est cataplasma, & caro consideranda an exacte rubefacta est. Et hoc maxime facere oportet in partibus hebetiore sensu præditis. In quibus uero celeriter operari ipsum uolumus, locus spongiis ex calida expressis fouendus est incumbente adhuc cataplasmate, hoc est, super lintheum spongiæ adhibendæ sunt. Post sufficientem usum, in balneum ducendus est æger, & in calidum solium ponendus, & pars iterum perfundenda citra inunctionem. Post balneum uero rosaceo illinimus locum. At in uehementi dolore aut etiam ulceratione, hapso lanæ aqua & rosaceo imbuto integendum est, & imponenda est malua cocta trita cum pane. Post sedatum dolorem utendum est cerato rosaceo cum cerusa. In quibus uero balneum adhiberi non potest, in his per reliquum corpus spogiæ ex calida aqua expressarum somentum utendum est. Verum in capitis & præsertim frigidis affectionibus, olei calidi perfusione locus mitigandus est.

Quod caprarum fimi pilule cum aceto impositæ priuatim coxendicum morbo conueniunt.

Cap. CLXXXII.
Caprarum fimi pilulæ in aceto tritæ, sinapismi usum exhibent. Priuatim uero ischiadicis, hoc est coxendicum affectione laborantibus conuenit hoc cataplasma, ut quod longe efficacius sinapismo in ipsis compertum est.

Quæ sint alia rubificantia. Cap. CLXXXIII.
Rubificat nasturtii semen, & calefacit uelut sinapi. Similiter helenii radix, & syluestrium columbarum fimus,

simus, quo ualde frequenter utor. Sed & cum nasturtij semine contuso ac cribrato, pro sinapi illo utor, in ischiade, hemicrania, uertigine, capitis dolore antiquo, in doloribus diuturnis laterum, humerorum, tendinum, lumborum. Et ad hæc in nephriticis ac colicis affectionibus, & arthriticis ac podagricis, quum nondum pori ac duricies callosæ fuerint coactæ. Quin & scilla contusa in mortario, consimilem sinapi uim habet in cataplasmate imposita. Verum ad modicum tempus imponatur, nam diutius immorans locum exulcerat. Utendū est ipsa priuatim ad erecta ceruice spirantes thoraci imposita. Item in resolutione, quando non solum motus, sed & sensus tactus defecit. Post hæc autem mitigandæ sunt partes, uelut in sinapismo prædictum est. Priuatim uero scillæ morsus mitigat perfusio olei, præsertim rosacei.

De Iberide siue Cardamine, quæ & Lepidium

uocatur.

Cap. CLXXXIII.

Ex his uero quæ ualde utiliter rubificant, est & iberis, quæ etiā cardamine uocatur. de qua Galenus in tractatione de ischiade plurima scripsit. Sed & Archigenes ipsa usus est in splenicis ac coxendicibus. Verum in epistola ad Aristonem Archigenes sic scribit de ipsa: Vellem autem te uti etiā radice eius herbæ quæ nunc hic Iberis appellatur. Habet autem folia uelut nasturtium, uere floridiora, caulem longitudine cu-

bitali ampliore aut minorem. Et nascitur quidem in incultis locis: Aestate uero lacteū florē producit, tuncq; efficacissima est. Radices nasturtiū odore refecerunt. Radices igitur accipe prædicto tempore, ipsasq; diligenter tunde, ægre enim conteri possunt: & adimplis suillis inueterati tantum adijce quo emplastri formæ cataplasma fiat, quod non minus horis quatuor impositum habe: Deinde in calidum balneum citra inunctionem ingressus, post modicā corporis exudationem, in solio mordaciore morare. Egressus autem uino & oleo multo perfusus ac deterfus, coxendicem lanis puris intege. Atque hic quidem est sinapismi modus. Verum utilitates spe maiores habet, eò quod medicatiorem uim possidet, & cum minore mordacitate curret.

De euocantibus ex alto auxilijs. Galeni. Cap. CLXXXV.

In omnibus diuturnis affectionibus, quum nihil profecerint ulla auxilia, euocantem ex alto curationem, metasyncriticam à Methodicis appellatam, hoc est, quæ meatuum miscellæ corporis statum præter naturam habentem transmutat, facere plerique solent. Ego uero ubi intemperies quædam humida & frigida in affectis partibus est, aut obtusus aut stupidus sensus, adhibeo ipsis pharmaca ex sinapi, aut thapsia, & similibus confecta. At siccis & calidis affectionibus ea non adhibeo.

AETII TETRABIBLI PRIMÆ, SERMONIS
TERTII, FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

QVARTO SERMONE AETII
CONTINENTVR.

*

DE sanitate tuenda.	Cap. I.	pititis ulcuscula.	cap. XXII.	pertingente.	cap. XXXVIII.
Quomodo infans recens natus sanus cognoscitur.	cap. II.	Ad ulcus Melicerida à mellei humoris similitudine dictum, quod & dulce appellatur, & Syriacè Sanalia.		De lassitudine ob siccitatem ac gracilitatem.	cap. XXXIX.
De infantis educatione.	cap. III.	cap.	XXIII.	De lassatis ex uenere.	cap. XL.
De nutricis electione.	cap. IIII.	Ad sedem infantium procidentem.		De lassitudinibus spontaneis.	cap. XLI.
Probatio lactis.	cap. V.	cap.	XXIII.	De lassitudine ulcerosa spontanea.	cap. XLII.
Victus nutricis.	cap. VI.	Ad femorū intertrigines.	cap. XXV.	De lassitudine tensiua spontanea.	cap. XLIII.
Ad stertentes infantes.	cap. VII.	Ad procidentes puerorum umbilicos.	cap. XXVI.	De lassitudine inflammatiua spontanea.	cap. XLIII.
Ad uocem infantium interceptam.	cap. VIII.	Ad hispidos pueros.	cap. XXVII.	Quali curatione ad frigiditates utendum est.	cap. XLV.
De dentitione.	cap. IX.	Quando ablactandi sunt infantes.	cap. XXVIII.	Cutis densatæ curatio.	cap. XLVI.
Ad inflammationes oculorū.	cap. X.	Victus ratio post ablactationem puerorum, & aliarū ætatū.	cap. XXX.	Quomodo curandus sit æstuosus ardor.	cap. XLVII.
Ad albugines puerorum.	cap. XI.	Victus senum ratio.	cap. XXX.	De matutina frictione.	cap. XLVIII.
Ad inflammationes ac humiditates aurium.	cap. XII.	Victus ratio eorum qui in ocio degunt.	cap. XXXI.	De uespertina frictione.	cap. XLIX.
De inflammatione Siriasi Græcis appellata.	cap. XIII.	De carniū subuersione.	cap. XXXII.	De cruditate.	cap. L.
Ut exudet puer in febre.	cap. XIII.	Quomodo graciles renutrire oportet.	cap. XXXIII.	De crapula.	cap. LI.
De aphiba ulcere oris ardēte.	cap. XV.	Quomodo quis partes attenuatas sanarit.	cap. XXXIII.	De equalibus intemperaturis.	cap. LII.
Ad deuoratas spinas aut festucas eximendas.	cap. XVI.	De lassitudinibus à gymnasijs, aut ex itinere abortis.	cap. XXXV.	Optimi temperamenti dinotio.	cap. LIII.
Ad assiduas sternutationes infantium, & ad grauedines.	cap. XVII.	De lassitudine ulcerosa.	cap. XXXVI.	Temperamenti calidi notæ.	cap. LIII.
Ad tusses puerorum.	cap. XVIII.	De lassitudine tensiua.	cap. XXXVII.	Temperamenti frigidi notæ.	cap. LV.
Ad alui infantium profluuiū.	cap. XIX.	De lassitudine inflammatiua, & ad ossa		Siccioris temperamenti notæ.	cap. LVI.
Ad aluum suppressam.	cap. XX.			Humidioris temperamenti signa.	cap. LVII.
De pustulis puerorum.	cap. XXI.			Calidi & humidi temperamenti notæ.	i cap.
Ad capitis ulcera, & achores tenuia ca-					

cap. LVIII.	Frigidioris uentris notæ.	cap. LXXV.	Frigidi & humidi hepatis notæ.	cap. XCI.
Calidi & sicci temperamenti notæ.	Pulmonis notæ.	cap. LXXVI.		
cap. LIX.	Cordis calidioris notæ.	cap. LXXVII.	Frigidi ac sicci hepatis notæ.	cap. XCII.
Frigidi & humidi temperamenti notæ.	Frigidioris cordis notæ.	ca. LXXVIII.		
cap. LX.	Siccioris cordis notæ.	cap. LXXIX.	Testiū temperamenti signa.	cap. XCIII.
Frigidi ac sicci temperamenti notæ.	Humidioris cordis signa.	cap. LXXX.	Calidorum temperamenti correctio.	cap. XCIII.
cap. LXI.	Calidi ac sicci cordis signa.	cap. LXXXI.		
De capitis dinotione.	cap. LXII.	LXXXII.	Frigidi intemperamenti medela.	cap. XCV.
Cerebri temperati notæ.	cap. LXIII.	LXXXIII.		
Cerebri calidioris notæ.	cap. LXIII.	LXXXII.	Humidi intemperamenti correctio.	cap. XCVI.
Frigidioris cerebri notæ.	cap. LXV.	LXXXIII.		
Siccioris cerebri signa.	cap. LXVI.	LXXXIII.	Sicci intemperamenti medela.	cap. XCVII.
Humidioris cerebri notæ.	cap. LXVII.	LXXXIII.		
Calidioris & humidioris cerebri signa.	cap. LXVIII.	LXXXIII.	Calidi ac sicci intemperamenti curatio.	cap. XCVIII.
cap. LXVIII.	Hepatis calidioris notæ.	cap. LXXXV.		
Calidi ac sicci cerebri notæ.	ca. LXIX.	LXXXVI.	Humidi ac calidi intemperamenti medela.	cap. XCIX.
Frigidi ac sicci cerebri signa.	ca. LXX.	LXXXVII.		
Frigidi ac humidi cerebri notæ.	cap. LXXI.	LXXXVIII.	Humidi ac frigidi intemperamenti sanatio.	cap. C.
Ventris siccioris signa.	cap. LXXII.	LXXXIX.	Frigidi ac humidi intemperamenti curatio, frigiditate predominante.	cap. CI.
Ventris calidioris notæ.	cap. LXXIII.	LXXXIX.		
Humidioris uentris notæ.	ca. LXXIII.	LXXXIX.		

AETII MEDICI GRAE-

CI CONTRACTAE ME-

DICINAE TETRABIBLI PRIMAE SERMO, QVARTVS.

DE SANITATE TVENDA. GA-

LENI PRAEFATIO. Cap. I.



V V M una sit ars quæ circa humanum corpus uersatur, duæ sunt ipsius primæ ac maximæ partes: prior quæ sanitatem tuetur, altera quæ morbos curat. Quandoquidem uero et dignitate & tempore prior est sanitas morbo, oportet sanè etiā nos prius considerare quomodo quis hanc custodiat. Deinceps uero etiā quomodo quis quàm optimè morbos curet. Dicitur autem sanitas dupliciter: Altera exacta, & optima, & perfecta, & summa: Altera deficient quidē ab hac, nō tamē in tantum ut animal ægrotet. Et huius graduū non parua est in corporibus differentia circa magis ac minus. Prius autem recensere conuenit, quomodo quis optimæ ac inculpabilis naturæ sanitatē conseruet, & adhuc ante hoc mēdonem facere, quænam sit optima corporis structura. Est autem si quis iuxta ipsam essentiam rei exponet, temperatissima, & quæ formationē partium, ac actionibus ipsarum exacte conuenientem habet. Et ad hæc numerū omnem, & magnitudines, & compositionem omnium ipsarum inter se, actionibus commodā exhibet. Si uero quis iuxta notas designare uolet, corpus exacte bene carnosum tale est, quod mediū est inter gracile & multa carne obesum: & neq; hirsutum est, neq; pilis nudum, neq; moderato mollius, neq; durius, neq; albū aut nigrū, aut uenis occultis aut amplis, aut animosum aut defectū animi, aut somnolentū aut uigilans, aut hebeti mente præditum aut uasum, aut uenerideditum aut uice uersa. Si uero etiā omnibus partibus fuerit exacte inter omnes excessus mediū, erit

perfecto etiam pulcherrimum aspectu tale corpus, ut quod sit moderatum, & ad omnes labores idoneum. Habebit autem & alia omnia signa temperamenti boni per singulas partes. De quibus pro uiribus pauca indicabimus circa finem huius sermonis. Multa enim corpora temperata quidē sunt, si ita contingat, capitibus, uerum intemperata pectoribus, aut uentre, aut genitalibus. In quorundam uero artubus est intemperies, & plerisq; in uno uiscere, aut alia quadam parte. Sed & de his in prauis corporū structuris postea dicetur in hoc sermone. Cæterum de optima structura iam dicamus, cuius singulæ partes uniuersam habent inculpabilem essentiam. Dicitur autē primum quomodo quis ab initio susceptū eiusmodi hominem, per omnem uitam sanum cōseruari, nisi si quid extrinsecus uiolentum ipsi accidat.

Quomodo infans recens natus sanus cognoscitur. Cap. II.

Indicabitur autem sanus infans statim ex natiuitate, primum quidem ex eo quod genitrix per totum gestationis in utero tēpus sana uixit. Deinde ex eo quod ubi natus est & in terrā positus infans, ipse eiulatum edit cum cōueniente firmitate. Et ex eo quod omnibus partibus ac sensibus integer est, & naturales meatus omnes expeditos habet, uelut sunt aures, nares, fauces, urinæ meatus, podex. Et quod unicuiusque membri naturales motus non segnes, neque exolutos habet, & iuncturarum flexuras ac extensiones, magnitudinesq; ac figuras, & sensum exactum.

De infantis educatione. Cap. III.

Proinde recens natus infans, hic nimirum per omnem structurā inculpabilis, primum ita tractetur, ut ipsi umbilicus quatuor à uentre digitis acuto scalpro resecetur: Reprobamus enim aliam materiam harundinum

dinum ac vitrorum, ut ne quid atteratur. Deinde contentus in ipso sanguis grumofus exprimatur, & spōgia detergeatur, ac lana carpta obturetur. Postea moderato sale per se tenuissimo conspergimus. Aliquando vero etiam in delictioribus totum corpus succo pitisanæ aut foeni Græci depurgare oportet: & aqua tepida viscositatem corpori oblitam abluere, & sordes naribus insitas digitis exprimere, & os atque aurium meatus purgare, palpebras diducere, & oculos detergere, ac oleū ipsis instillare. Digitis item disparare ipsum anum. Confestim itaque excernit per sedem id quod Græcis meconium vocari solet. Porro supra umbilicum haplus lanæ madefactus imponatur, ad umbilici figuram formatus. At cuminum ipsi inspergere reprobamus, propter acrimoniam, etiam si quidam id usurpare soleant. Deinde duplicatus umbilicus, & lanæ inuolutus, leniter in medio componatur. Et postea infans pro more fasciæ inuoluatur. Exhibendum est autem ipsi mel præ omni alimēto, quod optime est despumatum ut delingat, reprobato butyro velut stomacho incōmodo. Deinde instillanda est aqua mulsa tepida. Postea vero mater, ubi prius crassum ex uberibus emulxit, & ipsa aqua calida fouet, lac præbeat infanti. Præstat enim non accipere matris lac usque ad quartam diem. Lauare vero oportet puerū bis in die, horarum aliquot intersitio post cibum. Postquam vero exciderit umbilicus post tertiam aut quartā diem, cochleæ testam ustam trita loco insperge, aut talum suillum ustum, aut plūbum ustū cum uino illine, & obliga.

De nutrice electione. Cap. III.

Præ omnibus his eligenda est nutrix, neque iunior vixenti annis, neque senior quadraginta, quæ bis aut ter peperit, non morbida, boni habitus, iustæ magnitudinis, ampli pectoris, ubera habens moderata, non rugosa, papillas neque magnas, neque paruas, neque angustiores, neque ualde latas, aut cauernosas. Magna enim ubera plus quam opus est lactis præparant, & hoc manens in ipsis corrumpitur, & infantem ledit, simulque etiam matrem grauat. Parua uero parum lactis exhibent. Et magnæ quidem papillæ offendunt gingiuas, & impediunt linguam ne iuuat deglutionem. Paruæ uero ægrè apprehendi possunt, & propterea affligunt maxillas. Sed & etiaculatum lac per angustos meatus, sublinentem os pelliculam ferit, & aphtham Græce appellatū ulcus igneæ caliditatis generat. At latiores & cauernosæ papillæ aceruatim remittentes lac, suffocationis causa fiunt. Præterea conuenit esse nutricem castam, sobriam, mansuetā, munda, hilarem, et non tristē. Ego inquit Galenus, quū puer aliquando ploraret per totam diem & indignaretur, ubi uidissem stratum ipsius & uestimenta sordida, & ipsum puerum sordidum: iussi & ipsum, & stratum ipsius lauare, & uestimenta mutare, quo facto ab eiulatu & indignatione cessauit & obdormiuit.

Probatio lactis. Cap. v.

Probandum est lac gustu, visu, & olfactu. Nam & gustantibus & olfacientibus iucundum, & uidentibus album ac æquale, & inter liquiditatem ac spissitudinem medium habens, ipsum esse oportet. At uisiosum lac, aut crassum est & caseosum, aut liquidum & serosum, aut liuidū, aut strías floridas habens, aut spumosum, aut graueolens, aut foetidū, aut cito acrescens, aut gustanti amaritudinis, aut muræ, aut alterius cu-

iustam peregrinæ qualitatis significationem exhibens. Hæ igitur sint notæ uisiosi itemque boni lactis, ex quibus coniecturam facies mulierem morbosam esse, & ad aliam transibis. Cæterum opulenti plures nutrices esse oportet.

Vitus nutrice.

Cap. vi.

Exercere oportet nutricem moderatis exercitiis, & maxime supernis partibus. Cibos autem exhibere boni succi & qui facile digeruntur, & tempore conuenienti, & mensura congrua. Atque ita etiam potus. Abstineat a porro, cepis, allio, fassamentis, & omnibus foetidis & graueolentibus. Et a plerisque bellariis, præsertim nucleis pineis. Sunt enim oleosi, & propterea bilem faciunt, & uentriculo innatant. Itemque uenerem stimulant. Itaque penitus ab his nutricem abstinere oportet. Irritatur enim in coitu lunares purgationes, & propterea lac corrumpitur, & uisiosum ac paucissimum fit. Quædam uero etiam concipiunt, quo nihil nocentius fieri infanti qui ex ipsa alitur possit. Vbi autem imminuitur lac, aut corrumpitur, aut etiam omnino extinguitur, aut spissatur, aut attenuatur, præstat quidem alterius nutrice lac præbere. Sin id non permittat res aliqua instans, uisio nutrix curanda est, ut ne in morbum incidat infans. Extincto itaque lacte, considerandum est an totū corpus, aut una pars ægrotet, & lædētē affectionem corrigere oportet. Si uero ob penuriam extinctum est lac, alimentum augere, & melioris succi cibos dare, & plures auferre, aluumque si plus iusto fertur adstringere, & exercitiis supernarum partium uti, & uberum frictione, & fomentis per sponglas, ceratis item liquidioribus ad ubera ex oleo trino aut gleudino. Lini uero semē delingere cum melle aut passo. Aut sesamū crudum cum palmula passa, quam pateron Græci uocant, æquis portionibus edendam præbe, & bibat zythum, & eadem die ubera lacte replebuntur. Putabit autem mulier simul ut acceperit potū, omnia sua membra resoluta esse, donec lac in uberibus factū fuerit. Aut lumbricos piscatorum, qui in limo fluminis reperiuntur, & intestina terre appellantur, quinque aut septem terito, & palmulas passas addito, & simul terito, ac dato in zytho bibendos prælotæ mulieri sedum ad dies decem: & de multitudine ac bonitate lactis miraberis. Præstat autem etiam præcedens pharmacum similiter cum zytho conterere, & bibendum præbere. Vinum uero exhibendū est dulcius. Et feniculū aut anethum uiride cum pitisana coctum, sorbedum dato. Si uero tenue fuerit lac, balnea reprobada sunt, uelut quæ humores aquosos reddant. In cibo utendum est alicā, ouis sorbilibus, pane similagineo, pedibus ac extremitatibus porcinis, uolueribus tenerioribus, carnibus hoedinis, & uino dulci. Sin crassius fuerit lac mulieris, attenuante alimento utendum est, ac minus nutriente, & balneis frequentibus. Crassius enim lac abscessus & furunculos circa infantis corpus generat, & uenter ipsius cohibetur. Sed neque urinæ pro ratione prodeunt, & uomitus pituitosi infestant, & ægrè mobilis ac difficulter spirans puer euadit, & appetitū perdit, ac decolor fit, & sordes oculorum habebit crassas, & mucos similiter, & flatus multo ab eo prodeunt. Si uero acrius fiat lac, excretionem per uentrem plures sunt cum mordacitate, & appetitus deficit, & pustulæ acerrimæ in corpore fiunt, & præsertim circa supernas partes, imò etiam

infer

infernas, & infans paulatim gracilescit. Quare omni modo temperandum est corpus nutricis, balneis dulcibus, & boni succi alimento. Si uero lac quod multum fertur imminuere uoles, cibos minus alentes & paucissimos dato. ubera uero lenticula cocta integro, aut cuminum cum aceto illinito. Aut lapidem album simplicem, quo ad ædificia utimur, similiter cum aceto. Aut hyoscyamum cum aceto. Aut linum aceto imbutum imposito, & assidue humectato. perfundito autem aqua marina, aut muria calida, aut myrri decocto.

Ad stertentes infantes.

Cap. vii.

Quandoquidem plerique nutrices ineptis, uelut dictum est, utentes cibis, uisiosum lac suū efficiunt, & ex hoc diuersis morbis infantes, qui etiam optimā structuram adepti sunt, obnoxii sunt. Aliquando uero etiam ex forissecus corpori accidentibus morbi accedunt; necessarium est etiam de diuersis affectionibus pueros infestantibus, pro uiribus breui tractare. Si quidem igitur infans crassiore alimēto nutritus, pituitam in uentre colliget, & propterea stertat. Tunc semen cum melle delingendum dandum est, aut cumini parum cum melle. Et aqua multa instillanda est ori assidue calida. Si uero hec pressura perseueret, oleo medium digiti tingito, & consillas illinito, & depressa lingue radice ad uomitum irritato. ubi enim uomuerit, ab omnibus uexationibus confestim liberatur.

Ad uocem infantium interceptam.

Cap. viii.

Ad interceptam in infantibus uocem, ob quamcunque causam præcedentem (contingit autem hoc maxime suppressa aluo) brassicæ succum cum modico sale bibendum dato aut instillato. Statim enim soluit aluū, & uocem restituit. Sed & glans ano indenda est.

De dentitione.

Cap. ix.

Circa septimum mensem incipiunt infantes proferre dentes, & dum punguntur ac stimulantur uelut ab aculeo, dente gingiuas disparante, inflammationes succedunt ipsarum gingiuarum ac maxillarū & tendinum, ad quas etiam febres omnino consequuntur. Accedit & pruritus auditoriorum meatuum. Et aures humectantur. Aliqui uero etiam lippitudinibus capiuntur, & sanguis ex oculorum angulis fluit. Plerisque uero etiam exturbatur uenter, propter stomachi inflammationem, & uentris exolutionē. Itaque lenire ac pinguefacere oportet tendinem & maxillas, mollium lanarum ac mundarum circumlectu, circa cololum & ipsius neruum, per oleum dulce ac calidum. Instillare quoque auditorijs meatibus oleū calidum. Perseuerate uero inflammatione, etiam ceratum rosaceum liquidum locis imponere. In cibo offerendū est puero cerebellum, maxime quidem leporis coctum aut assatum. Sin minus, ouicula. Naturaliter enim opitatur. Sed & melle moderate cocto illinendæ sunt gingiue. Efficit enim minime molestum dentium exortum. Nihil uero duri dandum est ipsis ad mandandum, ut ne gingiue callosiores reddat impedimento sine dentium exortui. Balneo autē utendum est febribus remittentibus. Neque studio habendum est ut uenter adstringatur, ut ne materia sursum repens, supernas partes, præsertim oculos lædat, & febres uehementiores efficiat. Sed & nutrix cogenda est ut aquam bibat, & cibos leuissimos ac sorbiles accipiat. Alunt autem naturaliter auxiliari dentientibus pueris, colocynthidis syluestris radicem, in

aureo aut argenteo canali gestatam. Itemque rubi radicem. Sed & uiperæ, præsertim masculæ, dentem, in argento pro amuleto appende. At circa stomachum gestent semper uiridem iaspidem de collo suspensum, ita ut stomachum contingat.

Ad inflammationes oculorum.

Cap. x.

Lycium Indicum præsertim, sin minus, Pataricū cum lacte diluito, & supernas palpebras cum supercilijis illinito. Aliquando etiam ipsis oculis instillato, multo lacte dilutum. Mirabiliter etiam facit Nili ex rosas collyrium illitum. Ipsos uero oculos ocymi decocto abluito.

Ad albugines puerorum.

Cap. xi.

Ad albugines puerorum ab elulatu factas, solani nigri succum illine.

Ad inflammationes & humiditates aurium.

Cap. xii.

Ad inflammationes & dolores aurium, oui cæcidum cum lacte muliebri instilla. Aut intestina terre cū rosaceo cocta. Ad humiditates uero aurium, alumen uino dilue, & lanam puram ac mollem in ipso imbue, & in sole assicca. Et rursus imbue ac sicca. & ubi ter hoc feceris, lanam sicca asserua. Vsu uero experiente, de ipsa accipe & in aurem inde. Ad ulcera uero in auribus, pastillo Musæ utere, diluto cum sapa ac modico aceto. Si uero caro superexcreuerit, primum reprime per pastillum Bithynum dilutum cum uino. Deinde utere Musæ pastillo, uelut dictum est.

De inflammatione Siriasi Græcis appellata.

Cap. xiii.

Ex affectionibus quæ cum febre accidunt, est & Siriasis in infantibus appellata, quæ est inflammatio partium cerebri & membranarum, adeo ut sincipitis & oculorum cavitates consequatur, cū febre ardente, & pallore, & corporis siccitate, ac prostrato appetitu. Siriasis autem appellata est à sincipitis cavitare. Siros enim apud Græcos dicitur fossa ac corpus cauum, in quo semina seruantur. Quare omnia uelut ad inflammationes facere oportet, ita ut leniamus & mediocriter frige faciamus caput, coriandri succo cum rosaceo humectantes. Sed & totum corpus ex hoc illinatur. Aut cucurbitæ ramenta sincipiti impone. Aut uitis folia, aut portulacam cum rosaceo tusam, sincipiti illine. Aut heliotropi scorpiuri succo sinciput illine. Aut oui luteum cum rosaceo coctum, & sincipiti illinito, & assidue permutato.

Ut exudet puer in febre.

Cap. xiiii.

Arundinis uiridis medullā terito, & ex ea sinciput ac pedes illinito, ipsumque puerū uestimentis contegito.

De aphthis ulcere oris ardente.

Cap. xv.

De aphthis ulceribus, & inflammationibus consillarū, dicitur absolutissime in sermone de affectionibus quæ perfectis accidunt circa has partes, in octauo nimirum.

Ad deuoratas spinas aut festucas eximendas.

Cap. xvi.

Alumen quo ad coria utuntur cum oleo terito, & gula illinito, radicem lingue digito ualde cōprimens, & facile ipsas sursum effert.

Ad assiduas sternutationes infantium & grauedines.

Cap. xvii.

Ocymum siccum tusum ac cribratum naribus admove, ut per respirationē attrahatur, aut insuffla. Idem etiam ad grauedinem facit.

Ad

Ad tusses puerorum.

Cap. xviii.

Nucleorum nucum pinearum modice tostorum drach. iiii. seminis cucumeris parum tosti drach. i. tragacanthi drach. iiii. mellis despumati dodrantem. Præpara & præbe delingendum. Tragacanthum autem in uino ueteri dulcissimo macerato. Aliud Hippocraticum. Vitellum oui assatum, & sesami duplum, & salis granum unum moderatum terito sufficere, & cum melle delingendum dato. Aliud. Nucleos pineos tostos x x x. amygdalas decorticas x x x. seminis lini tosti, succi glycyrrhizæ, utriusque sextantem. Mellis quod satis est, dato delingendū. Probat etiam facit cuminum cum melle. Item ammium.

Ad alui infantium profluuium.

Cap. xix.

Si aluius infantis fluxione laboret, balneum & gestationem reprobamus. Vt mur autem humectatione stomachi ex uino & oleo melino. Si uero fluxio extendatur, cenanthen leuissimè tritam, & acaciā, ac mastichen, æquis portionibus singulis tritis, oui luteo quantum satis est excipe, & ex emollito stomachum illine, & dorsum, & hapsū lanæ purpureæ impone ac deliga. Facit enim citra molestiam. Præ omnibus uero nutritiæ alimentis boni succi uti oportet, & potibus adstringentibus. Si uero aluius infantis farinæ similia excernat, mentam tritam cum uino nigro, alui impone ac obliga.

Ad aluum suppressam.

Cap. xx.

Si uero supprimatur aluius, glande irritanda est, aut ex sola aqua mullā infusum immittendum est. Et mel alimentis ammiscendum. Cæterum florem artemisiæ cum oleo tere, & circa umbilicū affrica, & fluet aluius. At de lumbricis dicetur in uniuersalibus auxilijs in nono sermone.

De pustulis puerorum.

Cap. xxi.

Iam antea dictum est quod infantes uicioso alimento utentes, uarios incidunt morbos, ut cum alijs & pustulæ & papulæ instar bullarū efferuentes, & humida ulcera in cute fiant, quæ bubastica uocant, & alia consimilia. Itaque muriam & urinam, & alia quæ aliqui adhibent, reprobamus, ob acrimoniam. Lauamus autem ipsos rosarū decocto aut lentis. Et si ampliori adstrictione opus habemus, myrti aut malicorij. Magis uero ulceratis, cataplasma ex plantagine imponimus. Aut ex seride siue intubo cum pane. Aut ex flore polætæ cum portulaca, aut semperuiuo, aut ueneris umbilico, aut hyoscyamo. Aut rosas uirides aut siccas coctas cum meliloto & palmulis adhibemus. Aut spumam argenti, melilotum, alumē, cum aceto terito, & myrteum oleum siue rosaceum adhibito, atque illinito. Aliud ad bubastica ulcera. Recrementum plumbi & amyli, æquis portionibus cum solant succo terito, & adiecto rosaceo illinito. Aliud pulcherrimum. Cadmiā tritam cum aqua illinito, aut emoliam cum uino. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ, utriusque trientem, malicorij siccū leuissimè tritū sextantem, succi stratiotæ fluuiialis quod satis est, utere. Quod si non adsit stratiotes, lentis palustria succum accipe, & utere, aut herbæ uiridis quæ in aquis inuenitur, & stratiotæ similis est, succum amisce, probè etiam facit serapiadis tritescularis succus. Aliud. Retrementum ferri terito cum uino, ac illinito. Valde enim bonum est hoc. Probat facit & emplastrum ex ladano, & emplastrū ex hordeo, oui candido, & rosaceo aut myrteo oleo diluta. Aliud,

ad infantium pustulas ac papulas feruidas post rupturam. Cadmiæ drach. lxx. æris uisti drach. lxx. acaciæ, croci, utriusque unciam i. tragacanthi sextantem. Tragacanthum aqua macerato ac terito, & cum ipso reliqua excipito, ac pastillos formato. Et usus tēpore cum succo senecionis, aut intubi, aut solani, diluito, & addito rosaceo, illinito. Ego, inquit, succo senecionis aut intubi excipio tragacanthum ac reliqua, & pastillos effingo.

Ad capitis ulcera, & achores tenuia capitis ulcuscula.

Cap. xxii.

Pharmacum ex cuius usu ego nomen assequutus sum, Spumæ argenti, cerusæ, utriusque bessem, seminis ericæ, thuris, utriusque drach. iiii. uino & oleo raphanino terito ac uictor. Aliud. Acaciæ fuluæ unciam i. ladani trientem, myrrhæ sextantem, opij unciam i. Aqua palustri excipe & forma pastillos, & utere assidue. Aliud. Cochleas albas unā cum testa exustas insperge. Aliud. Aloē leuissimè tritā, cum plantagine arida trita insperge. Aliud. Balauitium aridum tritum insperge. Aut cum aqua tritum impone & illine. Aliud. Herbam quam in Alexandria Liparonem uocant, aliqui uero cnestrum appellant, urito, & cinerem cum uino tritum illinito. Vtere etiam reliquis cum discriminationibus referendis in sexto sermone, de uniuersalibus auxilijs ad achoras.

Ad ulcus Melicerida à mellei humoris similitudine dictum, quod & Dulce appellatur, & Syriacè Sanalia.

Cap. xxiii.

Spumæ argenti, baccarum lauri, æquales portiones terito cum aceto & oleo, & illinito. Sæpenumero eius experimentum fecimus.

Ad sedem infantium procidentem.

Cap. xxiiii.

Spongitiæ herba podicem assidue deterge. Acaciā cum sapā & uino nigro tritam podici illine. Cochleam uistā tritam quum egreditur prælotæ sedi insperge, & sanabis, ostreorum testas crudas tustas ac tenuissimo cribro excretas insperge. Myrrhi baccas uirides cum uino tritas impone. Vtere autem perfusionē aqua fabrorum, in qua ferrum tingunt. Ego uero semper uitor muria tepida, & ualde probè facit. Similiter autem & aqua marina. Vtere etiam dicendis in uniuersalibus auxilijs, quæ suo loco referentur.

Ad femorum intertrigines.

Cap. xxv.

Myrtum siccam tritam insperge, aut cyperū cum rosis.

Ad procidentes puerorum umbilicos.

Cap. xxvi.

Procidunt pueris umbilici, dum aut in elulatu diu & multum distenduntur, aut ex plaga, aut ex casu. Talibus igitur ammium cū muria tritum umbilico illine, & rasuram lintei impone, ac ad triduum obliga. Et rursus eo soluto, idem facito. Aut lupinos amaros et ungulam asini uistam, & laterem uistum, simul terito ac imposito, & obligato. Si uero efficacioribus opus fuerit, his quæ ad herniā inguinum referuntur utere. Critonis ad pueros exumbilicares, ob quancunq; causam, Resinæ pinus unc. xvi. aluminis scissi dextantem, mellis dextantes duos. Alumen tritum cum melle ad prunas coquito, & ubi bonam compagem habuerit, resinam addito, assidueq; moueto, & ubi dissoluta fuerit, laminā de hoc pharmacō accipito, & umbilico imposito, ac quotidie alterato. Verum supra laminam plāraginis folia aut hederæ imposito. Aliud. Aluminis scissi uncias xv. sedis uini austeri dextantem, gallarum drach. ii.

uino dilue ut spissitudinem habeant, & umbilicum illine, & forinfecus spongiam impone, posca imbutam ac expressam.

Ad hispidos pueros.

Cap. xxvii.

Crasstoribus & pluribus fuliginosis superfluitatibus sub cutē collectis, ex quibus pili generantur, hispidiores infantes fiunt. Itaq; caricas urito ac terito, & cum hoc cinere pilis oblitos locos confricato. Ex alio exemplari. Resinā coquito in aqua, & puerum lauato, ac leuiter detergito, ac cum caricarum ustarū cinere & fabarum cremore confricato. Aliud smegma corroborans ipsos. Farinā fabrum, cimoliz, spumæ nitrī, candidi ouorum, & testarū, æquales portiones pro smegmate adhibe.

Quando ablactandi sunt infantes. *Cap. xxviii.*

Donec firmetur infans lacte nutriatur. Postquam uero solidus factus fuerit, micis panis ex uino mulso, aut uino dulci, aut lacte. Deinde etiam oua sorbilia summat. Nam quæ manderē oportet, salua in ipsis replentur. Potus dandus est uinum dilutum. Vbi uero iam intrepide frumentaceū alimentum infans sumit, quod plerunq; circa uigesimalum mensem cōtingit: tunc latenter & paulatim ab ubere desuescat. Si uero ablactatus morbum inciderit, rursus ad lac transferatur. Et ubi cessauit morbus, refocilletur corpusculum, atque sic ablactetur.

Victus ratio post ablactationem puerorum, &

aliarum ætatum.

Cap. xxix.

Ablactati infantes in remissione ac hilaritate exercitorum uersentur, denturq; ipsis cibi leues ac boni succi. Verum à multo uino abstinere oportet eum qui bonum corporis temperamentum habet. Nam in humidis ac calidis corporibus, uinū replet caput uaporibus. Neq; uero à frigida aqua potu penitus arcere iubeo tales pueros. Sed inter cibos plerunq; & in calidioribus oris, optima aqua uti permitto. A septimo anno ad literas ueniant, & mītib; ac humanis magistris tradantur. At à decimoquarto anno usq; ad uigesimalum primum conuenit exercitatio in disciplinis philosophicæ doctrinæ. Prohibendi sunt à ueneris usu. Contrahendum est & uberius uinū, & plura exercitia iam sunt assumenda. His uero qui iam in uigore ætatis degunt, uictus ratio remissa cōuenit, tum animi, tum corporis. Et corporis exercitia qualiacunque fuerint, pro ratione his detrahenda sunt, & alimenta sensim contrahenda, quum habitus ipsorum frigiditatis principium sumat. Maximam autem optimè constructi corporis notam esse statuo ipsius naturæ promptitudinem, quicquid tandem fuerit agendum, ipsa sui ipsius mensuram exco-gitante in optimis constitutionibus. Nam & dum exercentur ac fricantur, aut quiduis aliud agūt, tunc primum pigrescunt, quum sufficienter fuerint exercitati. Et sanè etiam à cibis ac potibus tunc abstinēt, quum sufficienter fuerint impleti, neque plus iusto appetentes, neq; minus ingerentes. Quare nullus timor est de optimæ constitutionis homine, ne uel nimium labore fatigetur, aut cibis nimium expleatur. Ipsum enim sanum corpus omnia sibi ipsi excogitat, naturæ motibus impulsū, præsertim si animus ipsius à puero probè fuerit institutus. Pleriq; enim in improbis moribus educati, dum licēdore aut negligentiore uictu utuntur, bonas naturas corrumpunt. Quemadmodum aliqui uice uersa uicioso cor-

pore à natura producti, moderato uictu & tēpestiuis exercitijs, multa naturæ uirtuta ac delicta correxerunt. At de exercitorum mensura, & utendi modo, dictum est in præcedenti sermone.

Victus senum ratio.

Cap. xxx.

Naturalis senectū est sicca & frigida corporū tempera-tura, ex longæuitate proueniens: quum enim corporū essentia unā cū insita caliditate paulatim defluat, & instrumenta iā ulterius quàm conueniens erat sicca fiant, tum actiones deteriores redduntur, tum animal ipsum ex carne & seipso gracilius euadit. Postquam uero adhuc amplius fuerint resiccata, non solū ex carne, sed etiā rugosum efficitur, & mēbrorū im-potēs, & in motibus ambiguū. Qui itaq; affectionē ex scientia nouit, quod uidelicet siccitas est cū frigidi-tate, is bonus fuerit senū Medicus. Cognoscat enim quod horū correctio per humectantia ac calfacientia cōtingit. talia autē sunt, aquarū dulcium balnea calida, & uini boni potus, & cibi qui humectant simulq; calfaciunt. Et frictions per oleū mane moderate fiētēs. Deinde deambulationes & gestationes contra delationē, uirtutum senis coniectatione facta: nō enim parua est etiā in ipsis senibus differentia. Dandus autem est cibus modicus quidem, uerum saepe. Nam si paululum iustā mensuram senes excesserint, non parum leduntur. Securius itaq; est debilibus senibus parum cibi offerre, uerum ter in die. Circa tertiam quidem horam panem probè paratum recentē, cum optimo melle despumato. Circa septimā uero præfrictis, & cōuenientibus senibus exercitijs exercitatis, ac lotis, prandium exhibendum est, & primū quidem danda quæ uentrem molliūt, uelut sunt olea ex beta ac malua. Deinde pisces petrosos ac pelagios præbere conuenit, postea uero paululū in lecto quiescere, deinde moderato motu uti. Ad uesperam autem coenantes, à piscium esu abstineant. Accipiant autem cibos boni succi & ægrè corruptiles, uelut est gallina aut uolucris aliqua ex simplici iure. Vinum uero senibus utilissimum est. Sit autem ex calidioribus natura. Quale est quod substantia quidem tenue est, colore autē fuluum aut flauum. Atq; unum quidem hoc maximū bonum senibus ex uino accedit, quod calfiunt omnes ipsorū partes. Deinde quod serum sanguinis per urinas purgatur. Quæcūq; uero uina pallida sunt aut flaua, & simul crassa, ea sanguinē generant, & corpus nutriūt. Quapropter etiā ipsa aliquando cōmoda fuerint senibus, quo uidelicet tempore neq; serosum humorē in uenis habēt, & ampliore nutrimento indigent. Vt plurimum enim uino urinam ciente opus habent, eo quod aquosa superfluitas in ipsis redundat. At uero à nigris & acerbis ac crassis & similibus uinis abstinere ipsos oportet. Diutius enim in uentre manēt, & propterea incommoda sunt. Dulci uero si senex uti uelit, post balneū sumat dulce simulq; pallidū colore. Non prohibeo etiā uinorū ex melle paratorū usum, et præsertim his senibus qui suspecti sunt de calculi in renibus generatione, aut quos podagra aut articularis morbus infestat. Et tunc in uinū inijciendū est petroselinū solum. Sufficit enim hoc arthriticis. Ad calculosos uero betonica ammiscetur, quæ & cestrū appellatur et saxifraga. Abstinere autē oportet senes ab eduljjs & potibus, uiscosum & crassum humorē gignētib; Quælia sunt alica, cascus, qua cocta, cochlear, bulbi, fungi, lenticula

lenticula, & ostreorum caro, & reliqua supra relata in alimentorum crassi succi mentione, sermone secundo. Si uero ex necessitate aliquando contigerit aliquo ex talibus uti, statim exhibendum est pharmacum ex calamintha, aut ex tribus piperis generibus. Si uero non sit ad manū quid ex his, piper tundendum est & exacte cribrandū, & cum cum obsonijs edendū, tum potus inspergendum. Et alium tunc gustare conducit. Postquam autē soluta est obturatio, & aluus subducta, etiā theriacam antidotū, & mithridaticam, aut aliam quandam ex his quæ ex aromatibus constant exhibere conuenit. Alium uero usu trāsire statim ad humectantē ac calfacientem uictus rationē supra relatā. Dandæ sunt ipsis etiā maturæ & dulcissimæ uirides ficus, ante aliū cibū. Sed & in hyeme caricæ, nisi accidens aliquod circa dextram præsertim præcordiorum partē adsit. Quando quidē uero serosæ ac pituitosæ superfluitates in senum corporibus, uelut dictū est, colliguntur: urinā quotidie propellere oportet, non per medicatas res, sed apī decocto cum melle, & uinis urinā clentibus uti. Venter quoq; per oleum bonū subducendus est, præsertim absorptum ante cibos. Manifestū est autem quod & oleracea omnia præ alijs cibis edere oportet, ex oleo & garo. Emolliunt autem uentrem & pruna sicca, præsertim quæ ab Hispania afferuntur. Damascena uero in aqua multa meracore præmaceretur, aut in ipsa decoquatur. Sed & oliuæ muria conditæ, si fieri potest albæ, præsumendæ sunt. Ventre uero amplius suppresso, etiā mercurialis cocta detur, & cnicus cū pisana, sed & resina terebinthina. De hac uero accipiendum est aliquando ad nucis regię magnitudinē, aliquando ad duarū aut trium. Non enim solū citra molestiam mollirescunt, sed etiam uiscera extergere, & pulmonē & renes. At perfecta dosis eius est uncia una. Idoneum est ipsis & hoc. Caricas pingues accipe, & corium forinsecus ipsis oblitū detrahe, deinde in mortario tūde, & cnici medullā ipsis adijce, decima plus minus caricarum parte. Deinde ambo tusa misce, ex hoc duarū aut trium caricarū magnitudinē præbe. At uero ex relatis pharmacis nullum unquā largius accipiendū est. Quidam enim gaudēt quod cōfestim uehemēter sunt purgati. Verū quanto magis fuerint euacuati, tanto amplius uenter sistitur per sequentes dies. Suppressa autē aluo ipsorū, infundere oportet oleum solū calidū. Nam & dura stercorea hinc educuntur, & lubricitas quædā sit in transitu, & ipsum senū corpus mollescit, instar aridarū pellū induratū.

Victus ratio eorum qui in ocio degunt. Cap. xxxi.

Qui uitā in ocio degit considerare debet, an in priore uita exerceri cōsueuit, aut citra exercitationē lauari. Nam quidā hunc morem moderatē ferunt, ut aliqui ex ipsis nō assidue ægrotent, ubi corpore facile trāspirante prædicti fuerint. Atq; talem sanē corporis naturā, ad aliam consuetudinē transferre minimē oportet, quemadmodū neq; illā aliam, eorū qui per multum tēporis interuallum ægrotant. Si uero assidue quis ægrotet, cōsideranda est in ipso causa, an ob plenitudinē, aut propter humorū uitiatiōē ægrotet. Et si quidē ē morbis ex plenitudine ægrotare uideatur, scopus tibi erit propositus, ut omnino salubrē ipsius diætā conferues, quo semper moderatos habeat humores. Si uero propter uitiatos humores ægrotare solet, optimos facere humores. Quidā igitur plenu-

dinem coaceruāt, quū ea quæ per corpus transpirant pauciora fuerint his quæ accipiuntur. In his itaq; seruāda est symmetria ac proportio eduliorū ac porum ad ea quæ euacuātur. Symmetria autem est, ut in utrisq; cōsideremus nos quantitātē, tum eorū quæ ingeruntur, tum eorū quæ euacuātur. Nā qui in priore uita statim priusquā exercebatur, in balneū ingreſsi sunt, in his nūc frictione moderata utendum est, & breui motu. Qui uero exercitabatur ante balneum, his cōsulo ut nunc paululū augeant consuetudinem. Detrahete uero oportet etiā aliquid de cibis, & quātitate ac qualitate moderatos exhibere. Qualitatē autem dico, uelut in carnibus porcinis: celerrimē enim plenitudinem & copiam boni humoris congregant. Itaq; ad olera ducēdi sunt, & ad pisces similiter ac uolucres, qui non multū nutriunt. At uero in his qui uitiatos humores colligūt, nō unus est scopus, quoniā neq; una est uitiati humoris species. Quidā enim frigidiorē ac pituitosiorē uitiatum humorē congregāt. Aliqui uero calidiorē & biliosiorē. Sicut alij atrabiliarium. Fugienti itaq; sunt singuli cibi ac potus, qui promptē generare solēt humorē qui in ipsis cōgregatur. Dictum est autem de ipsis abunde, in boni succi & mali succi eduliorū mentione, in secundo sermone huius operis. In quo sanē de attenuatibus edulij dictū est, quæ commoda sunt, his qui crudū appellatum humorē coaceruant, qui semper quidem crassus est, nō tamen semper uiscosus. Porro in omnibus his cōmune auxilium est, moderata uentris subductio, & maximē quibus ueter est natura durior. Cōmune auxilium est etiam ueneris usus moderatus.

De carnum subuersione.

Cap. xxxii.

Quum ad immodicā carnum multitudinem deuenit corpus, liquare ipsum ac subuercere oportet. Ostēsum est autem quod calidius & siccius temperamentum, gracile corpus efficit. Huiusmodi igitur faciendum est carnosorum hominum temperamentum, si moderatū fieri debet. Didicisti autē iam quod uelocia exercitia atq; acuta, & diēta attenuās, itemq; eiusmodi medicamenta, sed & animæ curæ, totū tēperamentū calidius ac siccius reddūt, & ipsum corpus tenuius. Attenuās itaq; diēta manifesta est, pharmaca uero uehemētiora sunt, rutę semen, & præsertim syluestris cum cacuminibus, aristolochia rotunda, centaurea tenuis, gentiana, & polium, & quæcunq; forster urinam ciēt, uelut petroselinum. Singula enim hæc & per se, & inter se uniuersa mixta, attenuare & euacuare humores possunt. Sed & sal ex uisperis uitis multum attenuat. Quin & ipsa theriaca antidotus attenuat & discutit. Illinatur autem oleo, in quo cocta est cucumeris syluestris radix, & althæa, & gentiana, & panacis radix, & aristolochia rotunda, poliumq; ac centaurea. Cibi uero non statim a balneis dandi sunt, sed permittendum est ut prius quiescant aut quid consuetarū actionum obeant, & rursus ad secundū balneū ducantur. Præstat autē & balnei aquā discussoriā esse, si naturalem habere possent. Sin minus, flos salis marinę aquæ ammisceatur. Deinde uero edulia magna quidē mole, pauci uero nutrimenti danda sunt, ut impleatur quidē, modicū uero alimentū ex ipsis in corpus distribuatur. Talia uero sunt olera, & panes sordidiores, & similia quæ iam in secundo sermone relata sunt. Vīno autē utendum est albo colore, & tenui substantia. Neq; uero ante

ante cibos potus permittendus est, neq; copiosus potus indulgendus. Sed & semel in die cibū capere melius est, & pro exercitiorum ratione pauciores cibos exhibere. Quin & frictio sicca ex mappis crassioribus, sufficiens est ad attenuandum. Sed & nitro ac asperiore sale frictionem facere conuenit. Multū itaque nitrum in balneis attenuat. Modicum uero, irritamentum est ad carnositatem uberiores, & ad meliorem nutritionem. Prodest etiam insolatio carnosiss. Probe attenuat etiam potum hoc pharmacum. Petroselinū trientē, piperis sextantem, anisi, asari, ueriusq; unciā unam. Hoc & lotium dicit, & aluum promouet.

Quomodo graciles renutrire oportet. Cap. xxxiii.
Gracilitas corporibus accedit, quibusdā ex totius corporis intemperatura frigidior ac sicciore, quibusdam uero digerēdi facultate, aut nutriendi, aut utriusq; imbecillioribus natura existētib. Omnes autē sic habentes iuuant edulia boni succi, & exercitia tarda ac moderata, & frictio consimilis. Et in summa, omnia cōtraria relatis ad carnosos. Cōmodum est etiā ipsis picari per dies tres aut quatuor. Nā & digestionī cōfert, & nutritioni. Et multos uidere est crassefactos ex hoc plicationis auxilio, & praesertim eos quibus facultas digerendi debilis est. Nutriendi uero facultas nō debilis quidem est, sed ob idoneae materiae penuriā nutrire nō potest. Si uero ieiuni lauentur, ante balneū corpus linteis cōfricare oportet, donec rubesciat. Deinde frictione nō ualde dura uti, ut ne constringentes, cutē densam ac duram efficiamus. Oportet autem decoloribus & alimentum nō sentientibus iracundiā inducere, & commotiones animales.

Quomodo quis partes attenuatas sanare possit. Cap. xxxiiii.
Ex his qui in quibusdam partibus graciles fiunt, plerique aut ob diuturnam ipsarum quietem, aut ob deligadonis fracturae modum, ad hanc affectionē deueniunt. Oportet igitur uires quidem in membro corroborare, largum uero sanguinem attrahere, tū per moderatarum frictionum usum post cibum, tū per cōmodos parui motus, & per moderatas aquae calidae affusiones. Hec autem post cibum facere oportet, donec pars rubicunda facta eleuetur, & tunc statim a perfusione cessandū est. Oportet etiam picatorū medicamento uti, de quo dictum est in praecedenti sermone, ubi uero frigiditatis sensus circa attenuatam partem fuerit, linteis ipsa perfricanda est, & quodam pharmaco calefaciente. Sed & thapsia illinenda est, aliquando cum melle, aliquando cum cerato.

De lassitudinibus a gymnasijs, aut ex itinere obortis. Cap. xxxv.
Lassitudinum primae ac simplices tres sunt differentiae. Quae ulcerosa appellatur, & quae tensua, & quae inflammatoria. Et ad has insuper ea quae ob multā musculorum siccitatem generatur, quam lassitudinem uocant abusiue, quum nō sit lassitudo, sed siccitas.

De lassitudine ulcerosa. Cap. xxxvi.
Ulcerosa itaque lassitudo in superfluitatibus tenuibus simulq; acribus ac mordacibus generatur. Nō enim in his plenitudinis copia est quae affligit, sed humorum acrimonia, qui exercitiorum tempore, aut aliorum uehementium motuum, ex duplici causa generatur. Aut crassioribus superfluitatibus diffusis quidem ac attenuatis, non autem omnibus excretis. Aut

colliquata aliqua pinguedine, uel carne tenera, in uehementibus motibus; necesse est enim a talibus tenuibus humoribus & acribus pungi ac uelut sauciari cutem & carnes, ut & horror aliquādo fiat, & rigor, quum fortiter fuerint acres & multi. Tumor autem non est oculis expositus in partibus dolentibus. Accidit haec lassitudo praecipue corporibus uitiosis humoribus ac superfluitatibus repletis. Consequitur & ad recentes cruditates, quū aut immodestius se exercuerint aliqui, aut in sole diutius uersati fuerint. Sed & citra cruditatē in boni succi corpore cōflatur, propter immodici exercitij excessum. Densa autē & horrida apparet his cutis, & dolent uelut qui ulcus habent, alij cute tantū, alij etiam carnibus sub ipsa. Solutio porro cōtingit ex eo quod contrariū est affectioni. Oportet enim superfluitates discutere, & sedabitur affectio. Discutietur autē frictione multa & molli cum oleo dulcissimo nulla adstrictione praedito. Quale est dulcissimum sabinum. Maxime enim aduersatur his omphacinum. In prima igitur die largo oleo cū multa frictione utendū est, quo omnino nullus percipiatur futurae lassitudinis sensus. In secunda uero, quo ea quae facta iam est soluat. Solut autē ipsam, exercitiū moderatum, & frictio multa, pluribus ministris simul contrectantibus, quo pars ipsa nō frigeat, & superfluitates celerrimē discutiantur. Haec autem lassitudo plerunq; extendi solet usq; ad quartā diem. Itaq; quarta die lauentur & cōsueti cibo nutriantur. prioribus tamē diebus pauciores sint ac humidiores cibi, & nihil uiscosi habentes. Sit autē & balneum non moderato calidius. Laxare enim & discutere uolumus ipsum corpus.

De lassitudine tensua. Cap. xxxvii.
Lassitudo tensua nullam memorabilem superfluitatem in corporibus sitam habet. Verum in musculis ac neruis affectio est ob uehementes distentiones facta, quas per exercitia fecerunt. Contingit enim in his rectas in musculis fibras laborare ac tendi, ut proximae sint diuisioni. Fit autem haec lassitudo uiris maxime boni succi, qui nō acuta & uelocia exercitia faciunt, sed magis robusta. Et efficit sane lassatos ualde pigros & ad motum aegros. Non tamen horridi fiunt, uelut qui ulcerosam lassitudinem inciderunt. At uero corpus in his nihil minus quam in ulcerosa lassitudine, & in musculorum squallore, contractum uidetur. Et calidiores quam pro natura cōtingentibus esse uidentur. Solutio autem in his est tensarum partium laxatio. Frictio igitur his conueniens est modica simulq; mollis, per oleum dulcissimum tepidum fiens; & otium ac quies, & balnea maxime temperata moderato non calidiora, & mora in calida aqua diutius facta. Quare etiam si his talē laueris, magnopere profueris. Hi etiam post balneū unctione opus habent antequam induantur. Et si quidē postea sudauerint, deterfos rursus inungere conuenit. Quin & sequenti die ubi surrexerunt de strato, post defrictas superfluitates, & subductam aluū, unctione opus habet, ita ut neq; extremē frigidus oleo, neque dura frictione confricentur. Cibus dandus est his modicus quantitate, uerum boni succi, & nihil uiscosum habens.

De lassitudine inflammatoria, ad ossa pertingente. Cap. xxxviii.
Tertia lassitudo est, in qua uelut cōtusas ac inflamas

tas sentiunt partes. hæc tunc accidere solet quum ob uehementissimos motus calfacti musculi, attraxerint quid de circumfusis ipsis superfluitatibus. Et sola hæc eleuat musculos præter naturam, ut inflammationi similis sit affectio. Et propterea ex contactu dolent, & calidiores apparent. Dolent autem magis quum moueri uolunt. Si uero circa tēdines aut neruos in profundo eandem affectionem fieri contingit, ossium lassitudinem affectionem eam appellant, ob sensus profunditatem. Hæc lassitudo accidit ut plurimum hominibus ad exercitia non adfueris. Sanatio scopos tres habet, quemadmodum omnia inflammata: superflui euacuationem, distentæ partis remissionem, & inflammationem refrigerationem. Oleum itaque multum dulce tepidum, & fricationes molliores, & in temperatissimis aquis mora diutissima, tales lassitudines sanant. Si uero etiam paulo tepidior fuerit aqua, magis his prodest. Ita uero & quies multa & assidue inuictio. Cibi dādi sunt his boni succi, uerum pauciores, & nihil omnino uiscosi habentes.

De lassitudine ob siccitatem ac gracilitatem.

Cap. xxxix.

Alia præterea est quarta affectio, similis quidem lassitudini, sed non est lassitudo, eo quod neque ulcerosam, neque tensuam, neque inflammatiuam affectionem habet, imò neque horrorem aliquem, neque dolorem, neque ad motus pigritiam similem lassitudinibus infert: uerum solam gracilitatem cum siccitate. Cōtingit igitur in boni succi & exercitatione utētibz corporibus, quum immodestius exercitata non probe recurata fuerint. Discutiuntur enim sic superfluitates, & laxantur distēta corpora. Et nihil reliquum sit in corpore præter siccitatem, quā ex immodica euacuatione habet. Quare etiā correctio huius affectionis in appositione ac repletione euacuatū cōsistit. Non potest autem hæc fieri, dum cutis rarefacta est. Proinde cutē contrahere oportet, ac densare, & adstringere. Contrahit autem & adstringit, tum frigida aqua, tum feruens. Ac a frigida periculum est ne homo lædatur, qui iam rarus simul ac uacuus ob exercitiorum copiam factus est. A feruenti uero nulla læsio, sed secunda densitas cuti accedit, ita ut etiā relictus in ipsa calor reuocetur ex feruentis aquæ solio. Vnde feruentius calidæ aquæ solium parandū est. Exsiliant autem ex ipso statim in frigidum, quo in ipsis maneat firmitas in cute una cum caliditate. Nam & in sequenti tempore minus discutiuntur, & alimentum facile in carnes & in cutem suscipiunt: quo bono nullum malus ipsis excogitare possis. Vitanda est autem longior in frigida solio mora. Exoluit enim frigida lotio, calidæ lotionis utilitatem. Prima itaque die lotus uelut dictum est, cibum accipiat boni succi & humidioris. Secunda uero recuretur, modicæ simul ac mollis & lentæ frictionis usu, & solio calido. Atque hoc faciat consequenter per multos dies.

De lassitate ex uenere.

Cap. xli.

Debilitas utriusque sequitur ad immodicum ueneris usum, præsertim in corporibus naturā debilibus. Rarefit autem ipsis & cutis, ex uehementi motu. Et plurima fit per transpirationem discussio ac exhalatio, & propterea siccitas. Aliquando uero etiā frigiditas consequitur, tum propter raritatem, tum propter caloris transpirationem ac sudores. Correctio igitur horum est per constringentia spissantiaque ac corroboranda cutem. De quorum numero est & moderatum exerci-

cium, & feruentius calidæ aquæ solium, quales item ac somnus multus. Edulia uero sint multitudinem quidem pauciora, qualitate uero humidiora, & moderate calidiora: quo & concoctio bona fiat, & siccitas ex lassitudine corrigatur.

De lassitudinibus spontaneis.

Cap. xlii.

Quum de lassitudinibus ex gymnasiis, aut ex itinere obortis dixerimus, nunc de his quæ sine uehementi motu sponte fiunt docebimus: tales enim morbosæ sunt, uelut etiam Hippocrati uidetur. Lassitudines enim, inquit, spontaneæ denuntiant morbos. Sunt autem, & harum tres differentię, ulcerosa, tensiua, inflammatoria.

De lassitudine ulcerosa spontanea.

Cap. xliii.

Spontanea igitur ulcerosa lassitudo, ob uitiosos humores clandestine coalitos fit, qui acres & tenues ac calidi sunt, ut corrodant & stimulent ac pungant corpuscula sensu prædita. Et quam diu quidem ipsi in uenis ammixti sunt sanguini, latet ipsorum uis a sanguinis bonitate superata. Vbi uero in carnes et cutē transumpti fuerint, & per mansionem confirmati, tunc ulcerosam affectionem ac sensum inducunt. Et tunc maxime in talibus augentur, quum moueri uolunt. Considerandum est autem in his, utrum in cute & carne sola uitiosi humores contineantur, aut etiam cum sanguine intra uenarum uasa. Horum autem signa habes ex urinis, & morfu circa cutem, & sudoribus. Quando enim una cum hoc quod etiam in urinis apparent uitiosi humores, sensus quoque ipsorum mordax circa cutē contingit, & sudores alieni, cum colore, tum sapore apparent, manifestum est quod & in uenis cum sanguine uitiosi humores continentur, & quod in cute sunt ac carne. Si quidem igitur modicus sensus uitiosorum humorum cōtingat, ieiunū hominem per totum diē seruabimus, quiescere ac dormire iussim. Deinde uesperī multū & pinguius illito, atque temperatissima calida lotio, paucissimum boni succi ac sordibilem cibum dabimus. Neque uero uinum prohibebimus: concoquit enim uinum semicrudos humores, si quicquam aliud hoc facit, & sudores ac urinas prolificat, & ad somnum cōducit. Si quidem igitur a prædictis quieuerit hoc symptoma, paulatim ad cōsuetam reducere hominē oportet. Si uero sequenti nocte ac postera die adhuc permanserit, aut auctum fuerit, uisandum est de auxilio fortiore. Nam tales ubi uires robustæ sunt, alterū ex duobus facere oportet, ut aut uenam secent, aut purgatione utantur, ita tamen ut decernas utro auxilio magis opus habent, uelut consequenter dicam. Sin uero debiles fuerint uires, minime secanda est uena. Purgandum uero moderate aut omnino non. Si quidem enim cum multitudinem sanguinis robustæ fuerint uires, uena secanda est, aut cōsuetæ excretionis suppressæ mouendæ: uelut sunt hæmorrhoides in sede, & in mulieribus lunares purgationes. At ubi soli uitiosi congregati sunt humores, citra sanguinis multitudinem, ad convenientem redundanti humori purgationem uentendum est. Affligit autem quandoque bilis amaræ humor, aut atre, quandoque pituita salsa aut acida, aut serosi humores. Siquidem igitur uelociorē uitā habuerit homo, et cibus crassi succi usus fuerit, & præsertim in hyme, pituitosus humor colligitur. Verum in pluribus laboribus & cibus acrioribus, & in æstate, amara bilis coaceruatur. In autumno uero, & edulij eiusmodi, ac laboribus

horibus diuturnis, atra bilis. Horum uero notas sumere oportet, & ex colore, & ex hominis motibus, & ex urinis ac sudoribus, & ex siti ac ciborum appetentia. Proinde sanguine prædominante reliquis humoribus, una cum uiribus robustis, uenam secabis. Si uero uitiosi humores prædominantur, & uires robustæ sunt, purgatione cōueniēti utemur. At post uenæ sectionem aut purgationem, nutrire oportet hominem edulijs boni succi quæ exterforium quid habet, uelut est ptisana: & quæ nulla uiscositate prædita sunt, neque crassi succi sunt, neque multum nutriunt. Utendum est & balneis temperatissimis, & unctione ac frictione moderata. Sed & reliqua diæta ac cura sic facienda est, uelut relatum est in lassitudine ex gymnasijs generata. Si uero bonus sanguis paucus fuerit, crudi uero humores omnino multi, uires autem debiles; Neque uena secanda est, neque purgatione, neque exercitio utendum; Imò neque omnino motu utendum est, neque lauandum; Nam uenæ sectio bonum sanguinem euacuat, uitiosum autem, qui sanè in magnis uenis circa hepar & mesenterium congregatur, ad totum corpus trahit. At purgatio in his tormina ac morsus efficit, & animi deliquia intèra, ad hoc quod nihil memorabile euacuat. Crudi enim humores omnes pigri sunt ac ægre mobiles, ob crassitudinem ac frigiditatem. Itaque obturant omnes arctas uias, per quas oportet id quod in purgationibus euacuatur ad uentrem accedere ac inferri. Et ob hanc causam neque ipsi euacuantur, & alios impediunt. Ob eandem uero causam neque exerceri, neque omnino moueri, neque lauari hos conuenit. Omnes enim tales motus humores in totum corpus ducunt, & angustos transitus obturant. Seruandi igitur sunt in omni quiete, & danda edulia potusque ac pharmaca attenuantia ac secantia, & crassitudinem humorum confidenda, citra manifestam calfactionem. Nam humores quomodocunque fortiter calfacti, undique per corpus meant. Utantur igitur in uictu aceto mulso præsertim, aliquando & ptisana: Aliquando uero danda est & aqua mulsa. Possunt enim ferre tenuem diætam, si qui alij idem possunt, propter subiectam crudorum humorum multitudinem. Quandoquidem uero præcordia omnibus talibus eleuata sunt ac inflata, & facile sanè inflantur, quicquid tandem ingesserint: præstiterit ipsis dare cum cibo modicum piperis, præsertim longi. Mellus fuerit & dispolutico uti medicamento. Commodissimum est autem ipsis acetum mulsum, ex solo optimo melle & aceto præparatum; ut sint mellis quidem despumati partes due, aceti uero pars una, plus minus. Præstat enim ex accipientium sensu modum iudicare, non nostris commoditatibus. Nam quod naturæ iucundum est, hoc commodum est. Quod uero infucundissimum est, id maxime aduersarium est. Prodest talibus etiam apomeli, & præsertim aridum factum. At ubi iam attenuati aliquantulum fuerint humores, etiam uinum dandum est moderatum, album ac tenue. Sed & in apomelite ac aceto mulso coquendum est aliquando hyssopum & pulegium. Edulijs uero utendum attenuantibus, citra uehementem calfactionem: qualis est capparitis ex aceto mulso, aut ex aceto & oleo. Postquam uero omnia perfecte bona tibi apparuerint, tunc ad familiarem uictum paulatim reducere conare, ita ut mo-

deratis exercitijs utantur, & balneis, & unctionibus. Idoneum est autem ipsis unguentum lassitudinem eximens ex abiete paratum, itemque quod ex populo nigra fit, quorum præparandi modum inter Acopa uocata referemus. Congruum est ipsis & oleum chamæmelinum, & anethinum. Item sampsuchinum tempore hyberno, Sampsuchinum uero oleum sic præparatur. Coquitur sampsuchus in duplici uase cum oleo. Similiter coquitur & rosmarinus herba. Si uero hæc non habeas, radicem cucumeris syluestris, aut alihæa, aut bryoniæ, aut betæ albæ accipe, & cum oleo coque, multum enim discutunt.

De lassitudine tensiua spontanea. Cap. XLIII.
Tensiua spontanea lassitudo, si sine exercitijs, aut alio quodam motu excitata fuerit, multitudinem nimirum humorum indicat, qui nimia copia solidas animantis partes distendunt, & præsertim musculorum fibras. Vlcerosus sensus non est in hac lassitudine, sed neque tumor alicuius partis sub tactum aut uisum cadens. Verum solum grauitatem & distentionem percipiunt. Manifestum est autem quod sanguine redundante, optimum auxilium est uenæ sectio in cubito. Possunt & uenæ in talis secari. At uero post totius corporis euacuationem, ad distectarum partium laxationem procedendum est, per unctiones ac frictiones molles, otiumque ac quietem. Et utendum est balneis temperatis, & cibis citra mordacitatem exterforium quiddam habentibus, qualis est ptisana, & apomeli, & consimilia. Et ut in summa dicam, post uenæ sectionem eadem cura uti oportet, quæ relata est ante ad tensiuam lassitudinem ex gymnasijs exercitijs obortam.

De lassitudine inflammatoria spontanea. Cap. XLIIII.
Inflammatoria lassitudo quum sponte citra aliquem motum oborta fuerit, tum propter doloris magnitudinem, tum propterea quod cum manifesta inflammationum partium caliditate consistit, coeleuans musculos in tumorem, neque paucarum horarum, nedum dierum duorum aut trium moram ac dilationem tolerat. Sed statim febrem uehementissimam inducit, nisi quis sanguinem detrahendo præueniat. Calidissimus est enim talium sanguis, & plurima opus habent ipsius euacuatione, omnes ferme ab hoc malo apprehensi, & plerique ipsorum etiam post uenæ sectionem febriunt. Quare neque cunctari, neque parum detrudere conuenit. Sed & cito euacuare, & usque ad animi deliquium ducere, si nihil aliud amplius impedierit. Præstat autem & detractionem repetere in eadem die, ita ut in priore euacuatione homo non animo linquatur. In posteriore neque ferendum est animi deliquium. At quibus hoc modo affectis uena secta non fuerit, aut sponte aliunde sanguis eruperit, hi bona fortuna opus habent ut seruentur, & neque seruantur. Si quidem igitur in capite & collo dolores magis hæserint, humeralem appellatam uenam secare oportet. Si uero thoracem & dorsum & lumbos doleant, internam uenam secabis. Sin æqualiter totum corpus, mediam. Si quidem igitur à uenæ sectione febris permanserit, curationem facere oportet, quam in febrium tractatione referemus. Si uero sine febre maneant, in prima quidem die à uenæ sectione, ptisanæ succus aut alicæ solum dandus est. Similiter autem & secunda. Si autem & in tertia die sine febre manet, etiam lauato & largo oleo inungito.

inungito. Etiam si autem laueris, moderatum tamen uictum exhibebis ex lactuca, aut si ea non adsit, cucurbita: & alitum uelut prisanam coctam. Sed & beta, & malua, & atriplice utendum est, si non adsit lactuca. Ex piscibus dandi sunt petrosi, & asellus ex albo iure probe coctus. Utatur aquæ potu. Aquæ potum dico, non frigida aquæ potionem, sed calidæ. Post tertiam si tolerabilis manet æger, inspergere oportet in potum, uini parum albi ac tenuis, & de cætero pro ratione reficere, per boni succi & neutiquā calfacientis diætæ usum.

Quali curatione ad frigiditates utendum est.

Ex Herodoto. Cap. XLV.

Duplex est frigiditatis curandæ modus. Nam & futuram frigiditatem præcauere oportet, & corrigere iam factam. Quo igitur non capiatur frigiditas is qui in frigido aëre uersaturus est: neque famem tulisse, neque præuomuisse oportet, neque crudelitatem pertulisse, aut fatigatum esse, aut crapula impletum esse. Frigiditas enim consequens ad ciborum crudelitatem, morborum causa est. His uero qui famem pertulerunt, frigiditas ad ipsos nervos penetrat, qui nudi quodam modo sunt, & propria materia priuati. Quapropter qui in frigido aëre uersabitur, totum corpus nardino aut gleucino oleo præinungere debet. Plantas autem pedum, cerato ex laurino parato illinere. Aut ipsas lauri baccas cerato exdpi, ac utere. Verū ex ueteribus quidam succum cyrenaicum milij magnitudine, in talibus necessitatibus deuorandum dederunt, cera oblitum. At uero à conuersatione in frigido aëre, desidere non oportet, sed ambulare prius in tepidiore loco. Et postea ad balneum ingredi, & in calida aqua diutius morari. Non præsentem uero balneo, ad ignem corpus illinendum est, ac confricandum diligentius tum per seipsum, tum per alios. Deinde accipiendus est cibus calidus potentia & actu. Vinum uero neque ualde acerbum, neque nimis uetus dandum est. Tale enim nervosas partes offendit, iam à frigore uexatas, & præsertim uescicam ac renes. Si uero sequenti die frigiditas perseueret, curatio per balneum aut inunctionem conuenit. Et diætæ consimilis, & acopa ex oleo gleucino & amaracino ac similibus præparata.

Cutis densata curatio. Galeni. Cap. XLVI.

Densatur aliquando cutis, tum per uehementem frigus, tum per balnea aluminosarum aquarum, aut aliquid humilemodi. Fieri potest autem ut & post balneum, & post sudores, aut alio quodam modo rarefacta ac frigefacta cutis densetur. Cognoscitur affectio calore albidior quam pro natura, & cutis ariditate ac densitate, & quod sic affecti in exercitijs ægre calefiant. Neque enim sudant, neque bonum colorem habent. Si uero etiam à plurimis exercitijs coacti sudauerint modicum ac frigidum sudorem excludunt. Sanatio horum est calfactio & cutis rerefactio. Utendum igitur est exercitijs, & balneis calidioribus. Præstat autem in prima balnei domo super leui lapide sedentem perfundere. Vngantur etiam oleo quopiam laxatorio, uelut est quod dulcissimum est, uerum duorum aut trium annorum. Utantur & lauacro natationi apto, calido, temperato diutius. In frigido uero ne immorentur. Neque uero aqua sit ualde frigida, Vbi uero induere se uolunt, inungantur aliquo moderatè calfaciente, quale est anethinum aut cidnum. Ex

ungentis uero gleucinum, aut fusinum, aut irinum, aut amaracinum. Cibis porro utantur moderatis, nihil uiscosi habentibus.

Quomodo curandus sit æstuosus ardor. Herodoti.

Cap. XLVII.

Quemadmodum frigiditas famelicos magis lædit, sic ardor repletos. Quare qui in æstiuo sole uersari uolet, repletionem & acrum esum uitet, uinositatem item ac crudelitatem. præhumeſcet autem corpus balneis potabilium aquarum, & cibis humectantibus. prospiciendum est & in mora ipsa sub sole, ut caput tegatur leuiore aliquo uestimēto, aut folijs uitis, aut myrti, aut polygoni. Si uero sitis uehemens orietur, non acruatim ingerendus est frigida potus. Plurimis enim hinc præterfusio aquæ inter cutem contingit. Alijs uero ad ardentem pulmonem aquæ frigiditas illapsa, tusses & grauedines excitat, aliquibus etiam tabem. Præstat igitur prius faciem frigida proluere manusque ac pedes, deinde colluto ore paulatim ex interuallis absorbere. Postquam autem discessit à sole, temperata calida se lauet, & in frigida natet. Si uero non adsit balneum, aqua & oleo, aut aqua & rosaceo totum corpus humectetur, & mollibus manibus præfricetur, & tunc in frigidam insiliat, præsertim si asuetus fuerit. Si uero nihil tale adest, aqua perfundatur. Postea potus quidem sit aqua. Edulia uero, lactuca, intyba, cucumis, cucurbita. Vinum quoque dilutius solito sit. Obsonium pisces delicati, domestica gallina ex iure albo. A coitu uero abstineat. At ubi caput uehementer calfactum est, aut stomachus adhuc exardet, ut alba & glutinosa sit saliuæ, ut uix sputo reiici possit, & reliquum corpus pigrum apparuerit, ac uelut exolutum: caput rosaceo frigidum est, aut rosarum succo cum oleo omphacino, aut polygoni succo, aut pampinorum uitis, aut intubi, aut allicius similis succo. Totum uero corpus humectandum est aqua & oleo, aut aqua & rosaceo. Super stomachum autem molle linteolum imponendum uino & oleo imbutum. Aut ceratum rosaceum, aut melinum quod absinthium habet aut portulacam. Optimum est autem & absinthij cremorem bibere, ad detergendas biliosas & acres in uentre congregatas superfluitates. Conducit & rosaceum absorbendum dare ad cyathi unius mensuram.

De matutina frictione. Galeni. Cap. XLVIII.

Matutinam frictionem assumimus post superfluitatum excretionem, excellenter quidem mollē in plus iusto reſiccatis, & in his qui in uehementi frigore uersari uolent, & quibus propositum est frigida lauari, & qui lassitudinis sensum habent, & in quibus cutis densitatem corrigere uolumus cum largo oleo. At uero densitatem ex frigore obortam sanamus, primum quidem siccarum & asperarum frictionum usu, deinde frictionibus ex oleo calido. Ad raritatem uero cutis obortam ex balneis, aut frictionibus, aut ob ueneris usum, paucis quidem siccis frictionibus utimur, paucis uero etiam post ipsas, ex oleo frictionibus, & eo quopiam ex adstringentibus. Cæterum humiditates ex multo potu obortas solæ siccæ frictiones curant, per lintea factæ, citra pinguitudinem, aut cum aliqua ex discussoria uel prædictis.

De uespertina frictione.

Cap. XLIX.

Vespertina frictio lassatis, aut reſiccatis, aut alimētum non

non sentiētibz cōmoda est. Prandium in his parcius fiat, & amplius tēpus intercedat usq; ad cōnā, & plerūq; in quiete. Deinde etiā paululū deābulent. Melius enim est si subductis cibis etiā uentrē exonerauerint. His ita factis, citra periculū frictio assumitur. Frictio fiat cū oleo dulci, uentre penitus nō cōtacto. Periculum est enim & ipsos cibos prius cōcoqui, & semicoctum aliquem humorē digerī, & caput perturbari, & stomachum subuerī. Quare nardino ungento uenter perfundendus est absq; defrictione.

De cruditate.

Cap. I.

Quot modis cruditas fiat, & quomodo uariē resistere oportet oborientibus ex hac corpori detrimētis, in loco de alui affectionibus postea declarabitur. Nunc uero necessarium est dicere quomodo ad urgētia accidentia instare oportet. Ructu itaq; accedente ac irascante, & grauitate circa prēcordia existēte, & ex hac molestia quadā in totum corpus se diffundente, non cunctandū est ad uomitum deuenire, sed aqua plurima tepida hausta cogendus est, ut cibi penitus excernantur. Vbi enim permāserint, & torminum, & dolorū, & grauitatis capitis, & destillationis, aliquādo uero etiā febris, causa fiunt. Si uero quis natura difficulter uomat, aut ob aliā quandam causam uomere impediat, elaborādū est omni modo ut cibus subducatur, & ex prēcordiis secedat. Ad hęc erectior decubitus paretur. Adiuvat enim, si quicquā aliud, concoctionē. Et si uigilans quis fuerit, propter nimiam expletionem somnū assequi non potens, is immotus permaneat, & eandē decubitus figurā conseruet. Nā assiduę conuersiones flatus parunt. Flatus autē materiam sursum uergere faciunt. Si uero perseverarit hoc accidēs, etiā pharmaci cōcoctorij ex malis cydonijs pręparati, cochlearij mensura danda est. Si uero quis aduersus sit ad frigide potū, & multam sitim percipit, non incongruū fuerit sincerę frigide heminam exhaurire. Celerrimē enim corroboratum os uentris, quę in aluo sunt expellit. At uentrē nardino ungento illinere oportet, & partes circa prēcordia fouere, & extremarū partiū frictione uti. Exonerata aluo ad deambulationē procedendum est, tarde progrediendo, ne uapores ex cruditate ad caput allati concutiantur. Postea uero ad consueta uitę munia pergendum est. Deinde succedat balneū, & inunctio ex oleo dulci. Vtilis est & absinthij potus. Cibo uero utendum est facile concoctili ac moderato, & cui addita sunt quę aluo commodant, uelut sunt erinacei & cancri. Deinde olera, beta, malua. Modicē utendum est uino, uerum calidiorē. A reliquis uero abstineat, uelut sunt acriū esus, & bellaria, ac placentę ex melle, & fructus dulces. Talia enim omnia ægre cōcoqui ac digerī possunt. Hinc autem somnus imperturbatus succedat.

De crapula. Philumeni.

Cap. LI.

Sed & cruditates ex uino obortas, quas crapulas uocant, ferē eodē modo tractare oportet, ita ut cogamus ipsos uomere a tepida aqua, aut sola immisione digitorū aut pennarū, & in lecto quiescere iubeamus, & turbationē somno sedemus. Et si quis sanē ad frigide potum aduersus sit, & stomachi ac uentris uexationem siue morsum perceptet, dādi sunt ipsi cyathi duo aut tres sincerę purę frigide aquę ex interuallis. Sedata uero turbatione, cibos exhibebimus boni succi, & magis frigefacientes. Potus autē sit modicus, uis

num album & tenue, dilutius temperatū. Optimus uero in his est uini absinthicę potus a balneo.

De equalibus intemperaturis. Galeni. Cap. LII.

Quū tractauerimus quomodo quis a prima etate usq; ad senectutem conseruet hominem optime constructum: transibimus nunc ad eos qui statim ab initio morbosam corporum constructionem adepti sunt. Duplices autem sunt secundum genus uitiosę corporum structurę. Quędam enim æqualiter habent temperatas uniuersas corporis primas partes, quę similes appellantur. Quędam uero inæqualiter. Dico autem æqualiter, quum ad aliquā intemperaturā immutatę fuerint omnes simul corporis partes, frigidiore quā conuenit, aut calidiore, aut sicciore, aut humidiores factę. Et per confugationem, quędā calidiore & sicciore, quędam humidiores & frigidiore, quędā calidiore & humidiores, quędā frigidiore & sicciore. Et sanē iuxta instrumentaliū partium compositionē, aliquę æqualiter, aliquę inæqualiter composite sunt. Vidi enim iam quosdā habere uentrem quidem frigidū, caput autem calidū: alios uero caput frigidū, uentrem uero calidū. Vidi autem & uentrē per accidens assiduē bile uexatum, qui non esset natura calidus. Quemadmodum etiam alium frigescentē, qui nō esset frigidus. Sic & caput, & hepar & splen, & omnes alię partes, fruuntur aliis quando alterius intemperatura, quū ipsę ex natura nihil læsę sint in propriū temperamentum, neq; contrario modo dispositę. Proinde de primis optimū temperamentū adeptis a me dicitur, quo hoc exemplum habeas quod temperatū est. Deinde de his qui æqualē intemperaturā habēt. Demonstratū est a me sæpe, impossibile esse unam aliquam intemperaturā diutius perseverare. Ipsa enim sibi ipsi necessariō aliā quandam asciscit. Illud porro nosse expedit, quod quęcunq; corpora morbosam structuram in prima natiuitate habuerunt, ea omnino non perueniunt ad senectutem. Si uero etiam peruenerint, unum quendam morbum diuturnū habent. Proposuius autē in hac tractatione de uitiosam structuram habētibus agere, considerantes quomodo quis ipsa conseruet ut plurimum sana. Prius uero referendę sunt temperamentorum notę, postea consequenter etiam in intemperaturarum correctiones.

Optimi temperamenti dinotio.

Cap. LIII.

Optimē tēperatus est homo quū corpore apparet extrēmē mediū inter omnia extrēmē disposita corpora, in gracilitate ac crassitudine, mollitie ac duricie, caliditate ac humiditate, siccitate ac frigiditate. Et, ut in summa dicā, si animales ac naturales actiones inculpabiles habuerit. Medio item modo se habuerit inter hirsuta corpora ac glabra, & inter nigra colore ac alba. Habuerit autem capillos, dum quidem puer est fuluiores, in uigore uero etatis flauiores.

Temperamenti calidi note.

Cap. LIIII.

Calidius quā conuenit temperamentū totius corporis, nūc dico illud quod proportionē secundū humiditatem ac siccitatē inculpabilē habet. Qui igitur ab initio talē corporis naturā adepti sunt, saniores alijs apparent, & articulata uoce loquuntur, & canūt, & citius gradiuntur. Augebitur autē ipsis caliditas pro annorū proportiōe. Iuxta uigorē autē etatis palam calidiores apparent. Quare morbis & accidētibus a flaua bile facile capiuntur: Nā multa caliditas paulatim

latim consumens humiditatem, siccius temperamentum efficit. Hi colore rubicundi sunt, & nigros capillos habent, progressu uero temporis etiam moderatè densos. Habentq; uenas amplas, sunt enim & graciles. Nam pingues & uenas amplas habentes, non natura pingues sunt, sed acquisitum temperamentum habent.

Temperamenti frigidi nota. Cap. LV.

Frigidum ad contactum est his corpus, depile, & pingue. Color autem una cum capillis, fuluor his est. Si uero multa est frigiditas, liuidi sunt & plumbei coloris, et angustas uenas habent. Si uero quis angustas habet uenas, & gracilis est, is necessario acquisitum temperamentum habet, & non ex natura gracilis est.

Siccioris temperamenti nota. Cap. LVI.

Aegrè mobile, & siccum, & squallidum in his sit corpus facillime ab omnibus siccantibus. Nam & natura excarnes sunt ac graciles. At cum hoc quod hi graciles sunt & excarnes, amplius etiam durum & asperum apparet tangendibus horum corpus. Gracilitas autem non solum ad naturales consequitur temperaturas, sed etiam ad acquisitas ex longa consuetudine succedit.

Humidiore temperamenti signa. Cap. LVII.

Humidius temperamentum in reliquis consimile est temperato. Verum mollius & carnosius. Nam molles ab humida temperatura separari non potest. Quemadmodum sanè & crassities non solum ad naturalem sequitur temperaturam, sed etiam ad eam quæ ex longa consuetudine facta est, succedit. Proprium autem est humiditatis etiam grauari corpus ab omnibus humectantibus.

Calidi ac humidi temperamenti nota. Cap. LVIII.

Mollius & carnosius est hoc, optimo temperamento. Vbi uero plurimum fuerit augmentum, putredinosis facile capitur morbis. Si uero paulò humidius, multò uero calidius fuerit, tales molliores sunt moderatis, & carnosiores, & non paulò calidiores. Nigri autem sunt ipsis capilli, & caro non pinguis. Si uero paulò calidius, multò autem humidius fuerit, mollis his & multa est caro, & color mixtus ex rubro ac albo: & ad contactum paulò sunt calidiores. Quò uero in summa dicam, in coniugatis temperaturis semper prædominantis qualitatis notæ præualent.

Calidi & sicci temperamenti nota. Cap. LIX.

Calidum & siccum temperamentum hispidius ac calidius est, & gracile. Capitis autem pilos boni habitus & nigros ac multos habet in iuuentute. Temporis uero progressu etiam caluities sequitur. At uenæ ipsius amplæ sunt, & arteriæ magnæ ac uehementissime pulsantes. Et sanum & firmum, & articulatum, & musculosum, & minime pingue totum corpus. Et eutem ipsam duriores ac nigriorem.

Frigidi & humidi temperamenti nota. Cap. LX.

Thorax his angustus est, & pilis nudus, quemadmodum etiam totum corpus. Cutis autem tenera & alba. Capilli subfului, præsertim in iuuentute, & senescentes non caluescunt. Sunt item timidi, & minime audaces, ac pigri, & obscuras habent uenas. Et crassi sunt ac pingues, & femoribus ac musculis infirmi & inarticulati, & fiunt blæsi. Quòd si frigiditas ac humiditas amplius augetur, color una cum capillis fuluus euadit. Si uero plurimum augetur, liuidus. At si inæquale fuerit qualitatum augmentum, eius quæ

magis aucta fuerit propriæ notæ prædominabuntur.

Frigidi ac sicci temperamenti nota. Cap. LXI.

Si uero frigiditas ac siccitas ex æquo fuerint auctæ, natura durum & gracile habent tales corpus, albumq; ac non musculosum, & inarticulatum, ac depile, & ad tactum frigidum, pinguitudo tamen ipsis etiam si graciles sint, per carnem disseminata est. Pili & color corporis pro mensuræ frigiditatis portione se habent. Porro quum calida & sicca temperatura, in tempore inclinatæ ætatis, sæpe transeat in siccam ac frigidam: habitus talium gracilis ac durus similiter fit, uerum melancholicus est. Et propterea colore nigriores ac hispidiores fiunt. Prædominabuntur autem semper prædominantis temperamenti notæ, obscuræ uero alterius notæ erunt.

De capitis dinotione. Cap. LXII.

Caput paruum quidem uitiosæ cerebri structuræ proprium signum est. Magnum uero non necessario bonæ. Si quidem enim propter robur insitæ uirtutis materiam multam ac bonam creantis factum est, bonum est. Si uero propter solius materiæ multitudinem, non bonum. Distinguendum uero de ipso tum ex figura, tum ex his quæ ab ipso ortum habent. Ex figura quidem, si fuerit concinna. Semper enim hoc signum bonum est. Ex his uero quæ ab ipso ortum habent, si ualidam ceruicem habet, & alijs ossibus optime dispositum est. Et si uniuersum ipsorum neruorum genus bene nutritur, ac robustum est. Et si oculi acri uisu fuerint præditi. At uero acuminata capita defectuosam circa occiput aut frontem eminentiam habent, aut ultra iustum modum auctam. Proinde ut plurimum sicut magna, ita etiam hæc capita uitiosa comperimus. Raro autem & ex his aliqua sunt, bona, efformatrice ipsorum uirtute fortè existente, & multitudinē materiæ bonam adeptæ. Nam qui acuminata capita habent, & ceruicæ ualida præditi sunt, hi tum alijs partibus omnibus, tum ossibus robusti sunt, ait Hippocrates.

Cerebri temperati nota. Cap. LXIII.

Temperatum cerebrum naturales actiones moderatas habet, itemq; superfluitates quæ per palatum, aut aures, aut nares purgantur; minimeq; ledetur ab omnibus extrinsecis quæ calfaciunt, & frigefaciunt, & siccant, & humectant. Talibus pili capitis dum infantes sunt, subfului sunt, pueris uero subflauī: perfectis autem flauī fiunt, medium quodammodo tenentes inter exactè crispas ac simplices. Nec uero facile caluescunt.

Cerebri calidioris nota. Cap. LXIII.

Si uero moderato calidius fuerit, uniuersa circa caput rubicundiora ac calidiora erunt, & oculorum uenæ conspiciunt. Pili his genitis cito in capite oriuntur, ubi multò sunt calidiores temperatis, nigri & multi, & crispī ac robusti. Vbi uero non multò, subflauī primum, deinde nigrescunt, & progressu ætatis caluescunt. Superfluitates in palato, & naribus oculisq; ac auribus, pauca his sunt ac matura, quum inculpate sani fuerint. Replentur autem capite maxime, quum incauta diæta utuntur, & grauantur à calfacientibus edulij, potibus, & odoribus, atq; omnibus forinsecus accidentibus. Et hoc magis adhuc, si non solum calida ex natura fuerint talia, sed etiam humida.

Frigidiore cerebri nota. Cap. LXV.

Superfluitates plures circa proprios meatus hi habent.

Capilli uero ipsis recti sunt & fului ac stabiles, & multo tempore à natuitate orientes, tenues ac macri primum. Et citò à frigidis causis læduntur, & iuxta ipsum læsionis tempus destillationibus ac grauedine corripuntur. Neque uero capitis partes ad tactū calidæ sunt, neq; rubicundæ apparent. Et oculorum uenæ inconspiciuntur. Et ipsi quodammodo somnolentiores.

Siccioris cerebri signa. Cap. LXVI.
Meatum à superfluitatibus puritas, & sensuum sinceritas, signum sunt talis temperamentum. Vigilantissimi uero sunt, & pilos robustos celerrimè ubi nascuntur producant, crispas magis quàm rectas. Citò uero canescunt.

Humidioris cerebri nota. Cap. LXVII.
Pili simplices, & omnino non caluescunt, & sensus caliginosi sunt & superfluitatum copia adest, & somni multi, ac profundus.

Calidioris & humidioris cerebri signa. Cap. LXVIII.
Si uero caliditati affuerit humiditas, utrisq; parum excedentibus modum, bonus color adest, & calor, & uenæ oculorum magnæ sunt, & superfluitates plures moderate maturæ. Et capilli recti ac sublaui. Et non facile caluescunt. Replentur autem & grauantur capite à calefacientibus ac humectantibus. Quum autem ad plurimam humiditatem ac caliditatem uenit, morbosum fit his caput, & superfluitatibus redūdās, & quod facile ab humectantibus ac calefacientibus læditur. Auster his ualde aduersatur, optime autem in aquilonarijs locis degunt. Neque uero uigilare possunt diutius, & ubi ad somnum seipsos conuertunt, simul sopore premuntur altiore, & uigilijs, & insomnijs uarias imaginationes obuersantes habet. Visum item habent caliginosum, & sensus non exactos. Si uero una temperatura fuerit intenta, notæ ipsius magis prædominabuntur.

Calidi ac sicci cerebri nota. Cap. LXIX.
A superfluitatibus puri sunt hi, & sensibus sinceri, ac uigilantissimi. Et citò caluescunt: prima capillorum generatio ipsis celerrima est, & probe nutritur. Sunt autem nigro ac crispo capillo præditi, & calidi ad capitis contactum, rubicundiq; usque ad uigoris tempus.

Frigidi ac sicci cerebri signa. Cap. LXX.
Frigidum ac decolor caput efficit hoc temperamentum, quantum in se est. Alterantur enim aliquando partes ipsius, ex humorum in toto corpore temperamento. Tales temperaturæ uenas oculorum latentes habent, & à frigidis causis promptè læduntur. Quare etiam inæqualiter sani sunt isti, aliquando quidem capite leuissimi, & meatibus à superfluitatibus puri. Aliquando uero destillationibus ac grauedine ob paruas causas corripuntur. Sensus ipsis sunt in iuuentute quidem sinceri, & per omnia inculpabiles. Verum progressu temporis citò contabescunt. Et ut in summa dicam, Omnibus capitis partibus citò senescunt, quare etiam citò caluescunt. Capilli ipsis geniti prodeunt quidem uix, uerum macri ac fului. Progressu temporis frigiditate prædominante siccitati, non caluescunt. Si uero siccitas obtinuerit dominium, parum hi caluescunt.

Frigidi ac humidi cerebri nota. Cap. LXXI.
Humidæ ac frigidæ cerebri temperaturæ soporosos faciunt & somnolentos, & sensibus uisidos, ac superfluitatibus redundantes, & quibus caput facile frige-

fiat ac repleatur, & qui destillationibus ac grauedine facile corripiantur. Tales tamen non caluescunt.

Ventris siccioris signa. Cap. LXXII.
Si citò siticulosi fiunt, & modicus ipsis suffecerit potus, & uberiore grauentur, & fluctuationes habuerint superfluitate ipsis innatante, & edulij siccioribus gaudeant.

Ventris calidioris nota. Cap. LXXIII.
Calidior uenter concoquit melius quàm appetit, & multo magis quæ dura sunt & difficulter alterantur. Quæ enim facile alterantur, in ipso corrumpuntur. Gaudet autem edulij ac potibus calidis, & neq; à frigidis læditur, si moderatus contigerit ipsorum usus. At uero calidorum forinsecus allabentium diuturnam conuersionem ferre non potest.

Humidioris uentris nota. Cap. LXXIIII.
Hi neque siticulosi fiunt, & ampliorem humorem contra molestiam ferunt, edulijq; humidioribus gaudet.

Frigidioris uentris nota. Cap. LXXV.
Frigidior natura uenter, bene quidem appetit, non autem bene concoquit, & præsertim edulia quæ ægre alterantur & frigida sunt. Facile itaq; in ipso accescit, & propterea ructum acidum habet. Et gaudet quidem frigidis, læditur autem facile immodico eorum usu. Atque ita etiam extrinsecus allabentium ipsi frigidorum diuturnam conuersionem ferre nequit. Cæterum ex morbo conflatur in uentre intemperaturæ in hoc differunt à naturalibus, quod contraria concupiscunt, non similia, uelut naturales. Si quidem igitur concoquit probe, temperatus est uenter. Si uero non concoquit, non omnino intemperatus est. Sed si quidē nidorosos ac fumosos efficit ructus, immodicus est ipsi ac feruens calor. Si uero acidus, uiceuersa. Sic etiam uentres qui ægre concoctilia probe concoquunt, immodicum calorem habent. Si uero ipsa non concoxerint, debilis est ipsorum calor. Considerandum est autem an ob aliquem humorem aliunde in uentrem confluentem, hoc ipsis contingat. Nam ad pituitosos humores, acidus ructus consequuntur. Ad biliosos uero, nidorosi aut uirosi, aut alia quædam peregrinæ qualitates. Communia autem accidentia omnium redundantium in uentre humorum sunt nausæ. Verum si quidem in uentris amplitudine humores innatarint, supernatabunt in his quæ per uomitum reijciuntur. Si uero in ipsis uentris cuniculis impacti fuerint, frustra lancinabunt per inanes nausæ, ita ut nihil uomitu reijciatur.

Pulmonis nota. Cap. LXXVI.
Non solū uenter siticulosos & non siticulosos facit, & frigidi ac calidi potus appetentes. Sed etiam thorax, cor, & pulmo. Verum qui propter horum caliditatem sitiunt, plus inspirant, & amplius ac diutius essant. Perdpiunt autem æstum in thorace, non circa præcordia siue hypochondria Græcis appellata, quæ admodum qui propter uentrem siti uexantur. Et sane ubi bibunt, non statim quiescunt: & frigidus potus magis ipsorum sitim sedat, quàm multus calidus. Refrigerat autē ipsos & frigidus aer inspiratus, qui ne alleuiat quidem propter uentrem siticulosos. Sic uero etiam frige factum thoracem habentes, à frigida inspiratione sensibiliter læduntur. Et maxima est hæc frigidi pulmonis nota. Quemadmodum autem frigidum aerem inspirantes, palam sentiunt molestiam ac frigiditatem: sic calidus ipsis est gratus. Sed & pluitosus

tuitosas superfluitates hi cum tussi reijciunt. At pulmonis siccitates superfluitatibus carent, & uocem puram habent. Quemadmodum humiditates obscuræ & raucam uocem efficiunt, & ubi amplius aut acutius loqui uolunt, superfluitates ipsis incurrunt.

Cordis calidioris nota. Cap. LXXVII.

Magnitudo respirationis, & pulsus uelocitas ac densitas, calidioris cordis notæ sunt, audacitas ac uelocitas ad actiones obeundas impigra. Si uero amplior fuerit caliditas, excandescencia & furiosa temeritas. Est & thorax ipsis hirsutus, & maximè pectus, & præcordiorum partes thoraci uiciniores. Vt plurimum uero & totum corpus calidius fit ex calido corde, nisi hepar magnopere reluctetur. Sed & thoracis amplitudo, caliditatis signum est, nisi etiam hic magnopere cerebrum resistat.

Frigidioris cordis nota. Cap. LXXVIII.

Pulsus sunt moderatis minores, non tamen tardiores necessarii, aut rariores. Timidi uero ex natura sunt tales, & socordes, ac minime audaces, & pectus pilis nudum habent.

Siccioris cordis nota. Cap. LXXIX.

Pulsus sunt duri, & animi conditorem non facilem, sed feram & ægre sedabilem tales habent. Et ferme totum corpus his siccus est, nisi hepar reluctetur.

Humidioris cordis signa. Cap. LXXX.

Pulsus molles, & mores ad iram procliuēs, ac facile sedabiles. Et totum corpus humidius, nisi hepar resistat.

Calidi ac sicci cordis signa. Cap. LXXXI.

Pulsus duri & magni, & ueloces ac densi, & respirationes magnæ ac ueloces & densæ. Et sane multo magis uelocitas ac densitas ipsarum augetur, si thorax ad proportionem cordis responderit. Hi omnium maximè pectore hirsuti sunt, & circa præcordia. Ad actiones uero expediti, & animosi, & tyrannicis moribus præditi, & celeres ad iram, ac pertinaces in ipsa.

Calidi & humidi cordis nota. Cap. LXXXII.

Si uero humiditas una cum caliditate dominetur, minus quidē prædictis hi hirsuti sunt, nihil uero minus ad actiones expediti. Verum non adeo ferus est ipsis animus, sed ad iram solam sunt procliuēs. Pulsus uero molles sunt & magni, & ueloces ac densi.

Frigidi & humidi cordis nota. Cap. LXXXIII.

Pulsus molles sunt. Mores minime audaces, ac timidi, & pigri. Sunt autem hi pectore pilis nudo, & minime furiosi fiunt. Nam neque ad iram procliuēs sunt. De thorace ac toto corpore similiter uelut in superioribus distinguendum est.

Frigidi ac sicci cordis nota. Cap. LXXXIII.

Pulsus duri & puri: Hi omnium maximè ab ira alieni sunt. Coacti tamen ad irascendum, in ira perseverant. Sunt autem pectore omnino depiles.

Hepatis calidioris nota. Cap. LXXXV.

Venæ amplæ, flaua bilis copiosior. Tempore uigoris etiam nigra. Calidior est ipsis sanguis. Et propterea etiam totum corpus, nisi cor resistat, præcordia & uenter hirsuta sunt.

Frigidioris hepatis nota. Cap. LXXXVI.

Angustia uenarum, pituita copiosior, & sanguis frigidior, & totius corporis habitus frigidior, nisi à corde calefiat. Præcordia & uenter his pilis nuda sunt.

Siccioris hepatis signa. Cap. LXXXVII.

Sanguis crassus & paucus, uenæ duræ, & uniuersus

corporis habitus siccior.

Humidioris hepatis signa. Cap. LXXXVIII.

Sanguis copiosior & humidior. Venæ molliores. Sic & totum corpus, nisi cor reluctetur.

Calidi ac sicci hepatis signa. Cap. LXXXIX.

Præcordia hirsutissima. Sanguis crassior ac paucior. Amara bilis plurima. Iuxta uigorem etiam atra. Venarum amplitudo ac durities. Sic & totum corpus calidum ac siccum. Nam caliditas ex corde proficiens, frigiditatem ex hepate proficiscentem superare potest. Quemadmodum etiam frigiditas cordis, caliditatem hepatis superare potest. At siccitatem hepatis, cor humidius ad contrarium transmutare non potest. Quare manifestum est quod ubi amborum temperatura in idem concurrerint, totum corpus exactè iuxta illas afficitur.

Calidi ac humidi hepatis nota. Cap. XC.

Minus quidem quam calidum ac siccum præcordia hirsuta facit. Verum plurimum sanguinem & uenas magnas habent tales. Et habitum humidum ac calidum, nisi cor resistat. Si uero amplius utriusque qualitatibus naturalem modum exceßerit, facile capitur morbis, putredinis ac mali succi, atque hoc adhuc magis, si amplius aucta fuerit humiditas, paululum uero caliditas. Si uero ulceuerit, modicè aucta fuerit humiditas, plurimum uero caliditas, uitioli humores minime gignuntur.

Frigidi & humidi hepatis nota. Cap. XCI.

Depile habet præcordium, sanguinem uero operatur pituitosiorē, una cum uenarum angustia. Et corpus totum frigidius ac humidius, si non à corde ad contrarium transferatur.

Frigidi ac sicci hepatis nota. Cap. XCII.

Frigidum ac simul siccum hepar, corpus modici sanguinis, & angustarum uenarum facit, atque frigidius. Præcordia uero pilis nuda talibus sunt, nisi & hic cor superarit.

Testium temperamenti signa. Cap. XCIII.

Calidum testium temperamentum uenericum est, fecundumque ac masculorum generatum. Et citò hirsutus facit genitales partes, & circumscissas moderatè. Frigidum uero uice uersa. Humidum autem multo & liquido semine abundat. Siccum uero paucum & moderatè crasso. At calidum & siccum, crassissimum seminis est ac fecundissimum. Et celerrime ad coitum stimulat animal statim ab initio. Tales etiam celerrimè hirsuti fiunt circa genitales partes, & omnes circumcirca sitas, sursum usque ad umbilicum, deorsum usque ad media femora. Coitatum quidem igitur est tale temperamentum ad uenerem, uerum citissimè satiatur, & si cogatur læditur. Si uero humiditas ad caliditatem accedat, minus quidem hirsuti sunt hi, sed plus seminis habent. Non tamè magis alijs appetunt, sed multè ueneri minore detrimento sufficiunt. Si uero & humiditas & caliditas multum fuerint simul auctæ, ex ueneris abstinencia magis læduntur. At si testes humidi ac frigidi temperamento fuerint, partes circumcirca pilis nude sunt. Et tarde rem uenericam agere incipiunt, & neque ad actionem procliuēs sunt. Aquosum autem & tenue est ipsis semen & infecundum ac foeminarum generatum. Siccum autem & frigidum temperamentum, prædicto quidem in reliquis simile est. Crassius est autè ipsis semen, & omnino modicum. Porro quicunque totum

k a scrotum

scrotum cum testiculis laxatum habet, & uelut exolutum, hi uiribus ut plurimum sunt debiliores. Qui uero contractum habent scrotum una cum testibus, & uelut adstrictum, robustioribus uiribus ferme praediti sunt. Et huius rei signa sumi possunt ex omnibus quadrupedibus animantibus.

Calidorum temperamentorum correctio. Cap. xciii.
Quandoquidem in calidis intemperaturis biliosa spiritus redundat: considerare in his oportet, utrum subito ipsis bilis cum secessibus ac excrementis alui, aut ad supernum uentrem procedit. Si enim subito, nihil moliri oportet. Si uero ad supernum uentrem fertur, per uomitus euacuare a tepidae aquae potu. At si aegre uomant, uinum dulce tepidae aquae permixtum bibendum dato, atque sic uomant. Exercendi autem sunt exercitio non ueloci ac concitato, sed tardiore ac molliore. Quidam uero ex uehementer calidis omnino non opus habent exercitijs. Sed sufficit ipsis deambulatio, & balneum, inunctis oleo cum mollibus manibus. Hi etiam post cibum balneis gaudent, & alii qui ipsorum crassefacti sunt ob talem dietam. Vinum his conuenit aquosum, tenue & album. Nam fulua calida sunt, item ualde uetusta. Quare his ualde aduersantur. Attendendum est autem in omnibus qui post cibum lauantur, ne hepar affectum sit: Extreme enim laeduntur tales, si post cibum lauentur. Qui uero cum siccitate calidi sunt, circa aetatis uigorem maxime opus habent humida dicta ex edulis ac balneis, & concitatorum ac multorum exercitiorum abstinentia. Quare aestatis tempore citius lauentur, & post cibum rursus, nisi aliquod ex uisceribus affectum fuerit. Proderit his & frigidae potus, si nihil impenderit. At siccioribus temperamentis ualde aduersatur uenus. Abstineant item ab ardore, lassitudinibus, uigilijs, curis, & omnibus motibus acutis. Biliosi uero ira perciti exardescunt, & in acutas febres incidunt. Verum excessus quantitatem considerare oportet, & pro portione aucti caloris, augere etiam frigescentem ac humectantem uictus rationem.

Frigidi intemperamenti medela. Cap. xciv.
Quicumque frigidioris natura sunt, circa siccum uero temperamentum ac humidum moderate se habent, minus uiciosi sunt ad corporis robur ac sanitatem. Excitare igitur oportet ac corroborare ipsorum caliditatem. In humiditate uero ac siccitate totius dietae medium eligere.

Humidi intemperamenti correctio. Cap. xcv.
Humidae naturae in puerili aetate fluidis & plenitudinis morbis corripiuntur, & insuper putredinosis. Opus igitur habent pluribus exercitijs, & exacta in uentre concoctione. Nam cibi qui in hoc corrumpuntur, putredinosorum morborum materia fiunt toti corpori. Quapropter ante cibum hi loti, & naturalibus calidis aquis utentes, magnam opem sentiunt. Scopus enim in ipsis est ipsas corporis partes humidas seruare. Atque hoc commune est omni temperamento. Nam contrarium, ipsa inquam siccitas, omnium animalium corpora citius ad senectam perducit. Quare

re si quidem possibile esset semper conseruare humidum temperamentum corporis, uerus profecto esset philosophiae Philippi sermo, qui obedientem ipsi immortalē fore promisit. proinde diutissime uixerit, qui minime resiccat. Quum autem humida dicta superfluitates & humorum multitudinem generet, difficile est congruam tenere proportionem, ut neque morbis corripiantur, neque cito senescant. Quantum igitur ad temperamentum attinet, qui humidissimi sunt, diutissime uiuunt. Et sane etiam plus alijs sani sunt, ubi corpus fuerit corroboratum: quemadmodum etiam robustissimi sunt omnium eandem aetatem habentium, usque ad extremam senectutem. Et propterea laudatur hoc temperamentum ab omnibus fere medicis ac philosophis, qui corporis elementa exacte cognouerunt. Et quidam solum hoc naturale esse putauerunt. Melius enim alijs progressu temporis euadit, quam ab initio sit deterius. Quare qui tali corpori corrigendo praefectus est, ea quae desunt ipsi prouidere debet, per exercitia ante cibum fienda, & balnea ac cibos idoneos: & per plures excretiones tum per urinas, tum per uentrem contingentes. Nihil autem uetat & apophlegmatismis pituitam a capite trahentibus uti, & purgationibus tempestiuis: & praeter omnibus, edulis boni succi, & uini urinam prouocantis potu.

Sicci intemperamenti medela. Cap. xcvi.
Balneum siccis corporis temperaturis omnibus commodissimum est. Temperata autem sit & dulcissima aqua. Et si bis aut ter in die lauentur, magis conferet. Sed & uniuersa dicta humectans sit. A lassitudine uero & curis ac uigilijs abstinentum est.

Calidi ac sicci intemperamenti curatio. Cap. xcvi.
Calidum ac siccum temperamentum varijs curationibus subiacet. Non tamen inuicundus est similiter frigescentium usus. Nam iuxta siccas dispositiones necessarium est, non solum uicinas uentris partes, sed etiam totum corpus gracilius fieri.

Humidi ac calidi intemperamenti medela. Cap. xcix.
Quod si humida intemperatura est cum caliditate, adstringendum eduliorum usus utilis est. Sunt autem haec austera citra caliditatem. Et sane etiam frigidus potus ipsis commodus est.

Humidi ac frigidi intemperamenti sanatio. Cap. c.
Humidi uero cum frigiditate temperamentum, optimae medelae sunt omnia acris ac calida. Misceatur autem ipsis etiam acris, citra manifestam frigiditatem. Optima item medela est his modicus potus. Sic autem uinum calidum fortiter & adstringens, ac ualde uetus. His uero etiam ea quae forinsecus adhibentur proportionem respondeant.

Frigidi ac humidi intemperamenti curatio, frigiditate predominante. Cap. ci.
At si frigiditas humiditatem superauerit, uiciosae fiunt tales temperaturae, & haec maxime fluidis morbis corripuntur. Prodest autem ipsis illuies, & exercitia pura, & ratio uictus attenuans, & unguenta moderate calefacientia.

INDEX EORVM QVAE IN

QVINTO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

*

Quod oportet medicū naturę operum gnarum esse. Cap. I.
 Quod citra prænotionem morbi, fieri nequit ut probe cures. cap. II.
 Que sint bona signa. cap. III.
 Que sint mala signa. cap. IIII.
 Que prima dies totius morbi dicenda sit. cap. V.
 Principium morborum trifariam dici cap. VI.
 Quid est febris. cap. VII.
 Quid est exacerbatio. cap. VIII.
 Quid est remissio. cap. IX.
 Remissionem dupliciter dici. cap. X.
 Quod est principium febrilis accessio- nis. cap. XI.
 Augmenti particularis exacerbationis signa. cap. XII.
 Vigoris particularis exacerbationis signa. cap. XIII.
 Declinationis particularis exacerba- tionis signa. cap. XIII.
 Quod est principium totius morbi. cap. XV.
 Quod sit augmentum totius morbi. cap. XVI.
 Vigoris totius morbi cognitio. cap. XVII.
 Declinationis totius morbi cognitio. cap. XVIII.
 Quod declinatio totius morbi in iudica- tionibus consertim fientibus, sensum nostrum aufugit. cap. XIX.
 Quod seruandus aeger quatuor tempo- ra totius morbi pertransit. cap. XX.
 Vtrum tardius aut citius morbus iudi- cetur. cap. XXI.
 Quomodo prænoscere oportet, an iudi- cabitur morbus, aut non, & quan- do. cap. XXII.
 Future iā iudicationis signa. ca. XXIII.
 Quomodo prænoscere oportet, bo- na ne an mala iudicatio futura sit. cap. XXIII.
 Qui sint boni indicatorij dies & qui ma- li. cap. XXV.
 In quibus ambigua est dies principij morbi, & nulla præiudicatiua facta, derepente contigit iudicatio, quo- modo ambigua inuenire oportet. cap. XXVI.
 De notis ex pulsibus. cap. XXVII.
 De urinarum notis, & primum que sit naturalis. cap. XXVIII.
 Qualis urina optima in ægrotis. cap. XXIX.
 Quod non omnis alba subsidentia bonum significat. cap. XXX.
 Quid indicet tenuis & pallida urina.

cap. XXXI.
 Quid indicet tenuis & fulua. cap. XXXII.
 Quid indicet rufa urina. cap. XXXIII.
 Vrina tenuis micta, & postea turbata. cap. XXXIIII.
 Vrina crassa micta, & crassa manens. cap. XXXV.
 Vrina crassa micta, & postea desidens. cap. XXXVI.
 Vrina tenuis micta, & talis manens. cap. XXXVII.
 Differentie urinarum oleosarum, & quid significant. cap. XXXVIII.
 Quid significant eruiue subsidentie. cap. XXXIX.
 Quid indicent fursuraceæ subsidentie. cap. XL.
 Quid indicent lamineæ subsidentie. cap. XLI.
 Quid indicet polentaceum in urinis. cap. XLII.
 Quid indicet graecolens urina. cap. XLIII.
 Vrina nigra quid significet. cap. XLIII.
 De egestionum notis. cap. XLV.
 De egestionibus indicatorijs. ca. XLVI.
 De uomitus prænotione ac significatio- ne. cap. XLVII.
 De eruptionis sanguinis ex narib. præ- notatione ac significatiõe. ca. XLVIII.
 Quod & per hemorrhoidas, & mulie- bres purgationes sepe soluitur mor- bus. cap. XLIX.
 De significatione ex sudoribus. cap. L.
 Abscessuum signa indicatoria. cap. LI.
 De sputorum significatione. cap. LII.
 Signa perfecte ac fideliter soluti morbi. cap. LIII.
 Signa morbi non perfecte soluti. cap. LIV.
 Prænotio diei quæ moriturus est aeger. cap. LV.
 Quod etiā hora mortis ægri prænosce- re possit doctus Medicus. cap. LVI.
 In acutis morbis mortem non esse præ- dicendam. cap. LVII.
 Februm diuifio, & de diarijs febribus. cap. LVIII.
 De diarijs ex lassitudine febribus. cap. LIX.
 De febrientibus ex uigilijs, & cura, aut tristitia, aut ira. cap. LX.
 De febrientibus ex ardore. cap. LXI.
 De febrientibus ex frigore. cap. LXII.
 De febrientibus ex grauedine & destil- latione. cap. LXIII.
 De febribus ex cutis densitate. cap.

LXIIII.
 De febribus ex fame. cap. LXV.
 Dieta communis omnium diariarum fe- brium. cap. LXVI.
 De febrientibus ex inguinis inflamma- tione. cap. LXVII.
 De diarijs febribus ex cruditate obortis. cap. LXVIII.
 Curatio diariarum febrium multarum dierum, quarum aliqua ex mutatio- ne diariarū generantur, ob cutis ob- turationem. cap. LXIX.
 De febribus continentibus, siue syno- chis. cap. LXX.
 De uenæ sectione. cap. LXXI.
 De frigida aquæ exhibitioe. ca. LXXII.
 Dieta in febribus continentibus. cap. LXXIII.
 Vniuersalis doctrina de febribus putre- dinosis. cap. LXXIIII.
 De febribus putridis. cap. LXXV.
 Communis dieta omnium febrium putri- darum. cap. LXXVI.
 De febribus continuis. cap. LXXVII.
 Cura febris ardētis. Philū. ca. LXXVIII.
 Tertianæ exquisitæ dinotio. cap. LXXIX.
 Tertianæ exquisitæ curatio. ca. LXXX.
 Tertianæ spuria curatio. cap. LXXXI.
 De hemitritico, hoc est, semitertiana. cap. LXXXII.
 Quartanæ exquisitæ dinotio. cap. LXXXIII.
 Quartanæ curatio. cap. LXXXIIII.
 Quotidiana febris dinotio. ca. LXXXV.
 Quotidiana febris curatio. ca. LXXXVI.
 De Epialis febribus. cap. LXXXVII.
 Communia auxilia febrium per circui- tum repetentium. cap. LXXXVIII.
 De ignis sacri circa uiscera affectioni- bus. cap. LXXXIX.
 De colliquatione. cap. XC.
 De febribus quæ in calidis ac siccis tēpe- raturis fiunt, citra inflammationem ac putrefactionem. cap. XCI.
 De febribus hecticis ac tabidis. ca. XCII.
 Hecticarum febriū curatio. cap. XCIII.
 De popularibus passim uagantibus, & pestilentibus morbis. cap. XCIIII.
 De peste Ruffi. cap. XCV.
 De his qui ob crudorū humorū multitu- dinē, animo linguuntur. cap. XCVI.
 De his qui animo concidunt, ob flauā bi- lem quæ uentris ledentē. cap. XCVII.
 De his qui ob tenues humores animo concidunt. cap. XCVIII.
 De alijs animi deliquij causis. cap. XCIX.
 De dolore animi deliquium inducente. cap.

- cap. c. aut malignam febrem. cap. cx. De animi deliquio ob siccitatē. ca. cx i. De animi deliquio ob principalis mem-
bri obturationem. cap. cx ii. De animi deliquio ob repentinam eua-
cuationem. cap. cx iii. De animi deliquio propter affectus. cap. cxiiii.
De capitis dolore in febribus. ca. cx v. De uigilijs in febribus. cap. cxvi.
De graui sapore. cap. cxvii. Quomodo linguae asperitas in febribus
curanda sit. cap. cxviii. Quomodo sitis curanda sit. cap. cxix.
De aurium dolore in febribus. ca. cxx. Auris suppurata curatio. cap. cxxi.
De lippitudine in febribus. ca. cxxii. De oculorū obscuratione. ca. cxxiii.
Fluxus sanguinis narium in febribus cu-
ratio. cap. cxxiiii. Vesicae & urinae difficultatis in febr-
bus curatio. cap. cxxv. Lumborū doloris curatio. ca. cxxvi.
Vlcerationis circa os sacrum in febr-
bus curatio. cap. cxxvii. Ulcerationis circa scrotum & anum in
febribus curatio. cap. cxxviii. Pus-
tularum in febribus curatio. cap. cxxix.
De tremoribus in febribus. cap. cxxx.
De cōuulsioibus in febribus. cap. cxxxi.
De iucundis ac commodis potionibus in
febribus. cap. cxxxii. De potione pharmaci ex capitibus pa-
paueris. cap. cxxxiii. Omphacometitis preparatio. cap.
cxxxiiii. Mellis rosacei preparatio. ca. cxxxv.
Hydrosatis preparatio. ca. cxxxvi. Apometitis preparatio. ca. cxxxvii.
Hydromeli & Crustuminati prepara-
tio. cap. cxxxviii. Cydonati preparatio. cap. cxxxix.
Aceti mulsi preparatio. cap. cxl.

AETII MEDICI

GRAECI CONTRACTAE

MEDICINAE TETRABIBLI SECVN-
DAE SERMO PRIMVS, ET EX
ORDINE QVIN-
TVS.

DE FEBRIVM COGNITIONE AC CVRATIONE.



SALVBRIS diætæ præcepta ad conseruandam sanitatem cō-
moda ac necessaria, sã antea præ-
scripta sunt. didicisti itaque ex
ipsis, qualis & cuiusmodi diætæ
usu, tum ipse quantum eius
fieri posset, maxime sanus esses,
tum tuæ curæ commissis singulis cōuenientem sani-
tatem conseruares. Quandoquidem uero clām nobis
ipsis sæpe contingit, ut negligentiore diætā utamur,
aut ut propter aliquas actionum circumstantias, aut
ob ambiendis nos aëris uiolentiam, læsi aliquando
morboſis structuris acutarum aut diuturnarum affe-
ctionum corripiamur. Præstat etiam de ipsis mor-
bis tractare, & ab uniuersalibus febrilium morborū
notis auspicari, tum quod hi magis abundāt omni-
bus ætatibus communes, tum quod nō periculo ua-
cant, turbantēq; ac tumultum repentinum inducunt,
ob symptomatum accidentium copiam.

Quod oportet Medicum nature operum gnarum
esse.

Cap. i.

Quare circa prognosticum Hippocratis & alios eluſi-
dem libros, Medicum exercitatu esse oportet, & na-
turæ opera nosse. Naturę enim sunt morborum me-
dici. Aduuare igitur naturam oportet ad salutē de-
certādi aduersus morbum. Sic enim natura, ubi Me-
dicum ea quæ oportet facientem auxiliarium acce-
pit, & ipsum ægrotum obedientem, & nihil in diætā
delinquentem, morbum facile superarit. Oportet
autem cooperari etiam ministros, & extrinseca, quo-
nihil his quæ recte sunt resistat.

Quod citra prænotationem morbi fieri nequit ut
probe cures.

Cap. ii.

Propositum est autem nobis partem eam quę de signis
ac notis morborum tractat, prius exponere. Nam cō-
tra hoc ut prænoscas in quid desinet morbus, fieri nō
potest ut modus diætæ tibi probe suppetat: & præ-
sertim in acutis, & citum periculum inducentibus
morbis.

Quæ sint bona signa.

Cap. iii.

Facies bonis signis prædita, poteris enim uel ex sola fa-
cie cōstantē ac firmam prænotationē sumere, priusquā
ægrum contingas: dico autē ex sensibus in ipsa, uisu,
auditu, olfactu. Et ad hæc ex respiratione, sine qua ui-
uere non datur, & quæ indicat nobis dispositionem
cordis. Adest autē & loquendi instrumentū in facie,
ipsa lingua, quæ ostēdit nobis rationalis animę par-
tis robur ac debilitatē. Bonū signū est & decubitus
decorus, prout maxime consueuit etiā in sanitate se
facile conuertere. Bonum signū est & totū corpus ad
portandū facile esse, & æqualiter ac leniter calidum,
& sitis quantum eius fieri potest exors. Item sanā esse
mentē, & bene se habere ad ea quæ offeruntur. Bonū
signū est facilis spiratio, & ordinatus pulsuum mo-
tus. Ex his enim & quæ adhuc referentur, cognosce-
mus tū robur, tum debilitatē, triū animæ actionū.
Nam sanam esse mentē, & nō defluere corpus in de-
cubitu ad pedes, cerebrū per omnia sanū esse indicat.
Faciei uero floriditas, & facilis spiratio, & pulsus or-
dinatus, cor sanum esse arguunt. Quandoque enim
florida sit facies cum difficili spiratione, uelut in pe-
ripneumoniacis fieri solet. Ac sitis exortē esse, & bene
se

se habere ad ea quæ offeruntur, naturalem facultatem in hepate & toto corpore sanam esse indicat. Bonum signum sunt & somni boni, & sudores per totum corpus temperati & æquales ac moderati, & oportuno tempore apparentes. Bonum item signum est præcordia doloris expertia ac mollia esse. Et ad hæc secessus alui & urinarum ac sputorū expeditos esse, & bona concoctionis signa.

Quæ sint mala signa. Cap. IIII.

Totius faciei ac temporū collapsio, oculi fixi ac caui, lacrymæ inuoluntariæ, & alba oculorum in somnis apparentia, si non aduersus fuit sic dormire, & defluere corpus ad pedes, & præter morem pronū iacere, dentibus frendere, totū corpus inæqualiter calferi ac frigesieri, & ad portandū difficile esse. Item sitis intolerabilis, & ardor internarū partium externis frigidis existentibus, excessus mentis & uelut delirium quoddam aut stupiditas, sopor profundior, auersio totius appetitus. Frigiditas oborlens ex inflammatione thoracis ac costarū, difficulter spirare, & frigidum respirare, & foras multū expirare, intra uero parum inspirare: hoc enim iam futurā cordis mortificationē indicat, quemadmodum etiam pulsus interceptum esse, aut malè ferire. Facilem enim spirationē inquit Hippocrates, putare oportet ualde magnā uim habere ad salutē, in omnibus acutis morbis, qui cū febre sunt, & in quatuordecim diebus iudicantur. Malum signum sunt & uigiliæ cōcomitantes, aut etiam somni fientes quidē, uerum turbati. Sudores frigidi & inæquales, & non per totum corpus, & aliquando nullū figuram præ se ferentes ac uiscosi. Frigiditatem enim fortem hæc indicant. Et non in debito tempore apparere sudores malū est, & sudores statim febrem sequi. Item suppressio retrimentorū alui, & maxime uelicæ, & aliarum excretionum. Imò etiam si hæc procedant, & alicuius perniciosi notas ferāt: & præsertim urinae graueolentes ac crassæ & nigræ. Tales enim in acutis ac malignis morbis omnino periculū significant. Præcordiorum distēdo, & principalium partium inflammationes maximæ, cerebri inquam ac cordis & pulmonis, & membranæ costas succin-gendis, hepatisq; ac uentris: ubi enim aliquis ex talibus morbis adest, ualde mala signa apparentia periculosa sunt. Oportet autem uniuscuiusque signi uim perdiscere. Vnum enim aliquando signum forte ac fidum, plura signa infida ac debilia uincit.

Quæ prima dies totius morbi dicenda est. Cap. v.

Principium totius morbi dicere oportet, illud tempus quando homo febrile inceptū adeo manifestū, ut continuitatem corporis sibi solutā esse putet, & non amplius in publicū prodire ualet, & consueta uitæ munia obire, & propterea decubitu opus habuit. Non enim idē est displicentiā habere & febrile. Qui enim caput dolet, aut displicentiā habet, & corpore gra-uatus est, potest ferē in principijs consueta facere, donec præualens ipsi morbus uires eius deſciat.

Principium morborum trifariam dici. Cap. vi.

Principium propriè dicitur impartibilis illa ac indiuisibilis primi morbi impetus inuasio, in qua uictus homo decubuit. Principium etiam dicitur quod per dilatationē nominant, quod usq; ad tertium diē extenditur. Principium quoq; dicitur proprium ac necessarium, quod uelut partem totius morbi, principium nominamus: quod sanè non dierum numero

cognoscitur, sed exacerbationum qualitate, & concomitantium accidentium lenitate. Nam in augmento & morborum & symptomatum accidentium incrementum fit. Exacerbationes enim anticipant, & longius extenduntur in augmento, & symptomata grauiora fiunt. Principium igitur totius morbi dicitur, donec apparuerint manifesta & bona concoctionis signa. Si quidem igitur principium breuis temporis fuerit, morbum uelociter soluendum ostendit, uelut etiā Hippocrati uidetur. In pleuritidis inquit, si sputum statim appareat, in principio quidem breuis fit. Si uero posterius appareat, prolongatur: morbus ipse uidelicet. Qua igitur die apparuerint in superficialibus quæ excernuntur manifestæ concoctionis signa, in ea dicitur principium totius morbi cessasse, & incipere ipsum augmentum. Concoctionis enim signa nunquam malè apparent.

Quid est febris. Cap. vii.

Febris est calor præter naturā, cordis & articularū, uitalem firmitatem ledens, ex profundo emergens, & acris ac mordax ad tactum allabens, præsertim circa thoracem, & ubi arteriæ magnæ sitæ sunt. Verū ad talem calorem inæqualitas quædam & inordinatus motus pulsibus accedit iuxta ipsam febris speciem.

Quid est exacerbatio. Cap. viii.

Exacerbatio, quam paroxysmū Græci uocant, est motus morbi particularis, a remissione ad deterius. Particularis autem motus dictus est, ad discretionē uniuersalis morborum augmenti.

Quid est remissio. Cap. ix.

Remissio est particularis exacerbationis temporaria quies symptomatum corpori coincidentium.

Remissionem dupliciter dici, comprehenditur enim ex interuallum. Cap. x.

Ex remissionibus ea quæ sincera est, cognoscitur ex quiete concomitantium ad exacerbationē symptomatum circumscripta. Et propterea dicitur Interuallū, quemadmodum in his qui per circuitum quendam exacerbant, uelut tertiana, quartana, quotidiana, capitis dolor, morbus comitalis, podagra, & cōsimiles. Quæ uero insincera est & non pura, depræhenditur ex symptomatum diminutione, quemadmodum in continuis maximè febribus coniungit. Nam in his ante absolutam morbi solutionē, non contingit pura remissio: Declinationem enim prioris posterior exacerbatio excipit.

Quod est principium febrilis accessionis. Cap. xi.

Principium febrilis exacerbationis, ferme est cōtractio extreparum partium omnium, & maximè nasi. Et quandoq; etiā frigiditas totius corporis. Et aliquando tussicula parū irritans, unā cū frigiditate irruens. Item oscitatio & partium corporis extēsiō, aut nauſea, aut uomitus, aut animi deliquium. Et capitis dolor, aut alterius cuiusdam partis, & in profundum somnum delatio. Pulsus insuper paruus & contractus, tardè feriens ac relidens: Et symptomatum ad præsentem morbum concomitantium irritatio.

Augmēti particularis exacerbationis signa. Cap. xii.

Iuxta augmentum exacerbationis, aliorum quidē accidentium incrementum & unio accedit, contractio uero & frigiditas cessant. Et pulsus inæqualis emicat. Et corpus calefit quidem, uerum non exactè.

Vigoris particularis exacerbationis signa. Cap. xiii.

Iuxta uigorem exacerbationis, calor æqualiter diffunditur.

ditur, & particulatim distribuitur, per totū corpus. Et pulsus totam augmentū magnitudinem accipientes, ad subiectæ materiæ proportionem extenduntur, itemque reliqua exacerbationis accidentia. Tunc uero iam tempus est ægroto potum dare.

Declinationis particularis exacerbationis signa.

Cap. xiiii.

Declinatio est ubi incipiunt aliqua, aut omnia prædicta accidentia minui. Et pulsus ad ordinatum quodammodo motum deueniunt. Aliquando uero & humores exudant. Et calor nimis contabescit. Quandoque etiam somni boni concurrunt, si longum tempus inter accessiones futurum est, uelut in puris remissionibus fieri solet. Contingit enim in quibusdam morbis, ut exacerbatio posterior prioris declinationem excipiat, uelut in febribus continuis apparet.

Quod est principium totius morbi. *Cap. xv.*

Iam antea dictum est, quod principium totius morbi illud tempus didimus, quando per morbi uolentiam uires hominis uictæ, principium decubitus factæ sunt.

Quod sit augmentum totius morbi. *Cap. xvi.*

Augmentum totius morbi est, quum exacerbationes consuetam horam antea uerterint, & longiores ac maligniores, & cum pluribus ac grauioribus accedensibus factæ fuerint.

Vigor totius morbi cognitio. *Cap. xvii.*

Quum exacerbationes statim acceperint, & similiter per omnia consequenter contigerint, & concomitantia symptomata neque detraxerint, neque addiderint, tunc iam in vigore esse morbus dicitur. Vigor enim uehementior morbi totius pars est, quando etiam bonæ iudicationes uel maxime fieri solent.

Declinationis totius morbi dinotio. *Cap. xviii.*

In declinatione totius morbi, contraria augmento fiunt. Remoratur enim exacerbatio consuetæ horæ impetum, & modico tempore occupat. Et symptomata leniora ac simpliciora fiunt, & bona tolerabilia ac remissio adest per omnia.

Quod declinatio totius morbi in iudicationibus confertim fientibus, sensum nostrum effuset.

Cap. xix.

Quicumque morbi in uigore confertim iudicantur, & perfectam solutionem recipiunt, eorum declinatio difficulter comprehendere potest, ut neque sensus manifesta fiat. Imò neque commodum est de ipsa inquirere. Satis enim est cognoscere quod morbus fideliter, secure, ac perfecte solutus est.

Quod seruandus æger quatuor totius morbi tempora pertransit. *Cap. xx.*

Si quidem igitur sine periculo fuerit morbus, acutè moueatur, & ad hæc bona & commoda signa affuerint ægroto, quatuor morbi tempora citò pertransit, & manifestum est quod etiam seruabitur. Si uero his contraria affuerint, ante uigorem plerumque morietur.

Vtrum tardius aut citius morbus iudicatur. *Cap. xxi.*

Tardiusne an citius iudicabitur morbus, ex morbi magnitudine, & motus uehementia, manifestum fit. Nam magni morbi citò mouentur. Quod uero citò mouetur, etiam citò iudicatur.

Quomodo prenoscere oportet, an iudicabitur morbus, aut non, & quando. *Cap. xxii.*

Magni morbi qui & citò & uehementer mouentur, omnino iudicantur. Parui uero & obscuriores, & qui debiliter mouentur, si diuturni sunt, soluuntur ian-

zum paulatim citra iudicationem. Raro uero & ad abscessum tales procedunt. Tertiaria enim etiam intermittat, tamen quia citò & uehementer mouetur, iudicatur. Quartana uero, quia diuturna est, paulatim ferè soluitur. Item omnes qui pigrius mouentur. Naturam itaque morbi inspicere oportet, an biliosus sit, aut pituitosus, aut atrabiliaris. Deinde anni tempus, & ægroti ætatem, & temperamentum, ac studium, & prægressam uictus rationem. Imò & regionem, & statum ambientis nos aeris. Postea uero considerare exacerbationum circuitus, uelut antea dictum est; & an intermittant, siue non, uelut in continuis ac continendis febribus uidere datur. Si enim festinauerint, & semper anticipauerint conuenientem horam, & uehementiores facti fuerint, & per tertiam occurrerint, breui iudicatione futuram indicant. Si uero pigre moueantur, & eadem hora irruerint, & quotidie contigerint, tardam fore iudicationem significant. Considerandæ insuper sunt & superfluitatum concoctiones, an bonæ sint, & an in diebus indicatiuis fiant, uiribus robustis. Si enim morbus statim ab initio ostenderit omnia signa extra periculum, in primo quaternario iudicationem promittit. Si uero in quarta præsignificarit, septimam non transgreditur. Leuissimæ enim febres & in signis securissimis fientes, quarta die quiescunt, aut citius, inquit Hippocrates. Maligniores uero & in signis grauissimis fientes, quarta die occidunt, aut etiam citius.

Futura iam iudicationis signa. *Cap. xxiii.*

Ubi iam affutura est iudicatio, non parua turbatio in ægri corpore præcedit, & præsertim in nocte iudicatoriam exacerbatione præcedente. Quibus enim iudicatio futura est, his nox grauis est ante exacerbationem, inquit Hippocrates. Grauitates enim & uigiliae, & deliria, & graues sopores, & spirandi difficultates, & uertigines, & sensus obesi, & dolores capitis, colli, stomachi, ac multarum aliarum partium adsunt. In quibusdam uero aurium sonitus. Et splendores oculis obuersantur. Et lacrymæ inuitæ fluunt. Et urina supprimitur, & labium concutitur, & alia quaecumque pars tremula efficitur. Et contingit obliuio ac ignorantia præsentium. Et uehemens rigor aliquando incidit, aut ardor antea non factus, & in summa exacerbatio ante solitam horam irruit. Et multus sopor ac sitis intolerabilis sequitur, & uociferantur ac exiliunt uelut consternati. Et decubitus figuram seruare non possunt. Et timor impendit uidentibus. At imperitus medicus uidens symptomatum accidentium tempestatem perturbatur, & cum familiaribus ægri calamitatem deplorat, & per condolentiam occultat imperitiam. Verum generosi medici est non turbari, neque ignorare quod euenturum est: sed ex præsentibus prænosce, non solum quod iudicatio futura est, sed etiam qualis futura est.

Quomodo prenoscere oportet bonane an mala

iudicatio futura sit. *Cap. xxiiii.*

Optimam iudicationem, quam etiam solam simpliciter iudicationem nominamus, non per coniecturam, uelut alias, sed constanter quis prænosce poterit. Omnia enim signa in talibus morbis statim a principio citra periculum apparent. Quemadmodum rursus in morituris, ut plurimum ab initio omnia mala apparent. Primum omnium igitur considerare oportet ægri

ægrî uires. Deinde concoctiones ex urinis ac fecibus & sputis. Nullû enim unquâ perire uidimus, ex his qui ob præostensam bonâ concoctionem iudicati sunt. Tertio quod in uigore & totius morbi, & particularis exacerbationis, & in die testabili iudicatio contingit. Consequenter autem & speciem morbi, & mores. Speciem dico, tertianam, aut quartanam, aut quotidianam, aut aliquam aliam. Mores autem, an sint moderati & leues, aut mali ac maligni. Et mores præcipue indicabunt tibi, an seruiabitur, an morietur. Et in affectionibus quidem thoracis ac pulmonis attendere oportet sputis, neque uero urinarum inspectio negligenda est. Considerandæ uero sunt etiam egestiones. At in febriculis absque inflammatione alicuius uisceris, urinis maxime mentem attendere oportet. Ceterum in perniciosi morbis primum ac maximum signum est futuræ mortis citra iudicationem extrema uirium debilitas. Non enim excitantur ad pugnam. Secundum si nullum omnino fuerit ac ne minimum quidem concoctionis signum. Imò etiam si præmanifesta fuerit iudicatoria dies, futuram iudicationem simul præmanifestat, & malam fore indicat. Ad hæc uidendum est an magnus sit ac malignus morbus, nō tamen citò moueatur. Magnum autem dico peripneumoniam, pulmonis abscessum, semitertianam, febrem ardentem, & consimiles. Velut uerbi causa, contingat ut uideatur in quarta die primum in urinis nubecula nigra, aut simile quiddam in medio ipsarum pendens, aut subsistentia nigra. Sint autem & omnia accidentia perniciofa, morietur quidem talis homo. Verum si quidem celeriter moueatur morbus, in sexta; si uero tardè, in septima.

Qui sint boni iudicatorij dies, & qui mali.

Cap. xxv.

Septima ab initio morbi dies omnium maxime semper perfecte soluit ac fideliter, & bene ac citra periculum, & manifestè ac signanter. Septimæ uero fidem decimaquarta maxime imitatur. Propinqua autem ipsis est nona & undecima. Et huius propinqua est decima septima, & quinta. Post has quarta. Et post hanc tertia, & uicesima. Sexta uero sæpe quidem iudicat, uerum plures iudicationes malas, aut etiam letales inducit, aut certè non perfectas neque fideles. Reuertuntur enim morbi qui in sexta die iudicantur, etiam si soluti esse putentur. Si uero etiam perfecta iudicatio, id quod rarum est in sexta, contingat, tamen cum periculosis ac grauibz accidentibus contingit. Proinde sextæ naturam nulla alia dies imitata est. Si uero aliquando in octauam diem aut decimam solutio morbi acervata exciderit, assimilatur quodammodo ei quæ sit in sexta. Raro enim in his morbus soluitur, & neque fideliter, neque bene neque perfecte: sed & obscure ac minime signanter. At medio quodam modo inter primas bonas rellatas, & inter postea malas, tridecima locata est, neque similiter reprobanda uelut mala, neque tamen similis bonis existens. Quod si bona iudicatio futura est, oportet omnia prius iudicata esse, in urinis præsertim, imò etiam in alijs signis. Tertia igitur & quarta ac quinta dies statim ab initio præiudicantur. Quarta uero septimam præiudicat, & septima undecimam. Undecima uero decimaquartam. Decimaquarta decimam septimam, decima septima uig-

simam. Terminus porro acutorum morborum est decimaquarta. Quare si hanc transgressus fuerit morbus, ab acutis excidit.

In quibus ambigua est dies principij morbi, & nulla præiudicatoria facta de repente contigit iudicatio, quomodo ambigua inuenire oportet.

Cap. xxvi.

In quibus nulla præiudicatoria die facta, de repente contigit iudicatio, & in quibus nō exactè cognoscimus principium morbi, in his respicienda sunt signa, & ambiguum reperietur, si ad exacerbationum proportionem, & ad dierum naturam, mentem aduertimus. Si enim imparibus diebus facta fuerit exacerbatio in intermittentibus, aut seipsa uehementior facta fuerit in continuis febribz, æstima præsentem iudicationem imparis diei propriam esse. Si uero in paribus exacerbetur, illarum proprie iudicatio erit. Nam ad uehementiores exacerbationes omnino sequuntur iudicationes. Ceterum ad ipsam dierum naturam sic animum aduertere oportet: si ambiguum sit utrū nonæ aut decimæ diei iudicatio sit. Si enim accidentia omnia mitiora fuerint, & citra periculum ac bona facta fuerit iudicatio, & consequuta fuerit ad iudicationem bona tolerantia, nonam potius esse iudicatoriam diem dicere oportet. Si uero periculosa & mala facta fuerit iudicatio, & cum grauibz accidentibus, & grauis tolerantia post iudicationem sequatur, decimam diem magis iudicatoriam fuisse dicendum est.

De notis ex pulsibus.

Cap. xxvii.

Quum iam expectatur iudicatio, ante omnia pulsus tangere oportet. Nam altus pulsus, quemadmodum etiam uehemens, omnis bonæ iudicationis nota est, & constat signum iam adesse morbi iudicationem. Si uero uehementer ac fortiter ferit digitos, & cum hoc etiam magnus fuerit, & ad distentionem magis quàm ad contractionem festinarit, motus externi potius signum est. Externum autem motum dico, sanguinis eruptionem ac sudores. Internum uero, uentris exturbationem ac uomitus. Si quidè igitur magnus fuerit pulsus, & undosus, & simul mollescat, unà cum hoc quod etiam ipsum arteriæ corpus humectum est, & ad distentionem magis festinat: per sudorem futuram iudicationem sperare oportet. Si uero magnus simpliciter fuerit ac uehemens, & magis ad distentionem quàm ad contractionem festinarit, sanguinis eruptionem per nares fore significat, ubi uidelicet simul testimonium præbuerint signa in sanguinis eruptione referenda. Si uero uehemens quidem fuerit, non autem magnus, & durior seipso factus fuerit ac inæqualis, & ad contractionem magis festinarit, inclinatione iam ad intestina facta, per uentrem iudicationem facturam expectare oportet.

De urinarum notis, & primum quæ sit naturalis.

Cap. xxviii.

In febrilibz maxime morbis, notæ ex urinis commo dissimæ sunt. Quandoquidem uero quicquid est præter naturam ex naturalibus inuenitur, à naturalibus initium faciamus. Vrina igitur optima est in sanis ac optimo habitu præditis hominibus, subfulua aut subflaua, & moderatè crassa, & talis manens colore, qualis mixta fuit, & leuè ac albam & æqualem subidentiam habens omni tempore, copiâ uero pro potus ratione. At in foeminis naturalem urina-

nam

nam colore alborem uirili esse conuenit, & subsidendam habere ampliore. In puerili uero ætate, multum crassam subsidendam habere oportet, propter puerorum uoracitatem, & inordinatos ac inuestiuios motus. Leuem autem subsidendam Hippocrates uocat, coherentem ac indiuisam indicare uolens. Aequalem uero dicit, ut per totum semper similis mingatur, & non hodie quidem concocta, cras uero cruda; & ut neque subsidendam, aut totam diffusionem inaequalem habeat. Proinde in naturali urina querimus colorem, & diffusionis compagem, & quæ in ipsa diffusionis obiter feruntur, uelut est nubecula, aut simile quiddam in medio pendens, & subsidencia siue residentia quæ fundum occupat. Manifestum igitur est quod urina in aliquo ex istis mutata, cruditatem in uenis indicat.

Qualis urina optima est in ægrotis. Cap. xxxix.
Optima igitur est urina in ægrotis quæ similima est sanis, subpallida aut subflaua, albam ac leuem & æqualem subsidendam habens. Defectuosior est, quæ id quod in medio pendet album ac leue & æquale habet. Crudior autem adhuc hac est, quæ nubeculam talem habet. In qua enim flatus est in profundo crassus ac crudus, si quidem paucus fuerit, permittit materiam ad fundum uasis deferri, diuidens autem ipsam, uniri non permittit. Si uero redundauerit crudus in profundo flatus, eleuat subsidendam ad medium diffusionis urinae, & facit id quod in medio pendet. Si uero adhuc amplior fuerit crudus in profundo flatus, eleuat subsidendam, & ad supernam superficiem diffusi urine liquoris attollit. In quantum igitur flatus diuidere ac eleuare ualet ipsam subsidendam, in tantum crudiores urinam putes. Si uero neque subsidendam, neque quid in medio pendens, neque nubeculam habuerit urina, nosse oportet quod natura nondum humorem concoxit. Si uero aliquando habet subsidendam, aut illud in medio pendens, aut nubem, aliquando uero non, pugnam indicat naturæ aduersus morbum, atque hinc modo cruda est, modo non. At uero in tertianis exquisitis & in diariis febribus, nubecula sola, aut illud in medio pendens, ad morbi solutionem sufficit. Aliquando uero etiam urinam solum boni coloris factam esse.

Quod non omnis alba subsidencia bonum significat.

Cap. xxx.
Sæpe uero albus color eius quod in urinae fusura siue diffusionis fertur, idiotas decipit, ut subsidendam bonam putent quæ bona non est. Contingit enim crudum ac album humorem unam cum urina excretum subidere, & bonæ subsidencie imaginationem exhibere. Quandoque uero hepate aut renibus affectis, pus excernitur cum urina, & subidens decipit arificem. Verum primum distinguendum est, an homo antea affectos habuerit renes, aut hepar, aut aliam quandam partem per urinam expurgari solitam. Deinde etiam graecolens reperitur urina pus habens. Crudus uero humor à bona subsidencia distinguitur, per inaequalem subsidencie substantiam siue compagem. Non enim coherens sibi ipsi manet, sed in paruas uelut arenulas diuiditur. Et omnino non leuis est, quemadmodum uera subsidencia. In bonis igitur urinis, primum supernè apparet nubecula. Deinde subdescendens facit id quod in medio pendet. In fine uero subidens in fundo uasis, nimis

rum ubi perfecte fuerit concocta. In crudis uero humoribus, statim ab initio ad fundum uasis multa copia secedit, una cum hoc quod mali coloris est tota fusura. Postea uero etiam paulatim concoctus ac attenuatus, circa medium fusuræ urinae conspiciatur, & facit id quod in medio pendet. Quum autem amplius attenuatus fuerit ac concoctus, in superficie diffusionis urinae consistit, & nubeculam facit, decipiunt idiotas ut putent morbum ad deterius procedere.

Quid indicet tenuis & pallida urina. Cap. xxxi.
Tenuis & pallida urina, cruda quidem est substantiæ compage, concocta autem mediocriter colore. Debilitatem autem indicat etiam hæc natura, quod colore quidem concoxit, uelut quæ res facilis sit; non autem etiam compage, propter difficultatem. Si uero per multum tempus hæc fertur, periculum est ne sufficere possit homo, donec concoquatur morbus. Nam quæ ualde tenuis est, mala est. Indicat enim cruditatem, in quantum calorem id quod tenuius est depascere oportet.

Quid indicet tenuis & fulua. Cap. xxxii.
At tenuis in substantiæ compage urina, & fulua colore, melior est quam pallida. Et tamen reprehensione non caret propter substantiam.

Quid indicet rufa urina. Cap. xxxiii.
Rufa urina cruditatem indicat, non mortem. Verum tempore opus habet ad concoctionem. Est enim ex sanguine seroso, nondum ualde concoctionem adeptus, neque proprium colorem. Et propterea diuturniorem morbum significat. At in febribus continuis, ob sanguinis multitudinem consistentibus, excernitur urina rufa & crassa, & subsidencia rufa, & colore, & fusuræ compage, & subsidencia cruda.

Urina tenuis micta & postea turbata.

Cap. xxxiiii.
Urina quæ tenuis mingitur, & postea foris turbatur, cruda est propter flatus crassi redundantiam. Indicat autem naturam incipere concoquere.

Urina crassa micta, & crassa manens. Cap. xxxv.
Urina quæ crassa mingitur, & crassa manet, & non desidet, qualis est iumentorum, significat uigere crassorum flatuum ac humorum uelut fermentationem. In his capitulis dolores aut adsunt, aut aderunt, propter humorum turbationem ac euaporationes.

Urina crassa micta, & postea desidet. Cap. xxxvi.
Quæ crassa mingitur urina, & postea desidet, indicat humorum fermentationem quiescere, & quodammodo attenuari. Et separationem ac secretionem incipere.

Urina tenuis micta, & talis manens. Cap. xxxvii.
Extremam cruditatem tenuis & alba urina significat. Non enim aggressa est in his natura concoctionem. Contingit autem hoc aut ob uirium debilitatem, aut propter obturationem, aut ob morbi longitudinem. Nam in quartanis diuturnissimis, in principio ob crassitudinem & intractabilitatem materiae, urina excolata tenuis uocatur. Mingitur autem tenuis, etiam ob hepatis obturationem aut renum. Verum cognoscitur ex locali dolore. Mingitur etiam aliquando tenuis & album in febribus ardentibus. Febris enim ardens bilis multitudinem indicat, atque hæc urina phrenitidem imminere significat. Non tingitur autem urina, quia non manet in uasis ipsa bilis, sed leuitate sua ad cerebrum decurrit. Si quidem igitur non adest in his

his phrenitis, scito ipsam iam affore. Si uero adest, & urina tenuis ac alba mingitur in ardentissima febre, ut plurimum mortem pronunciat. Non enim tolerare possunt uires cerebri iam prostrate ab ardente febre, acrimoniam ac mordacitatem bilis iam putrefactæ.

Differentiæ urinarum oleosarum, & quid significant.

Cap. xxxviii.

Solet febris primum pinguedinē eliquare, postea carnem, postremum etiam ipsa solida corpora inuadit. Pinguedine igitur liquefacta oleosæ urinx excernuntur. Paulatim autē liquatur pinguedo, unde & principium habet, & augmentum, & uigorem. In principio igitur colliquationis, ita oleosi coloris facit urinas, ut ambiguum sit, aquosæ ne sint an oleosæ. In augmento uero oleosæ fiunt, ita ut notabiliorem oleosi mixturam habeant. In uigore autem colliquationis totæ urinx per totum, tum in colore, tum in substantiæ compage, uelut oleum sunt. At hæc pinguedo eliquata, aut renum solum est, aut totius corporis. Si igitur renum solum fuerit, cōsertim excernitur talis copia, imò & caloris sensus amplior circa renes contingit. Si uero totius corporis fuerit, paulatim additamentum facit.

Quid significant eruiæ subsidentiæ. Cap. xxxix.

Quando consumpta est pinguedo, deinceps caro liquefit, & eruiæ subsidentiæ in urinis fiunt. Sed & hæc aut renum solū sunt, aut totius corporis. Si quidem igitur in febribus apparuerit talis urina, totius corporis affectionem esse indicat. Si uero non, in renibus solum. Et rursus, si crudæ sunt urinx, totius corporis est malum. Si uero concocta est urina, eruiæ autē sunt subsidentiæ, renum affectionē indicant.

Quid indicent fursuracæ subsidentiæ. Cap. xl.

Quum febris pinguedinem consumpserit, & maiorem carnis partem, & in profunditatem uasorum irruerit, fursuracæ subsidentiæ fiunt, angustiores quidem lamineis, uerum crassiores ipsis. Et hæc similiter aut ex toto corpore, aut ex uesica excernuntur. At si quidem febris affuerit, ex toto corpore. Si non, ex uesica. Et si quidem cruda fuerit urina, corporis est affectio. Si uero concocta, solius uesicæ. Sed & localis adest dolor.

Quid indicent lamineæ subsidentiæ. Cap. xli.

Quum ipsæ solidæ partes affectæ fuerint, primum in superficie deraduntur, & quæ in urinis subsident lamineæ fiunt. Sed & ex uesica sola talia excernuntur. Si quidem igitur fuerit febris, totū corpus afflictum est. Si non, uesicæ affectio est.

Quid indicet polentaceum in urinis. Cap. xlii.

Quum febris post occupatam profunditatem, & maiorem & longiorem profunditatem inuaserit, fiunt talia fursuribus crassiora, & uocantur polentacea. At duo significant hæc polentacea. Aut enim sanguinis assationem indicant, aut fortem solidorum colliquationem. Si quidem igitur alba fuerint polentacea illa, solidorum corporum affectio est. Si rufa, sanguinis.

Quid indicet graueolens urina. Cap. xliii.

Graueolens urina putrefactionem indicat, & futuram naturæ mortificationem.

Urina nigra quid significet. Cap. xliiii.

Omnes nigræ urinx statim etiam crassæ, omnino perniciosæ sunt. Raro enim aut nunquam inueniuntur tenuis & nigra. Nam niger color accedit urinis, dum

expurgatur atræ bilis humor, aut ipsa atra bilis, tum quæ ob frigiditatem, tum quæ propter nimiam assationem facta est. Et uiris quidem ac foeminae nigræ urinx pessimæ sunt. Pueris uero aquosæ. Minus autem perniciosæ fiunt nigræ urinx, his qui debilem habent splenem, quibus non ex adustione, neque ex perfrigeratione, nigrescit ac liuescit sanguis, quædam modum in alijs quibusdam contingit: sed ex melancholici humoris diffusionem. At hæc tres differentiæ crassitudinem substantiæ habent. Necessariò igitur etiam crassæ reperiuntur nigræ urinx. Proinde in acutis morbis perniciosissima est omnis urina denigrata, & præsertim quum & graueolens fuerit & crassa, & nigram subsidentiā habuerit. Fieri enim non potest ut seruetur æger ex acuto morbo, qui talem urinam minxit. Et si quidem subsidentiā fuerit nigra, perniciosissimum est. Si uero id quod in medio pendet nigrum fuerit, minus malum, aut non similiter malum. Si autem nubecula fuerit nigra, adhuc mitius & non similiter malū. Nigra porro urina, aliquando indicat frigiditatem, aliquando caliditatem, siue superassationem. Si quidē igitur prius mixta fuerit liuida urina, deinde sic nigra fiat, frigiditatem causam habet. Si uero flaua præcesserit, & postea nigra inuenta fuerit, ab ampliore nimirum caliditate superassata nigra facta est. Scire tamen oportet præcium est quod & in febris quartanæ declinatione, & in melancholici delirii solutione, urinx apparent nigræ ac crassæ. Splenicis autem ut plurimum talis urina mingitur, quando debilis fuerit splen. Nullam enim concoctionem ac distributionem melancholicæ superfluitatis facit.

De egestionum notis. Cap. xlv.

Quod de urinis antea dictum est, hoc etiam in egestionibus cognoscere oportet. Dico autem, qualis sit naturalis egestio. Nam ab hac euariatio in aliqua parte, cruditatem indicat. Optima igitur est egestio mollis & compacta, & leuis, & iuxta consuetam horam quam maximè prodians, & ad proportionem comestorum, colorata quidem moderate bilioso humore, hoc est, subfulua, & non ualde graueolens. Quæ enim talis est, naturalis est. Et manifestum est quod significat sana esse omnia circa uentrem ac intestina. Si uero aliqua parte à relatis euariauerit, præter naturam iam dicitur. uelut est, ualde graueolens, aut crassa, aut sicca, aut dura, aut distorta, & non humori ammixta, & quæ cum stridore & uelut streptu quodam præter rationem excernitur. Tales enim omnes concoctoriæ actionis debilitatem indicant. His adhuc deterior est exacte fulua. Est enim bilis intemperatæ ac puræ signum. Nigra uero egestio, atræ bilis signum est, aut sanguinis adusti. Liuida uero intestinorum frigiditatis ac mortificationis. Pinguis autem & oleosa, pinguedinis colliquationem significat. Viscosa uero ipsorum solidorum corporum colliquationem indicat. Quæ autem uaria est colore, & ualde graueolens, uariorum humorum excellentem putrefactionem significat. Cæterum in omnibus his considerare conuenit, an edulia talia fuerint, aut intestinum ex more fluxione laboraret, quum debile sit.

De egestionibus indicatorijs. Cap. xlv.

Si porro iudicatio alicuius morbi per uentrem futura est, nihil quidem præiudicans, uelut in alijs, neque quæ

quicquam proprium ac firmum praesignificans habet. Verum ex eo quod adsunt quidem iudicationis signa, non autem adsunt signa uomitus, aut eruptionis sanguinis narium, aut sudoris, colligere datur. Considerare tamen oportet ex aluo egesta, an plura prodierint quam prius ante iudicationem. Indicant enim inclinationem hac magis fore, & praesertim ubi imminuta fuerint urinae. Insuper autem & grauitas notabilis, & dolor, & tensio circa praecordia & lumbos, uentris excretionis praecedunt. Quandoquidem uero & per haemorrhoidas, & per locos muliebres, iudicationem fieri possibile est, communia etiam amborum sunt signa quae nunc sunt relata. Verum considerandum est an horum quid ex more expectetur. Si quidem igitur in principio morbi aut augmento, uenter perseveranter liquidiora egerit, aut uelut biliosa quaedam pura, & febris perseverat, & bilis magis augebitur: tunc & ardentior & periculosior ut plurimum est morbus. Si uero in uigore multum exturbetur aluus sua specie, ferè morbi solutionem efficit. At circa uigorem aliquando in morbis diuturnioribus uenter exturbatus, omnem materiam morbum facientem dederit. Verum in acutis morbis, & nigra pura & graueolentia inducentia, praesertim in principio pessima sunt. Quibuscunque enim morbis inchoantibus bilis atra sursum aut deorsum prodierit, mortale est. Et rursus quibuscunque ex morbis acutis, aut diuturnis, aut ex uulneribus attenuatis, bilis atra subierit, postmodum dies moriuntur. Non autem simpliciter si quid nigrum excernitur, tam etiam hoc atra bilis est. Potest enim & sanguis e propriis locis excidens, & tempore aliquo manens frigidus in grumos congelari. Attram itaque bilem cognoscemus ex eo quod ad terram fusa, ipsam radat ac fermentet, uelut acerrimum acetum.

De Vomitus praenotione ac significatione.

Cap. XLVII.

Instante iam iudicatione, uomitum fore expectare oportet, si pulsus fuerit uehemens, & ad contractionem magis festinaret, & durissimus existens ac inaequalis. Cordis item punctura & uehemens oris uentris morsus adest una cum capitis dolore, & uertigines oculorum, tenebris simul obuersantibus. Et labium concutitur, & saliuam multa ac tenuis defluit, & nauisae infestant, & infernae praecordiorum partes frigidae tangentibus apparent. Omnia enim haec coincidunt, bilioso ac mordaci humore in uentre ac stomacho coaceruato, mordenteque ac simul contrahente totum stomachum infernè. Vnde & labium concutitur, & saliuam defluit. Si uero cum his etiam rigor accesserit, citissime uomunt. Quod si etiam cibos recens ingererint, & maxime potum, citò uomunt. Vtilissimus est uomitus pituitae ac bilis quam maxime mixtorum. Vomatur autem non crassus. Nam sinceriores, hoc est, non mixti, reprobandi sunt. Tales enim & cum uolentia & inclinationibus ac molestia uomuntur, una cum hoc quod signum sunt, solam bilem praedominari. Quin & uarij reprehendi merentur, uelut sunt liuidi & nigri ac porracei. Mali enim sunt hi inquit Hippocrates. Si uero omnes hos colores idem homo uomuerit, perniciosum est. Deteriores tamè sunt liuidi ac nigri, in acutis & ardentibus morbis fientes, & praesertim si fuerint graueolentes. Attendere uero oportet & in his, nam sanguis conflue-

xit in uentrem, & tempore quodam in ipso moram traxerit, & grumosus excernatur. In plurimis enim tale quiddam contingit, ex circuitibus quibusdam. Et non solum nihil molesti infert, sed etiam tolerantiores seipsum fiunt, ubi hic per uomitum fuerit reiectus.

De eruptionis sanguinis ex naribus praenotione ac significatione.

Cap. XLVIII.

Si sanguinis ex naribus eruptio futura est, propria signa praecedunt haec. Splendores oculis obuersantur, eo quod flauus est humor. Obtusus autem est uisus, propter multitudinis sursum uersus lationem. Quapropter etiam lacrymantur oculi. Facies rubicunda est, & praesertim malae. Praecordia distenduntur circa dolorem, difficultas spirandi adest, propter transitum sanguinis per thoracem. Capitis item dolor, & temporum pulsus irruens simul cum iudicatoria exacerbatione, & non in principio morbi existens. Collum dolet, & deliria saepe ac exultationes fiunt. Pulsus autem alti sunt & magni, & ad distentionem magis festinant. Si uero cum his omnibus etiam nares scalpat, iam adest tempus ut sanguis erumpat, & praesertim quum dolor fortiter circa frontem ac tempora incutit. Quod si etiam sano sanguis erumpere consuevit, augebit sane etiam hoc ualde spem tuam. Atque haec sunt signa iam futurae sanguinis eruptionis. In principio uero apparentia crudo existente morbo, periculum significant, & tales plerumque moriuntur. Si uero facta iam concoctione, praesertim in urinis, haec signa appareant, circa uigorem morbi commode conspiciuntur. Soluunt autem tales sanguinis eruptiones etiam uiscerum inflammationes in febribus, quando maxime ex directo fiunt, uelut inflammato hepate, ex dextro nare; inflammato splene, ex sinistro. Unde facillimum iam fuerit etiam medicum praedicere, utra naris sanguinem emissura sit, occasione ex dolente parte accepta. Soluunt etiam saepe sanguinis ex naribus eruptiones phrenitidem, non tamen lethargum aut peripneumoniam.

Quod et per haemorrhoidas, & muliebres purgationes, saepe soluitur morbus.

Cap. XLIX.

Vidimus in multis etiam per haemorrhoidas prius existentes in sede apertas, morbum solutum. Similiter & in foeminis menstrua purgatione facta. Oportet autem & in his progressa concoctione, in morbi uigore excretionem fieri, quo bona & rursus iudicatio fiat. Praecedat & in his notabilis grauitas, & dolor lumborum, imò etiam imi uentris dolor ac distentio.

De significatione ex sudoribus.

Cap. L.

Febrem per sudores soluendam cognoscemus ex eo quod ardentissima est, qualis est quam inde Causum Graeci uocant. Biliosus est enim hic morbus, & ubi fortiter motus fuerit, rigorem efficit. Si quidem igitur pro ratione suppressa fuerit aluus, aut urina, iudicatione propinqua existente, rigorem expectare oportet. Si uero amborum suppressio facta est, & non adsunt signa uomitus aut eruptionis sanguinis, sudor necessario erit multus, & hoc magis fiet ubi augesciente exacerbatione aegri mente moti fuerint, & forinsecus calidiores facti, & vapor quidam calidus ex corpore ascenderit, qualis antea non corrigi, uelut uidere est in recens lotis. Pulsus item his sunt magni & alti & ueloces, & ad distentionem magis festinantes ac uelut undosi. Et arteriae tunica mollis ac humecta apparet. Superficies autem totius corporis pruriginosa

riginosa & mollis, & quibusdam horis rubicunda. Hæc in exacerbatione iudicatoria fientia, concoctione prægressa, & iudicatoria die bona existente, salutare & solutorios sudores significat. Manifestum est autem quod moderatè calidum esse oportet solutorium sudorem, & per totum corpus fieri, & pro ratione leuare, ac tolerantiorē facere ægrotum. At frigidi sudores cum acuta quidē febre mortales sunt, cum mitiore uero, longitudinem morbi significant.

Abscessuum signa iudicatoria.

Cap. L I.

Si ad abscessum conuertatur morbus, salutariter se habente ægro, ad hoc maximè animū aduertere oportet. Durante quidem febre & continua existente, & urinis tenuibus ac crudis semper existētib, & subsidentia non habentibus, si postea apparuerit in aliqua inferiori parte, uelut cruribus aut circa iuncturā aliquā, aut grauitas, aut tensio, aut ardor, aut dolor, absq; manifesta causa, in ea parte abscessum fore expecta. Si uero æger derepente difficulter spirās, citò quidem à difficili spiratione liberatus fuerit, successerit autem dolor & grauitas capitis, & altus sopor ac surditas, huiusmodi glandulis circa aures abscessum fieri necesse est. Fiunt autem abscessus magis in hyeme, & senioribus qui trigessimū annum exceſſerunt.

De sputorum significatione.

Cap. L II.

In peripneumonidis ac pleuritidis affectionibus, sputa propriè appellata, subsidentia in urinis similes sunt. At nihil omnino expuere, sed solum siccè tussire, est uelut in urinis quum extremè crudæ sunt. Si uero incipiat æger humida & perfectè cruda educere, obscura est & incerta talis transmutatio, & desinit primum morbi tempus, hoc est principium. Vbi uero in seperit spueri pauca & matura, & semper plura ac facilius educit, tunc augmentum esse dicimus. Quum autem exactè fuerint concocta ac mollia, & non ægrè educuntur, tunc instat uigoris tempus. Vbi uero concocta fuerint, ac citra molestiam educuntur, & imminuta est copia, & dolor non amplius fuerit, & homo faciliè spirat, ac bene tolerat, uigorem cessasse putandum est, & morbum iam declinare. Cæterum ante alia animū aduertere oportet, utrū citius aut tardius sputa exiussire incipiat, quemadmodū etiam Hippocrati uidetur. In pleuritidis inquit, si sputum statim appareat, in principio quidem breuis sit: si uero posterius appareat, prolongatur morbus ipse uidelicet. Quæcunque igitur sputa subflaua sunt & subfulua & subspumosa ac tenuia, solius cruditatis notæ sunt, & nihil notabilis mali indicant. Quæ uero purè flaua & fulua & uiridia ac spumosa sunt ac uiscosa, insuperq; nigra, mala sunt. Nam excepto sanguine quicumque alius humor purus fuerit, malam affectionem indicat ex calore generatam. Sanguinea igitur & pituitosa sputa, moderata sunt. Flaua uero ac nigra, mala. Considerare uero oportet & educationis ipsorum modum. Si enim faciliè expuuntur, iudicium est quod talia bona sunt. Si uero ægrè educuntur, mala: & præsertim si nigra, aut liuida, aut æruginosa fuerint, aut ualde graueolentia, ut prunis infecta graueoleant.

Signa perfectè ac fideliter soluti morbi.

Cap. L III.

Perfectè ac fideliter solutum esse morbū putare oportet, quum in idem simul conuenerint omnia solutoria signa. Siue igitur in uigore statim & confertim ac cōstanter iudicatus est morbus: siue paulatim de-

clinando fideliter solutus est, ex his sanè cognoscere poteris. Primum enim & maximum signum bonæ ac fidelis iudicationis, sunt concoctiones superfluitatum apparentes in diebus indicatiuis, cum uirū fortitudine. Deinde si in impari die iudicatio facta est, & ad hæc insuper, si febris soluitur egro iudicato, & ipse æger ab omnibus accidentibus liberetur, & colorator fiat tum in facie, tum reliquo corpore, pro euacuationis ratione: & subtiliore pulsu præditus, ac fortior dum assurgit, & bene toleras per omnia, & maximè circa concoctiones ciborum ac digestionis: & si omnes naturales actiones inculpate facit, et corpus pro refectionis ratione roboratur: & color ex non naturali in naturalem transmutatur. Hæc est optima iudicatio, & oportet ipsos confidenter renutrire conuenienti uictu ac balneis uidelicet. Si uero defectuosa facta fuerit iudicatio, morbus recidiuare solet.

Signa morbi non perfectè soluti.

Cap. L IIII.

Suspectos de recidiua cognoscemus, ex eo quod putatur quidem solutus esse morbus, perseverant autem consimiles prioribus urinae ac pulsus. Et quod adhuc pallidus est æger, & difficulter tolerat, & reliqua contraria omnibus prædictis bonis fiunt. Et in summa, quoties præter rationem solutus est morbus, bis ipsum reuerti timor est.

Prænotio diei qua moriturus est æger.

Cap. L V.

In perniciosis morbis considerare oportet exacerbationes per singulos insultus, an quotidie, aut alternis, aut alio modo fiant. Si uero febris est non intermitentium generis, uidean in imparibus diebus, aut paribus, æger magis intolerans seipso sit. Nosse enim clare oportet quod in illa die aut nocte, in qua magis intolerans seipso sit æger, morietur. Et si morbus multo plus uires excedit, citò morietur: Si uero uires parum resistunt, differri poterit ad unā atq; alteram diem. Fieri autem non potest ut moriturus ad declinationis morbi tempus deueniat. Raro uero in declinatione morbi aliquem mori cōtingit, nisi alius morbus prior succedat. Neq; uero necessariò ad uigoris tempus peruenit moriturus: sed ut plurimum in principio aut augmento ægroti moriuntur.

Quod etiam horam mortis ægri prænosceat possit

doctus medicus.

Cap. L VI.

Quum quatuor sint particularis exacerbationis tempora, obseruare oportet qua hora diei aut noctis grauior exacerbatio irruere solet. Insuperq; in qua parte exacerbationis æger seipso grauior factus est, nimirum an circa accelsionem, aut augmentū, aut uigorem ipsius exacerbationis. In illa enim hora, in qua languidior, aut præter solitū magis pulsu destitutus factus fuerit, morietur. Et in accelsione quidem exacerbationum moriuntur, ob inflammationes magnas in partibus principalibus, aut propter multitudinē crassorum ac uiscosorum humorū acruatim intrò lapsorum, ut transitus spiritus perfectè obturentur: ita ut suffocetur ac uelut extinguatur natura, quemadmodum si quis uiridium lignorum copiam accumulet in flammam. In uigore uero exacerbationū moriuntur, emota natura per uiolentiam ac uehementiā morbi. Eodem modo contingit ipsos etiā in exacerbationis augmento mori. In declinationibus autem exacerbationum moriuntur, exoluta ipsis per uiolentiā uitali firmitate. Obscurior enim & collabēs semper fit pulsus in perniciosis exacerbationis declinationibus.

Diffult

Diffluit enim tunc una cum alijs in corpore, etiam febrilis calor. Atque hinc idiotæ melius res habere imaginantur. Aegri uero aut ad exonerandum aluum surgentes, aut alio motu facto, animo linquuntur. alii qui uero paucos ac viscosos sudores exclusos moriuntur.

In acutis morbis mortem non esse predicendam.

Cap. LVII.

In acutis morbis conlectatione uti non oportet, in quibus maxime repentina mors, aut periculum ingruit. In his enim facile transluit & ardentior est humor, & uehementissima febris uolentia. Et de his morbis Hippocrates pronundauit: Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neque sanitatis, neque mortis.

Februm diuifio, & de diarijs febribus. Cap. LVIII.

Ex morbis ob intemperiem orientibus unus est & febris ipsa, calore præternaturali ad tantam immoderatiā euecta, ut angat hominem, & actionem lædat. Differentiæ huius caloris maioris ac minoris ratione distinguuntur, & iuxta subiectum siue materiam, aut ipsum cordis corpus calore occupare, aut humores, aut æream essentiam. Incipit igitur hæc præternaturalis caliditas, aliàs ex alio de prædictis, & nisi soluta fuerit, progressu temporis similiter reliqua duo genera afficit. Et si quidem in spiritibus permanserit hic calor, diariam febrem efficit. Si uero humores occuparit, febrem putridam incendit. Si uero ipsum cordis corpus iniuria affecerit, hecticam ac habitualement febrem facit. Nam aliqui febricitantes facile solubilem affectionem habent, uelut calefactum in sole lignum. Aliqui uero ægre solubilem, uelut accensum ab igne lignum, ut etiam fumum edat. Quidam uero planè exuruntur, uelut lignum ad carbonis naturam adactum. Tria igitur sunt genera, diariæ, putridæ, & hecticæ. Primum itaque de diarijs tractabimus. Fiunt hæc febres, uelut dictum est, citra humorum putrefactionem, solo spiritu feruescente, & propterea diariæ appellantur: Nam ubi loci sunt ægri in prima huius febris declinatione, & cibum boni succi ac humectum acceperint, non amplius secundo febricitant. Proprium autem & inseparabile signum diariarum febrium est urinarum cōcoctio in prima die, & caloris iucunditas. Verum post exacerbationem sedatam, certiores habebis cognitionem. Nam articularum motus, per omnia assimilatur motui sanorum, quod nulli alij febricitanti adest. Et ipsa bona ægri tolerantia maximum liberationis signum est. Et urinae multo meliores post exacerbationem quam in febris principio tibi apparebunt. Et si ipsis dum lauantur, neque horror aliquis insuetus acciderit, neque alia aliqua in iucunditas, & post balneum consequenter bona tolerantia manserit, cōfidenter nutrire potes ipsum, & uinum exhibere intrepidè bibendum, quantum in præsens moderatū est. Facile uero à talibus febribus capiuntur hi in quibus defluxiones corporis non uaporosum, sed acre quid ac fumosum habent. Quare si quando suppressus fuerit coaceruatus in ipsis calor, febrilis efficitur. Auspicientes uero ac externe læssentes harum febrium causæ sunt, lassitudines, frigiditates, uigiliæ, curæ, tristitiæ, iracundiæ, rigor, ardor ac exustio cutis, ut difficulter transpirationem admittat.

De diarijs ex lassitudine febribus.

Cap. LIX.

Qui ex lassitudine febricitant, cutem sicciorem quam qui ex alia quadam diaria febre laborant, habent. Et

hoc maxime cōtingit his qui simul frigefacti sunt ex multa lassitudine, ut etiā post febris uigorem permaneat ipsis siccitas. Et pulsus his parui fiunt. Qui uero non nimium fatigati sunt, his humiditates quædam, aut uapor calidus ex profundo effertur. Magni autem sunt & his pulsus. Oportet autem ipsos statim post exacerbationis declinationem, in balneum ducere. Et accurate simul ac molliter modico oleo dulci tepido perfrictos, aquarum dulcium lauacris lauare. Sed neque si in aëre balnei ipsos morari iusseris, quicquid læseris propter frigiditatem. Postea quietis studiū prodest.

De febricitantibus ex uigilijs, & curæ, & tristitia, aut ira.

Cap. LX.

Eos qui ex uigilijs febricitant, distinguit etiam coloris species. Est enim subhumida. Sed & oculorum motus manifesti sunt: nix enim attollunt supercilia. Et caui fiunt ipsis oculi, imò etiam siccus. Pulsus autem densiores sunt omnibus ob uigilijs, curam, ac tristitiā febricitantibus. Qui uero ex ira febricitant, his neque cauitas oculorum adest, neque color ille. Et calor his est amplior, & uelut ex profundo emergens. Et magni sunt his pulsus. Omnes igitur relaxari neque frictionibus, neque balneis multis opus habent. Sed multum olei perfrictione omnino non adstringentis. Atque ubi parum defricti sunt, pro more lauentur.

De febricitantibus ex ardore.

Cap. LXI.

Febricitantes ex ardore statim ab initio perfrigerantibus sanare oportet, & balneis pluribus dulcissimarum ac temperatissimarum aquarum. Oleum autem modicum adhibendum est, & omnino non affricandum. Sint autem quæ adhibentur capiti frigefacienda, omphacinum & rosaceum ex ipso præparatū sine sale. Facere autem hæc possumus frigida, uas in quo continentur suspendentes in puteum ut aquam contingat. Sed adhuc magis saliens aquæ frigida, oleum frigefacit, & magis adhuc nix forinsecus uasi circumposita. Perfundendum est autem sinciput ex oleo sic frigefacto, lana moderate excepto, ita ut manū in sublime leuemus, & hoc indefinenter faciamus, usque ad febris declinationem: atque ita in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducamus, accessu solo aëris balnei per transitum concessio.

De febricitantibus ex frigore.

Cap. LXII.

Si quis frigefactus febricitarit, suppressis uidelicet fumosis transpirationibus, quæ per cutem fiunt, & hic in balneum ducendus est in febris declinatione. Caput autem calfaciendum est & ante balneum, & post balneum, in declinatione, ex unguento amaracino aut nardino.

De febricitantibus ex grauedine ac destillatione.

nc.

Cap. LXIII.

Qui ob grauedinem febricitant lauare non oportet, priusquam ea concoquatur, si ex frigiditate aut cruditate destillatio facta est. Caput autem humectandum est irino unguento aut amaracino aut nardino. Si uero ex ardore facta est destillatio capite calfacto, & instar cucurbitæ attrahente materiā ex locis subiectis, hunc statim in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducere oportet, & in frigida immergere, & sub saliente locare. In balneis autem frigefacientibus caput humectare. Sunt autem ea moderata, propter balneum.

De febribus ex cutis densitate.

Cap. LXIII.

Densatur cutis aut ex frigore, aut acerba qualitate ipsi præter aduetudinem allapsa. Quale quid accidit etiam his qui in aluminosa aqua lauantur. Arctissima est

hinc

his cutis, ut etiam tacto cognoscatur. Imò & calor is motus, levis quidem iuxta primā manus admotionem apparens, acris efficitur, si diutius tactus perseveret: Urinæ autem non uelut alijs fuluæ sunt. Quare non accusamus in his quòd alimentum non sentiant, unde corporis moles contrahitur. Neque uero oculi caui ac sicci fiunt. Verū sunt quibus humidiores & prominentiores esse uidentur naturalibus, eò quòd non contigit transpiratio in ipsis, sed materiæ magis intus concluduntur. Vnde neq; pulsus parui sunt uelut in tristitia, aut cura, aut uigilijs, & ualde immoderatis exercitijs. Curare porro eos oportet aquarum dulcissimarū ac temperatissimarū balneis, post exacerbationis declinationē, & præcipere ipsis ut aliquandiu in balnei aëre morētur, affundendūq; est ipsis oleum dulce tepidum, & frictio mollis ac moderata adhibenda. Tenuis autem uictus præscribendus est, & uinum dandum tenue & album.

De febribus ex fame.

Cap. LXV.

Si ob famē fiat febris, exacerbationē declinante in balneum ducantur, & plurimo oleo tepido dulcissimo perfusi leuissimè fricentur, & plurimo tēpore in calido solio morētur. Egressi deinde ac uiribus resecti rursus in balneum ducantur, & in calidum solium locentur. Postea egressi post balnei turbationē sedatā, dāda est aqua calida potanda, deinde ptisanæ succus: aliquando etiam pisces petrosi in iure albo parati.

Dieta cōmunis omnium diariarū febrium.

Cap. LXVI.

Dieta in febribus diarijs omnibus cōmunem scopum habet, ut sit ex edulij boni succi & quæ omnino cōcoquantur, & nusquam circa meatus detinentur: his quidem qui ex ardore aut ira februnt, quæ simul frige faciunt ac humectant: frige factis uero, minus alentia & moderatè calfacientia. His autē qui uigilarunt, aut tristes fuerunt, aut curis uexati, humidus & somnificus cibus congruus est. Fatigatis autem, plurimus & maximè nutriendus. At in quibus intēperatura corporis calidior ac sicclor facta est, eos oportet aliquando circa primum exacerbationis impetum nutrire. Vinum autem dandū est omnibus qui ex diaria febre laborant, aquosum, tenue ac album, quòd & concoctionem adiuuat, & urinas ac sudores propelet. His uero qui uigilarunt, aut tristes fuerūt, aut curis uexati, magis intrepidè uinum datur. Sed & fatigatis nimium, dandum est quātum superare possunt. Iratis autem priusquam ab affectu omnino liberati fuerint, minimè tutum est uinum dare.

De febricitantibus ex inguinū inflammatione.

Cap. LXVII.

Si quidem citra laceffentem externā causam, inguinis glandularum inflammatio fiat, multitudinē sanguinis plerumq; in uniuerso corpore indicat. Nam & calor in his amplior est quàm in prædictis, & facies rubicūda ac tumida apparet. Oportet igitur celerrimè uenā secare priusquam materia in inflāmato putrescat, ac febrem putridā accendat, post uenæ sectionem utendum est tenui diēta, usq; ad perfectā liberationē.

At inflāmato inguinī, ante uenæ sectionē adstringentia ac repellentia imponenda sunt, post uenam sectam, laxantia ac moderatè discutiētia. Cæterū quibus propter offensionem digitorum pedis, aut aliud quid tale, inguinis inflāmatio facta est, & ea de causa febris diaria consequuta, tales ne interrogāt quidem Medicum quid facere oporteat, sed ulceri ex quo inguinis inflāmatio facta est prospicientes, lauantur

circa exacerbationis declinationem. Prohibendum autem est uinum omnibus ex inguinis inflāmatione febricitantibus, donec inflammatio fuerit soluta. Et uictus ratio tenuior ipsis constituenda est.

De diarijs febribus ex cruditate obortis.

Cap. LXVIII.

In corporibus ex malis humoribus uitiatas cruditates orientes citissimè febrē accendunt. Minus autem fit malum, si ob cruditatē aluus infra erūpat. Non paruum autem malum est, si fuerit suppressa. Februnt autem aliqui etiam in quibus profluuium uētris ob cruditatem fit. Si quidē igitur sola corrupta euacuata esse apparuerint: lauandi sunt ac nutriēdi in febris declinationē. Si uero plus iusto euacuatio fiat, melius est nutrire citra balneū, prospiciendo uentri ipsi. Cura uero uentris dupliciter fiat. Si enim non amplius feratur ipsa aluus, absinthium modicum aqua macerans coquito cum oleo in duplici uasculo, & ex hoc locos circa uentrem humectato. Deinde hapsum lang purpureæ oleo imbutū uentri imposito. Si uero debilius est os uentris, mastichē cū ungento nardino ad strigmentitiā crassitudinem redige, & purpuram ex eo imbutā impone. Sint autem ea quæ imponuntur ad tactū calida: tepida enim robur uentris exoluūt. At si adhuc feratur aluus, melius est optimo melino uti pro nardino, cū modico uino. Cōmodum est ad hæc & mastichinum. Si uero etiā uenter exuratur post euacuationē, melino similiter utaris, aut cerato ex ipso parato. Nutriēdi porro sunt adhuc fluēte aluo, ex polenta & panibus paucissimum acetum habentibus. quos hinc oxylipes Græci uocāt. Inspargenda est autem polenta succo malorū punctorum, aut pīrorū aut malorum, præsertim cotoneorū. Vel in ipsorum decoctū, aut myrtorum. Si uero fluxus cessarit, alica detur, & gallorū testes, & pisces petrosi in iure albo parati, & fructus adstringentes. Si uero inappetentes fuerint, ut auersentur cibos, ex cōcoctorio medicamēto ex malorum cotoneorum succo ac melle composito, cochlearium unum aut duo dāda sunt. Si autem non affuerit id quod ex succo cōpositum est, detur id quod ex carnibus cotoneorū paratur, cui nihil omnino piperis additum est, aut ualde exiguum quiddā. Si uero supprimatur aluus in his qui ob cruditatē ex diaria febre febricitāt, si quidem cibi adhuc in uētre continētur, plurima tepida pota, digitis aut pennis immisis, per uomitū subebimus id quod molestū est reijcere, deinde præcordia fouere, & quietē agere. Si uero cibi iā descenderūt ad intestina, reclinatis ipsis ita ut partes circa caput & stomachū sursum uergentes habeāt, foueatur uenter, & somnus concilietur. Post somnū autē glandula subdetur, ad superfluitates quæ descenderunt educēdas, aut per mitiorē clysterem, quale est fursurum decoctum, euacuatio fiat. Dieta sit tenuissima, quæ plurimam extersoriā uim in se habet. Quòd si inflatio accesserit, incoquere oportet in oleo cuminum, aut rutā, & infundere per sedē. Euacuata uero aluo, statim nutrantur. Si uero etiam citra molestiam dormierint, postridie lauentur, adhibentes uentri ungentum nardinum cum modico uino. Et post balneū similiter tenui uictu utantur. Si uero etiam tertia dies febrem aliquam induxerit, neq; sic timendum est, sed similiter lauandum, ac moderatè nutriendum. Dare autem oportet talibus ante cibum aliquod concoctorium, oxyporū à cita penetratione appellatum

medicamentum, & præsertim quod ex cotoneis malis sit cochlearij mensura.

Curatio diariarum febrium multarum dierum, quarum aliqua ex mutatione diariarum generantur, ob cutis obturationem. Cap. LXXI.

Quædam febres propter obturationem uasorum circa cutem fiunt, ex diariarum mutatione, quæ non probe curatæ fuerint statim ab initio. Cõtingit hoc maxime in corporibus uisiosis humoribus præditis, quum multum fuerint uoraces. Nam in talibus circa primam ac secundam diem aliquantisper, non est in pulsu putredinis signum, sicut neque in urinis, cruditatis: dum enim prolõgatur quidem declinatio, & non amplius iuxta proportionem remittit, suspecta est affectio: si enim non transpirauerint perfecte, necesse est putrefactos esse uisiosos humores. Si quidem igitur puer aut senex fuerit ægrotus, uenam secare non expedit. In medijs autem ætatibus, robore præsentæ ægroto, uena secetur, si sanè etiã plenitudinis signa affuerint in corpore. Detrahendum est autem pro uiribus, & obturationis magnitudine: maior enim febris ob uehementiores obturationes incidit. Minor autem ob minores. Euacuata uero multitudine, & rarefactis meatibus, fumosæ ac fuliginosæ superfluitates transpirantes pauciores fieri poterint. Periculosum enim est aperire potentibus obstructions, uis ante euacuationem. Quæ enim uim exterforiam habent, exhibita dum exhalant simul attrahunt quid ex crasis ac uiscosis humoribus in uasis, & duplicat in angustis meatibus obturationes. Si uero etiã extrinsecus cuti admoueatür exterforia, periculum est ne attrahant etiam aliud quid ad meatus obstructos. Quod igitur secure & intrinsecis exhalatio, & extrinsecis attractio contingat, utilissimum est euacuare pro uiribus corpus: post euacuationem uero non longa facta dilatione, aliqua exterforia edulia aut pharmaca dare. Eduliorum quidem loco potius sanam & aquam mulsam, pro pharmacis autem, acetum mulsum ex solo aceto ac melle paratum. Quæ enim in aceto mulso coquuntur alijs, uelut calamintha, & similia calida, febres accendunt, uelut etiã uinum. At post tertiam diem, neque putredinis humorum signo in pulsibus præsentæ, neque in urinis cruditate, & ubi hora suspecta in qua febris accessit in prima die transiit, confidenter iam hominem lauare oportet. Si uero etiã circa decimam horam suspectus tibi fuerit paroxysmus siue exacerbatio, lauare oportet ante horam sextam. In balneo uero corpore præcalefacto illintre oportet oleo dulci tepido, & moderatius cõfricare, postea depurgare & abluere forinsecus corpus. Eligenda ad hoc quædam moderatè extergentia, qualis est ordeacea farina & sabacea. Deinde immittere in solium calidæ temperatæ, deinde etiam in frigidam. Si uero circa decimam horam, ut ita demus, turbatio quædam suspecta sit, nihil exhibendum est præter aquam cui incocta est hyssopus & parum apij. Deinde si nihil mali intulerit hora, nutriantur: Si uero etiam quid attulerit, omnino moderatum apparebit. Quare & lauare poteris post frigidie ac nutrire. At ubi magna facta est obturatio, necessario putrefactio contingit. Vnde curatio in putredinosa febre referenda, etiam his congrua est.

De febribus continentibus, siue synochis. Cap. LXXII.
Continens febris nominatur, cuius ab initio usque ad finem una est exacerbatio, nullam alterius exacerbationis principij significationem faciens. Corporibus bo-

no habitu præditis, & multo sanguine repletis, & ætati calidæ peculiaris est continens febris. Conflatur enim ob calidi sanguinis copiam nodum putrefacti, & eo quod non transpirat, feruore solum caliditate excitantis: quemadmodum nouum uinum solet in dolijs: tempus autem talium febrium maxime uernum est. Sunt autem differentie febris continentis tres, nam aut equalis permanet magnitudo ab initio usque ad solutionem, aut additamentum facit, aut detractionem: hoc autem contingit prout maiores aut minores fiunt transpirationes, ex eo quod densior aut rarior est habitus corporis affecti. Est autem multa copia quæ in talibus affligit, & feruorem sanguinis ebullientem consequenter febris accendit. Aliquando uero etiam crassitudo. Scopus igitur curationis in ipsis est euacuare copiam, & extinguere calorem præternaturalem, & crassitudinem secare, si quidem affuerit. Deinde ueterem bonam temperaturam debilitatis partibus reparare.

De uenæ sectione.

Cap. LXXIII.

Si ualidæ sunt uires, & ætas permittit, & nihil aliud fortiter resistit, sanguinis tantum auferre oportet, quantum uires tolerant. Præstat autem si uires adsunt, usque ad animi deliquium ducere. Quibus uero non sic uena secta est, hi ad extremum periculum deueniunt, ut aut suffocentur, aut animo linquantur, nisi uirium robur, aut larga sanguinis eruptio, aut multus sudor, ex manifesta perniciæ ipsos eripiat. Nam multitudo in his non amplius a uenis contineri potest, obturat ac distendit corporis molem, & propterea ipsum aliquando dirumpit, & uasa maxime in naribus aperit. Ea gratia festinare oportet ad sanguinis detractionem, quantum uires ferunt: quod uasorum natura ex transpiratione ac uentilatione, naturale temperamentum conseruas, iuxta morem ab initio humoribus dominetur. Verum animaduertendum est & ad ipsius uenæ sectionis scopos. Præcedente enim ciborum cruditate, eousque uenæ sectionem differre conuenit, donec tibi satis esse uidebitur concoctio ipsorum in uentre peracta, itemque secessus superfluitatum in intestinis. Si uero suspectam habes post uenæ sectionem, aliam fore sanguinis euacuationem, uelut muliebrem purgationem, aut hæmorrhoidum in sede fluxum, relinquere oportet in uenæ sectione tantum sanguinis, quantum per alios locos euacuandum putas. Quare siue menses fuerint moti, siue hæmorrhoids aperta, totum negotium nature permittito. Si uero non tantum quantum oportebat euacuatum fuerit, tunc uenam secato, quod ex utrisque compositis perficiatur quod conuenit. Aptus est ad uenæ sectionem habitus corporis durus, multus sanguinis, densus, & ægre transpirans. Status aeris humidior. Resistit uenæ sectioni puerilis ac senilis ætas, temperamentum calidum, ac siccum ualde, & tempus ac regio cõsimilis, & qui natura humidiores sunt, & præsertim cum caliditate, & qui raro habitu præditi sunt. Insuper quibus os uetris aut amara bilis ualde uexatur, aut debile est, aut ultra iustum subtili sensu præditum: hi enim omnes facile transpirant, & in uenæ sectione animi deliquijs corripiuntur, ex quibus ægre reuocari possunt. Similiter autem etiam si triginta annorum fuerit is cui uena secanda est, uerum humidus & mollis, & pinguis ac albus corpore, & paruas uenas habuerit: huic aut omnino non uenam secabis, aut parum detrahes: omnino quidem non, ætatis tempore & in reliquis eiusdem ordinis: parum uero, alijs temporibus

temporibus ac reliquis cōstitutionibus. Proinde alii qui in animi deliquiū collapsi in ipsis medicorū manibus, nō sunt reuocati, quare si quis euacuasset citra uirū dissolutionem, non perisset. Aliqui uero per omnē deinceps uisā, totum corporis tēperamentum frigidius habuerūt, propter immodicā euacuationē, ut quidā in malo corpore ac habitu uisam degerint: quidā uero ex hoc ipso pernicioso morbo correpti sint, ab aqua inter cutem, & erectæ ceruicis spiratione, hepatisq; ac uētris debilitate, & semī sideratione: optimū igitur est, quēadmodum nos semper facere uidisti, nō dierum numero animum aduertere, neq; soli multitudinī, sed uirū robori, in omnibus quidem, uerum maxime in continentibus febribus: si enim uires conseruentur, non solum sexta ac septima, sed etiam sequentibus diebus uenam secabis.

De frigida aquæ exhibitione. Cap. LXXII.
Si aliquando coactus fueris curare ægrotū, qui non solum antea uenæ secandæ auxilium omisit, sed etiam nunc aut propter timiditatem ægroti, aut cognatorum sanguinē detrahare prohibearis: ad frigida exhibitionem deueniendū est exacta præscriptione facta, quantū ex ipsa fieri possit detrimentū. Nā si hoc paruum uel omnino nullum futurū est, danda est in potu frigida sincera quantū eger elus uoluerit. Tunc autem danda est frigida, quum in urinis uideris coctionis signa. Neq; autem in principio, neq; in augmento danda est frigida, sed in ipso uigore totius morbi, ac particularis exacerbationis. Oportuno enim tēpore data frigida, corroborat solidarū partium naturam. Corroborata uero natura præattenuatos humores aggreditur, ut bonos quidē detineat, inutiles uero eiciat, aut per uētre, aut per uomitus, aut sudores. Si uero frigida potior fuerit eger tēpore sanitatis ualde confidenter frigida dato, ipsa experientia doctus, omnia uiscera frigida familiaritatē sustinere. Si enim omnino aliqua pars adeo frigida esset, ut ab ipsa læderetur, sanitatis itaq; tempore euidentis detrimentum ostēdisset. Quum autem nulla pars in sanitate læsa sit, ne in febre quidem lædi poterit, quū maximum propugnaculum habeat in profundo ardentis caloris multitudinē. Quapropter his qui modicum sanguinem, & minimū carnis habent, frigida potus periculosior est. Cito enim ad solidas animalis partes pētrat carnis nudatas. Quapropter etiam habituales febres, neq; sincera, neq; multa frigida opus habent. Tenuia enim sunt in ipsis ac modici sanguinis corpora. Vnde quū magni detrimenti timor immineat in ineptis, a frigida exhibitione abstinere oportet, & ut alijs auxilijs, quæ obturationes reserant, & multitudinem euacuant, & feruorem febris mitigāt. At uero detrimenta ex intempestiuo frigida potu oriuntur hæc sunt: Viscosos ac crassos humores attenuari ac transpirare frigida impedit. Quare siue inflammatio fuerit in aliquo uiscere, siue ignis sacer, siue indurata, siue mollis ac laxa affectio, frigida potus ad huius sanationē nihil cōfert: sed uestigio quidem non modicam affert lenitatem, eo quod febre iam factā extinguit. Manente autem intus causa, quū ex frigida densatum fuerit corpus, aliam febre accendit priore grauiorem. Atq; hæc quidē detrimenti species contemni poterat. Verum pleriq; debilia habentes uiscera, citius ac facilius a frigida exhibitione læduntur. Quibusdā enim stomachus siue gula adeo

fortiter affectus est, ut perdiderit actionē, & uix potuerit deglutire: Alijs uēter lēsus est, ut uix cōcoquere potuerit: Alijs hepar, ut ex hoc in aquā inter cutē inderint. Alijs colū, aut pulmō, aut renes & uesica, aut aliud quid a frigida læsum, debile ad propriam actionem factū est. Quidā ipsorum statim erectæ ceruicis spiratione, aut alto sopore, aut lethargo, aut aurū abscessu, aut conuulsionibus, aut tremoribus, aut siderationibus corripiuntur. Et ut in summa dicam, Omne neruorū genus & caput ipsis affligitur. Noui quod formidinem tibi induxerim per ea quæ reuoluit, ad frigida exhibitionē. Verum uidisti me sæpe ipsa oportunē usum esse, & in quibus dare oportet. Et semper utilitatem assequutum esse, citra ægri læsionem.

Dieta in febribus continentibus. Cap. LXXIII.

Quibus uena secta est, his ego post duas uenæ sectæ horas, semper do modicum ptisanæ succum, & subeo quiescere. Et postquam ex somnis surrexerint, rursum similiter ptisanæ succum exhibeo, & in hoc perseuero usq; ad tertiam diem. Quarta serē semper in balneum duco. Tales enim oportune uena secta uiribus robustis, & ad animi deliquiū euacuatū, necessariō sequitur non longē postea uentris secessus, attenuatis uidelicet humoribus, & leuatis ac corroboratis uiribus. Aliquando uero etiā bilis uomitus. Ad quæ statim etiā humiditates per totum corpus aut sudores succedunt. Quare confidenter hos lauato quarta die. At uero tempus exhibendi cibi in febribus continentibus, tum his, quæ iam relatae sunt, tum his quæ postea referentur, quæ sanē unā solum ab initio usq; ad finē exacerbationē habent, est bona ægri tolerantia & cōsuetudo. Tunc enim ipsis cibi dandi sunt, quando tolerantissimi sibi ipsis esse uidētur. Et illo præsertim tēpore diei, in quo etiā prius morē accipiendi cibi habuerunt: maxime enim tolerantē pertulerint cibos isto tēpore acceptos. Robustis igitur uiribus, & dū uigor morbi breui expectatur, tenuissimo uictu uel licet. Vbi uero uires ægræ sunt, non licet tenui uictu uti, citra magnū detrimentū. Quare alimentis tantum apponendū est, quantū roboris uiribus detractū est.

Vniuersalis doctrina de febribus putredinosis.

Cap. LXXIII.

Transpirationis angustia ac impedimentum meatuum obscurorum totius corporis obturationem facit, per quos fumosæ & fuliginosæ superfluitates quotidie transpirant. At obturationis affectio quū parua fuerit, & probe tractata, diariā febrem efficit. Quum autem siue propter magnitudinē, siue imperitiā Medicorum consuetū diariarū tempus excesserit, aut cōdientem, aut aliā quandam ob humorū putrefactionem accendit febre. At uero transpiratio multiformiter impeditur, & dum densantur meatus propter siccitatē, aut adstrictionē cutis: & dum obturantur propter multitudinē & crassitudinē ac viscositatem humorum. Dū itaq; quotidie fumosarū ac fuliginosarū superfluitatū trāspiratio impeditur, naturalis in nobis calor affligitur. Alius uero præter naturam corporibus accedens, primū humores propter humiditatem putrefacit ac corrūpit: Progressu uero tēporis etiā pinguedinem ac carnem, & ipsa solida corpora inuadit. Est autē putrefactio essentia putrescentis corporis ad corruptionē transmutatio, a calore præter naturam fiens. Putrescentes igitur humores, aut intra uasa arctati, conuinuas & nunquā inermittens

res usque ad perfectam morbi solutionem febres efficiunt, aut per totum corpus delati, & extra uasa elapsi, quando febre per circuitum accedentem, & interualla habent accendunt, uelut tertianam, quartanam, quotidianam, aut aliam consimilem. Causa uero cur non excidant extra uasa humores in febribus continuis, est aut multitudo, aut crassitudo, aut viscositas ipsorum. Quoadmodum igitur dum inanimata corpora putrescunt, primum abijcimus ex ipsis quae iam putruerunt, deinde reliquum in aere frigido suspendimus, & perspirationes perfrigerantes molimur: Eodem modo sanabimus in humanis corporibus putrefactionem, quod quidem iam corruptum est omni modo euacuantes. Reliquum uero gestationibus moderatis & transpirationibus perfrigerantibus, ad exactam ac naturalem proportionem reducentes. Proinde ubi prius de non intermittebant febribus tractauerimus, mentionem faciemus deinceps, & reliquarum.

De febribus putridis.

Cap. LXXXV.

Quum in omnibus uasis, & praesertim maximis, circa alas ac inguina, ac consimilibus, sanguis calidior, qualiter redundans putruerit, febrem putridam continentem efficit. Plerumque uero in corporibus multum sanguinis ac carnosus, & denso habitu praeditis, & superfluitatibus calidis repletis haec generatur. Proinde his iam febrientibus pulsus maximus & aequalis ac uehemens est, & qui copiam arteriae neque durior, neque molliorem habet. Ad tantam uero uelocitatem ac densitatem uenit, ad quam magnitudinem ipsa febris uenit. Atque haec quidem ambabus communia sunt, huius uidelicet, & praedictae continentis extra putrefactionem febris. Verum huius praecipua putrefactionis signa in urinis, & pulsibus, & caloris specie adsunt. Curatio uero harum febrium, in utroque genere communicat, tum in eo quod cum putrefactione, tum eo quod sine hac est. At essentia quidem & uniuersa ipsarum natura, ex genere putridarum est. Verum quatenus una est tota ipsarum exacerbatio, ab initio usque ad totius morbi solutionem, eatenus communicat cum continenti absque putrefactione. Oportet itaque etiam curationem ipsis in hoc solum cum illis continentibus communem esse. Per alia uero omnia bifariam secari, ita ut quosdam medendi scopos ex genere putridarum accipiamus, quosdam uero ex propria ipsarum essentia. Saguis enim est qui in hac febre putrefactionem suscipit. Sic uero etiam alias differentias putrefactorum humorum sanare conuenit, iudicationem partim a putrefactione sumendo, partim a propria uniuscuiusque differentia, uelut pituita, aut utraque bile. Quandoquidem igitur putridarum febrium septem subiecta sunt praeter naturam, a quibus iudicationes sumuntur, nempe copia humorum, & crassitudo, & viscositas, & obturatio, & transpirationum suppressio, & putrefactio, et febris non habens interuallum, unamquamque sanare ex relatis affectionem sanare oportet per contraria. Copiam per euacuationem. Crassitudinem per secantia. Viscositatem per exurgentia. Obturationem, aperientibus. Transpirationum suppressionem, si quidem propter constrictionem cutis facta est, per diffundenda: si uero propter densitatem, per rarefacientia. Deinde putrefactionem, extergentibus & alterantibus ac transmutantibus. Febrem autem, per frigescentia. Quum igitur uires fuerint fortes, uena & his secanda est, nisi cruditas uentris, aut alterius cuiusdam partis prohibeat, uelut antea dictum est. Nam

ex his quae de illis diximus, considerare oportet convenientiam etiam de his. Quandoquidem uero neque obturatio neque putrefactio curari potest per solam uenae sectionem, quum alijs auxilijs opus habeant, referuare aliquid sanguinis oportet ad curationis tempus, ut ne necessitas aliqua ingruat, ob inopiam, interpestiue nutriendi. Quantum enim ad talem febrem attinet, omni non non nutrire oportet: Quantum uero ad sanguinis euacuationem, nutrire opus erit. Quare ex duobus alterum necessarium erit, ut aut nutriendas febrem augeamus, aut non nutriendas, uires dissoluamus. Melius igitur, uelut dictum est, relinquere sanguinis proprium alimentum animalis partibus. Et ipsum contentum esse modicis sorbitionum exhibitionibus, uelut sunt pusana & aqua mulsa, quibus ut medicamentis magis quam alimentis opus habemus. Si uero ob aliquam causam relictum fuerit uenae sectionis auxilium: homini per tenuem uictum connutrito, quum iam concocti fuerint humores, & crassitudo ipsarum fuerit praetenuata, febre in uigore existente, dabimus frigidam aquam, uelut in superioribus continentibus febribus, nisi quid ex illic relatis prohibeat exhibitionem. Quod si uero etiam frigidae potionis auxilium fuerit relictum, alijs auxilijs utendum est, quae obturationes aperiant, & multitudinem euacuant, & feruorem mitigant, uelut antea dictum est, & deinceps consequenter referetur.

Communis dieta omnium febrium putridarum.

rum.

Cap. LXXXVI.

In omnibus putridis febribus in communi putrefactos humores expurgare oportet, per urinam, & uentrem ac sudores. Hoc enim commune est omni putredini. Si uero aliquando sua sponte ad os uentris imperuisece rint, per uomitus euacuentur. Alioquin non oportet aegre uomentes praeter naturam fricare, uene uires oris uentris exoluantur, quibus maxime in morbis opus habemus. Eligenda uero sunt quae extra calefactionem ac resiccationem praedictas euacuationes perficere possunt. Velut est pusana succus, & aqua mulsa, acetum mulsum simplicissimum, & fauorum mellis elorum cremor, apomeli Graeci uocant, & radicis apii decoctum. Aqua itaque mulsa ad secandos crassos humores, & detergendos uiscosos, & promouendas excretiones, optima fuerit, in febribus ex coarctatione ac putrefactione obortis, & praesertim continentibus putridis, attamen febrilem calorem augeat. Quare si immodica fuerit caliditas ab aqua mulsa abstinendum est, & utendum pusanae succo. Si uero obturationes aegre solubiles esse iudicauerimus, acetum mulsum dandum est: quanquam & hoc si quis immodice utatur, intestina radit, & rursim mouet, & neruosas partes laedit, ut difficile sit reperire tale auxilium, quod nihil laedens multum proficit, atque hoc contingit propter complexum affectionum praeter naturam in corpore. Quapropter his qui facile a quacumque re exhibita laeduntur, melius est ut pusanae succo utantur, donec ualidius alimentum accipere possint. At si alius non egerat, aqua mulsa cum solo oleo infusa eluatur. Totum uero corpus forinsecus ante euacuationem discussoris diffilare non oportet, post euacuationem uero discussoris uti licet. Pharmacis autem utendum est tepidam caliditatem habentibus, uelut est oleum chamaemelinum, & in hoc tempore, inter discutendum inquam, etiam uinum aquosum, potum omnes excretiones

mouet. Concoctione uero manifesta in urinis apparete, etiam lauare licet, dulcis & potabilis aque balneo.

De febribus continuis. Cap. LXXVII.
Febres continuæ eiusdem generis sunt cum intermissis, sive interpolatis. Eiusdem autem generis dico cum tertiana exquisita, febrem ardentem (causam Græcis dictam) exquisitam, & cū quotidiana, eā quæ quotidie exacerbatur, & tamen nō intermittit. Nam & febris ardens omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruat, & in hoc solum ab illa differt, quod cum rigore non irruit, neque intermittit. Et quæ quotidie exacerbatur, similiter omnes notas habet cū quotidiana. In eo uero quod non intermittit, eiusdem cum illa generis est. Eodem modo etiam quæ per quartā exacerbatur, non autem intermittit, eiusdem generis est cū quartanis. Et manifestum est quod neque rigor exacerbationes præcedit, neque sudor consequitur. In hac febre, quemadmodū neque in febre ardente. In febre ardente rigor superueniens soluit ægritudinem. Differt autē febris ardens à continente putrida, eod quod hæc ex sanguine putrefacto conflatur, & à principio usque in finem unam habet exacerbationem. Febris autem ardens ex flaua bile putrescente incenditur, & alternis diebus exacerbatur, & quādam habet febris diminutionem ac uelut remissionem. Continens uero putrida similis manet usque ad solutionem.

Cura febris ardentis. Philum. Cap. LXXVIII.
Est igitur febris ex flaua bile putrefacta incensa, continua ardentissima, & neque medicis, neque ægris bonū ordinem exhibet. Lingua enim in his arida est, & nigra ac aspera. Morbus item uentris, ac sitis intolerabilis, & uigilia. Aliquando etiam delirium. Primum itaque leniter ac blandē hanc febrem aggredi oportet. Vbi uero concoctionis signa apparuerint in urinis, & morbus iam ulgerit, acrius instare, & ad frigide potum accedere. Nisi & hic aliquid prohibeat ex his quæ de continendis febribus relata sunt. Prima uero auxilia in febre ardenti sunt: Decubitus in locis frigidis, qui ad purū aërem patent ac perflantur. Stratum molle & sepius renouatū, amicula assiduè permutarā, & satis gracilia & non sordida. Lectus sit abunde amplus, quo possint mēbra calefacta subinde ad alias atque alias eius partes transferri. Et per flabellum aër ignauior cōcitetur. Epithemata cōueniunt pectori ac stomacho imposita, palmulæ cū uino & rosaceo, aut melino tritæ. Sunt & frigefaciētia commoda, uelut sunt pampini uitis triti, seris, polygonū, plātago, ramenta cucurbitæ, lactuca, rumex acutus. Singulis autem ammisceantur mīcæ panis præmadefactæ, aut polentæ. Oportet tamen assiduos horum usus deuotare. At uero panniculi linei complicati moderate graciles aqua & oleo calido imbuti, & pectori ac stomacho impositi, ardentem febrem spirifice mitigant. Sed & aqua & oleum calidum, aut aqua & oleū rosaceum, ex alto in pectus delata per lancē manipulū, uehementiā ardoris facile obviunt. Oportet autē abunde calida esse aquam, & oleū, aut aquā & rosaceum. Tepida enim paritū firmitatem exoluunt. Si uero parum niri his ammixtū fuerit, sudores excludere poterint. In ardentissimis autem febribus etiā acetū parū ammiscēdum est. nā & hoc quod debet facit. Cibi porro offerendi sunt humidissimi, & nihil acré habentes, uelut sunt lactucæ, caules cum posca aquosa feruēfacti, & cucurbitæ similiter cum

posca. Sed & pīsanæ succus tenuior dandus est absque sale, aut alio additamento. Et aliquando post cibum aquam frigidam cochlearij unius aut duorum mensura absorbeant. Aut sit potius ipsorum potus in totum lactei teporis. Sed & aqua frigida fracta colluctanda ac gargarissanda præbeatur. Et rosarum succi cochlearium absorptum stomachum refrigerat. Quin & alia animi oblectamenta procurentur. Folia uitis uiridia, item myrti ac rosarum per paulmentū spargantur, & aqua frigida frequenter irroretur. Et aquæ salientes in uicinia sonum edant. Tempus autem frigefaciētiū epithematum ac similiū, est uigor exacerbationis. Nam in principijs ac augmentis exacerbationum, dum adhuc inæqualiter affectum est, & caliditas circa uiscera resideat, si hæc adhibeantur, diffundunt quidem sensum, uerum repellentia caliditatem in profundum, malus detrimentum inducunt, incluso intus feruido calore, & rursus febrem ardentem efficiēte. At in uigore exacerbationum, ex passa caliditate per totum corpus, facile extingui poterit ea quæ adhuc reliqua est circa uiscera. Nam & melius spirantes, & minus siticulosi fiunt, his in tempore adhibitis. Et ipsorum roscido uapore excluso, ad somnum conuertuntur. Cæterum instante iam uigore totius morbi, & nullo prohibente ex his quæ in continend febre relata sunt, tempus iam est frigidae exhibendæ. In quibus igitur confidimus, nullum ex uisceribus, neque caput, uelut dictum est, læsionem incursum, sinceram sanē frigidam exhibemus. In quibus uero metus est, atque is uel minimus impedimento est, pro prima uice fractum exhibebimus potum siue frigidam. Frangitur autem si quis temperata aquæ calidæ cyathum unum, ad quinque frigidae puræ sinceræ ammiscuerit. Atque talis potio suspectis corporibus exhibetur. Quidam uero olei rosacei cyathum frigidae exhibendæ affundunt, & sic exhibent. Ipsum enim rosaceum non ualde frigefacit, & oleositas eius corporibus intus oblita, non permittit ipsa à frigida aqua lædi. Et simul firmitatem quandam exhibet uentri rosaceum, & lubricitatem, propter oleositatem. Quidam pro rosaceo, melinum exhibent. Porro balneum illis solum cōuenit in ardenti febre, qui citra tumorem aliquem inflammatum, aut erysipelatum ægrotant, ubi concoctionis signa apparuerint in urinis. Quod si quis iuuenis sit carnosus, tempore æstatis, & constitutione calida ac sicca, febre in uigore existente, & concoctione in urinis apparente, citra uisceris alicuius inflammationem, & in lauacrum frigidae notatorium seipsum iniiciat, atque nater, sudores utique commoueantur. Si uero etiam ad frigidae balneū aduersus fuerit, ualde confidenter hoc auxilio utatur. Quibusdam enim statim uenter biliosa egessit. At si moderata est febris, & uires robustæ, unā cum concoctionis signis, profunt ipsis balnea dulcium ac temperatarum aquarum, & ex uingentis chamæmelinū, præsertim si aër ambiens, frigidus fuerit. Nam si aliquando contigerit, ut frigido existente ambiente æger fortiter a febre exuratur, modicam salutis spem de ipso habere oportet. Si uero neque concoctionis signa affuerint, in tali aëris statu, neque uires fortes habere apparuerint, tale seruari impossibile est. Quare neque lauabis ipsum, neque inunges rarefacientibus medicamentis, neque uinum dabis, neque frigida. In quibus enim desperata

est salus, uanum est auxilia multos seruanda Imperi-
torum calumniæ exponere. Proinde ego sanè Me-
dicos quosdam noui methodi ignaros, qui imitati
sunt ea quæ à nobis fieri solent, & uisunt his auxi-
lijs, in his qui penitus mortui fuerunt, & neq; quic-
quam profecisse, & oportunum ipsorum usum suspe-
ctum ac horrendum fecisse. At nos & temporum oc-
casiones, & auxilia describimus, in his qui seruari
possunt. Nam qui incurabiles sunt ægri, his neq; oc-
casio neq; auxilia commodant.

Tertianæ exquisitæ dinotio. Cap. LXXIX.

Febris tertiana exquisita in corporibus natura billosio-
ribus omnino consistit, & in ætate uigoris, & maxi-
mè tempore æstiuo, & in locis calidis ac siccis tempe-
ramento, & in tali ambientis nos aëris statu. Sed &
ultra in laboribus, & curis, ac uigilijs, ardoribusq; &
paucò alimento, eòq; calido & sicco. Et immodicus
calefacientiu ac siccantium potionu ac medicamento-
rum usus, apta sunt ad febrem tertianam. Quum igitur
gignatur tertiana, ex flaua bile putrefacta, ac mo-
ta, & extra uala lata, statim à principio rigorem insi-
gnè inducit, qui à quartanæ febris rigore in hoc dif-
fert, quod in tertianis pungi ac uulnerari corpus ui-
deatur. Nam in quartanis inuasio uehementem per-
frigerationem habet, & magis in profundo. Quoti-
dianam uero neq; rigor omnino præcedit, sed magis
circumfrigesunt. Est etiam in tertianis febribus or-
do pulsuum exquisitus, & æqualitas. Excitatur autè
in progressibus exacerbationum pulsus ipse ad uehe-
mentiam ac magnitudinem & densitatem. Sitim e-
tiam inducit tertiana, maximè in uigore, & hominè
exurit, ut se denudet & abijciat uestitum, & magnu
ac densum spiritum ducat, & uelut flammam quan-
dam efficit, & frigidam bibere expetat. Et paulò post
calor æqualiter per totum corpus extenditur. Quod
si etiam manum intecris corpori, iuxta primu con-
tractum calor multus & acris occurrit, qui uelut eū
uapore quodā affertur. Vincitur autem paulò post
à manu, & sanè iam etiam bibere tempus est ægro,
atq; ubi bibit, statim multitudinè calidi uaporis per
cutem remittit, prænuntiam sudoris, & uomitus bi-
lis apparet, & aliquando etiam uenter egerit. Urinæ
uero his sunt billosæ & subfuluæ ac subflauæ, & mo-
deratè crassæ, & paulò post aut nubeculā albam, aut
quiddā in medio dependens bonū efficiunt. At si ful-
uiores fuerint urinæ, & neq; quid in medio pendens,
neq; nubecula, in primo circuitu apparuerit, ad septē
circuitus extendetur morbus. Verū exquisita tertian-
na quæ in prima die ostendit in urinis subsidentiam
albam ac leuem, & æqualem, tertium circuitum non
transgreditur. Hæc febris in integrā febris quietem
desinit post exacerbationem, uniuersum exacerbatio-
nis tempus duodecim horarum ad summum facies,
& non plurius. Atq; hanc exquisitā tertianam no-
minamus. Quæ uero diuturniorem habuerit exacer-
bationem, eam appellamus extensā. Si uero quoti-
die exacerbauerit, cum rigore irruens uehementi, ha-
buerit autem omnes prædictas notas in pulsibus, &
urinis, & reliquo corpore, hanc duplam tertianam
nominamus. Et hoc contingit propter multitudinē
& crassitudinem & bilis inæqualitatem.

Tertianæ exquisitæ curatio. Cap. LXXX.

Tertianam igitur exquisitam uelut à flaua bile comota
fientem, humectare ac frigesacere quantum eius fieri

potest, conuenit. Et quæ quidem in supernū uentrem
confluunt, euacuare per uomitus. Quæ uero infernū
subeunt, similiter per infernā excretionem. Sed & u-
rinis ac sudoribus uia aperienda est, & uenter quidē
mollibus infusis euacuandus est. Urinæ autem pro-
pellendæ sunt, apio & anetho in potionibus macera-
tis. Et si concoctionis signa apparuerint, confidenter
iam etiam absinthij comam aqua mulsa macerata ac
excolatam dabis. Balnea uero ipsis cōueniunt, ex a-
qua calida potabili temperata, & neq; nitrum, neque
aliud quiddā tale in balneis adhibere, sed aquam &
oleū præcalefacto corpori circūfundere, & in calidæ
solium locare, ac hortari ut in ipso moretur quātum
eius fieri potest. Eos uero qui balneum amant, etiam
si bis laueris, non peccaueris. A uino uero abstinen-
dum est penitus priusquā cōcoquatur morbus. Vbi
uero cōcoqui incipit, tenue & aquosum ac modicū,
primum dandum est, prope solutionem uero, ube-
rius. Cibi qui humectant ac frigesaciunt, omnes cō-
modant tertianis exquisitis. Quantitas uero in ipsis
tanta sit, quantū probè concoquere possunt. Et ex o-
leribus quidem cōueniunt atriplex, blitū, malua, la-
ctuta, & cucurbita. Ex reliquis autē ptisanæ succus,
& sorbitiones ex alica, & pisces petrosi, & ex uolu-
cribus quæ mollem carnē habent. Ex alijs alas, & gal-
lorū testes, & suillos pedes, ac cerebella, & paruorū
porcellorū extremas partes dare conuenit. Sorbedi
sunt etiā ouorū uitelli, & fructus gustandi non ægrè
concoctiles. Abstinentium uero ab omnibus dulce-
bus & acris, & salis, nidorosisq; ac uirosis edu-
lijs ac potibus. Et à ueteribus ac natura calidis uinis.

Tertianæ spurie curatio. Cap. LXXXI.

In non exquisitis tertianis, neq; lauare statim ab initio
bonū est, sed quando iam apparuerint signa conco-
ctionis: neque quotidie nutrire, sed satis est alternis.
Quies autem & calfactio præcordiorū ipsis condu-
cit, & sorbitiones cōcoctu faciliores. Infusa item in-
ferni uentris non ualde mollia. Et si sanguinis detra-
ctione opus habuerint, neq; hæc relinquatur, sed sta-
tim ab initio distinctione facta, uelut in Sermone de
uenæ sectione dictum est, moderatus sanguis aufera-
tur, quantum in præsens satis est. Totus uero diætæ
status non frigesaciens & humectans sit in totum, ue-
lut in tertianis exquisitis, sed etiā quid de incisorio ac
calfactorio modo assumat. nimirū uelut crassiore bi-
le subiecta, & nō ualde calidiora. Maximè uero con-
tulerit ipsis ptisanæ succus, iniecto pipere & hyssopo
aut origano. Sed & nardi spicam cū aqua mulsa co-
ctā bibendā dato. Et alia quoq; quæ urinā elent, præ-
terquā extremè calfactū ac siccā. Maximè quoq;
absinthij cremor assidue dādus est post septimā diē.
Sed & acetū mullum multis profuit potum. Et ali-
quod lene purgatoriū, bona cōcoctione in urinis ap-
parente. At uero uomitus ab accepto cibo, usq; adeo
cōmodus est his qui in hac febre perseverant, ut mul-
tos nouerim statim perfectè liberatos ex huius usu.

De hemitritæ, hoc est, semitertianæ. Cap. LXXXII.

Febris semitertiana appellata, sit pituita putrefacta ad
putrefactū amaræ bilis humorē ammixta, & est ex
duabus febribus cōposita: quotidiana enim cū circū-
frigesactione irruente, tertiana uero cū rigore, febris
ex ambabus mixta, horrorem inducit, & de rigore
quidē minus, plus autē de frigesactione, id quod ex-
trematibus permixtis contingit. Itaq; neq; absonū

nomen

nomen huius febris imposuerunt qui hæmicitæ dixerunt. Duplex est autem modus generationis eius. Aut duabus exacerbationibus uno tempore coincidentibus: Aut statim ab initio utrisque inter se permixtis. Quum igitur tertiana prædominatur, horridior febris fit, & iuxta accessione etiam aliquid rigoris assumit. Statim uero talis etiam calidior est & æstuosior, & quendam bilis uomitum, aut egestionem, aut sudorem inducit. Vbi uero altera pituitosior febris præualet, prædominatur quidam frigiditas extremitatum, uerum modici sunt horrores: & non sunt siticulosi, neque æstuarii. At ubi æquales magnitudine fuerint, & tertiana interpellata, & quotidiana continua, inuasio quidam exacerbationis cum horrore coniungit. Et quum pituitosa febris dominatur, contractiones sunt ac horrores. Quum autem biliosa febris præualuerit, acruatim incallescunt. Atque hæc quidem est semitertiana exquisita, ex tertiana intermittente & quotidiana continua composita, ambarum febrium temperatura æquali existente. Cæterum semitertiana non exquisita, aut biliosum humorem habet, aut pituitosum. Quum igitur ex utrisque relatis humoribus semitertiana febris conflatur, etiam curationem mixtam esse conuenit. Quare ex his quæ de tertiana relata sunt, & ex his quæ de quotidiana dicuntur, curationem componere oportet.

Quartane exquisitæ diuotio. Cap. LXXXIII.

Quartana exquisita omnem ætatem inuadit, præcipue tamen inclinatam. Hippocrates autem in libro de septenario, uigoris ætatem dixit. Idem alterere uidetur, eundem hominem non bis quartanam febrem incidere. Verba eius sunt, Primum quidem quartana febre idem homo bis neque capitur, neque unquam captus est, neque de cætero corripitur, si semel sanus fiat, & hoc propterea: iuxta propriam uniuscuiusque hominis naturam, & ætatem uigoris contingit. Necessarium enim est uigentem hominis naturam in hoc tempore quartana febre corripi. Præterito autem uigore, exolutam esse & à quartana, & ab inuasionem. At uero naturæ corporum magis arabilioræ hanc febrem perferunt, & ex temporibus Autumnus, & præsertim ubi ipse seipso fuerit frigidior ac siccior, & inæqualis. Edulia item ac potiones, & totus uitæ uictus siccus & frigidus tempore existens, quartanarum febrium signum est. Et liens auctus. Hæc autem febris non statim à prima die omnino irruit cum rigore: Sed aliquando ex alijs in hanc fit transmutatio, ex his quæ erroneæ ac inordinatæ uocantur. Verum in progressu rigor accedit, & cum augescente etiam rigor augeatur. Sensus autem ægrotis contingit, non uelut pungatur & stimuletur cutis, uelut in tertianis contingit, sed & perfrigerantur uehementer, & uelut franguntur usque ad ossa. Proinde audire est ægros dicentes, quod ossium lassitudine tenentur, & carnem costringi imaginantur. Pulsus porro sunt parui, obscuri, ac tardi & rari in principijs accessionum, uelut in nulla alia affectione. Etenim iuxta inuasionem quartanarum arteria tibi ligata esse uidebitur, & introsum retrahi, ac prohiberi à regressu. Quare etiam si iuuenis fuerit æger, tamen senilis extremæ ætatis motum arteria imitatur. Si enim ægrotantis naturalem pulsum noueris, aut in principio exacerbationis alterius morbi attueris, nihil aliud expectaueris quo minus pronuncies, irruentem à principio febrem quartanam esse, adeo immensa quædam mutatio pulsus ad raritatem ac

tarditatem fit. Urinæ uero his in principio quidam albæ ac tenues & aquosæ, nimirum propter materiam crassitudinem percolatæ. Progrediente uero morbo, pro ratione colorationis sunt, & subsidentiâ habet crassam. Sequitur autem sudor copia circa exacerbationis declinationem. Ex Rufo. Quartanæ igitur à splene initium sumentes, diuturniores sunt. Fiunt autem manifeste ex colore, & cruditatibus, & quod uenter non facile egerit, & ex splenis tumore, & quod ad sinistram magis se reclinent. Est autem periculum ne progressu temporis etiam in aquam inter cutem incidant. At uero propter hepar inflammatum quartanarum, coloris sunt albicantis, & toto corpore tumidi, & urinæ his sunt ualde rubræ, sandaracham referentes. Et ad contactum tumor dextri præcordij occurrit. Et hi etiam magis difficulter spirant quam splenici, & subtrahunt, & postremum in hydropem inestabilem delabuntur.

Quartane curatio.

Cap. LXXXIII.

In principio igitur moderate ac leniter tractandi qui ex quartana febre laborant, ita ut neque medicamentum aliquod forte adhibeamus, neque euacuationem, nisi sane sanguis ualde abundare uideatur. Tunc enim moderate sanguinem auferre oportet. Et si diducta uena sanguis fluens niger ac crassus fuerit, confidenter euacuat. Talis autem in splenicis maxime reperitur. Vbi uero flauus ac tenuis apparuerit, statim cohibe. Secunda est autem uena, aut interna, aut media, in sinistro cubito, si splenicus fuerit homo: Aut in dextro, si circa hepar fuerit affectio. Diæta uero sit flatus expers, & bona. Venter autem molliatur quantum eius fieri potest, per consuetos cibos. Si uero hi nihil profecerint, infusis per clysterem utendum est, primum quidem mollioribus, postea acribus. Prohibendæ sunt carnes porcinæ, & omnes uiscosæ ac tardi transitus. Item frigida ac humida edulia omnia. Vino utendum est paucum, albo & tenui, ac moderate calido, uolucris autem montanis. Et piscibus mollis carnis, ac facilis concoctionis, & nihil uiscosum habentibus. Utendum est etiam salisamentis ac sinapi. Et per dies aliquot accipiendum est pharmacum ex tribus piperis generibus, & diosporidum cum appellatum. Et si piper solum tritum quotidie acciperint, recte utique fecerint. A frictionibus autem & deambulationibus & alijs consuetis, non penitus arceantur. A balneis uero abstineant, frictionibus contenti, quæ ualde profunt. Et si breuis fuerit ac non ualde uiolenta quartana, non malum fuerit in intermedijs diebus consuetæ exercitia contingere. Atque hæc quidem in principio ac augmento faciendæ sunt. In uigore uero morbi tenuiore uictu utendum est, & iubendi sunt ægri diu quiescere, & uisceribus prospiciendum est, adhibitis fomentis ac cataplasmatibus mollire ac laxare potestibus, & flatus dissoluere. Talia uero sunt, farina ordeacea, & semen lini, iris, cuminum, chamæpitys, & ruta, in aqua mulsa cocta. Oleum quoque à fomento cataplasmati miscendum est. Oportet autem primum olei solum per paucos dies irrigare, atque ita cataplasmatibus uti, in die uidelicet adhibitis, si æger ferat. Epithematis autem utendum est polyarchio, & eo quod ex syraxe paratur, & similibus. Consequenter autem etiam urinam citius utendum est. Et aqua mulsa in potu exhibenda, in qua cocta est ruta & anethum. Quod si concoctionis morbi signa euidenter apparuerint, confidendum est statim pharmacis humores nigros euacuantibus, & non semel, sed sæpius, si opus fuerit.

Conuenit

Conuenit autem Epithymū quartanis potum, & Veratrum nigrū maximè prodest, eò quòd citra molestiam euacuat ea quæ molestant. Et uinū dulce in uacuum colocynthidis calicē infusum. Omnibus tamē miscendū est apium, aut anisum, aut dauci semen, succunditatis gratia. Assidue etiam betæ ac ostreorum decoctum bibant. Conueniunt his quoque aloëdaria Oribasij, quæ sic habent. Aloës drach. c. spice nardi, asari, mastiches, croci, xylobalsami, singulorū drach. vi. cassiæ drach. xii. epithymi drach. xvi. ueratri nigri exempta medulla drach. viii. forma pilulas magnitudine erul. cū pulegij decocto, & exhibe pro uisibus. Possunt & cū melle cocto pilule formari. Ego uero etiam ueratrum internum adieci. Utendum est & uomitibus à cibo, & à raphanis, si nihil impedierit. Plerique enim ipsis assidue usi, partim perfectè à morbo liberati sunt, partim facile pertulerūt. Nam unā cū hoc quòd euacuant ea quæ stomachum infestant, etiā facilius concoquunt tales, ubi uero nihil iam prohibet, etiā album ueratrum dandum est, primum quidem raphanis infixum uelut in Sermone de purgatorijs dictū est, postea uero etiā ipsum per se. Qui uero uomere non possunt, his uehementius infernè purgatis dandum est medicamentum ex uiperis, theriaca appellatum; & reliqua quæ ad tales febres laudantur. Inter quæ est & familiare illud nobis omnium probatissimum, quod recipit succi cyrenaiici, & piperis, & myrrhæ troglodyticæ, & foliorū rutæ uiridiū, singulorum æquales partes. Singula seorsim leuissimè teruntur, & ruta cum melle trita excipiuntur, fiuntque pilule, de quibus aliquibus obolus unus, alijs duo exhibentur. Aliud Asclepiadæ, hoc etiā somnū facit, quo etiam ipse uxor piperis longi, myrrhæ troglodyticæ, succi papaueris, castorij, singulorum pares portiones, efforma & utere, obolum unum aut dimidium exhibens cum aceto mulso, duabus horis ante accessione. Aliud ad quartanam, facit & ad arthriticos; hoc in quartanis dato prælotis duabus horis ante accessione, drachmæ unius pondere cum aceto mulso. Arthriticis uero cum aqua mulsa. Bituminis unc. i. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. folijs mentæ uiridibus leuissimè tritis excipe, ac utere uelut prædictum est. Cæterū qui in principijs talium pharmacorū aliquod exhibuerunt, aut omnino ante uigorem, hi sæpe simplicè quartanam duplicem fecerunt, aut omnino maiore ac difficiliorem effecerunt. Aut duplicè antea triplicem reddiderunt, aut omnino duas difficiles ac maiores effecerūt. Noui ego quendam medicum qui ausus fuit à tribus quartanis correpto dare theriacā ante morbi uigorem. Deinde auctis omnibus accidentibus, quum febris continua successisset, hominē peremit. Archigenis. Quartana febre laborantibus, inquit Archigenes, trifolij bitumen olētis seminis drac. i. in tribus aquæ mulsæ cyathis exhibere soleo. Mirificè etiā ipsis prodest bitumen ipsum iudaicum tritū potum cum uino diluto drachmæ pondere. Verum pharmacū minimè molestum, & sæpe successum sortitū expertus sum ego hoc, maximè in quibus splenes tument, & hydrops initium capit. Hederæ corymbiferæ folia quinque cū myrrhæ troglodyticæ magnitudine sabæ trita, in aquæ mulsæ dulcioris hemina exhibentur. Sed & castorium potū rigores mitigat, & morbosam carnē cōsumit, & concoctionibus in uenis opitulatur, & se-

gniciem ad motū eximit. Ruffi. Absinthij cremor humores uentrē infestantes deterget, & concoctioni auxiliatur. Unde neque salua colligunt qui absinthium bibunt. Mitigat etiā inflammationes hepatis ac splenis, & urinas impellit, & menses muliebres. At si æger aduersus fuerit, & habitus uentris euacuatione gaudeat, & mordaces humores secedant, lac recens mulctum asininū aut equinū, quibusdam dedit, quos magis purgare uoluit. Alijs uero caprinum, propter familiaritatem & parabilitatem. Exhibui autem ab initio heminas tres, & progressus sum usque ad sex. Deinde intermisso uno circuitu, similiter à tribus heminis incepti, & addita quotidie hemina, ad sex progressus sum, et postea detracta quotidie hemina una, rursus per duos circuitus quiesci. Et simul morbus dissoluebatur, & corpus nutrebat. Oportet autē animal boni succi esse, culus lac exhibemus. Si uero alius nō acescit, neque nidorosum sit, neque per uentrem erumpit, etiā in suspecta die, sorbitionis loco moderate dandū est, multo tempore ante accessione, & buccellæ panis modicæ superingeredæ. At uero morbo in uigore cōstituto, apparente manifestissima concoctione, nullo uiscere læso, aduersus tēpore sanitatis, etiā aquam frigidā exhibui duarum heminarū mensura, instante iā propè inuasiōe, & reuera à multis rigore prohibui, non parū sæpe etiam febribus exaptis. Melius est autē etiam forinsecus calefacere corpus cyprino aut sicyonio, ante exacerbationes quidem, ut ne rigeant: sedatis autē exacerbationibus, ut ne ab extrā allabentibus perfrigerentur. Dioscorides porro dicit prodesse his qui quartana tenentur febre, hæc in potu accepta etiā ante accessione. Plantaginis radices iiii. sicæ tritæ in uino bibuntur. Verbenacæ recte quartus à terra geniculus tritus cū uino potatur. In tertiana uero tertius. Radicis ite libanotis drach. i. in uino exhibetur. Quod si oleo illeue ris totum corpus, extremitates autem ex uingento aliquo ad rigores destinato inunxeris, & ægrum cōtectum quiescere siueris, non experietur rigorem.

Quotidiane febris dinotio.

Cap. lxxxv.

Quotidiana febris in pituitosioribus naturis consistit, & tēpore hyemis, & in humidioribus ac frigidioribus cōstitutionibus. Et senes quoque magis infestat & pueros, propter edacitatē, & præsertim eos qui in humidis ac frigidis regionibus degūt, & uitā ociosam agunt cum repletionē, atque hoc magis ubi post cibos assidue balneis utatur, et adhuc multo magis ubi ipsi cibi natura sunt pituitosiores, & inordinatus est ipso rū usus. Hæc igitur febris neque cum rigore irruit statim in prima die, sed tēporis progressu nō rigor, sed circumfrigefactio ægre cōcalefcens ipsis accedit. In pulsibus autē manifesta ordinis cōfusio, & inæqualitas adest, tēpore irruptionis exacerbationis præsertim, & uelocitas ac uehementia motus ipsis nō adest. Nō autē exurit febris hæc ægrotos, neque dēsam respirationē facit, neque crebras efflatiōes, neque frigidæ expectentiam excitat. Sed hæc febres minimè siticulosæ sunt. Vomūt autē pituitosa. Et quæ per uentrē infernè ipsis euacuatur, frigidiora, pallidiora, crudiora, & aquosiora omnino sunt. Exudant autē nequaquā in primis diebus, neque ad perfectā febris quietem deueniunt. Albus est ipsorū color. Urinæ albæ & tenues in primis diebus minguntur, postea uero crassæ ac cōturbatæ. Hic humor quotidie exacerbatur, desinit autem

autem in quiete febris non integram, uniuersum tem-
pus faciens horarum plerūq; octo & decem. Qua-
propter etiam amphemerina febris Græcis uocatur,
de ambabus enim participat, die ac nocte.

Quotidianæ febris curatio. Cap. LXXXVI.

In quotidianæ febris curatione aceto mulso utimur in
primis diebus, & his quæ urinas probè impellere
possunt. Et tota diætæ forma ita ad uim habeat. Cir-
ca uigorem uero uentri prospicere oportet, & præ-
sertim ori ipsius. Et postea uomere à cibis & rapha-
nis & purgatorijs pituitam euacuantibus uti. Reli-
quam diætam ad communes scopos respectu facto
comperies, ut scilicet attenuante diætâ, & pharmacis
incisorijs ac attenuantibus utaris.

De Epialis febribus. Cap. LXXXVII.

Prædicti generis, pituitosi inquam, est & febris quæ
priuatim à leni afflictione Epiala appellatur, quum
simul & febricitant & rigent, & utrunq; percipiunt
eodem tempore in omni corporis parte. Pituita e-
nim acida, & uitrea appellata, citra febrem quidem,
rigorem inducit. Si uero putredo aliqua moderata
ipsis accedat, febrē epialam efficit. Si uero amplius
putrescat, præcedit quidem rigor, sequitur autem fe-
bris, exuperata frigiditate à multitudine caloris, ut
omnino non appareat iuxta augmenta & uigores
exacerbationum. Fortassis autem & pituita uitrea
addam qualitatem habet. Curatio porro contimi-
lis est his qui quotidiana febre laborat, incisorio cu-
rationis modo amplius aucto.

*Communia auxilia febrium per circuitum re-
petentium.* Dioscoridis. Cap. LXXXVIII.

In communi ad omnem circuitum ac rigores utiliter
exhibentur ea quæ sudores mouere possunt, & sunt
hec. Seminis smyrnæ drach. i. datur potanda ex uino
duabus horis ante accessione. Item aristolochiæ drac.
i. & iridis drac. ii. & calaminthes decoctū cum casto-
rii drac. i. in quartanis & quotidianis. Chamædryos
item decoctū assidue potatū, quartanā et quotidianā
soluere solet. Carol quoq; semen, ferulæ semen, uer-
basci radix, aut succus cū uino. Aliud, quod ad omnē
circuitū, & maximè ad quartanas datur, duabus ho-
ris ante accessione. Facit & ad calculosos, ac dysen-
tericos, & stomachicos. Est etiā anxiosus ac despera-
tis, & lippientibus cōmodum. Seminis hyoscyami
albi, seminis apij, seminis anisi, styraçis, singulorum
drac. iiii. croci drach. x. opij drac. iiii. castorij drac. ii.
myrrhæ drach. ii. cū aqua ad fabæ ægyptiæ magni-
tudinē formato, & cū duobus aquæ cyathis exhibeo-
to. Aliud ad omnē circuitum. Aphrodæ. Seminis
hyoscyami, myrrhæ troglodytiæ, opij, styraçis, sin-
gulorum drach. i. croci, zingiberis, aloës, singulo-
rū drac. x. & obolos ii. excipe melle, & exhibe nu-
cis ponticæ magnitudine, cū aquæ cyathis iiii. præil-
litis extremitatibus ac cruribus, & sine ut dormiant.
Ego uero etiā castorij drach. i. adieci, & mirificè uim
suā declarauit. Viere etiā confidenter antidoto poro-
nia, & ea quæ ex sulphure cōstat. Miram enim effi-
caciā habent aduersus omnē circuitum, præsertim
quartanas ac quotidianas febres. Cæterū quæ trita
cum oleo illinuntur, profunt omnibus qui per circuli-
tum exacerbantur cū rigore, fouent enim corpus, &
sudores mouēt. Sunt autem hæc. Chamæmeli flos
erius, & in pastillos efformatus, ac in umbra sicca-
tus, & usu expetente cū oleo tritus ac illitus. Semen

ultidis cum oleo, semē libanotidis, flos salis, nitrum,
spuma nitri, baccæ lauri, pyrethrum, smyrnæ semen,
hypericum, calamintha, cāchryon, castorium, cony-
za, costus, granum cnidium, cū nitro, oleo & aceto,
oleum amygdalinum, cyprinū, irinum, gleucinum,
chamædrys, staphis agrestis. Asclepiadæ unguentum
ad accessiones cum rigore. Hoc sæpe tertianas depu-
li inquit: Spumæ nitri drach. ii. myrrhæ drach. ii. pi-
peris grana x. ceræ drac. iiii. olei cyprini, aut irini,
aut gleucini, aut amygdalini sexcuncem, liquefacta
aridis ammiscantur. Vfus est hora ante accessione.
Magis autem confricandi sunt pedes, unde horrores
initium sumere uidentur. Aliud ad tertianas. Gra-
ni cnidij, spumæ nitri, piperis, æquales portiones ex-
cipe irino, & ad strigmentitiam crassitudinem redi-
ge, & utere extremitates leniter confricans. Hoc me-
dicamentum sudores ciet, & per duos aut tres circuli-
tus sanitatē reducit. Aliud, ad quartanas, tertianas,
ac reliquos circuitus. Myrrhæ drachm. vi. cassiæ
drach. x. piperis drach. x. staphidis agrestis drach.
iii. nitri drach. iiii. ceræ sexcūcem. Cyprini aut alte-
rius talis libr. i. Myrrham uino dilue, & staphidem
& reliqua contunde accribra, & cum myrrha tere,
ac cerato affuso excipe. Vfus autem tempore phar-
macum cum pari cyprini portione illine.

*De ignis sacri circa uiscera afflictioni-
bus.* Cap. LXXXIX.

Fiunt aliquando ignis sacri affectiones circa aliqua ui-
scera, febrem ardentē ac habitualement inducentes. Et si
quidē circa uentrem fuerit ignis sacer, erysipelas Gre-
cis appellatus, febrem ex his accensam lipyriā nomi-
nant. Si uero circa hepar, urentem siue fumosam. Si
circa pulmōnē, algidam. Talis autē febris frigefacen-
tibus ac humectantibus opus habet edulij ac potu-
bus, & his quæ extrinsecus imponuntur. Quum igitur
febris habitualis aliū morbum ammixtū non ha-
bet balneo indiget, quēadmodum etiā alię omnes ca-
liditates ac siccitates. Si uero affectio fuerit circa uiscē-
ra ignis sacri, à balneo quidē abstinere oportet in to-
tum, frigida uero in uigore morbi utendū est conten-
tiosa, sic autē appellare solemus, quum semel frigidis-
simam & multā damus. Ante uigorem autē frigida
nō est danda, nisi ab ægroto cogamur, cui mos sit fri-
gidam bibere, & qui sitim non ferat. At forinsecus
imponenda sunt frigefacientia, & si nihil profecerint,
tunc etiam frigida potus exhibeatur, aut edulia po-
tius frigefacientia, conueniunt autē maximè lactucæ
humidæ ac dulces, pura frigida elotæ. Atq; sic quidē
acceptæ optimę sunt. Si uero opus fuerit aliquando
ad preces ægrorū, in suauitatē ipsarum mitigare, ace-
tum multæ aquę frigida ammixtū, ad intinctū cōce-
demus. Sit autē acētū exactē separatū ab omni uino-
sa qualitate. Forinsecus autē etiam ipse lactucæ suc-
cus aptus est. Imò etiā semperuiui, & intybi, portula-
cæ, atriplicis, solaniq; ac plāraginis, cū pane sicco tri-
to, & modico bono rosaceo, & his quæ similiter re-
siccāt. Optimū uero est id quo nos utimur, iuxta uua-
rum acerbarū tempus. Expressum enim ipsarū liquo-
rem in mortarium conijcimus cū portulacis uiridi-
bus, tūdimus, & utrūq; liquorē in uas mitimus, o-
sculumq; eius diligēter obturamus, atq; sic uas in a-
quam immittimus. Melius autē est etiā niue uas ob-
ruere. Vfus autē tempore polentam tenuissimā am-
misce, & postea subigo, ut liquidius euadat medi-
camentum

lipyria

de frigida

camentum, idēq; duplici linteolo infarctū præcordiis impono, non immorari sino, sed ubi tepidum factū fuerit tollo, ac alterū impono. Atq; hoc semper consequenter facio, donec eger sentiat profunditatē quodam modo perfrigeratam, & à siti liberetur. Ammīscemus autē aliquando etiā oleum omphacinum, aut rosaceū, ubi circa præcordia fuerit ignis sacer, inflammationis naturam habēs. Vidi mulierem supinam decubantem in terra & uoce destitutā, habētemq; pulsum formicātem, unā cū manuum ac pedū perfrigeratione. Putabā autem calidā esse affectionem. Nam simul cū relatis pessimis signis, densiorē uidebam respirationē factam. Hoc autem signū est magni doloris, ac calidi morbi in præcordiis ac thoracis partibus existentis. Dixit autē quidam ex astantibus se audiuisset mulierem dicere, quod arderet ejus stomachus, & frigidae potionis magnā cupiditatē haberet. Quapropter etiā in paulmento facit, inquit, uenans frigiditatem. Itaq; confusus dedi ipsi per cochleariū aquā frigidam, iterum atq; iterū immittens ipsam ori ejus uolenter. Videbā autem labia ipsius placide aquam intus attrahere. Et rationatus ipsam expetere frigidae potū, propter insitā uentri feruidā affectionē, rursus amplius exhibui. Post hoc autē oculis quoq; annuere incepit, indicans sic me facere debere. Accepta itaq; cōfectione ex papaueris capitibus cōstāte, diacodion appellata, parū de ea cū uino cōidīo & aqua frigida, per cochleariū ori infudi. Et ex hoc nimirum paulō post sensim loqui cepit. Quare rursus amplius de hac portione dedi, uino emmeleo pro cōidīo accepto, cū modica aqua. Ori itē uentris semperuiū & lactucam, cū pane trito & rosaceo imposui. Frigida autē hæc adhibui propter affectionis caliditatem, & tempus æstatis, donec frigiditatem abunde sentiret.

De colliquatione, Philagrii.

Cap. x c.

Colliquatio nominatur quū excernitur quid per uentrem, non ex comestis aut concoctis, sed ex humoribus ex toto corpore in ipsum cōfluentibus, quod simile quidē est bilī quæ assidue per uomitū reijcitur, ac per uentrē secedit. Differt autē ab ipsa foetoris graueolentia, & quod egestio fuluor apparet, & calsitudinē habet strigmentuā, aliquando etiā oleosam, aut adiposam. Colliquatio autē appellatur hic morbus, quoniā recens cōpacta essentia pinguedinis ac carnis ab ardentissima febre dissoluitur ac colliquescit. Et ubi iam diuturnū est malū, etiā ipsarū solidarū partium essentia ex parte eliquatur. Quapropter grauissima omniū est hæc febris. Satis autem clarū est quod extinctoriis medelis utimur, ita ut ualde frigidam aquam potandā exhibeamus, & cataplasmata & epithemata frigefaciētia thoraci ac præcordiis imponamus. Et cibos humectātes ac frigefaciētes demus. Dictū est autē de his in tractatione de febribus ardentibus. Dicitur item consequenter in sequenti capite.

De febribus quæ in calidis ac siccis temperaturis fiunt, citra inflammationem ac putrefactionem. Cap. x c i.

Quicunq; tēperatura biliosa, & habitu graciles & natura aridi, & stomachū subtili sensu præditū habentes, & qui facile in bilē efferuescit: hi ubi famē aut uigilias pertulerunt, aut nimīū delassati sunt, & præsertim in profectioe ac estiuo sole, aut tristitia affecti sunt, aut grauib; curis pressi, promptē ab horroribus ac febribus corripiuntur. Nā habitus in biliosis naturis, ob famē ac omnia relata, facile in bilē efferuescit. Et

primū quidē inæqualitatē percipiunt, postea etiam horrorē. Et si quidē in motibus perseuerarint, aut cibum nō acceperint, statim febricitāt. Mordaces enim humores ac uapores per sensitiua corpora delati, horrores ac rigores generāt. Et propterea horrente ac desata cute, uelut quæ ex natura in his aridior est, cohibetur fuliginosæ ac fumosæ superfluitates, antea transpirare solitæ, & sic febrē accendūt, nisi talis cibū accipiendo uelut dixi præuerterit. Ostendi autē tibi aliquos qui sic febricitarunt, & maxime qui ex longo morbo se recolligebāt. Ex quibus unī in foro obuii factus horrore incipiente, introducto ipsi in officinā quandā, panem ex uino diluto exhibui, & euestigio horrorem sedauī, & febre prohiui. Alios uero in suas domos abire festinantes, in principio horroris, aut paulō post nutriui. Et in summa, quibus adhuc sunt principij exacerbationū accidentia in talibus tēperaturis, his omnibus panē ex uino diluto citō exhibui, & horrorē statim sedauī, & febre prohiui. Quanto enim citius ipsos nutries, tanto magis febrē impedites. Si uero aliquando paulō tardius ipsos nutriui, febris quidem facta nō est. Calor autē modicus ipsis accedet, ut si diutius moreris nutrire, tali caliditate excalescet, ambiguum ut sit an febre appellare ipsam oporteat. Si uero duæ horæ post horroris initium factæ fuerint, manente adhuc horrore etiā tunc nutrire oportet. Verū prædicere quod febricitabunt hi febre nō molesta, ad quā exudationes consequentur, Et hoc factō, & lauare oportet, & rursus nutrire. At postquā sedatus est horror, incipitq; febris cū contractione, nō amplius nutriendi sunt illo tēpore. Declināte uero exacerbatione statim alatur, & ne expectetur donec febris integrē quiescat. Detur etiam potus aqua calida in uigore amplior. In omnibus enim squalētib; affectionibus nō cessant exacerbationes priusquam aut balnea, aut alimētis humectātibus rigētur. Quosdā uero etiā declinatione incipiente. Alios autē uigore exacerbationis instante nutrio. Fames enim in his tēperaturis, maxime febricitantibus, nō simpliciter nocua est, sed si quid aliud perniciosū. Aut enim ex fame in arduas febres incidunt, ex quibus si nō morte præuēti fuerint, in habituales delabuntur, & ex his rursus in tabē. Aut statim ab initio habitualis febris ipsis coincidit. Proinde à principio sic nutrire oportet eos qui talē temperaturā habent. Quum uero aut ex lassitudinibus, aut ira, aut curis pluribus, aut uigiliis, aut tristitia, aut ex omnibus simul cōmisissis, corpore uehemēter resiccato, febris inuaserit, squalidā quidē habens cutē, ardentem autē caliditatem, timor profectū est talē hominem habituali febre corripiendū esse, & præsertim in æstate, & sicca ac calida cōstitutione. Opus igitur habent tales humectātibus ac frigefaciētib; edulīs ac potibus. Qui enim temperatura calidi ac siccī sunt, hi etiam necessariō uires debiles habent. Non enim fieri potest, ut corpus calidum ac siccū, ubi febricitet uires ualidas habeat. Cōuenit igitur quā celerrimē per pisanæ succum, aut sorbitiones ex alica nutrire, & paululum panis insuper exhibere, atq; sic per frigidā potum ægrum curare. Extinguitur enim statim ac sedatur febris profectū, si non inflammatio aliqua ipsi adest, neq; humorum putrefactio. Si tamen magnum detrimentum futurū cōspectaris, exhibitionem ejus inhiibe, & per ea quæ extrinsecus corpori adueniūt ac adhibentur, curat

curationem molire. Forinsecus autem adueniunt, aer nos ambiens, & quaecumque humectare ac frigefacere solent medicamenta. Et ad haec aquarum dulcium balnea. Si itaque ambiens nos aer temperatus fuerit, utendum est eo uelut habet, nihil amplius moliendo. Si uero aut multum calidus est aut frigidus, calido quidem uice uersa excogitanda sunt subterraneae domus, frigidaeque, ac quae uentis perflantur ad septentrionem conuersae. Auras quoque ipsis quasdam proprias excogitabimus. Aliquando ex Euripis in quos plures aquae salientes se praecipitant. Aliquando aqua frigida ex uasis in uasa transfluente. Haec uero statim etiam somnum conciliant. Respergenda est etiam domus assidue frigida aqua pura. Et rosae multae, aut uisium pampini, aut myrtus per terram sternantur: aut aliae quaedam plantae frigefacientes. Arcenda est ab ingressu hominum copia. Nam & hoc domum calfacit. Si uero frigidissimus est aer, uelut in hyeme maxime, per tegumenta corpus foueatur. Frigus enim densat ac constringit cutem, & humorum qui intus aduruntur defluxiones transpirare prohibet. Maiorem enim ex frigida inspiratione utilitatem fore noscendum est, quam ea est quae ex cutis perfrigeratione contingit. Similiter autem & in his quae forinsecus imponuntur, eligenda sunt frigefacientia citra sortem adstrictionem, densationemque ipsius cutis. Et non solum quae frigefaciunt, sed etiam quae copage corporis fuerint partium tenuium, quantum eius reperire est in frigefacientibus aut citra ammixtionem alterius uehementis qualitatis. Est autem simplicissimum medicamentum ex humectantibus ac perfrigerantibus, quod & ad ignem sacrum utor, & ad pudendorum inflammationes in principio. Ceram albiissimam in duplici uase liquato, & in aquam frigidam diffundito, ac manibus emollito diu eam eluens. Deinde similiter ipsam liquatam, in aliam aquam diffundito, & rursus tertio idem facito. Ad hanc autem ceram sic lotam, rosaceum ex optimo oleo omphacino preparatum adijcito, ut sit quidem cere uinc. i. rosacei uero triens. Haec similiter in duplici uase liquato, et ab igne ablata moueto, donec aliquantulum frigescent. Postea in mortarium diffunde, & pistillo fortiter tere, aqua potabili ac frigidissima paulatim instillata quantum satis est. & tandem fictili puram aquam habente excipe, & aquam quotidie permuta. Hoc pharmacum tenui linteo inductum impone, non super totum petus, uelut quidam faciunt, neque super tota praecordia, sed illo maxime loco in quo multae caliditatis sensus percipitur. Permutetur autem pharmacum semper priusquam manifeste calefiat. Aliud episthema optimum. Rumicis acuti succus polenta tenui ammixta, duplicato linteo detricto excipiat, & frigidus imponatur. Facit & portulacae succus, & semperuiui, cum uuae acerbae succo & polenta. Item tribuli uiridis succus, & polygoni, ac seridis, & lactuca cum polenta. Sed & ipsa horum folia trita imposito. Bonum pharmacum etiam hoc est: Palmularum pinguium carnem exemptis membranis, cum posca meratiore ad flacciditatem usque coctam, & cum tenuissima polenta tritam impone. Si uero aridius hoc uidebitur, ex praedicto cerato parum, aut rosacei optimi minimum quiddam ammisce. Bonum etiam pharmacum est rosarum succus cum tenui polenta. Et ipsae rosae tritae impositae. Et haec quidem assumimus mul-

tum frigefacere uolentes. Si uero moderate hoc facere uoluerimus, non modica est copia emplastrorum leniter perfrigerare potentium. Ego enim noui, imposito aliquando frigido medicamento praecordij, hominem euestigio difficulter spirasse: alium autem statim tussiuisse. Et paulo post amborum accidens quieuisse, frigido pharmaco sublato. Balnea porro dulcium ac calidarum aquarum, aut potius temperatarum, utilissima sunt omnibus siccam ac calidam temperaturam habentibus. Lauandi autem sunt quae admodum hecticae, in secunda balnei domo, corpore ex aqua & oleo calido perfuso, & ipsis statim in temperata aqua solum locatis. Deinde etiam in frigida solum. In frigida tamen moram diutius trahere non oportet. Si uero inflammatio alicuius uisceris accedat, balneum recusare oportet. Illud tamen nosse expedit, quod si quando inflammatio principalis partium in talibus febribus ac corporibus coinciderit, omnino morientur. Et praesertim si pulmonis, aut membranae costas succingentis, aut uentris, aut hepatis inflammatio fuerit. Nam quantum ad inflammationes harum partium attinet, minime nutrire oportet. Quantum uero ad uisum debilitatem, saepe nutrire oportet. Quare necessarium est ut aut dum non nutrimus, uires exoluamus: aut dum nutrimus, inflammationes augeamus.

De febribus Hecticis ac tabidis. Cap. XCII.

Hectica, hoc est, habitualis nominatur febris, quum ad tantam immodestiam uenerit caliditas praeter naturam, ut in habitu sit ipsius solidae essentiae similis corporis cordis. Et propterea aegre solubilem habet structuram. Primum igitur calor praeternaturalis eliquat, & resiccat, ac consumit essentiam in partibus uelut ex humore concretam, qualis est pinguedo & caro: Deinde uero propriam humiditatem consumit, ex qua corpora nutriuntur. Quae sane circumsusa est ac instar roris dispersa, circa omnes animalis partes. Hinc autem transit ad carnosum genus, quod fibris & membranis partibus solidorum corporum insitum est, quod sane discindentes coqui tollunt, fibras uero abiciunt. Exactum autem eius complementum in hoc est, si ipsa solida similium partium essentia siccior facta est, quando & tabida febris uocatur. Duplex est autem genus hecticarum febrium. Quaedam enim ex ipsis post febres ardentes plerumque fiunt, aut usque adeo in longum extensas, ut temporis progressu humorem corporis cordis consumperint. Aut manente adhuc humiditate fiunt, & cordis corpus occupantes, hinc inceduntur; quemadmodum lucernarum flamma ex funiculo, superstita adhuc in lucernis oleo. Et haec quidem una est ipsarum generatio: Altera uero quam ab initio statim irruerint, primam generationem diutius similem facientes, ob tristitiam, & iram, & lassitudinem ampliorem simul cum ardore factam. Has igitur non difficile est curare. Eas uero quae in tabem procedunt, sanare impossibile est. Natura enim ipsarum calida est & sicca, simile quiddam patienti corde, quale quidam patitur funiculus in lucernis, ubi plurimum fuerit exustus. Qui enim exustus est comminuitur, ut neque si largum oleum affuderis, luculentam flammam excitare possis. Proinde parua haec & infirma flamma circumdextra tremit, semper amplius minor euadens, donec fuerit extincta. Facilis autem cognitu est haec febris. Priusquam enim contigeris pulsus accaliditatem, oculos immo-

m dice

prout uisibilis
carnis x. m
cap. xj

101

dicē cauos uidebīs, uelut in foueis quibusdam fitos, & gramas in ipsis reperies siccas, & squallidā quādam affectionem, qualis his fieri solet qui per totum diem in sole aestiuo multum puluerem percurrunt. Perit autem & ipsorum coloris uitalis flos. Et cutis circa frontem sicca est ac circūtenfa. Et plerumq; palpebris nictant, uelut somno grauati. Est autem hæc affectio non somnus, sed impotentia uigilandi. Et tēpora sunt collapsa, ut loci caui appareant. Et quid aliud quā ossa & cutis sunt in totum: ut etiam si denudatum consideraueris uentrem, neque aliquod intestinum, neque uiscus aliquod saluum esse putes, & præcordia uehementer retracta esse ad thoracem, & cutem totam siccam ac obaridam, & si distenderis digitis appræhensam, uelut corium quoddam producit. Febris itaque exacte tabida incurabilis est uelut dixi. Tabescit enim in ipsis totum corpus, instar arboris extremē arefactæ, aut ob flammæ uiciniam, aut ob uehementem ac immodicam siccitatem. Atq; hæc est quam senectam ex morbo uocant. Tale enim corpus sit in his qui secundum naturam ad extremā senectam perueniūt citra febrem, paulatim extincto in ipsis insito calore. Verum eorum qui secundum naturam consenuerunt, mors sine molestia cōtingit, ob frigiditatem ac siccitatem imminens. Tabida uero febris non solum sicca, sed calida affectio est. Hæc igitur uelut dixi incurabilis est. Illud porro omnibus febribus hecticis commune est, ut debiles sint & æquales semper, à prima die usq; ad extremam respirationem. Maximum autem & minimē ambigū naturæ ipsius signum habebis, si cibum homini præbueris. Alimento enim accepto accenditur calor, & pulsus augetur ad magnitudinem ac uelocitatem. Et quod in ipsis contingit simile est ei quod accidit in calce ac lapidibus calefactis. Si enim frigidissimam aquam ipsis affuderis, multo calidiores apparent, uaporosa in ipsis caliditate, ab humida essentia irrigata. Donec igitur aliquid humidæ essentiæ seruetur hectica solum febris est. Quum uero in periculū uenerit, ut non amplius supersit aliquid humiditatis, exacta iam tabes, Marasmus Græcis dictus, consistit. Nos autem earum solum curationem aggredimur, quæ sanari possunt.

Hecticarum febrium curatio.

Cap. xciii.

Hecticas febres omni modo statim refrigeramus; priusquam progressæ in tabem desinant. Caput autem curationis ipsarum in humectantibus ac frigefacientibus consistit, tum his quæ foris adhibentur, tum quæ intra corpus accipiuntur. In quibus est & aer qui inspiratur. Omnes igitur hecticos, etiam si iam principium tabescendi acceperit, absque hoc ut alia febris ipsis sit implicata, aut propter humorū putrefactionem, aut cum principalis partis inflammatione, confidenter lauato, citra omnem tamē laborem, ut ne uires exoluantur. Deferatur itaq; æger in lecto ad balneum. Præparata autem ipsi sindone calida, in ipsa ad primam balnei domum gestetur. Sint autem quatuor qui sindonem teneant, in singulis angulis unus: deinde in prima domo nudatus, ad secundam portetur. In qua toto corpore ex oleo tepido dulcissimo perfusus, ad tertiam domum feratur, & in solium locetur. Sit autem aer balnei temperatus, & humidus præparetur, parietibus aqua calida respersis. In ipsa uero solij aqua temperata abūde quiescat, moderatē

in sindone uectus, nulla corporis perfusione fiēte, neque item capitis perfusione. Hinc autem extractus à quatuor adolescentibus sindonem gestantibus, in frigidam aquam confertim mergatur, ne minimum quidem moræ in ipsa trahens. Statim autem alius paratam habens sindonem aliam, ipsi inijciat, & alius aliam simili modo demissus autem in lectum, mollibus linteis lenissimē detergatur. Postea uero unctus, & uestibus contectus ad domum in lecto referatur. Sit autem & domus balneo uicina. Eos quidem igitur qui iam tabescunt, lauare oportet uelut dictū est. Qui uero in hecticis febribus sunt, nondum tabescentes, hi etiam citra sindonē lauari possunt. Deferendi tamen & hi sunt ad domū siue in lecto, siue in uehiculo quopiam, aut lectica: Deinde oleum ipsis infundendum, uelut dictum est. Et postea ad calidā aquam ducantur, ut in illa inmorentur. Deinde ad frigidam prodeant, ut nullam omnino moram in ipsa trahant. Atque ita deterfi ac inuncti ad domum reducantur. De balneis igitur satis dictum est. Consequens est ut de alimentorum uiribus addamus. Quod quidē igitur frigidus & humidus conuenit esse cibos hecticis febribus profuturos, omnibus manifestū est. Tales autem sunt, pitisanæ succus frigidus acceptus, & alica uelut pitisana præparata, conuenit etiā panis aqua frigida madefactus. Verum nullius horum frigiditas sincera sit, uelut potus. Nam quæ bibuntur, & cito calefcunt, & meatus penetrant. Quæ uero eduntur aut sorbentur, diutius in uentre perseverantia, perfrigerant ipsum, si immodicē fuerint frigida. At ubi iam diuturna est febris, lac asinum dandum est, diligentel animaduersione habita, ne in uentre in caseum coaguletur. Hoc uero aliquando etiā ipse æger nos docebit, ut qui suæ naturæ habet experimentum. Quamdoq; autē nos ipsos deprehendere oportebit paulatim ad eius usum progrediendo. Fugienda est autem quātum eius fieri potest, mellis mixtura in omnibus hecticis febribus. Dandum uero est primū lac asinæ in cubiculū adductæ, quo calidū adhuc lac potetur. Si quidē igitur probe fuerit concoctū, & non corruptum, copia eius augeri potest, ut in exhibitione cyathus dimidijs addatur. Reliqua uero diætā facienda est, uelut in siccis uentris intemperaturis, uelut in proprio loco dicetur. Quātō autem hecticarum febriū caliditas maior illis est, tantō frigidioribus auxilijs opus habet, & diligentia ampliore, ut ne damnum aliquod cōsequatur, ex fortiorum auxiliorum usu.

De popularibus passim uagantibus, ac pestilentibus morbis.

Cap. xciiii.

Populares & cōmunes morbos uocant eos qui simul multis hominibus coincidunt: quorū uelut generatio, ita & causa cōmunis est. Communia itaq; edulia praua, morbos cōmunes pariunt. Item uiciosa aquæ potus, & aerūnæ immodicæ, & labores consueti relictī. Fames, & repletio, præsertim ubi post magnam indigentiam, abūdantia succedit. Sed & regionis natura sepe communes morbos inuexit, aere quem inspiramus à putredinosa euaporatione inquinato. Causa uero talis putredinosæ euaporatiōis, aut mortuorum multitudo est, uelut in bellis contingere solet. Aut paludes quædā, aut stagna, aut barathrū aliquid profundum in propinquo, uenenosam ac prauam exhalationē remittunt. Hæc igitur assidue contingere solent. Sed & ambiens nos aer, temperamēta assidue

assidue peruerit, dū aut immodicē calidior, aut fierior, aut frigidior, aut humidior euadit. Nam reliquis causis non omnes simul obnoxij sumus, neque per totū diem occurramus. Aer autem nos ambiens forinsecus omnibus circūfusus est, & per inspirationē trahitur. Necesse igitur est ut ad mutationes eius, iuxta temperamentū ipsius coassiciantur etiam animalium corpora. Aliquando uero ambiens nos aer humidior ac calidior factus, pestilentē constitutionē inducit. Et quia sunt in corpore humores ex uisioso uictu ad putrefactionē idonei, principij fit pestilēdis febris. Quare si quis moderatis laboribus, & uictu modesto ac castigato utatur, in totū illisus manet per omnes eiusmodi affectiones. Et nos sanē hoc prænoscences, statim incipiente tali constitutione, quaecumq; corpora humida uidemus, omni modo siccare conamur. In his autē quæ natura sicciora sunt, pristinam naturam conseruamus. Quæ uero superfluitatibus redūdant, purgationibus sanamus. Obturationes autem meatuū aperimus ac extergemus. Et in summa sanitatem corporibus custodiuimus, contraria adhibentes. Et quādoq; refrigerationibus usi sumus, si ita opus esset: quādoq; uero calfactorijs. Sed & rogingenti extructo & intenso, aërem ad caliditatem ac siccitatem transmutare quis potest, humidum & frigidum factum, quemadmodum Hippocrati Athenis fecisse dicunt. Itemq; Acronem Agrigentinum.

De peste. Ruffi. Cap. xcv.
Omnia horredissima in peste fieri possunt, & nihil occultatur, uelut in singulis morbis. Plurima enim & uaria fiunt, delyria uaria, bilis uomitus, præcordiorum distensiones, dolores, sudores multi, extremitatum frigiditas, profluua biliosa, tenusa, flatuosa, urinae, alijs aquosæ ac tenues, alijs biliosæ, alijs nigrae, malas subsidenuas habentes, & pessima ea quæ in medio uasis dependent. Sanguinis nariū destillationes, æstus in thorace, linguæ torrefactæ, uigiliæ, conuulsiones uolētæ. Sed & ulcera praua & carbunculosa & perniciosissima, in peste fieri possunt, & in reliquo corpore, & in facie, ac tonsillis. Si uero solerti ingenio quis præditus sit, futuram pestem prænosceret, attendens anni temporibus, quæ & mala sunt, & in bruta animantia impetum faciunt. Si enim ambiens nos aer, pestis causa fuerit, uolucrum generis prior interitus erit. Si uero ex prauis de terra exhalationibus hoc contigerit, quadrupedum animantium prior corruptio fiet. Quum autem hæc tecum expendes, amplius etiam illud cogita. Quale est præsens anni tempus, qualis totus annus, hinc enim comperies quomodo uictus rationem optimè constituas. Verbi causa: Debebat esse, si recte res fieret, tempus siccū, nunc uero humidum factum est. At si quidem humidum factum est, necesse est etiam uictum resicantem constituere, quo excedens humiditas cōsumatur. Respicienda sunt etiam studia hominum, an non ad sanitatem conducant, & ea prohibere. Ventrīs quoque cura habenda est. Si uero superior uenter pituitam habuerit, uomitus euacuetur. Quibus autem sanguis abundat, his uena secetur. Bona est & per urinas purgatio, & quaecumq; alia. Si uero æstuosus fuerit æger, & flamma usque ad pectus ascenderit, non fuerit alienum frigescentia pectori adhibere, & frigidæ potum dare, non paulatim exhibendo, uincitur enim ab ampliori in uentre caliditate, & plus nocet,

ac amplius exurit. Sed & multa & acuatim frigida danda est, ut copia eius flama extinguatur. Si uero ardor occuparit interiores partes, extremitates autem & superficies frigida fuerint, & præcordia distendantur, & uenter colliquamenta partim sursum, partim deorsum mitte, uigiliæq; affuerint ac delyrium, & linguæ asperitates. His calfactoria lomenta adhibere oportet, ut calor ad superficiē corporis trahatur, & quibuscumq; id fieri potest modis conandū est, ut calor ex profundo ad externa educatur.

De his qui ob crudorum humorum multitudinem, animo linguuntur. Cap. xcvi.

Quidam febricitare incipiunt, ex magna crudorum humorum copia collecta, una cum hoc quod os uentris male affectum est, aut ex cruditatibus, aut alijs. His inflata sunt præcordia, & totū corpus maiorem naturali molē habet. Et color alijs quidē albidior & aquosior fit naturali. Alijs autem nigrior ac liuidior euadit, quos plūbicolores aliqui appellant. Pulsus uero omnium minores sunt, quā pro caliditatis ratione, obscurioresq; ac omnino inæquales. Si quidem igitur hi humores copia sua vires grauauerint, & crassitudine ac multitudine meatus animalis obturarint, multis de causis perniciofa est affectio, & animi deliquium inducens, tum quod animal nō nutritur, tum quod suffocatur: & quod tēperamenti symmetria alteratur ac corrūpitur. Etenim crudi humores nutrire nō possunt prius quā cōcoquantur. Multi uero grauant aut obcurant transpirationes, & calorē extinguunt. Si uero neq; obturarint, neq; grauauerint, hi animi deliquia quas syncopas uocant, nō inducunt, sed omnino animo exoluuntur tales, si nō frequentius alantur. Danda est autē eis copia, nō pro una uice, neque cibi crassi aut uisibus frigidi, sed ex genere attenuandum & calefacientium. Sic etiam medicamenta ipsis danda sunt, quæ homo febricitans accipere potest, attenuanda ac calefacientia. His cōmodum est uinū aquosum album ac tenue, nisi ualde febricitauerint, quod tamen non adeo contingit in relata affectione. Debiles enim sunt his febres, & adhuc magis si fuerint senes. Vinum autem dandum est ipsis ad singulos cibos, & potius ad uesperam & noctem, non mane & usque ad meridiem. Iuuenibus uero nō statim ab initio uinum detur. Nulli porro talium sanguinis ablato citra maximum detrimentum fieri solet, etiam si euacuatione indigent. Imò neque uenæ sectionem, neq; purgationem ferunt, qui sanē etiam citra hæc derepente animo concidunt. Quomodo igitur hos sanare oportet? qui egent quidem euacuatione, euacuanda uero non ferunt, nullum equidem inueni in his euacuationis modum præter confrictionem. Incipere uero statim ab initio morbi conuenit, primum a cruribus supernè deorsum per lintea moderate aspera. Deinde etiam totæ manus confricentur, supernè deorsum. Postquam autem artus satis calidi apparēt, & timor fuerit lassitudinis sensum ipsis accessurum ob multitudinem frictionis, oleo laxante utendum est, quale est quod dulcissimum est. Abstinentium autē ab omphacino, & omnibus adstringentibus. hyemis autem tempore etiam discussorio utendū est, quale est oleum sicyonij, & chamæmelinum, aut aliud simile, uelut anethinum. Postea uero oleum detergeatur, & progressus ad totam spinā fiat, & hæc similiter fricetur, primū per lintea, deinde

m 2 oleo.

vide Cornelium
Celsi lib. 3.
7.

oleo. Postea rursus ad crura progressus fiat, & rursus ad manus, deinde rursus ad spinam, ita ut per totam diē hoc agamus in domo lucem habere puram, & minime humecta. Sit autem & caliditate moderata domus. Commodissima est his aqua mulsa, in qua coctum est hyssopum. Verum neq; cibi, neq; sorbitio, neq; aqua ipsis danda est, neq; permittendū ut large bibant, sed aqua mulsa sola utantur per primos tres dies, ita ut per successionē fricemus, & illud solum tempus remittamus, in quo somnus ipsos occupat. Ad hunc autem conducit maxime amplior frictio. Sed neq; amplior somnus talibus commodus est, neq; enim humores discuti permittit, & viscera grauatur. Vtriusq; igitur moderata natura opus habet, somnus & uigilia. Si quidem igitur pulsus ipsis ualde paruum & fortiter inaequalis est, extremum periculum imminet, & facere oportet quae dicta sunt, nihil aliud curiosius conando. Si uero firmitate & magnitudinem moderatam habuerit, & non fractus neq; molis fuerit aequalis, uentrem considera, & clysterem adhibe confidenter, si non probe egestionem faciat. Contingit enim ex aquae mulsae potu, ut probe euacuetur omnis superfluitas, quae in primis uentis congregari solet, iuxta simas hepatis partes, & mesenterium. Si uero superfluitatū impetus amplius quam oportet in uentrem fiat, primum amplius ipsam decoquiro. Talis enim minus aluum subit. Si uero etiā postea superfluitas humorum amplius feratur, neq; sic sistere oportet, sed pro aqua mulsa pisanæ succū dare. Si uero ferri adhuc perseveret, sorbitionem ex alica dato, pulsus nimirum in hoc sequens. Aliquando enim de repente mutantur ad debilitatem, aut inaequalitatem, aut paruitatem, quo tempore conuenit exhibere panē ex uino diluto, neq; uentre uidelicet, neq; hepate inflammato. Nam si inflammatae fuerint hae partes, corpore crudis humoribus repleto, desperatus est æger pulsibus ita mutatis. In talibus igitur ægrois si mortem praedixeris, & nullum strenuum auxilium adhibueris, te ipsum inculpātū seruabis. In quibus autē spes est salutis (est autem in omnibus cetera inflammationē ita ægroiantibus) quum a principio suscepimus ipsos, turpissimum mihi uidetur ut animo concidat æger. Si uero perceperis aliquādo crassos esse humores, semper acetum mulsum dabis pro aqua mulsa. Et si quidem æstas fuerit, & æger frigidae potor, huius frigidū acetum mulsum dabis. hyeme uero omnibus calidū. Aduersissima sunt his balnea, & aer nos ambiens multū calidus aut frigidus factus. Quare neq; lauare cōuenit, & reclinare tempore æstatis in domo frigida, hyeme uero calida. Leguntur enim ualde ex utroq; excessu. Nam in balneis, & æstate, & omni caliditatis incremento, crudi humores diffunduntur, & per totū corpus diffuunt, ut periculum sit etiā ad pulmonem & cor. peruenturos esse, & quandoq; etiā ad cerebrū recursuros esse. Melius igitur est circa hepar & uenas ipsos permanere. At uero in domibus immodicē frigidis, & hyeme, & omnino in frigido ambiente, humores crudi incocti permanēt, & obiterationes hepatis augent & exacerbant, si paruae fuerint. Si uero nō fuerint, generāt propter crassiciē detenti ac impaeti. A cataplasmatibus autem & perfusionibus abstinere oportet, donec multitudo parū euacuetur, partim concoquatur. Qui enim hæc in talibus affectionibus adhibent, ipsi

inflammationes per ea quae faciunt efficiunt, non adiuuantes praecordia laedi. Hæc igitur facienda sunt a prima diē, ubi ipse inceperis curationem. Si uero ubi iam animo concidunt uocatus fueris, praecordia non inflammatis, dabis ipsis panem non multū uino fuluo madefactum. Et si quidem fuerit æstas, aut regio natura calida, aut constitutio calida, cū aqua frigida. Sin contrā, cum calida uinum dabis. Postquā autem sedatum fuerit eiusmodi animi concisi accidens, experiendum est ut calida potum exhibeas. Nam ad totam curationem melior est calida, crudorum humorum concoctionem adiuuans. Statim uero & in his ad frictionem deuenies, eo quo dictum est modo.

De his qui animo concidunt, ob flauā bilem os uentris ledentem. Cap. xcvi.

In quibus ob flauam bilem os uentris ledentem animi deliquium contingit, his exhibendus est frigidus potus, sit tamen hic uinum calidum natura, fuluum, tenue, & lectus.

De his qui ob tennes humores animo concidunt. Cap. xcvi.

Qui ob tennes ualde humores animo concidunt, ut ciussime tum per sudores, tum per obscuram transpirationem exoluantur, contrario modo curentur his qui ob erudos humores animo linquuntur. Nos enim paulatim euacuamus, eo quod uires acruatam euacuationem nō ferant. Qui uero ob tennes humores animo concidunt, paulatim assidue nutriamus. Si uero a principio hos exceperimus, uiribus adhuc robustis, non paulatim alimus: Possunt enim hi amplius alimentum semel exhibitum superare. Quemadmodum autem diximus priores perniciose affectos esse, ubi uiscus quoddam inflammatum fuerit. Eodem modo etiam hos incurabiliter habere putandum est, si aliquod uiscus fuerit inflammatum, uiribus iam languentibus. Neq; enim possibile est ipsos assidue nutrire, sed in declinationibus solum. Neq; si non nutriuerimus possibile est ipsos seruare. In talibus affectionibus letalis constitutio celerime fit in facie: Nasus acutus, oculi caui, tempora collapsa, & quae deinceps recensentur. Et siue amplius excreuerint, siue uigilauerint, aut tristitia affecti fuerint, si non citius alantur, statim talem faciem habent. Si igitur propter uigilias, aut tristitiam, aut ampliorē excretionem, tale factum fuerit, parum mali esse puta. Si uero citra hæc, perniciosum. Atq; hoc magis, si statim a morbi initio sic habuerint. Non enim dubitant ad ipsius concoctionem. Nutrire igitur ipsos tunc necessarium est, & cutem ipsorum densare, & aërem domus frigidum præparare, uelut dictum est de his qui ex sicca intemperie sebricant. Ungentibus quoque sunt adstringentibus ungentis, & cibi exhibendi non ualde promptē defluentes. Et neque aqua mulsa, neque pisanæ succus eis exhibendus est, sed panes, & sorbitiones ex alica, & fructus austeri, ac ægrè corruptiles, tum per se ipsi, tum cum pane & alica ex aqua cocta. Dentur etiam ipsi ouorum sorbillum uicelli soli, & gallorum testes, & cerebella suilla probe affata, aut bene cocta. Nam crudiora extreme laedunt. Et in summa, omnia facienda quod crassior materia fiat, & cutis densetur, & transpirationes impellantur. Prodest his uinum aquosum ab initio post cibos acceptum.

De alijs animi deliquij causis. Cap. xcix.
Sunt & aliæ quatuor causæ, ob quas homines animo concidunt. Dolor uehemens, uigiliæ, euacuatio immodica, & in delirantibus ipse motus. His quintam si libet adde, principiorum intemperiem. Celerrima igitur perniciēs instat corde affecto, consequenter autem cerebro.

De dolore animi deliquium inducente. Cap. c.
Dolor est repentina temperamentī mutatio, & futura continuitatis solutio. Non enim quæ paulatim fit alteratio, animal dolore afficere potest. Apparet enim corpora non solum dum acuatim ad non naturalem habitum ducuntur, molestam habere mutationem, sed etiam dum ad naturalem habitum reducuntur, nisi paulatim id contingat, dolore affici. Proinde eos qui in uehementissimo frigore iter fecerunt, acuatim calefactos dolore affici scimus circa unguum radices adeo ut ferre non possint. Querimus igitur quomodo ægrotantes dolent, nullo forinsecus accedente ipsis dolorem inducente. Necessarium est in corpore talem quandam causam querere, quæ calfaciens uehementer, aut perfrigerans, aut essentiam aliquam sensitiui corporis diuidens, angorem nobis inducat. Et primum sanè considerabimus cuius naturæ esse oportet id quod corporum diuisionē facere poterit. Necessarium igitur est aut rupturam, aut contusionem, aut erosionem esse affectionem, in qua continuitas diuiditur. At ruptura fit ex tensione, contusio ex grauitate, erosio ex mordaci qualitate. Quum igitur foris nihil fuerit quod dolorem inducat, aut tendens, aut grauens, aut mordens, sed ex seipso aliquid horum patitur corpus, omnibus nimirum manifestum est, quod ab aliquo intrinsecus fit. Attensio quidē ab essentia distendere corpus ipsum continens fieri potest, aut ab immodica siccitate. Contusio uero ab aliquo tumore duro adiacente. Morsus autem ab acri humore. Considerandum igitur est in doloribus, an sit humor multus, aut status transitum non habēs, uelut in colicis. Aut grauis moles, uelut in inflammationibus & tumoribus induratis. Aut humor mordax, aut affectio sicca, uelut in conuulsis. Aut frigiditas uehemens. Aut caliditas. Et horum singulorum correctio rite faciēda est. Stupidus itaq; dolor ex frigida fit affectione. Pulsatiuus autem dolor proprius est magnæ inflammationi. Si uero uelut ab aculeo infixio, aut uelut à cerebro perforari quis sibi uideatur, crassi intestini, quod colum nominamus, hæc doloris species existit. At uero in renibus cum grauitate quadam dolor est in uno loco firmatus, circum lumbum dextrū aut sinistrum, retrorsum magis. In colo uero dolor ex loco ad locū transit. Pungitiuus autem dolor circa membranas consistit. Qui uero prosiliens dolor appellatur, contingit in uehementibus hemicranjs, dimidia capitis parte affecta. Cognoscitur ex hoc, quod uelut à radice quadam, à primario affecta parte dolor initium sumens, celerrimè ad adiacētes utrinq; partes fertur. Quapropter ad ambas extremitates contingentibus distentionibus, etiam nerui ad utranque partem distenduntur. Minimè ad latitudinem distentos dolores nerui ipsi habent. At uero membrana subter omnem cutem distenta, tensiuos & stupidos dolores inducit. Quæ uero inter carnem sunt membranæ, dolores uelut diuidentes faciunt. Sunt enim multæ, &

inæqualiter insitæ, & forinsecus ipsam carnem am-bientes. Cæterū circūcitarum ossibus membranarū dolores profundi sunt. Et ipsorum ossium dolētium imaginationē inducunt. Quum igitur nulla externa causa doloris apparet, prægressam causam & diætā cōsidera. Si enim fuerit præter cōsuetudinē ociosior, aut cibis pluribus homo usus est, aut multū nutriendis: Aut cōsuetæ excretio suppressa est. Si quicquā horū, aut omnia apparuerint, multitudo est doloris causa. Et propterea quàm celerrimè homo euacuetur. Sic enim cū omni securitate tibi licebit his quæ fluxiones repellunt uti in partibus dolore affectis. Si quidē igitur multitudo fuerit quæ distendit, uiribus fortibus existētibz, uena secetur, & ex magna uena inflammatae aut dolenti parti propinqua sanguis auferatur. Si uero debiles fuerint uires, reuulsio fiat & deriuatio sursum, aut deorsum, aut utrinque, aut per frictiones. Viscosis autē humoribus solis infestantibus, purgatio fiat. Ambobus autem cōcurrentibus, utrisq; euacuationibus utendū est, primum uenæ sectione, postea purgatiōe. Si uero his factis dolor remanet, manifestum sanè est circa partē affectam impactum esse id quod molestat. Manifesta est etiā curatio, per discussoria siens medicamenta. Eodem uero modo etiā propter spiritum flatuosum, aut pituitam viscosam fiēte dolore, uelut in colicis per fomenta & irrigationes medemur. Si uero tumor grauis aut contundens, dolorem effecerit, tumor ipse curandus est per attenuantia ac rarefacientia. At si ob mordacem humorem dolor fiat, aduersissima his sunt attenuanda ac calefacientia. anethum autem uiride in oleo coctum, dolorem eximit, & somnum inducit, si affecta pars oleo calido irrigetur.

De animi deliquio propriè dicto. Cap. ci.
Haecenus de animi deliquio dictum est, quod syncopē Græci uocant, hoc est, animi concisionem. Tale uero quiddā est & quod propriè animi deliquiū, hoc est, lipothymia uocatur, itemq; exolutio. Et nomē quidem animi deliquiū unū est: Causæ uero ipsius plures, & curationes iuxta singulas species. In tantū autem de ipsis nūc dicemus, in quantū quis his satis cognitis, resistere possit exacerbationibus derepente incidentibus. Differt autē animi deliquium à syncopa, quod animi deliquiū derepente incidit, sensu & motu hominē priuans, & omnino non sudant. Syncopa uero, & uigilantes, & dormientes inuadit, & omnino cum sudoribus qui syncopici appellari solent.

De his qui ob uentris profluuium, aut sanguinis eruptionem, aut immodici sudoris euacuationem animo linquuntur. Cap. cii.
Qui ex bilis supernæ ac infernæ excretionē, & alui fluxionibus, & alijs immodicis euacuationibus animo linquuntur, his aqua aspergenda est, & nasus apprehendendus, & os uentris confricandū, & digitis aut pennis immixtis landnandum, & ad uomitum cogendum. Manus & crura pluribus & uehementioribus uinculis deligētur: manus in euacuationibus infernæ fiētibz; crura uero in supernæ fiētibz. Auxiliatur etiam in talibus euacuationibus uinū aquosum uetus frigida dilutum. Balnea uero fluxionibus in uētre commoda sunt, uerum his qui ob sanguinis eruptionem, aut sudorum immodicorū euacuationem animo linquuntur, aduersissima sunt. Adstrictione enim hi indigent & frigiditate, non laxa-

tionē. Vinum uero frigida dilutum uelut dictū est, etiam his commodum est. Neq; uero extremitates ligare conducit, neq; uomere, neque omnino moueri. Sed densari his conuenit ac frigescere. Quapropter aërem domus frigidum paramus, frigidos uentorum flatus inducentes, & paulimenta adstringente qualitate sternentes, uelut myrto, rosas, pampinis uitis.

De his qui ob humorum copiam, animo linquntur.

Cap. ciii.

Qui ob humorum copiam animo linquntur, plurimum fricentur & calefiant, & manuum iuncturae ac malleoli ipsis deligantur. A cibo uero & uino, ac balneis omnino arceantur, si febricitant. In potu autem detur acetum mulsum.

De his qui ob quandam uteri affectionem animo linquntur.

Cap. ciiii.

Similiter etiam haec quae ab utero affecto exoluuntur ex aceto mulso curandae sunt. Et crura fricanda ac liganda, maxime his quae ab utero strangulantur, & in quibus retractus aut loco motus est uterus. Cucurbitas quoque inguinibus à femoribus affigemus. Et naribus quidē odoramenta graueolentia adhibebimus. Vtero uero beneolentia, & laxare ac calefacere potentia medicamenta admovebimus. At uero his quae ob immodicam mēsum euacuationem animo linquntur, manus magis deligabimus, & fricabimus, & cucurbitam pectori affigemus.

Ad eos qui ob stomachi debilitatē, animo linquntur.

Cap. cv.

Ad eos qui ob stomachi debilitatem animo linquntur, cataplasmatibus utemur ad stomachum roborantibus, ex palmulis, uino, polēra, croco, aloē, mastiche. Et irrigationibus ex absinthio, & oleo melino & mastichino ac nardino, & uino. Et si stomachus exuratur, ammiscenda sunt etiam frigescentia, uelut est ramentorum cucurbitae succus, aut lactucae, aut portulacae, aut solani, aut intybi, aut rumicis acuti, aut uuae acerbae. Hic autem non solum frigescentia, sed etiam adstringit. Prodest etiam generose ipsis extremarum partium frictio. Si uero ex horum usu melius habuerint, eos quidem qui stomacho exuruntur statim ad balneum ducere oportet. His autem qui quandā frigiditatis sensum habent, parum dandum est de medicamento ex tribus piperis generibus constante. Aut ipsum piper album.

De his qui ob uitiosos humores, os uentris rodentes, animo linquntur.

Cap. cvi.

Quicunque uitiosis humoribus os uentris mordentibus exoluuntur, his aqua calida data uomere iubeto. Si uero aegrē uomant, stomachus & pedes ac manus prius foueantur. Deinde digitis aut pennis immisis uomant. Si uero uomitus non contingat, uentris excretionem adiuuare oportet glandulis subditis. Si uero ex his melius habuerint, comam absinthii in aqua mulsa coctam, bibendam dato, & omnibus modis stomachum corroborato, tum per ea quae foris imponuntur, tum per ea quae intra corpus sumuntur. Non tamen à principio hoc facere conuenit, neq; absinthium praebere. Sed posterius post uitiosorum humorum euacuationē, ubi iam pura facta fuerit aluus,

De his qui ob pituitā in stomacho collectam animo linquntur.

Cap. cvii.

Si pituita multa & frigida in stomacho collecta, exo-

lutiones fieri contingit, stomachū oleo calido in quo absinthium coctū est, plurimum rigabimus. Deinde aquam mulsam dabimus, in qua hyssopus aut simile quid commaduit. Item acetum mulsum & piper, & pharmacum ex tribus piperis generibus constans, & id quod diosporidicū appellatur. Et tota rationis uisus summa ad incisoriū ductū sit destinata.

De animi deliquio ob fortem frigiditatem.

Cap. cviii.

Exolutiones ob fortes frigiditates, similiter ut bulimo, hoc est magna fame ex frigore oborta, correpi curantur, ita ut omni modo ipsos calefaciamus. Vinū igitur dandum est ipsis calida dilutum, & cibi calefacientes. Fricandi sunt etiam ac fouendi iuxta ignem.

De animi deliquio, ob multam caliditatem.

Cap. cix.

Qui ob multam caliditatem animo linquntur, aut in aëre suffocante uersati sunt, aut in balneo diutius moram traxerunt, eos roborare oportet confestim quidem frigida aqua aspersa, & uentilatione facta, & aegro ad uentum conuerso. Fricandum est etiam ac lancinandum os uentris. Et consequenter uinum & cibi dandi.

De animi deliquio, ob inflammationem, aut malignam febrem.

Cap. cx.

Qui ob inflammationum magnitudinem, aut uehemētis febris malignitatem, animo linquntur in ipsis accessionibus, & artus perfrigeratos habent, eos fortiter fricare oportet ac fouere, & crura ac manus ipsorum deligare, & iubere ut uigilent, & ab omni cibo ac potu abstineant. Optimum est autem in his praenoscere quod futurum est, & ipsum ante exacerbationem lenire ac mitigare.

De animi deliquio ob siccitatem.

Cap. cx.

Sed & eos qui ob siccitatem animo linquntur in exacerbationum principijs, optimum est praenoscere. Si enim duabus aut tribus horis ante accessionem nutritiueris, & manus ac pedes ligari iusseris, non interibunt. Oportet autem cibos esse concoctū faciles & stomacho commodos. Si uero etiam uehemens periculum fore suspicaberis, panem ex uino dabis, aut alicam coctam uino infuso exhibebis. Si uero modicam syncopam fore speras, uinum ne dederis, sed mala punica, aut alia poma, & adstringentes fructus cibis ammiscabis. At post exacerbationem non est necessarium fructibus uti. His uero qui derepente in periculum incidunt, uinum calidum dandum est, & panis, & alica omnino modica. Si enim aut amplius dabis, aut cibos concoctioni resistentes, hi qui sic affecti sunt suffocabuntur.

De animi deliquio ob principalis membri obturationem.

Cap. cxii.

Qui ob principalis partis obturationem animo linquntur, his acetum mulsum dandum est, & portiones ex hyssopo, origano, pulegio & melle, & cibi incisoria ut praediti. Crassi enim & uiscosi magno his detrimento sunt. Quare ab ipsis abstinendum est. Fricandi sunt artus & ligandi, & portiones urinae clientibus utendum, ex apio, petroselinio, dauco, & similibus. Vbi uero manifesta consequitur utilitas, etiam uino aquoso ueteri utendum est.

De animi deliquio ob repentinam euacuationem.

Cap. cxiii.

Si ob repentinam & acerrimam factam abscessus rupturam

pturam, aut sectionem, aut euacuationem, uelut in hydropicis, animi deliquitum contigerit, statim quidem odoramentis reuocentur, postea uero sorbitionibus probè concoctilibus nutrantur.

De animi deliquio propter affectus. Cap. cxiii.

Si propter tristitiam, aut gaudium, aut timorem, aut iram, aut terrorem, exolutio fiat, per odoramenta, & narium ac oris apprehensiones reuocatos, ad uomitum cogito. De cardiacis & bulimo dicitur suo loco in stomachi affectionum tractatu.

De capitis dolore in febribus. Cap. cxv.

In his quibus in febribus caput dolet, uitanda est multitudo lux: Lædit enim uisum, & membranas ad motum ducit. Utendum est autem frictione pedum, & extremitatum deligatione, ac constrictione. Utanda est etiam caliditas à carbonibus, aut lucernis, aut sole & fumo. Item inuicundi & humiditate repleti odores. Et clamores, & iræ, & frequens potus, & colluctio oris. Nā aut statim ab ore, aut humecto stomacho, uaporum multitudo ad caput deferitur, quod alias iam ignitum est. Maxime uero irrigationibus largioribus utendum est, ex oleo omphacino, aut optimo rosaceo, lanæ manipulo excepto, & digitis ex alto expresso, & instar salientis cum lectu quodam delabente. Quod si non resistat aer ambiens, frigida sit irrigatio, aut per se, aut ex nostro studio. Aucto autem dolore, etiam in aurem rosaceum fundatur. Si uero tempus permittat, & dolor cum ardore quodam innitatur, ocymi succus aut polygoni, aut mentæ, ex tertia aut quarta parte rosaceo ammiscetur. Et tunc etiam parum aceti ipsis diligenter ammiscetur, maxime in quo acetum fuerit coctum. Perseuerante uero dolore, ad uenæ sectionem deueniendum est, si nihil aliud fuerit quod prohibeat. Odoramenta quoque non incommode assumuntur, myrtus, rosa, pulegium. Cataplasmata uero conueniunt in sinu capite ac fronte, polygonum tritum cum flore polentæ, & folijs seridis ac plantaginis. Si uero dolor uehementer incumbat, hyoscyami folia uiridia aut papaueris cum micis panis. Præstant autem amygdalæ amaræ madefactæ ac decorticatæ, & cum micis impositæ temporibus ac fronti. Optima uero est aloë fronti illita cum aceto. Aut crocomagma. Et intestina terre trita illinuntur, & celerrimè mirificè optulantur. Vtēr porro in ipsis facile solubilis præparetur. Considerandum tamen ne stomachus uehementer infestatus, caput ad consensum perducatur. Et conandum ut quæ molesta sunt per uomitus euacuentur.

De uigilijs in febribus. Galeni. Cap. cxvi.

Si uigiliæ nimium infestauerint, manus & crura deligari iubebimus, eò tempore quo ad somnum conuerti solent, & hortamur ut assidue aperiant ac claudant palpebras, donec satis fatigati fuerint. Deinde repente soluimus ligamenta, & tollimus lucernam, & multam quietem esse iubemus. Ex Herodoto & Philumeno. Puluaribus uigilantium subdantur capita papaueris, aut radices papaueris nigri, aut mala mandragoræ, aut hyoscyamus. Odoramentis autem utendum est, papauere uiridi, & lactucis, quæ meconitides appellantur, & menta, & coriandro ac rosæ. Nos autem minus horrenda faciei proleuone uitimur, incoctis in aqua calicibus papaueris nigri, & meliloto. Aut calamintha, aut pulegio, & melius facit. Odoramentum uero optimum hoc est.

Papaueris albi calicum costorū, corticis radices mandragoræ, æquales portiones terito, & uino ac pauco rosaceo subactas olfaciendas exhibeto. Suffumigium autem somnifico utendum est tali. Styradis, amomi, ammoniaci thymiamatis, bdellij scythici, corticis radicis mandragoræ, opij, singulorum æquas partes preparato & suffito in lignis cupressinis. Mirificè facit etiam berenices suffumigium, similiter suffitū. Ducit enim ad somnum. Descriptum autem habetur in tractatu de theriacis, Sermone inquam de clamo tertio. Vngento uero somnifero utere hoc. Styradis sextantem, rosarum siccarum unc. i. seminis hyoscyami nigri unc. i. baccarum myrti nigrarum unc. i. olei rosacei lib. i. Vini ueteris odorati quantum satis est. Contusa & cribrata terito cum uino, & adiecto oleum, & unctis utitor, illitis ex eo naribus intrinsecus ac extrinsecus, & fronte. Imponendum est etiam fronti serpillum cum meliloto in passio coctum. Item semen ocymi, & attractylidis semen, hyoscyami semen & folia, similiter & solani halicacabli, iidem faciunt. Illine etiam frontem ex cyphi cum uino, & crocomagmate. Si uero perseuerarit uigiliarum symptoma, frontem & tempora aliquo pastillo dolorem eximente illine. Et si nihil profecerit, prædictæ rei difficultate, ad dolorem eximentia, in potu exhibenda procede. Est autem minus molestum, & sapore iucundius omnibus pharmacis somnificis, id quod ex calicum papaueris decocto ac melle componitur. Cuius compositionem paulò post in hoc Sermone referemus. Utere & cataplasmate optimè ex palmulis maceratis aut coctis in uino, & cum polenta trita, adiecto modico rosaceo, aut melino. Pectori enim impositum quodammodo præparat ad somnum.

De graui sopore. Herodoti. Cap. cxvii.

Perfectam curationem eorum qui in grauem soporem delapsi sunt, in sequenti Sermone de capitis affectionibus trademus, in quo etiam de phrenitide docebimur. Nunc autem dicere necessarium est quomodo quis urgentibus symptomatis resistere possit. Proinde spongia posca imbuta, non ualde frigida, faciem detergere oportet, & extremitates fortiter deligare. Odoramenta uero adhibeantur incisoria uisum habentia & excitatoria, & maxime castorium. Et in exacerbationum remissionibus cucurbitæ dorso ac spinæ efficaciter affigantur. Perseuerante uero morbo, etiam sternutatoria in exacerbationum remissione adhibeantur. Cauendum autem est à lucernarum usu. Caput enim inde repletur. Sit autem & ciborum materia incisoria uisui prædita. Habent autem uisum excitandi etiam in ipsis, ea quæ sequenti Sermone ad lethargicos describentur, tum per se, tum cum aceto naribus admota.

Quomodo lingue asperitas in febribus curatur.

Cap. cxviii.

Lingua in febribus aliquando siccat, & opus habet humectatione. Aliquando uero exasperatur magis aut minus, & diffringitur, aut nigrescit, aut carbonis speciem induit: quod à uiscerum inflammatione contingere solet. Si uero ipsa quidem lingua, uelut dictum est, affecta fuerit, præcordia uero mollia reperiuntur, periculosum signum est. Humectare autem ipsam oportet, seminis lini decocto in ore detento. Efficacius id erit, si myx cum semine lini fuerint

coctæ. Sed & digito in hoc succo madefacto linguam confricabimus, simul detrahentes etiam sordes dentibus adhaerentes. Deinde colluant os aqua pura, aut spongia pura detergeant. Deinde rosaceo diligenter illinantur. Sed & ipsum rosaceum melli ammixtum egregie efficax est. Et portulacæ succus in ore detentus, locos humectat. Et rhus culinaris aquæ, aut aquæ mulsæ ammixtus. Et prunorum damascenorum aut myxarum ossa in ore detenta mitigant. Sepe etiam lactucæ caulem ad oliuæ magnitudinem defectum, aut de symphyti radice, in ore tenendum dedimus, & quod oportuit fecit. Sint autem cibi mordacitatis exortes, & omnino non adstringentes, leuesque ac sorbiles. Si uero etiam præcordia inflammata fuerint, horum curationem facere oportet. Principium enim & finis interaneorum lingua est. Si uero diutius durarit linguæ asperitas, adipem anserinum si affuerit, sin minus, gallinacium, aut qui adhuc præstantior est phasianicum duplici uasculo liquoato, & digito in ipso intincto, linguam abunde fricato. Si uero adhuc perseverarit asperitas, butyro recenti similiter utere, facit optime, sed in principio eo uti non conuenit.

Quomodo sitis curanda sit. Philumeni. Cap. cxxix.
Sitis duplex est, altera ob humiditatis inopiam: altera ob caliditatis redundantiæ. In febrientibus itaque ambæ affligunt. Nam caliditas in his multa est, & sic citas succedit, multa humiditate per uolentiam febris consumpta. Si quidem igitur sine detrimento bibere possent quando uellent, hanc sanè sitis medellam statim amplecteremur. Quandoquidem uero & mensuram & tempora potus discernere oportet, lenimenta quædam sitis excoglanda sunt. Nam in tempestiue sumptus potus, non solum sitim non exstinguit, sed etiam ulce uersa augeat. In principijs enim acerbationum omnes materiæ febres accendentes, ad profundum declinant, & propterea sitim intendunt. Datus autem in illo tempore potus à materiæ multitudine superatur, & simul uitiatu accessio fit mali. Quare in principijs & augmentis potus exhibitionem prohibere oportet. In uigoribus autem, primum per gargarismos, & per collusiones oris, squallorem corporis mitigare oportet. Deinde declinatione incipiente potum dare. In remissione uero etiam nolentes aliquando cogantur potum assumere, ut ne humore indigi ad exacerbationis accessum delati resiccentur ac exurantur. Mitigare autem aliquo modo sitim oportet olei frigidissimi irrigatione, aut rosacei instar salientis delabentis. Sed & auxilia ad febres ardentes relata, & ea quæ ad linguæ asperitatem dicta sunt in ore retinenda, sitim mitigant. Omnibus autem præstat lactucæ semine commansum, & radix dulcis appellata, & cucumeris semen. Oportet autem post horum commanducationem collusionibus ac gargarismis uti. Sint autem & cibi omnes humectantes. Catapota sitim eximens. Ex Dioscoride. Seminis cucumeris drach. viii. tragacanthæ drach. iiii. tragacantham tulsam ac cribratam ouorum crudorum recentium candido dilue, & ex contritis simul catapota efforma, eaque in umbra sicca, & unum sub lingua tenendum præbe, ita ut dissolutus liquor absorbeatur. Dato etiam cremore maiorum cydoniorum absorbendum, aut pirorum, aut omphacii succum, aut hydrosotum, aut mel rosaceum

cum aqua calida. At uero in sanis, sitis ob siccitatem factæ medela est somnus. Concoquit enim humores. Sitis autem ob caliditatem, medela sunt uigiliæ. Caliditas enim in uigijs circa superficiem expanditur. Sitis uero ob caliditatem eduliorum factæ, aut ob multum uini potum, medela est frigida potus.

De aurium dolore in febribus. Philumeni.

Cap. cxxx.

Aurium dolor in febribus fit, & aut ipse febrem auspicatur, aut succedit, & periculosiores febres efficit. Succedunt dolori atque inflammationi etiam uigiliæ. Si uero perseverarit, etiam mentis emotiones. Hippocrates autem letales fieri dicit in his dolores. Si igitur moderatus est dolor, & in principio, rosaceum tepidum auribus instilletur. Aut candidum & aquosum oui, cum lacte muliebri, forinsecus autem hapso lanæ oleo imbuto, in quo anethum coctum est, aures obturentur & integantur. Caput item rosaceo irrigetur, aut oleo omphacino. Si uero dolor amplius intendatur, & uenæ sectio assumatur, & aluus iritetur. Postea quoque forinsecus per ambitum aurium cataplasma ex pane, aut semine lini imponatur, hyoscyami aut papaueris uiridibus folijs simul contritis. Butyrum autem pro oleo in cataplasma misceatur. At in dolorum exacerbationibus, fouendi sunt loci spongijs aqua & oleo calido imbutis, donec dolor sistatur. Vehementer enim hæc mitigant, & rursus prædictum emplastrum imponatur. Instillandum est etiam auribus oleum amygdalinum, aut rosaceum, in calice papaueris ad calidum cinerem calefactum. Aut intestina terræ in rosaceo cocta instilla. Aut asellos sub hydris stabulantes, aut araneos.

Aurk suppurate curatio. Cap. cxxxi.

Suppurata inflammatione & eruptione per meatum facta, ubi lana specillo obuoluta pus eduxerimus, primum aqua mulsa eluimus; deinde uino mulso: Postea aceto mulso: deinde modica nitri spuma aceto mulso ammixta. In meatum uero indemus nostrum medicamentum lana exceptum, quod egregie facit. Est autem alumen liquidum, mel, & rosaceum, æquis portionibus singula modice cocta. Optime facit & Mulsæ pastillus optima sapa & modico aceto dilutus. Cæterum de sonitu & audiendi difficultate, inter communia auxilia dicetur. Nosse tamen oportet pessimum signum esse in acutis febribus auditus difficultatem. Nam aut lethargum, aut mentis apprehensionem, aut parotidas perniciosas, aut aliud quoddam periculum minatur. Raro autem permanet audiendi difficultas in aliquo qui morbum superauit, sed simul cum morbo intercidit. Et enim aliquando per circuitum repetit in exacerbationibus augescens. In remissionibus uero simul discedens. Quod contingente auditorum meatum uexare non oportet: sed solum caput irrigare cum his quæ in febribus ad capitis dolorem conueniunt.

De lippitudine in febribus. Cap. cxxxi.

Si lippitudo in febribus fiat, abstinere oportet ab omni medicatione. Infundendum est autem oui tenue & candidum cum lacte. Et foris illinendū glaucium, aut Nili collyrium ex rosis, aut aliud quoddam ex croco, ex his quæ fluxiones repellunt cum refrigeratione. Si uero dolor uehementer uexet, somnū fiat per spongas, & hapsum lanæ quo imbutus pro more

more imponatur. Si uero augeatur dolor, etiam panis imponatur, in calicem papaueris ac melilod decocto madefactus, cum oui assatuitello, aut etiam cocti, addito modico rosaceo. Aut psyllium feruenti aqua madefactum imponito. Suppurata inflammatione collyria dolorem eximentibus utendum est.

De oculorum obscuratione. Philumeni. Cap. cxxiii.

Fieri solet circa morborum solutiones, aut etiam ubi uires recolligunt aegri, circa utrumque oculum aut circa alterum obscuratio, ut uix uidere possint, uelut per caliginem quandam, & ut aliquando quaedam ante oculos uideantur pilis similia. Adum oculi considerantur, puri apparent. Rarissime uero in talibus circumstantiis, circulus pupillae aut minor aut amplior reperitur. Ipsum porro obscuracionis oculorum accidens, ut plurimum seminis in tempore effusione praegressa, iuxta morbi solutionem, aut resolutionem euestigio incidit. Et est signum debilitatis spiritus uisui ac nervosae partis. Itaque in perfecta corporis conualescentia, etiam uisus actio integre restituitur. Quapropter a localibus auxiliis abstinere oportet, & neque fomenta, neque illitiones adhibere. Verum refectorij totius corporis ductus usu, hoc ipsum accidens corrigere.

Fluxus sanguinis narium in febribus curatio.

Philumeni. Cap. cxxiiii.

Fluxum sanguinis e naribus in quarta die in febribus fientem, pessimum lignum Hippocrates dicit. Multitudinem enim significat in toto corpore, aut in capite. Destillat enim sanguis aut ob compressionem, aut ob densationem meatuum. At uero uberior excredo eius, multitudinem & laxare, & minuire potest. Paulatim igitur euacuationem facere oportet inde, unde natura impetum habet. Hac ratione facta, ausus sum in destillationibus in quarta die fleuibus, per graminis cauliculum, uelut mos est, uas narium fauciare. Non autem oportet modico fluxu contentum esse, sed pro uiribus detrahare. Sufficiente autem facta euacuatione, consueti more eundem suppressere.

Vesicae et urinae difficultatis curatio in febribus.

Philumeni. Cap. cxxv.

In principio pessimarum febrium etiam hoc accidit, ut uesica doleat, & paulatim ac cum dolore urinam emittat. Et hoc non solum molestum est, sed etiam signum quod tota pars nervosa doleat. Est enim totum corpus crudioribus humoribus refertum. Confluit autem ex ipso acervata multitudo in uesicam, quae amplius distenta ad actiones suas inefficax fit, & periculum suppressae urinae inducit. Proinde immo uentri, pectini, ac inguinibus, lana pura oleo dulci calido aut scyonio imbuta imponatur. Praestat autem rutam, & anethum, & apij semen in oleo cocta esse. Aut cuminum tritum lane inspergere. Si uero dolor augeatur, etiam cataplasmata post irrigationes adhibeantur. Et in intestinum rectum oleum & butyrum cum foenigraci decocto infundantur. In mulieribus uero & in uterum, & in intestinum rectum. Si uero inflammatio urgeat, & rubor cum multa caliditate in summo uentre appareat, etiam uenae sectio adsumatur. Dieta autem sit tenuis & exquisita. Utanturque pisana, aut alica lota ex aqua multa, aut ouis sorbilibus. Post haec edam micae panis probe lotae exhibeantur. Deinde malua friabilis assumatur, & por-

rum capitatum pluribus aquis coctum. Et pisces tenerissimi. Infusio quoque appareatur usque ad umbilicum & totos lumbos, ex artemisia, foeni Graeci, pulegij decocto, & oleo ammixto. Progressu uero temporis, castorium lane inspergatur. Ceterum potus ita affectis commodissimus est, post augmentum quietum, cucumeris satui semen, quod praemaceratum decorticatur, & tritum datur cochlear. ii. mensura cum aceto cyathis tribus. Et mouet quidem urinam citra molestiam. Dolores autem euestigio soluit. A reliquis autem urinam ceteribus, quam diu febres perseuerant, in totum abstinendum est, ut ne urinae copia ad uesicam delata, ipsam distendat, & malum augeat.

Lumborum doloris curatio. Cap. cxxvi.

Lumborum dolores fiunt plerumque in febribus prauis statim ab initio, & permanentes maximas uexationes inducunt, & repente dissipant, periculosiorem fore morbum indicant. Circa primos igitur dies irrigatione ex uino & oleo utendum est. Deinde spuma nitri, & uinum dulce mari mixtum, & oleum, simul unita & lana sordida excepta, locis adhibeantur. Tales autem irrigationes uehementiam quidem doloris mitigant, dolorem autem non omnino tollunt. Progressu uero temporis uenae sectione utendum est. Deinde eucurbitae loco adhibendae. Postea cataplasma parabimus ex semine lini & foeno Graeco, & hoc in sacculum coactum lumbis supponemus, ut super ipso decubitus fiat. Deinde irrigatio ex oleo rutaceo fiat. Et cerata ex cyprino facta adhibeantur. Venter autem a principio facile solubilis per cibos paretur. Vehementer autem prodest ipsis clyster, ex decocto cucumeris syluestris & melle solo infectus. Euacuat enim pituita & citissime alleuat, nisi uehemens fuerit febris.

Ulcerationis circa os sacrum in febribus curatio.

Philumeni. Cap. cxxvii.

In diuturnis & aliis habitum eliquantibus febribus, consumpta carne, super nudis ossibus decubitus fit, & eminentes maxime ipsorum partes, dolorosas & aegre curabiles ulcerationes habent, eo quod per stratum trahantur. Non solum autem ob curacionis difficultatem graues sunt ulcerationes: dilatantur enim & profundae fiunt, & crassa labia habent, proserpuntque & usque ad nuditatem procedunt: sed etiam notatae sunt a ueteribus, uelut haec affectio perniciem portendat. Quapropter antequam immedicabilis fiat, curacionem eius aggredi oportet. Primum itaque ubi locus rubicundus & dolorosus fieri incepit, circulum laneum iuste magnitudinis loco subdemus, quo affecta pars per uacuum firmata, a compressione liberetur, & decubitus minime aerumnosus fiat. Postea utro ceratum ex rosaceo aut myrteo oleo paratum, quod recipit spumam argenti, cerussam, ordeumustum imponemus, subiecto uidelicet ex lana circulo. Idem faciunt etiam omnia sedis cerata. Et adhuc magis id quod residet in creta uasis in quibus aqua coquitur, quod uelut testa adharet fundis ipsorum, si cerato rosaceo ammisceatur. Reperitur autem eius copia in aeneis balnearum uasis. Item ceratum ex melle, quod quatuor haec aequaliter recipit, spumam argenti, oleum, ceram, mel. Diluitur autem rosaceo, & mirifice facit. Adhibeatur etiam fomentum per spongas. Si uero inflammatio fiat, panis cataplasma locis imponatur, cum solano, aut polygono, aut plantagine, aut brassicae folijs. Si

uero pascendo proserpat, ulceratio, lenticula cocta cū malicorio imponatur. Utendum est & medicamentis ad nomas paratis, cum rosaceo dilutis. Item emplastro uiridi Epigoni. Et pastillo qui Corax appellatur, & Andronis aut Musæ pastillo cum sapa. Contra tracta autem & repressa noma minoribus communibus auxilijs utendum est.

Ulcerationis circa scrotum & anum, in febribus curatione. Philumeni. Cap. cxxviii.

Sæpe in ægrotantibus exulcerantur partes hæ, quandoq; ob solam negligentiā. Aliquando uero etiam à prauis & acerbis humoribus, & malignis febribus. Itaq; reperire est ita affectos etiam mente læsos, & non percipientes dolorem, neq; animaduertentes feruorem, nisi is qui curam ipsorum gerit ex odore cognoscat. Primum itaque per spongiā fouendus est locus ex aqua leniter calida. Deinde illinendus myrteo aut rosaceo oleo. Et postea scrotum myrtosica leuissimè trita conspergatur. Deinde ex candido oui, cum cerussa & modico rosaceo aut myrteo illinatur, ut ne exarescat. Si uero illitionum inquinamenta non ferant, ceratum molle præparetur ex rosaceo, quod cerusam & argenti spumam habeat, & uitellos ouorum coctos. Cōuenit etiam ceratum butyrinum, & quod ex anseris aut gallinaceo adipe paratur. Et emplastrum siue ceratum ex ordeo. Et omnia ad sedem parari solita. Si uero nome succedat, utendum est curatione in ossis sacri ulceratione relata. Cibi uero exhibeantur ipsis dulciores, pro facta de febribus confectione. Ventris quoque cura habeatur maximè locis circa sedem alleuariis.

Pustularū in febribus curatione. Herodoti. Cap. cxxix.

In febrientibus assidue fiunt pustulæ circa labia & nasum, iuxta febrium solutionē. Verum in principijs febrium non simpliciorum, sed à prauis humoribus ortarum circa totum corpus exoriuntur uibices similes culicum moribus. In malignis autem & pestilentibus febribus exulcerantur, & quædam ad carbunculorum speciem accedunt. Omnes autem multitudinis corrupti & habitum erodentis humoris signa sunt. Quæ uero in facie oriuntur, omnium malignissimæ sunt. Deteriores autem sunt plures quàm pauciores, & maiores quàm minores, & quæ citò delentur quàm quæ multo tempore durāt. Deteriores item feruentes quàm quæ pruritus inducunt. Et quæ quidem succedunt aluo suppressa, aut moderatas egestionem faciente, bonæ sunt. Quæ uero fluente aluo & uomitibus uexantibus fiunt, malæ. Si uero succedentes aluū resiccant, bonæ. Sequuntur ad pustulas, febrium malignitas, & plerumq; etiam animi deliquia. Eas igitur quæ circa febrium simpliciorū solutiones fiunt circa labia & nasum, rosaceo illinere oportet per se, aut cum cerussa & spuma argenti. Conferunt etiam pastilli ex croco, myrrha, & alumine, quæ iridem uocant. Et niger pastillus, qui recipit crocomagmatis, balaustrum, atramentum sutorij, myrrha, & aloës, singulorū partes æquales. Teruntur hæc cum uino uelut collyrium, & in pastillos efformantur, & usus tempore cum aqua aut lacte illinuntur, aut cum uino, ubi adstrictionem augere uoluerimus. Agglutinantur autem hæc post illitionem, aut sine hac, pellicula palmulæ ossi adhærente, aut membrana oui. At uero pustulæ uibices referentes curentur uenæ sectione in principio, si nihil impederit. Solent enim

reuerse intra corpus periculum afferre, si nō per uomitus, aut per aluū acrimonia secedat. Quapropter etiam aluus per pisanæ succū, & oua, & oleum chamæmelinum molliatur. Detineant autem ueluti infusum per totam noctem. Sed & ciborū contractione utendum est, quò undiq; multitudo tollatur. At in accessionibus propter succedentes circa stomachū uehementissimos morsus, aqua tepida data uomere iubemus, digitis aut pennis immisis. Cibi uero exhibeantur contemperandi uim habentes, uelut est pisanæ succus, aut alica cum aqua mulsa. Si uero febris ardens infestet, illinatur corpus aqua & oleo, nitro modico ammixto. Pustulas enim circa superficiem retinet, & materiam in profundo attrahit, & profunditatem refrigerat, & sæpe sudores excludit, quia aerium humorum multitudinem in uapore diffilare possunt. Cæterum in pestilentibus & carbunculosis, uenæ quidem sectionem adhibemus statim in principio, non autem cibi contractionem. Fames enim peiorem materiam facit, & uires in his conscindit, quas integras seruare uolumus in omnibus febribus, maximè pestilentibus. Si quidē igitur admiserint loci, illinendæ sunt pustulæ pharmaco crasso, ex rosaceo & cerussa, & thure ac uino dulcissimo. Aut ex spuma argenti & manna thuris cū rosaceo. Reliquæ uero partes cerato integantur ex eadem materia parato. Conueniunt etiā ipsis omnia cerata & emplastra quæ ambustis adhibentur. Et pustulas quidem circa faciem, calidæ prolutione mitigabimus. Quæ uero in reliquo corpore sunt, per spogias diutius foueantur, maximè prurientes. Si uero serpentina fuerint ulcera, etiam calcis uiuæ parum ammisceatur; mirificè enim resiccet, & serpiginem ipsarum sistit. Quæ uero iam depakunt, lenticula cocta cum malicorio ac melle, aut plantagine, aut polygono, aut rosæ cum pane integantur. Bonum est etiam his caprinum lac, ad humorum prauitatem contemperandā. Oportet autem quartam partem lactis aquam ammiscere, & simul coquere assidue uersando, donec dimidium de toto supersit. quo neq; in casei naturam trāsiliens exarescat, neq; seruens factum nidorosum fiat, propter febrem detinentē. Declinatione uero facta, per medicamentū purgatorium idoneum materię euacuentur. Postea autem Anddotus theriaca detur, aut mithridatica, aut alia quædam ad letalia uenena, & uirus eiacularia facta. Nam humorū fortis mutatio per corruptionem facta, uenenoso pharmaco similis est. Fiunt porro aliquādo pustulæ magnæ colore albæ, modicum pruritus inducentes, redundantes in foemoribus, naribus, lateribus, & summa uentris plerumq; parte. Origanum autem ex multa lacta & alba materia habent. Hæc uero cum toto corpore curantur. Neq; enim grauem morbum minantur, si saltem modico uictu quis utatur. Quod si febres in his urentes fiant, commodum fuerit frigidam dare in exacerbationum uigoribus, morbo in uigore existente, nisi uiscera habeat quæ facillè læduntur. Fiunt etiam aliquando pustulæ rotundæ, inæquales, subalbidæ, aut subrubræ, cum elevatione carnis. Aut uaris similes, qui in facie oriri solent, & duræ sunt, ac multum pruritus inducunt, ut uigiliarum causa fiant, dum inde sinens adest cupiditas ad scalpendum. Consequuntur autem hæc plerumq; ad febres intermittentes, & minime grauem indicant morbum. Quapropter cōueniendū

nienti tempore æger in solium calidum intentè insi-
deat. Utendum est & his quæ foris illinuntur, uelut
est oleum myrteum aut lentiscinum cum myrto, aut
manna thuris, aut cîmolîa, torrefacta, aut alumine li-
quido, aut farina fabarum. Aut sesamū tritum cum
modico aceto illinito. Si uero pruritus urgeant, lin-
teis crudis aut per spongiarum ex aqua feruente foueto.
Si autem exulceratæ fuerint, utendum est ceratis ad
ambusta destinatis, præsertim eo quod ex ordeo pa-
ratur. Porro quæ ualde rubræ sunt, pessimè existunt.
His autem deteriores sunt liuidæ, nigræ, & tumidæ,
similes existentes carnibus compunctis, redundant
autè in facie & pectore, & uentre, lateribusq; ac dor-
so. Tales à principio aggredi non oportet, sed differ-
re. Si enim non successerit, in eum qui curationē ag-
gressus aut pollicitus est, culpa recidit. Si uero per-
manerint hæc usq; ad uigorem, & non progredian-
tur in peius, non omnino negligere oportet, etiam si
rarò, attamen aliquando opem ferre, & opportuno
tempore medicamēta adhibere, atq; magna animad-
uersione curare. Quæ enim post mortificationem su-
perficiæ ex alto emergunt, quid aliud significarint,
quàm uitam aliquo modo ab internis efferri?

De tremoribus in febribus. Herodoti. Cap. cxxx.

In malignis febribus fiunt tremores. Conflantur enim
ex uitato uictu, & frigida potu, & potæ, ac multi
uini, & ex immodico rei ueneræ usu, ac similibus.
Abstinendum itaq; est ab his quæ nocuerunt, & ex-
hibenda quæ prodesse possunt. Necesse est autem om-
nino affectam esse in omnibus spinalem medullā.
Quapropter tota spina contegenda est, & affectæ par-
tes, lanis sicyonio aut potius gleucino imbutis: aut
cerato liquidiore ex aliquo taliū parato, aut ex oleo
rutaceo. Rigandum est etiam caput in primis diebus
oleo dulci. Si uero protrahatur morbus, anethino in
accessionum interuallis. Deinde adhibeantur cucur-
bitæ à primo uerticulo usq; ad lumbos, impositis ca-
taplasmatis ipsidem partibus unā cum præcordiis, ex
cruda ordeacea farina oleo & aqua diluta ac cocta.
Integantur autem hæc lanis oleo ueteri aut sicyonio
imbutis. Cibi exhibeantur sorbiles calidi. Prouidē-
dum etiam ut faciliè solubilem faciamus aluum, per-
manendumq; in hoc ductu, donec febres minuantur
aut soluantur. Progressu uero temporis si persevera-
rint tremores, cōmunis auxiliorum modus uelut in
alijs tremoribus adhibeatur. Ita ut alterius in olei ca-
lidi solii locemus, & ante solii insessum & postea,
sicyonio aut antiquo oleo illinamus. Aliquando et-
iam castorium ungento ammiscendum est. Si uero
perseuerarint dolores, etiā in potu exhibeatur casto-
rium. Et ceratū imponatur ex ipso paratum. Et com-
munia ungenta ad resolutiones in usum assumantur.

De conuulsionibus in febribus. Galeni. Cap. cxxxi.

Conuulsionem plerumq; fiunt propter repletionem ner-
uorum partium, quæ ratione etiā fortiter inflama-
tis accidere solent. Insuperq; ob mordacem tenuem
humorem, nervosas partes erodentē. Et propter for-
tem frigiditatem congelatio simile quiddam efficien-
tem. Fit etiam conuulsio ob excellentem siccitatem.
Sequitur autē maximè ad perniciosas phrenitidas,
& tum propter febris uehementiam, tum ob intentos
& agrestiores motus. Et ex his qui sic conuulsi sunt,
neminem seruatum esse ipse uidit, neque qui uidisset
audiuit. Proinde prædictæ tres conuulsionis species

sepe curantur. Incurabilis est autem ea quæ ob ner-
uorum partium sit siccitatem. Aliquando uero in
ore uentris humor tenuis, & acris, ac maximè æru-
ginosus, conuulsionem fortes & syncopam inducen-
tes efficit, ut frigida exudationes fiant. In his aqua
tepidā in potu oblata, digitorum aut pennarum im-
missione, uomitum mouemus. Si uero circa intesti-
na morsus sensus contingat, prisanæ succum per cly-
sterem injicimus. Damus autem cibos ægre corru-
ptiles, uelut est alica cum mali punici granis, & simi-
lia. Si uero nihil tale fiat, conuulsionem per totum cor-
pus fientes similiter ut tetanicos, qui antrosum ac
retrosum conuelluntur, curabimus. In partialibus
uero primum partes contractas blandè contrectabi-
mus, & dolores ipsarum mitigabimus, molliterque
fricabimus oleo sicyonio antiquo calefacto. Si uero
adhuc perseuerent, etiam castorium ammisceatur, &
reliqua relaxantia ungenta adhibeantur. Qui uero ob
siccitatem conuelluntur, propter febris uolentiam,
& præsertim delirio præsentē, his lauandum est ca-
put multa calida dulci ac temperata aqua. Manus
quoque ac pedes multa calida perfundantur. Deinde
oleo dulci calefacto caput irrigetur, & manus ac pe-
des illinantur, & amictulis foueantur, & quies indu-
catur. Quod si sanguinis multitudo adsit, & conuul-
sionem inducat, uena secanda est. Deinde cucurbitæ
affigendæ cum scarificatione. Et si quidem crura fue-
rint contracta, postremo uerticulo cucurbita affiga-
tur. Manibus uero conuulsis, septimo uerticulo, &
ei quod humeri articulo subiectū est cucurbita affi-
gemus. Si uero toto corpore ab affectione immuni,
labium contrahatur aut palpebra, graue hoc accidens
ducendū est. Detractiones autē sanguinis per cucur-
bitas in his fiant à ceruice & primis duobus uerticu-
lis. Caput uero oleo anethino calido irrigetur. Vbi
autem tempus balnei opportunū apparuerit, lauetur,
& in aquæ potu adhuc seruatur. Si uero uinum ex-
hibere opus fuerit, modicū & aquosum præbeatur.

De iucundis ac commodis potionibus in febribus.

Philumeni. Cap. cxxxii.

Duplex robur & admirandum simul auxilium exhi-
bet, id quod etiam naturæ ob iucunditatem gratum
existit. Venter enim ubi quod blandum est suscepit,
& in se complexus est, tener et probè concoquit pro-
uiritibus, maximè si fuerit quantitate moderatū. Ex-
citur enim natura, & actiones sepe ab affectionum
feritate misere afflictas suscitāt, ac morbo repugnat
iuxta duplicem modum. Ipsum quidem malum pa-
lma contrarietatis natura castigans; vires autem ani-
mal gubernantes consolans, & excitans, ac fortifi-
cans, ad superandum morbum. Omnes igitur homines
ut plurimum dulcibus gaudēt potibus, & præsertim
si adstrictionē, & caliditatem, & quasdam eiusdem
generis qualitates habuerint ammixtas. Quale est ui-
num dulce, & uinum mulsum. Verū hos potus non
tutum est in febribus exhibere. At eos quos nunc re-
feremus, etiā si magna animaduersione opus habeāt,
tutius tamen quàm prædictos exhibere possumus.

De potione pharmaci ex capitibus papaueris.

Galeni. Cap. cxxxiii.

Sumatur autem in manus medicamētum ex papaueris
capitibus, quod optimum potu est iucunditatis gra-
tia, & optimum ad calidas ac magnas affectiones cir-
ca uiscera consistentes, & totum corpus apprahēn-
dentes,

dentes. Item febricitantibus, & cholericis in quibus bilis infernè ac supernè erūpit, affectionibus. Et his qui delirij in febribus ac uigilijs affliguntur. Prodest & tussis frequēti ex tenui fluxione factæ, quæ ex capite calidiore in pectus destillat. Preparatur autem hoc modo. Capita papaueris moderatæ magnitudinis decem numero unā cū ipso semine, recentia, neque ualde mollia, neque dura, in aquæ pluuiæ optimæ sextario uno per diem ac noctem macerare oportet. Deinde ad ignem non fumantē coquere, donec flaccida appareant, & expresso liquore, & per panniculum rariorē excolato, mellis optimi despumati dimidiā aquæ mensurā ammisce, & agitando coque ad compagē mellis Attici. Præstat autem per passum Creticum, aut per sapam, mellis loco præparare, ubi fluxus fuerit ualde tenuis. Ammisceo etiam aliquando ad hoc pharmacum glycyrrhizæ radicem, ut unā cum papaueris capitibus coquatur. Si uero hæc non affuerit, succum ipsius siccum inijcio. Si uero contineatur in pulmone humor delapsus educatione indigens, melius est per mel ipsum parare. Datur moderata mensura duorum cochleariorum. Augebis autem & minues copiam, pro corporis magnitudine cui id exhibes, & pro ætate, animique tempore ac regione. In omnibus enim his ad frigiditatem declinantibus, minimum dabis. Ad caliditatem uero, plus. Sed & destillationis quantitatis ac qualitatis respectu, plus aut minus dabis. Certè ex eo quod ex capitibus papaueris Thebaici præparatur, datur ad summum uncia una. Talis est descriptio Galeni huius pharmaci. Ego uero semper in usu eius quod ex passio præparatur perseuero, aliquando mel ammisceus ad eius exhibitionē, aliquando acetū mulsum, aut mel rosaceū, aut omphacomeli, aut aliud quoddā pharmacum hepaticum, aut splenicū, aut stomachicū, & ulres eius ad præsentē semper affectionē transmutans. Exhibeo autem ipsum non solū somno indigentibus, ad uesperā, & ad tussim: Sed etiā infania laborantibus post uenesectionem & febrientibus uehementer, & quibus os uentris intolerabiliter perustum est, et in igne sacro, atque alijs calida affectione thoracis & pulmonis, hepatis item ac intestinorum & mesenterij. Et non solum semel, sed iterum, & non solum in febriū uigore, sed etiam ante uigorē, & ante manifestā concoctionē, in quibus uigiliæ, aut caliditas acris & magna hominē affligunt. Præstat autem ea quæ sexcenties feci in huius pharmaci exhibitione recensere. Etenim in febribus putridis ante morbi uigorē, & in his qui ex hepatis, aut splenis, aut pulmonis affectionibus ægrotant, acetū mulsum simplex exhibitioni eius ammisceo. In uigore uero febriū, omphacomeli, aut mel rosaceū adijcio. In rarioribus quidem corporibus, & qui os uentris debilius & non appetens habent, omphacomeli. his uero qui dulci potu gaudent, & qui medicatum aliquē humorem, aut biliosum in uentre habēt, mel rosaceum. Atque hæc quidem in febrilibus affectionibus. Urinæ autem stillicidium ex urinarū acrimonia abortum, magnificè sedat maxime in balneo, & ante balnei ingressum largè datū. In quibus etiam uictus rationem pleniorē & melioris succi esse iubemus. Sed & in nephriticis ac lūbis calidioribus medēdi uim habet. At uero his qui urinæ profluuiū laborant, & quibus bilis supernè & infernè erumpit, exhibeo frigida ammixta, præsertim in ca-

lidioribus temperamentis. Oportet autem in bilis supernè ac infernè effusione, habitum corroborare forinsecus per adstringentes irrigationes, & similia, atque sic pharmacum exhibere, cum omphacomelite calido temperatum. Si uero thoracem humoribus repletum per tussim euacuare uolueris, acetum mulsum uariè ad eius exhibitionem ammisceito, & calidum exhibeto.

Omphacomelitis preparatio. Cap. cxxxiiii.

Botri uuæ acerbæ accipiantur qui iam maturescere incipiunt. Deinde in domo temperie moderata ad bi-duum uel triduum expandantur, & resiccati exprimantur, & liquor uase uitreo excipiat, & optimi mellis despumati pars una, ad tres succi partes ammisceatur, & ad dies aliquot ad solē exponatur hoc pharmacū, donec feruere desierit ac quiescerit. Deinde in domo superiore seruetur ne putrescat. Hæc autē proportio tibi pro regula sit in optimo melle & optimo uuarum acerbæ succo. Augebis autē & minues quantitatem mellis, pro tenuitate aut crassitie succi. Utendum est ipso in tenuibus ac diuturnis uentris fluxionibus, ob calidas affectiones factis. Et in his quibus os uentris appetentiam nullam habet, propter caliditatem. Et in his qui humectum stomachum habent, post uentris per uomitus euacuationē. Et in prægnantibus mulieribus, & quæ terram aut carbones, aut alia quædam aliena edunt, ubi per piscinam ex aloë purgationem feci, omphacomeli exhibeo. Bonum est & his qui ob excessentem uentris euacuationem, animo linquuntur.

Mellis rosacei preparatio. Cap. cxxxv.

Mel rosaceum tres partes succi rosarum exungulū excolato accipit, & mellis partem unam. Coquitur autem ad solem calidum expositum ad plures dies, eodem modo quo omphacomeli. et postea adseruatur. Si uero turbulentus fuerit aer, aut frigidior, quando mel rosaceum paras, ammixto optimo melle ad rosarum succū, & per rarum panniculum siue linteum excolato, simulque ad lentum ignem coquito, donec quartam aut tertiam succi partem cōsumpseris, atque sic exceptum medicamentū uelut dictū est adseruato. Et ubi calidiore uideris aërē, uelut omphacomeli insolato. Adstringit equidē leniter, & propterea frigefacere potest. Habet uim extensoriā ex melle. Habet & subamarū quiddam & leniter acre, unde oricomodum est calidam quandam inflammationē habēt, propter calidi fluoris influxū, itemque in acris ac biliosis fluxionibus in uentre, ubi uidelicet affecti prius uomuerint. Exhibemus etiam ipsum his qui uentre exuruntur, citra humorum superfluitatē, atque hoc absque uomitu. Item febricitantibus, uigore iam totius morbi instante, & particularis exacerbationis. Sæpe enim in febrilibus morbis etiam unica portio larga sufficit in conuenienti tempore data, ad affectionis solutionem, tum per sudorum eruptionem, tum per uentris subductionem. Inter reliquos enim potus mel rosaceum conuenientissimum est his quibus acres humores per uentrem subire uelis.

Hydrosati preparatio. Cap. cxxxvi.

Rosarum recentium exungulū, & per diem ac noctem præficcatarum lib. i. mellis sextar. i. aquæ pluuiæ ad tertias decoctæ sextar. iiii. commisceito hoc modo. Aquæ pluuiæ sextar. ix. coquito donec tres reliqui fiant, & ad ablatam ab igne aquam feruentem præficcata

siccitas rosas inijce, & uas pluribus operimentis probe coniectum adserua. Sequenti uero die aquam excola, & rosas non expressas abijce, ut ne aspera aqua fiat, & coiecto melle in mortarium, & probe truo, aquam cum ipso iuncto, & fistulis uasis præsertim recubus ac crudioribus excepta, ad paucos dies insolato, & in domo in qua uinum repositum est adseruato. Hoc multo magis quam mel rosaceum frigelacit.

Apomelitis præparatio.

Cap. cxxxvii.

Apomeli sic præparare oportet. Fauos accipe melle plenos, colore quidem albos, uerum mel pellucidum continent, & mel ipsum manibus exprime, & ad aquam fontanam optimam ammisce. Et si quidem crassus fuerit mel, quatuor aquæ partes, ad unam mellis ammiscemus: Si uero liquidissimum fuerit mel, tres aquæ partes ad unam mellis adijcimus. Si uero sicciores tibi uidebuntur faui, ipsos in tenues partes comminutos in mensurata aqua mitte, & manibus sufficienter tere, exprime, excola, & medre, & cognosces quantum mellis addere oporteat. Deinde in ollam nouam mittimus, in qua prius aqua fuerit seruata, propter terream qualitatem, & ad ignem non fumantem coquimus, detrahentes semper inter ebullendum insistentem spumam, aut cerosam partem. Postquam autem nec spuma, neque quicquam sectis superintuerit, & octaua aut septima pars de tota mensura decesserit, ollam ab igne tollimus ac frige fieri sinimus. Et post perfectam perfrigerationem, sequenti die id quod superne fluitat detrahimus, & in uasa fistilia recentia ac crudiora transfundimus, & in uinaria cella adseruamus. Est autem apomeli extensoria ac inuisoria uis præsertim, & biliosa per aluum ducit, & ad urinam ciendam conducit, & febres putridas ad solutionem præparat. Calidis tamen & siccis naturis aduersatur. Et in morbis calidis, & præcordijs inflammatis nocuum est. Et nec uinum ledit, immo etiam augeat. Dandum est autem ante sorbitiones. Nam post ubi datum nocuum est.

Hydromeli & crustummati præparatio.

Cap. cxxxviii.

Hydromelum sic præparatur. Succum malorum lib. vi. mellis lib. x. aquæ ad tertias decoctæ lib. xviii. Alia præparatio. Majorum dulcissimorum & odoratissimorum, ac friabilem carnem habentium, corticem & interna grana detrahito, deinde consula exuccato, & succum per panniculum purum ac densiorem excolato. Sumito autem succi sextar. i. mellis sextar. ii. aquæ pluuiæ in coctura ad tertias redactæ sextar. iiii. Postquam igitur præcoctis aquæ ad tertias, adijce ad ipsam mel, & ubi efferbuerint simul, ab igne ablata quodammodo frige fieri sinito, et sic omni spuma detracta, malorum succum adijcto, & uasis fistilibus exupito, oblinito, & in cella uinaria reposito. Videtur autem eo post dies quadraginta. Quum autem rosas exiguas ad hydromelum ammiscere uolueris, uinum rosatum per diem ac noctem in ipso macerato, deinde decoctum adseruato. Bonum enim colorem inde accipit.

quirit, & non accessit. Eodem uero modo etiam ex crustumminis, & alijs pirorum generibus præparare potes.

Cydonati præparatio.

Cap. cxxxix.

Præparatur etiam ex malis cydonijs magnis, coruæ & internis granis exemptis, deinde consulis & exuccatis, & succo per panniculum excolato. Sumantur autem succi sextar. iiii. Mellis sextar. vii. aquæ pluuiæ ad tertias decoctæ sextar. xii. Primum itaque aquæ sextar. xxxvi. coquimus, & ubi reliqui succi sextar. xii. mel adijcimus, & quum ebullierint, ablata ab igne ollam aliquatenus frige fieri sinimus. Postea detracta superstante spuma, succum cydoniorum adijcimus, & unita excipimus, ac uelut hydromelum adseruamus. Aliquando uero ut ne præparata potio corrumpatur in hyeme propter frigus, mel prius despumamus, & succum excolato ad ipsam inijcimus, & in fistula obliato per totam hyemem seruamus. Postea in uere aquam ad tertias decoctam, uelut dictum est, accipimus, & mel cum succo ipsi ammiscemus, atque sic uinum. Idem facimus etiam in malis, & crustumminis ac alijs piris. Quomodo uero præparauerimus cydonatum & hydromelum, & ante hyemem, & post hyemem insolamus ipsum per dies quadraginta, cauentes ab imbris ac uentis, & sic in uinaria cella reponimus. Melius igitur est præparare id quod cum melle seruatur sub caniculæ æstiu. Potest etiam rosarum exungulum, & per diem unam siccatarum uncia una, ad sextarium mellis despumati adijci, & aqua uelut dictum est sub canis æstiu coqui, & uniri, & sic excolari, ac per dies quadraginta insolari. Conuenit hoc quod ex succo malorum cydoniorum præparatur, morbis qui adstrictione & extersione opus habent, qui internis partibus exulceratis sunt, ore, stomacho, uentre & intestinis. Auxiliatur etiam scabiei in uenis. Et renibus ac uellicæ, in quibus furfuraceæ ac squamosæ & capilliformes uirinarum sunt subsidentiæ.

Aceti mulsi præparatio.

Cap. cxi.

Acetum mulsum componitur ex optimo melle, & pelliculissimo aceto, ita ut sint mellis partes duæ, aceti pars una. Hæc proportio pluribus corporibus conuenit. Variari tamen potest semper pro gustu & temperamenti & grau ratione, ut habeas, quod blandum ac gratum est naturæ. Coquitur ad mellis cocturam, & exhibetur calida temperatum. Potatum extirget uiscosos humores, & crassos attenuat. Quæ propter uiscera omnia ab obestratione liberat, nec par, splenem, uentrem, mesenterium, & renes. Compositum est enim his, siue in febribus, siue circa febres detur. Aquæ uero multæ ammixtione, uehementia uirium ipsius exoluitur. Tussim autem mouere quæ non est, & intestina radere acetum mulsum, Hippocrates & Galenus dixerunt non in corporibus crassis & glutinosis humoribus rebus, sed puris & non redundantibus superfluitatibus. Aut his quæ ex tenui & acris fluxione laborant, & quæ heruosas partes ualde subtili sensu præditas habent. FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

SEXTO SERMONE AETIA

HABENT

De hydrocephali affectione. Cap. i. De febre. Cap. ii. De phrenia. Cap. iii. De catocis & catalepsi.

Cap. iiii. De caro.

Cap. v. De comate.

Cap. vi.

Cap. vii.

De uellicæ.

De uertiginosis.	cap. vii.	De conuulsionibus aut distentionibus.	cap. xxxviii.	Resiccantia ac cicatricem inducentia achoribus.	cap. lxxv.
De infantia.	cap. viii.	De Temo siue distentione & conuulsione.	cap. xxxix.	Smegmata ad achoras, furfures, asperitatem, & scabriciem.	cap. lxxix.
De melancholia.	cap. ix.	De capitis dolore distinctiones.	ca. xl.	De aurium affectionibus.	cap. lxxxi.
Curatio melancholice.	cap. x.	De dolore capitis ex ardore aut caliditate oborto.	cap. xli.	Ad dolores ex frigidityte.	ca. lxxxi.
De infantia lupina aut canina appellata.	cap. xi.	De dolore capitis in febribus.	ca. xlii.	Ad dolores ex aqua medicata.	cap. lxxv.
De incubo.	cap. xii.	Ad capitis dolorem ex ebrietate, & meri potu.	ca. xliii.	Ad dolores ob humorum crassitudinem.	cap. lxxvi.
De morbo comitiali.	cap. xiii.	Perfrigerati capitis medela.	ca. xliiii.	Ad aurium sordes.	cap. lxxvii.
Que arguit morbi comitialis.	ca. xiiii.	De capitis dolore a stomacho.	ca. xlv.	De sonitu aurium.	cap. lxxviii.
Que collabentes comitiales excitant.	cap. xv.	Que ex natura capitis dolorem inducunt.	cap. xli.	Ad auditus difficultatem ac sorditatem.	cap. lxxix.
Auxilia ad comitiales.	cap. xvi.	Ad dolorem capitis ob plagam.	ca. xlvii.	Ad aurium inflammationes.	cap. lxxx.
De his qui ex stomacho primario affecto, comitialis morbi modo conuelluntur.	cap. xvii.	De cephalaea.	cap. xlviii.	Ad aures absq; ulceratione humectas, que uelut exudant, & seorsum humorem excludunt.	cap. lxxxxi.
De his qui ex parte aliqua habent morbi comitialis causam.	cap. xviii.	De hemigrania.	cap. xlix.	Ad ulcera in meatu auris.	ca. lxxxxi.
Curatio senum ac puerorum comitiali morbo correptorum.	cap. xix.	Communis curatio cephalae & hemigraniae.	cap. l.	Ad corruptiones ac fctores aurium.	cap. lxxxiii.
Curatio ualde senum comitialium.	cap. xx.	Epithemata ad capitis dolorem.	cap. li.	Ad superexcrecentes in aurium ulceribus carnes.	cap. lxxxiiii.
Curatio puerorum recens natorum comitialium.	cap. xxi.	Que naribus indita caput purgat.	ca. lxi.	Ad superexcrecentes in aurium ulceribus carnes.	cap. lxxxv.
De fatuitate.	cap. xxii.	Apophlegmatismi pituitum per os a capite detrahentes.	cap. lxi.	Ad uermes in auribus.	cap. lxxxv.
De memoria amissa.	cap. xxiii.	Smegmata & puluilli inspersiles, caput densantes.	cap. lxi.	Ad sanguinis ex auribus eruptiones.	cap. lxxxvi.
De commorsis a cane rabioso, aut his qui aquam timent.	cap. xxiiii.	De alopecia.	cap. lxi.	De calculis aut alijs corpusculis in auriem illapsis.	cap. lxxxvii.
De cerebri inflammatione.	cap. xxv.	De defluio capillorum.	cap. lxi.	Ad affectiones aurium extra meatum.	cap. lxxxviii.
De erysipelate cerebri.	cap. xxvi.	Ad supercilia pilis denudata.	cap. lxi.	De parotidibus.	cap. lxxxix.
De syderatione.	cap. xxvii.	Tingentia ac nigrescentia pilos.	cap. lxi.	De narium affectionibus.	cap. xc.
De resolutione.	cap. xxviii.	Vt fului pilii fiant.	cap. lxi.	Ozenarum curatio.	cap. xci.
De supercilijs aut palpebra resolutione.	cap. xxix.	Vt albi pilii fiant.	cap. lxi.	Polyporum curatio.	cap. xcii.
De conuulsione canina.	cap. xxx.	Vt crispi pilii fiant.	cap. lxi.	Ad ulcera in naribus.	cap. xciii.
Linguae resolute curatio.	cap. xxxi.	De his que pilos corrumpunt.	cap. lxi.	Ad sanguinis ex naribus eruptionem.	cap. xciiii.
De instrumenti uocalis resolutione.	cap. xxxii.	Que pilos extirpant.	cap. lxi.	Quomodo sanguis ex naribus eliciatur.	cap. xc.
Deglutitionis resolute curatio.	cap. xxxiii.	Psilothra pilorum.	cap. lxi.	De narium obturatione, & odoratus oblesione.	cap. xcvi.
Vesice resolute curatio.	ca. xxxiiii.	Que pilos attenuant.	cap. lxi.	De sternutatorijs.	cap. xcvi.
Colis resoluti curatio.	cap. xxxv.	De furfuribus siue porriginis.	ca. lxi.	Ad sedandas redundantes sternutationes.	cap. xcvi.
Intestini recti resoluti curatio.	cap. xxxvi.	De morbo pediculari.	cap. lxi.		
Cruris aut alterius cuiusdam membri resoluti curatio.	cap. xxxvii.	De achoribus & reliquis pustulis capitis.	cap. lxi.		
		Ad capitis scabriciem.	cap. lxi.		
		Ad parua & densa ac rubicunda capitis ulcuscula.	cap. lxi.		

AETII MEDICI GRAE.

CI CONTRACTAE MEDICINAE TETRABIBLI SECVNDAE


SERMO SECVNDVS, ET EX

ORDINE SECVTVS.

De cerebri, capitis, & nervorum affectionibus, aurium item ac narium.

DE HYDROCEPHALA AQVOSA.

capitis affectione, Leonide.



HYDROCEPHALA affectio appellata est ab aquoso humore in capite collecto. Plerumq; igitur aquosus humor colligitur. Aliquando autem seculatus aut cruentus. Saepe uero lentus consistit, aut ex obscura, aut ex manifesta causa.

manifesta causa. Ex obscura quidem, localibus uasis suis sponte rarefacta, & aquosa in ipso essentia, quae non sanguine permixta est, depulsa & in unum locum congregata. Atque ex huiusmodi causa aquosus humor colligitur. At uero ex manifesta causa fit, uasis localibus ex plaga aut contusione ruptis, & sanguine in ipsis praeteressuso, & deinde rarefacto, ac in essentia seculentam, aut cruentam dissolutum. Frequenter uero sub hac affectione ex tali causa in infantibus, qui obstitit

obstetrix functionis suę in experta, & durior manu rem tractans, corpora aliqua in capite infantis attriuerit. Colligitur autē hic humor in hydrocephalis, aut inter cutem et membranam caluam ambientem, siue musculus temporum. Aut sub membrana caluam ambiente, inter ipsam & os capitis. Aut sub calua, inter os & cerebri membranam. Maiores autem nostri dicunt etiam inter cerebri membranā & ipsum cerebrū colligi, id quod perniciosum existit. Si quidem igitur lētus humor fuerit collectus sub cute extra membranam caluam ambientem, aut inter hanc membranā et os capitis, tumor adest iuxta capitis partem ubi collectio facta est, concolor, circa dolorem, mollis ad tactum, cedens ac transiens ad digitorum contactum. Et si quidē sua sponte fiat ab initio, doloris exors. & concolor est locus. Si uero ex plaga, aut contusione, primum quidem rubicundus & dolorosus sit tumor, postea uero lentescēte humore & in tenuem essentiam transeūte, tumor concolor circa dolorem euadit. At ubi collectio sub calua facta est, inter os & membranā cerebri, ab initio dum modicus est humor, caput grauatur, et uerdigines assidue fiunt, & sensus heberantur, uisus inquam, auditus & reliqui. Quum autem redundauerit humor, futurę capitis ob multitudinem disparantur, & propterea caput magnum fit, & locus collectionis apparet. Humor enim ad digitum cedit. In communi igitur in collectione sub cute, & in ea quę inter membranam caluam ambientem & ipsum caluę os sit, hisdē aggressiōibus utimur, ad humoris excretionem. Et si quidem paruus est tumor, apex ipsius unica sectione diuiditur: Si uero maior, duę aut tres sectiones fiunt, aut plures iuxta magnitudinis proportionem, in locis ad effluxionem commodis. Non oportet autem uelut in abscessibus, post chirurgiam limniscos trāsmittere, sed ipsas solas sectiones linamentis disparare. Nam post humoris excretionem, corpora in his facile agglutinantur. Quapropter linamentorum usu in ipsis contenti sumus. Post indita linamenta, si infans fuerit cui chirurgia adhibetur, deligationē propter grauitatem recusamus, uerum lana ouo imbuta imponatur, & caput pileo contegatur. In robustioribus autem linamenta forinsecus custodiantur, & deligatio fiat. Poterit autem a tertia die conglutinatorio adiuuari, per emplastrum quoddam glutinatorium. Quod si sub temporū musculo collectio fiat, expectare oportet donec humor reducet, ut ne musculus incidatur. Et postea a lateribus musculi sectionem facere. Et si quidē humor in profundo sub musculo contineatur, duę sectiones fiant utrinq; a lateribus musculi ipsius. Deinde corpuscula securē per scapellī manubrium exorientur. Post totius autem humoris excretionem, curatio fiat uelut dictum est. At si sub calua collectio facta fuerit, itidem expectare oportet, & quum redundauerit humor, & futurę fuerint disparatę, fastigiatum locū disseccare, & consequenter facere uelut in capitis futuris disparatis.

De phrenitide. Ex Posidonio. Cap. II.

Phrenitis inflammatio est membranarum cerebri cum febre acuta, delirium & mentis percussione inducens. Raro autem ab initio phrenitis cum febre irruit, plurimis uero a quarta aut quinta aut sexta incipit, & adhuc serius, cum ipso ferme periculo incidens, ut iam aliqui septima, aliqui nona delirare in-

ceperint. Differentię autem phrenitidis plures sunt, sed tres principalissimę. Aut enim imaginatiua facultas solum læsa est, seruatur autem ipsis ratiocinatiua & memoria. Aut ratiocinatiua solum læsa est, seruatur autem imaginatiua & memoria. Aut etiam imaginatiua læsa est, seruatur autem memoria. At uero ubi memoria deperdita est in febrilibus morbis, simul perit omnino et ratio, & imaginatio. Proinde anteriore cerebri parte læsa, imaginatio solum læditur: Medio uero cerebri uentriculo læso, ratio peruerditur. Posteriore autem circa occipitium parte læsa, perit memoria, & cum ipsa omnino etiam reliquę duę facultates. Quibus igitur imaginatio læsa est, hi iudicant quidem recte, imaginantur autem peruerse. Quibus uero ratio solum læsa est, imaginantur quidem recte, iudicant autem nō recte. Quibus autem memoria læsa est, nullius antea factorum meminerunt, imō neque omnino recte imaginantur, neque iudicant. Conuenit itaque parti magis læsę auxilia adhibere, & tamen neq; alias negligere. De memoria itaque perditā priuatim paulo post dicemus. Nunc uero quomodo phreniticos curare oportet dicendum est. Aeger igitur decumbat hyeme quidem in domo tepida, æstate uero, frigida. Quies autem imperanda est & ipsi ægroto, & omnibus in domo, & uicinis. Et qui quidem ad lucem efferuntur, in tenebricosa domo decumbant. Qui uero ad lucis splendorem resipiscunt, in lucida domo degant. Si quidem igitur phrenitis cū febre ab initio in prima die, aut secunda, usq; ad quartam irruat, & non ex transmutatione alterius morbi succedat, & urinae fuerint subcruentę, & facies rubicunda, & ætas uigoris, & bona corporis habitudo adest, & omnia signa simul indicant sanguinis multitudinem, uena cubiti secetur, ea quę media est, & pro uiribus detrahatur, & nō usq; ad animi deliquium. Minus autem quam oportet auferatur, ob plurimam quę in ipsis ex uehementi motu contingit disculsionem ac exhalationem, & propter lassitudinem. Sed & sectio moderata fiat, ut ne æger clanculum brachij uinculum exoluat. Cōsequitur enim periculum sanguinis eruptionis. Quod si ob aliquam causam, uenę sectionis auxilium relinquatur per clysteres uentrem euacuare oportet, cum fursurum aut psisanę succo, modicaq; nitri spuma ac pauco melle. Caput autem rosaceo magis tepido irrigetur. Nam cerebri membrana inflammata, frigiditas rosacei non est tuta. Imō neq; caliditas. Frigidum enim dēsat meatus, & superfluitates in capite discuti non permittit. Quod uero ualde calidum est, feruorem duplicat. Quare æstate exacte tepidum rosaceum adhibendum est, cum modico aceto: hyeme uero moderatē calidum. Commodum est & chamæmelinum ex æquo ipsi ammixtum, si ambiens frigidior fuerit. Si uero uehementius fuerit delirium, post factam euacuationem, uelut dictum est, per uenę sectionem aut clysteres, capitibus papaueris in oleo coctis caput rigato, & faciem assidue prolut præcipito ex aqua, in qua papaueris capita sunt cocta. Frontē uero somnifero aliquo pastillo illine. Olfaciant etiam assidue somnifica, in præcedētī sermone conscripta ad uigilias. Et sub cervical capita papaueris subdantur, aut mandragorę mala. At uero auctis malis, dandum est etiam somniferū ex capitibus papaueris pharmacum, cochlearij mensura

plus aut minus, pro uiribus. Dandum est autem id quod ex melle præparatur, non quod ex passo, propter uinositatem. Detur autem hoc pharmacum in exacerbationis declinatione. Si enim datum fuerit in uigore, trahit quidem ad somnum, febris autem excitatur, & eger ad ambo partitus, grauius fert quod contingit. Dato uero pharmaco quiescere iubet. Præstat autem mel rosaceum ad pharmacum ex capitibus papaueris adijcere, contemperat enim acrimoniam, & aluum subducit. Quapropter etiam aquæ quæ bibitur, mel rosaceum irrorare bonum est, in exacerbationis uigore. Cæterum assiduus usus stupefacientium pharmacorum, potionum, irrigationum ac illitionum uitare oportet. Facile enim in his qui immodice perfrigerantur, transitus fit à phrenitide in lethargum, quando etiam perniciosus fit morbus. Quare ubi delirium moram traxerit, serpyllum aut spondylium in oleo coquantur: Crassos enim uapores transpirare faciunt. Quum autem manserit facies etiam post uenæ sectionem in contracta & rubicunda, cucurbitas occipitio affige, & moderatis uulnusculis impactis cutem scarifica, & ad libræ mensuram sanguinem detrahe. In cibo porro datus est pulsanz aut alicæ succus, aut micæ panis sæpe lotæ cum rosaceo melle. Mitigata uero febris, dentur oua sorbilia, & lactucæ serussactæ, quæcunque moderate humectant ac friges faciunt, una præ nutriunt, propter uirium debilitatem.

De lethargo. Archigenis & Posidonij. Cap. lxi.
Lethargi principio duo sunt. Quibusdam enim septum transversum & uiscera primario affecta, cerebrum ad consensum ducunt. In quibusdam uero cerebrum affectionem auspicatur. Et quibusdam statim ab initio affectio incidit. Quibusdam autem ex mutatione alliculus acuti morbi. Nam à phrenitide maxime in his qui per stupefacientia pharmaca perfrigerati sunt, transitio ad lethargum fit. Quin & à continente febre mutatio in lethargum fit sæpissime, itemque ex alijs plurimis morbis, præsertim in quibus plures euacuationes subsequuntur sunt. Aliquando etiam in diuturnis febribus, per circuitum contingit ægrotos somno immergi, uelut in quotidianis fit & semitertianis, quandoque etiam quartanis. Et alij quidem cum conuulsione & contractione neruorum in soporem deferuntur. Alij pedetentim facta accessione. Et alij quidem unam immersionem sustinent, in quo extreme periclitantur: Alij in circuitibus in somnum deferuntur, & rursus reuocantur. Proinde considerare oportet speciem delationis in sopore. Qui enim per circuitum somno immerguntur, manifestior pulsum habent. Qui uero semper affecti sunt, minutissimum & egre mobilem. Hi uero etiam dum excitantur, aliena loquuntur, & obliuiosi sunt. Qui uero per circuitum afficiuntur, nihil tale patiuntur. Et alij quidem cum grauitate & elata respiratione in somnum deferuntur, ut & sterant, & singultus ac suspiria edant dolorem indicantia, quæ reuocati neque eloqui possunt, propter rationis læsionem. Alij uero quietissime dormire uidentur. Et alij quidem perfrigerantur artus, & rugosi ac pallidi sunt, et corporis miscella fere congelatur. Alij uero diffunditur, & uelut rorem effundit circa exacerbationum declinationes. Qui igitur hac affectione occupati sunt, his hæc adsunt. Præcordia reuelluntur, uenter contrahitur, & uolenter ab assidentibus excitati, rursus in somnum deferuntur, & obliuio ipsis.

Nam dum sæpe ad mictionem urgetur, porrecta ipsis matula, se in manibus ipsam tenere obliuiscuntur. Aucto uero malo, totum corpus segne redditur ac uelut mortificatur. Supini autem decumbentes, ad pedes defluunt, distensis manibus ac cruribus. Nasus quibusdam destillat. Os ipsis hiat, & fortior eius hiatus succedit. Inferna mandibula uelut resoluta ac laxata uidetur. Atque hæc quidem adsunt lethargicæ affectioni. At uero curationem ipsorum aggredientes in domo lucida ad splendorem ipsos locamus. Si autem domus tepida. Pedes & manus confricentur. Odoramenta excitatoria exhibeantur, uelut est castorium, funiculus lucernarius extinctus, pix liquida, bitumen, galbanum. Suffusa quoque lethargicos excitat, lapis gagates, bitumen, castorium, peucedanum, sulphur, galbanum, sagapenum, cornu ceruinum, hirci sordes, abrotonum, silphium. Sternutatoria quoque naribus admoueantur. Si uero multitudo humorum in corpore est, si quidem sanguis fuerit redundans, uenasectur secunda die, & pro uiribus euacuetur. Si uero pituitosa & lentior materia fuerit, uelut in lethargicis reducere solet, attenuantia exhibere oportet, & quæ crassiciem secare possunt, ita ut his quibus neruosa pars læsa non est, acetum nullum exhibeamus: quibus uero læsa est, decoctum apij, feniculi, adianthi, & similium. Sed & alius efficaciore infuso eluatur, & glandes subdantur ex ruta, nitro, cumino, & melle cocto. Caput autem rigetur in principio quidem serpyllo in aceto & oleo cocto. Verum in interitis affectionibus peucedani radicem pro serpyllo in aceto coquito, & cum oleo capiti adhibeto. Bonum est ipsis & oleum ininum. Tremoribus autem & contractionibus succedentibus, castorium cum modico aceto terimus, & oleo addito caput irrigamus. Si uero præcordia sint inflamata, in principio cataplasmata adhibeantur, ex polline aut pane, & malo cotoneo cocto, aut pampinis uitis. In progressu uero, semel lini ad pollinem aut panem ammisceatur, & absinthium, & althææ folia cocta. Postea uero ex ordeï farina, & feno Græco, & althææ radice cataplasmata fiant. Omnibus autem absinthium ammisceatur. Sit autem latum linteum, ut utrinque latera, & pectus sub manibus amplecti possit. Post cataplasma uero partes nudas sinere non oportet, sed ceratopardino aut cyprino contegere. Retro autem dorso ceratum ex sicyonio factum imponere, quod terebinthinum & baccas lauri tritas infartas habet. Et si quidem inflatio adsit, ammisceantur cataplasmatica ea quæ flatibus discutunt, uelut sunt cuminum, baccæ lauri, ruta, & similia. Si uero quid induratum fuerit, & libanois addatur, & farina fabarum. At uero in diuturnis iam lethargicis uiribus presentibus danda est hiera ex colocynthide. Et sternutatoria adhibenda, ex uerratro albo, struthio, pipere, castorio. Et naribus infundendum elaterium cum lacte, aut cyclamini succus, aut ipsa radix sicca trita insufflanda, & ori ac palato sinapi cum melle illinendum. Deinde occipitio cucurbitæ affigendæ cum multra flamma, item circa primum & secundum uerticulum, sanguis quoque detrahendus ex posteriore capitis parte. Postea derasis capillis capitis sinapisimus adhibendus ex caricis cum sinapi aceto macerato. In tremantibus uero etiam castorium sæpe potandum detur. Affectione autem declinante æger ad balneum ducatur, & smegmate mordaciore utatur. Velut est fex usta, sinapi, pyrethrum, piper,

piper, bacce lauri, calx ulua, nigrum uero duplum adijciatur. Cibi porro sint tenues & incisori ac resicantes. Et cum condimentis parati, apij, anisi, cumini, piperis & bacce lauri. Et ex uolucris conueniunt, gallina domestica, columba, auicula montana, & perdix. Ex piscibus, petrosi. Ex oleribus, porri, asparagi, petroselinum, chamaedaphne. Vinum aquosum, tenue, album subadstringens. Sed & reliqua curatio iuxta eundem modum fiat.

De catocchia & catalepsi.

Cap. III.

Mediam inter phrenitidem & lethargum affectionem reperies, quae species est delirii siue amentiae. Medici autem catocchia & catalepsi, hoc est mentis occupationem & apprehensionem uocare solent, ex humore atrae bilis magis contingens. Periculosior est autem haec affectio quam lethargus. Verum in febribus lethargo similibus consistit, & aliquando dormire, aliquando uero palpebras apertas habent, aut nictant, aut intente uident, & uelut fixos oculos ac palpebras habet, & penitus immobiles, adeo ut neque si quis manum oculis ipsorum obtendat, eos claudant. Voce insuper ac sensu priuantur, neque audientes neque respondentes. Admouent autem manus suas aliquando ad caput & oculos ac nares, uelut qui uellicentur, atque hoc non sentiunt. Pulsus sunt parui, languidi, ferme deficientes. Spiritus aliquando densus, aliquando rarus. Et per interualla quaedam magnum spiritum ducunt. Alui & urinae supprimuntur, non praesiccitate: Habent enim multum humorem, sed propter sensum stupiditatem, grauius his subaridae in angulis oculorum fixae sunt. Et aliquando uicinos parietes attingunt. Et in summa, neque phrenitidis omnino similes sunt, neque lethargici. Quandoque etiam ob sanguinis multitudinem confertim caput occupantis & ipsum superimplens fit haec affectio: quemadmodum uidimus in adolescentem quodam multo sanguine referto. Qui quum tri-duum exegisset, neque claudens palpebras, neque ad uerba uociferationes transmutans oculos, neque respondens, quarta die sanguinis eruptione larga per nares facta, ab omnibus molestiis confertim liberatus est. Quare si puer multo sanguine refertus appareat, extra dilatori uenam supernam in cubito secam, & pro utribus detrahe. In alijs autem primu uentre per clysterem eluere oportet, simpliciore infuso immisso, uelut est fursurum succus cum spuma nitri & melle. Postea uero etiam polypodij radix cum fursuribus coquatur. Caput autem primu irrigetur oleo dulci tepido. Deinde si caput calidius apparuerit, caput papaueris in oleo coquatur. Si uero frigidius, serpillu. Et si quidem facile solubilis fiat aluius ex praedictis infusis, in ipsis perseverandum est. Si uero sistatur, ueratri nigri radix cum fursuribus coquatur. Potus ipsis conuenit apomelini, aut aqua mulsa pro tempore diutius cocta. Quod si urinae crassae fuerint, etiam anethi & apij decoctum detur. Cibi sint, ptisanarum succus & similia. *Aqua his aduersatur, auget enim inflammationem, & fluctuationes facit, & splenes excitat, & si nimis non sedat. Totum autem corpus oleo anethino inungatur, maxime hyeme. In quibus uero etiam tremor succedit, castorei drachma, cum aqua mulsa ori infundatur.*

De caro.

Cap. IV.

Quum frigidi & humidum humores cerebrum occupant, caros appellata Graecis affectio succedit, hoc est, capitis percussio, cum debili febre. Consequitur sensum

stupor, & totius corporis immobilitas, cum principalem actionum laesionem. Oculi uero ipsorum semper sunt clausi. Distincti autem caros a lethargo, quod lethargici interrogati respondeant, & non omnino sine uoce decumbant. Verum qui in caron collapsi sunt, somno profundissimo detinentur, ut dum pun-guntur sentiant quidem, non tamen loquantur, neque oculos aperiant. Curandi uero sunt & hi similiter uelut lethargici, ita ut magis incisoriu & attenuatorium curationis ductu faciamus. Stomachi quoque cataplasmata, una cum hoc quod calefaciant, etiam corroborandi uim habere oportet.

De comate.

Posidonij.

Cap. VI.

Soli uapores calidi & humidum, & subiectis partibus ad caput in febribus delati, & ipsum implentes, affectionem faciunt, quam Medici coma nominant. Cognoscitur si somnus amplior naturali fiat, & in somnis peregrina loquuntur, & corpore inaequaliter habent, & inferam mandibulam inter dormiendum laxatam. Et saepe excitati confertim rursus in somnum deferuntur, & caput humidius habet. Curantur ex irrigatione rosae, aut chamaemelini cum aceto. Sit autem acetum acerrimum. Si uero frigidius appareat caput, anethinum cum oleo dulci ex aequo permixtum ac calefactum adhibe. Et in summa, in quantum intentum est frigiditas, in tantum calefactoria augeantur, ut etiam pulgium aliquando & ruta in oleo coquamus. Glandes quoque sedi subdantur, quae multum irritare possunt. Nutriantur autem ptisanarum succo, & apomelini.

De uertiginosis.

Archigenis & Posidonij.

Cap. VII.

Vaporibus calidis & acerbis ad caput delatis, & animalium in cerebro spiritum euercentibus, primu hemetudines quaedam in oculis fiunt. Postea etiam aurium sonitus assiduus, & auditus grauitates, atque haec maxime contingunt circa ciborum coctionem, & ubi ex somno exurgunt, augescunt affectione, uertigines & obtebrationes oboruntur, ut putent se uolueri omnia circueverti. Contingit hoc etiam ubi confertim ex fellis surrexerint, cruditate quadam pregressa. Perseuerate uero diutius malo, ex facili occasione uertigine afficiuntur, ut etiam concidant aliquando, maxime ubi in circulum circueuertantur. Nam quod alijs ob multas circulationes contingit, hoc illis ex una. Sed & si alium quendam circueverti uiderint, uertigine afficiuntur, aut si trochum, aut tale quid circumueverti conspiciant, idem perpetuntur. Spiritus enim uisuius ad trochum qui circumuolutatur allabens mouetur, & simul cum illo circumfertur. Atque sic inaequalem & turbulentum ac inordinatum humorem, ac spiritus motum efficit. Facile uero corripitur hac affectione quibus consuetae excretionis sunt suppressae. Sed & cruditates & ardores assidui, & ebrietates, affectionem hanc efficiunt. Consequitur & alui suppressio, & propterea multa inflatio, & uisnarum tenuium ac paucarum excretio, materia ad caput accurrente. Gradiles autem in totum ferme fiunt, & pigri ad omnem aggressionem. Si quidem igitur ea quae oculis obuolantur sanguinolentiora se uidere putant, ad insaniam magis apti sunt. Qui uero purpurea uident, ad morbum comitalem. Si igitur uires robustae fuerint, & nihil aliud aduersetur, uena secanda est, siue principium affectionis fuerit, siue tempus iam progressum fecerit. In uena autem sectione uilandum est sic acuatim euacuemus, eo quod ex

n 3 qualibet

qualibet occasione concidat. Quare pluribus detractionibus ex quibusdam intervallis uteres congruam mensuram explebimus. Irrigetur autem caput tempore sectionis uenae aceto & rosacea, polygona aut hederæ succo ammixto. Et lana convoluta rosaceo aut oxanthino madefacta eodem tempore uentri imponatur. Si uero quid sanguinis detractione impediat, uelut gracilitas, aut aliud quid ex saepe relatis, subducatur alius, primum per clysterem ex furfurū succo, spuma niri et melle. Postea uero picra ex aloë compositio assidue detur. Si uero accidentia perseuerarint, etiam uehementioribus purgatorijs utendum est, ita ut ad redundantem humorem pharmaca adaptes. Ex efficacioribus autem purgatorijs componantur his quæ fœniculum in aceto mulso coctum habent. Et quod ex palmulis, ruta, & scammonia præparatur, quorum compositiones relatæ sunt in purgatoriorum Sermone. Sed & pituita à capite per os detrahendibus, & gargarismis utendum est, ex origano, pulegio, & aceto mulso. Postea uero quæ anagallidis succus naribus infundatur, aut cyclamini, aut radicis betæ, aut elaterij cum lacte. Sed et nitrum cum nigella tritum, & oleo ueteri ammixtū, generosam per nares purgationem facit. Post hæc autem ad balneum ducantur. Tale uero frictoriū caput corroborans ipsis cōuenit. Lapidis asij unc. i. spumæ niri albae unc. i. iridis unc. i. floris iunci odorati sextans. Ex hoc quod satis est accipe, & simplici insperge, modicam aquam calidam irrorans. Deinde ubi lauisti, & caput calida non madefecisti, sed solū abluisti, egredi- sus de solio frigida ter aut sæpius madefactio. His uero qui ualde calidum caput habent, etiam rosaceum cum aceto sæpe adhibeas, & ipsum ex salientibus aquæ in balneo frigefacias. Et si quidem ex his cesset affectio, cessandum est a medicationis molestia. Si uero perseuerarit, arteriæ in capite iuxta tempora supra aures incidantur, uentre prius euacuato, aut per hieram, aut per clysterem. Postea uero constrictorijs fortioribus utendum est, quæ ad insanos referuntur. Cibi sint boni succi, facile concoctiles, flatus exortes, omnino stomacho commodi, uentri commodi, urinam cientes. Vinum modicum sit, album & tenuissimum, & non ualde uetus. Cōueniunt his balnea naturalia aluminosa. Maxima uero & prima ac ultima in his præseruatio ac curatio est ut suppressæ excretiones commoueantur, & officij sui commoneantur, maxime in mulieribus.

De insania. Archigenij & Posidonij. Cap. VIII.
Insania fit citra febrem, multo sanguine nō purificato ad cerebrum confluente, qui aliquando purus est, & multitudinem solum affligit, uelut in ebrijs. Aliquando uero flaua bile ammixta. Precedit insaniæ capitis debilitas, uelut in podagra debilitas pedis semper adest. Tunc autem dolent, quum materia locis inhiærit. Si itaq; ob solum sanguinem insania fiat, hæc consequuntur. Ritus immodicus ipsis commouetur uelut denudus sæpe ob oculos imagunculas quasdam risu dignas, & hilaris est ipsius facies, & assidue caput. Aliquando enim ex contingentibus euaporationibus sonitus circa aures adfuit, ut putent se cibicinas quosdam audire. Seruatur in ipsis memoria, uelut ex capitis lenis quas familiares habent coniectare licet. Lesa est autem imaginatio & ratio. Si uero flaua bilis ad sanguinem fuerit ammixta, & mordace ipsum

effecerit, uelut ex ipsa stimuletur ac pūgatur cerebrum & membrana eius, iracundi & temerarij & perculsores ac iniuriosi fiunt. In quantum enim bilis sanguini mixta est, in tantum mutatur in uicium, & auge- tristitiam ac iram. Si uero amplius fuerit bilis superaffusa & crassifaceta, & ipsi corpori cerebri ac membrarum instar uisci agglutinata, pungatq; ac diuellat, seriosa deliria efficit. Quidam enim tam propriam carnem gustarunt, & domesticos uelut insidiatores tractarunt, occiderunt, percussit, & uulnerarunt. Cōtingit autem eundem hominem aliquando risu immodico teneri, aliquando ira & indignatione. Nā in fame ac inedia tolerata, & ex acrioribus ac salioribus alimentis, & in pluribus moribus ac turbationibus, sanguis seipso acrior efficitur. In cūctariis uero si quis moruor. Sæpe autē etiā nullo auxilio adiuturo, per modicum cibum & comoda alimentia, progressu uetporis id quod lædit consumitur, & cerebrum a saeperefluentibus intactum manet, & puri mentis emotione nis intervallum ac defectus & uicissitudo consequitur. Quibusdā per circuitum quædam irruunt affectio. Alijs semel in anno. Alijs bis, aut sæpius, coacturatio uidelicet paulatim eo quod molliū est. Corripiuntur hac affectione pauci ante uigore ætatis. Plurimi in ipso uigore, & potissimi. Viri magis quam mulieres. Et ex illis magis qui animalibus affectibus diuexantur, uelut sunt irrisores, risu mulso & intermepesuo uidentes, intrastabiles, iracundi, curiosi, auaripotes, item & assidua cruditate laborantes. Et quibus consuetæ excretiones supprede sunt. Et propterea etiam mulieres aliquando inaniunt, quibus menses suppressi sunt. Infinitæ uero sunt insanix species, quas exponere superfluum est. In delapsuris igitur in hac affectionem, prædictorum propterea quædam præcedunt, uelut ritus præter rationem non alienus id facere, & facili occasione irascuntur, & aurium sonitus adest, & splendores oculis obuersantur. Et uigiliae adfunt intentæ, & curæ per uices representes ac peregrinæ, grauitas item & uibratio capitis. In progressu uero temporis omnia hæc intenduntur, & appetentie ipsis puriores fiunt, & ad uenerem prompti sunt. Et ideo assidua seminis in somno effusiones ipsis fiunt, & oculi cillantur, simulq; intenti ac fixi consistunt. Atq; hæc consequuntur usq; ad perfectam mentis emotionem. Oportet igitur doctum medicum ægri curam gerentem, his apparentibus, aut quibusdam ex ipsis, tacere quæ oportet diuina tales notæ affectio præmiserit, aut etiam iam insuperit, ut scilicet tenorem exhibere conuenit, sobrietatem, liquidum, non percellentem, uentri commodum, & qui ne uisitationem sanguinem generare possit. A uino abstinendum est penitus. Vbi uero per triiduum hominem eo uisus curasit, aliquam cubi ueniam facio, præcipue quicquid supernam. Si uero non appareat, in diuina. Vbi hæc non appareat, uenas circa colos perquiri uo, maxime in mulieribus, eo enim momento etiam menses impellantur. Quod si neque hæc appareant, ad eas quæ in summis manibus ac pedibus sunt, transcendendum est, & uidentur enim est ut prius per uenas sectione generosa euacuatio fiat, atq; sic affectu partium curatio sequatur. In uenæ autē sectione pro uiribus euacuationem facere oportet. Exincto enim seruore, euacuatio quidē consideranda hñt. Simul autem & locus alius auxilijs datur. Quandoque uero aliqui in prima

prima detractioe generose ferunt euacuationem. In
repetitis autē detractiombus animi deliquia incedunt,
cōuenit hos in prima detractiōe euacuare quantum
opus est. Sic enim multū de flauosa & uaporosa su-
perfluitate cōseruatur. Itaq; pulsus assidue tangere
oportet, dū sanguis fluit. Et si cōsiderint, reseruare ad
reprehendā detractiōem. Sæpe enim recuperatis uiri-
bus postera die detractiōem repetimus. Aliquando
etiā tertiam sectionem seruantes apposito sale. Caput
uero irrigare oportet rosaceo cū aceto, aut polygoni
succe, aut oleo oenanthino, aut melino. Lana autē for-
dida oleo imbuta sincipiti imponatur, & frequētius
renouetur. Post euacuationē omni modo procuran-
dus est somnus. Sanguine enim euacuato, si successer-
int uigilię, acriorēs & feriores ipsos faciūt. Quapro-
pter cōfidentes pharmaceuti ex papaueris capitibus da-
bimus, quod somnū inducit, cū pulsanā aut alicuius
succe, aut cū aqua. Lucundam enim fuerit, & postea so-
mnus succedet. Pleriq; enim ipsos omnia somnifica
continent. Quapropter etiam si prima die eo accepto
dormierint, intermissa die una, rursus dādum est de
eo cochleariū unū. Solet enim uel solū post uenā sec-
tionē, perfecte liberare ab affectiōe, unā cū conue-
niente diæta. Cauendū tamē est ne cōsequēter ipsum
exhibeamus. Stupefat enim sensus. Studendū etiā
est ut uentrem facile solubile faciamus, tūper cibos,
tum per clysteres. His autē factis, a localibus auxilijs
incipere oportet hoc modo. Sanguinē uenā in fron-
te eleuata media detrudere cōuenit, ita ut per phlebo-
somum instrumentū ipsam diuidamus nō facta im-
pulsione, uelut quidā facere solent, propter maximas
inflammationes mēbranę caluā ambientis, quę sæ-
pe sauciata ipsa succedere solent. Dextrahenda est autē
sanguinis libra ferme una. Post hanc euacuationē, in
his qui sanguinē biliosorem, intermissis quinque die-
bus, detur picea ex aloē, cochlearij magni maculura
cum aqua multa. Deinde etiā per narces caput pur-
getur, radicem betę succo infuso, aut elaterio, aut
stramonio, sutorio cū lacte. Sternutatorium quoq; ad-
hibeatur ex ueratro albo et herba lanaria. Sed & per
os picea detrabatur, per mastichem & staphidē as-
gruam. Itā per gargariationē aceti mulsi, in quo co-
ctum est pulegiū & hyssopū. Subducatur etiā aliud
purgatorium ex centaurea, & ex geniāna. Sed & ipsa
per se ipsam radix geniāna cōmoda est potius detrachun-
q; unius pondere cū aqua multa. Dabit & aristolochia
eodē modo. Prodest autē maxime ipsa cōstocula ma-
gis syluestris radix & semē, ex aqua quouidē potā,
et radicis bryonię drachma una. Postea ueroflumi-
guilugę totū caput dēuicē affligantur, & præser-
tim sincipiti. Ac in mulieribus studendum est ut men-
ses moueamus. Deinde uiribus reparatis per dies sex
pecij Galeni hieraro dato, quę maxime ob stochas-
dis copiam euacuat. Dato autē pondere drachmę tri, ex aqua
multa. Deinde rursus naris uicibus adhibeatur. Dexte-
rante uero affectiōe nāl bāne ducantur. Frictoriū
autem, omnimodum ipsi in balneo, hoc est, in dā il-
lymo, tepida alij spangis, churis, spumæ uiri albe,
pulis, buccinorum uiscorum, flois iuncū duratis,
apricis, rularum, succum singulorū uis. Sumo-
disto, & cribrato, ac uisum in prima haloridē, in
laxgens sincipiti quantum satis est, & aquam uis-
dam uirorā, ita ut salis longam morā in domo tra-
bat quā uires pharmaci, usque in profundū dūctis

buantur. Deinde capite leniter detenso & abluto, ubi
loquens est ita ut caput nō madefecerit calida, ex folio
exeat, & frigida iterum atq; iterum irriget. Si uero
ualde calidū caput habuerit, etiā sæpius frigida per-
fundatur. Post hæc per rubificatoriū ex sinapi & ca-
ricis caput corroboratur. Et per interualla quedam
pituita per os detrabatur, & naris uicibus adhibeatur.
Diæta uero statuatur tenuior, concoctū facilis, ueni-
tri cōmoda, flatus exort, uim cōtemperandi ha-
bens. Nisi usus his rarus sit. Si uero reliquę affec-
tiōis superfuerint, ad ueratrum albi dēueniendū
est. Modus autem utendi relatus est in Sermone de
purgantibus medicamentis. De cætero uero ad mor-
nendi sunt, ut ab omnibus eduljjs & potibus bilem
gignentibus abstineant. In uere autem quotannis ne-
nam, secernat gratia præseruationis. Deinde etiam pur-
getur, & præsertim si bilis magis redundarit. Mus-
lieribus uero menses cōsueti tempore præsententur
ut fluant, cū impedimentum. Sed & in alijs cōsue-
tæ excretionēs procurentur, ut per os, per uicē, per
De melancholia. Ex Galeno et Rufino. Cap. xli
Quemadmodum in apparentibus corporis parubus,
aliquando omnibus eadem temperatura apparet, ut
in malo corporis habitu elephantiasi & hydro-
pisi; aliquando uero una quedam pars, aut amara
bilis, aut pituita, aut atra bilis humores susceptio ipsa
solum temperaturam mutat. Sic etiā circa cerebrum
fieri potest, ut aliquando toto in uenis sanguinem tra-
biliario facto, ex cōmuni detrimēti ratione etiam
cerebrum lædatur. Et rursus ut alio tempore, sangui-
ne in toto homine illa so permanente, is qui iuxta so-
lum cerebrum est alteretur. Exoritur hoc duplici-
ter, aut aliunde confluent in ipsum; aut generatur in
loco atræ bilis humore. Generatur autē prædicti hæc
multa indigena, aut flauam bilem, aut crassiorem &
auriorem sanguinem adassante. Plerumq; uero parti
res circa præcordia primario affectæ, caput ad cōsensum
perducunt, & delirium efficiunt, aut ipsa bile ce-
rebrum occupant, aut aliqua uaporis melancholicę
exhalatione, quemadmodum in morbo flauoso &
præcordiali appellato. Nāque rationi nostrę ob-
stat, aliunde & ex alia parte principium, & genera-
tionem affectiōis esse. Namque uentris quibmodocū-
cūq; affectum facile ad cōsensum duclit, cerebrū ob
cognationem, per maximos duos nervos qui ex sin-
piti ad ipsum deferuntur. Perducit etiā ad cōsensum
sum cor ipsum ob uicinitatem. Similiter quoq; sepius
transuersum, quod etiam ipsi inferitur. Communis
ita est etiam stomacho ad spinalem medullam, quæ
parte & incumbit, & colligatur uerticulis collit. Prin-
cipium itaq; etiam modis melancholicę plerumq; exor-
ditur. Flatus enim ipsi succedunt multi, qui sæ-
pe eleuantur, & circa præcordia diuinus morantur,
& rursus ipsa acidi consequuntur, nullo uisum
cibo accepto. Ventres plerumq; ipsi, licet sunt, somni
parui diuulsi, insomnia turbulenta & peregrina, ubi
bratones corporis alio alio, uertigines capitis, &
flauum sanguinem circa uera. Et alijs quidem caput ple-
num & graue esse uidetur, alijs uero laxū & uacuum
alijs sic. Quidam neq; omnino caput se habere pur-
taule, ad quem excogitasse dicitur. Philonimus supra
reliquam curā ad os plumbeum pileum, a quo grā-
uata caput se habere intelligeret. Huius etiam mēte
caput, & timidi, & misericordes, & lacrymantos ac
n 4 deserta

deserta persequuntur. Quidam etiā dæmones ab inimicorū præsignis sibi immissos esse putant. Alij uenenosum pharmacū accepisse suspicantur, & suspido nem ipsorū confirmat uirosi ac peregrini ructus qui ipsi adsunt. Et est morbus hic omnifarius & nō facile enumerabilis. Velut uerbi causa circa timores. Alius amicissimos timet, alius oēs homines. Et alius ad lucē prodire timet, & tenebras persequitur. Alius fugit caliginosos locos. Pleriq; tamē in tenebricosis locis degere cupiunt, & in monumentis ac solitudinibus. Quidam uerō etiā aquā timent, & uinum & oleum, & omnē liquorem, uelut qui morfi sunt a rabioso cane. Et in summa, Melancholica deliria multiformia quidē sunt, ob particulares corruptas imaginationes. Vnum uero omnibus ipsis, cōmune est: Timor & tristitia. Tristantur enim omnes præter rationem, & neq; si interrogas habent quod dicant cur tristantur. Non pauci uero ipsorū mortem timēt, & alia quædā nullo timore digna. Sunt etiam qui mortem uehementer exoptant. Quod igitur ob atram bilem rationalis animæ principia occupant, timor fit, & tristitia, & mortis formido, nihil miri est. Videmus enim etiā extra corpus nihil nobis ita horrendum, uelut sunt tenebræ. Quum igitur uelut caligo quædā rationali animæ parti circūfusa fuerit, necesse est timere hominē, ut qui causam timoris fecit in corpore circūferat. Sicut enim in profundis tenebris pueri timent, itemq; adulti imperiti: Ita etiā atræ bilis color, uelut tenebræ rationis locū obumbrans timores efficit. Quapropter omnium symptomatum singulas accidentiū causas enarrare impossibile est. Pleraque enim multam difficultatē habent, uelut uerbi gratia, Cur fugiunt uelut horrenda, quæ non sunt horrenda. Alia uero persequuntur uelut bona, quæ nō sunt bona. Et cur alius domesticos timet, alius uero omnes homines, & huiusmodi. Plurimorū uero symptomatum causas medicū dicere, non est difficile, uelut, qui sibi uidetur uas fictile esse, propter siccitatem hoc patitur; frigidus enim & siccus est melancholicus humor; similiter etiā qui cutē suam siccis pellibus similē esse putat. Qui uero putabat se caput nō habere, fortassis ob leuitatē hoc passus est, quam flatus uetulosus sursum latus ipsi exhibuit. Cur uero appetunt melancholici plures cibos: nū quia frigescit ipsis os uentris? Cur autem aliqui ipsorū uini potiores sunt: num quod frigiditas callactione opus habet? Cur autē occidunt se ipsos: num quia a maioribus malis liberari se putant? Nisi fortassis talē opinionē induunt, quod bonum est mori, quod barbaris quibusdam uidetur. Cur autem cruditates assidue ipsis fiunt: num quia turbatū & superfluitatibus plenum est ipsorum corpus, & propterea etiā uenter intemperatus, ut qui semper ex atræ bilis humore perfrigeratur? Cur autem alui plerunq; ipsis siccantur: num quia flatus supernè circa præcordia consistunt, & non ualde infra secedunt? Necesse itaq; est ob hoc ipsum etiā uentres siccōs esse. Ex multa uero retentione, aliquando coaceruata ac colliquata egerunt. Oculis autem plerumque nictant, & oculi ipsis prociidunt, & crassa labia habent, propter crassum flatum. Atri uero coloris, propter humoris diffusionem. Hirsuti uero pleriq; ipsorum sunt, propter multitudinē crassarum superfluitatum. Veloci uero plerunq; lingua sunt, & balbi, & gracili uoce præditi, ob linguæ incōtinentiā. Morus enim

condiciores à flatu fiunt. Quicquid autē conditè mouetur, citò defluit. Et procliuē sane fuerit etiā aliorum symptomatum causas reddere, si quis ex his progressum facere uolet. Porro nigrescit aliquādo hic humor supercalefactus, aliquādo superrefractus. Nā quale quiddā patiuntur carbones, dum uruntur lucidissimi ob flammā existentes, extincta autem flamma nigrescentes: tale quiddam circa clarū sanguinis colorem frigiditas facit. Videmus enim etiam in externis, quædā corpora fluida fieri ac denigrari à frigiditate. Et rursus excessus caloris resiccans ac cōsumens humiditates à quibus calor nutritur, humores nigrefacit, quemadmodū etiā sol fructus, & hominū corpora. Hæc igitur sunt quæ ante curationē Medicum cognoscere oportet. Quæ uero discenda sunt, ut quis ita ægrotantibus opē ferre possit, iā tempus est subiungere. Nō parum autē refert ad curationem, nosse unde morbus initū habuit. Cognoscere itaq; oportet quod duplex est melancholiæ species. Quidā enim ex natura & temperatura ab initio atrā bilem habent. Quidā uerō ex mala diæta postea id temperamentū acquisierunt. Et est hæc species segnis semper & tristis. Qui uero ex flauæ bilis superaffusione in delirium incidunt, audaces & iracundiores alijs sunt, & percussores, & omnia horrenda facientes, & maxime tēpore quo bilis superaffatur. Quo uero tēpore ipsa extincta fuerint, tristes, moesti ac timidi fiunt. Quum igitur totū corpus melancholicū sanguinē habuerit, à uenæ sectione principium curationis facere conuenit. Quum autē solum cerebrum, æger uenæ sectione non habet opus, nisi multo sanguine redundarit, & præseruationis gratia detractionē faciamus. Cognitio uero an totum corpus melancholicū sanguinem habeat, aut iuxta solū cerebrum talis sit, ex his à se fiat. Nigriores & hirsuti, & qui uenas amplas habent, apuissimi sunt ad atræ bilis generationē. Aliquādo etiam homines colore rubicundi, cōserunt in melancholicam temperaturā transeunt. Consequenter autem ab ipsis, flauī, & præsertim ubi uigilijs, & laboribus pluribus, & curis, & tenui uictu, aut melancholicis eduljs fuerint usi. Ad hæc si suppressa est hæc morrhoea in sede, aut alia excretio cōsueua, aut mulieribus menses, nec parū confert anni tempus, & ætatis status, & regio, & ægritætas ac studiū. His omnibus præcōsideratis, ubi speraueris in totius corporis uenis melancholicū sanguinē contineri, certissimū experimentū adhibeto, ex uenæ cubiti mediæ præsertim sectione. Si enim effluēs sanguis nō uidebitur atriabilius esse, statim cohibeto. Si uero talis apparuerit, quantum pro ægrī corporis habitu satis fore putaris, euacua. At uero tertia melancholiæ differentia, cuius principium à uentre habere diximus, & quæ affectio præcordialis appellatur, sepe ex elatis cognoscitur. Primū enim incipiūt uentris symptomata, uelut sunt inflationes, rugitus, ructus acidi ac uirosi, & quod uenter resiccatur, & quod in secessibus ac uomitibus & ructibus alleuatur, & quod ipsi ægrī percipiunt omnes uexationes circa præcordia consistere. Quemadmodū igitur dū quibusdā sepe ex uentre fuliginea quædā aut fumosa, aut omnino crassiorū uaporum exhalatio sursum fertur, uelut in suffusos oculos habentibus, aliqua ob oculos uersantur. Eodē modo etiā nunc dū melancholica exhalatio ad cerebrū, uelut fuligo aut fumus feritur, melancholica quoq; sym-

promata circa mentem contingent. Quum igitur melancholici delirii propria symptomata apparuerint magna, circa uentrem uero aut nihil molesti, aut minimum fuerit, in his cerebrum primario affectum esse putandum est, uelut praedictum est.

Curatio melancholice Galeni. Cap. x.

Melancholia ex cerebro primario affecto oborta, per balnea assidua, & dieta boni succi humidam ac flatibus exortē curare oportet, citra aliud efficax auxiliū, nisi ob temporis longitudinem humor affligens ægre euacuetur: quando sanè magis uarias ac fortiores curationes adhibere oportet. Incipientē autem affectio nem curare cōuenit. Nam inueterata ac aucta, ægre tractabilis euadit. Ruffi. Si uero autē cerebrum primario affectū fuerit, sicut præcordia, cōmunia sunt subducentia uentrē auxilia. Primum igitur bonæ concoctionis curā habere oportet. Postea uero purgare primum epithymo & aloē. Horū enim etiam si parum quotidie acceperit, prodest tamē moderate & paulatim subducendo. Posidonij. In quibus sanguis reducere apparuerit, statim ab initio uena secetur in cubito, & præsertim in quibus cōsuetæ sanguinis excretionēs sunt suppressæ. Verum in mulieribus quibus menses defecerunt, uenā in talo secare oportet. Et in singulis pro uiribus sanguinem euacuare. In quibus autē uiciati humores magis redundant, præparatum per uictū egrū purgabis per hierā Ruffi, aut Archigenis, aut Iusti. Si uero utriq; reducent, facta prius uenæ sectione purgato. Postea interpositis aliquot diebus, alui per clysteres euacuato, primum cū furfurum succo, spumaq; nitri ac melle. Deinde etiā polypodij radices cōtusas, aut epithymū cū furfuribus coquito. Post triduum à clysteris usu, detur ipsis picea ex aloē cōpositio, quæ supra reliqua oīa, etiā epithymū accepit. Præparanda est autē, uelut Themison iubet, ita ut aloēs accipiat drach. 6. mastiches, croci, spicæ nardi, cinamomi, aut cassiæ duplū, asari, carpobalsami, singul. unc. 1. His uero etiā epithymi sextans addatur. Detur autē cochlearij magni copia cum aqua mulsa. Deturq; ipsis ex modicis interuallis iterū atq; iterū. Deinde rursus per uictum reparatis uiribus, rursus dato hieram Ruffi, aut Archigenis, aut Iusti. Sit autē pondus drach. 11 11. cū aqua mulsa, & salis cochleario paruo. Melius est autē per euacuantia quotidie leniter uentrē subducere. Atram uero bilem ducit amaracus, & cunila appellata, drachm. 11. pondere aquæ mulsæ inspersa & pota. Conducit & lactis sero alui subducere. Sed non de caseis dandū est serum. Præstat enim quod à lacte per cocturā separatur. Sit autē lac equinum, aut si non possit haberi, bubulum. Lac ipsum in ollam nouam mittatur, & sic ramulo agitetur. Postquā autē ter aut quater ebullierit, acetum mulsum irroretur. Deinde per colatū in potu detur. Et primum quidem ammiscendū est mel, quum autem uenter subire inceperit, nō amplius addatur mel. Accipiat autē æger hoc serū per heminas, nō infra quinquæ heminarū mensurā. Ab omni uero euacuatione utendū est maluæ semine leuissimē trito, duarū drachmarum pondere, cū aquæ cyathis tribus. Egregie enim facit. Quare sæpe ipso utēdum est. Optimū est & pulegij decoctū sæpe bibere, & ante purgatoria, & post ipsa. Et similiter cēaurij parui. Ab Iulij autē tē decoctū & assidue & conuenter præbe. Stomacho enim & uentri in his commodū est. Et neq; flatū

multū in uentre fieri permittit, neq; secessum penitus resiccat, & urinam ciet, & concoctionē probe adiuuat, adeo ut ego ex huius solius usu nouerim quosdam à morbo liberatos. Danda sunt etiam urinā mouentia, anisum, daucus, petroselinū, asarum, nardus: & his adhuc amplius foeniculi magni syluestris semen, & radix. Chamæpitys autem & chamædrys propius accipienda sunt, ita ut singula hæc cū aqua coquantur, aut arida trita portioni inspergatur. Cōmodæ sunt etiam euacuationes per sudorē, & labores, & balnea fiētes, & per illitiones in sole, qualis est quæ cū oleo chamæmelino fit, & cum oleo ac nitro. Quod si habitus permiserit, rursus per hierā purgato. Conuenit autē neq; præcordia negligere, & maxime ubi accesserit Medicus, curationis ipsorū cōiecturā faciat. Omēta igitur cōueniūt ex oleo, in quo cocta sunt ruta, anethum, serpyllū, absinthiū, artemisia, pulegiū, uicicis semē, baccæ lauri, aut folia tenera. Hæc enim dolores mitigat, & flatus minuit, at uero in inflationibus stomachi cū morfu, cumini & pulegiū in aceto coquere oportet, & per spōgias stomachū fouere. Aliquādo etiā alumē aceto inspergimus. Cataplasmata autē habeat aut anisum, aut apium aut cumini in oleo præcoctū. Et cyperus leuissimē trita, & iris, & libanotis cataplasmati addatur. Permittantur autē diutius, & ante & post cibū. Ablato autē cataplasmate præcordia cōtegantur, aut lana amplissima, aut leuissima & pura pelle agnina, præillitis locis ex nardino. Utendū est etiā cucurbitarū adhibitiō neq; ad flatus quidē inaniū, ad inflammationes uero ac duricias, cū scarificatione. Postea uero ceratis ex cyprino utendū est, & polyarchio, & quod ex styrace paratur, & quod ex seminibus fit, & similibus. In progressu autē curationis, etiā rubificatione ex caricis ac sinapi uti, ualde proderit, & cōcoctiones reuocat. Nā & uētri robur addit, & si quis dolor in præcordio restat, eū eximit. Utendū est etiā acris sine gmaris ad præcordia, & picatorū medicamēto, hoc est, pice sicca per seipsam liquefacta, aut cum modico oleo. Calida autē imponitur cuti, & uētri ac dorso adhibetur, ac sinitur donec sua sponte decidat. Quare licet cū ipsa lauari, & quod paulatim disparatur forficibus auferre. Valde uero prodest eis stercus bubulū aridū aceto mulso infartū ac impositū. Prosunt etiā bulbi cum nitro aut alumine triti ac impositi. Sed & his ad bubulū stercus ammixtis utile sit cataplasma, & præsertim ubi morsus ab ipsis circa stomachū percipitur. Cæterū in quibus cōuulsiones assiduæ corpori adsunt, confert etiā castorij potus, & illitio corporis ex castorio cum oleo sicyonio. Conuenit & moueri & exerceri ipsos pro uiribus ante cibos. Balnea uero probe cōcoquenti non sunt ualde necessaria, nisi lassitudinē alicui mederi uelis. Qui uero non bonū uentrem habet ad concoquendū, huic cōducit frequētius lauari, aut ieiuno, aut post perfectam cōcoctionem. Post balnea cibos damus concoctu faciles, flatus exortes, ex aluo secedentes, exacta consideratione facta quomodo ex singulis homo afficitur: non enim omnes ad omnes cibos similiter dispositi sunt. Plerūque tamē cōueniunt panes clibano cocti probe præparati. Volucres nō pingues, non uirosæ, montanæ. Oua gallinarum mollia. Pisces petrosi & molles carne. Herinacæ uero marini plurimum præstant ad iucunditatem & utilitatem. Vitanda sunt omnia in stagnis

Hæc expensum
cum gustum est
Chirib. l. 1.
Mortuaria

stagnis degentia, & in paludibus. Ex carnibus conueniunt hoedinae, & lactentium animalium, & ex his magis extremas partes probe coctae. Non inutiles sunt etiam uuluae, & uentriculi, & pedes suilli. Ex oleribus ad communem uictum conferunt dulcia. Acriora uero aliquando danda sunt pharmaci loco, uelut est asparagus palustris, petroselinum, & similia. Moderata uero copia omnia accipiuntur. Vinum sit tenue & album & non ualde uetus. Non autem acruatim detur potus inter cibum, neque magna copia potus exhibeatur, ut ne cibi in uentre fluitent. Acetum quoque acerrimum cochlearij mensura post omnem cibum absorbeatur ubi iam uult dormire. Sed & pleraque obsonia in aceto tineta edere conuenit. Praestat autem aceto ammiscere parum de scilla, & ruta, & aristolochia tenui. Posidonij. Commodum est autem ad inflationes tale oxyporium preparare. Ligustici, seminis apij, zingiberis, thymi, singulorum unc. i. mellis despumati quantum satis est. Dato cochlearij dimidium mane, & uespere similiter. Quod si mellis dulcedinem auersentur, salem concoctorum eiusmodi ipsis preparato. Scillae assatae unc. i. salis ammoniaci quincunces, seminis apij, foeniculi, thymi, petroselini, anisi, sinonis, zingiberis, singulorum drac. iiii. panis puri siccus quincunces, piperis sequiunciam. Ex hoc cochlearij mensura edendam dato cum cibo, prout uoluerit. Detur etiam ipsis antidotus theriaca ex quibusdam interuallis, & praesertim hyeme, & inchoante uere. Ruffi. Vomant ex longioribus interuallis etiam a cibis. Verum a raphanis, aut origano, aut thymo seiunt. Non tamen fortioribus uomitorijs utendum est. Sunt enim talia nocua in his, aerumnas uentri ac stomacho addentia, iam antea ex morbo afflicto. Videntur enim aliqui ex efficacioribus uomitorijs melancholia correpti. Proinde operae pretium esse nosse, quod multi sic aegrotantes, in tempore curationis nihil commodi perceperunt. Dimissa uero curatione restituti sunt, natura ante curationem praeualente contra morbos debiles ex medela factos. Quapropter naturae remissionem dare oportet. Videtur enim una cum curationibus affligi. In quiete uero inualefcere, & superare morbos iam antea attenuatos.

De insania lupina aut canina appellata. Ex Marcello. Cap. xi.

Qui morbo lupino siue canino appellato corripiuntur, in februario mense noctu exeunt, per omnia imitantes lupos aut canes, & usque ad diem monumenta maxime aperiunt. Cognosces autem ita affectos ex his signis, pallidi sunt, & uisu imbecilli, & oculos siccos habent, & non lacrymantur. Videbis etiam ipsos cauos oculos habere, & linguam siccam, & saliuam omnino non profundunt. Sunt quoque sticculosi, & tibias habent exulceratas immedicabiliter, propter assiduos calus & canum morsus. Ac talia quidem sunt signa. Nosse uero oportet melancholiae speciem esse hunc morbum. Quem curabis tempore accessionis uenam secando, & sanguinem usque ad animi deliquium euacuando, & aegrum boni succi cibis nutriendo. Utatur autem balneis dulcibus. Deinde sero lactis per triiduum usus, hiera ex colocynthide Ruffi, aut Archigenis, aut Iusti purgetur, iterum atque iterum ipsam sumens ex interuallis. Post purgationes etiam theriaca ex uiperis utendum est, & alia adhibenda in melancholia iam antea relata. Ad uesperam uero inuadente iam morbo, irrigationibus capitulis somnum inducere solitis

utendum est, & talibus quoque odoramentis. Nares item opio illinantur. Quandoque uero etiam somnifica in potu exhibeantur.

De incubo. Posidonij.

Cap. xii.

Qui incubus appellatur non est daemon, sed magis praeludium & proceium morbi comitialis, aut insaniae, aut syderationis. Nam cruditates ex uoracitate affectione praecedunt. Dum enim uentriculi cerebri uaporibus crassis ac frigidis implentur, prohibent his facultates per nervos transire, & morbum aegre excitabilem efficiunt, & qui uix ad rectam actionem perducitur. Unde etiam immobiles penitus tales permanent. Praecedit enim incubum suffocatio, uocis priuatio, grauitas, & immobilitas. Per multam uero anxietatem attenuato ac discussu spiritu, & apertis meatibus derepente exciatur. Cauendum igitur est a malo dum in principio est. Inueteratum enim & assidue incidens, quosdam ex relatis morbis inducit, dum paulatim in uentriculis cerebri crassus humor coaceruatur. Quaecumque enim patiuntur comitiali morbo correpti in exacerbationibus, eadem perpetiuntur incubo pressi dum dormiunt. Si quidem igitur sanguis redundat, uenam in cubito secare oportet. Si uero uisiosi humores magis praedominantur, purgatio facienda est per hieram Archigenis. Maxime autem opitulatur ipsis hoc. Corticis ueratri nigri drach. i. scammoniae obol. iiii. anisi, aut dauci, aut petroselini parum. Dieta uero sit tenuis & penitus flatus exors. Auxiliatur etiam ipsis niger praenoniae fructus, si quindecim grana trita cum aqua in potu exhibeantur. Rigare uero oportet etiam caput oleo anethino calido, & pileo coeregere ubi cubitum uadit aeger.

De morbo comitiali. Galeni.

Cap. xiii.

Tres sunt morbi comitialis differentiae. Omnibus autem commune est, cerebrum affectum esse. Aut primario consistere in ipso affectione, aut per consensum oris uentris. Raro autem fit etiam tertia species ex parte quadam, in qua incepit affectio, & deinde sensibiliter aegrotans ad caput ascendit. Atque hanc speciem in puero quodam uidi, qui principium affectionis in crure habebat, & postea per tempus quoddam per femur & lumbos ac spinam ad collum & usque ad caput ascendebar. Vbi uero caput pertigisset, non amplius sui copos erat. Tale quiddam contingit etiam in his qui a scorpione, aut aliqua alia uenenum eiaculari bestia icti sunt. Quidam enim ictus a scorpione, grandine se impeti putare dixit. Et erat totus subfrigidus, & frigidum sudorem excludere, & medicamentis adhibitis uix seruatus est. Non igitur impossibile est circa aliquos non principales partes eiusmodi essentia generari, citra externam causam. Et hac ipsam ubi in nervosa parte constitit, uiam suam per continuitatem ad nervorum principium transmittere. Posidonij. Couulsio sequitur ad morbum comitalem, eo quod principium nervorum affligitur ab instantibus ac molestis exhibentibus. Quemadmodum enim stomachus, dum aut alimentum copia grauatur, aut ab acri humore mordetur, non solum singultum, sed etiam conuulsionem inducit. Sic etiam principium nervorum ad talem motum perducitur, dum reicere conatur quicquid tandem fuerit id quod ex primario affecta parte ad ipsum affertur. Ceterum ordinati aut inordinati circuitus ipsis fiunt iuxta dietae modum. Aut enim per omnia aequaliter dietam habent aegri, aut inaequaliter & inordinate. Irruente igitur comitialis morbi exacer

remissio non

exacerbatione, conuulsas & obortas partes deligare oportet, Inungereq; ac dirigere. Deinde disparato ore pennā oleo illitā immittere, cyprino præsertim, aut irino, aut narcissino, & uomitū irritare. quo incumbentes stomacho humores extrahantur. Oportet etiam odoramentis sensum irritare, uelut peucedano aut succo cyrenaico. Perseuerante uero exacerbatione, Medicus confidenter cogens, ac mandibulas diducens castorium ori infundat, & succum cyrenaicum cum aceto mulso. Reuocatis autem ipsis, per sedem infundatur centaury ac calaminthæ decoctū, aut aristolochiæ. Deinde recuperatis uiribus, per hieram Galeni ex colocynthide purgētur. Elusmodi sanē est recentis & acuti comitialis morbi curatio. Deinceps autem quæ ad inueteratū demolitionē pertinent trademus. Oportet itaq; ægros in longo aque potu cōdinare, & in curationis aggressione, si nihil impedierit, uenam secare, & intermissis diebus quatuor aut quinque corpus reficere, ac sic infra euacuare, maxime per ueratū nigrum, aut colocynthidē. Verratū autē rogiem siccum tundere ac cribrare oportet, & eius drach. i. cū aqua mulsa præbere. Aut modico pipere addito melle excipere, & catapocia deuoranda dare. In colocynthide uero electo semine, & relicta medulla, uinū dulce infundito, ac per noctē finito. Mane uero uinū excolatum ac tepelactum bibēdum dato. Post sufficentem purgationem lauare ipsos oportet. Tertia deinde die cucurbitas affigere præcordiis ac dorso cum scarificatione. Deinde intermissis aliquot diebus ac relecto corpore, purgare per hieram Galeni ex colocynthide. Postea uero, etiam capiti cucurbitas affigere. Ex sequenti die cataplasma capiti adhibere, ex pane cocto cum aqua mulsa, amygdalis amaris simul cōtritis, aut serpillio, aut calamintha, aut mēta, aut ruta. Et hoc faciendum est per triduum. postea radendū est caput, & illinendū peucedani succo in aceto diluto. Aut spondylium, aut serpillū, aut tris in aceto coquatur, & facta intermissione, rursus ex hiera drach. i. i. solum dato. Deinde sternutatorijs utendum est, & plicuitam per os ducentibus, & naribus rursus, ita ut cydamini succū naribus infundamus, aut ipsam radicē siccā tritam insufflemus, aut elateriū cum lacte. Et rursus facto interstitio, clysteri ex centaury & colocynthide utere. Deinde sinapismū capiti adhibere, & eduliorū acriū esu per interualla utere.

Quæ arguunt morbum comitalem. Cap. xiiii. Arguunt comitalem morbum & eo affectos collabētiadunt suffita, bitumen, lapis gagates, cornu ceruinum, odor hepatis capriui assati, & ipsum hepar dū edicitur.

Quæ collabentes comitales excitant. Didymus mi. Cap. xv. Si magnum pedis ægri digitiū diuiseris ex quacuncq; parte, & destillante sanguine labia ipsius collapsa illeucria, statim excitabitur. Asclepiadæ odoramentum excitans comitales. Sagapent, piperis, castorij, amygdalarum, amararum, radicis peucedani, spondylii, galbani, singulorum drach. i. i. sulphur drach. i. opobalsami drach. i. aceto diluo ac passillos efforma. Vt utero experiente aceto diluo actaribus subline. Vtendum est hoc in exacerbationibus. Facit & ad uerū strangulationes. Pharmacum hoc repositum seruatur in area pyxide, quam naribus ægri ad nouebia. Aliud Galbani, spondylii aut serpilli, ærugine rursus, iup

castorij, acori, singulorum drach. i. i. i. succi peucedani drach. i. i. aut radicis drach. i. i. succi cyrenaid drach. i. opobalsami drach. i. piperis grana x x i. i. i. amygdalas amaras decorticatas x x x. picis liquidæ quantum satis est, aceti tantundem. Excipe & utere.

Auxilia ad comitiales. Dioscoridis. Cap. xvi. Ad comitiales facit rutæ syluestris semen cum aqua potum. Et spondylium eodem modo. Item radicis bryoniæ drach. i. seminis siue fructus balsami drach. i. i. Cardamomi drach. i. Ramentorum lori arboris cremor. Foliorum quinquifolij drach. i. quotidiē pota. Testudo terrestris cocta ac delinqua. Lafer cum cibo acceptum. Summe uero prodest castorij post aliquam purgationē acceptum, ad dies quinque aut plures, drach. i. pondere cum aqua mulsa. Et eboris ramenta magnopere profuisse cognouimus, ad dies quinque aut plures, duorum cochleariorum mensura quotidie pota cum aqua mulsa. Ex Asclepiade. Oxallidem, siue rumicē acutum, uiridem præsertim, quotidie dato à prima lunæ usque ad trigessimā. Eadem oxallis herba uiridis data cum uino delyrantiibus, in naturalem statum eos restituit. Aliud, ut ne assidue cadant inquit Archigenes. Eryngij montani appellati, culus folia angusta & parua, & flores auricolores & oculorum speciem præferentes. Huius radicem cōtridito ac diligenter cribratam reponito. Et ex hac mystra duo ad dies quinque dato, sufficiens melle adiecto, ut eclegmaris crassitudinem habeat. Et hoc facito ex interuallis ut trecētos sexaginta quinque dies expleas. Qui enim hoc pharmacum per anni spaciū, hoc est trecētos sexaginta quinque dies sumit, ab hac affectione non corripitur. Aliud. Scilla & ellaræ Internæ partis tritæ, anethi, singulorum acetabulum, apij acetabula tria. Excipe melle, & nucis ponice magnitudine exhibe cum aceto mulso. Et qui bibit si potest, currat. Sin minus, condicatē drambule. Aliud Asclepiadæ. Folij oleæ x x v. & castoreum aceto mulso usus est Themison. Facit ad comitalem morbum & elephaniasim. Est & hæc theriaca bona. Selsis drach. v. scordij, castorij, cinamomi, seminis trifolij, singul. drach. v. i. staphidis syluestris drach. i. i. gentianæ drach. v. i. i. aristolochiæ drach. v. i. pyrethri drach. v. i. i. euphorbij drach. v. i. piperis albi drach. x. opobalsami drach. i. i. i. succi cyrenaid drach. i. i. i. Excipe aceto mulso simpliciter, & dato comitalibus cum aqua mulsa drachmas tres, elephaniasim uero affectis sesquidrachmā præbe. Aliud. Quo Serenus utebatur ad comitales, cui nullum cōparari potest. Idem concoquit & euacuat, Castorij, uerratū nigri, scammoniæ, singulorum drach. i. i. opopanacis, cumini chebaici, centaury, nieri, sulphuris uiui, abrotoni, ammoniaci thymiamatis, seminis rutæ syluestris, absinthij, singulorum drach. i. i. cōtrita & cribrata excipe aqua, & efforma pilulas fabæ Aegyptiæ magnitudine, & unam quotidie præbe cum aceti mulsi cyathis i. i. i. Diuina huius cōpositionis uis est. Redpit autem simplicia x i. i. & habet drach. xvi. Aliud. Coagulum leporis quotidie lectus bibet erui magnitudine aqua dissolutum. Si non adest leporinum, hœdino utatur. Aliud Archigenis. Ad comitales, & qui per circuitū cōuelluntur, & à uoluulo uexantur, & ex diurno capitis dolore laborant. Castorij, abrotoni, radicis panacis, pyrethri, croci, singul. drach. v. i. i. seminis rutæ syluestris, myrrhæ, piperis

piperis, singulorum drach. iiii. Terito in aceto mulso scillitico, & pastillos drachmales formato, & unū exhibeto non febrientibus cum aceto-mulso. Febrientibus in remissione. ac interuallo cū aqua mulsa per triduum. Deinde interposito triduo, rursus per aliud triduum dato. Facit etiam ad arthriticos. Ducti mulseribus mentes, si noues per interualla uelut diximus bibatur. Aliud consimilis usus. Castorij, piperis, radice panacis, singulorum drach. viii. pyrethri, staphidis syluestris, abrotoni, seminis rutæ, zingiberis, acori, daudi, singulorum drach. iiii. croci, iridis, cardamomi, singulorum drach. ii. Dato ex hoc arido cochlearium cum aqua mulsa. Facit ad comitiales, resolutos, & tremulos.

De his qui ex stomacho primario affecto, comitiales morbi modo exacerbantur. Galeni. Cap. xvii.

Quando stomacho primario affecto sit morbus comitialis, oportet aegro præcipere ut bonæ concoctionis studiosus sit, & circa horam tertiam panem accipiat probe preparatum, ex uino ueteri albo & tenui diluto ac leniter adstringente. Dato autem ipsis etiā amarum ex aloë pharmacum sæpe in anno. Dicitur autē amplius de his qui ex stomacho comitialis morbi modo affliguntur, in Sermone de stomachicis. Multum uero prodest ipsis fœli, & spodylij radix ac semen, & aristolochia, cum aqua trita pota. Auxiliatur his magnifice & uenæ sectio à talis & poplite, si assidue fiat. Noui etiam puerum qui omnino non corripiebatur comitiali, ex quo poroniæ radicē gestabat magnam & recentem de collo suspensam, ut indefinenter stomachum contingeret.

De his qui ex parte aliqua habent morbi comitialis causam. Posidonij. Cap. xviii.

Quibuscumque uero ex alia manifesta parte morbus comitialis principium habet, uelut in prædicto puero ex crure; Post totius corporis euacuationem, unguentis locum prius excalfacere oportet. Deinde epichema ex seminibus imponere. Et ex emplastris quæ rarefaciunt & intemperiem transmutant. Quale est quod Ebrietas appellatur, & quod ex althæa paratur, & mnaeæ inscriptum. Postea uero phoenicis appellatum. Post temporis autem interstitium dropaces ac sinapismi loco adhibeantur. Et sic quidem adolescentes ac iuuenes, & inclinatæ ætatis homines, fortiter curare oportet.

Curatio senum ac puerorum comitali correptione. Posidonij. Cap. xix.

Senes autem & pueri affecti hoc modo curentur. Corporis equidē euacuationes in his uisitare oportet per purgantia medicamenta. Imbecille est enim & senibus & pueris corpus, ad resistendum fortitudini purgatiuorum. Perclysterem uero euacuandi sunt præsertim senes, ex centaurea, aristolochia, polypodio ac anetho. Sed & manducationum usus senibus conuenit, & gargarismatum, ac eorum quæ naribus induntur. At uero pueris simplicissima infusa immittantur. Frictoriorum quoque ac sinapismorum simpliciorum usus pueris adhibeatur. Senibus autem effusiorum. Sed & antidoti præscriptæ senibus sunt exhibendæ.

Curatio ualde senis comitalium. Posidonij. Cap. xx.

Valde senibus cōsulendum est, ut uictu solum calidior reuantur, & ut bonæ concoctionis rationē habeant. Impossibile est enim eos qui cum hac affectione cō-

senuerunt, humana ope curari, ac morbo liberari. Quibus autem temperaria est affectio, ab aliquibus occasionibus allapsa, etiam si ualde senes fuerint, ab ipsorum curatione desperandum non est.

Curatio puerorum recens natorum comitalium. Posidonij. Cap. xxi.

Afficiuntur etiam recens nati pueruli à morbo comitali, & dissilem curationem habent, non tamen desperatam. Possunt enim ipsorum matres aut nutrices calidis cibis ac potibus nutrirī, quo lac semper calidius ac tenuius fiat. Possunt etiam capite infandum puluisculis calidioribus conspergi, uelut est cyperus, adiantum, iris. Oleo item anethino assidue illini, & irino, ac amaracino calidis. Lauari quoque possunt, ita ut caput non rigetur, neque calida, neque frigida. Nisi ubi opus fuerit sordes detergere per spumam natri ac mel, & sic caput solum calida ablucere, non autem immergere. Dandum est etiam ipsis mel despumatum ad delingendum. Et collo alliganda est poronia radix recens, ut semper stomachum contingat.

De fatuitate.

Cap. xxii.

Fatuitatis quoque ac delyrii curationem aggredi oportet à principio generationis ipsorum, si partes corporis uniuersæ, & præsertim capitis, moderate se habuerint, & si rationem antea moderatam ac integram habuerunt, postea uero dementes apparuerunt. Oriuntur ambæ affectiones frigidiore cerebro facto, aliquando ex sola qualitate, uelut fieri solet in profectioibus dum plura caput frigidat, aut etiam uehementis uentus. Aliquando uero etiam modica pituita ad cerebrum illapsa. Differt autē fatuitas à delyrio, quod fatuitas quidem consequentia & dicitur & facit. Delyrium autem transgressionem inconsequentem habet, & sermonem alium alij cōnectit, ita ut posterior nihil commune habeat cum priore. Delyrium item senibus plerumque accidit. Fatuitas autem & in pueris, & adolescentibus, ac reliquis ætatibus, ex prægressis quibusdam morbis consequitur. Ceterum curatio amborum morborum cōsimilis est ei quæ ad comitiales relata est, per calefactoria auxilia similiter fiet, non tamen similiter siccantia.

De memoria amissa. ex Ruso ac Galeno. Cap. xxiii.

Memoriæ detrimentum sæpe in quibusdam morbis factum esse compertum est, læsa simul etiam ratione. Ita ut affectio quidem utraque eadem sit, intendatur autem quādo unā cum memoria etiam ratio perit, quod sane fatuitas appellatur. Percunt autem ambo hæc in lethargo, & omnibus affectionibus soporiferis. Unde etiam curatio ad prædictas affectiones descripta adhibetur instantibus iam morbis. Contingit autem hoc etiam ex peste, quemadmodum accidit in peste Athenis facta. Si uero irruerit aliquando ex aliquo prædictorum morborum, soluto iam in totū, & in obliuionē transeunte, considerare oportet qualitatem magis prædominantem, hoc modo. Sola quidem humiditas redundans, profundos ac longos somnos facit. Sola uero siccitas, uigilias. Si uero frigiditas fuerit cum humiditate, soporiferæ ac stupidae affectiones fiunt. Si uero humiditas fuerit cum modica frigiditate, memoriæ detrimentum & fatuitates succedunt. Quum autem multa sit differentia temperaturarū, pro maioris ac minoris ratione, multiformis sit uarietas causarum animales actiones laedentium. Obseruare igitur oportet somnos eorum

qui memoriam perdidit, aut intelligentiam: Intelligentiæ enim amissio fatuitas est: utrum somno leni sint ualde, an moderatus ipse sit somnus: Ita enim repereris intemperatam prædominantem. Insuper autem considerandum est utrum melia excrementa per os & nares de humoribus ex capite delabentibus, aut sicce appareant partes hæc. Si quidem igitur frigiditas sola est, calefacere solū conuenit, non item siccare. Si uero cū siccitate fuerit frigiditas, calefacere et humectare. Atque ego sane noui quendam qui ferme memoriam amiserat, & ratione laesus erat, ob studium & uigilias circa disciplinas. Alium item uinitorem ob uineæ labores similiter affectū. Et uterque ipsorum palam à calefacientibus ac siccantibus lædebat: Ab humectantibus uero simulque calefacientibus opem sentiebat. His autem prædistingctis curationem adnectamus. Si igitur ob purgationes quasdam, aut alias immodicas euacuationes, aut animi deliquita, fractis uiribus, memoriæ detrimentum succedat, refectoria diæta uti conuenit, nihil aliud curiosius moliendo. Roboratis enim corporibus & collectis uiribus, restituitur etiā memoria. Eodem uero modo si propter extremā senectutem accesserit memoriæ detrimentum, non oportet curiose quid moliri, sed solum conueniente diæta contentum esse. Quibus autem tem derepente deficit memoria, alia uero sana esse uidentur, in his comitalem successurum timere oportet, aut resolutionem, aut etiā syderationem. Et in summa magnum quoddam malum in ipsis comperies. His igitur sufficiunt aliquando præseruationes à morbis imminetibus. Dum enim morbi aduentum prohibemus, ex hoc etiā memoria conseruatur. Prohibent autem prædictos morbos, primum attenuans & incisoria diæta. Deinde etiā purgationes conueniunt, & similia. Si uero ex morbis uelut dictum est irruerit, uelut lethargo aut peste horum curationem contentiosius aggredi oportet. Summa uero medelæ est in calefaciendo uniuersum ipsorum corpus, intrinsecus ac extrinsecus, iuxta mensuram euacuationis habitus naturalis. Calefactoria quæ ferme calibus conueniunt æstate quidem oleum per se calidum: hyeme uero irinū cum aceto acriori, aliquando serpillio, aut spondyllo, aut calamintha in ipso cocto. Aliquando etiā nitro inlecto & pipere, aut bacis lauri. Commodum est etiā castorium cū oleo occipiti adhibitum. Auxiliatur autem his maiorem in modum hieræ Ruffi purgatio. Quandoque enim inquit huius solius purgatione usus, multum profecti in purgando, quum nihil boni secum detrahat. Incipit enim superne à capite detrahere, & postea etiā alias partes pertransit, nullam uiolentiam, nullum dolorem inferens, non ardorem, nō stomachi dolorem, non sitim. Verum semper pro euacuationis ratione alleuat. Unde etiā stomachum corroborat per purgationem, ut ciborum quoque appetentiā augeat. Creditur etiā post purgationem per hieram, eboris ramentum memoriæ opitulari, drachmæ pondere potum cum aqua mulsa, & similiter cerui cornu. Quin & castorium similiter drachmæ pondere potum, post purgationem cum aqua mulsa magnopere prodest. Maximum auxilium est & ueratri albi portio, non uelut quidam putant postremum, sed ab ipsa recte etiā quis incipere possit. Quid enim opus est diu & multum laboribus fatigari, quū ex ma-

ximo auxilio maximam medelam consequi liceat. Quare citra omnem formidinem ueracrum dādum est, priusquam eger per morbum excoletur, & uires auxiliæ exiles fiant. Commoda sunt quoque sternutatoria ex ueratro albo & castorio, naribus admota post euacuationes: & quæ naribus induntur ac infunduntur, & quæ pituitam per os detrahunt. Alimentum uero conuenit friabile & aliquo modo calefactorium ac attenuatorium. Ab pleribus autem omnibus frigescentibus abstinentum est, & à fructibus ac bellariis, caseo quoque ac lacte, & à cibis crassefacientibus ac instantibus. Alia enim ex ipsis spiritum conturbant, alia dēstant. Acriora uero ex interuallis exhibeantur, uelut sunt allia, thymbrā, origanum, pulegium, & raphani. Sed & horum copia uitanda est. Semper autem cruditas cauenda. Nam cruditates omni re magis mentem uiuifera. Vinum his conueniens tenue, album, & non ualde uetus. Per moderatam enim caliditatem tum alia non pauca potest, tum animam māsuefacit & ad tripudia aptam facit, motum ei præbens concinnum ac sedatum. Multus autem aquæ potus, & adhuc magis uini pessimus est. Caput enim ualde humectat. Multa autem humiditas obliuiofissima est. Somnus sic moderatus, & à repletione ne fiat. Veneris uero usus litrarissimus. Neque enim ad totam sanitatem conuenit, neque ad animæ rationationes. Imò & tristitiā inducit, & lamenatio illa in costu contingens, conuulsioni quodāmodo cognata est. Et per refrigeratio quæ succedit congelat quodam modo ac stupefacit intelligentiam. Cæterum post purgationes uniuersales ac locales, etiam sinapismus occipitis commodus est, & post sinapismum, balneum. Cruditas autem & lassitudo penitus uitentur, tum aliarum corporis partium, tum maxime capitis ac ipsius mentis. Vitandi quoque uehementes ardores ac frigora. Ambo enim caput replent. Vitanda & edulia crassefacientia, & instantia, ac humectantia. At uero si quis ex his progressum faciat, etiam in sanis qui humidius caput habent, uisus rationem commodam præscribere poterit, ut quis optimā memoria præstet.

De commorsis à canerabioso, aut his qui aquam triment. Ex Ruffo & Posidonio. Cap. xxiiii.

Quum canes natura calidi ac sicci sint, per æstatem ex ambiente nos aëre aliam caliditatem ac siccitatem acquirunt, & ob immoderatam intemperatam insanunt, & hæc insania rabies uocatur. Patiuntur autem hoc magis in illis regionibus, in quibus maxime & inæquales ambientis mutationes inordinate fiunt. In quibus & hyemes uehementes fiunt, & æstus excellentes. Insanientes autem canes, & si uehementi correpti potum nō admittunt, eò quod insanunt. Unde etiā magis intenditur ipsis uenenis malignitas. Signa canum rabiosorum hæc sunt. Muti sunt & adeo deliri ut ne familiarissimos quidem cognoscant, sed hos primum attingant. Cibum auersantur, & siticulosi quidem sunt, non tamen bibunt, & plerumque anhelant. Ore autem hiant, & linguam exerunt, ac saliuam largam & spumolam profundunt. Aures item inclinant, & caudam laxatam habent, segniūque incedunt & uelut somnolentiores existunt. Si uero etiā cucurrerint, uelocius solito currunt inrepestiue ac inordinate. Huiusmodi canes fugere oportet. Omnes enim qui à rabioso cane mori sunt, si me-

glecti fuerint, aut male curati, in affectionem timoris aquae incidunt. Et hoc maxime patiuntur qui vitiosis humoribus repleti sunt. Vnde quidam statim ubi commorfi sunt, aquam & alios liquores timet. Alii post quadraginta dies. Alii post longius tempus. Oñtingit autem ipsis grauior perturbatio, quum uquam, aut aliud quoddam pellucidum speculum uiderint. Aspiciunt enim faciem suam rubicundam, & toruē tuentem, atque ira plenam. Fieri autem potest, ut quemadmodum aliqui dicunt, etiam canis à quo morfi sunt imaginem in aquis apparere imaginentur. Recordati autem formae canis, cōfertim ab immodico timore corripiuntur. Hoc uero patiuntur ob immodicam siccitatem. Nam philosophus quidam morfi à rabioso cane, & generoso animo affectioni resistens, & inconsequens ratus canem in balneo apparere i apparebat enim ipsi quemadmodum etiam alijs hoc modo affectis. Ratiocinatus igitur & sic secum loquutus. Quid tamen & balneo commune est? superauit affectionē, & sanatus est ab affectione, ubi circa timorem bibisset. Quum igitur aliquis à rabioso cane commorfi sit, ei quā celerrime per receptam curationē auxiliari oportet, etiam si paruum & in superficie consistens fuerit morsus, de hac recerit, quod nullus ex his qui non probe curati sunt effugit. Primum itaque uulnus malus facere oportet, osculo ipsius per scapellum diuiso ac dilatato. Deinde etiam fissuris inculsis omnem circum circa locum uellicare, eo studio ut effluxum sanguinis multum per locum efficiamus. Vlcus uero cauterijs ignitis amplioribus inurere. Deinde porrum imponere, aut panem cum sale trito, aut cepas, aut allium. Et ubi crustae exdiderint, ulcera ad dies quadraginta aut sexaginta à cicatrice arcere. Et si ad cicatricem peruenerint, rursus per cinerem uitae aut ficulneum, & similia ulcera resoluerē. Hac de causa bonum est etiam folia marrubij, & anagallidem imponere. Hae uero etiam à cerasse serpente morfi magnopere auxiliatur. Vlcus autem perfundendum est chamæmeli, & radicis ruticis acuti, quem oxallidem uocāt, decocto. Noui ego quendam senem, qui ubi quis morfi esset à rabioso cane, sola oxallide curabat. Nam & ulcus decocto perfundebat, & herba integebat, & de ipsa bibendum dabat. Et hoc pharmacum uelut robustū ualde laudabat. Mingunt aut homines qui ipsam acceperunt multa & intemperata. Et propterea morbum regium haec expurgat. Nos uero etiam impediginem ex ipsa cum aceto confictam depellimus, & pruritus auxiliatur per eandem radicem. Videtur etiam ipsa ad morsus canis rabiosi cum alijs auxilijs. Similiter facit etiam syluestris rumex aculeatus, radicem habens oblōgam, uelut raphanus paruus. Commodum est etiam ipsis pharmacum Galeni ex pice brutia. Est autem hoc. Pice brutiae lib. i. opopanacis quadrantem, aceti heminas ii. Opopanacem cum parte aceti terito. Residuum uero aceti ad piceam adijce, & coque donec acetum cōsumatur, atq; ita ad tritum in mortario opopanacem diffunde, & unita excipe ac impone, & hoc pharmaco per dies quadraginta aut sexaginta utere, & nō permittes ulcus cicatrice includi. Bonum est & theriacam antidotū ex uiperis oleo rosaceo dilutū uulneri imponere. Sed & aridum hoc, ipsis cōuenientissimum est. Salis fossilis drach. vii. chalcididis drach. xvi.

scilla drach. xvi. rutae uiridis drach. iiii. æruginis rase drach. iiii. seminis marrubij drach. i. Reponitur siccatur in sole, in ærea pyxide. Utere primum sic, donec crusta inducatur. Deinde cum rosaceo, donec crusta exdant. Sed & potamogeton cum sale impositus non permittit incidere in affectionem timoris aquae. Utere autem hac herba & humida & sicca. Danda est antidotus theriaca in potu per primos tres dies, nucis auellanae magnitudine. Neque enim aliquem noui, qui eam accepit atq; timore correptum. Nec uero ab alijs auxilijs abstinendum est, sed danda maxime est antidotus celebris ex cancriis fluuiatilibus. Est autem compositio eius hæc. Cancro rum fluuiatilibus magnorum uluorum, in uase æris rubri ustorum cineris dextantem, gentianæ quicunq; cem, iuris unc. i. preparandum est hoc pharmacum mense Augusto luna decima octaua. Si uero nō affuerit quod sic preparatum est, nihil de hoc curiosus sis, sed quocunq; tempore paratum exhibe uelut dictum est. Præstat tamen lignis uitae exustione ipsorum facere. Dato cochlearij mensuram cū aqua calida ad dies quadraginta, si ab initio hac potione usus fuerit. Si uero non ab initio, sed post aliquot dies, dato quotidie cochlearia duo, donec impleueris quadraginta dies. Facit quoq; per seipsum cinis cancro rum potus, & cum melle uulneri impositus. Preparatur quoq; antidotus ex nucibus, etiam febricitantibus iam conueniens. Nam supra hoc quod affectioni resistit, etiam somnum conciliat. Compositio eius hæc est. Sagapeni drach. i. opij thebaici drach. ii. croci sesquiscrupulum, lycij indicij scrupulos x. & dimidium, carnis nucum iuglandium non ualde ueterum drach. x. excipe & exhibe drach. i. cum aqua pluuiali calida ad noctem, post uigorem febris. Ita ut mane quidem antidotū ex cancriis, uespero uero ex nucibus præbeas. Quod si hæ antidoti non adsint, dato confectionem cyphi appellatam, siue eam quæ ex rebus xxxvi. constat, siue eam quæ ex xxxviii. paratur, habueris: cōmodus est etiam succus cyrenaicus aut parthicus, sabæ magnitudine deuoratus. Quidam hepar ipsius canis qui momordit coctum præbent commorfo. Mergi quoque secur assatum datum cū oleo ac modico sale commodum est. Aliunt enim ita, efficax ipsum esse, ut eger euestigio aquam petat. Sed & hippocampus marinus assatus comestus prodest. Sanguinē enim ipsius amorē aquae inducere dicunt, & formidini aquae resistere. Vnde iterū atq; iterum hippocampum edere iubent. Et ipsos hippocampos cum acri aceto tritos ulceri imponunt, & hoc pharmaco sæpe rabiem superarunt. Quin & catuli coagulū cū aqua datum, utilissimē ab ipsis bibitur. Et ubi semel ipsum acceperint, assidue cōmouet ipsis potus cupiditatem, & bibunt etiam alios liquores intrepide. Oportet autē catulum non multorū dierum esse, sed recens natū & adhuc lactentem. Prodest ipsis etiam leucanthemū herba pota. Tantam autē eius uim esse aiunt, ut si ex ea fundum poculi sublinatur ac exhibeatur, ipsi libenter potum accipiant. Idem etiam de chamæmelo traditur. Utilissimum autem est ipsis bitumē Iudaicum potum cum aquae cyathis tribus. Datur ex ipso perfectis scrupulus unus, aut, uelut aliud exemplar habet, drachma una. Utiliter etiam datur syluestris fici uirgultorum cortex siccatus ac tusus & cum aqua potus. Et lycium indicum. Et ablinthum,

chium, & scordiū, & centaurea parua. Aristolochia, artemisia, chamædrys, bryoniae radix, polium, laser, cancerorum fluuiialium decoctū multo anetho cū ipso cocto. Substernitur autem commodè & insternitur ipsis ursæ pellis, & phocæ. Sed & hyænæ pellis efficacissima est, ut ipsis intacta uelociter mentē in integrū restituat. Quin & pellis hyænæ exusta, ita ut cinis in potu detur, affectionem formidinis aquæ sedat. Cognitionē autem an homo à periculo liberatus sit, ex his sumito. Vlcus nudibus regijs leuissimè tritis intege. Sequenti uero die solue, & cataplasma gallo aut gallinæ edendū obijce. Si enim ex elus esu nō mortui fuerint, tunc ulcus ad cicatricē perducto, nimirum uelut liberato ægro à periculo. Vtere autē eodem etiam ab initio ad dinodionem. Si enim gallina ex elu cataplasmatīs prima die impositi ulceri nō moritur, scito non à rabioso cane hominem mortuum esse. Si uero mortua fuerit, ulce uersa. Primum enim ne attinget quidem. Si uero à fame coacta ederit, morietur, si rabiosus canis fuerit. Hoc igitur quotidie alterare oportet, donec ex eius esu gallina non moriatur. Cæterum ulcus ipsum optimè ac tutissimè ad cicatricē perducit antidotus theriaca, cum rosaceo diluta. Vlceribus autem ad cicatricem perductis, ueratrum album præbeatur ad totius affectionis destructionem. Nam & rabiosi canes hoc cū posenta accepto uomunt, & statim resipiscunt à rabie liberati. Fieri etiam poterit quod opus est, si per Ruffi hieram infra purgaris, ubi quid prohibuerit ueratri acceptationem. Danda est etiam quotidie hiera, non ad purgationem, sed tanquam auxiliare medicamentū, nucis auellanae magnitudine, cum cyatho decocti saluæ, aut herbæ sideritidis, quam heracleam appellant. Quidam etiam sola ipsa utuntur, & multum prodesse dicunt, & propterea etiam Alyssum, ab eo quod rabiem eximat, ipsam nominant. In uictu indigentia & repletio uitanda sunt, & magis indigentia. Nam indigentia humorum malignitates augent, quod nequaquam commodum est ulceri maligno. Quapropter alimentum moderari oportet, quo & probe concoquat corpus, & succulentissimum ex bono succo fiat. Quin & egestionum quotidianarū & mictionum cura habenda est. Ad hoc autem faciunt & prædictæ radices, & scandix comesta, & fœniculum. Cretinum autē tum uentrem, tum urinam mouet. Cichorium uero syluestre etiā stomacho commodum est crudum comestum. Appellant ipsum aliqui ferim, aut picridem. Commodus est & brasiæ asparagus, & asparagus palustris, & rumex hortensis, & agrestis, & acutus. Et ex piscibus qui tenerā carnem habent gammari & cancri, & herinacel recentes cum uino mulso. Ex carnibus extremæ partes, & uolucres omnes montanæ, concoctu faciles ac boni succi. Vinum tenue & albū, non ualde uetus. At uero præseruationis gratia singulis annis appropinquante tempore, per hieram præpurgari oportet. Et instante iam die theriacam antidotum accipere per triduum.

De cerebri inflammatione.

Cap. xxv.

Cerebrum inflammatū sæpe ita intumescit, ut etiam suturæ capitis disparentur, & dolorem maximum ac exurentem compressis membranīs inducit. Consequitur nausea stomachi multa, & bilis uomitus, & rubor multus in facie consistit, & oculi prominent, & facies intumescit, iunctq; totū caput. His ergo uena

secunda est à cubito. Oportet quoq; à naribus & uenis sub lingua sanguinem euacuare. Vtere etiam irrigationibus capitis, quarum usus alijs ad inflammationes adhibetur, & cataplasmatīs humectantibus & concoquere ac maturare potentibus.

De erysipelate cerebri.

Cap. xxvi.

Fit & erysipelas, hoc est, ignis sacer, in cerebro, & patitur æger hæc. Dolet totum caput, & uidetur sibi flammā in ipso habere. Et facies ipsius frigida est, itemq; præcordia. Et os siccatur. His igitur uena secetur, & præsertim uenæ sub lingua incidantur. Forinsecus autem adhibe capiti frigescentia ungenta, & pastillos quibus ad erysipelata utimur.

De syderatione.

Ex Galeno. Cap. xxvii.

Syderatio propter repentinum exortum, indicat humorem crassum, aut frigidū, aut uiscosum implere principales cerebri uentriculos, & non propter intemperiem totius essentia eius fieri. Magnitudinē itaq; periculi, ex magnitudine lēSIONIS respirationis cōsecuta. Quum enim respirationem multū impediri, & uix fieri uideris, non paruam morbosam affectionē cōijce in cerebro factam esse. Est autem syderatio Græcis apoplexia appellata, priuatio sensus & motus totius corporis, unā cum lēSIONE principalium actionum, de repente incidens. Ex Archigene. Syderationis affectio ex natura magna est, & uehementer acuta. Contingitq; ut qui periculū effugerunt in diuturnū morbum incidant, resolutionis aliquarum partium, aut etiā totius corporis, aut etiam uiolatæ rationis. Sensibus autē magis accidit affectio, & magis in hyeme, & cōstitutione frigida, & ex uehementibus cruditatibus, & ardoribus uehementibus, & immodico uini potu ac ebrietate. Talia enim habitū perfrigerant. Et in summa qui in hanc affectionē collapsi sunt, uiuentes sunt cū mortificatione, aut cū tota sensus priuatione. Primū igitur corpus oleo calido inungendū est. Caput autē rigadum rosaceo cum aceto. Coquendū est autē in aceto serpillum aut spondiliū. Odoramenta quoq; adhibenda sunt, castorium, opopanax, & galbanum. Et aperto ore instillandū est acerū mulsum. Et pinnae oleo cyprino, aut irino, aut narcissino imbutæ immittendæ sunt, & uomitus prouocandus, & sedes assidue illinenda cū ruta & cumino, addito nitro ac melle, ad flatum prouocandos. Si uero hæc nihil profecerint, clysteribus utendū est ex decocto surfurum, & cucumeris syluestris radice, & centaurio, nitroq; ac melle. Aut ex muria cum melle ac oleo rutaeco. Enitendū autem est ut quod insusum est emittatur, per lūborum ac uentris frictionē. Et si opus fuerit etiā digiti in sedē immittantur & obiuamēta educantur. His peractis uenā secare oportet periculo prædicto. Detractio autem fiat e dextra manu, & copia eius qui detrahitur diuidatur. Commouere enim oportet tantū, non exoluere uires, & calorē extinguere. Inspiciantur etiā pulsus in euacuatione, & facies color, ac respiratio. Et si nihil mali cōsequitur, etiam repetenda est detractio. Post uenæ sectionem, adhibeantur odoramenta excitatoria, & uociferationes. Et corpus totum inungatur. Et si qua pars resoluta fuerit insigniter, hapso lanæ integatur sicyonio aut pingui ueteri oleo imbuo. Qui uero ad uenæ sectionem inepti sunt, primum ad uomitum, uelut dictum est, cōmoueantur, & sedes ipsorum illinatur his quæ flatum educunt. Deinde post illusiones, cucurbitis cō-

cutere

resolutis ex
ardore nō f

cutere conamur magnis & fortibus, retrorsum iuxta lumbos affixis, & ubi per tempus aliquod attraximus, transferimus ipsas utrunque ad pectinem ac inum ventrem. Sæpe enim expresserunt ea quæ in ventre sunt, & simul cum expressione reuocarunt morbo occupatos. His uero nihil efficientibus, aliquando ipsi ausi sumus ori hieram infundere. Et quæ suscipere non possent, quantum oportet, per clyster infundimus. Et priusquam quicquam egeretur, accidens concurrentia reuocarunt me ad ampliorem aggressionem. Et sane permittit hæc affectio, ac cogit uel temere omnia tentare. Hæc igitur in necessitate sunt. Vbi uero tolerare possunt, etiam reliqua auxilia annecte. Febris tamen occupat hominem, alios prima, alios secunda die, & exhibet spem salutis ipsa calamitas febris. Sed neq; negligenda est. Verum si qua resident in intestinis, ea educere oportet. Si deorsum repant, per clyster. Si sublimia sint, per purgatorium inferne pharmacû, & maxime per hieram Archigenis. Post purgationem cucurbitæ præcordijs ac capiti affigantur cum scarificatione. Si uero aliqua compunctio etiam inferius fiat, illic quoq; scarificatio adhibeatur, præsertim in mulieribus, iuxta uteri regionem. Quod si ad aliam quandam affectionem transitus fiat, curatio ad illam adaptetur. In summa uero prouidendum est in syderatis, ut facilis fiat per aluum ac urinas excretio. Curandum est autem ut accipiant cibos quotidie quidem, uerum paucos & leues ac calidos, & exterioria uel præditos, pleneq; cum melle edulcatis.

De resolutione, ex Archigene, Cap. xxviii.

Quum omnes nerui sensum simul ac motum amiserunt, Syderatio appellatur affectio. Si uero iuxta alteram partem, siue dextram, siue sinistram hoc contigerit, Resolutio uocatur, illius partis uidelicet iuxta quam facta est. Conflat hæc affectio, humoribus multis uiscosis ac crassis neruos obturantibus, per quos motus uoluntarij perficiuntur. Manifestum igitur est quod redundantem humorem euacuare oportet. Nec uero apud principium in his reperire datur quam a uenæ sectione, si quidem permiserit ætas, habitus, tempus, studium, prægressus uictus, & reliqua quæ prohibere solent uenæ sectionem. Oportet autem moderatam detractionem facere, ut ne perfrigerentur. Frigiditas enim cum siccitate, uelut dictum est, affectionem inducit. Quapropter solum imminuenda est materia paululum per uenæ sectionem, & præsertim in prouectiori ætate. Detrahit uero hæc a lenioribus partibus. In hoc autem tempore contexta esse oportet mēbra, hapso lanæ oleo sicyonio aut glucino imbuto. In prouectioribus ætate etiam castorium inspergendum est irrigationi. Ac in his qui de repente resoluti sunt, uelut ex ardore, præstat irrigatio ex lanis succidis, & oleo ac aceto, aliquando etiam nitro. Sæpe uero irrigatione renouare oportet. Cibus conuenit his modicus. Sint autem sorbitiones alicæ lotæ, & succi ptisanæ. Interpositis diebus quibusdā a uenæ sectione, alius subducatur, primū clysteribus. Deinde etiam per aloës & polypodij ac colocynthidis cremorem purgetur. Conuenit etiam hiera Archigenis pro uiribus accepta. Post purgationem cucurbitæ affectis partibus adhibeatur. Si uero hæc ineptæ fuerint, ulcinis affigatur. Post cucurbitas utendum est cataplasmatibus ex semine lini, & fœno græco, ac ordi farina, cum oleo ueteri coctis,

& pulueribus insperfilibus ammixtis. Aut etiam emplastris quæ acceperunt picem, resinam, mannam, thuris, aliquando etiam bitumen. Egregie facit & artemisia coincta, & calamintha, ac ruta, & conyza. Postea uero etiam nitrum ammiscemus, & in muria cataplasmata coquimus. Modicam autem aquam esse oportet, quæ & ipsa in coctura consumatur. Postea autem pro lini semine, farinam loliaceam & fabaceam adhibere conuenit. Optimum est & erysimum. Deinde cerata & ungenta adhibeantur. Alius autem semper facile solubilis sit. Catapotia ad resolutiones, tremores, & opisthotonicos. Succus cyrenais, piperis, galbani, singulorum drach. i. passo dissoluito ac facto catapotia, & dato ex eis obol. ii. & his acceptis absorbeant aquæ mulsæ cochlearia duo aut tria. Aliud ad tremulos, resolutos, & opisthotonicos. Myrrha, castorij, styracis, piperis, æqualibus partibus utere. Aliud. Opopanacis, sagapeni, castorij, myrrhe, succus cyrenais, piperis, uirgultorum rutæ, singulorum drach. i. præpara catapotia & exhibe, & insuper absorbeant aquam mulsam. Ungenta uero idonea sunt huiusmodi. In aliquo ex prædictis oleo scillam macerare oportet in sole ad dies quadraginta. Si uero tale oleum non affuerit, in præsens scillæ sententem in oleo sextario coquere oportet. Similiter etiam canchry, hoc est libanotidis semine utendum est. Ammiscendum est & ceræ parum, & galbani, & propolis, aliquando etiam castorij unc. i. & adarces ac euphorbij, sing. drach. iiii. & nitri drach. iiii. Commoda est quoque ranunculus herba similiter præparata. Manifestum est autem quod a lenioribus incipere conuenit. Sed & cerata ex his parari possunt, adiecto pyrethro, baccis lauri, nitro, sinapi. Malagmata uero conueniunt ex baccis lauri, & quod uiride appellatur. Sæpe uero sufficit ceratum cyprinū, largo sinapi ammixto, quod malagmatis usum exhibet. Conueniunt etiam smegmata ex fece uini, & aceto, & combusta adarce, euphorbioq; ac calce uiuæ parata. Sed & dropaces ipsis commodissimi sunt. Sint autem leuia omnia quæ imponuntur, propter corporum debilitatem. Reuocat autem sensus etiam thapsia cum aqua illita aut cum aceto, post dropaces. Item illitio ex cantharidibus. Verum ulcerationes ex talibus sientes cicatrice diutius includere oportet. Quin & sinapismi ipsis commodi sunt, & postea balneum. Utendum est post purgationem etiam potonibus ipsis conuenientibus. Castorium itaq; assidue ipsis detur drach. ii. pondere cum aqua mulsæ. Et opopanax magnitudine fabæ, cum castorio, & sagapeno erui magnitudine ab ipsis deuoretur. Item succus cyrenais eadem magnitudine, Sed & sarmentorum uitis uiridiū decoctum, a ieiuniis assidue potum, ualde prodest partibus corporis resolutis. Vtilissima est etiam post purgationes & alias euacuationes, theriaca ex uiperis antidotus, & mithridatica. Est & simplicius pharmacum ualde celebre ad huiusmodi affectiones, hoc. Castorij, seminis rutæ syluestris, opopanax, sing. obol. ii. pyrethri obol. i. acori tantundem, piperis grana x. Cū aquæ mulsæ cyathis ii. dimidiū huius totius primū dato, robusto uero totū. Vniuersa uero curatio a capite initiū sumat. Hoc enim radix est & principium totius affectionis. Quapropter illitiones ipsius sint, castorij, peucedanum, baccæ lauri, & menta. Hæc modico acri aceto excipiatur, addito irino

Immo unguento, ut liquidioris cerat crassitudo fiat, & illinatur ex hoc totum caput usque ad frontem. Sed & odoramenta eiusdem generis adhibeantur. Postquam autem alius efficacior clystere praeuacuata est, & totum corpus iam minus superfluitatum habet, cucurbitae capiti adhibeantur cum scarificatione, primum quidem tali quae multum sanguinem extrahere potest. Deinde uero moderatiore. Hoc autem auxilium saepe adhibendum est, leuibus & inanibus cucurbitis primum capiti circumpositis, & deinde locis agglutinationis. Sic enim affixae nihil minus quam repetita sanguinis detractio possunt. Tonsura uero non solum cucurbitarum gratia, sed etiam per seipsam asidue fiat. Si uero ambiens nos aer non fuerit frigidus, etiam rasura commoda est. Statim autem praedictis illitionibus caput modice confricandum est. Postquam autem detracta fuerit materia, etiam sternutatorijs & pituitam per os ducentibus utendum est. Ego uero etiam crustas inurere non dubitarim per ignem, aut per medicamentum. Vnam quidem circa occipitis cauitatem, quo loco spinalis medulla initium habet, duas autem ab utraque ipsius parte. Tres aut quatuor in uertice. Vnam ex his in medio capitis, tres circum ipsam. Vlceribus enim diutius fluidis permanentibus, non despero perfectam restitutionem. Reliqua dicta sit attenuatoria, uentri comoda, nihil viscoli aut uisosi habens. Et quae urinam clementis alimentis ammiscetur. Utendum est etiam potionibus relatis ad morbum comitalem, & unguentis ad arthriticos referendis. Quum enim communia sint haec, superfluum est eorum etiam hic meminisse. Si uero fuerit aestas, etiam in totum detegantur loci, & denudati aeri exponantur. Quibusdam enim hoc tempore principium recuperationis actionum conigit.

De supercilijs aut palpebra resolutione. Cap. xxxix.

Si supercilijs aut palpebra fuerit resoluta, curabuntur unguentis calidioribus & acrioribus fronti illitis. Palpebra uero collyrio ex sandace & germinum oleae succo illinatur. Optimum autem in ipsis, & maxime in supercilio relaxato, hoc. Mastiche cum succo brasicae non lotae terito, & disticta si onis cute, fronti crassius illine. Perseuerante uero affectione, palpebra quidem sutura curat. Supercilijs uero fasciola de fronte ablatis.

De conuulsione canina.

Cap. xxx.

Caninam conuulsionem uocant mandibularium musculorum resolutionem. Distorquetur igitur in obliquum os, nasus, & oculus, & in summa, dimidia faciei pars. Auxilia itaque resolutae parti adhibeantur, non oppositae. Decipiuntur enim aliqui, qui mandibulam ab opposita parte distrahi putant. In communi igitur ipsis commodant omnia in resolutione relata. Nam & sanguinis detractio, si nihil prohibuerit, & purgatio, & clyster, & cataplasmata, & unguenta, & malagmata, & sinapismi, & rapae usus, conducunt. Priuatim uero deligatura quae ad opposita reducit. Et sanguinis detractio a uenis sub lingua. Et cucurbitae duobus uerticulis impositae. Et quae pituitam per os detrahunt, itemque quae per nares. Iam uero etiam acris illitionibus utendum est ad oculi affectum, praesertim collyrio ex sandace & germinum oleae succo.

Linguae resolutae curatio.

Cap. xxxi.

Si lingua fuerit resoluta, uenae sub ipsa secantur, corpore uniuerso prius euacuato. Et cucurbita sub mentum ponatur. Et quae pituitam per os detrahunt, & collu-

tionem ex sinapi, & linguae exercitia adhibeantur. Reliqua item occipitis ac collo uniuerso admoventur, uelut sunt illitiones acres, & epithemata, & sinapismi.

De instrumenti uocalis resolutione. Cap. xxxii.

Resoluitur & uocale instrumentum, faucium inquam musculi, & extremitatis asperae arteriae, imò etiam thoracis superiores. Spiritus itaque in ipsis supprimitur. Quidam etiam gracilem uocem acquirunt. Alii uix loqui possunt. Et alij aliter uox impeditur. Proinde post uniuersalia auxilia, etiam thoraci adhibeantur ea quae antea enumerauimus. Et gargarismi acres in ipsis exhibeantur. Priuatim uero ad ipsos uocem est spiritus detentione, & coaceruata expiratione, & continua uociferatione. Post haec autem per uictum ac exercitia uniuersum corpus corroboretur.

Deglutitionis resolutae curatio. Cap. xxxiii.

Si deglutitio resoluta fuerit, hoc est, delatix ciborum promptitudo: nam si stomachus, hoc est, gula resoluta fuerit, perniciem inducit: calida omnia adhibenda sunt. Priuatim uero conandum est ut cibi indatur quam penitissime, ut ne ad asperam arteriam dilabatur. Cucurbitae quoque mento affigantur. Et unguenta usurpentur ad partes iuxta tonsillas acris, ex castorio, sagapeno, succo cyrenaeico praeparata. Gargarismi itaque ex sinapi. Et quae comasa pituita ducunt. Forinsecus quoque adhibenda sunt illitiones communes praedictae ipsi mento.

Vesicae resolutae curatio. Cap. xxxiiii.

Vesicae resolutio siue detinuerit urinas, siue inuoluntarie excreuerit, nisdem communibus auxilijs curabitur, circa pectinem & maxime circa intercapedinem inter anum ac scrotum adhibitis, qua parte situm est uesicae collum, quem locum quidam siran, id est carenulam appellant. Utendum est autem supra praedicta, irrigationibus pectinis ex unguento nardino, & mala bathrino susinoque ac sicyonio, in quo cocta est eryngii radix, cyperus, cardamomum, ruta. Sed & sedes his illinenda est. Post communia uero auxilia, etiam per infusa in anum conandum est reuocare uesicae actiones. Sunt autem haec, a principio quidem castorium cum oleo sicyonio, aut ruta, aut cumino, aut anetho in oleo cocto. Deinde centaurea & colocynthis decoctum, ita ut modo cum aqua, modo cum pisanae succo simul coquantur. Optime facit & anagallidis succus. Et origani ac thymi decoctum. Omnibus autem ammiscendum est oleum sicyonium & castorium. Aliquando etiam opopanax & galbanum in ipsis eliquamus, si frigoris sensus ipsis affuerit. Infundimus etiam per eodem oleum sicyonium cum castorio aut opopanax. Quandoque etiam silphium in oleo coquimus. Priuatim uero in his qui urinas detinent cathetere instrumento immisso ad urinas prolestandas utimur. Et post urinae euacuationem, cathetere adhuc in sito, aliquod ex praedictis infundimus, angustissima fistula ad utrumque parata, quae catheteri adaptari possit. Et mirum est quanta inde utilitas emergit, ex infuso uidelicet post urinas excretas. Utendum est autem in utrisque etiam urinam clementibus, per interualla: Velut est sion, & iunci odorati flos, ac similia. Utendum & aceto ac uino susino. Dicitur autem de his amplius in Sermonem de affectionibus uisae.

Colis resolutae curatio.

Cap. xxxv.

In colis resolutione urinae excretionem non impediuntur. Seminis autem excretio & coitus impeditur. Oportet igitur auxilijs ad uesicae relatis uti. Priuatim

uero nunc etiā coxendicibus calefactoria adhibere. Etiam quoque tentiginem sciētia, de quibus suo loco dicitur, exhibere. Facit autē cum reliquis pudendum cerui femori uelut zona alligatum. Et carnes ipsius comestae, & polypi marini, & herinacel. Et ex uolueribus sturni. Castorium autem in omni resolutione commodum est. Cauenda uero sunt in ipsis omnia frigida edulia ac potiones.

• *Intestini recti resoluti curatio.* Cap. xxxvi.

Intestino recto resolutio omnino inuolūtariē stercora excernuntur. Aliquando uero etiam sistuntur. Itaque etiā auxilia eadē sint quae in uesica sunt relata, coxendicibus adhibita. Priuatim uero in his, nūc adstringētia & corroboranda, nūc pingua & leuia, per clysterem infundimus, & rursus mordacia ac lancinantiā. Proinde cupressi ac rubi decoctum adstringit, maxime ubi immodicē egerit. Suillus autē & anserinus adeps, & oleū maluae maxime pinguefacit ac lenit, ubi stercora supprimuntur aut acria existunt. Muria uero & colocynthidis decoctū, itemque centaurij, artemisiae, conyzae ac thymi lancināt ac mordent. Egre gie facit & trifolij bitumē olentis decoctū. Quum autem frigiditatis sensus affuerit, commodum est silphij, & gentiana, & bryoniae radix, in omnibus infusis sedis. Ego uero aliquando etiā acopon lassitudinē eximens ex euphorbio paratum dilutū, per clysterem cum foeni graeci decocto immisi, & bene successit.

• *Cruris aut alterius cuiusdam membri resoluti curatio.* Cap. xxxvii.

Si crus aut manus, aut aliud membrum resolutum fuerit, communia auxilia in resolutione relata adhibeantur, & exercitia moderata unicuique parti congrua. Utendum est etiā in omni resolutione unguentis quae ad arthriticos referuntur. Cibi uero sint in omnibus faciles cōcoctu, attenuatori, uentri commodi, nihil uiscosi, aut mali succi habentes. Vinum sit album, tenuē, & non ualde uetus. In summa uitanda est corruptio, frigiditas, ardor, oedum, lassitudo, coltus, uini multi potus. Ex epistola Archigenis ad Marsum, potio resolutis conueniens, de qua sic ait: Optimum est hoc pharmacum, & ad eiusmodi affectiones ualde a me probatum. Castorij, seminis rutae syluestris, opopanax, singulorum obolos ii. pyrethri, acori, singulorum obolum unum, piperis grana x. Cum aquae mulae cyathis ii. dimidium ex hoc primum dato: robusto uero totum. Indicat autem obolum habere si liquas tres.

• *De conuulsionibus aut distentionibus.* Cap. xxxviii.

Quum statim a principio, aut non multo post principium morbi, sunt conuulsionē, & permiserint, ex repletionē originem ducunt. Quum autem multis sudoribus praegressis, aut uomitibus, aut uentris excretionibus, aut sanguinis eruptione, aut post uigiliis, aut fame, aut motus multos & uehementes conflatae fuerint, ad euacuationem consequuntur. Et ubi etiam in sanis contigerit aliquas partes repente conuelli, ob repletionem fieri necesse est. Si uero ex febribus ardentibus succedit conuulsio, ob uehementē nimium totius corporis, & maxime nervosarum partium siccitatem contingit, & est huiusmodi malum maximum ac fere incurabile. Quum igitur corporis partes antrosum distenduntur, emprosthotonus appellatur: quum retrorsum, opisthotonus, quum uero aequaliter in utramque partem tenduntur, tetanus uo-

catur, conuulsionē itaque ob uehementem siccitatem nemo curauerit. Eas autem quae ob plenitudinē aut inflammationem sunt curaueris, plenitudinem quidem euacuando, inflammationem uero, proprijs ipsis auxilijs adhibitis. Fit etiam conuulsio in his qui uehementer ob uomitus lancinantur, & sedatur ubi quae molesta sunt per uomitū fuerint reiecta. Auxiliatur conuulsis succus centaurij tenuis potus, & fesele cum aceto mulso aut posca. Castorium autē non solum potum, sed etiam foris illitum commodat. Atque haec exhibemus his qui ob plenitudinem conuelliuntur.

• *De Tetano siue distentione & conuulsione.* Ex Archigene. Cap. xxxix.

Quid significet tetani nomen, iam antea dictū est. Corripuntur autem hac affectione cum ob alias causas, uelut dictum est, tum ex uulneribus, & in foeminis ex abortu. Verū tetani ex uulnere fientes non ita sanantur. Neque autem pueris, neque senibus conuulsio fit tetanica. Infantes enim magis infestat morbus comitialis. Quare negligendū non est, sed uena secanda, si distentio ex uulnere cōsequitur. Copia uero detrahenda est multa quidem, sed tamen non usque ad animi deliquitum. Et paulo post exhibeatur alica cum aqua multa. Sit autē modicum quod exhibetur. Et ex aqua & oleo tepido aegri illinantur, & in solio desideant infra umbilicū. Oportet autem & partes quae non madescent praesertim caput, & probe contegere ut ne impleatur. Ungenta autem & illitiones adhibeantur ex oleo sicyonio & gleucino, aut irino, aut oleo ueteri. Conueniunt & ungenta lassitudinē eximens moderatē calfacienda, uelut est quod foetidū appellatur, & quod ex sampsocho fit, & quod ex populo nigra, & similia. Quorum cōpositiones in Sermone de arthriticis referuntur. Si uero non a uulneribus, sed ex repletionē fiat tetanus, post uenae sectionem, ungentis magis lancinantibus utendum est, quae adarcen habet, & similibus. Deinde etiā cataplasmata locis affectis adhibeantur, quae laxare ac discutere possunt simulque lenire. Et haec maxime musculis circa collū & maxillas ac spinam adhibeantur. Horum autem materia sit foenum graecū, & semen lini, & farina ordacea ac loliacea. His addatur terebinthina resina, & galbanū, & mel ac oleum multū, in quo decocta sunt ruta, conyza, aut artemisia, aut libanotis. Infariatur etiā aliquando ammoniacum thymelasma. Sint autem mollissima ac leuia cataplasmata. Sed & fomentum adhibeatur incumbente cataplasmate, ex uesica magna & oleo calido semiplena. Aut ex oleo frictū, aut ex nillo in sacculis. Sed & cataplasmata in saccos coacta imponantur, ut fomentum circa inquit namentū fiat, & praesertim si capiti id imponere oportet. Vitandae autē sunt assidue irrigationes capitis. Caput enim inde repletur. Occupet cataplasma & frigidū, ceruicem & maxillas ac totā spinam usque ad lumbos. Inspergatur irrigationibus castorium. Et cucurbitae cum scarificatione locis affectis omnibus affigantur. Temporis autem successu etiam folia ex oleo assumantur moderate, bis aut ter in die, ita ut quinta olei pars ad ignē calefiat, reliquum in solium mittatur. Domus autem calida appareat. In potu conueniunt optimū apomeli, & radices silphij decoctū, & ipsa trita, & hyssopi decoctū, & succi cyrenacel magnitudo erui deodorata, & myrrhatroglodytica magnitudine fabae. Ex omnibus autē minime offendit, & maxi

& maxime efficax est castorium tritum datum cochlearij mensura. Post hæc commodant sedis illitiones ex ruta & opopanace. Auxiliatur & olei infusum rutacei cum terebinthina. Danda est ipsis & Archigenis hiera drach. ii. pondere cum pari castorio, cum ptisanæ succo ac melle. Deinde quædam ex alijs dentur, & ipsum castorium per se.

De capitis dolore distinctiones. Ex Galeno. Cap. xli.

Qui citra distinctionem doloris capitis auxilia descripserunt, maius detrimentum quam emolumentum his qui eis fidem habuerunt, attulerunt. Neque enim omnes ob unam affectionem caput dolent. Sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singularum propria existit. Una enim affectio est iuxta intemperiem simplicem citra humorum complexum. Alia iuxta humorum qualitatem. Tertia uero multitudinem tantum ipsorum humorum contingit. Quarta quum multitudo hæc transitus humorum ac uaporum obturatur. Et ad has adhuc alia, quum ob imbecillitatem in aliquibus capitis partibus spiritus flatuosus innascitur. Vehementissimi igitur capitis dolores sunt iuxta caliditatem ac frigiditatem. Moderati uero iuxta siccitatem. Ad humiditates autem nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores, siue iuxta omnes capitis partes, siue iuxta unam quancunque tandem dolor congerit, uehementior quidem ob calidos ac frigidos; moderatior autem ob resiccantes citra caliditatem aut frigiditatem manifestam oboritur. Humefrantes autem penitus nullum dolorem inducunt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet. Nam ob multitudinem, citra quidem obturationem, grauatur caput. Cum obturatione uero dolores inducunt. Si uero multitudo mordacem qualitatem habuerit, dolorem augebit. At uero spiritus flatuosus & uaporosus distensionem efficit citra mordacitatem.

De dolore capitis ex ardore aut caliditate oborto. Cap. xli.

Capitis dolores ex ardore solis, aut caliditate obortos sanant quæ frigefacendi uim habent, citra manifestam adstrictionem. Optima uero ex ipsis sunt quæ essentiam tenuiorem habent. Quapropter nihil melius est ab initio quam optimum rosaceum frigidissimum factum, & sinicipiti affusum. Sic autem rosaceum eo anno factum ex oleo omphacino, citra salis ammirationem. Proximum a rosaceo locum habet chamæmelinum, ubi moderatam frigiditatem inducere uolumus. Quum enim uehementer frigefacere uouerimus, semperuiui succum ammiscere conuenit, aut polygoni, aut lactuæ, aut uuæ acerbæ, aut portulacæ, aut pampinorum uitis, aut psyllij, aut intybi. Papaueris autem & mandragoræ succus uehementer frigefacit. Quapropter nociuus est. Cæterum Erastriatus maximum præseruatuum in calidioribus habitibus esse dicit, ubi quis in sole uersaturus sit, si spogiam latam, densam, aqua imbutam, & probe expressam capiti imponat. At si dolorosa caliditas in capite inualecat, unam cum spiritu flatuoso, ab initio quidem curatione perrepulsoria utendum est, quæ ex adstringentibus ac frigefacientibus contingit. Postea uero ex mitigatorijs ac concoctorijs medicamentis aliquid ad repulsoria ammiscere oportet. Deinde etiam ex discussorijs quippiam addendum, paulatim detractis pharmacis quæ repellunt.

De dolore capitis in febribus.

Cap. xlii.

In capitis doloribus in febribus coincidentibus, uenasecanda est in prima aut secunda remissione, si nihil impenderit, & præsertim in bono habitu præditis ac multo sanguine refertis. Animaduertendum est autem, ne ob exhalationes ex uentre fiât, aut propter aluum suppressam. Si uero posterius post septimam irruant, præuacuata memorabiliter per clysterem aluo, cucurbitæ occipitio aut ceruici affigantur. Et caput ex olei irrigationibus mitigetur, rosacei quidem, in calidioribus, & hora æstatis, cum modico aceto, chamæmelini uero in non ualde calidis. Anethini autem in frigidioribus habitibus, & in hyeme, quinta aceti parte addita. Frons uero illinenda est ex cypheos coctione in frigidioribus. Crocomagmate autem in calidioribus. Porro medelæ doloris capitis ex febrium magnitudine oborti, in febrium tractatione supra descriptæ sunt.

Ad capitis dolorem ex ebrietate, & meri potu.

tu.

Cap. xliii.

Vina temperie calida maxime generant capitis dolorem, ut quæ omnino quidam uaporibus caput replent, aliquando uero etiam humoribus calidis. Proinde opus est multitudinem quidem euacuare, caliditatem uero frigefacere. Rosaceum igitur aut tale quoddam non ualde frigidum satis est capiti adhibere. Somnum item ac quietem. Et ubi talia per totum diem fuerint adhibita, in uesperam lauare oportet, & boni succi cibis nutrire, non tamen calefacientibus. Qualis est ptisanæ aut alicæ succus, & panis ex aqua, & ouæ sorbilla sine garo, & lactuæ feruifactæ. In potu omnino utendum est aqua. Post omnem uero cibum, parum dandum est de malo puniceo, aut piro, aut pomo, aut uua passa. Sequenti uero die lauetur, & boni succi cibo nutriatur. Et usum tenue album modicum detur. Cæterum præsumpta ebrietatem arcet hæc. Amygdalæ amaræ quinq; aut septem a ieiunio comestæ. Vinum absinthices aut myrteum præsumptum. Et ipsæ myrti bacæ præsumptæ. Brassicæ cauliculi præcomesti. Ebrietatem autem extinguunt postea ingesta, centaury tenuis decoctum, ceruinum cornu, uerbenacæ rectæ semen cum aqua.

Perfrigerati capitis medelæ.

Cap. xliiii.

In capite recens frigefacto, rutaceo oleo calido siniciput irrigare oportet. Si uehementiore caliditate opus habuerit, parum euphorbij oleo injiciatur, aut unguentum seinum illinatur, aut amaracinum, aut laurinum, aut serpillinum, aut nardinum. Frons quoque talibus inungatur, & narium ac aurium meatus illinantur.

De capitis dolore à stomacho.

Cap. xlv.

Quidam etiam si modicus in uentre, & maxime circa os ipsius, humor acris fuerit collectus, statim caput dolent, humoribus in uentre prauos uapores ad caput mittentibus, ut aliquibus ipsorum suffusis similia symptomata accendant ex exhalationibus, si non cibum ingesserint. Et propterea famem ferentes læduntur. Augescit enim ipsis huiusmodi humorum malignitas propter inedia. Oportet itaque sic uexatos sanare, ita ut nihil capiti adhibeamus, uerum quam citissime molestos uentris humores euacuemus, aqua tepida exhibitam in potu, et immixtis penitus uomitu proritato. deinde uero post modicum interstitium cibis boni succi et stomacho comodus detur, si fieri poterit post uomitum.

o 4 Sin

Sin minus, ante balneum. Atque hic tantus sit ut ne laedantur dum lauantur. A coena uero parum bibant, & sequenti die mane abstinentio & eadem diæta utantur. Et de cætero quotidie circa horam tertiam aut quartam modicum panem accipiant cum oliuis albis, aut cū uua passa, aut aliquo huiusmodi, per experientiam reperto, eod quod singulis optimum est. Aliud enim aliq optimum est, iuxta naturę proprietatem. Interpositis autem horis duabus balneum petant. Pessima porro affectio est, ubi uisiosis humoribus in uentris tunicis absorptis, aut inelutibiliter infartis, nausæ ac lancinationes inducuntur. Quibus optimum auxilium est aloë pharmacū, quod aloës quidē habet drachmas centū, reliquorum uero quæ recipit singulorum drach. vi. croci uero drach. iiii. aut minus, crocus enim caput percellit. Datur ipsis ex hoc pharmaco drach. i. cum aque cyathis duobus. Cauenda autem sunt in omnibus, & præsertim his, edulia natura capitis dolorem inducentia.

Quæ ex natura capitis dolorem inducūt. Cap. XLVI.
Non solum in his qui caput per stomachi consensum dolent, sed etiam in omnibus capitis affectionibus, uitanda sunt quæ natura capitis dolorem inducunt. Sunt autem hæc uisiosis semen, absinthij succus, lactis potus, glandes quercinæ comestæ, oliuæ nigrae, mecumyla, eruum. Hoc etiā articulos exoluit. Amplius autem lædunt myrrha, thus, hederæ corymbi. Mentem uero perturbant lentisci fructus, crocus, peucedanum, cyclaminos sicca cum uino pota, styrax modicus quidē potus, tristitiam discutit, multus autē turbulētos somnos facit.

Ad dolorem capitis ob plagam. Cap. XLVII.
Si uulnus ob plagam facta fuerit, glutinatorijs & inflammationem arcentibus pharmacis utendum est, postquam ulceris labia fibulis impositis constrinxerimus. Si uero usq; ad pelliculam os caluæ ambiens, oseeq; conscalpro, iuxta concarnationis modum curare oportet. Coniungit autem non parū sæpe, in casu præsertim ex sublimi facto, ut quædam partes circa cerebrum aut membranas eius abruptantur, quando sanè etiam periculum uehementius & acutius imminet. Optimū itaq; fuerit in his, nisi ætas prohibeat, & nisi uitalis facultas debilis appareat, a uenę sectione curationis initium facere. Quod si aliquid uenę sectionem impediat, aluum per clysterem euacuabimus, reuulsionis simul ac euacuationis gratia. Deinde auxilijs ad inflammationes commodis utemur. At uero membranam cerebri sauctatam, inquit Archigenes, probè glutinat calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa. Deinde butyrum, & rosaceum, & adeps suillus infusus, uetus, simul mixta & repelacta infusa.

De cephalæa. Galeni.

Cap. XLVIII.

Cephalæa inueteratus & ægrè cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet, adeo ut neq; streptus, neq; uocem uehementiorē, neq; lumen splendidū, neq; uini potū, neq; odoramenta caput replēta tolerare possint, neq; item motū. Sed in quiete ac tenebris ob dolorū magnitudinē decubere uelint. nā uelut a malleo sibi percundi uidentur: quidā uero uelut contundantur aut distendantur, & quæ circa caput sunt sentiunt. Non paucis autem usq; ad oculorū radices, dolor progreditur.

Habet autem hæc affectio aliquando continuos dolores, aliquando exacerbationes & interualla, siue ordinata, siue inordinata. Intermitunt enim aliquando eiusmodi exacerbationes, uelut in comitiali morbo correptis, interceditq; tēpus aliquod quod omnino accusari non potest. Manifestū igitur est hanc affectionem consimilē aptitudinē capitis, ut facili laedatur, uelut in cephalalgicis, habere. Verū ad maiorem debilitatem deueniūt in hac affectæ capitis partes. Et quidam ex eis cerebri membranas dolitāt. Quidam uero membranam tantum caluariā ambiētem. Dolores igitur cum grauitate, humorū multitudinem indicant, cum mordacitate uero aut humorū aut uaporum acredinem. Cum pulsu autē inflammationem. Cum tensione uero, si quidem citra grauitatē ac pulsū fiat, flatus tenuis & uentosi multitudinē demonstrant. Si uero cum pulsu, membranosi corporis inflammationē. Si uero cum grauitate distentio fiat, humorum multitudinē intra membranas cōtinentam. Et dolores quidem in superficie hærentes, membranæ os caluæ ambiens affectionē significāt. Qui uero in profundo sunt cerebri, membranarū. Quibus enim affectio inter caluariā est, his dolores usq; ad oculorum radices procedunt, eod quod oculorū tunica ex cerebri membranis ortū habeant. Si quidē igitur humorum aut uaporū multitudinem reperiatis causam, si quidē propter totius corporis repletionē facta est, uniuerso corpore euacuato capitis dolorem sanabis. Si uero uelut debile existēs caput, ad se sublato humores ac uapores susceperit, materiam reuellere oportet in totum corpus, atq; ita particulae mederi. Per clysteres itaq; reuulsio fit, & ligaturis extremitatū, & pluribus infernarum partiū confriktionibus. Interdum etiam sanguinis detractio. Caput autem curabis, quādo quidem reuulsorij uti oportet, per repulsorias irrigationes. Post totius uero corporis euacuationem iam caput euacuatis ac discussorij uteris. Deinde his quæ corroborare possunt. Repellit igitur oleum omphacinū, & rosaceū per se, & cum aceto, & quod ex papaueris capitibus, & oleo teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, ac mēta uiridi apparatur. Adhibeantur autem remedia tepida quidē, ubi frigidior & crudior fuerit humorū multitudo. Frigida uero, ubi calidior & biliosior extiterit. Discutit autem oleū dulcissimū calidū, & hoc magis inueteratum, item sicyonū. Si uero crassior fuerit humorum multitudo, spondylium aut serpillū, aut pulgij comam, aut calamintham, aut mentā oleo incoquens, multitudinem euacuabis. Eadē hæc etiā robur parti addit. Quapropter usq; ad perfectam curationem eis uti conuenit. Omnium porro maxime discutit, & mirifice corroborat, uerbenaca recta, præsertim uiridis. Imo etiam arida cum radicibus, & simul cum serpillio, oleo incocta. Coniungenda etiam ad ea crocodiliadis maximæ circa aquas nascentis radix, Quin & ipsam per se uerbenacam, si oleo incoxeris, caputq; inde rigaueris, omni capitis dolori antiquo, ex frigidityte aut ex crassis humoribus oborto medebere. Maxime etiā profunt sub aquario uasē nascentes asella, millepede appellati, si cū oleo coquantur.

De hemierania. Ex Galena.

Cap. XLIX.

Affectio dolorosa iuxta damidiam capitis partem contingit, quam hemieraniam appellant, & ut plurimum per circuitum exacerbatur. Fit autem propter influxum

influxum uaporum aut humorum, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum. Et aliquibus cōtingit ut extra caluariā doloris sensum perceptent. Quibusdam autem in capitis profunditatē penetrat. Alii qui uero temporū musculos uehementer dolent. Dilationes autē ex his quæ de cephalæ dicta sunt fiāt. Proinde purgare ipsos oportet, aut prius uenā secare, atque sic localibus auxilijs uti, ita ut quis tum per digitos suæ manus, tum per lintea, dimidiā frontis partem, & maxime circa temporū musculum, confricando excalfadat, ante exacerbationis tempus hoc faciens. Post exacerbationē uero hemicranicis appellatis pharmacis utendum est, si quidē multa caliditas in doloribus percipiatur, his quæ refrigerans quispiam habent, non præsente uero caliditate, his quæ multum calefaciunt. Vtriusque uero aliquid ex his quæ robur addunt misceatur, quod adstringentem habeat facultatem. Optimum porro est unguentū quod habet euphorbiæ unc. .j. ceræ quadrantis, olei dulcissimi lib. .i. Ex hoc dimidiā frontis partem unā cum temporū musculo illine. Commodissimum est ad frigidas affectiones, ut sæpe ex unico eius usu ante balneum, dolor cessarit. Sic autē affectis prodest etiam in aurē infusum oleum tepidū, modico euphorbio adiecto. Satis est enim si ad librā olei, drach. .iiii. euphorbiæ addatur. Cæterum naturalī quadam ratione aut potentia, euphorbium ad hemicranicos facit sic adhibendum. Terito ipsum cū aceto, & si quidē dextrū tempus dolet, illinito sinistrū: si uero sinistrū dolet, illinito dextrū: & celerrimē sanat dolorē. Itē intestina terro terito, & dolēs tēpus illinito, mirificē faciūt. Similiter utere carne cochlearū. Vtere etiā paulō post describendis cōibus omnis doloris capitis auxilijs,

Communis curatio cephalæ & hemicranie.

Ex Archigene & Galeno. Cap. i.

Inueterata & ægrē solubili cephalæ aut hemicrania existente, principium curationis à uenæ sectione, aut purgatione facere cōuenit, alio prius per clysterem euacuata. Manifestum est autem quod multo sanguine refertis uenam secare oportet. Vidatis autem humoribus referti, purgandi sunt. Et deinde irrigationibus cōmodis utendum est. Et à naribus sanguis detrahendus, deinde pituitam per os ducentibus, & his quæ naribus induntur utendum. Postea raso capiti illinendum est id quod ex scammonia & peucedano ac aloë constat. Epithema uero conuenit ex amygdalis amaris, & thure ac myrrha. Emplastra uero ex agarico, & quod ex scilla constat, & nigrum ex cucumere syluestri, conueniūt pustulas locis inducentia, & quæ in profundo sunt ad superficiem transferentia. Non incongruum est etiam malagma ex bacis lauri. Nos autē utimur cataplasmate ex cantharidibus, & mirifice facit, dum per longū tempus ulcuscula ab hoc pharmaco sentia sanie manāt. Oportet autem munitam esse uesicam per lactis potum ac irrigationes, eò quod faciliē ab unguentis ex cantharide lædatur. Perseuerante uero affectione, secundæ sunt arteriæ circa aures, & præsertim quæ in temporibus sunt. Quidā etiā uestione profunda usi sunt in cephalæ, qui hoc solum cauerūt ne quis musculus sub cauterium caderet. Adhibentur autem cauteria nucleiformia, ubi magis dolor hæret. Et licet usque ad os urete quo squamæ discedant Barbari uero luniformem diuisionem faciunt circa anteriore capitis partem, su-

pra frontem, à sinistra aure usque ad dexteram, pelliculam caluam ambiētem exoluentes, & capitis os deradentes, caput tamen munientes. Et nō potest temere assumpta esse uideri his qui mali difficilem tractionem nouerunt, propter quam neque talia auxilia maiora quàm opus est existunt. Veratrum autē non minus cauterijs prodest, imò etiam magis. Inducendi igitur sunt prius per uomitum à raphanis. Deinde dandum est ueratrum. Ego uero tum his, tum comitialibus, ueratris albi bulbum tritum & in puluere redactum exhibui drachmæ unius pondere, uelut in Sermone de purgatorijs dictum est. Purgatur enim hinc efficaciter cum ualde multa excretionē. Deinde interpositis quibusdam diebus de surculis exhibeo drach. .ii. Amplius enim hinc lancinantur quàm excernunt. Et rursus tertio similiter præbeo. Nam ad affectionem iam firmatam, & in ipsis ut ita dicā ossibus fixam, non est alius efficacior modus. Post hæc reparatis uiribus infra purgamus, per interualla quædam per nostram hieram, quò illuc repere cogamus materiam sursum uergentem. Vitare autem oportet frigiditatem, ardorem, lassitudinem tum reliqui corporis, tum ipsius capitis, per uisum, auditum, olfactū & gustum, & præcipuē tactum. Viranda sunt etiam acriora edulia, uelut ceparum, alliorum, & similiū: Item ea quæ inflant, & quæ difficulter transeunt, uelut sunt casei, lac, fungi, tubera, bulbi, rapa. Eligantur autem uentri commoda & quæ facile concoquuntur, friabilia, non pingula, non uirosa, stomacho grata, urinam clementia. Fugiendū est etiam mel & omnia dulcia. Vinum uero album & tenue sit, & non ualde uetus, neque ualde odorum, & copia moderatum. At uero stœchadem herbam coctam cum aqua, aut aqua mulsā, in omni capitis dolore, uelut solum & maximum remedium exhibeto. Aliud ad omnem capitis dolorem. Os cerui ustum & tritum cum rosaceo dolenti loco illinito. Aut ocymum tritum imposito. Aut mentam cum aceto tritam bis in die illinito. Aut rumicem syluestrem & gallas simul tritas temporibus ac fronti illinito, & euestigiō sanabis. Aliud. Stercus hirundinum antequam in terram cadat, unā cum luto quod in nido reperitur, aceto in ligneo uase madefacto ac illinito. Aliud. Pilulas caprini stercoreis tritas illinito ac alligato, atque hoc mane ac uesperis facito, & sanabis. Aut nasturtium torrefactum cum aceto & rosaceo terito, & ceratū crassitudine imposito, & citissimē medeberis. Aut intestina terræ trita illine. Aut cochlearum carnis cinerem, stercus bubulum, thus, æqualibus portionibus cum aceto trita illine. Quidam uero ex nostris præceptoribus, inquit Galenus, hoc utebantur ad hemicranias, piperis drach. .ii. crocomagmatis drachm. .ii. euphorbiæ recentis drachmæ dimidium. Si uero uetus fuerit, drachmā unam, stercoreis columbarum in agris degentium drachmæ dimidiū, atramenti scriptorii boni drachmæ dimidiū. Terito cum acerrimo aceto, & illinito tēporis musculū & dimidiū frontis, ac totā affectam partem. Crocomagmatis præparatio. Croci drach. centū, myrrhæ troglodyticæ drach. quinquaginta, rosarum siccarum drach. quinquaginta, amyli recentis drach. quinquaginta, gummi drach. quinquaginta. Teruntur cum uino. Ad capitis dolorem temporibus illinitur. Miscetur etiā in præparationes aliorū pharmacorum. Aliud quod nō solum hemicra-

hemisranclis commodat, sed etiam omni inueterato capitis dolori, illitum. In dolore quidem capitis, a tempore ad tempus per totam frontem, in hemisranclis uero dimidia parti affectae. Croci drach. xv. atramenti sutorij drach. x. aluminis drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. opij, omphacij sicci, chalcitidis crudæ, singulorum drach. iiii. gummi drach. xv. Cum uino falerno uelut collyrium terito, & pastillos formato. Et usus tempore cum posca, aut aceto meraco illine. Aliud. Scammoniae drach. vi. croci drach. ii. comæ hederæ drachm. vi. sulphuris uisui drach. iiii. anisi drach. viiii. feminis apij drach. viiii. diligenter terito & cum ocymi succo pastillos efformato. Hoc multo rosaceo dilutum irrigatio fit capitis lethargicis comoda. Verum in capitis dolore cum aceto adhibetur. Aliud pharmacum non solum in his commodum, sed etiam ad uertiginosos faciens. Radicis peucedani drach. iiii. iridis, myricæ drach. ii. æruginis, acori, singulorum drach. i. spondylii drach. iiii. piperis nigri drach. ii. & dimidiam, serpilli drachm. iiii. myrrhæ drach. ii. castorij drachm. ii. & dimidiam, baccas lauri x xv. rutæ uiridis drach. viiii. mentæ uiridis drach. iiii. opij drach. i. Vino excipe & forma pastillos. Vfus autem tempore, aceto & rosaceo dilutos illine. Sed & cerato rosaceo excepti fronti imponuntur, uelut malagma. Pastillus qui non solum hemisranclis prodest, sed etiam ischiadicis. Thapsiæ drach. iiii. euphorbij drach. iiii. succi medici drachm. iiii. myrrhæ drachm. i. opopanax drach. i. Contusa simul ac trita cum uino efforma, & utere cum aceto. Alius. Radicis peucedani drachm. iiii. croci drach. i. myrrhæ drach. iiii. opij drach. i. Cum aceto formato pastillos, & utere cum aceto in irritationibus. Euestigio soluit dolores. Alius ad omnem capitis dolorem & hemisranclam, per multam experientiam cognitus. Succus absinthij, succus hederæ, stercoris caprini, cochlearum unâ cum testis exustarum, chartæ uisæ, baccarum lauri, bulborum, thuris, euphorbij, atramenti scriptorij, crocomagmaris, gallarum, foliorum raphani, uistellorum oui, succi maluæ, æquales portiones terito cū aceto, ac formato pastillos, ac utere cum aceto.

Epithemata ad capitis dolorem. Cap. LI.

Amygdalarum amararum, floris uulcis, radicis peucedani, mentæ uiridis, uirgultorum rutæ, baccarum lauri, serpilli, spondylii, castorij, singulorum unc. i. rosarum siccarum sextantem. Dissoluito cum aceto, & excipe cerato rosaceo. Deinde in linteum infarta, dextra capillis, toti capiti imposito, & per fasciam deligata usque in sequentem diem seruate, & rursus exoluito, ac renouata imposito. Aliud malagma, ad omnem capitis dolorem. Aeruginis drach. iiii. æris uisti drach. iiii. squamæ ferri stomomacis appellati drach. ii. terræ cimolij drach. iiii. chalcitidis crudæ drach. iiii. pumicis crudi drach. iiii. terebinthinæ unc. i. ceræ septuncem, olei ueteris quincuncem. Aridis leuissime tritis liquabilia liquefacta affunde, & emollito ac uitior. Si uero durius esse uideatur, oleo amygdalino emolli, & utere uelut dictum est. Facit etiam fronti ac temporibus impositum. Facit quoque mirifice emplastrum nigrum Archigenis corio inductum, & dolenti tempore impositum. Euestigio enim soluit dolores. Habetur autem inter auxilia ad orthopnoicos descripta Sermonis octauj capite

quingagesimo septimo.

Que naribus indita caput purgant. Cap. LII.

Quod si necessitas postularit, etiâ per nares caput purgare oportet, post totius corporis euacuationem, & nagallidis succo naribus infuso, aut cyclamini. Aut ipsa cyclamini radice insufflata. Aut elaterio cum lacte infuso. Cæterum pharmaco parabili sæpe usus sum nigella pridie in acri aceto macerata, & deinde cum aceto trita, ac naribus infusa. Facit etiam ad narium obturationem. Aliud. Hederæ succus aut casiaminthæ, per narifusorium instrumentum naribus infusus, multum mucum ducit. Aliud. Nucleum specilli in aquam tingito, & eo atramentum sutorij leuissime tritum excipito, & nares penitissime indito. Hoc multum purgat, & dolores euestigio leuat. Aut atramentum sutorium lacte tritum infundito. Purgat maxime scelericos. Aliud. Nigellæ tritæ drach. viiii. spumæ nitri drachm. i. salis ammoniac drach. i. oleo ueteri aut irino, aut cyprino dilue, & tomentum specillo obuolutum medicamento immerge, & ex eo nares assidue illine. Et defluet quicquid caput infestat. Habeat autem pharmacum compagem cerati liquidioris, & seruetur in cornea pyxide. Aliquando pro spuma nitri elaterium adijcito, & facit ad diuturnas lippiudines, ac morbum comitialem. Ducit enim multam humiditatem. Aliud citra molestiam purgans, & confestim dolorem eximēs. Cyclamini siccae drach. viiii. iridis siccae drach. ii. nitri rubri drach. i. Ego uero elaterium pro nitro adiect, & probe trita per stipulam insufflaui, sursumque attrahere iussi, & postea deorsum inclinari, ut collectus humor deflueret. Sed et per sternutatoria caput concutere oportet, quæ describentur in Sermone hoc inferius ubi de narium affectionibus agemus.

A pophlegmatismi pituitum per os a capite detrahentes. Cap. LIII.

Nitri semissem, staphidis syluestris quadrantem, anisi trientem, foliorum lauri uiridium sextantem, uuarum passerum uinacis exemptis quantum satis his excipiendis. Ex hoc commanducandum præbe pro una ulce quadrantem, & commansa exspuere iube. Aliud quod commansum, caput purgat. Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis syluestris, singulorum æquales portiones uuarum passerum carne excipe, & manducanda præbe. Verum post horum usum, sale ac melle recurentur. Aliud caput purgans, quod neque caput dolere permittit, neque oculorum caliginem fieri. Prodest & auribus & dentibus. Et qui per tempus ipso uitur, in nullam ex his affectionibus incidit. Est autem optimum. Sampsuchi sicci, iridis illyricæ, pyrethri, hyssopi, nitri, piperis, feminis apij, radicis panacis, staphidis syluestris, singulorum drach. iiii. Si uero uisum eius intendere uoles, adijce etiam myrrhæ drach. iiii. Singula primum seorsim, deinde simul terito cum aqua, & formato pastillos, pauco melle ammixto. Vfus autem tempore, melle & aqua diluito, ac pro gargarismate uitior. Aut oleo cyprino aut irino, aut ueteri ammixto naribus infundito.

Smegmata & puluilli inspersiles, caput densantes. Cap. LIIII.

Smegma densans caput, nitri Bernicarij semissem, baccarum lauri, sinapis, sampsuchi, singulorum sextantem, cyperi undam i. fecis uini uisæ uncia i. Hoc smegmate

Smegmate in balneo illito defricetur. Oculis autem linteam multiplex aut spongia prætendatur. Aliud. Nitri assati lib. i. baccarum lauri lib. i. i. staphidis syluestribus, sinapis, singulorum lib. i. radice cucumeris syluestris semissem. Vtere uelut dictum est in inueteratis affectionibus. Smegma capitis, faciens ad defrillationes & aquosam capitis affectionem, experimento constans. Nitri assati uino extincti semissem, iridis, aristolochiæ, helenij, singulorum unc. i. acetum mulsi quantum satis est. Contusa ac cribrata aceto mulso permisceto, & præaso sincipiti ante balneum illinico, & breui tempore finito, ac affricato. Smegma ad omnem capitis dolorem & oculorum fluxionem, experimento constans. Helenij, myrrhæ, calami aromatici, farinæ lupinorum, farinæ erui, sulphuris uiui, spumæ nitri, æquales portiones pulsanæ succo excipe, & pastillos forma. Vtu uero postulante, pulsanæ succo dilute utere. Hoc smegma in balneo sincipiti, inspergere oportet, capillis antea inter se disparatis, ut corpori auxilium adhaereat, præcepere ut os claudatur, quo per nates calidum ærem uolumenter attrahentes subiectam materiam citius transmittant. Sapo Constantini resiccat fluxiones. Balaustrorum sextantem, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum sextantem, costi, aloës, gallarum, thuris, malicorij, foliorum rosarum, sarcocollæ, singulorum quadrantem, saponis gallici lib. i. decocto lupinorum amarorum sextarium. Arida contundito ac cribrato, & cum liquidis conterito, saponis adiecto, & pastillos formato ac utitor, ubi opus fuerit dilute quantum satis est eum uino, & illinico ante balneum sincipiti præaso. Deinde paulo post affricans & abluens. Sapo Andreæ comitis ualde celebris. Floris iunci odorati, calicis, cyperi, amomi, folij malabathri, costi, singulorum unc. i. gallarum sesquiunciam, nardi celdæ, aluminis, iridis, fecis uini antiqui uisæ, gypsum, uiti, nitri, singulorum scrupul. xii. rosarum siccarum scrupul. viii. salis scrupul. viii. testarum purpurarum uistarum quadrantem, saponis gallici lib. i. lupinorum decocto trita accipe ac utere. Keromyrō, hoc est unguentum siccum ad capitis fluxione laborantis curationem maxime uanum. Iridis helenij, floris iunci odorati, singulorum lib. i. rosarum siccarum quadrantem, amomi, costi folij, gallarum singulorum semissem. Vtere post balneum, præillito capite ex uino austero, & tunc insperge. Aliud opdmū. Iridis quadrantem, gallarum unc. i. calicis, costi, folij, spicæ nardi, balaustrorum, rosarum siccarum, carpobalsami, singulorum sextantem, myrrhæ drach. iiii. Cōtundito, ac cribrato, & præillito capite ex uino austero inspergito, maxime post balneum. Alius puluis insperabilis Theodosij, caput resiccat. Gallarum, balaustrorum, singulorum tridentem, cyperi sextantem, spicæ nardi, folij, corticis thuris, corticis pinus, nardi celdæ, singulorum unc. i. iridis sesquiunciam. Cōtusis ac cribratis utere. Alius ualde bonus. Iridis quadrantem, gallarum, rosarum siccarum, singulorum sextantem, aluminis unc. i. Vtere uelut dictum in capite calidiore. Alius puluis ad caput humidum, a quo tum oculi, tum aliæ partes fluxione infestantur. Radicis præoniæ unciam i. aluminis scissi unc. i. baccarum lauri drach. iiii. cyperi sextantem, nardi celdæ semissem, contusa cribrata insperge. Hoc ego sæpe experatus sum. Puluis caput corroborans, facit & ad eos

qui oculos assidua fluxione laborantes habent. Florum mali punici satui unciam i. gallarum unciam i. cyperi, iridis, helenij, singulorum tridentem, seminis rutæ syluestris, quod Harmala & Besala uocant, sextantem, radicis chamæleonis nigri sextantem, carpobalsami unc. i. floris iunci odorati sextantem, aristolochiæ, rosarum siccarum, myrti sicæ, nardi celdæ, singulorum unciam i. xylobalsami sextantem, amomi, malicorij, staphidis syluestris singulorum unc. i. contusis cribratis utere. Aliud smegma resiccat omnigenas fluxiones, & præsertim acres, & subcrassas, multo experimento comprobatum. Milij quadrantem, ladanij sextantem, floris iunci odorati sesquiunciam, seminis rosarum sicci sesquiunciam, aluminis liquidi sextantem, spicæ nardi unc. i. sinapi sextantem, iridis, acaciæ, piperis, staphidis syluestris, singulorum sextantem, costi, folij, pyrethri, singulorum unc. i. calami, musci quem sphagnum siue hypnon uocant, singulorum sesquiunciam, nitri rubri lib. i. Nitrum urito & aceto mulso extinguito, & ad reliqua trita ammisceto, ac uictor ita ut sincipiti inspergas, & paulatim affricas.

De Alopecia. Cap. lvi. Quemadmodum plantæ aliquæ ob humoris inopiam resiccatæ, corrumpuntur taliquæ uero ob humoris alieni ab ipsarum natura attractione. Eodem modo & capilli, aut propter humorum ex quibus nutriuntur consueverunt inopiam, aut propter eorundem uitiationem corrumpi solent. Et propter inopiam quidem humorum, caluities contingit: propter uitiatos uero humores alopecia & ophiasis. unum quidē ambæ secundum morbosam affectionem malum, nomina uero iuxta figuram habentes diuersa. Serpenti enim similis læsa capitis pars in ophiasis apparet. Alopecia autem sic appellata est, quoniā uulpibus frequenter accidit hæc affectio, uelut tradunt. Humorū igitur prauorum redundancia causa est affectionis. Quales autem sint hi, ex colore cutis capitis cognoscet. Si enim albidior est, pituitam: Si nigrior, bilem atram: Si pallidior, bilem flauā significat. Et sanè redundantes uitiatos humores euacuare oportet, aut per pilulas ex aloë & colocynthide, aut per Galeni hieram ex colocynthide. Si quidem atræ bilis humor redundauerit, ueratro nigro ad ipsam ammixto: Si uero amara bilis, scammonia: Si pituita, ipsa per se ipsam detur. Post totius corporis purgationem, pituitam per os ducere melius est, atq; ita localibus auxilijs uti. Hæc autem discussoria uitiati humoris esse oportet, & essentia tenuium partium. Si uero supra hoc quod discutit uitiatos humores, aptū fuerit pharmacum ad bonum sanguinem attrahendum, optimum sanè tale fuerit. Porro præaso capite locū linteo cōfricare oportet, ac cōsiderare. Si enim post modicam frictionem pars rubescit, affectionē sanatu facile putato. Si uero post multā frictionem rubescit, sanatu difficilem. Deinde Thapsiam recētem tritam, uiribus ipsius larga aquæ ammixtione exolutis, illinere. Considerare autē oportet post thapsiæ illitionem, num ob uehementiam ultra quā conuenit cutem rubefecerit. Hoc manifestum erit, si flauior colore euaserit. Periculum est enim ne exuratur cutis, si nos sæpe ipsa utamur. Proinde aut ad aliud mollius transire oportet. Aut si ipsa uti uelimus, uim ipsius exoluere, per cerati aut adipis ammixtionem.

Animad

Antimaduertas autem ne alopecia ulceretur, quod si fiat, anserino adipe aut alio quodam tenuium partium illine. Adhibeantur autem hæc auxilia in aëre calido, citra auram frigidam in sole, hyeme uero in balneo. Ex reliquis porro pharmacis huiusmodi affectionibus convenientibus calidissimum est euphorbium. Minus autem ipso calida est thapsia, post thapsiam uero sinapi, & nasturdum, iuxta aliū autem modum adarce. Deinde nitrum berenicarū, & sulphur, & spuma nitri, & utrumque ueratrum, & eruce semen, & olcum laurini, et alcyonium utrumque, uisū & non uisum, & pix, & cedria, & radices calami sepiarum, & cortex ambo usti. Et murinum stercus, & anserinus adeps, & maxime ursinus ac hyenæ. Et amygdalæ amaræ totæ ustæ, & uiperæ pellis ac caput uisum. Et foribus quidem ex his ceratum liquidum ammiscet. Imbecilliora uero oleo laurino aut pisce liquida excipe. Et diuturnas ac ægre curabiles affectiones, per foris curato, implentia uero & curantur faciles, per debilia. Critonis medicamenta ad alopecia. Pilorum ursi ustorū, radicem calami ustarū, adiani usti, foliorum ficu ustorū, panniculi Cilicij usti, singulorum æquales partes adipe urfino & cedria excipe. Visus autē tempore, loco foris & per fid solia confecto, ac per nitrum deteriso, pharmacū illine. Archigenia ad alopecia. Verbenacam rectam in sole cum aceto tritam, loco prius per nitrum præparato illine, & rarum linteum superimponere, hoc præmadefacto loco tollendum est. Aliud. Alcyonium elarius ad lucernam exurito, & opobalsamo non adulterato extinguito, & cum eodem tritum illinito. Adhæret enim in totum, & non discedit donec pilifuerint exordi. Aliud. Equinos dentes exure, ac utere cum aceto. Ad diuturnas autem alopecias egregie facit thapsiæ succus cerato exceptus, ac loco impositus, ut nihil aliud facere satagas. Decedit enim summa superficies, et sanies effluit, & pilifua sponte enascuntur. Aliud. Squamam ferri stomomatidis diu cum aceto in sole tere, & modico oleo addito illine. Aliud, ad alopecias & pilorum defluuium ac uiriliginem inueteratas. Buccina usta cum oleo ueteri terito, ad strigmentitiam crassitudinem, & præraso ac confecto loco illine. Insigne hoc est. Aliud. Asclepiadis. Spumæ nitri partes ii. salis ammoniaci parte i. hæc usta & cum acerrimo aceto ad strigmentitiam crassitudinem trita, illine & affrica, donec pharmacum in profundum penetret, alopecia prius leuiter conscalpta ut locus pilis commodè densetur, & hoc bis per diem facimus. Aliud. Marrubium uiride tritum illine. Aliud. Perdicij herbar uiridis folijs locū asidue confrica. Aliud. Spoceridis, hoc est cupressi folia trita cum aceto adhibere. Aliud. Herinaceorum marinarum testas ustas cum melle illine. Aliud. Herinacei terrestres pellem, aut caput uisū, adhibere cum melle. Aliud. Alcyonij drachmæ. sulphuris uiui drachmā i. muscarum tostā ut resicentur, cyathos ii. Muscas per se terito, alcyoniū uero urito, & sulphur uisum & contusum ac cribratum cum aqua contere, & fel suillum & acetum paulatim siccis affunde donec strigmen tostum fiat. Deinde axungiam a rotis currū derasam, & in manu emollitam, ut emplastri formafiat, ammiscere, & præraso ac confectis confidenter, nелut optimū, illine. Aliud. Herinacij terrestres usti cinis pice liquida exceptus, alopecias remouet. A-

liud. Sorani, quo etiam Archigenes usus est, & id uē hementer laudat. Alopeciam præscalptam & confectam, deinde in superficie scarificatam, ceparum aut raphanorum cortice trito integere, addito melle. Aut cum his confrica, & nasturtij semē, & muscerdas, & piper, & ueratrum album, æquis portionibus cum aceto illine. Est enim ualde insigne. Aliud Archigenis. Rheia culinarij drachmā iiii. sinapis drachmā ii. cum aceto illine. Aliud. Cantharides ustas, & tritas cum melle affrica. Aliud. Corni noui partem lanuginosam, in aëreo uase ustam, cū oleo antiquo, aut melle, aut aceto tere ac illine. Cito pilos producit. Aliud. Cyclamini radicem uiridem ustam illine. Aut sicca ustam adhibere. Aliud. Felis stercore cum sinapi ac pipere, addito aceto utere. Aliud. Allium uisum cum rosaceo illine. Aut betæ radicem eodē modo. Aliud. Ungulas asini ustas, asphodeli radicem uisam, alcyonium, nitrum, æquis portionibus oleo ueteri excipe, ac utere. Aliud. Herinaceorum marinarum cum testis exustorum drachmā ii. muscerdas drachmā i. acetito dilue, ac illine loco præfricto. Aliud. Alcyonij usti, cornu ceruini usti, cyperi usti ex toto, æquis portionibus utere cum aceto. Aut abrotanum uisū cum oleo uetustissimo adhibere. Ad alopecias & calulciem ac pilorum raritatem ægre curabilem, in capite, in mento, & in supercilijs. Pilorum ursi unciam i. radices calami quadrantem, filicis cum radice quadrantem, castanearum hispida cortice quadrantem, lanarum succidarum pinguisimarum sexticem, capita muscarum xxx. muscas quinque sine capitibus. Omnia in nouam ollam coiecta, in furnumposito uer exurantur. Deinde cinerem terito. Habeas autem in uino. Aminæo prius trita, ladanij unciam i. folij malabathri unc. i. myrrhæ sextantem. Et adijciatur his olei ueteris sextans, olei cedrini unc. i. atque ita aridis inspersis excipe. Deinde ubi linteolo alopeciam perfricueris, & leui scarificatione usus fueris, aut cepa, aut scilla, aut ficu folijs exscalperis, pharmacū ipsum illitum affrica. De cetero uero locum rigido ac aspero lineo confricato, & hoc modo illinendo usque duos menses progreditor. Quod si amplius in hac curatione perseveraris, etiam calulciem persanabis. Aliud. Oribasij. Muscerdarum unciam i. stercoris cameli exusti, ordi usti, singulorum pugillum unū, foliorum lauri ustorū manipulum unum, excipe sorde ab axibus derasa, hoc est, qui a rotis currū deraditur.

De defluuiio capillorum. Cap. lvi. Est & alia capillorum affectio, quæ ex raritate cutis, & penuria essentia pilos generantis consequitur. Quapropter etiam curatio hoc modo læsorum, non eundem scopum cum alopecijs habet. In alopecijs enim scopus est, ut uidatus humor consumatur. In his uero, ut habitus capitis corroboretur, & boni succi alato procuretur, & cutis densitas ac raritas moderata reuocetur. Solet autē hæc circa pilos affectio plerumque his qui ægrotarunt addere. Raro uero etiā citra morbum. Et plurimi ægrotantes citra pharmacum, per resicentē corpus uictum breui sanari sunt. Quare pharmaca in ipsis sint quæ moderate cutem densant, unā cum hoc ut non perfrigerent ipsam. Quæ enim ualde adstringunt, omnino etiam frigefaciunt, & alimētū affluxum repellunt. Vnde etiam amplius pilifluunt. Quapropter moderate adstringentia amul-

ammiscere oportet humectantibus pharmacis, quale est ladanum, & oleum lentiscinum, quæ ex natura sua adstringunt & moderate calefaciunt. Itaque neque expertus sum, neque mente concipere possum, aliud præstantius fore medicamentum ad defluos pilos, eo quod ex ladanum & lentiscino oleo paratur. Si uero non affuerit lentiscinum, crudo & immaturo oleo utendum est. Illud autem manifestum est, quod raso capiti pharmacum crassius adhibere oportet. Verum ad cutem detonso, liquidius. Quod si magnum fuerit pilorum defluum, & coniectes magnam cutis capitis raritatem factam esse, oleum myrteum pro lentiscino, ad ladanum ammisceris. Postes & unguentum nardinum ammiscere in ætate frigida & tempore hyemali. Commodum est etiam ad hæc pharmacum, unguentum illud diuitum foeminarum, spicatum appellatum, & quod Salca appellatur. Quare his uel solis diuites uti iubeto. Cleopatra porro inquit, ad defluos pilos utere hoc: Terram cimoliam solidissimam in uino austero macerato, addito mororum succo tanto quantum combibere potest, & semen hyoscyami tenuissimè sufficiente mensura adijcito, terito, ac pastillos formato, eosque in umbra siccatos in fictili nouo reponito. Vsu uero expetente, aqua dilutos affricari iubeto. Deinde resiccatos eluito, & per dies quinque rursus illinito. Uttere hoc in capitibus calidioribus. Facit etiam ad faciei ac colli impetigines. Aliud ad defluos pilos. Verbenacam rectam uiridem unam cum radicibus in oleum omphacinum coniectam per plures dies insolato, & oleo excolato utitor quotidie pro communi. Si uero non affuerit uiridis herba, siccam unam cum radicibus contusam ac cribratam oleo ammisceris, ut strigmentitiam spissitudinem accipiat, & ubi per aliquot dies siueris, utere. Et minimè uanum medicamentum comperies. Aliud ad pilos ex morbo defluentes. Chamæleonis nigri radices uino coctas crassius capiti illine. Aliud. Sambucum ustum, & cerato liquidissimo exceptum illine. Auget hoc pilos, & cutem densat, & defluere non permittit. Sed & narcissinum unguentum illitum pilos defluere non sinit. Aliud. Ladanum & rosas in uino ueteri terito ac illinito. Conseruat enim pilos, eosdemque nigros facit. Aliud conseruans pilos: Idem etiam nigrefacit. Myrti baccarum nigrarum sextar. i. uirgultorum myrti sextar. i. seminis apij sextar. i. adiantij sextarij dimidium, ladanij tantundem, uini nigri sextarios v. Coquito ad perfectam dissolutionem. Et ubi tertia pars restat, adijcito olei omphacini aut alicuius unguenti sextar. ii. ac rursus coquito. Postquam autem bis aut ter ebullierit, expressum ac excolatum humorem diligenter reponito. Vsu uero expetente, in præras omnino utitor, bis per diem illinens ex eo capillos. Cæterum in pueris pulchros ac densos pilos facit, nucis testa usta ac uino trita, & illita. Aliud. Loci arboris folia trita illinito.

Ad supercilia pills denudata. Cap. LVII.
Vt ne defluant pili neque à supercilijs, neque alia corporis parte, melanchum ustum & cum aqua tritum impone, ubi pilos emergere uolueris, præsertim uero in supercilijs. Aliud. Apes plurimas uistas ac oleo ammixtas illine animaduersione habita ne aliū locū contingas, ubi pilos nasci nō oportet. Aliud.

Adamantem lapidem cum aqua tritum illine: quod si albos producere uoles pilos, cum aceto eundem terito.

Tingentia ac nigrefacientia capillos. Cap. LVIII.
Medicamenta quæ albos pilos tingunt ac nigrefaciunt, ex austeris ac acerbis composita magnopere lædunt. Non enim solum in superficie, sed etiam in profundo cutem alterant, usque ad locum radicum pilorum. Detrimentum uero foeminis utentibus illic accidit, aliquando ad morbum comitiale, aut syderationem, aut ueternum, aut soporem profundiorē: Aliquando uero etiam destillationibus ægre solubilibus corripuntur, ut tabes consequatur. Et scio multas foeminas mortuas esse, ex perfrigeratione à talibus pharmacis inducta. Magis autem læduntur quæ frigidius temperamentum habent. Cæterum quæ citra læsionem adstringendum pilos nigrefacere uolunt, cedria illinantur. Illinantur autem tribus uel quatuor horis ante balneum. Deinde lotæ confricentur. Oportet autem ipsam citra olei ammixtionem adhibere, in capitibus uehementi resiccatione ac calefactione indigentibus. In alijs uero oleum ammiscendum est. Nam una cum hoc quod consumit humiditates, etiam pilos nigrefacit, & defluos corrigit, & non defluos habitiores efficit. Idem facit & pix liquida cum oleo adhibita. At uero Archigenes pilos nigrefacientia sic describit. Radicis capparis corticem cum lacte asinino ad tertias coquito, & trita in noctem imponito, pilis antea confrixis. Aliud. Radicis ilicis corticem aqua coquito donec mollis euadat, & imponito. Aquam uero cocturæ affricato. Aliud. Quod intrinsecus in anemona nigrum est, cum oleo myrteo tritum illinito. Aliud. Corticis salicis succum cum oleo africa, summe denigrat. Aliud. Lapis Alabandicus siue Alabandinus uocatus, colore subnigricans cum fuluedine ac pelluciditate, quo mulieres ad ornatum utuntur, tritus & cum uino nigro ac oleo omphacino affricatus, superficiem pilorum nigrefacit. Aliud. Malum punicum uiride immaturum accipe, & collum eius diligenter resera, quo id quod amputatum est, congruum operculum fiat. Deinde electis granis, & tenuibus membranis intus relictis, in uacuum mali calicem sesami illoti drach. iiii. inijce, & thuris tantundem, utrisque uicissim locatis donec impleatur. & tunc proprium operculum impone, & luto aut fermento triticeo obline, & in clibano torre. Postea uero lutum aut fermentum adime, ipsum uero malum punicum leuissimè tere, & in uitreo uase repone. Deinde præfricto ac resiccato capite modicum de pharmaco ad paucum oleum ammisceris, ac pilos illine. Et hoc quinquies repete, hoc etiam crispis ipsos facit. Quidam pro sesamo ac thure, nigellæ ac gallarum contusarum, singulorum drach. iiii. in mali punici calicem coniiciunt. Aliud quod pilos denigrat, ac crispis facit. Oportet autem per terram cimoliam pilos confricare, & tunc tingere. Præstat quoque caput prærasum esse, & crassiore medicamento illinere, uisitata fronte & omnibus uicinis partibus. In multis celebre factum est, & est ualde necessarium. Sulphuris fullonici, atramenti sutorij, gallarum, caldis uiuæ, spumæ argenti, singulorum sextantem. ferruginis unc. i. Singula seorsim terito, & cum aqua ad unguenti formam reducto, ac

confidenter utitor nihil ueritus calcem. Non enim urit, eo quod uis ipsius à reliquis est oppressa. Hoc & ligna & cornua & lanas tingit. Aliud efficax experimento cognitum. Denigrat pilos ad miraculum usque. Foliorum ficī nigræ, foliorum uitis nigræ, foliorum mori, singulorum lib. i. Omnia in aqua pluuiali per diem unum macera, deinde diligenter coque, & præraſis pilis impone. Aut si hoc nolueris, radicibus pilorum liquidius illine. Aliud quod pilos nigrefacit. Ladani, gallarum, amygdalarum amararum depurgatarum, fecis uini, foliorum adianti, singulorum sexuncem. uini è uinaceis expressi (quod loram uocant) sextar. iiii. Omnia in uas æreum stanno obductum conijce, & ad tertias coque. Deinde excola, & in alio uase paruo ad mellis consistentiā coque, & ad hæc ungenti Mendesi, aut alterius huiusmodi, parem mensuram adde, & conquassata repone, & hoc quotidie utere. Sic autem plumbum potius quam stannum, id metallum quo æneum uas obducitur. Aliud quod à canis præseruat. Colocynthidem syluestrem perforato, & interna probe repurgato. Deinde ipsam oleo expleto, & integrum hyoscyami albi semen adijcto, & per diem unā finito. Et hoc per annum semel eodem modo illinito. Aliud barbam nigrefaciens. Recrementum ferri & plumbum in aceto coquito, donec tertia pars restiterit, & illinito, atque ab oleo penitus abstineto.

Vt fului pili fiant.

Cap. LIX.

Fuluos pilos faciunt lupini crudi, & nitrū cum aqua illitum; loti arboris ramentorum decoctū. Ligustri folia trita cum herbæ lanariæ succo imposita. Fex uini ueteris uſta, & cum oleo balanino trita, ut suſtam spissitudinem habeat. Hoc ubi dormitum ire uoles, illine, & mane flauī erunt.

Vt albi pili fiant.

Cap. LX.

Hirundinis fimum cum felle taurino tritum illine, & albi euadent. Aliud. Verbasci albi florem urito, & aceto extinguito, & ad smegma ammixto utitor.

Vt crispī pili fiant.

Cap. LXI.

Spumam salis cum myrrha affricandam præbe. Aliud. Carpasi succum illine, & manebūt crispī acnigri. Aliud. Asphodeli radices urito, & tritis cum uino utitor. Aliud. Semen lini uino maceratum modicè coquito ac excolato, & ad succum oui candidum ammisceto, & ex eo uesperī pilos cōfricato, ac caput obligato. Postera uero die in balneo abluito, & hoc sæpe facito. Verum in his qui caput habent quod facile perfrigeratur, in balneo illinito, & illa die non abluito. Aliud celebre. Nucem pineam integram uiridem bonam unam, iridis scrupu. xii. myrti unc. i. baccarum myrti unc. i. polytrichi selquiunciam, ladani sextantem, gallarū unciam i. mastiches Aethiopice unciam i. pampinorū uitis sextantem, lacrymæ palmæ arboris scrup. xii. adipis ursini scrup. xii. seminis betæ scrup. xii. rhois coriarij scrup. vi. aluminis scissi scrup. vi. olei omphacini sextar. iiii. succi artemisiæ, succi serapiadis tritescularis, succi polytrichi, succi asphodeli, succi anagalidos, singulorum quadrantem. Misce ac utere.

De his quæ pilos corrumpunt.

Cap. LXII.

Eorum quæ pilos corrumpunt tres sunt differentiæ. Nam quædam proprie psilothra appellantur, quædam attenuatoria, quædam omnino ipsos extir-

pantia. Quæ igitur ipsos penitus extirpant, periculosi usus sunt. Aliquando enim non solum illitas partes corporis, de cætero penitus depiles reddunt, sed & usque ad caput & mentum, superciliāque ac palpebras, nuditas pilorum procedit. At uero attenuatoria & psilothra minime periculosum usum habent.

Quæ pilos extirpant.

Cap. LXIII.

Pilos penitus extirpare dicitur thynni hepar putrefactum, ranarum in arundinetis degentium sanies, testudinis marinæ sanguis, uitis albæ lacryma, lacryma hederæ, itemq; bryoniæ, scolopendra marina, stellæ marinæ. His ammiscetur nitrū, amurca & cedria, & oleum quod insulsum appellatur. Item Alcyonia & sandaracha, & his similia. Aliud. Vriticæ syluestris semen cum oleo tritum fortiter affrica, & defluent pili. Tardius autem circa pubem puerorum pilos enasci facit, aliquando uero etiam eos qui sunt, extirpat, uitis lacryma cum oleo illita, & humor qui ex uiridi sarmento dum uritur exudat. Aliud. Succī tithymali characitæ cyathum i. uini & olei singulorum cyathum i. misce, & illine in balneo. Et ubi modicum sudaueris, & deinde per strigilem confricueris, reperies pilos in strigile. Qui uero post dies quadraginta exorietur, lanuginosi erunt. Aliud. Asellorum sub hydris stabulantium drachm. xii. sandarachæ drach. iiii. calcis uiuæ drach. viii. auripigmenti drach. viii. lixiuij ex ligni ficulnei cinere excolati heminas ii. aceti cochlear. ii. Omnia unita in olla coquito, donec experimentum tibi facient, illita pilos tollunt. Et utere in balneo uelut dictū est. Aliud. Buglosi & semperuiui succum, æquis portionibus cū stercore hircino terito, & ultra tabella excepta densari finito, ac utitor in balneo. Aliud. Bulbum hyacinthi purpureos flores habentis cum thure & amygdalis amaris terito, & oleo affuso unito, & in balneo ungito ex hoc: itemque citra balneū quotidie, & paulatim pili corrumpentur.

Psilothra pilorum.

Cap. LXIII.

Ex his quæ pilis denudant, & psilothra appellantur, utile est lixiuium, & auripigmentū, & sandaracha, & calx uiua. Manifestum est autem uehementiam ipsorum frangi, debiliorum & liquidorum ammixtione, prisanq; inquam aut oryzæ succi. Crito itaq; tale psilothrum in libris de ornatu describit. Calcis uiuæ partes ii. auripigmenti partem i. Hæc in mortarium plumbeum coniecta, aqua calida aut prisanq; succo affuso terito, & ubi nigra facta fuerint, in balneo illini iubeto. Hoc statim corpus glabrum facit, & pilis enascens tenuis emergit. Aliud. Oryzam, fabas, ciccer, prisanam, simul in aqua coquito, & ad hoc decoctum primum calcem ammisceto sufficientem, & prout moris est, agitato. Et ubi dissoluta fuerit, auripigmenti unc. i. inspergito, unito, & myrrhæ tenuissimè tritæ unc. i. mastiches unc. i. pumicis torrefacti drach. iiii. opobalsami cochlearia ii. adijcto. Aliud. Sandaracham cum hyoscyami succo tritam illine. Aliud. Fructus ficī syluestris sexuncem, & foliorū eius sexuncem, herinacium terrestrem integrum uiuum, succi aconiti, hoc est, iridis syluestris lib. i. ueratri nigri lib. i. fecis uini uſtæ lib. i. caricarum pinguium nigrarum lib. i. auripigmenti auricoloris trientem, costi trientē, calicæ trientem, carpo

carpobalsami tridentē, olei sextar. i. Omnia contusa cum herinacio terrestri uiuo, in duplici uase cū aqua coquito: Sint autē aquae marinae lib. v. donec aqua fuerit cōsumpta. Et ab igne ablata per triduum finito, & ubi sedata fuerint, excolato, ac utere oleo in prima balnei domo antequam sudare incipiunt.

Quae pilos attenuant.

Cap. LXV.

His quae pilos attenuant uti poterit medicus, in his qui duros ac magnos pilos habent. Sunt autem talia exterforiae & attenuatoriae facultatis. Quemadmodum autem in omnibus alijs medicamentis differentia secundum excessum & defectum est, ita etiam in exterforijs. Ordei itaq; farina & fabarum, & erui, spumaq; nitri ac nitrum, moderatiorem uim habet. Quae uero his fortiora sunt, in his qui duros ac magnos pilos habet cōueniunt. Quale est nitrum uisū, & nitri spuma & aphrolitū, & testae calinae. Item seplae testa usta ac non usta, & fictiliū ac clibani testae, & pumex ustus ac non ustus, & muricū ac purpurarum ac reliquorum ostreorum testae, alcyoniae & herbae lanariae radix. Veratrum item utrumque, & bryoniae radix ac dracunculi, aristolochiae & panacis radix, & canchry ac huluscemodii. Quod si odorata haec facere uolueris, cyperū & melilotum, & rosas siccas, & iunci odorati florem & iridem, & melissophyllum ammisceris. Diuitibus uero nardum celticam & indicam, amomum, folium malabathri, myrrham & costum. Attenuat etiam pilos cinis sarmentorum uitis, & ficulneus, & ex tithymalis, tritius & in balneo affricatus. Et ab exustis uinaeis cinis, & alumen silium, & stercus caninum siccum. Aliud smegma illustrans cutem, & pilos lanuginosos faciens, ualde bonum. Mora crudissima cum terra cimolia ac nitro, æquis portionibus trita adseruato, ac utitur. Puluillus attenuans pilos in balneo, multo experimento constans. Puniceis costis, testarum seplae uistarū, nitri, cimoliae æquis portionibus utere confidenter. Alius. Testarum purpurarum uistarū sextantem, alcyoni sextantem, nitri bessem, cimoliae bessem, puniceis unc. i. omnia tosta terito, & utitur in balneo, ac miraberis. Alius, quo usi sumus in cubicularia. Calcis uisae ex marmore factae lib. i. auripigmenti unc. i. staphidis syluestris, cimoliae testarum seplae, radice bryoniae siccae, aluminis scissi, singulorum drach. i. i. i. cerusae unc. i. sampsiuchi, aloes, ueratri nigri, singulorum scrup. vi. Conustus ac cribratis utere, inñciens ex eo in familiare psilotrum drach. i. i. i. & ouorum candida. i. i. Deinde psilothrū ablue, & rursus siccū affrica, & quotidie in balneo hoc utantur. Aliud smegma attenuatorium, & lanuginē produciens. Farinae fabarū, puniceis, similaginis, spumae nitri albæ, singulorum choenices atticas ii. ieniculi cum pisana cocti, & postea aceto mulso eloti ac siccadi, tustiq; ac cribrati choenices ii. saponis gallici lib. ii. Saponē reliquis antea tritis ammiscet, ac manibus subige, & utere.

De furfuribus siue porriginē.

Cap. LXVI.

Quibusdam se scilicet caputibus, furfuribus similia saepe ex capitis cute decidunt. Contingit autem haec affectio a uisiosis serosis humoribus, quos consumere scopus est in eius curatione. Itaq; discussoria ac exterforia adhibenda sunt pharmaca, ubi per purgatorium medicamentum prius totum corpus euacuauerimus, si uiculis humoribus fuerit repletū. Quidam

etiam aliqua adstringentia ad discussoria ammiscuerunt, quo per ipsa affecta pars corroboretur, ut ne facile in seipsam suscipiat influentes serosos humores, sed resistat, eosq; repellat, ueluti est sutoriū atramentum, & similia. Deterget itaque furfures in capite: Cimolia cum betae succo aut foenigræci, aut utrisq; simul ammixtis. Aliud. Fabam unā cum cortice molito, & cum betae succo utitor. Aliud. Furfurum dimidiam choenicem in aquae sextar. i. macerato, deinde diu manibus terito, & succum excolato, & ad ipsum aceti heminam dimidiam addito, & ad spissitudinem coquito, & sic affricato. Deinde betae, aut foenigræci, aut lupinorum decocto abluito. Aliud. Terrae cimoliae, sulphuris uisui, æquales portiones terito cū aceto, & affrica in balneo, & calida aqua ablue, & illine non solum in balneo, sed etiam citra balneum. Aliud. Spumae argenti, olei rutacei, aceti, pares portiones terito & illinito. Hoc multo experimento constat. Aliud. Cucumeris syluestris radicem coquito, & decocto utitor. Archigenes de medicamento ex bryonia dicit, præ omnibus, inquit, hoc tibi paretur. Si igitur iuxta pondus præparare uoles, sic facito. Cimoliae sexuncem, nitri quincūcem, farinae fabaceae quadrāterē, corticis aridi radice cucumeris syluestris sextantem, bryoniae sextantem, farinae ordeaceae ac lupinorum, singulorum unc. i. Aliud. Cimoliae lib. ii. nitri bryoniae, corticis radice cucumeris syluestris sicci, farinae fabarum singulorum lib. i. farinae ordeaceae ac lupinorum, singulorum sextarii dimidium. Singula seorsim leuissimē terito, mensurato ac unitis utitur in balneo. Archigenes dicit, ad furfures farinam foeni græci, & nitrum, & cimoliam, cum betae succo affrica, & fel bubulum aut suillum addito aceto illine. Deinde post horā ablue, & atramento sutorio ac nitro cum modico oleo tritis illine. Aut cuminum, & myrobalanum, & fabaceam farinam, æquis portionibus cum aqua lixiui terito, & affricato. Aut amygdalas amaras decorticas, cum aqua aut aceto tritas affrica. Postquam uero resiccati fuerint pili, calida aqua ablue. Aut malū syluestrem in aqua marina, donec decima pars super sit terito & affricato. Aut nitrum & pumicem, & fecem uini, pari portione cum aqua calida affrica. Aut spumam nitri, & atramentum sutorium, æquis partibus cum uino adhibe, ter aut quater in mense. Hoc adeo efficax est, ut nihil reliquum faciat. Aliud. Thus tritum cū aceto illine. Aut scorpiuri succum illine. Aut scillā assato, & ubi mollis facta fuerit, expressum succū oleo ammixto illine. Victus sit flatus exors, nihil ex crasso humore prædiis habens, uelut sunt tubera, lungi, bulbi, legumina, & carnes bubulae ac similes. Sin autem quae ingeruntur uentri cōmoda, concoctu facilia, & mel cibis addantur. Ad intinctus confert acetū cum sapa. Condimentū sit cuminum, apium, foeniculum, aliorū parcus sit usus. Et maxime ab omnibus bellarijs abstinendum est. Vinum utile est tenue & albū. Iucunditatis tamen gratia etiam uinum dulce & uinū nullum permittitur. Ex fructibus uua arefacta optima est, deinde ficus ante cibum. Postea malū punicum post omnem cibū. Et amygdalae uirides cōmodē sunt ante cibū. Et bonē cōcoctionis potissima ratio habenda est. Deambulationes lenes plurimae

mane ac uesperl optimæ sunt. frigida lotio balneis præstat. Verum in calida se lauanti incommoda est multa in aëre conuersatio. Et capitis perfusio solijs melior est. Et post hæc large per frigidam refrigera. Dormire ad satietatem commodum est. Ab ira & indignatione, insolationeque ac uehementi frigore abstineant, itemque ab omnibus quæ caput replent.

De morbo pediculari.

Cap. LXVII.

Pediculorum generatio quibusdam acuatim in capite contingit, multis humoribus moderate calidis in profundo cutis collectis, ubi etiam pediculos generari contingit, non in superficie cutis, in qua furfures consistunt. Itaque pharmaca ipsorum necessarium est sicca esse, & quæ magis ex profundo attrahere ac euacuare possunt. Lupinos igitur in aqua coquito, & decoctum ipsorum affricare iubeto. Aut myricæ decocto, aut aqua marina, aut muria meraca cum aceto perfundito. Aut hederæ succum melle mixtum illinito. Aut perdicij succum dormitum eunti illinito. Aliud ad pediculos capitis, ac totius corporis. Ligustri florem cum uino tritum, capiti ac toti corpori affrica, ubi dormitum ire uolet. Aut staphidis syluestris partes II. sandarachæ & niri, utriusque partē I. adhibe cum aceto. Aut rhoem culinariū cum oleo tritum illine. Aut alumine cum oleo trito utere. Aut ueratrū albū, & staphidē syluestrem, ac nitrū, & quis portionibus cum oleo trita, in balneo adhibe. Aut rumicis syluestris radice cum oleo in balneo utere. Aut modico pipere cum multo oleo utere. Aut oleū laurinū aut raphaninū illine. Si uero pilī denudati sūt, staphide syluestri cum aceto & oleo utere. Aut alumine liquido cum oleo. Prodest itē ipsis potus allij drachmarū duarū, cum origani tritū drachma una ex aqua mulla.

De achoribus & reliquis pustulis capitis.

Cap. LXVIII.

Vlculum quod achor Græcis appellatur, in capite cute consistit, tenuia foramina habens, per quæ tenuis sanies effluit mediocriter uiscosa. Similis autē est ipsi alia affectio, quæ Corion, hoc est, fauus appellatur. Quæ quia foramina maiora habet, humores mellis similes continet, Meliceris uocatur, hoc est, fauus mellis. Proinde scopus in his est ut humores affectionē facientes euacuemus. Si uero adhuc influxerint, ut prius influxionē impediamus, euacuato prius corpore per purgatoriū medicamentum, initio sumpto à uenæ sectione, si æger ferre potest. Deinde purgatorio utimur sero lactis præparato ex aqua mulla, ammixtis ad ipsum epithymi drach. III. Relata est autē seri præparatio Sermonis secundī capite nonagesimo sexto. Si uero intempestius est lactis usus, colocynthidem perfectā accipe, & semen enjce, & in ipsam tomentū siue pulpam adhuc habentem, sapam aut uinū mullum infunde, & per diem ac noctem macerari sine, & postea calefactū exhibe. Deinde uero etiam caput purgandū est per ea quæ naribus induntur, & quæ per os pituitam extrahunt. Conueniunt autē ipsis secantia & discussoria medicamenta, eo quod uiscosus est humor qui affectionē generat. At uero incipientes achoras, ubi totum corpus superfluitatibus caruerit, per adstringentia ac repellentia curabis. Talia autē sunt myri, & pini cortex, & rubi folia imposita, plantago imposita, oleæ syluestris succus affricatus, salicis folia & flos imposita, similiter polygonū. Quædam uero prohibent ne

achores augetur, simul reprimētia quod influit, simulque cōcoquantia ac discutientia quod iam continetur, ut quæ mixtas uires habent, quibus sanie post principium uti oportet. Tale est oleū myrteum & rosaceū & lentiscinum, rubi succus cum oleo, portulacæ succus cum oleo, ladanū cum uino illitum, ligustri & lētes. Quædam uero antiquis & moderatis auxiliantur, discutientia & extergētia citra sensibilem caliditatem, non tamen aliquid irritans habentia. Quibus utendū est maxime ubi dolor aliquis cum achoribus affuerit. Sed & in his à debilitatibus initium facere conuenit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est, & Cretica ac Samia terra, pompholyx itē ac spodium, & spuma argenti & Cadmia tenera, & adiantū cum rosaceo illitū, & sœnigræd decoctū affricatum, & malua trita cum liliacea farina imposita. Aut melilotū cum farina sœnigræd ex uino impositū. Item cicerū decoctum, & ipsum cicer coctū impositū, nuces rācidæ cōmansæ ac illitæ, quod si his nihil effeceris, siccū ex charta pharmacū illine cum aceto. Si uero acrius tibi uideatur, spumā argenti pari portione adde. Si uero non affuerit siccū pharmacū ex charta, chartam ure, & cinerem eius aceto subige, ac utere in his qui durā carnem habent. Quædam porro uehementē adeo uim habent, ut ualde crassos ac uiscosos humores euacuare possint, ipsosque dissoluere achoras, etiam si iam in scirrhum indurati fuerint. Talia sunt chalcitis, sex uili uita, sandaracha, & calx. Acetū autem fortissimū est omni tempore ad achoras, & discutiens & repellens. Sit autē acerrimū. Discutit etiam optime lilij radix affricata, & thus cum aqua & nitro, & lupinorū amarorū decoctū affricatum, & cucumeris syluestris radix cocta, & fici folia cum aceto trita, bulbi cum nitro affricati, rutæ folia imposita, farina sœnigræd cum nitro affricata, thus cum aceto illitum, malicorij cum laurino oleo illitum, alliū cum cauliculo ustū, ac cinere cum oleo illito. Hoc ualde bonū est. Aliud. Mulier quædam nuces regias mandebat, & puero achoras habenti imponebat, & sanatus est. Aliud. Radices anchusæ ustas, ac cum oleo ad strigmentū spissitudinē tritas, illine cum penna, & sanabis. Aliud. Thymū urito, & cinerem cum uino & oleo subactū illinito. Aliud. Cnestrū quam in Alexandria liparona uocatur urito, & cinerem cum uino tritū illinito. Aliud. Buccinarum uistarū cinerem cum aqua adhibeto. Est hoc salutare pharmacū non solum ad achoras, sed etiam ad omnem papularū eruptionem. Quod si incideris in achoras inflāmatos & dolētes, dolorem prius liquido medicamento concoctorio molliente, & lenimigabis, quale est parhygrū, & omnia ad sedem parata, & quæ ad carcinomata descripta sunt. Farinā itaque sabacā uino madefactā ac tritam, ut emplastrum formā acquirat, imposito. Facit & ad seruētilora & agrestia in capite pustularū genera. Aliud ad maximos & inflāmatos dolores, leniens, dolorē eximens ac percurans. Collyriū quod aster appellatur, aut aliquod ex Libianis appellatis, aut consimile quoddā cum modico hyoscyami succo terito, & adiecta sapa ac rosaceo illinito. Alia pinguis cōpositio, ad achoras, pustulas, papulas seruēdas, intertrigines. Est & ad sedem bona. Spumæ argenti drach. viii foliorū rutæ tenerorū drach. x x v. Aceto dilue, & rosaceo aut myteo excepta pennis illine. Hoc magno experimēto nobis constat. Alia similis. Spumæ argenti

gēti drach. iiii. cerusę drach. vi. sulphuris uiui drach. iiii. cerę drach. iiii. rosacei aut myrtēi quantū satis est, ut liquidū ceratū spissitudinem accipiat. Liquida siccis affūde, & unitis utere. Hęc ad totius corporis pustulas cōmoda est. Alia ad humidos achoras. Ladani drach. viiii. cerusę tātundē, sulphuris uiui drach. viiii. utere cū uino & myrteo oleo. Aliud pharmacum. Ladani, baccarū myrti nigrarū, spumę argēti, sulphuris uiui, seminis hyoscyami, malicorij, æquas portiones terito, & uino ac myrteo, aut rosaceo oleo affuso utitor. Aliud ad feruidas, saniosas & impetiginosas papulas. Verbenacę supinę drach. viiii. acacię drach. viiii. myrrhę drach. ii. uino austero trita illine. Aliud. Facit & ad eas quę in mento sunt. Baccarū myrti, malicorij, atramenti sutorij, spumę argenti, æquales partes tritas cū uino & oleo myrteo adhibe. Emplastrū ad achoras uetustissimos. Resinę pinus siccę, cerę, adipis suilli, aut bubuli, æquas portiones simul liquatas in aquā excolato, & diutius manibus emollicis utitor. Aliud. Quo usus est Aegyptius in Palladio Magistriano in Alexandria, ubi medicorū auxilia frustra tentasset. Colophonię semissem, ammoniaci thymiamatis sextatē, galbani scrup. iiii. opopanacis scrup. iiii. olei drach. iiii. mastiches, cerę, singulorū unc. i. resinę pinus lignosę drach. iiii. æruginis scrup. iiii. Quod si magna affuerit acrimonia, æruginem ne adijcias. Hoc abscessus discutit, & iam ruptos euacuat ac sanat.

Ad capitis scabriciem. Cap. lxxix.

Rutam & alumen terito cum melle, & præralis pilis illine. Aliud. Sulphur uiuum & staphidem syluestrem terito, & picis sero ammixto illinito.

Ad parua & densa ac rubicunda capitis ulcuscula. Cap. lxxx.

In paruis ac densis & rubicundis capitis ulcusculis, māmārū papillis similibus, a quibus etiā sanies effluit, caput radito, & semen lini tritū ac melle subactū imponito. Aut cōchylīū urito, & cū aqua tritū imponito. Aut emplastrum ē lolio imponito. Et ubi euacuatī fuerint humores hoc sublato myrsinatū appellatū imponito. Cæterū ad rubicundas papulas in capite, cerusam cū laurino illine. Aut pini corticem cū cerato. Aut testam elibani cū aceto aut uino. Aut betam coctā impone. Aut betę succū ad ceratum rosaceum quantum eius admittit, adijce & impone.

Resiccantia & cicatricem inducentia achoribus. Cap. lxxxi.

Spumę argenti drach. xxi. calcis uiuę tantundē, acetū unc. i. rosacei tātundem, utere. Aliud ualde bonum, quod humida ulcera resiccet, & cicatrice includit. Spumę argenti, cerusę, ordeī usti, æquales partes cum rosaceo aut myrteo illine. Emplastrum melinum, resiccans omnē fluxionem, & cicatricem inducens, præsertim in antiquis ulceribus. Spumę argēti, cerusę, salis fossilis, singulorū lib. i. aluminis scissi semissem, atramenti sutorij semissem, olei lib. ii. acetū sextar. i. oleum, spumam argenti, & salem, ac cerusam coquito, singula per se & simul leuissimē trita. Vbi uero nō amplius inquinauerint, alumē & atramentum aceto diluta, ad pharmacū ab igne ablatū & aliquo modo frigefactū paulatim adijcto, unito, & in mortarium diffundito, & probē mollito, utitor.

Smegmā ad achoras, furfures, asperitates, ac scabriciem. Cap. lxxxii.

Quod si in declinatione fuerit affectio, & omnino ad cicatricem uergat, ad totam affectionē eradicandam huiusmodi smegmatis in balneo utendum est. Terrę Cimolię lib. ii. nitri rubri tantundem, myrobalani lib. i. myrrhę, iridis, piperis, singulorum unc. i. nardi celticę, costi, casię singulorū unc. i. contudit, cribrato, ac utitor in balneo.

De aurium affectionibus. Cap. lxxxiii.

Aurium dolores fiunt, tū ob frigiditatem a uentis inductam, aut a frigidis aquis, aut ipsē medicatis, in quibus homines se lauant: tū ob inflammationē cutis in meatu, aut nerui auditorij in profundo. Fit etiā dolor propter spiritū flatuosū, q̄ trāsitrū non habet.

Ad dolores ex frigidityte. Cap. lxxxiiii.

Dolores itaq; a sola frigiditate obortos, calefacientia quā celerrimē curant. Cepa igitur aut allium in oleo seruefactū frigiditates omnes sanat. Ego uero euphorbio modico ad multū oleū ammixto utor. Aut pipere exactissimē trito cū uino & oleo. Prodest & amaracnum, & optimum nardinum, & laurinum. Sed & ruta in oleo dulcissimo cocta magnifice facit.

Ad dolores ex aqua medicata. Cap. lxxxv.

Quum medicata aqua circa auditoriū meatum cōtineatur, oleum assidue infundere conuenit, ita ut aurem eluamus, & per mollē lanam detergeamus, & deinde rursus infundamus. Magnopere uero ipsos mitigat oui candidum cū lacte muliebri tepidum infusum. Omnia enim quę adhibentur, moderate calida sunt. Prodest ipsis & anserinus aḡeps. Sed & exuſio per os aquam attrahit. Aut per arundinem, uelut per aquę fusorium instrumentū (siphonē Græci dicunt) exuſione facta, ceparum succū cum anserino adipe instilla. Valde enim mitigat. Si uero quis uno pede auri affectę proximo exiliat, inclinans quodammodo seipsum, aquam faciliē excernit.

Ad dolores auriū ob humorū crassitudinē. Cap. lxxxvi.

Si dolor auri cū capitis grauitate obortus fuerit, crassus & pituitosus humores causa doloris existunt. Dinotio autē ex prægressa diætā tibi continget. Nitru igitur ac spumā nitri auricularibus pharmacis miscbis. Veratrū item album ac nigrum, & amygdalas amaras, & ex aristolochijs eā quę ad manū est, & cucumeris syluestris ac bryonię radicē, & centaurij magni radicē, & parul comā, & iridem, & casię. Et in summa, omnia amara cū mordacitate ac molestiam meatus purgant, & extergent, & crassos humores impactos secant.

Ad aurium sordes. Cap. lxxxvii.

Ad aurium sordes ungentū nardinum tepidum instilla, & sequenti die per specilli cōcauum eas quę expositę magis sunt expurga, & rursus nardinū infunde. Si uero locus durus fuerit, aut etiā sordes durę, nitrum torrefactū ac leuissimē tritum in aurem insperge, & acetum calidum instilla, & apposita lana pernoctare sine. Postera uero die, aqua & oleo calefactis elue.

De sonitu aurium. Cap. lxxxviii.

Sonitus in auribus plerunque ex flatuoso spiritu generantur. Fiunt etiam aliquando ob sensus auditus subtilitatem, ex euaporationibus. Dinotio cōtingit tibi primum ex temperatura & habitu hominis. Deinde etiam ex omni prægressa diætā. Sed & ex eo quod aut paulatim, aut acruatim fit sonitus, in-

uenire datur affectionem. Quin & ex eo quod hoc sonitus accidens aut per intervalla redit, aut perpetuo permanet, affectio cognoscitur. Exacta uero distinctio hæc à te fiat. Si enim quis putet à spiritu flatuoso exitum non habente, sonitum fieri, & secantia ac attenuantia adhibeat, & nihil proficiat una cum hoc quod etiam his quæ pituitam per os ducunt utatur. Tunc sanè ob auditus subtilitatem, sonitum fieri cōiectet. Ego uero in talibus ammisceo ex his quæ sensum stupefaciunt, uelut est mādregoræ succus, & opium paucissimū. Aut oleū in quo intestina terræ cocta sunt infundo. At uero ad sonitus ob flatuosū spiritū generatos, talia cōmoda sunt. Apolloniū ad sonitus ac bombos & sibilos derepente fientes. Accum acerrimū calefactum instilla. Aut acetum cū rosaceo calefactū instilla. Si uero perseverarint, cuminum, rutam, anethum & nigellā, cū aceto coquito, & rosaceo adiecto utitor. Aut colocynthidis medullam in oleo coquito, & oleū infundito. Si uero adhuc remanet ampliori tempore, omnibus amaris & acerbis, & attenuatorijs ac discussorijs utere, quæ paulò antea descripta sunt ad eos qui ob humorum crassitudinem aures dolēt, ita ut singula cū aceto coquas, & mel addas. Facit autē ad inueteratos sonitus, castorium & spica nardi, æquis portionibus cū aceto & rosaceo. Aliud ad sonitus diuturnos. Herbarum lanariæ, croci, castori, ueratri albi, æquales partes tere cum aceto, & informa pastillos, & utere cū uino. Cæterum ad sonitus ex morbo, fomento per absinthij decoctum adhibito, acetum cum rosaceo infunde, aut raphani succum cū rosaceo. Aut aloē optimam cum uino mulso. Si uero adhuc perseverarint, ueratro nigro cum aceto cocto utere.

Ad auditus difficultatem ac surditates. Cap. LXXIX.

Qui difficulter audiūt, per hieram ex aloē, aut per cataportia ex colocynthide purgādi sunt, & pituita per os detrahenda est, & caput omni modo resiccandum ac corroborandum. Utendum est & attenuatoria diæta. In ipsam uero aurem immittenda sunt pharmacata quæ findunt ac secant, & attenuant uiscosos ac crassos humores. Quorum sylua iā antea relata est in his qui ob humorum crassitudinem aures dolēt. Fomenta ad grauē auditum, Apolloniū. Ad audiendi difficultatem derepente obortā, & ex capitis dolore, absinthiū cum aqua in olla coctum per arundinē pro fomento adhibe, ita ut alterā arundinis partem cauitatē auris adaptes, alterā uero foraminē operculi ollæ inferas, quo uapōr qui exhalat ad auditorium meatū allabatur. Aliud. Baccas lauri aut folia in aqua coquito, & similiter utere, aut origanū, aut hyssopū eodem modo, aut aquā marinā cum aceto similiter. Est & hoc optimum, urinam tauri, aut bouis, tertia aceti parte addita, pro fomento adhibeto. Itē myrtum cōtusum similiter coctū adhibeto. At uero circulū ex lana auri circundare oportet, ut ne loci uicini amburantur. Elotiones porrò his conueniunt, acetum acre albū, cum pari aquæ mensura, & nitro leuissimè trito calefactū infunde per multos dies. Et postea aqua calida elue, atq; sic subscripta infunde. Quæ auribus in auditus grauitate infundantur. Porri succū irino ungento ammixto infunde. Veratri nigri radicem cum aceto tritam, & melle exceptā, in aurē inde, & per dies quinq; sine. Capræ recens mactatæ cornu urinā eiusdē exple, ea

maximè quæ in uesica ipsius reperitur, aut alia asseruata, & cornu in fumum ad dies nouē suspende, ac utere. Clauos caligarū ueterum numero centū, in uino Amineo ad dies septē macerato, & donec septies ebulliat coquito, excolato, & adseruato, & usus tempore quātum satis est calefactū infundito. Hocus ego surdū curauī. Aliud. Asphodeli radicē in oleo coctā adhibe. Hoc etiā inueteratā audiendi difficultatē sanat. Optimus est etiā cucumeris syluestris radicum aut foliorū succus cū aceto infusus. Aut capræ urinā & fel eiusdē simul calefacta infunde. Aut castoriū cum baccis lauri & aceto. Aut ueratrū nigrū cum aceto terito, & melle diutius cocto excipito, & collyria ad glādis figurā formato, & in meatū indita per triduū finito. Aliud. Nasturtij seminis quantū satis est, & nitri parū, ficus pinguis carne granulis exēptis excipe, & collyria meatui auris congrua forma ac inde, & per triduū sine. Hoc sordes multas ducit, & statim alleuat. Aliquādo uero pro nasturtio sinapi conijcimus. Utere hoc etiā ad aurium sordes. Multū quoq; opitulator ad auditus grauitatem spōgia in tenues partes cōcisa, ac intorta & melle imbuta meatui indita. Idē cōmodum est ad enascentem in auditorio meatu superfluā carnē. Aliud. Omnis piscis fel infusum prodest, itē perdicis, & capræ. Aliud. Fel tauri cū anguis senecta tritissima aceto exceptum, & meatui inditū, grauem auditum soluit. Quidā cum rosaceo indunt. Aquæ uero fomentum adhibere oportet. Aliud. Saluæ succū cū oleo omphacino in aurē instilla. Utere, est ualde cōmodum. Aliud. Herinacel terrestris fel cum oleo infunde. Aliud. Veratri albi drach. iiii, castori drach. i. spumæ nitri drachmam i. infunde cum aceto, & utere uelut optimo. Utere etiā pastillo ex amygdalis amaris cum aceto mulso. Descriptus est ad aures purulentas.

Ad aurium inflammationes.

Cap. LXXX.

Moderatas & non pulsantes inflammationes sanat rosaceū cum aceto tepesactū. Et glauciū in cote medica tritum cum uino dulci ac modico aceto. Si uero uehemētior fuerit inflammatio, dolores quidē mitigat, tenuē, ac candidū ouī cum lacte muliebri tepidū infusum. Optimū uero ad ipsos pharmacū est nardinum ungentum, cū modico medicamēto Basilico appellato, aut cū adipe anserino, aut phasianino. Vbi uero magnus est dolor, necesse est stupefacientibus sensum uti, ita ut ad lac muliebre, & ouī cadidum modicū opij ammisceamus. Ammiscendū est & castoriū, ad uehemētiores dolores pari mensura, ad leuiores dupla proportione. Nos autē opiū & castoriū cū sapa probè conterimus, & tepesacta infundimus. Oportet autē omnino non cōtingere auditoriū meatum tempore doloris. Et fomentū adhibere per auriculariū specillū, lana mollissima circūdatum, ita ut lanā tepido Basilico medicamēto, cum nardino aut alio ex his quæ infundūtur tingamus, & ad principiū auditorij meatus indāmus, & pharmacū in profundū destillare sinamus. Et hoc assidue facere oportet. Postquam uero repletus est meatus, lanā superne obdito. Quod si æstas fuerit, & multæ caliditatis sensus ægrū circa inflāmatā aurē uexarit, fomentum per rosaceū bonū fiat. Mitigat porrò feruētes inflammationes tepida cū rosaceo instillata, auriculæ muris succus, & polygoni, & portulacæ, & rametorū cucur

cucurbitæ succus, itē aranei cū rosaceo cocti, & aseli sub hydris stabulantes similiter, & intestina terræ eodē modo. Et blattæ domesticæ interanea cū rosaceo. Et oleū amygdalinū ac hyoscyaminū. Medicamentū auriculare ē succis, ad inflāmatōnes quæ ægrè transmutantur: citō enim ipsas suppurat. Succū ramentorū cucurbitæ, succū calami, succū perdicij, succū brasicæ, singulorū cyathum unum, nitrī tostī, myrrhæ, croci, singulorū drach. iiii. unguētī nardini unc. i. aluminis liquidī unc. i. aceti scillitici sextantē, mellis optimi lib. i. excipe & repone in uitreo uase. Et usu postulante, cū nardino aut rosaceo diluto utere. Aliud, ad diuturnas & ægrè transmutabiles inflāmatōnes. Galbani drach. vii. seu taurini drach. iiii. ceræ, colophoniz, saponis, singulorū drach. iiii. picis drach. i. Colophoniz, picem, seu liquefacito, & galbanum cū cera præmollitum adijcito, & deinde etiā saponē, & excolatis utitor, ita ut in cote cum aqua aut oleo aliquo diluas. Ad maximos dolores. Aloē optimam uino mulso dilutā instilla, aut lanas succidas aceto feruefacto, & instillato, insupérque ipsam lanam in aurem indito. Quod si mitius facere uelis, cum aceto aut sapa coquito.

Ad aures absq; ulceratione humectas, quæ uelut exudāt, & serosum humorem excludūt. Cap. lxxxxi.
Misy in linteolum illigatum & prunis obrutum, exurito, & unā cū exusto linteolo terito, & per arundinem insufflato. Aut gallas terito, & linteo illigatas exurito, ac similiter utitor. Aut alumen in testa exustū, & oleo præaffuso tritū insufflato. Porro postquā penitus sedata fuerit inflāmatio, castoriū cū oleo infūdatur, quo detrimētū ex afflictione soluitur.

Ad ulcera in meatu auris. Cap. lxxxii.
Recentia quidē ulcera glaucium curat solū cum aceto tritum, & omnia ex ipso collyria, & quæ ex croco, itemq; ex rosis fiunt & appellationē habēt. Curat etiā eadem collyrium Damocratis ex myrrhæ. Quæ uero purē manāt citra dolorem, & moderate hoc patiūtur, per eadē curantur. Quæ uero fortiter purē manant, per pastillos. Qualis est Andronis & præsertim Musæ, cum sapa & modico aceto infusus. Quod si etiā hæc superentur, recrementū ferri cum acerrimo aceto, in caniculari æstu ad solē terito, & pastillos efformato, & utere cū aceto. Si uero nō est canicularis æstus, recrementū ferri leuissimē tritū cū aceto ad prunas coquito donec resiccet, & utere cū aceto. Auriū elutiones. Cæterum Apollonius ad auriū ulcerationes talia scribit. Vino mulso calido frequenter ipsas elue. Aut myrrū cū uino coquito ac utitor. Si uero foetidū fuerit quod prodit, malicorium & lentē cum uino coquito, & tepidū infundito. Post elutiones autē cōueniunt ad infundendū, fel bubulum, & maxime porcinū, in malicorio tepēfactū instilla. Idem facit & caprinū fel, & omnis piscis fel rosaceo ammixto. Aliud optimū. Alumen scissum tritū, cum sapa & aceto in feruētī cinere coquito ad mellis spissitudinē, ac utitor. Facit etiam omne alumen cū polygoni succo, & Erasistrati Panchrestos appellata ab omnimoda utilitate, liquida. Habetur autem inter ocularia medicamēta. Aliud. Aluminis scissi, croci, gallarum, æquis portionibus utre cū uino. Auricularis cōpositio ad dolores magnos, & pus albū. Amygdalas amaras decorticas viii. spumę nitrī albę drach. iiii. thuris drach. iiii. opij

drachmas tres, croci drach. iiii. galbani drach. ii. myrrhæ drach. i. aceto trita excipe, & forma pastillos ac utere, si dolor adest, cū rosaceo. Si pure manāt, cū uino mulso, aut aceto aut sapa. Si uero auditus grauitas affuerit, cum aceto ad diuturnas ulcerationes. Aloēs, thuris, myrrhæ, singulorum drach. iiii. misyos dra. ii. efforma cum aceto, & utere resolutis cū aceto aut rosaceo.

Ad corruptiones ac factores aurium. Cap. lxxxiii.
Malicorij & lentis decocto elue uelut prædictū est, & utere subscriptis. Aluminis scissi libram unam, atramētī futorij drach. viii. myrrhæ drach. viii. crocomagmatis drach. viii. uini dulcis mytei sextar. iiii. Alumen cū uino coquito, & ubi ad compagem reductū fuerit, reliqua prius trita cum aceto adijcito, & unctis utitor cū sapa & aceto. Aliud, ad purulentas & graueolētes aures. Vrsi fel instilla, si uero aridum fuerit, cum aceto & sapa diluto utere. Summē enim prodest. Aegyptium pharmacū ad omnes relatas affectiones, etiā si fuerint cōgenitę. Amygdalarū amararū drach. ii. piperis albi drach. ii. fabarū Aegyptiarū internam partem drach. ii. pōdere, croci, myrrhæ, opij, thuris, castorij, singulorū drach. ii. omphacij drach. iiii. atramētī futorij drach. iiii. spumę nitrī drach. ii. Terito cum aceto in quo malicorium coctum est, & excipe ad strigmentidam spissitudinem. Vnus autem tempore quantum satis est de hoc pharmaco accipe, & nardino ungento dilutum instilla.

Ad superexcrecentes in aurium ulceribus carnes, Heraclidæ Tarentini. Cap. lxxxiiii.
Aeruginis drach. viii. squamę æris drach. iiii. mellis hemina dimidiū, hoc est dodrantē. Arida trita melle excipe, ac coque ut rubicūdum pharmacum euadat, & utere super eminentē locum hoc ponens. Aliud. Aeruginis drachmas quatuor, atramētī futorij drach. iiii. succū marrubij, cyathos tres, mellis quantum satis est, præpara & utere uelut dictū est. Aliud. Apollonij Memphitæ deprimit omnē superexcrecentē carnem, citra dolorem. Aluminis scissi drach. iiii. misyos usti drach. iiii. aeruginis drach. ii. lemnij sigillī drach. ii. gummi drach. ii. (aliij singulorū tot uncias pro drachmis habēt.) Terito cū aceto, & formato pastillos, ac utitor cum uino aut aqua. Deprimit & cicatricē inducit. Facit & ad nares exulceratas.

Ad uermes in auribus. Cap. lxxxv.
Vermes in auribus aut generatos, aut extrinsecus illapsos, amara & acria in summa occidunt, uelut sunt, capparīs foliū aut succus, cedria, urina humana uet⁹, singula cū melle: aut aristolochiā tritā insuffla: aut calaminthæ succū infunde. Aut ueratrū album cū uino: aut colocynthidis decoctum, aut cēraurij, aut absinthij, aut polij cum uino: aut scordij, aut marrubij succum, aut elateriū cum aceto. Facit & maluę hortensis aut syluestris succus: maxime in his quę sunt inflammata.

Ad sang uinis ex auribus eruptiones. Cap. lxxxvi.
Ad sanguinis ex auribus eruptiones, ut ne in grumos coeat, porri succum & acetum mixta infunde, & sanguinē sistet, & grumos dissoluet. Aut malū punicum in aceto coctum infunde. Aut gallum in aceto coquito & excolato, & rubi succum misceto ac infundito. Aut polygoni succum cum modico aceto, aut acaciam, aut amurcam, aut lycium cum aceto instillato.

De calculis aut alijs corpusculis in aurem illa-
psis.

Cap. LXXXVII.

Si calculus, aut faba, aut consimile quid in meatu au-
ris illapsum fuerit, elue. Aut specillum lana obuolu-
tū resina tinge, & extrahe. Aut per glutinosum ali-
quod pharmacū aut dropacem idem facito. Quod
si nō successerit, sternutatorium naribus inde, & os
obtura ac nares. Nam iuxta contingentem spiritus
extensionem id quod incidit efflatur. Hoc autē assī-
due fiat, donec exciderit. Si uero intus manserit, au-
ris inflāmata cōuulsiones inducit. Optime uero eorū
quæ illapsa sunt eiectionē adiuuat concussio,
ita ut si puer fuerit, pede teneatur, & cū concussione
in caput eleuetur. Si uero perfectæ ætatis quispiā ita
fuerit affectus, ipsum in tabulā secundum affectā au-
rem reclinatū, caput ad tabulā firmare iubeto. Dein-
de leuata tabulæ circa caput parte deferri finito, idē
sæpe repetito. Mouebitur enim quod incidit, & ad
expeditiores meatus partes progredietur, atque ita
angusta & cōcaua specilli parte immissa scite extra-
hito. Si uero faba aut cōsimile quid in aurē illapsū,
in ea maneat, madefactūq; ac tumefactū dolores in-
ducat, impossibile est ipsum integrū eximere. Qua-
re per specilli concauū industriē partiū ac diuidere
ipsum oportet, atq; sic particulatim extrahere. De-
inde sapam aut uinum dulce calidum infundere ac
lenire meatum ex laniatione offensum.

Ad affectiones aurium extra meatū. Cap. LXXXVIII.

Foramina in pulpīs aurium in pueris inflāmata, oleo
quod in ærea lucerna æruginē contraxit, assidue il-
line, & sanabis. Ad cōrulas autē aures, myrrhā, man-
nam thuris, terrā nigram, qua quidam pro smegma-
te utuntur, cū aceto ad cerati spissitudinē unita impo-
nito, & nequaquā amplius irritato. Aliud. Sulphur
uiuū, myrrham, thus, cū pice liquida in splenio im-
ponito. Philagrū ad contusas aures. Mannam thuris
aut ipsum thus, & aloēm, cū uino & rosaceo terito
& imponito, his etiam cochleas paruas integras tri-
tas, si haberi possunt, addito. Aliud. Intestina terræ
cū modica terra ex qua accepta sunt, tere & impo-
ne. In quibus uero fractæ sunt aures, intrinsecā ex-
peditiorem cōcauitatē cartilagineam figulina terra
expleto, & resiccati finito, ac solanū cum cerusa illi-
nito, donec in integrū restituantur. Si uero inflāma-
tio ad contusionē accesserit, meatui quidem butyrū,
tepīdum, aut adipem anserinum, aut gallinaceū in-
stilla. Aut etiam ocymī succum cū aliquo ex relatis
adīpe. Forinsecus uero cerusam cum solani, aut po-
lygoni, aut coriandri succo illine. Aut putamen ma-
li puncti dulcis in uino coctum ac tritum obline.
Aut glaucio utere. Emplastrum autem hoc adhibe-
to. Sandycis lib. i. olei lib. i. aquæ semissem. Coqui-
to simul, donec non amplius inquinent, & utere.

De parotidibus.

Cap. LXXXIX.

Parotides ex genere sunt inflāmatōnum. Fiūt autem
glandulis circa aures affectis. Non tamen utimur in
ipsis, uelut in alijs partibus inflāmatis, in principio
repellētibus. Imō uice uersa attractorijs utimur, as-
siliētem humorē ex profundo ad cutem attrahere
cōnātes, & naturæ opem ferre, quæ per humorū ex-
loco in locum, impetuolum illapsum, febres curat.
Ac uero quum uehementi impetu fluxus illabitur,
nihil nos curiosius agentes, omnia naturæ permittī-
mus. Si enim aut cucurbitā, aut pharmacū quoddā

humores ex profundo ad cutem attrahēs adhibue-
rimus, uehemens dolor hominē occupat, ut ex ipso
& uigiliæ succedant, & febres intenduntur, ac uires
exoluantur. Mitigare igitur tunc potius cōuenit, &
non humorū influxui opitulari, per cataplasmatum
maximē leniētium usum, quæ ad hoc quod mode-
ratē humectā habent caliditatem, per quam mitiga-
re dolores ualent, etiā influentes humores cōcoque-
re possunt ac suppurare. Vbi uero suppurati fuerint,
discutere ipsos aggrediemur. Si uero duricia cū do-
lore apparuerit, emollientia ad attractoria miscebi-
mus. Proinde ubi uehemēs dolor obtinet, & humo-
res adhuc influunt, butyro utemur locū assidue illi-
nentes, aut adipe suillo, aut butyrū & adipem simul
liquefaciemus, & modica cera adiecta, ut mollius
ceratū fiat imponemus. Ac uero moderatas paroti-
das, in quibus neque multa copia influūt, neq; dolor
uehemēs adest, neque suppuratio expectatur, facile
curabimus per fomenta ex muria, & cataplasmata
ac pharmaca discussoria. Quale est Mnasææ empla-
strum, & emplastrū ex succis, & his adhuc magis ea
quæ molliora sunt & ceratiformia, ex butyro &
celsypō parata, quæ assumunt ostrea usta, aut bucci-
na, aut purpuras. Quale est & hoc. Adipis anserini
ueteris insulsi sexuncem, butyrī uncīā unā, ceræ sex-
tantem, ostreorū ustorum tritorū sextantem. Ligua-
bilibus liquatis ostrea insperge, & unitis utere con-
fidenter. est enim efficacissimū hoc. Aliud ualde bo-
num. Apochymatis sexuncē, picis bessem, ceræ qua-
drantem, colophonitæ sextantē, adipis uululini sesqui-
uncīā, bituminis sextantē. Reliqua liquato ac excola-
to. Bitumen uero cū modico aceto terito, & liquata
ad ipsum affūdito, & emollitis utitor. Quin & in in-
duratis iā ac diuturnis parotidibus, buccina usta &
omnia ostrea adipi ueteri porcino liquato ammi-
xta, uelut dictū est, citra omnē molestiā discutiūt o-
mnes diuturnas ac induratas inflāmationes. Quapro-
pter utēdū est in duriorib; parotidibus albo empla-
stro ex buccinis, quod Ariobarzaniū appellatur, &
eo qd' Dionysia appellatur, & ex misy paratur. De-
scribētur ea in sermōe de emplastris. Ego uero soleo
parotidas puerorū & mulierū solo butyro curare.

De narium affectionibus.

Cap. xc.

Ex genere tumorum præter naturā polypi in naribus
generantur. E' genere uero ulcerū ozænæ. De excre-
tionibus autē præter naturā sunt sanguinis eruptiones,
Ozænæ itaq; ex acrium & putredinosorū hu-
morū influxu fiunt. Nam si solū acres fuerint, in-
curabilia ulcera facere solent, non tamen graueolen-
tia. At polypus appellatus, polypi marini carni iux-
tā essentiae proprietate, & colore & compage simi-
lis, ex crassis & uiscosis humoribus generatur. Cæ-
rerū curatio utrisq; cōmunis est, ozænæ & polypo,
ut primū caput resicetur ac corroboretur. Manife-
stum est enim quod uiscosorū humorū redundantia
naribus ex capite influūt. Quomodo uero caput ro-
borare oportet, iam dictū est, ubi de capitis dolore
egimus, ubi diuersa smegmata & epithemata descri-
psimus, quæ sincipiti ac toto capiti præraso imponū-
tur. Verū ad iā præscripta optimē ad ipsos facit em-
plastrū ex anemona capiti impositū. Itēq; hoc. Myr-
rhæ unc. i. thuris unc. i. cochleas integras v. ouorū cā-
dida ii. Omnia in mortario cōtusa ac mixta illinito,
linteo capiti superimposito, & finito per dies ix.

Atq;

Atque ita postea localibus auxilijs utere.

Ozenarum curatio.

Cap. xci.

Postquam itaq; per prædicta caput corroboratum præparaueris, ad nasi curationē procedes, scopum propositū habēs in ozænis, ut affectam partem per pharmaca mixtam uim habentia resicces, repellentia uidelicet ac discussoria. Repellūt igitur austera & acerbæ, quæ in communi adstringentia appellantur. Discutunt autē siccam & calidā uim habentia. Archigenes autem ad dolores in naribus & ozænas talia describit. Calamīnthæ succū infunde. Aut ipsam siccam tritā insuffla per arundinē. Aut erucę succum assidue infunde. Aut mel in nasum stillato, & per sternutatoriū concussione facta, tectoria ulceri obducta excutito. Deinde ueratrū album cū multo nasturtij semine naribus attrahere iubeto, & postea amurcam cū melle illinito. Aut ranunculi succum cū alumine liquido in nasum instillato, & attrahere iubeto, atq; hoc facito donec persanaueris. Si uero antiqua fuerit affectio, etiā acetum acerrimū ammisce. Meatus autem nasi ex hoc illinito. Spicam nardi & misy, æquis portionibus trita cū uino austero ad strigmentitiam spissitudinē illine, & lana obtura. Optime uero facit ad ozænas atramentū sutoriū melle cocto exceptū, & chalcidīs eodē modo, & ærugo, & squama æris, & floridum medicamentū ori destinatum. Et hoc, chalcidīs crudæ drach. xii. cadmiæ drach. viii. terito cū aceto ad multos dies sub caniculæ feruore, & exiccato, utere cū uino ipsum diluēs, aut siccum insufflans. Aliud, Mysios, chalcidīs, myrrhæ, singulorū drach. iiii. atramenti sutoriū drach. iiii. aluminis scissi, gallarum, squamæ æris, singulorū drach. iiii. aluminis rotundi drach. ii. thuris drach. i. aceti lib. i. Omnia trita simul coquito in æneo uase, & ubi ad mellis cōpagem redacta fuerint ablatis utere, linamēto intincto & naribus penitissimè indito. Siccus puluillus ad ozænas. Fructus ericæ, myrrhæ, nitri, malicorij, singulorū drach. iiii. croci, costi, singulorū drach. ii. trita insuffla. Aliud, Aluminis scissi, myrrhæ, singulorū drach. iiii. sandarachæ, rhois culinarij, salis ammoniaci, croci, costi, singulorū drach. ii. trita insuffla, naribus prius uino mulso collutis. Aliud Theodori ad graueolentiā nariū. Amomi, myrrhæ, casie, rosarum siccarū, æquales partes tritas cū ungento nardino dilue ac utere. Aliud, Myrrhæ, casie, rosarū, singulorum æquales portiones contusas ac cribratas melle excipe, & mane ac uesperī illine, donec malum cesset. Aliud. Hedichroo cū uino mulso trito utere. Aliud, lucundū appellatū. Myrrhæ drach. iiii. casie drach. iiii. floris lund odorati drach. iiii. rosarum siccarū drach. i. terito cum uino mulso ueteri, reponito ac utitor illinens ex eo nares. Aliud. Cyperi quadrantē, sandarachæ, aluminis scissi, myrrhæ, croci, singulorū unc. i. aridum insuffla. Aliud. Apollonij ad polypos. Veratrū & origanum trita insuffla. Aliud. Veratrum nigrū & sandaracham, æquis portionibus cum oleo terito, & lana excepta naribus indito. Aliud. Atramentum sutoriū, æruginem, laser, æquis portionibus, cū oleo illine naribus per specillū lana obuolutū, ad dies nouē. Deinde uollula trahe ac exime. Aliud ad ozænas quo assidue utor. Ad pastillum Musæ adijce chalcidīs drach. vi. aliquādo etiā xii. & ueratri albi drachmas

ii. Vtereq; cū uino mulso. Aliud. Auripigmētū tritū per specillū large admoue. Vbi uero intumuerit & eminuerit, ueratro nigro arido trito moderato utere, & in septem diebus ut plurimū nasus uacuus redditur. Deinde diphryge trito cū melle expurga. Aut auripigmētum, calcē, & ueratrū albū trita cum melle adhibe. Aliud celebre. Myrrhæ drach. iiii. chalcidīs drach. iiii. casie drach. iiii. spicæ nardi drach. ii. mysios drach. ii. ueratri albi drach. i. Vtere sicco, & cū uino mulso. Aliud bonum. Mysios torrefacti drach. viii. iridīs drach. iiii. croci drach. i. excipe melle ac illine. Aliud, Aluminis scissi unc. i. myrrhæ unc. i. thuris sesquifunciā, muscī herbę quæ & dorcadias appellatur drach. iiii. æruginis drach. ii. salis ammoniaci scrup. iiii. terebinthinæ unc. i. mellis trientē, aceti quantū satis est. Aliud, facit & ad polypos. Aeris usti, squamæ ferri stomomatis, aluminis scissi, singul. unc. i. myrrhæ unc. i. thuris sesquifunciā, aristolochiæ, uerbenacæ rectæ, squamæ æris, æruginis, singulorum unc. i. aut omnium æquas portiones, adhibe aliquādo uino diluta, & per linamentū inde. Aliquando uero cum compositione ex moris, aliquādo cū melle. Aliquādo etiam siccū insuffla, aquā in ore continere iubens. Aliud cuius uilitatē ne cōtempseris. Centaurij tenuis usti, polij usti, chamæmelli usti, singulorū drach. viii. æruginis, squamæ æris ustæ, radicis cyclamini siccae, myrrhæ, aloës, malicorij, singulorū drach. iiii. tritis utere prout uoles. Aliud, ad ozænas, & erosiones, & nomas, & crassitudinē, & omnia nariū uida: Succū soliorū uidis albæ quadrantē, mannæ thuris, atramētū sutoriū, chalcidīs, aristolochiæ, singulorū drach. iiii. terito & siccato ac insufflato. Pastillus ad ozænas Cyri Archiatri Edeffæ. Cadmiæ ter ustæ ac uino extinctæ, plumbaginis, plumbi usti, spumæ argentī, spicæ nardi, thuris, soliorū cupressi, herbæ sabine, gallarum, Lycij indicī, gummi, singulorum drach. iiii. cerusæ, glaucij, solij, balaustiorum, floris lund odorati, malicorij, aloës, acaciæ, singulorum scrup. viii. florum rosarū & foliorum singulorum scrup. vi. cōtusa & cribrata terito cum aceto, & formato pastillos, ac utere cum uino, aut sapa.

Polyporum curatio.

Cap. xcii.

Iam antea dictū est quod ex crassīs ac uiscosis humoribus polypus generatur, & propterea mixta materia opus habet, adstringēte & secante, & discutiente, ac siccante. Quorum sylua talis est. Aluminis scissi, myrrhæ, sandarachæ, singulorū drach. iiii. atramētū sutoriū usti drach. i. gallarum drach. i. tritis utere, ubi prius nares uino odorato elueris, ita ut postea per specilli nucleū illinas. Vtere etiā his quæ ad ozænas præscripta sunt. Aliud. Soreos drach. ii. chalcidīs tostæ drach. ii. fructus myricæ drach. i. croci drach. i. myrrhæ drach. i. trita insufflato uelut dictū est. Aliud. Chalcidīs tostæ drach. ii. mysios drach. ii. atramētū sutoriū usti drach. ii. amomi drach. ii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. i. terito & utitor siccis. Aliud mirabile. Soreos quadrantem, aluminis scissi quadrantem, gallarum sextantem, myrrhæ sextantē, utere sicco. Aliud ad polypos, ozænas, ægilopas, & quæ extra sectionem ac uisionem remouere uoles. Disparat etiam ossa corrupta. Ramentorum æris rubri unc. i. salis ammoniaci sextantem, aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi heminas

VI. Arida trita adiecto aceto æris rubri uase exci-
pe, & ad solem expone ac pistillo æneo sub canicu-
lari æstu agita, donec resiccentur. Deinde trita uase
fistili reconde. Vfus autem tempore aqua in ore te-
neri iube, & per arūdinem naribus insuffla. Ad po-
lypos & ozænas. Sinapi tritū aquæ misceto, ac sub-
igito, & collyria glādifformia formato. Deinde gra-
cile linteolum sinapi obducito, quo ipsum extrahe-
re possis ubi uoles, & naribus indito, principio lin-
tei foris relicto, & totam diem finito, & excidet po-
lypus. Aliud ad polypos & ozænas ac superex-
crescentē carnem. Aluminis scissi scrup. i x. alumi-
nis rotundi scrup. vi. atramentū sutorij scrup. vi. chal-
cididis scrup. x viii. myrrhæ scrup. x viii. squamæ
æris scrup. ix. thuris scrup. iiii. gallarū scrup. xii.
contusa cribrata terito cū aceto uelut collyrium, &
formato pastillos. Vfu uero postulante, quantū sa-
tis est cū melle contere, & linamētum intinge, ac na-
ribus inde, & ad diem unam sine. Altera uero ex-
trahe, & sequetur polypus, quod plerūq; fieri solet.
Aliud Oribasij. Squamæ æris drach. viii. sandara-
chæ drach. iiii. çris drach. vi. ueratri nigri drach. ii.
Siccum hoc insufflato, & uelut optimo utitor. Nā
in diebus decem manifestam utilitatē declarat. Ne-
cheplos rex ad carnē in naribus enatam. Squamam
æris, & squamā ferri, ac alumen scissum, æquis por-
tionibus terito ac insufflato, aut per specillum adhi-
beto, aut in linamento utitor. Asclepiadæ ad po-
lypos. Atramentū sutorij drach. i. diphrygis usti drach.
ii. calcis uisæ drach. ii. sandarachæ drach. ii. sicca
adhibe. Aut linamētum intortū aqua madefactum
ac pharmaco imbutum inde. Aliud quo Antipater
usus est. Atramentū sutorij, sandarachæ, æquales par-
tes tritas insuffla, & per specillū admoue. Aliud.
Atramentū sutorij usti drach. iiii. rubicæ sinopice
drach. i. trita insuffla. Naturale Apollonij ad po-
lypos. Nycticoracem iugulato, & calido ipsius san-
guine polypum illinito: Reliquū uero in sole sicca-
to ac reposito, & aridum tritū inspergito. Aliud
eiusdē ad exulceratos polypos, & ad ozænas. Dra-
cunculi radicem aridam tritam insperge, facit & suc-
cus ipsius illitus. Aut cupressi folia, aut pilulæ ficus
carne exceptæ. Facit & salua imposita. Et laser cum
atramentū sutorij, aut æruginis pari portione. Ga-
lenus autem ad polypos inquit & ozænas compe-
ri egregiē facere subscripta. Primū quidem id quod
ex malis punicis paratur. Sin autem æquali nu-
mero ac magnitudine ex tribus generibus accepta,
de austeris, de dulcibus, & de acidis. Oportet autem
ipsa recentia matura contundere, ipsaq; tota confrin-
gere exacte, quo succus ex ipsis exprimi possit. Quē
modicē coctum reponimus in stanneo uase. Quod
uero restat solidum & crassum, diligenter in morta-
rio tundito, & ualde bene in pila terito, ac collyria
formato, oblonga, & crassitudine & longitudine
differentia, eaq; siccato. Et usus tempore congruū ex
his collyrium in nasi meatum inde, in quo polypus
existit. Nam citra mordacitatem & consensum tol-
lit polypum longiori tempore. Si uero humidior
& mollior polypus tibi uideatur, amplius accipies
de austeris punicis malis: Si uero durior, de acidis.
Quandoquidem autem molestum est semper colly-
rium ferre, conuenit ab eius usu interquiescere, & in-
terim dum collyriū non adhibetur, succo expresso

uti, & ex ipso internas oris partes illinere, hiantē æ-
gro, eo maxime loco quo nasus ad palatū perfora-
tus est, atq; hoc per pennam, aut lanā specillo obuol-
utam. Cæterū ex siccis pharmacis noui aliquādo di-
phryge polypū consumptū. Cōuenit in ipsis quoq;
prædictum collyriū ex malis punicis siccum, leuissi-
mē tritū ac insufflatum. Aut per specilli nucleū na-
ribus inditum. Omnia autē hæc assidue facere oportet,
ut nunquam desit medicamentū loco affecto. Fa-
cile enim ab influente humiditate eluitur. Philagrii.
At in eunuchis & molle corpus habentibus, & pro-
pterea nullam mordacitatē ferentibus, rosas siccas le-
uissimē tritas adhibe, mirifice enim prosunt molli-
bus & humidis corporibus. Nā pleraq; quæ effica-
citer polypos eximunt, exacerbant quodam modo
ubi scopum non contigerint. At uero in diuite quo-
dam quī odoratum pharmacum expetebat ad oze-
næ curationem, pastillo hedychroo usus sum, sub-
egitq; ipsum cum uino ueteri odorato. Et mirum est
quā breui affectio curata est. Relata est autem hu-
ius præparatio in theriaces descriptione.

Ad ulcera in naribus.

Cap. xciii.

Ulcera in meatibus nasi simpliciora semper curauit per
pastillos Andronij, & Pasionis, & Polyidæ, & Mu-
sæ, & Bithynum appellatum, aliquando uino dulci
ipsos exoluens, aliquando austero. Et quandoq; per
acetū uinosum aut acre, ita ut ab affectionū sympto-
matis, pharmacorū usum inueniamus. Archigenes
autem pinguibus emplastris eiusmodi ad ipsa usus
est. Plūbi cremētum tritum, cū uino ueteri ac myr-
teo oleo, æquis partibus in fistili uase coquito ad
prunas, semperq; agitato. Et ubi strigmentosum fa-
ctum fuerit pharmacum, ablatū in pyxide plumbea
seruato. Oribasij ad nasi ulcera. Spumæ argenti
drach. vi. cerusæ drach. vi. plumbi usti & loti drach.
iiii. myrrhæ, aloës, singulorum drach. ii. gallarum
drach. i. uino & myrteo oleo dilutis utere. Facit etiā
ad sedis uisā. Aliud Oribasij. Atramentū sutorij
drach. vii. aluminis scissi drach. vi. gallarum drach.
iii. malicorij drach. iiii. Ex uino aut aceto terito. A-
liud eiusdē, ad simpliciora in meatibus nasi ulcera.
Spumæ argenti drach. vi. cerusæ drach. vii. malico-
rij drach. iiii. aluminis scissi drach. iiii. terito cū ui-
no & affuso oleo myrteo, in plumbeo uase seruato
ac uictor. Optime faciunt ad eadem: Asteris colly-
ria, & Libiana appellata, & præsertim Cleonis ac
similia, cum uino & oleo myrteo diluta.

Ad sanguinis e naribus eruptionem.

Cap. xciiii.

Sanguinis e narib⁹ eruptionē sistit foliorū urticæ succus
per linamētū inditus. Et ipsa folia trita frōti imposi-
ta. Itē chalcidis arida trita linamēto excepta ac indita.
Oportet autē linamentū lucernariū frigida aqua
tinctū in chalcide obuoluere. Sistit & lysimachij
herbæ succus, & anthyllidis. Et ferulæ pars lanugino-
sa cū aceto indita. Thus cū polygoni aut porri succo
asinini stercoreis recēis succus, cū porri succo, & ace-
to per linamentū inditus. Aut stercus idē uisū insus-
fla. Aut spōgiā nouā pice liquida imbutā inde. Aut
hippureos succū, aut ipsam herbā tritā inde, & frōti
imponere. Aut saluæ folia trita adhibe. Aut ouorū
testas urito ac terito, & de his duas partes sumito,
& de galla omphacide partem unā, & linamēto a-
qua aut aceto tincto excepta indito. Frōtē uero bul-
bis tritis cū porri succo aut aceto integito. Aut gy-
psum

ipsum ouf candido subactum fronti ac naribus imponito. Magis autem facit lapis specularis translucidus cum aceto. Aliud. Cochlearum carnes cum aceto tritas adhibeto. Aut cochleas uistas ac tritas, fronti ac naso cum aceto imponito. Apollonius autem inquit, cochlearum carnes cum iure tritas naribus indito, & sanguis sistetur. Iisdem etiam frontem intege. Aut siccum ex anemona pharmacum emplastri forma fronti impone. Aut emplastrum ex solidibus. Optimum autem est hoc, ex cuius usu saepe laudem assequutus sum. Lapidem molarem feruefactum ac ignitum acerrimo aceto extingue, & uaporem naribus admoue, ac sistetur. Commodum est & per spongas frontem frigefacere, & caput in sublime leuare, & manuum iuncturas inguinacum ac genua deligare. Apollonius porro ait, pedis e directo naris unde sanguis erumpit, magnum digitum ligato, & multum ac aegre sisti se sinentem sanguinis lationem sedabis. Commodum est etiam cera aures obturare, & in ore aquam pluuiam frigidam continere. Sed & cucurbitam occipiti affige cum scarificatione. Et circa uiscera magnam cucurbitam adhibe, si dextra pars sanguine manarit ad hepar: si sinistra, ad splenem. Aliquando etiam uenam secare cogimur. Summe uero facit hoc. Rhoidarum & ochrae aequales partes cum aceto in oppositam nari aurem instilla. Nimirum si dexter nari meatus sanguine fundit, in sinistra aurem: si sinister, in dextram. Sed & quae ad sanguinem spuentes describentur potanda praebent.

Quomodo sanguis e naribus eliciatur. Cap. xcv.

Mentam tritam melle exceptam ad collyrii formam redige, ac naribus inde. Aut rubrae radicem leuissimam tritam oleo subige, & naribus penitissimam illine. Aut graminis florē, aut summam eius asperiorē partē naribus inde, & obtorque donec sanguis erumpat.

De narium obturatione, & odoratus oblesione,

Galenus. Cap. xcvi.

Oculis & linguae ac uniuerso corpori sensum ac motum suppeditat cerebrum per neruos. Verum odoratus sensus intra caluariam est in anterioribus cerebri uentriculis uaporosum quendam spiritum habentibus. Caeterum necessarium est prius nosse quomodo nasus constructus est, & quae corpora meatibus ipsius cohaerent. Quum itaque nasus habeat medium interseptum, & duos memorabiles meatus, qui sane apparent, unus in singulis naribus, nosse oportet supra nari partes utrunque ipsorum dextrum ac sinistrum bifariam findi. Et altera quidem pars ad internam oris partem circa palatum uergit: Altera uero recta uelut ab initio ferebatur, ad ipsum cerebrum ascendit. Sunt autem in cerebro duae propagines oblongae ac cauae, principium quidem ex anterioribus uentriculis habentes, progredientes autem ad illam caluariam partem, unde nasus initium habet. Iuxta hanc uero partem etiam ossa coliformia sita sunt, per quae inspiratio & expiratio iuxta cerebrum contingit, & superfluitates in ipso expurgantur. Sed & crassa cerebri membrana, qua parte coliformia ossa contingit, tenuibus cauernis perforata est. Et per hanc sane primam excolatur crassiores cerebri superfluitates, quas mucum appellamus. Et haec deferuntur, primum quidem ipsam membranam penetrant, postea uero per coliformia ossa excolatur, atque sic in nari meatus incidunt. At in transgressu per hos meatus, aliquando pars aliqua ex his quae deferuntur,

praeterfluit in os, per praedicta foramina ex naso in palatum, & praesertim ubi fuerit mucus ille uiscosus ac crassus. Reliquum autem quod deferitur, per nares euacuatur. Adiuuamus autem excretionem per os ex palato, per sreatum. Excretionem autem ex naso, per uiolentioris efflationis ac sternutatoriorum usum. Respirationis equidem ac olfactus gratia facta sunt foramina cerebri in nares. Vritur autem ipsis natura ad recrementorum cerebri purgationem. Proinde odoratus laesio non in meatibus nari est. Sed aut anterioribus cerebri uentriculis ad intemperiem perductis, aut meatibus in ossibus colatoriis obturatis, mucum ac destillationem ut plurimum praegressis, aut his partibus perfrigeratis uel humectatis. Nam & aer qui palatum per inspirationes attrahitur, tum nares aliquando perfrigerat, tum uicinas ac contiguas partes, & hoc maxime ubi ambiens nos aer frigidus factus est. Archigenis. Primum igitur conuenit eos qui olfaciendi facultatem lesam habent, aut colatorios meatus obturatos, in siccioribus locis diuersari, quales maxime sunt maritimi, & gymnasiis pro uiribus uti, itemque unctionibus singulis diebus, ita ut erectum habeant collum, & per alios confricentur. Caput quoque pectine perfricare oportet, & nitro detergere in balneo, & aqua marina calida abluere, ac caput perfundere, marina calida affusa. Deinde etiam aquae frigidae modice immergere in egressu. Optimum est & in marina aqua assidue natari. Utendum est & medicamentis quae naribus indita caput purgant. Caeterum tota uictus ratio attenuatoriae sit facultatis. Quare etiam acrim rerum efus ex interuallis adhibeatur. Domus in qua degunt, moderate calida sit, pro temporis anni ratione. Somnus diuturnus incommodus est ipsis. Dum autem dormiunt, cervicalia sublimia habeant, & in latus reclinentur, & non secundum affectam partem, uelut si contingat unum ex colatoriis meatibus esse obturatum. Quotidiana itaque uictus ratio talis sit. Claro autem instante aere, primum uentrem expurgare tenta, per Archigenis ex colocynthide hieram. Deinde hirudines sublimiori nari parti adhibe, & multum sanguinem trahere sine. Post tertium autem diem, splenio ab intermedio supercilliorum usque ad malam obturatam nari partem intege, sic autem factum ex emplastris discussoriam uim habentibus. Quale est melinum Serapionis, & emplastrum Icelii, & nigrum Archigenis, & quod ex tithymali succo paratur, & quod ex scilla, ac consimilia. Horum autem usus non fiat infra quindecim dies. Post haec praeter ea ex aloë assidue uenter subducatur. Commodus est enim frequentior ipsius usus. Postea pituita per os ducendum est, ex staphide syluestri ac mastiche. Postquam autem sufficiens euacuatio per os facta est, emplastro ex agarico, aut ex cacheri, aut malagma te ex bacis lauri, aut aliquo consimili nasus integatur, & frons usque cutis rubificationem. Solent enim talia mucosam humiditatem per cutem attrahere. Postea uero sternutatorio utendum est, primum simpliciore, deinde efficaciore, quale est ueratrum album leuissimè tritum. Tertia deinde aut quarta die a sternutatorii usu, radendum est caput, & sinapismus adhibendus usque ad frontem. Deinde lauetur. Et post multos rursus dies si opus fuerit, rursus caput per narifusorium instrumentum purgetur. Sit autem efficax medicamentum quod adhibetur. Quale est elaterium cum lacte, aut cyclamini succus.

Aut

Aut ipsam cyclaminum siccam tritam insuffla. Aut cucumeris syluestris radicem. Aut nigellā tufam ac cribratā, & oleo uetustissimo addito probe tritam, per nares infunde, & pharmacū per respirationem uehementius attrahere iube. Aquam autem ægro in ore tenēdam exhibe. Hoc ego usus sum in quodam adolescente, qui ex muco ac destillatione diuturna olfactus sensum læsum habuit, & ubi consequenter per tridū hoc auxilio usus esset, magnopere auxiliū percipiebat. Quarta uero die attracto uehementius per inspirationē pharmaco, fortē mordacitatem in profundo capitis sentiebat, & quū hæc paulatim imminueretur, postera die penitus conualuit. Vtiliter etiā nigella assumitur cum aceto. Cōuenit autem post horum usum, post tridū uidelicet, sinapismū frōti adhibere, facieiq; ac naso, & postea lauare. Sed & odora menta assidue adhibeantur odorata hæc, Narcissus, sisymbrium, serpillum, lilij folia, uioleæ, menta, poliu, ruta syluestris, & thymbra. Omnium uero utilissimū est castoriū aceto dilutum. Quin & potum castoriū tritum cum aquæ mulsæ cyathis tribus, præ multis auxilijs proderit. Efficacius autē red dicitur, aceti scillitici cyatho dimidio addito. At uero acetum scillinū quotidie à selunis trium cochleariorum mensura acceptum, utilissimū ipsis existit. Cæterum post has omnes lancinationes, si adhuc affectio aliquo auxilio opus habet, adhibendus est etiā à raphanis uomitus, ita ut ipsi concisi aceto mulso aut garo madescant. Sequenti uero à uomitu die, æger absinthij decoctū bibat, aut pulegij. Et post hoc imponendum est naso emplastrū ex scilla, cuius experientiam feci, relinquendumq; aliquo tempore ut uaros in loco excitet, & strigmentosam humiditatem extrahat. Habetur autem hoc emplastrū in Sermonis de emplastris tractatu. Atq; hæc omnia etiā bis ac ter & sæpius adhibenda sunt, ad pertinaciores affectiones.

De sternutatorijs, Hippocratis. Cap. xcvii.
Sternutatio fit calefacto cerebro, aut humectato eo quod in capite uacuum est. Aer itaq; intus existens erumpit, sonitus autem fit, quoniam per uacuum & angustum spiritus trāsit. Consideremus autē quomodo sternutationes capitis grauitatem sanāt. Fit equidem sternutationes, maximis inspirationibus prægressis, & efflatione celerrimè sequente. Appello autem efflationem, acruatam expirationem. Habet enim cerebrum duas has facultates, per quarum alteram superfluitates in anterioribus uentriculis excernit ad seipsum contractas: per alteram uero alas nasi expandit, & spiritū attrahit. Quum itaq; à spiritu grauatur, tunc ipsum excernit per contractionē sui. Si uero obturatis in naribus uis, impeditur ex-

cernere grauantē spiritum, aut mucum: tunc uiolēto motu ad sternutationē procedit, depellere conans ea quæ meatus obturāt. Vnde sternutationes capitis grauitatem, uelut dictum est sanant. Imò etiam affectiones quasdam circa cerebrum consistentes. Quales maximè sunt, lethargus, & profundis sopores, ac cōsimiles. Tales enim per sternutatoria maximè curantur. Sed & ad solem respicientes ad sternutationē iritamus, diffusis uelut arbitror à caliditate crassus cerebri spiritibus. Extrudunt autem sternutationes etiā mucos ex cerebro crassos ac uiscosos, per uehementem spiritus impetum, etiam hos foras cōeijcentes. Porro sternutationem mouet, ueratrum album, herba lanaria, piper, castorium, cyclaminum, euphorbium, nitrum, herba ptarmica, hoc est, sternutatoria appellata, cumini, singula seorsim ac simul leuissime trita & admota. Non autē hæc insufflare oportet, sed motā pyxidem naribus admouere, aut per specilli nucleum naribus penitissimè indere. Et simplicia quidem sunt hæc. Sunt & composita ex ipsis adeo conflata, quale est hoc. Sternutatoriū Heraclidæ Tarentini. Cumini Aethiopici, piperis, herbe lanariæ, castorij, singulorum æquas portiones, contusas ac cribratas in creā pyxidem reponere. Vfus autem tempore agitātā pyxidem aperi, & naribus adhibe. Aut per specillū penitissimè inde. Aliud, Piperis, ueratri albi, herbe lanariæ, euphorbij, castorij, succi cyclamini sicci, æquis partibus utere uelut dictum est. Aliud ad diuturnos capitis dolores, uertiginē, capitis grauitatem, & comitialē. Veratri albi drach. iiii. nitri rubri, herbe lanariæ, castorij, piperis, singulorum drachmam unam, utere uelut dictum est.

Ad sedandas redūdantes sternutationes. Cap. xcviij.
Redundantes sternutationes sedant ea quæ etiam grauedinem sanant, oleū rosaceum naribus infusum, & oleum dulce, & unguentum nardinum. Olfactu uero sedant sternutationē, anisum, ocymi festuæ sicce tufæ, nigella sicca trita. Aut thymum fermento oblitum, & cinere obrutum, & ubi tostus est, tritū adhibe. Singula uero hæc raro lincolo illigata olfacienda dato. Sedat sternutationes & grauedinem, etiam myrrha per se, uel cum thure & uino odorato trita, illitis hinc naribus. Facit & menta, & hedychoon, & cyphi. Sed & aqua tepida frontī aspersa sternutationes sedat. Quin & si ab utraque nasi parte, iuxta magnos oculorum angulos uenas sitas digitis compresseris, sternutationem sedabis. At uero Apollonius naturale auxilium prodit ad hoc, ut pueri non sternutent. Ciconiæ, inquit, pennæ in domo habeantur, & impossibile est ut sternutent.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

SEPTIMO SERMONE AETII

HABENTVR.

D E natura oculorum. cap. i.	De inflammatione ob plenitudinem, & de chemosi oculorum. cap. v.	De frigida oculorū intēperie. ca. xi.
Quot & quæ affectiones circa singulas oculi partes fiunt. cap. ii.	De balneis. cap. vi.	De oculorū inflatione. cap. xii.
Perturbationis oculorum curatio. cap. iii.	De uini potu. cap. vii.	De tumore oculorum. cap. xiii.
Inflammationis oculorum superficialis curatio. cap. iiii.	De uenæ sectione. cap. viii.	De tumore indurato. cap. xiiii.
	De purgatione. cap. ix.	Vlcerum in oculis communis curatio. cap. xv.
	De somento. cap. x.	De illabētibus in oculum animalculis

- De illabentibus in oculum animalculis aut paleis, aut arena. cap. xvi.
De calce uiua in oculū illapsa. cap. xvii.
De ulcerationibus ab igne. cap. xviii.
De his quæ oculo infiguntur. cap. xix.
De sugillatione. cap. xx.
De puncturis oculorum. cap. xxi.
De uulneribus profundioribus. cap. xxii.
De ouiformis humoris excretionem. cap. xxiii.
De oculi prolapsu. cap. xxiiii.
De ulcerationibus superficialibus, ex humorum influxu, obortis, nubecula, caligine, epicaumate, encaumate. cap. xxv.
De argemo. cap. xxvi.
De fossulis, et concauis ulcerum generibus. cap. xxvii.
De suppuratione aut ungue. cap. xxviii.
De pustulis. cap. xxix.
De carbūculis in palpebris. cap. xxx.
De canceratis oculorum ulceribus. cap. xxxi.
De malignis oculorū ulceri. cap. xxxii.
De myocephalis. cap. xxxiii.
De staphylomatis. cap. xxxiiii.
Staphylomatū chirurgiā. cap. xxxv.
De ulceribus cicatrice indigentibus. cap. xxxvi.
De cicatricibus et albuginibus. cap. xxxvii.
Materia attenuans cicatrices et albugines. cap. xxxviii.
Auxilia ad cicatrices et albugines. cap. xxxix.
Albuginum tinctura. cap. xl.
Ad glaucos oculos ut nigras habeat pupillas. cap. xli.
De puerorum curatione. cap. xlii.
De aspretudinibus, ac densitatibus, sycofiq; ac callis. cap. xliii.
De oculorum debilitate. cap. xliiii.
De myopia. cap. xlv.
De nyctalope. cap. xlvi.
De hebetudine oculorum. cap. xlvii.
De obfuscatione oculorū. cap. xlviii.
De resolutione oculorum. cap. xlix.
De glaucedine. cap. l.
- De suffusione. cap. li.
De mydryasi, hoc est, pupillæ dilatatione. cap. lii.
De tabe pupillæ. cap. liii.
De macie oculi. cap. liiii.
De expressione oculorum. cap. lv.
De confusione. cap. lvi.
De his quæ in albo oculi nascuntur. cap. lvii.
De pterygijs. cap. lviii.
Pharmaca ad pterygia. cap. lvix.
Chirurgia pterygiorum. cap. lx.
De carnis in angulo magno incrementum. cap. lxi.
Chirurgia incrementi carnis in angulo. cap. lxii.
De sanguinis ex angulis eruptione. cap. lxiii.
De concretionem palpebrarum ac contractionem. cap. lxiiii.
De pediculis palpebrarum. cap. lxv.
De pilis pungentibus palpebrarum, et de duplici pilorū ordine, itemq; multiplici quam phalangosam uocant. cap. lxvi.
Pharmaca ut euulsi pili non renascantur. cap. lxvii.
Agglutinatoria pilorum. cap. lxviii.
De sutura palpebrarum sursum uersus. cap. lxix.
De sutura palpebrarum deorsum uersus. cap. lxx.
De euerfione palpebræ. cap. lxxi.
Chirurgia euerfionis palpebrarum. cap. lxxii.
De lagophthalmis. cap. lxxiii.
De lippitudine dura. cap. lxxiiii.
De lippitudine sicca. cap. lxxv.
De lippitudine scabra. cap. lxxvi.
Curatio lippitudinis duræ, siccæ, scabræ. cap. lxxvii.
De defluuio pilorum palpebrarū, quod uitium et madarosis, et ptilosis, et milphosis à Grecis appellatur. cap. lxxviii.
De abscessu in palpebris. cap. lxxix.
De calculo palpebrarum. cap. lxxx.
De grandine oculi. cap. lxxxi.
De ordeolo siue præputiola. cap. lxxxii.
- De ganglijs, atheromatibus, steatomatibus, et meliceridibus palpebrarū. cap. lxxxiii.
De uaricibus palpebrarum et malignis agnatis eminentijs. cap. lxxxiiii.
De ægilope. cap. lxxxv.
De uestione ægilopis. cap. lxxxvi.
De anchilope. cap. lxxxvii.
De carnis in angulo magno decrementum. cap. lxxxviii.
De his qui tempora inurunt. cap. lxxxix.
De arteriarum sectione. cap. xc.
De caluariæ circuncisione. cap. xci.
De frontis per submissum scalpellum excoriatione. cap. xcii.
De uasorum sectione. cap. xciii.
De musculorum temporum cataplasmatibus, agglutinatorijs, ac illitionibus. cap. xciiii.
Totius capitis illitiones. cap. xcvi.
Cataplasmata oculorum lippietium. cap. xcvi.
Illitiones oculorum. cap. xcvi.
De aridis collyrijs. cap. xcvi.
De liquidis collyrijs. cap. xcix.
Collyria ex croco, et ex succis diuersa. cap. c.
Collyria unius diei, monohemera appellata. cap. ci.
De collyrijs sistentibus. cap. cii.
De lenibus collyrijs. cap. ciii.
De lenibus et albis collyrijs. cap. ciii.
Collyria libyana, et tephra, ac spodia. cap. cv.
Collyria ex thure. cap. cvi.
Collyrium Cleonis. cap. cvii.
Collyria ex rosis uiridia ac alba. cap. cviii.
Collyria diasmyrna, et chiaca appellata ex uino. cap. cx.
Collyria ad aspretudines, et extersoria. cap. cx.
Collyria enstacla, hoc est, instillatitia appellata. cap. cx.
Collyria ex cornu ceruino. cap. cxii.
Collyria Nardina et Theodotia. cap. cxiii.


AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI SECVNDAE

SERMO TERTIVS, ET EX
ORDINE SEPTIMVS.

De morbis oculorum.

DE NATVRA OCVLORVM. Cap. I.



VRATIO circa oculos uaria est & diuersa. Nam & ipsa particula, oculus inquam, non simplex est, sed compositione sortitus est ad suam essentiam constituendam, tunicis nimirum & humoribus, insuperque palpebris ornatus. Natura enim nervos a cerebro ad oculorum regiones descendentes, uisus uidelicet, & partem duarum membrarum cerebrum completendum, quae cum ipsis nervis excurrit, augere & uelut dilatare, tunicis oculorum originem essentiae largita est, ut quae omnium intimam tunicam retiformem appellata, ex nervo uisuo constructa. Aciniformem uero tunicam huic praepositam, ex tenui membrana produxit. Similis est enim acino uuae, & figura, & colore, & rotundiore foramine perforata est iuxta pupillam. At uero tunica quae ambabus his forissecus praetenditur corneiformis uocata, ex crassa membrana originem habet. Quae uero his omnibus foris obducta est, alba illa quam agnatam appellamus, ex pellicula forissecus ossi capitis circumscissa, quae circumscissalis & circumscissalis appellatur, generationem habet ex propaginibus corporum oculi circumdatorum. Ceterum humores in oculo tres sunt: Intimus omnium est qui in cauitate retiformis tunicae continetur, uitriformis dictus: similis est enim & colore, & substantia uitro fusco. Exterius autem ab hoc situs est ad finem retiformis tunicae, humor glacialis siue crystallinus, qui etiam discoformis & lentiformis appellatur: similis est enim colore quidam glaciei, figura uero lentis, aut disco. Forissecus autem circumfusus est, ouatus siue ouiformis humor: similis est enim colore & substantia, humori albo ac tenui in ouis. Omnium igitur intimus humor uitriformis, ad hoc ut glaciale alat constructus est, qui uero forissecus ipsi circumfusus est ouiformis, ad hoc ut hunc humorem faceret factus est, & ad hoc ut ipsum a solis splendore iniuria affici non permittat. Palpebras porro constituit tunica agnata: ex his autem singulae naturali statu emota, oculum aegrotare faciunt.

Quot & quae affectiones circa singulas oculi partes sunt.

Cap. II

Quae proprie dicuntur lippitudines, & chemoses, & perturbationes, & tumores, & suffusiones ex plaga, & pterygia, affectiones sunt tunicae agnae. Eadem etiam ulceratur, & carbunculo infestatur, & cancerosam affectionem habet. At lippitudo dura & lippitudo sicca, communes affectiones sunt palpebrarum, & ipsius oculi. Ceterum circa externam palpebrarum superficiem, pustulae aquosae, melicerides & steatomata. Verum ex his quae circa internam palpebrarum consistunt, est densitas, aspretudines, sycoses, grandinae, calculi, coactio, coclusio. Et lagophthalmi appellatur, quibus

bus superna palpebra reuulsa est, ut oculum cingere non possit. Etropia uero quibus interna palpebra euerfa est. Sed & mutilationes & corrosiones, & ulcerationes in palpebris consistunt. Circa palpebras uero extremitate fit trichiasis, hoc est pilis pungentes, & defluuium pilorum, quod madarosis & pilosis dicitur. Fit & morbus pedicularis, ac porrigo, & paruus insar ordei abscessus. Sed & Mitholus, id est, pilorum nuditas, affectio est extremitatis palpebrae. Rubricunda enim haec est palpebrae ala, colore milui, hoc est, miniu referens, unde etiam Miltosis uictu appellatur. At uero anguli afficiuntur quidam etiam in Aegilopis, sed non soli. Carunculae autem naturalis supra iustum modum incrementum, & eiusdem decrementum, solorum angulorum affectiones sunt. Porro circa tunicam corneiformem, consistit caligo, nubecula, argemon, epicauma, cecoma, bothriu, ruptio, prolapsio, unguis, pus, pustulae, carbunculi, canceratae affectiones. At circa aciniformem tunicam sunt, prolapsio, myocephala, staphylomata, pupillae dilatio, quae mydriasis & platycoria appellatur, tabes, confusio, pupillae distractiones. Suffusio uero circa ipsum foramen aciniformis siue uniformis tunicae consistit, hoc est, iuxta pupillam. Sed & ouiformis humor amplior seipso factus, aut crassior, exactum uisum impedit. Quin & imminutus idem humor crystallinum resicat. Quae uero glauco appellatur, siccitas est uehemens humoris crystallini. Obscuratio autem obturatio est nervi uisui, ut omnino non uideat, qui sic affectus est, pura tamen apparente pupilla. Laesos etiam oculos habet, circa hoc ut aliquid mali appareat circa oculos qui nyctilopes appellantur. Totum uero oculorum manifesta lesio est, quae expressio uocatur. Est autem prominentia oculi uelut extra positi. Ceterum curationis tractationem a simplicioribus & superficialibus morbis in oculis incipiendam putamus.

Perturbationis oculorum curatio.

Cap. III.

Perturbationes oculorum a fumo factas, & ardore, aut puluere, aut alio consimili, facile curabis, si iusseris aegrum a laedente causa discedere, uelut sole aut fumo, aut alio simili. Deinde oculos lauare, primum aqua tepida dulci, postea etiam frigida. Iubendus est etiam splendor auersari, & oculos claudere. Ex his enim sedatur malum, nulla alia re adhibita, sed solum indigentiore uictu. Si uero ex ardore obortae sunt perturbationes, ampliore potu utendum est. Si enim somnus successerit profundior, etiam lippitudo formidata concoquetur, quare neque a balneis abstinendum est. Verum dieta exquisitior utendum. Perseuerante uero affectione quiescere oportet, & palpebras illinere collyriis ex croco, aut rosas, & maxime collyrio Nili ex rosas. Granas autem, & glutinationes noctu circa oculos fiens, expurgat, & probe luuat postea aquosissima, & ipsa aqua per se frigida affusa. Et aliquod ex siccis

siccis delacrymativis appellatis, præsertim quod croceum procatalepticum, hoc est, præoccupativum, siue perseverativum, appellatur.

Inflammationis oculorum superficialis curatio. Cap. IIII.

Quod si inflammatio superficialis fiat in tunica agnata, & dolor uehemens non adsit, repulsoria in ipsis adhibenda sunt collyria, ita ut uehementia mordacitatis ipsorum, per oculi ammixturem mitigemus. Plerumque enim tenuis oculi liquor cum collyrijs Monohemeris, hoc est, diarijs appellatis, sufficit ad curandas superficiales & incipientes lippitudines, citra magnam inflammationem, & uehementem dolorem. Sæpe enim ita inflammationes mitigauit, ut homo ad uesperam balneo usus sit, & postridie collyrio nardino ad restitutionem in integrum, & corroboracionem se illeuerit. Ammiscetur autem ad collyrium nardinum circa primam illitionem, minimū quiddam ex repulsorijs, circa secundam adhuc minus. In quibus igitur collyrijs dominantur adstringentia, plurimum liquorē oculi esse oportet, modicum uero collyrij. In quibus autem præualent concoctoria, uelut est nardinum, ea crassius adhibenda sunt. Fomentum adhibendum est his per spongiā, si moderatus est dolor, semel aut bis: Si uehemēior, melius est uel quinque uicibus eo uti, animaduersione tamen habita ad oculi qui curatur sensus subtilitatem aut hebetudinem: Quicumque enim oculi secundum naturam uenas amplas habet, & sanguine plenas, itaque qui glauci sunt, omnino non ferunt collyriorum adstrictionem. Quare aquosiora in his collyria adhibere oportet.

De inflammatione ob plenitudinem, & chemosis oculorum. Cap. V.

Si plenitudo in toto corpore subiecta est, & inflammatio in oculis magna sit, & dolor uehemens adest, non amplius sufficit collyriorum usus ad talē affectionem. Vario itaque opus habemus in his medicationis ductu. Et oportet prima ac maxima auxilia adhibere. Quorum etiam Hippocrates in aphorismis meminit, ubi ait: Dolores oculorum soluit meri potus, aut balneum, aut fomentum, aut medicamentum purgatorium, aut uenæ sectio. At non eidem homini omnia auxilia hæc adhiberi iubet. Sed alij uenæ sectionem, alij purgatorium pharmacum, alij fomentum, alij balneum, alij uini potum. Itaque à balneo initium faciamus.

De balneis. Cap. VI.

Balneum conuenit his quibus inflammatio tumida in oculis est. Est autem tumor mole quidē laxis, sed ad tactum frigidior, & colore albus, & qui influit fluxus, minus mordax est, & minus calidus. Immo neque chemosis in ipso oculo subrubra est, neque distenta. Hæc autem affectio magis in senili ætate contingit, & plerumque hyemis tempore, & magis foeminis pingulibus. Et ut cōpendio dicā, omnibus frigidum ac pituitosum cerebrum habentibus, inflammatio tumida contingit. Quum itaque omnia relata signa uideris, considerent balneum assumito: adeo enim ægrum leuat, ut alio auxilio non habeat opus. Oportet autem magis in aëre moram trahere, & oculos plurimum fouere siccitate fomento per spongas multum expressas. Quod ubi feceris, palam percipies tumorem in calido aëre disparuisse, & interim ægros penitus ab affectione liberatos. Si uero quid ad perfectam curationem defuerit, nardinum collyrium in balneo ituro instillato. At si moderatus apparuerit dolor, etiam crassius collyrium adhibebis, præcalfactum uidelicet in cote, ita ut loto, uelut dictum est, & à balneo egresso, humiditatem diligenter

per spongiā detergeas, & sic idē collyrium illinas, obseruas ne quid ex ipso in oculum præterlabatur. Solet enim magnū damnum excitare. Quare neque sudaribus illinendum est. Fit enim in balneo humorum diffusio, & præterlapsum collyrium mordacitate quadam induta, materias facile ad oculum trahit, & duplicat inflammationes. Si uero relata affectio durabilior fiat, & fluxionis essentia, ad frigiditatem magis ducatur, tum smegmata capitis in balneo adhibenda sunt, & pulueres insperfiles post balneum. Et primum quidē simplicibus uti oportebit. Si uero causa perseverarit, etiam ad cōposita transeundum est, quorum sylua talis est. Baccæ lauri, nitrū tostū uino extinctū, sampsuchus, fex uini usta, & similia. Puluisculi uero mulieribus præsertim cōsueti adhibendi sunt, qualis sunt ex iride, & apij semine, & cupressi pilulis, & ungentis siccis appellatis. Oportet autem non immodicē calida esse, neque acria quæ adhibetur, sed leniter calida, & habere adstrictionem ammixtā. Horum uero cōpositiones iam relatae sunt in præcedenti sermone. Smegmata igitur in balneo inijcere oportet simpliciter, pilis prius inter se disparatis, quo auxilium corpus contingat, præcipiendumque ut in balneo os claudat, quo calido aëre uehemēter per nares attracto, subiecta materia citius transmutent. Post balneum autem detergis capillis, puluisculi inspergantur, uelut dictum est. Et de balneis quidem hætenus. Consequenter etiam de uini potu.

De uini potu. Cap. VII.

Vinum attenuat, & incrassatos humores transmutat. Et sepe per accides aliquod horum euacuationem facit. Conuenit autem esse uinum colore fuluū, & substantia tenuē, & non uetus, neque uehemēter adstringens. Dandum est autem uinum his maximē qui ipsi aduerti sunt, & qui sicca ac frigida intemperiem magis prædominantem habet. Videtur enim societatem quandam ad balneum habere uinum ipsum. Quum igitur euacuatione ac transmutatione humorum opus fuerit, balneum assumendum est. Quum autem transmutatione, & renutritione, ac humectatione & calefactione, moderataque euacuatione, uino opus habemus: miscere igitur uinum oportet aqua calida non multa. Sit etiam meracius quam pro cōsuetā tēperatura. Sit & aqua quæ adijcitur purissima, & fumi ac odoris exors, & ualde feruida, quo etiam seipsa tenuior euadat, & sufficiat ad amplioris uini tēperaturā. Sit & poculum in quo exhibetur amplius, & conetur eger oculos inter potandum aperire. Sic enim exoluta obstructione, & multa naturali ac saluberrima lacryma influente, à dolore liberabitur. Statim enim laxantur palpebræ, & seipsis magis mobiles fiunt, ac leuiore. Illud uero considerare oportet, anne caput hominis facile lædatur. talium enim caput facile læditur ex uini potu. Cæterum ad reliquias affectionis oculi, collyrio uti oportet, primum leni ac dulci instillato, ad accessoriā perturbationem curandā. Et ubi oculi in quieto statu fuerint, & à feruore inflammationis liberati, tunc repulsorium collyrium adhibeatur: quale est quod Hermolaus appellatur, & cōsimilia sistentia appellata. Dum enim rubor adest, & inflammatio, adstringentibus collyrijs uti non oportet. Conclisis enim per adstrictionem materiae reliquijs, dolorem maiorem faciunt. Et de uini potu hætenus. Dicendum & de uenæ sectione.

De uenæ sectione. Cap. VIII.

Adhibenda est uenæ sectio, si nihil ex sæpe relatis impedierit, in dolore oculorum, in his quibus multa ocu-

lorum distēdo est, & multus rubor, & ad contactū resultus, & ardor, & lacryma multa ac calida, & chemosis iuxta corniformē & agnatā tunicā, ut à uehementi inflāmatione palpebræ euerātur, ut uix oculos operiant, & subrubra apparet tunica agnata, & maiori tumore prædita est, & totū corpus sanguine repletum. Secāda est autem potius superna in cubito uena, humeralis appellata, faciendāq; est maior sectio, ad hoc ut crassior sanguis euacuetur, ueloxq; animi deliquiū succedat, quo dolor eximatur, & inflāmationis feruor extinguatur. Euacuato autē toto corpore, collyrijs & reliqua curatione, reliquæ affectionis percurentur. Utendū est autem collyrijs, qualia sunt cygnaria, & Libiana, ita ut aquosiora calida instillemus. Fomēta in his nō ualde adhibenda sunt, sed per spongiā ex aqua tepida leniter deterfio fiat. Alimēta danda sunt lenia, facilia, cōcoctu & ad digerendū uentri cōmoda, urinam cictia, nihil acre & salsum habētia aut crassi humoris aut ægrē cōcoctile. Post inflāmationis depulsionē, nardinū aquosius instillandum est usq; ad perfectam sanitatem. Et uenæ quidem sectionis hætenus mentio facta sit. Transcundū est hinc ad purgationem.

De purgatione.

Cap. ix.

Si neq; ætas, neq; anni tēpus, neq; stomachi in primis debilitas, aut alterius cuiusdam uisceris, neq; aliud quoddā maximum impedimentū fuerit, purgatio assumenda est, in his quibus tenuis & multa lacryma defertur, aut salia, aut acris, aut frigida. Et uniuersum corpus uitiatis humoribus repletū, & caput superfluitatibus redundās, & aluus assidue suppressa, & copīa ex hoc malarū superfluitatū congregās. Et ad hæc uehemens doloris uexatio adest. Nam in uenæ sectione plenitudinē totius corporis suspectā habemus. In purgatione uero uictiosos humores auersamus. Purgatoriorū autē natura nō una est, sed plures. Iuxta redundantē enim & affligentem humorē, pharmacorū materia euariat. Si quidē igitur aluus assidue fuerit suppressa, aloē ipsi exhibenda est, cū brasicæ succo trita, & in catapotia redacta. Si uero pituita magis redundarit aquosa, exhibe pharmacū ex euphorbio, pipere, & sale ammoniaco præparatum. Si uero bilis abundarit, pierā ex aloē dato, scammonia leuissimē trita duobus scrupulis, aut minus additis, pro uiriū ratione. Si autē atræ bilis humor dominatur, addatur ad picræ dosim, epithymi scrupulus, & scammonia obolus. Cæterū post sufficientē per purgatoriū euacuationem, si quidē simplex & sine uulnere fuerit affectio, adstringētibus collyrijs utendū est: quale est Hermolaus, & similia. Et hæc per instillationē adhibenda sunt. Si uero uulneratus fuerit oculus, teneris utendū est. Qualia sunt cygnaria, & Libiana. Iam igitur Aphorismi Hippocratis scopus, quantum in præsens opus est, relatus est, hoc est, quomodo ad maximos dolores ac inflāmationes citò instare ac reniti oportet. Quando quidē uero in multis maxima auxilia relinquuntur, uenæ sectio maximē & purgatio, considerandum sanē est quomodo tales tractare oportet. Proinde cū uniuersalibus iam relatis signis, etiam peculiaribus quædam circa oculū signa uidere est, totū morbū redarguentia ac indicantia. Gramæ itaq; & lacrymæ apparēt, aliquādo glutinosæ ac crassæ, aliquādo tenues & citò destillantes. Et aliās salse, aliās acres, aliās mordaces.

Et quādoq; calide, quādoq; frigide. Grama itaq; statim in principio lippitudinis apparēs, magis cruditis signū est, & diuturnā lippitudinē fore significat. Oportet itaq; in talibus leniter curationē facere per dulcia collyria instillata, & reliquū consimilem ductū, quo temporis progressū concoctio uere fiat. Nā repulsoria collyria, quū sint serc uiribus frigidiora, obstructionē & corporū codensationem faciunt, & dū humorū materias concludūt, maximas inflāmationes ac graues dolores inducūt. Aliquādo etiā ruptionē tunicæ corniformis faciūt, propter humorū distētionē, & maximē ubi rubor adest, & inflāmatio, & materiæ multitudo in oculis subiecta est. talia uero collyria sunt quæ ex uberiore opio & acacia præparantur. Quale est quod Antoninus, & quod Hermolaus appellatur, & quæ Pelaria appellantur, & his similia. Quidā enim collyrio Antonino amplius usi, unā cū dolorū augmento, etiam uim uisui in iuria affecerūt. Nā per immodicā perfrigationē, portulacæ mortificationē magis induxerunt.

De fomento.

Cap. x.

Fomento utendum est multo, maximē si in principio crassissimæ gramæ apparuerint, quo ipsæ extenuentur. A balneis autem penitus abstinendum est. Aliquando etiā à uino. Cibi exhibendi sunt modici, uentri cōmodi, ac attenuantes. Quod si duriorē aluum habuerint, per betarū ac surfurū decoctū eluatur, cū melle ac sale. Os autē per pharmacum ex moris illiatur, ad materiæ euacuationē. Aut per collutionem aliquam pituita per os detrahatur: pleriq; enim maxillares musculos læsioni obnoxios habentes, manducationem ægrē ferūt. Postea uero, uelut dictū est, simplicia collyria infundantur. Et si quidem calida fuerit affectio, Libianis collyrijs utendum est. Quale est quod à nobis ad huiusmodi affectiones experientia cognitū est, & in Heretomis reperitur, & ab ipso Tephro appellatū est, pompholygemq; nō habet. Vnde etiam nos descriptionē ipsius delegimus. Nā pōpholyx rara inuenitur, & facile adulteratur. Optima est autē pompholyx colore non alba, sed magis ad liuedinē uergens. Signum optimæ est, si in prunas inspersa, auricolorem ignis speciem efficit. Utendum est igitur collyrio Tephro appellato, ad lippitudinem à calido humore obortā. Si uero non affuerit hoc, alio quodā ex Libianis appellatis utendum est, aut cygnario. At si inflāmatio affuerit, cū lacrymæ calidæ influxu, hecatontarchiū collyrium aquosius instillare conducit, si non ulceratus fuerit oculus. Et si quidē inflāmatio prædominatur, addenda sunt ad hecatontarchiū quædā nō adstringētia collyria. Si uero influxus magis præualeat, ipsum per se ipsum aquosius infundatur. Omnibus autem præstat, in quibus gramæ crassæ sunt ac uiscosæ, id quod ex uino paratur, & Isotheū inscribitur, cum albumine ouis infusum, atq; hoc aquosius, ut coloretur solum ouū ex collyrio. Citissimam enim opem affert citra aliud auxiliū. Post collyriorū usum, si puncturā aliquā aut mordacitatē, aut caliditatem perceperit, solum albumen ouis calefactum infundatur. Nam lacryma ex supernis partibus delata, apud palpebram colligitur, & arene imaginationē exhibet. Et quidā Medici fidē habentes his quæ ab ægro dicuntur, uelut sit aliquid sub palpebra arene, inuersam palpebram spongia detergent. Et uidentur sibi in præsens quidem

quidem ægrū ab omni suspitione liberare. Verum maximū detrimentum in posterū ipsi inducunt. Dū enim exasperat palpebrā, pungituum dolorē con- duplicat. Proinde his quæ ab ægris dicuntur, nō ualde attendere oportet. Doloribus enim perturbati, ignorat id quod ipsos ledit. Cōuenit igitur post collyrii usum, largo fomēto uti: hinc enim lacrymæ influxus dissoluetur. Deinde solū oui cādīdum præcalescētū infundere. Statim enim à punctura liberantur. Rarefact enim albumē oui meatus & per uisco sitatē facile euacuat, lacrymā & meatus obducit, ac humorū acrimoniā cōtemperat, & ipsorū tenuitatē ad iustam spissitudinē transmutat. Et in summa, siue punctura infestari, siue nō, infundendū est oui cādīdū per se ipsum, post collyriorū usum. Omnē enim morbosam putredinē deterget. Nā collyriorū essentia quomodocūq; tenuis fuerit, tunicis tamen oculorum ac palpebris insidēs, aspretudinē quandā inducit, quæ ubi oculū cōtigerit, minimē bona censenda est. Quidā porro dolorē obtundere uolentes, & caliditatē & acrimoniā edulcare, lac pro ouo infundūt. Decipiunt autē seipsos ex ignorantia, pro paruo solatio, diuturnā affectionē ægro propinantes. Idem enim faciunt quod hi qui uulneri pinguiā adhibēt, & carnē superexcrecentē augent. Sed & quū lac facile alteretur, à caliditate in oculo præter naturam acrius euadit. Et de calida quidem lippitudine hætenus. Consequenter etiam de frigida dicendum est.

De frigida oculorum intemperie. Cap. xi.

In frigida oculorū intemperie minus quā in calida dolores fiunt. Tardius autē curatur, & si successerit in his inflammatio, tumida fit & colore uelut plūbea. Plerumq; autem oculus his nō ualde perturbatus est, neque rubicundus. Lacryma uero ipsis destillat per paruū angulū, aliquando etiā per magnum modica ac frigidissima. Progressu uero temporis etiā palpebræ inflāmur, & puncturæ cōsequuntur. Conflatur hæc affectio humorib; pituitosis ac frigidis in capite redundātib; . Aliquando etiā ex mora in aëre frigido, & maximē post balneū. His igitur tepēstiuē præuacuat per clysterē balneū adhibeatur. Sed & uinū dandum est, uelut paulō antē in aphorismo Hippocratis dictū est. Infundendū est autē ipsis incipiente lippitudine collyriū nardinū Zolli ad aquosiorē compagem dilutū. Et quātum lacrymæ imminuuntur, tantū collyrii cōpages inspissetur. Sitq; tibi hic uniuersalis scopus curationis oculorum, ut pro decremento influentium humorum, crassefactas compagem collyriorum quæ adhibētur. Declinante uero lippitudine nardinum collyrium aqua dilutum per specilli nucleum palpebræ sublinatur.

De oculorū inflatione, ex Demosthene. Cap. xii.

Inflari oculum dicunt, quū absq; manifesta causa intumescēs, decoloratior & pituitosior ac fortiter pruriginosus sit cū fluxione. Cōtingit autē hoc plerumq; senioribus, pruritu ab angulo ad nasum incipiente, uelut si quis à musca aut culice sit commorsus. Frequēs est hæc affectio in æstate. Curatur spongiæ fomentu. Deinde palpebrā intrinsecus subline melle per se, & cū croco trito. Commodat & liquida Erasistrati panchrestos. Illinendæ sunt & palpebræ forinsecus cū melle. Cōducit & euacuare aluū. Deinde etiā lauare, & temperata calida aqua caput perfundere. Et post balneū dare uinū. At si pruritus uehemens est,

& ætas ac reliqua permiserint, & nihil aliud obstituerit, uena secanda est in cubito, aut alius purganda. Prodest & aqua marina affusa præsertim hyeme.

De tumore oculorum. Cap. xiii.

Tumere oculum dicunt, ubi palpebrā forinsecus eleuari contigit, decoloratiorēq; esse ac grauiorē, & ægrè mobilem. Itemq; dū pallidior apparet. Aliquando etiā album palpebræ aliquantulū excedit nigrum. Est autē tumor laxus forinsecus circa palpebrā obortus, qui digito cōpressus citò cedit, & citò rursus repletur. Est & ut plurimū citra dolorē, & concolor naturali habitui. Fit autē plerumq; à fluxione aquosa. Curandi porro sunt tumores qui circa solas palpebras forinsecus sunt, citra oculi cōsensum, præuacuata per clysterē aluo, solis illitionibus, præmissis fomentis per spongiā. Laxi uero tumores & concolores, præuacuata similiter aluo, & præmissis fomentis, melle illinātur intrinsecus palpebræ sublinato. Prodest & Erasistrati liquida illita. Utendū etiā ad ipsos apophlegmatismis ex melle cocto, uua passa, thymo & pulegio. Acriora uero uitanda sunt, uelut est staphis syluestris, & similia. In quibus autē oculus condolet palpebræ, præuacuata aluo, & inedia imperata, spongiæ fomentū adhibeatur. Aliquando etiā faciei perfusione utendum est, & præsertim ubi pruritus cōsequitur. Deinde absinthiū aut hyssopū tritū supernē illinatur cū melle. Si uero corpus debile fuerit, lentem coquito, & per colum culinarium, aut cribrū, aut rarum panniculum seu linteum, excolato, & ammixto melle expressum liquorem illinito. Quod si æstas fuerit, crocum cum uino mulso illine, aut cū coriandri, aut solani, aut intubi succo. Facit & glauciū. Oculus uero Erasistrati liquida sublinatur, aut aliquo alio medicamento quod plurimam humiditatem ex oculis ducere potest.

De tumore indurato. Cap. xiiii.

Fiūt etiam indurati tumores forinsecus circa oculum, plerumq; renitentes ad cōtactū ac duri, progredientes usq; ad malas & supercilia. Hoc autē maximē contingit ex carbunculosis affectionibus, & diuturnis lippitudinibus præcipuē in mulieribus. Oportet igitur ubi palpebræ simul intrinsecus fuerint crassefactæ, ipsas euertere, & collyrijs exasperationi destinatis confricare. Si uero forinsecus solū fuerit affectio, nequaquā oculus sublinatur. Sed frictio totius corporis & induratae partis adhibeatur. Post hæc impetandum est ut oculos claudant, quo interim diutius confricetur. Deinde subscriptū collyrium oculis illinatur. Thuris drach. vi. gummi drac. vi. aluminis scissi drach. i. malicorij drach. i. Trita ex aqua illine, & sicari permittre. Ad uesperam autem linteū molle & lana superligetur. Imò etiā interdū, si fuerint. Deambulatione utendū est multa & lenta. Vitanda sunt balnea, sol, & reliqua calfactoria, legumina item & bellaria. Ira etiam & detentio spiritus, & uomitus, & coitus tollatur.

Ulcerū in oculis cōmunis curatio, Seueri. Cap. xv.

Exulceratur oculus aliquādo extrinsecus aliqua re illabente. Aliquādo ex humorū influxu, aut erosione tunicae agnatæ, siue corniformis, aut palpebrarum, aut angulorū. Curanda autē sunt in cōmuni omnia in oculis quomodocunq; fientia ulcera, uniuerso corpori præ omnibus prouidentia adhibita, quo id quod redūdat in habitū tollatur, per uenæ sectionē,

aut purgationē, aut clysterem. Si uero rei circūstan-
tia omnibus his opus habuerit, omnibus utēdū est.
Dieta uero constituenda est cōtraria afflictioni, ita
ut tenuem humorē inspissemus, crassum autem atten-
nuemus, & uiscosum secemus, corruptorū & acriū
temperamentū inducētes, & undiq; naturale tempe-
ramentū ægro exquirētes. Alius autē facile solubi-
lis semper per cibos reddatur. Et frictio multa infer-
narū partiū fiat. Utēdum & deambulationibus plu-
ribus lentis, & aquæ potui. Et balneū rarissimē ad-
hibendū. Collyria uero tenera ulcerato oculo infun-
dantur. Quale est quod Aster appellatur, cōmodissi-
mum ad ulcera medicamentū. Sed & alba cygnaria
à colore appellata, & præsertim quæ ex fœnigræci
succo paratur. Si uero sordidū fuerit ulcus, cū fœni-
græci succo collyria diluere oportet, & sic infundere.
Viscositas enim ipsius facile remouet sordes. Possi-
det autē cum uiscositate etiā laxatoriā facultatem.
Quare sæpe in ulceribus ipso solo fœnigræci succo
usū perfecimus quod opus fuit. Si uero multa fuerit
sordes, ad fœnigræci succū parū mellis addere cōue-
nit. Oportet autē fœnigræcū exactissimē purgare,
& sæpe abluere, ac pura dulci aqua madefacere in fi-
ctili uase probē torrefacto; (uitare enim cōuenit æ-
neum uas ad eius cocturā) postera uero die diffusa
aqua, aliā purā adijcere, & ad lentum ignē fumū nō
edentē coquere. Reijciatur autē primū & secundum
decoctū, quo omnis amaritudo excludatur. Deinde
purissima aqua affusa, & olla probē operta, coqui-
to ad cōpagem mellis liquidioris. postea per linteū
excolato, fœnogræco nō expresso, sed succo sponte
defluente cōtentus, utere uelut dictū est. Cæterū deco-
ctū hoc usq; ad secundā, aut ad summū tertiam diem
seruare oportet. Inueteratū enim acrius euadit. Post-
quam autē pura facta sunt ulcera, à fœnigræci succo
abstinendū est. Et si profundiora fuerint ulcera, libia
no utendum, aut potius collyrio ex thure. Vbi uero
incarnata fuerint ulcera & explanata, aut etiā adhuc
paulō profundiora, adhibēda sunt collyria quæ cic-
atricē inducere possunt, quale est Cleonis. Et de cōmu-
ni quidē ulcerū curatione sufficiūt relata. Cōsequēs
est ut dicamus quomodo ad singulas affectiones in-
stare oportet. Et primum dicendum est de ulceribus
ab extrinsecus illabentibus obortis.

*De illabentibus in oculum animalculis aut paleis,
aut arena, Demosthenis.* Cap. xvi.

Si in oculū inciderit culex, aut aliud quoddā animal-
culū, altero oculo clauso, & affecto aperto, animal-
culum sua sponte prodibit. Si uero palea, aut arena,
aut tale quid inciderit, tunc etiā idem facere tenta. Si
uero permanserit, digito exime. Aut potius aquam,
aut lac, aut aquam mulsam instilla. Si autē amplius
oculo adhæserit per pharmacū quoddam nō inquili-
nās, & nō acre eripe, quale est qd ex melle paratur.

De calce uiua in oculū illapsa. Cap. xvii.

Si calx uiua in oculū inciderit, aqua quidē & lac infu-
sa attrahūt & exurūt. Verū albumē oui infusū, uī u-
storīā calcis obrūdīt, & eo adhuc magis oleū rosaceū.

De ulcerationibus ab igne. Cap. xviii.

Quæ ab igne sūt ulcera, duriores crustas faciūt. Qua-
propter frequentius humectentur lacte infuso cum
albumine oui. Collyrijs autem utendum est ex sti-
bio, & quod Cleoni inscribitur.

De his quæ oculo infixuntur. Cap. xix.

Si in oculū infixus fuerit aculeus, aut ossiculū, forci-

pe extrahatur, atq; hoc attentē in directū, ne franga-
tur. Si uero nihil eminuerit, sed æquale corpori fue-
rit, specilla duo accipito, & nucleis ipsorum utriq;
admotis, oculum cōprimito, ut quod infixū est, in
medio consistat. Vbi uero prominuerit, uolsella ex-
trahatur. Deinde turturis aut columbæ sanguis in-
fundatur, aut albumē oui. Si uero statim eximi non
poterit, oculis infusis & cataplasmatibus ad inflamma-
tiones congruis curetur. Nam post dies aliquot sup-
purata punctura, id quod infixum est emerget.

De sugillatione. Cap. xx.

Sugillatio dicitur quum ex plaga quadā, ruptis aut cō-
tusis uasis in oculorū tunicis sanguis sub tunica sub-
ierit, & statim quidē cruentus color oculi fuerit, po-
stea uero liuidus. Sic affectos curare oportet cōmu-
ni prædicta ulcerū curatione, per uenæ sectionē, aut
purgationē, & quæ cōsequuntur, infuso cādido oui
tepido, aut sanguine turturis uel columbæ. Superne
uero imponēda est lana uino & rosaceo ac ouo im-
buta, & deligatio leuis adhibēda. Postera die oculus
sæpe foueatur per spongiā cum absinthij aut hyssopi
decocto, forinsecus autē lana imponatur. Quum
uero oculus ab inflammatione liber factus fuerit, mel-
le, aut Erasistrati liquida illinatur, aut collyrio aro-
matico. Bene facit & solani succus cū melle infusus.
Et thus suffitū cum pari bitumine. Cæterum ad inue-
teratas sugillationes probē facit hoc. In æris rubri
uas pueri incorrupti urinā mittito, & æreo pistillo
in sole ad multos dies terito, ut multū succum remit-
tat, & siccātū melle excipito, ac utitor. Apollonius
autē Memphites ad sugillationes ac uibices, tale col-
lyrium prodit. Lapidis hæmatitæ, sanguinis asinini
de corde siccātū in sole, æquales portiones cū urina
pueri incorrupti tere, & cardamines iberidis appel-
latæ succum adijce ac simul tere, & infunde. Aut col-
lyria ex his efforma, & usus tempore cū muria in-
stilla. Aliud. Lapidis hæmatitæ drach. iiii. sangui-
nis columbæ siccī drach. iiii. sanguinis asinini drac.
iiii. gummi drac. ii. terito ac utitor, uelut dictū est.

De puncturis oculorum. Cap. xxi.

Omnes pūcturæ in oculo, quales à stylo aut aliqua cō-
simili re fiunt, post cōmunem prædictam curationē,
sanguine turturis aut columbæ statim ab initio irri-
gato, aut oui candido. Et ab initio quidē uitāda sunt
fomenta & cataplasmata calida. Post quartam uero
aut tertiam diem, toto copore præeuacuato, spon-
gis foueto, & cataplasmata ad inflammationes desti-
nata imposito. Collyria uero adhibeantur leuissi-
ma, etiā si impura appareāt ulcera. Utēdū igitur est
spodiaco, & tephro, & astere, ac similibus. Facit &
collyrium Nili ex rosis aquosum cū ouo instillatū.

De uulneribus profundioribus. Cap. xxii.

Quum profundius & maius factū fuerit in oculo uul-
nus, ut periculum sit ne effluant ex oculo humores,
animaduertendum est ne inflammatio succedat, & fe-
bris subsequatur. Præ omnibus igitur uenæ sectio-
ne utēdum est, si uires sustineant, nullum est enim ef-
ficacius auxilium ab initio. Si uero uenæ sectio re-
linquatur, purgatorio idoneo utamur. Sin minus,
clysteribus aluum subducentibus euacuatio fiat. In
oculum uero calidum oui instilletur. Et cataplasma
adhibeatur ex ouo simul contuso uitello, cum rosa-
ceo & uino, ita ut leniter tepefactum & lana exce-
ptum imponatur. Sequētib; diebus fomentum fiat
ex decocto rosarum aut meliloti, & infundatur lac
mulieb're

muliebre cum ovo tepidū. Cataplasmata adhibeantur ad inflammationes descripta, & maxime id quod ex capitibus papaueris, meliloto, croco, & pane paratur. Illinenda est etiā frons ac tempora modico apio cum croco. Sint autem leuia cataplasmata, & superna palpebra sola ex his integatur, quo aperiri possit oculus, & lacrymas influentes excernere. Oculus quoque leuiter deligetur. Si uero aliqui cataplasmata ferre nō possint, his palpebrae, ac tempora, & frons collyrio Nili ex rosis illinatur. Si uero uehemēiores fiunt dolores, caput pilis denudetur, & cucurbita occipiti ac uertici affigatur. Et in noctē quaedam dolorem eximentia in potu exhibeantur. Circa quartam uero aut septimam diem Nili collyriū ex rosis instilletur aquosissimum usque ad perfectā curationem. Cibus dandus est sorbilis, boni succi, uentri cōmodus: oportet enim uentrem semper probē solubilem esse. A uino uero abstinendum est usque ad declinationem. Cauenda sunt autem & quae caput repleant, & fluxionem iritant.

De ouiformis humoris excretionē. Cap. xxiii.

Si puncto oculo ouiformis humor excernatur, ut etiā oculus aliquatū contrahatur, reliqua quidē similiter, uelut dictū est fiāt, ut ne inflammatio succedat. Verum post inflammationis ac ulcerationis declinationem, balneum conducet, & uinum tenue moderatum. Et cibus boni succi, quo humor probē reanutriatur ac rursus expleatur.

De oculi prolapsu. Cap. xxiiii.

Prolapsus totius oculi, ex uiolētia quadā capitis plaga contingit, aut ex ulceribus carbunculosis, aut internis uasis ac pelliculis, quibus adhæret oculus, ruptis aut laxatis. Procidit enim quibusdā totus oculus foras, ut a palpebris cōtegi nō possit. Aliquando etiā usque ad malas & supercilia procidit. Atque hoc maxime cōtingit ex casu ab alto loco, aut ex plagis capitis uolentis. Periculosa est autē affectio. Itaque curatio statim adhibenda est, per uenae sectionē, aut purgationē. Sed & reliqua adhibeantur quae relata sunt in cōmuni ulcerum curatione. Contrahendus est cibus, & postea in ouo & rosaceo ac uino simul cōtusus lanam imbue & impone. Deinde uero cataplasma ex meliloto & papaueris capitibus adhibe, cui addita sunt hyoscyami folia cū pane aut psyllio modicē madefacto. Assidue uero alterentur cataplasmata, ut ne calefactae partes suppurentur. Sequentijs diebus remittēte inflammatione, cucurbita occipiti cum scarificatione affigatur. Praesente uero inflammatione, cucurbitae sunt ineptae. Assidue autē ouum & lac tepida instillentur. Remittēte uero inflammatione, collyrio Nili ex rosis cum ouo utendum est. Aut etiam mellis summi exortis parum ipsi ammiscendum, ad sanie excernendam. Simul autē sub palpebrā subiiciendus est specilli nucleus, ut ne concretio aliqua fiat, quod si prolapsus magnus factus fuerit, & nulla spes est ut uisus restituatur, cataplasmatibus suppurationis utendū est, qualia sunt quae ex polline fiūt, Sed & lentem cum melle imponere oportet. Et inflammatione declinante balneum petendum est.

De ulcerationibus superficialibus ex humorum influxu obortis, nubecula, caligine, epicaumate, & encaumate. Cap. xxv.

Quae ex humorū influxu fiunt superficiales ulcerationes, diuersimodē nominantur: caligo enim est ulcus superficiale in nigro oculi factū, consimile caligino-

so aëri, colore caeruleo, quod multū locum nigri occupat. Quū uero in pupilla factū fuerit, nō facile aëri uidet. Nubecula autē uocatur profundius ac minus caligine ulcus in nigro, & est colore albius. Epicauma uero dicitur, quū nigrum oculi in superficie exasperatū, inuistū fuerit, & colorem cinereū prae se tulerit. Encauma uero est ulcus ut plurimū ex febre fiens, cum crusta impura, in nigro aut albo. Et in nigro dū sit in profundo, plerumque in purgatione, maiore tunicarū corrosione cōtingēte, humores paulatim foras effunduntur, & totus oculus effluit. Has igitur superficialissimas ulcerationes, cū febre aut sine febre fiētes sanare oportet, aluo per clysterē praecua cuata, ita ut collyriū Nili ex rosis aquosius instillemus, & in ipsis interuallis infusionis collyrii, lac infundamus. Praeteritis deinde aliquot diebus, ammiscendū est ad Nili collyriū, chiacū appellatū Apolloni, aut aromaticum. Deinde uero etiā meracis his utendum. Cito enim cicatrices, easque tenues & ferē non apparentes inducunt.

De argemo.

Cap. xxvi. Argemum est ulcusculū circa iridis circulum factum, partem albi, & partē nigri occupans, & album apparatus. Quum igitur profundius & sordidū factum fuerit circa iridis circulū, & citius repurgatum, aliquādo procidit tunica uulformis. Quapropter meatus obducētibz pharmacis in ipsis a principio utendum est, quo ulcera ab inflammatione liberentur, & tunica oculi subnutrita crustam reiciat.

De fossulis, & concauis ulcerū generibus. Cap. xxvii. Fossulae appellantur quū in nigro fiunt caua, angusta, & pura ulcera, puncturis similia. Concaua uero uocantur, rotūda & ampliora fossulis ulcera, & minus profunda. Nō igitur ipsa purgare oportet per acria collyria, sed potius per mitia renutrire, & maxime ea quae fossulae appellantur. Concaua uero diuturna primū leniter detergētibz curabimus, & deinde ad renutrientia transibimus, qualia sunt quae ex thure fiunt. Vbi uero explanata fuerint, aut etiā adhuc cauiora sunt, Cleonis collyrio utendū est. Si uero sordes multae ulceribus insite fuerint, aqua mulsā infundatur. Nos autē ad foenigræci decoctū paratū uelut antea dictū est, modicū mellis ammiscuimus, & citius reque sitā assequuti sumus. Utimur etiā in cauis ac sordidis ulceribz collyrio Theodotij Seueri aquo fiore cū ouo, & citra omnē dolorē repurgat, & celerissime ad cicatricē perducit. Meminisse uero etiā in his oportet praedictae cōmunis ulcerum curationis.

De suppuratione aut ungue.

Cap. xxviii. Suppurationes in ulceribus fiētes diuersas appellationes habent. Unguis enim dicitur quum a profundiore ulcere pus defluens, & inter tunicas illapsus, & in circulo iridis figuratum, similem ungui relictō imaginem prae se fert. Ampliore uero pure collecto, & dimidium nigri occupante, aut per totam corneam tunicā pellucēte, suppuratum esse oculum dicimus. Fiūt autē haec etiam circa exulcerationem, dolore capitis, aut lipplitudine praegressa. Contingunt etiam inflammatione praegressa, propter ampliore humorum repletionem diruptis quibusdam uasis, & sanguine ex ipsis profuso suppurato. Consequitur autem ad suppurationem dolor uehemens pulsatorius, & rubor circa oculum totum, & temporum dolor. Curatio faciēda est ab initio relectis somētis, per alui per clysterē euacuationem

tionem. Deinde per uenæ supernæ in cubito sectionem. Ita ut postea etiā uenam circa magnū oculi angulum secemus, citra colli ligationē aliās fieri solitam. Sed & cucurbitā occipiti affigemus, aut hirsutines temporibus. Deinde collyrijs ad inflammationes destinatis utendū est, & maxime Nili ex rosis, cum ouo aut lacte aquosius instillato. Post tertiā uero diem somētum per spongiā adhibendum est, moderate primum, deinde paulatim semper facta maiore accessione. Et collyria quidē meatus obstruenda uitanda sunt. Utendū autē discolorijs ac lenientibus, maxime chiaci Apollonij, & similibus ex myrrha paratis, quæ dialmyrna appellantur: Quæ enim uehementer discutiunt ac resiccāt, statim quidē multā tenuioris euacuationē faciunt. Quod uero reliquum est & crassius cōdensat, & ut ægrè dissolui possit resiccāt. Galeni. Medicus quidā apud nos expertissimus ophthalmicus etiam capitis cōcussione multos sanauit. Et locabat quidem ipsos in sella erectos, & utrūq; à lateribus caput apprehēdebat, atq; ita cōcutiebat, ut nos manifestē uideremus pus deorsum ferri, & infra manere, propter grauitatē uidelicet. Quū igitur in superficie fuerit pus, & ulceri cōtiguū, dum purgatur ulcus omnino etiā in uaporē exhalat pus: quum uero ulcus superficialiū fuerit, & superius. Pus autē amplius, & in profundo inferius ulcere, & à pharmacis non excolatur, oculū sub pure perungere oportet, acu oblique circa iridē & coronā appellatā immisso, & pus excernere. Atque hanc chirurgiā locis non inflāmatīs adhibere oportet. suppurationes autē in albo tunicæ agnatæ fiētes, scalpro uenæ sectorio ex inferna parte diuidito, & tunicā agnatā leniter subexcoriato. Cæterū post humoris euacuationē, in utrisq; oculi cadidum instillato. Deinde integrū ouum cū uino mulso cōquassato, & molli lana exceptā oculo superposito ac deligato. Postera uero die fomento ex aqua calida per spongiā adhibito, & ouo infuso, rursus prædictū lanæ hapsum imponito, & post triduū collyrio Dionis illinito, aut quopiā ex his quæ ad perpunctiones adhibētur. Est autē Dionis collyriū hoc. Spodij drac. i. thuris, squamę aeris, myrrhę, acacię, spicę nardi, opij, singulorū drac. i. gūmi drac. vi. excipe aqua pluuiali. Vlu uero expetere infunde cū candido oui, & prædictū lanæ hapsum superpone. Si uero postquā inflāmatio cessauit, caro ex diuisione prominuerit, prædictum collyrium cū lacte dilutum illine. Probe etiam deprimat & repurgat chiaci Apollonij.

De pustulis.

Cap. xxix.

Pustulæ fiunt & in albo, & in palpebris. Plerumq; uero circa corniformem tunicam. Et aliæ in superficie fiunt, aliæ in profundo: cōstat enim tunica corniformis ex quatuor uelut mēbranosis corpusculis, densissimis ac fortissimis. Aliquando igitur sub prima membrana pustulā fieri contingit, quando etiam colorem nigriore præ se fert. Aliquādo sub secūda aut tertia cōsistit, quando sanè etiā albidior pustulæ color fit, eò quod in profundo tunicę corniformis occultatur: naturalis enim pustulę color niger est. Tunica uero corniformis alba est, & cornibus simillima. In quantū igitur in profundo corniformis tunicę pustula occultatur, in tantū colorē assimilat, & maiorem dolorē inducit, & molestior est. Nā siue ob plenitudinē rupta fuerit pustula, siue ab acrimonia corrosa, ut tunica ulceretur, facilis curatu est superfi-

ciaria ulceratio. Difficilis autē profunda. Periculum est enim ne reliquū corniformis in profundo tenue existēs rumpatur, & uiformis procidat, ac effluat oculi humores. Præsertim si iuxta pupillam ruptio fiat. Facta enim iuxta pupillā ruptione, etiam si pro more ægri, tamē aliud quid graue cōsequitur. Nam inducā ulceribus cicatrice, homo non uidebit, propter inductas cicatrices. Quandoquidē uero aliquādo etiā ob corniformis corrosionē uiformis tunica procidit, & superficialis pustulæ imaginationē facit, operæpretiū est de his exactius distinguere. Pustula itaque superficialis, similiter undiq; nigra est, nō tamē nigredine exactē saturata. At in uiformi tunica pars quæ procidit, aut nigra est, aut cærulea. Quod uero maximū signum est, fundum prolapsæ uiformis per circulū reperies albū. Alba est enim colore corniformis tunica, qua rupta uiformis procidit. Sed & pupillæ magnitudo imminuitur in uiformis prolapsu, aut sanè omnino euariat secūdū figuram: nō enim pupilla exactē conseruat rotundam figurā in prolapsu, sed iuxta partē quandā uelut diuisa apparet. Proinde relatis signis diligenter intēdere oportet, & affectiones inter se distinguere. Nā iuxta affectionū differētiās etiam curationē uariare oportet. In prolapsu enim uiformis, magis adstringētibus ac repulsorijjs utimur. In pustulis uero his quæ leniter discutiūt. Curandæ igitur sunt pustulæ ita ut caueamus primū muliloquū, sternutationes, iras, spiritus, detēdiones, clarū splendore, deinde cōtrahendus est etiā potus ac cibus, & ad alui euacuationē acri clystere utendū est. Tērandū quoq; ut lacte aluus soluator, in quibus id neq; accessit, neq; in nidore uertitur, neq; uomitu reijcitur. In talibus enim uitandū est lac, & utendū gallinę iure, aut cni-ci succo, aut aloë, aut per simplicius quoddam aluus soluenda. Vitanda sunt etiā uehemēdora purgatiua, & maxime quæ stomacho sunt magis infesta. Deligationes autē & multos lanæ hapsos in his reprobanus. Valde enim nocent nō solū in his, sed etiam in omni lippitudine, ex humorū acrimonia facta. Cataplasmata igitur adhibere oportet, ubi inflāmatio affuerit, maxime in principio, leuia quidē, sed lata. Sunt enim cataplasmata tenuibus ac mollibus lin-teolis illinēda, & super totū oculū imponēda, supercilio ac mala & tēpore simul cōprehensio, & finēda, quā diu fuerint madida. Postquā uero siccata fuerint, tollenda & alia imponēda. Adhibeantur ea quæ ad inflāmatōes cōgruūt, uelut est tenue ouorū, & uitelli ouorū tritū cū croco ac modico opio, moderateq; passo ac pane. Conueniūt etiā adstringēda, uelut sunt mala cydonia cocta, aut malicorium in aqua coctū. Verum uitandū est, uelut dixi, ne oculus in his diutius deligetur: est enim nocētissimum hoc. Mitigata uero inflāmatōe, etiā ab emplastris abstinentendū est, propter grauitatē. Collyria uero in principio cōueniūt, Nili ex rosis, cū lacte dilutū & infusū. Proficiēte autē curatione, adhibendū est id quod ex thure, myrrha, ac croco paratur. Postea etiā nardina. Forinsecus autem illinendæ sunt palpebræ collyrio Nili ex rosis, frons uero acacia & hypocisthide, cū croco & modico opio. Fomēta ab initio tepida adhibeantur. Nam intenta à principio inflāmatōes exacerbant. Postea uero caliditatē intendere oportet. Deambulationes & alij motus ab initio nō conueniūt. Balnea uero & reliqua uaporatoria fo-

menta

menta post principium. A uino abstinere oportet per omnē curationē, & aqua calida in potu uti, & cibos molles ac faciliē concoctiles accipere. Fugienda est in his sanguinis ex fronte aut uenis angularibus detractio: procidit enim oculus, & maximē si inflāmatio simul affuerit, aut profundior exulceratio.

De carbunculis in palpebris seueri. Cap. xxx.

Quandoquidem carbūculi sunt ex genere pustularū, & sunt hi quoque aliquando in palpebris, oculumque ad maximū consensum perducūt, age & ad hos pauca auxilia proferamus, dinotiones ipsorū primum exponentes, quū sint etiam aliq̄ quidam abscessus palpebrarū, qui imperitis carbūculi uideri possint. Nā & ordeolum tuberculū, & panī, & uari circa palpebras fiunt, sed cum tumore quodā hæc, & ferē citra inflāmatōnē, & non cū uehementi dolore. Carbunculi uero ruborē ab initio habent, ut oculū sibi perurī putent: tumorem uero aut eminentiam nō statim inducunt. Nam ob immodicā caliditatem, uelut ruptionē quandā carbunculus sustinet, & quod effluit ex ipso quū sit acre ac mordax, superficiē quidē carbunculi resiccat, & crustā inducit, uicinis uero lotis morbum inserit. Cōsequitur igitur ad ipsos fortis inflāmatio, tū ipsius oculi, tum partium circūsitaram, & maxime glandularum circa aures, ut quandoque magnarum ulcerationum, & ruptionū oculi causa fiunt, insuperque prolapsuū, & nuditatis palpebrarū. Et cicatrices a carbunculis crassæ fiunt, & assidue ulcerantur. Et in reliquo quidem corpore sanguis qui effluit ex carbūculis niger reperitur, propter superaffationē. In oculis autē sanguis nō omnino ex carbunculis manat, eō quod neque redūdet in oculo sanguis. Vnde plerumque etiā albi colore sunt carbūculi in palpebris. Et si quidē emotio affectionis cito contigerit per cōuenientem curationē, carbunculus penitus dispareret. si uero durauerit, & ægrē discuti poterit, necessariō locus nigrescit. Proinde incipientibus carbunculis nō statim ad cataplasmata & illitiones progredi oportet, sed per clysterem primū aluū euacuare. Deinde lactē moderatē cocto purgare. In sanguineis corporibus etiā uena secanda est. Postea per spongas fomentū adhibendū, primū ex simplicioribus. Adstringentibus enim & frigefacientibus, & aliquando etiā resiccantibus pharmacis usi, hos sanabimus. In principio igitur, quū feruor adest, tumorem extinguere conantes, coriandro trito ruborem oculi illinimus. Et solanū cum passo tritū & carbunculo adhibitū, statim ipsum abolet. Atque hic ductus in principiis magnopere prodest. At frigefaciētia cataplasmata oculo in carbunculis adhibita, repellunt quidē id quod influit carbunculo, & externas inflāmatōnes sedant, uerū periculū est ne in ipsum oculū impetū faciat: hoc enim solanū aliquando perpetrāuit. Adhibitū enim cū passo statim quidē tumorem aboleuit, oculus autē hinc repletus est. Cæterū carbunculos sã depascentes uarie curare oportet. Nam quod defluit acre ac mordax existit, ut etiā uicinos locos depascatur, & periculū sit ne oculus ledatur: solet enim erosio his cōtingere. Conuenit igitur spōgia detergere, & oculū moderatē perfundere, rosarū, aut rubi, aut pampinorū uitis decocto. Sit autem tepidius decoctū, aut potius lactei teporis. Quod si etiā sordidi fiāt loci, ex eo quod nome depasces preualuit (sæpe enim etiam palpebræ excidunt) ad hu-

ijsmodi fluxiones etiam hypocisthidis succū aquæ ammiscemus, & myrtū & acaciā passo diluta locis illinimus. Oportet enim pro corporis curandī ratione, etiam materias eligere maximē medias. Valde enim efficacia pharmaca loci nō sustinent, qualis est ærugo, & similia. Per mordacitatē enim etiā salutis spem habeat oculus, hac quoque priuatur: neruosæ enim partes & præsertim carnibus denudatæ, à uehementer mordacibus læduntur, ut etiā cariem inducant. Malicoriū itaque ex malis punidis acidis cū lenticula feruefacimus, & de rassa interna parte, cum modico melle terimus, & ex eius usu magnopere proficimus: celerem enim purgationē facit, & humores qui oculis inferuntur, quodammodo supprimit. Nā pingula nomas augent. Aucta uero noma, in uino malicoriū coquere oportet, & per se citra lenticulā imponere. Crustas autē magis malicoriū coctum tritum cū melle impositum resoluit. Sunt & cōposita pharmaca carbunculis conuenientissima. In principiis enim feruorū, pastillus ex halicacabis illitus excellenter extinguit. Frigefacit enim & resiccat moderatē: Si uero cōtrahere oportet carnem superexcrecentē, Musæ pastillum aridū tritum adhibemus. Si uero incarnatione opus est, ipsum Musæ pastillum cū sapa dissolutum illinimus. At si cicatricem inducere intendimus, rursus pastillū ex halicacabis assumimus. Apollonius autē ait: Ad carbunculos oculorū hoc pharmaco utimur. Spodij drach. iiii. lapidis scissilis drach. ii. croci obol. iiii. myrrhæ paululum torrefactæ obol. iiii. Terito cū uino odorato donec arescant, & passi cretid, aut alterius non acris heminā ammisce, cōtere, excipe ac subline. Disparat crustas, & purgat ulcera, siue extra palpebras affectio fuerit, siue intrinsecus in profundo. Facit & ad fluxionē ac inflāmatōnes. Si uero dolor oculum uexarit, hoc collyriū illine, & euestigiō sistet nomē. Recremēti plūbi triti loti & exiccati drac. iiii. spicē nardi drach. i. gummi drac. ii. foliorū oleæ centum uiginti succū. Succum aquæ hemina ad folia adiecta exprimito, excolatoque, & ad reliqua cōterenda uictor. Facit & collyriū Nili ex rosis cū ouo infusum. Maximē uero Nardinū candido inscriptū, per submissionē palpebræ sublitū, usque ad perfectam curationē: oportet enim ubi pura facta sunt ulcera, fomento præmisso, specilli nucleū lacte tingere, & palpebris submittere, atque angulos inter se disparare, ne distorta cōcretio fiat. Et ob hoc neque oculū deligare oportet, maximē post ulcerū purgationē. Nam circa principia si inflāmatōnes maximæ & distentiones fuerint, lenticulæ coctæ cataplasma cū pane imponere cogimur. Sed & psylliū impositū inflāmatōnes mitigat. In doloribus enim aliarū oculi inflāmatōnū adhibitū, somnū inducit. Sint autē leuissima cataplasmata. Sed neque diu in cataplasmatū usu perseuerare oportet. Augēt enim putrefactionē, & oculum magnopere ledūt, uelut etiā in pustulis prædictum est. Postquā igitur aliquatū mitigauim⁹ inflāmatōnes, statim a cataplasmatīs, tū in carbūculis tū in pustulis abstinēbim⁹. At uero in locis circa aures per cōsensū inflāmatīs, splenium ex cerato butyrino imposito.

De canceratis oculorum ulceribus. Cap. xxxi.

Vlculcula in nigro oculi fiētia, cicatricem nō recipiētia, parua, dolorosa, parua uasa habentia uaricosa, cancerata dicuntur. Et aliquando quum cicatricem accepisse

accepisse putantur, resoluuntur citra manifestā causam. Fiunt autē in his punctoriū discursus usq; ad tempora. Et cōsequitur in ipsis fluxio humoris moderate acris ac tenuis. Et albū in oculo itemq; nigrū, semper rubicundū est. Et auersantur cibū. Augentur autem ipsis uehemēter dolores, illitis acrioribus medicamentis. Cōtingit hæc affectio maximē seniores, ex diuturnis lippitudinibus. Et foeminis quibus menses defecerunt. Curatio porro adhibenda est, habita totius corporis cura, cū prædictione quod fieri non possit ut perfecte sanentur, sed fieri posse ut mitigentur, primū per conuenientem diætā; deinde etiam per pharmaca dolores lenire potentia. Diætā igitur huiusmodi sit. Postquā à lecto surrexerunt, corpus moderate illinant oleo dulci. Caput autē modico rosaceo aut omphacino. Et uiridi sindone oculo prætentā, deambulare iubeto in tenebroso ac nō uentoso loco, cū silentio & absq; alia distentione, ita ut neq; caput agitent, quantū eius fieri potest. Postquā autē ampliore & lenta deambulatione usi fuerint, ad domiciliū tenebrosum, & nō ualde lucidū se recipiāt, & rursus ab alio corpus ipsorum illinatur, excepto capite, cōfrictis maximē lūbis ac infernis paribus. Postea uero lactis moderate cocti, remota cōcretionē superstante, heminae mensurā accipiant. Nā acrimonias quæ affluunt hebetat, & aluum facile solubile facit. Si uero ineptus sit ad lactis potū, pollinē polentę passo moderate calido diluto inspergito, & sorbendū dato: Postea si fame uexetur, duobus ouis sorbilibus utatur, & somnum diurnū uitent. Circa decimā autem horā cōfricti assumāt panem purū, cum obsonio quodā uiscosum quippiā habente, uelut sunt oua sorbilia, cerebellum porcīnū duabus aquis coctum. Ex piscibus muræna, torpedo, glauciscus. Ex oleribus malua, atriplex, lactuca. Assumenda etiā alica ac oryza, & laganū in gallinæ iusculo coctū, & pedes suilli ac tali probe cocti. Omnia uero sint moderata. Vinū bibant & tenue subadstringens, & ipsum moderatum. Ab omnibus autē salsa mētis & leguminibus penitus abstineāt. Item à balneo, nisi necessariū hoc fuerit, aut lassitudinis gratia, aut tardæ concoctionis. Atq; tunc tardandū in ipso est, sed citō exeundū. Doloꝛe uero & fluxione oborta illinatur pharmaca lenia ad pura ulcera cōuenientia, uelut est spodiācū, & collyriū Cleonis, & similia. In oculū autē assidue infundendū est ouū, aut lac muliebre tepidum. Mitigat etiā lentis decoctū infusum, aut plāraginis, aut portulaca. Verū ad temporū dolores utendū est collyrio Nili ex rosis. Si uero ad uehemētes inflammationes cataplasmatibus uti cogamur, cataplasmate ex papaueris capitibus utendū est leuissimō. Antea enim dictū est quod fugere oportet cataplasmata in oculis calidā affectionem habentibus. Ammiscēdum est autē cataplasmati ex papaueris capitibus, in his & crocus, & lac muliebre.

De malignis oculorū ulceribus. Cap. xxxii.

Fiunt & alia maligna ulcera, partim à magno angulo initū sumentia, partim à nigro, partim ab albo, & oculū citō corrodūt, & præsertim in corporibus uiciosiis humoribus repletis, & quæ acrum rerum esu uita sunt. Sanies etiā ab ulcere manat multa ac graueolens, & sequuntur dolores uehemētes ac febres. Sæpe etiam alui fluxus. Depascuntur etiam aliquādo ulcera uicinos oculis locos. Curandæ uero sunt

etiam huiusmodi nomæ, per prædictæ diætæ usum. Veruntamen eiusmodi exhibenda sunt quæ aluum non soluūt. Vnde in his magis uolucriū genere utendū est, maximē montanarū. In oculū uero infundendū est lac, aut ouū, & prædicta collyria. Si uero nome transgressa fuerit oculos, curatio ita fiat. Pompholygem optimē lotam, ex muliebri lacte illinere oportet, & superimponere, sanie prius per aquam elota, deinde per lac. Facit similiter & cerusa lota ac siccata, & cum lacte adhibita. Et plūbi lotura sicca, quæ cōfrictō plumbeo mortario cum plumbeo pistillo colligitur. Facit & plumbi recrementum lotum, & amyllum. Singula cū lacte muliebri. Cataplasmata uero si coacti fuerimus adhibere, mala cydonia cocta adhibeantur, aut rosæ uirides, aut siccæ uino maceratae, polygonum item ac solanū, & semperuium, & feris cum polentæ polline. Si uero uasa in fronte ac temporibus fuerint eleuata, etiam sectionis uasorum rationem habere oportet.

De myocephalis.

Cap. xxxiii.

Quum ulcera quæ propter erosionem aut ruptionem corniformis tunicae fiunt, profunda euadunt, pars aciniformis tunicae procidit, & quod prolapsum est nigrum aut caeruleum apparet. In circuitu uero circa fundum eius partis quæ procidit, labia corniformis tunicae alba apparet. Et si adhuc magis pars prolapsa durauerit, labia ruptionis tunicae corniformis callosiora facta adhuc magis alba apparent. Diuulsa est autem omnino in uulsi formis siue aciniformis tunicae prolapsu pupilla ipsa, ut omnino nō appareat, aut & situ & figura immutata. Et per hæc discriminatur myocephalon à pustula. Dicitur autem myocephalon, quoniā figura simile est capiti muscæ. Repulsorij autē & adstringētib; opus habet pharmacis, qualia sunt maxime quæ ex uino fiunt. Est autem & hoc celebre ad ipsum: Cadmiæ, æris, chalcitidis crudæ, singulorū unc. i. æruginis drachm. iiii. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. & dimidiā, croci drach. iii. salis ammoniaci drach. iiii. gummi drach. iiii. Excipe uino ueteri adstringente. Aliud, ad pterygia, carnis incrementum iuxta magnum oculi angulum, aspritudines, Exteris etiam cicatrices. In alio exemplari reperi, etiam staphylomata facere. Misys crudī drach. xii. cū aquæ cochleario terito, deinde croci leuissimē triti drach. xx. adijcito, ac rursus terito, & additis myrrhæ drach. iiii. excipito ac utitor. Post illitionē uero ex ipso factam, spongiā teneram imposito ac deligato. Aliud bonum. Facit & ad data staphylomata. Misys crudī sextantem, croci unc. i. gummi unc. i. terē cum uino & utere. Mirificē etiam facit in ipsis theodotij Seueri, & si quidem inflammatio non affuerit, crassius illine: si uero affuerit, cum ouo infunde. Adhibeatur ipsis quoque conueniens deligatio. Et inflammationis cataplasma ex papaueris capitibus impones. Aut psyllium aqua calida madefactum. Collyrium Hori faciens ad myocephala cū Theodotio. Facit & ad diuturnas tenues fluxiones. Cadmiæ, squamæ æris, croci singulorum drachm. viii. opij drachm. xii. misys usti, myrrhæ, acaciæ, gummi, singulorum drachm. iiii. Excipe aqua.

De staphylomate.

Cap. xxxiiii.

Differentiæ staphylomatum plures sunt: Nam & causæ affectionis uariæ sunt, plerūq; tamē quomodo cūq;

cumq; factū fuerit staphyloma, uisum destruit. Appellatur autē staphyloma, quum corniformis tunica fuerit eleuata, & eminentiā acino uuae similem fecerit. Fit autem aliquando humoribus sub aliquā corniformis tunice striam collectis, a quibus humoribus coactā corniformem tunicā sustinere condignitas eleuari & incuruari, facereq; staphyloma clatraptione. Fit hoc etiam ex pustula quadam inter strias corniformis tunice satis profunde consistente, quae tunicam eleuauit, non tamen rupit. Appellatur etiā staphyloma quam ob corniformis tunicae rupturam, magnus uniformis tunice prolapsus factus fuerit. Differt hoc a primo, quoniam in illo eleuatio sola est tunicae corniformis, unde etiā tota moles albidior apparet. In hoc uero ruptura quoq; facta est tunicae corniformis, & quod prolapsum est, caeruleum aut nigrū apparet. Quum autē maximum factum fuerit staphyloma, ut extra palpebras transgrediatur, & induretur, ita ut ipsa corniformis circum circa callosa facta sit, & talem affectionē cōstringat, clauus appellatur, quoniā per omnia clauū capiti similis existit. Hæc igitur affectio quomodocunque fiat, duobus malis subiacer, uisus uidelicet detrimento, & figuræ deformitati. Et sic quidē affectū oculi ad naturālē statū reducere, impossibile est arū. Figuræ uero deformitati cōsiliū cōtingere potest, maxime per chirurgiā. Quæcūq; igitur staphylomata recensita sunt, & propter inflammationē eleuatae sunt tunice, curanda sunt cataplasmatū ad inflammationes descriptorū usu, & simili quoq; diætā. In quibus autē sub corniformis strias humores aliqui collecti eleuationē fecerunt, si dolor affuerit, semen lini cū foenograceo ex aqua mulla cocta imponemus. Declinantibus uero doloribus, farinā fabaceam cū rosīs aut semine lini ex aqua impone. Aut rubi folia, aut bryonē botros immaturos, cū butyro & terebinthina, æqualibus portionibus impone, & deliga. Ad dolores uero cōuenit etiā solani succus cum lacte muliebri infusus. Collyriū autem ad non inflāmata staphylomata cōmodū hoc est. Alcyoni drach. iiii. salis ammoniaci unc. i. spūmē nītri drach. i. lacrymę oleæ syluestris drach. i. gummi sextantem. Excipe aqua. At Theodotium Seueri brasiacæ succo dilutum, & crassius oculo adhibitu, unā cū spongię deligatione, molē dissipat, si nō diuturna fuerit affectio. Cæterū ægrē curatur staphylomata quæ ampliōrē fundū habent, & quæ uenas sanguine plenas habēt. Incurabilia autē sunt eminentia, & colore uaria, & temporū dolores inducētia. His sane nihil aliud adhibedū est, quā ea quæ dolores mitigare possunt, quæ in malignis ulceribus iam antē relata sunt.

Staphylomatum chirurgia. Cap. xxxv.

In staphylomatis quæ angustū habent, & nō maligna sunt, cōmoda est actio secundum cōstrictionē appellatā, cuius hic est modus. Duas acus accipere oportet filiū duplex intortū habentes æquali prorsus longitudine. Deinde hominē ad pedes tuos collocato, capite ipsius reflexo, ita ut occiput ipsius genibus tuis innisatur. Et deinde disparatis palpebris, per mediū staphylomatis fundum, ex supernis deorsum acum transmittito. Sit autem non ualde crassā, neq; oblonga, deinde dum detinetur oculus ab acu transmissa, alterā acum duplex filiū habentē similiter transmittito a paruo angulō ad magnū, per mediū idē staphylomatis fundū, quo figura duarū acuum tras-

missarum cruciformis fiat, aut literæ græcæ x. similis. Nam quū paulō obliquior facta fuerit transmissio, facilius acus extrahitur. Deinde incisis duplicatorum filorū principijs, superna duo principia, superno acus principio subiicientes, inferna uero inferno, strennuē constringimus. similiter autem & oblique acus principia constringimus: optima uero cōstrictio fit rectis principijs ad obliqua ductis, & hoc modo colligatis. Deinde apicem staphylomatis resecamus, solo fundo ipsius relicto gratia filorū, ut ne elapsis ipsis humores oculi effundantur, & oculus cauior fiat. Cur autem staphyloma excidimus: primū quidē compendiarie curationis gratia. Citius enim fila excidunt, & ulceratio curatur. Deinde etiā minori dolore æger affligitur per totū curationis tempus, quū & corpora transpirent, & neq; magna inflamatio cōsequatur. Post resectionē uero apicis staphylomatis, acus extrahere oportet, filis uelut dictū est cōstrictis, & tunc lac infundere, aut ouū cadidū. Supernē uero oculo imponatur ouū cū rosaceo ac modico uino cōcussū, & molli lana exceptū. Imponatur etiā temporū alius lanæ hapsus hīdem imbutus. Et facta deligatione, æger in quiete seruetur. Postera die fomentū fiat per spongas probe expressas, & lacte infuso, lanā ouo imbuta imponatur & deligetur. Atq; hoc faciendū est per plures dies, donec fila excidant. Elapsis autē filis illinantur tenera ad ulcera descripta, ut pura exulceratio fiat. Deinde cicatricem inducentibus utendum est.

De ulceribus cicatrice indigentibus. Cap. xxxvi.

Purgatis oculorum ulceribus, & expletionē indigentibus, animaduertere oportet ut ne carne redundant, sed aliquanto cauius ad cicatricem perueniant. præsertim si in pupilla fuerit ulcus. Nam supereminentes cicatrices uisum impediūt, & deformitatem afferunt, & dum ex palpebris punguntur, fluxiones inducunt. Quæ uero aliquantulū cauæ sunt, melius apparent ac splendorem excipiunt, & decorē si fuerint parū cōcolores. Tales autē consequuntur, si a molibus & meatibus obstruentibus pharmacis, compendioso ad cicatricem inducentia transeamus. Præstat autem si aliquādo clandestinē caro superexcreuit, citō reprimere ac eminentias attenuare, & sic cicatricem inducere. Vitanda autē sunt rīgentia cicatrices pharmaca, & maxime si iuxta pupillam fuerit ulcus: dū enim denigrantur, impediunt uisum. Sed & deligationes oculorū in ulcerationibus uitandæ sunt, quibus aliqui utūtur uolentes humiliare cicatrices. Deligatus enim exulceratus oculus, & immobilis factus, sæpe palpebris agnascuntur. Porro ulcera ad cicatricē perducta diligenter notare oportet. Quidā enim decipiuntur, & cauiōres factas cicatrices, caua ulcera esse putātes, mollia & replentia collyria illinunt. Deinde cōtingit locos quidē non impleri, uerum tunicas ex hoc crassas fieri. Quū itaq; superficiē ulceris clarā factam uideris, & albam ac leuē, & album oculi naturalem colorē recepisse, & totū oculum a fluxione liberatum, scito cessasse iam ulcus, & cicatricem inductam esse. Est autem optimum collyrium quo usi sumus in puris ulceribus & cicatrice indigentibus, quod Cleoni inscribitur.

De cicatricibus & albuginibus. Cap. xxxvii.

Omnes cicatrices in nigro oculi albæ apparent. Densata enim corniformi tunica subiectus ipsi caeruleus color non translucet. Maxime tamen supereminentes

tes albescunt. Aequales autē minus sunt albę. Caulos-
res uero quodāmodo cōcolores sunt nigro. Quę ue-
ro adstringentibus pharmacis usq; ad inductā cica-
tricem curantur, magis obscurantur, eō quod pelli-
culę per adstrictionem multum densantur. Ac uero
callosas ac diuturnas & crassas cicatrices curare non
oportet. Necesse est enim in talibus, collyrijs ualde
acribus uti, & à uehementi mordacitate alię oculi
partes ulcerabuntur. Si uero etiā suffusio aut glauce
do affuerit, uanū est cicatrices extergere. Oportet au-
tem eum qui cicatricem exterere uelit, per uictū cor-
pus accommodare, quo moderata materia & boni
succī, in toto corpore adsit. Itaq; ab omnibus acri-
bus abstinere oportet, salisq; ac crassi succī cibis. Et
à multo uino. Et bonę cōcoctionis maximē curam
gerere, & moderatē boni succī eduljjs uti. A balneo
uero curationis tempore abstinendum est. Illitio au-
tem facienda est ante cibū, ubi probe cōcoxit, & ca-
pite ac toto corpore leuis est, uētris onere prius de-
posito, & nō statim à lecto ad illitionē transeundū,
neq; ante coenā. Vitanda sunt excoctantia cicatrices
pharmaca. Quidā enim illinentes ipsas acribus me-
dicamentis, & excoctantes, ac candida ramenta per spō-
gias detrahentes, ea in cuticulis nigris circumferētes
ostentāt. Deinde illinūt aliquod medicamentū quod
tingere potest. Verum fluxionibus succedētib; ex
pharmacorum acrimonia, itemq; inflātionibus,
& aliquando resolutis cicatricibus, ulcera magis
profunda fiunt. Deinde cogantur rursus adstringen-
tibus ac meatus obstruentibus collyrijs uti, & cica-
trices magis crassas faciunt.

Materia attenuans cicatrices & albugines, Gd.

leni. Cap. xxxviii.

Proinde in his quę attenuari possunt, utendū est phar-
macis moderatē extergentibus. Exterforia autē non
minima facultate, participat æs uustum, & squama
aeris, & flos eiusdē, & chalcitis usta. Si uero lota fue-
rint talia, exterforia quidē adhuc manent. Tanto ue-
ro imbecilliora actionibus fiunt, quāto etiā leuiora.
Securius est autem leuioribus uti. Ac fortiora his
sunt, Misy, & ærugo. Quare etiam ad sycofes & cal-
los cōueniunt, si ammiscentur. Quidam his adi-
ciūt etiam gallas, pharmacum uehementer adstringens.
Sed uehementius est adstrictione simulq; acrimo-
nia atramentum sutorium. Multo uero moderatius
euadit uustum ac lotū. Eiusdem materię est & squa-
ma ferri stomomatis. Quęcunq; igitur ex adstringen-
tibus multum terream compagem habent, aspri-
tudines sycofesq; accallos eliquāt, uelut sunt Misy,
& ærugo, & similia. Quę uero ex succorum gene-
re sunt, uelut omphaciū & hypodistū, glauciumq;
& acacia, in subliationibus facile cum lacryma eluū-
tur. Citra mordacitatem autē extergent, cornu cer-
ui uustum, & cornua caprarum. At thus tardissimę
particeps est extergēdi facultatis, eximitq; dolorem
ac cōcoquit. Prædictorū uero animalium cornua,
exterforia quidem sunt, sed neq; uim eximendi do-
lorem, neq; cōcoctoriā habent, quum frigidę ac
siccę sint temperaturę. Thuris autē cortex adstringit
quidem & ipse nō instrēnue, sed multum omni-
bus prædictis inferior est. Thuris uero inter onera
cōfracti pollen, quod mannā dicunt, differt à thure,
eo quod modicam adstrictionem assumpsit. Parua
enim quædā corticis segmenta ipsi ammixta repe-

riuntur. Habet & armeniū appellatū uim extergen-
di, quo uidelicet utuntur pictores. Item atramentū
indicū, & propterea ulceribus nō inflāmatijs citra
molestiam adhibetur. Ataloē mixtę facultatis est,
uelut etiā rosa. Habet enim amarū quiddam, quod
extergit. Habet & adstringēs quiddam, quo cōtra-
hit ulcera & ad cicatricē ducit. Sal uero ammoni-
acus, & lapis Alus, & flos ipsius, fortissima sunt
pharmaca. Quare etiā ad scabras oculorum affectio-
nes cōueniunt. Cæterum ex aromaticis cōmodē his
miscentur, calia & malabathrum, ac amomū, discul-
soria quidem facultate prædita, uerum etiam adstri-
ctione participātia. Nam in communi de omnibus
exterforijs medicamentis nosse oportet, quę mode-
rata sunt, & quę sycofes ac collas consumunt, ea o-
mnia etiam ad cicatrices crassas conueniunt.

Auxilia ad cicatrices & albugines. Cap. xxxix.

Ad albugines dracunculi semen habentis occultatum
in terra simile pipere, idipsum semen accipe, & tritū
cum melle illine. Aliud, ad cicatrices & hebetudinē
uisus. Seminis rutę scrup. ii. armeniāci scrup. viii.
salis ammoniaci scrup. iiii. ammoniaci thymiamatis
scrup. iiii. utere sicco. Aliud. Cicatrices recentes ex-
terit citra omnē molestiam, lac equinum cum mo-
dico melle assidue illitum. Aut anethi florem purpu-
rascentem cū modica aqua terito, & per linteum ex-
colato, ac succū oculo bis in die instillato. Et postea
cūcumeris hortensīs semen cōmande, & expressum
per linteolum succum in oculum instilla, & hoc as-
sidue facito. Aliud ad albugines. Sideritidis her-
bæ fructū leuissimē tritum insussa. Deinde cōpra-
hensum manu oculum, frigida aqua paululum pro-
lue. Exterget etiā generose. Alcyonium milesiū cum
melle. Ammoniacum thymiamata tritū cum uino &
melle. Quod si puero paruo albugo facta fuerit in
oculo, mater pueri ammoniacum cōmandet, & in
pueri oculum sufflet. Facit & Anemones radix bul-
biformis leuissimē trita illita. Et anagallidis ceruleū
florē habētis succus cum melle. Aliud Capnī Che-
lidonī appellatū succus cum melle. Nitrū cum oleo
ueteri, mentę succus mirifice facit. Columbę simus
in cote cum aqua dilutus præter opinionē facit. Item
felis fel illitum. Aliud ad albugines certum. Buty-
rum liquefactum solum illine, summe prodest, &
utere. De hoc plura promittere nō oportet, omnem
enim promissionem uincit. Aliud optimū, Lac mu-
llebre, melanterioriam ex clauis uetustis ac aceto para-
tam, mel bonum, hæc tria æquis portionibus simul
mixta & excolata adhibe uelut diuinū pharmacū.
Aliud. Rumidis hortēsis & plantaginīs semen in te-
sta exurito, & cinerē exacte terito, ac utitor. Aliud,
Crocum, pipere, æquali pōdere lenissimē trita, cum
felis felle in collyria redigito, ac utitor. Aliud, Pul-
lorum hirundinum capita detracta in olla exurito
ac terito, & in corneo uase reponito, ac utitor. Est
enim utilissimū auxilium etiam ad percussos o-
culos illitum. Aliud. Lapidem sarcophagum appella-
tum, ex quo loculos defunctorum magnos faciunt,
tundito, cribrato, & cum spūto ipsius ægrī præfer-
tim ieiuni terito, ac confidenter illinito. Aliud. Vi-
tulę fel heminae mēsurā ad ignem modice coquito,
& optimi mellis parē mēsurā adijcito, & myrrhę
drach. ii. croci drach. ii. simul terito, ac rursus in æ-
neo uase sufficienter coquito, & in pyxidē æream
reponito,

reponito, ac utitor. Aliud. Lapidis magnetis uivui, lapidis ophitæ, sibiij, æquas portiones tufas, cribratas, ac rursus probe tritas, nictæridis herbæ succo ac optimo melle addito, illine per specillum ex lapide sarcophago factū. Aliud. Galbanū cū melle liquefactum ac simul tritū adhibeto. Aliud collyriū, tollit albugines mirificè ac citò. Squamæ ferri stomomatis drach. ii. aluminis scissi drach. ii. gummi uermiculati drach. iiii. terito ex aqua, & formatis collyrijs utitor. Aliud. Rhani succum, si fieri potest de semine, sin minus, de folijs, sextantē, ammoniaci thymiamatis unc. i. testarū sepiæ unc. i. mellis atticæ sextantem. Trita excipe ac utere. Quidā solū ammoniacū cum rhamni succo terentes illinūt. Ipse uero succus per se illitus cicatrices tingit. Archigenis collyriū ad albugines, quod ex una illitione plurimā albuginis partem tollit. Summe etiam facit ad omnē periculofam ac diuturnā lippitudinē. Cochlearū ustarū drach. iiii. æris usti drach. iiii. squamæ æris drach. vi. squamæ ferri stomomatis drach. xii. æruginis drach. vi. lapidis scissi drach. i. aloës drach. i. omphacij sicci drach. ii. lycij indicij drach. iiii. chalcitidis drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. thuris drach. iiii. corticis thuris drach. ii. croci drach. ii. crocomagmatis drach. ii. spicæ nardi drach. iiii. cytinorū drach. ii. gummi drach. viiii. terito cū aqua, & formato collyria, ac utere cū aqua. Quod si aridū facere uoles, trito collyrio utere sicco. Facit & harmaetium collyriū, & præscriptū ad myocephala ex uino, & his similia. Probè etiam facit ad cicatrices, inquit Apollonius, collyriū pepiesmenon, id est presum appellatū, quæ omnia in tractatu de multi usus collyriorū cōpositione describētur. At uero theodotū Seueri cū aqua crassum illitū, ad tātam tenuitatē perducit cicatrices, ut sensu cognosci nō possint. Optimū autē in ipsis est siccū collyriū Alexandro regi inscriptū ex croco, spica celtica, & terra ampelotide paratū. Habetur autē inter sicca multi usus collyria.

Albuginum tinctura.

Cap. xli.

Iam antè dictū est quod abstinere oportet à pharmacis cicatrices tingentibus. Verū ut ne ignorētur ea quæ hoc facere possunt, etiā horum mentio facienda est. Gallam inquit tritā repositam habe, & usus tempore nucleū specilli calefacito, & eo de pharmaco excipito, ac albugini admoueto. Postea uero atramentū sutorium aqua dilutū adhibeto. Aliud. Malicoriū tritum admoueto, & postea atramentū sutorium cum aqua tritum. Aliud. Mali punici dulcis carnē tritam modica aqua adstillata, & leuissimam factā reponito. Et usus tempore, ubi hāc sæpe affricueris, & præadstrinxeris, hyoscyami succum illinito, ad dies xvi. hoc & tingit albugines, & dissipat, multoties illitū. Aliud. Facit & ad glaucos oculos. Misy cū aqua tritum in collyria redigito. Similiter autē aliud collyrium ex galla formato. Vfus autē tempore, ubi per collyrium ex galla præadstrinxeris, collyriū ex misy illinito. Aliud siccum. Gallæ drach. i. acaciæ drach. i. atramentū sutorij drach. ii. Vtere. Aliud collyriū. Florum mali punicæ, atramenti sutorij, acaciæ, gummi, singulorum drach. iiii. sibiij drach. iiii. gallarum drach. ii. Aqua excipe. Si uero flores punicæ non affuerint, id quod in ipsis malis inter grana mēbranæ speciem præfert inijce.

Ad glaucos oculos ut nigras habeāt pupillas. Ca. xlii. Malicorij punici dulcis succum infunde. Deinde inter-

stitio facto hyoscyami cæruleum florem cum uino tritum instilla, aut hyoscyami succum. Oportet autem debito tempore flores colligere ac reponere. Aliud. Acaciæ fructū, & parum gallarum diligenter tere, & anemones succo excipe, ut mellis crassitudo fiat. Deinde liquorem per linteam diligenter exprime, ac repone, & utere uelut dictum est. Aliud. Cucumeris syluestris succum illine. Hic mulieres glaucoculas oculis nigricantibus facit. Aliud. Hyoscyami cæruleum florem in umbra siccatō ac reponito. Vfus autem tempore florem uino austero dilutum præillinito. Et postea ipsum florem leuiter tritum per se illinito. Hoc uim suam statim declarat.

De puerorum curatione. Seueri.

Cap. xlii.

Ingens grammarum copia in oculis puerorū reperitur, & instantur plerunque horum palpebræ à materiæ multitudine. Sunt enim pueri natura humidiores ac calidiores. Itaq; horum collyria perfrigatoria sunt, & aliquo modo resiccatoria, participantia etiā non modica astringitione, quo sordidū copiam influentem repellere possint. Ad tantam enim adstringendī facultatem progressa sunt puerilia collyria, ut etiam aspritudines tollant. Hebetatur enim in pueris collyriorū acrimonia à locali humiditate, & grammarū multitudine. Sed & per allabentium humorum copiam, propter ploratum fientē, collyria eluuntur. Est autē nobis experientia cognitū in ipsis primariū & mirabile collyriū, quod recipit lapidis scissi drach. xx. lapidis hæmatitæ drach. xx. æruginis drach. iiii. chalcitidis crudæ drach. iiii. æris usti drach. iiii. opij drach. vi. myrrhæ drach. vi. gummi drach. xvi. Hæc est collyrij cōpositio ratione approbata, & experientia utilis cognita. Teritur ex aqua. Sed & aliud collyriū ad ipsos utile experientia cōstat, quod recipit. Lapidis scissi drach. xx. Lapidis hæmatitæ drach. xx. æris usti drach. viiii. ammoniaci thymiamatis drach. viiii. misyos usti drach. viiii. opij drach. iiii. seminis hyoscyami drach. iiii. gummi drach. viiii. Excipe aqua. Oportet autem & in his à principio ammiscere lenia collyria, atq; sic paulatim ad efficacem auxiliorū facultatem progredi. Mirificè etiā ad ipsos facit theophilium collyrium, & quod Mono inscriptum est, quæ inter multi usus collyria habentur.

De aspritudinibus, ac densitatibus, sycofiq; ac cullis.

Seueri.

Cap. xliii.

Quandoquidem ratio auxiliorū cognitionē respicit, & uelut inter se cōdependētes facultates reperit, admonet sanè eadem ut nihil aliud ab ipsis interponamus. Proinde asperitates quæ etiam ab aliquibus densitates uocantur, ex mala curatione sæpe fiunt, dum medici diutius collyria instillant. Queniam modū enim in externis uulneribus pinguium adhibitiō, carnū quarūdam inutilium causa est: Sic etiam in præsentī fieri cogitare oportet. Sint autem & ex fluxione diuturna minime mordaci: Si enim acris esset, citius oculis damnū induceret, quàm palpebræ affectionem inseminaret. Fit etiam aliquādo non prægressis fluxionibus, neque manifesta causa præsentē. Et sunt huiusmodi non similes his quæ ex fluxionibus fiunt. In illis enim densiores & asperiores ac cruentiores euerse palpebræ apparent: In his uero uelut milij grana, aut erui parua semina uidere est, intra palpebras exurgentiā. Estq; hæc species reliquis

reliquis curatu difficillior. Differunt tamen hæ inter se. Nam densitas in superficie est & cū rubore. Aspritudō uero maiorem inæqualitatem ac eminentia habet, cum dolore simul ac grauitate. Ambæ autem oculos humectāt. Quæ uero Sycoſis dicitur, altiores eminentias habet & uelut incisas, & cui aliq̃ reliquā ficut hianti similis est. Calloſitas uero aspritudō est diuturna, induratas & calloſas inæqualitates habens. Quidam igitur aspritudines radere conantur, partim ferro, partim folijs fici. Est autem hic conatus noctuus. Amplius enim ipſas augent, & duras cicatrices inducunt, & aſiduarum fluxionū auctores fiunt, dum ſemper oculi ex ſuccedentibus durioribus cicatricibus punguntur. Curare uero oportet aspritudines, nullo ulcere circa oculū existente, collyrijs ad pueros relatis, ita ut euerſis palpebris, ſi nō inflāmatæ fuerint, illinantur, & per ſpecilli nucleum diu affricentur. Qui enim cito ab affricione deſiſtunt, denſant magis, & oculis fluxionem inducunt. Si uero permanſerit cauſa, efficacioribus uti cōuenit. Quale eſt hoc. Teſtę ſepiæ drach. viii. puniſis drach. viii. rubricæ ſinoplicæ, ammoniaci thymiamatis, ſingulorū drach. x. gummi drach. viii. Exdipe aqua. Ex huius uſu magnā laudem reperies. Statim enim ab illitione cuticulæ quædam in ſpongiæ admoſione excidunt. Oportet autem poſt collyrij illitionem, aquā frigidā per ſpongiā adhibere. Eſt & aliud collyrium ad huiusmodi affectiones, quod recipit cadmiæ drach. iiii. ſquamæ æris drach. iiii. ſalis ammoniaci drach. iiii. opij drach. ii. gūmi drach. xii. Excipe aqua. Ego uero ſeucriano ſicco collyrio uſus profeſci, cuius & tu experiētiā magiſtrā habebis. Apollonius autē dicit, ad exaſperatas palpebras utendū eſt pharmacijs, quibus etiā craſſiſſimas cicatrices depurgamus. Quale eſt hoc. Aeris uſti drach. viii. myrrhæ drach. i. ſquamæ æris drach. i. acaciæ drach. i. cadmiæ drach. ii. ſpicæ nardi drach. i. cinnaſmomī drach. i. croci drachmā i. piperis grana xvi. hyperici drachmas iiii. ammoniaci thymiamatis drachmas tres, æruginis obolos duos, gummi drachmam unā, terito cum uino ueteri aſturo, & collyria formato, ac utitor. Aliud. Ad fluxiones antiquas, & palpebras denſas. Cadmiæ drach. xvi. æris uſti drachmas iiii. ſeminis hyoſcyami drachmā i. opij drachmas ii. myrrhæ, fructus ericæ, acaciæ, ſingulorū drach. iiii. gūmi drach. viii. Omnia ſicca leuiſſime terito, & lac muliebre adijcto, ac ſimul trita in collyria efformato. Et ea ſimiliter lacte trita craſſe illinito, adhibito prius fomento. Liquida cōpoſito ad aspritudines. Facit & ad oculos ſuppuratos. Chalcididis uſtæ drachmas iiii. croci drach. viii. mellis drach. ix. Arida cū aqua terito, & ubi probe ſiccata fuerint, mel ammiſceto ac utitor. Theophrasti liquida. Ad omnes ſicoſas emineſcias, & omnē carnis extuberantiā. Aeris uſti drach. ii. miſyos uſti drach. i. myrrhæ, croci, omphacij, ſingulorū drach. i. uini chij aut alterius adſtringētis ueteris, odorati, unc. ſc. decim, mellis Attici dextrantē. Sunt & alia collyria facientia ad aspritudines. Quale eſt phoenix, & dioryſus, & ſimilia, quæ inter multi uſus collyria deſcribentur. Cæterū in quibus cum palpebrarum aspritudine, etiā tunicæ oculorum inflāmatæ dolore uexantur, ammiſcere oportet aliquid de exterſorijs, ad propria inflammationi medicamenta. Qualia

sunt collyria ex uino parata. Sedata uero oculorū inflammatione aspritudines exterere oportet. Verum in his qui ulcus habent cum fluxione mordaci, fieri non poteſt ut huiusmodi medicamento utamur. Corniformis enim amplius corrodetur, & uulſiformis prolapsus maior fiet, & uehemens dolor hominem appræhēdet. Augebitur autem & malignus fluxus. In his igitur collyrium huiuscemodi parare oportet. Pumicem leuiſſime tritum tragacantho aut gummi madefacto exdpimus, & parua collaria formamus. Deinde euerſis leuiter palpebris diutius affricamus. Et poſtea lac inſundimus, & collyrijs ad puſtulas ac ulcera deſtinatis utimur. Ceſſante uero in temporis progreſſu fluxione, ad acriora collyria tranſimus, ac cum ipſis palpebras, uelut dictum eſt, confricamus. Miſcemus etiam ad ea quæ ulceribus conueniunt, collyria ex uino, paulatim augentes ipſorum mixturam, quo neq̃ palpebræ uexentur tunicas oculorum, & ulcera pura facta impleantur ac cicatricem recipiant.

De oculorum debilitate. Demosthenis. Cap. xliii.
Debiles oculi dicuntur, qui neq̃ album, neq̃ ſplendidum, neq̃ igneum uidere ſuſtinent, ſed ex quauis occasione uiſum continent & lacrymantur, præſertim inter legendum. Differunt autē hi à fluentibus propter carunculæ naturalis circa magnum angulū decrementum: fluentes enim hoc modo, etiam citra aliquam externam cauſam lacrymantur, hi uero occasione aliqua oblata. Curādī uero ſunt deambulationibus, curſibus, exercitijs ſupernarum partium, cum fricione & ſpiritus detentione, capitisq̃ raſura, ac leui oculorum fricione poſt exercitia, & frigida in caput perſuſione. Utendum eſt & aquæ potu, & uictus ratione media. Conducit & legere cum clamore, iteq̃ ſic ſcribere. Si uero pharmacijs opus fuerit, adſtringentibus & perfrigerantibus ac meatus obſtruentibus utemur.

De myopia. Cap. xlv.
Myopes dicuntur qui ex natiuitate parua quidem prope uident, magna uero procul uidere non poſſunt. Et qui ſcripta admoſis oculis legunt. Et aliq̃ quidem inæquales, aliq̃ æquales oculos habent. Incurabilis eſt autem talis affectio.

De nyctalope. Cap. xlvii.
Nyctalopas uocant qui die quidem uident, occidente uero ſole obſcurius. Deinde noctu penitus nihil cernunt. Hoc autē magis fieri uidetur propter aliquam capitis debilitatem, & maxime uiuſui ſpiritus craſſitudinem, itemq̃ reliquorum oculi humorum ac tunicarum. Quibuſdā uero conſtingit, ut noctu quidam melius uideāt, interdiu autem deterius. Et ſi noctu luna appareat, nihil cernunt. Sed hoc rarum eſt, illud autem prius plurimis cōtingit. Curādī porro ſunt qui in nocte non uidēt. Si bono habitu præditi fuerint, uenæ cubiti ſectiōne, itemq̃ ab angulis oculorum: qui uero uitiōſis humoribus redundāt, conuenienti pharmaco purgentur. Poſtea poſt uniuerſalem euacuationem utendum eſt his quæ pituitam per os ducunt, & quæ per nares purgant, & ſternutationes ciendæ. Naruſuforium autem pharvacum ipſis commodum hoc fuerit. Piperis, ſtaphidis ſylueſtris, ſingulorum ſcrup. ii. ſinapis ſcrup. i. tundito ac cribrato, & radicū betæ ſuccum adijcto, ut mellis liquidi cōpages fiat, & cōtrita naribus infunde

infunde, ac attrahere iube. Atque hoc ad dies v. aut vii. facto. Vtere etiam alijs quæ in nares mittuntur, in Sermonibus de narium affectionibus præscriptis. Ante cibum uero bibant hyssopum, origanum, rutam. Diæta autem attenuatoria sit ex toto. Si uero per hæc non successerit, rursus purgatorium dandū est, quale est hoc. Scammoniae obol. iiii. castorei obol. ii. salis obol. iiii. In debilioribus autem scammonie obol. ii. iñice. Talis enim purgatio sæpe euestigio ab affectione liberauit, aut multo meliorem dispositionem induxit. Post paucos autem dies dādum est purgatorium pituitam & bilem ducens, quale est hoc. Colocynthidis obol. ii. scammoniae obol. iiii. salis obol. iiii. Excipe in catapotia sex, & medijs habitibus tria præbe, fortibus autem omnia. Oculi uero illinatur melle cōcto, & ad continendum liquore immixtum claudantur. Aut oleo uetustissimo similiter illinantur. Aut aluminis scissi in testa exusti drac. ii. salis ammoniaci aut cappadocici drac. i. terito, & cum melle illinito, aut cū lacte muliebri. Aut hyænæ fel cum melle. Vitandus tamen est frequentior acriorum pharmacorum usus. Assidue uero utendum est oleo uetustissimo. Putatur ipsis prodesse hepar hirci assatum, cum sale citra oleum, calidissimum comestum. Quidam etiam destillante ex hepate dum assatur sanie ipsos illinunt. Aliqui hepar coquunt, & oculos super elatum uaporem detinentes, hoc fomento utuntur. Auxiliatur etiam elateriū ex interuallis cum melle illitum. Et perdicis fel aut capræ syluestris, aut hirci. Buglossi etiam piscis fel illitum ualde prodest. At uero diæta tota attenuatoria sit. Et ab initio etiam a uino abstinendum est. Et uitanda omnia crassefacientia. Cæterum in his qui noctu melius uident, interdum autem deterius, nos coniectamus spiritum multū attenuari, aut tunicas rarefieri, atque ex hoc spiritū dissipari, ac uisum obscurari. Noctu uero crassefieri colligitur, ac sensum mouere. Et oportet in his robur oculis addere. Herophilus tamē uice uersa in libro de oculis dicit, ad eos qui in die non uident, gummi, crocodili terrestres stercus, misy, hyænæ fel, trita cū melle illinito bis in die, & ieiunis hirci hepar edēdum præbe. Ego uero cōlecto hoc magis facere ad eos qui noctu nō uidēt.

De hebetudine oculorum. Galeni. Cap. xlvii. Hebetudo oculorum est obscuritas uidendi, ob plurimas causas contingens. Aut dum uisuius spiritus in crassatur, aut dum tunicae densantur ac crassefiunt. Aut dum humores in oculo crassi ac uiscosi fiunt. Contingit etiam his hebetudo, qui diuturno morbo detendi fuerunt, & tristitia ingent. At in senibus unā cum hoc quod crassi facti sunt humores, & tunicae, & spiritus uisuius, etiam debilitas adest spiritus uisui, & imminutio multa, ac collapsio, & uelut corrugatio nerui uisui ac tunicarum in oculo densatarum ac crassefactarum. Nam dū imminuuntur humores in oculo senibus ipsis, & minus de spiritu ex supernis ad pupillam defertur, usque adeo rugosa fit sæpe corniformis tunica, ut senes partim omnino non uideant, partim male & uix adhuc cernant. Corrugationes enim mutuo inter se incidunt, & tunica uelut conduplicatur, & alia crassitudinem aduenientia assumit. Porro auxilia in cōmuni ad hebetudinē, ex eadē materia componuntur, ex qua etiā in incipientibus suffusionibus, & partim in collyriorum formas effinguntur, partim liquida sunt, quæ

etiam induratis inflammationibus tunicarum conueniunt: partim sicca. Horum compositiones in fine huius Sermonis habentur.

De obfuscatione oculorum. Demosthenis & Galeni. Cap. xlviii. Obfuscatio est perfectū ut plurimū uidendi impedimentum, citra manifestā circa oculū affectionē, pura uidelicet apparente pupilla. Et quibusdā paulatim affectio conflat, alijs cōfertim incidit, ut minimū aut semel in totū nō uideant. Et obfuscationis quidē paulatim cōflatae plures causæ sunt de hebetudine iā relatae. Eius uero quæ cōfertim incidit causa est obturatio nerui uisui, crassus ac uiscosis humoribus cōfertim ipsis illapsis, aut eiusdē nerui resolutio. Præcedunt affectionē assidue cruditates, & meri potus, insolatio, capitis inustio ac ardor, aut perfrigeratio. Aut assidua lectio post cibū, aut balnea similiter assidua post cibū. Et uomitus inrepestiui, coitus immodicus ac inrepestiuus, spiritus detentio uiolenta, quēadmodū in tubicinisbus contingit. Hæc enim & his similia, dū modice fiunt, uisus hebetudinē efficiunt: dū uero immodice, obfuscationē. Fit etiā aliquando obfuscatio ob fortes capitis plagas, aut casus ex alto, resolutio quādoque neruo uisui, aut rupto, aut quod omnium mississimum est, humorū copia per uehementem cōcursionē illata, & uisuum neruū obturante. In resolutionibus igitur nerui, tarde mouetur oculus, aut omnino nō. Quum uero ex uiolenta plaga in caput facta, aut ex casu, a cerebri connexu ruptus fuerit neruus, primū quidē oculus prominētior fit, deinde cauatur, & alimētum nō sentit. Quum autem ob humorū crassorum aut uiscosorum copiam, neruus cōfertim obstructionē sustinuerit, absque alia causa, necesse est capitis grauitatē cōsequi, maximē in profundo iuxta radices oculorū. Eos igitur quibus oculi cōfertim obfuscantur, curare oportet, uena cubiti incisa, si plenitudine grauatus fuerit eger. Validissimū enim auxilium in ipsis est uenæ sectio. Deinde interpositis aliquot diebus, fasciā collo circumdabimus, ac cōstringemus, & postquā frontis uenæ eleuatæ fuerint, rursus exoluemus, & hoc iterū atque iterū faciemus: quo per spiritus motū, humores obturati uolēter concitantur. Postea eleuatas angulares uenas, ab utraq; nasi parte secare oportet, & fortem euacuationē facere. Ego enim ad tres heminas ex angularibus uenis aliquādo euacuaui. Post hæc cōfertim cucurbita occipitio affigenda est cū scarificatione. Cōtingit enim plerūque statim incumbente adhuc cucurbita hominē respicere. Sed nō oportet hoc auxilio cōtentū esse, uerū reparatis uiribus, post tertiā diē purgare. Deinde ad diætā deducere. At uero in his quibus paulatim per multū tēpus oculi obfuscantur, præmissa recta uictus ratione, a uenis angularibus euacuationē, uelut dictum est, faciemus. Et in his qui nō multo sanguine abundāt, statim ab initio ab angulis auferatur. Deinde cucurbita occipitio affigatur. Et postea purgatio fiat. Per diætā uero maxime aliquid facile solubile facto per cibos, bonæ cōcoctio nis præ omnibus ratione habita, per aliquot autem dies dāda est aloë deuorāda, terebinthina excepta in catapotia, facit & cnici succus cū melle. Vtēdū est & exercitijs infernarū partium, & deambulationibus pluribus in umbrosis locis. Vitandus est uini potus, & aque potio, uiriliter tolerāda. Vitandus est etiā omnis cibus crassefaciēs, & assiduus coitus, & capitis insolatio.

latio. Neq; uero balneū cōuenit, neq; somnus diurnus, neq; uehementior a cibo motus, neq; legere aut scribere. Vitandæ sunt iræ, indignationes, & curæ pertinaces, & uehementes perturbationes, ac timores, præsertim post cibū, & assidui uomitus. Quotidie autē proluēda est facies aqua frigida, præsertim pluuiali, & illinendū corpus per alios. Perseuerante uero affectione, etiā per narifusoria caput purgetur, ita ut naribus infundamus quæ ad capitis dolorē dicta sunt. Utendū est, & pituitā per os detrahentibus sibi dem relatis. At uero illitio oculorū, diuturna sã existente affectione, primū per simplicia fiat, uelut per mel nō fumosum, aut oleū uetus; postea etiā cōpositis utendū est. Nos autē laudem assequuti sumus in ipsis ex Diacenterii collyrii usu, & liquida Aglaide cōpositione ad suffusiones destinata. Cōmune uero ad omnē obfuscationē ac hebetudinē hoc est. Videtur autē & ad mēbranarū crassitudines facere. Croci drac. i. myrrhæ drac. i. piperis grana x. spicæ nardi obol. ii. succi foeniculi drac. xvi. ammoniaci thymiamatis drac. i. mellis quincuncē. Ad omnia leuissime trita foeniculi succū affunde, deinde tere ac resicca, & amixto melle ænea pyxide excipe, ac utere. Ante illitionē uero, fomentū per spongiā in aqua calida marina tinctam oculis adhibendū est. Aliquando etiā tota facies in marinā tepidam immittēda est. Atq; hæc quidē cōmunia in omni obfuscatione. Ceterum his quibus ob coarctationē multorū aut crassiorū humorum ad neruū delatorum, uisus impeditur, post uenæ sectionē, & cucurbitæ admotionē, & purgationem, caput sinapismo integendum est. Et postea etiā caustico pharmaco occiput exulcerandum. Et capitis ex aqua calida perfusione utendum. Præstat autē saluginosam aut nitrosam esse aquam.

De resolutione oculorum. Cap. XLIX.

Non solū neruus uisuius, uelut prædictū est, sed etiam totus oculus aliquādo resoluitur, aliquādo cū reliqui corporis dextris aut sinistris partibus resolutis. Aliquando uero priuatim circa solā palpebram fit resolutio. Aliquādo uero etiā totus oculus resoluitur. Et si quidē palpebra fuerit resoluta, oculus semper cōclusus est, & palpebra nō sentit. Si uero totus oculus resolutus fuerit, motus ad dextrā ac sinistrā, sursumq; ac deorsum perficere non potest. Et si quis acris pharmacū sublinat, non percipit morsum. Si igitur palpebræ solius fuerit resolutio, præpurgato per aloëdaria uniuerso corpore, & post aquæ potus & frequentioris deambulationis, ac multæ infernarum partiū frictionis usum, palpebra assidue alumine scisso cū acris aceto illinatur, & collyriis calidioribus, aut eo quod ex sandice cōstat. Quod si hinc nō restituitur, sursum suere ipsum oportet. Totius autē oculi resolutiones ægrè curabiles sunt, maxime in ætate prouectis. Si uero ex nativitate cōtingerit resolutio, impossibile est hanc corrigere. In quibus igitur salutis spes est, talis curatio faciēda est præ omnibus: si bono habitu præditus fuerit, uena cubiti secetur: Deinde anus per clysterē eluatur. Postea purgatorio corpus euacuetur. Deinde pituitā per os ducētib; utendū. Deinde per ea quæ naribus induntur purgandū. Postea cucurbita occipitio affigenda cū scarificatione. Et hīrudines temporibus admoūdæ.

Propinandū etiam castoriū per se, & cum abstinthio. Dandū & pulegium, hyssopū, ruta, cum aceto

mulso ac sale. Postea caput castorio illinatur, cū rosaceo & aceto. Et ex eodē ungento, mollis lana imbuta, oculo clauso imponatur, cauendū ne in oculū insillet. Atq; hæc curatio bis in die fiat. Palpebræ uero forinsecus & frōs, castorio cū croco ex aceto illinantur. Mihi uero uidentur liquidæ ex castorio ac melle ad affectionē commodæ, quæ cōpositiones & sublinendæ & superlinendæ sunt. A uino uero, & carnosio multūq; nutriente ac crassi succi cibo omni abstinentū est, & assumēdi qui excretionēs facile solubiles faciūt, ac humores attenuāt. In primis tēporibus uitāda sunt etiā balnea, & uaporatoria, & insolationes. Vomitiū autē ex interuallis utēdū ieiunio à raphanis, deligato oculo, & citra multā lācinationē.

De glaucedine. Cap. LI.

Glaucedo duobus modis dicitur. Glaucedo enim proprie mutatio est cristallini humoris ad glaucū colorem, siccitasq; ac cōcretio. Altera autem glaucedinis species ex prægressa suffusione, fit humore iuxta pupillam uehementissime cōgelato ac resiccato. Et hæc species incurabilis est. At proprie dictam glaucedinem incipientē aliquando sanare datur, ex deambulatione pro uiribus, & totius corporis frictione, ac lauacris maxime capitis. Aestate uero etiam frigide lauacrum conuenit, & tonsura capitis ad cutem. Oculi uero solo oleo antiquo sublinantur.

De suffusione. Ex Demosthene. Cap. LI.

Suffusio est præterfusio humorū circa pupillam congelatorū, ut ubi perfecta fuerit, uisum impediat. Incipiente uero suffusione, talia ægris accidunt. Velut culices parui caliginosa quædam oculis sæpe obuersari uidentur. Et quidam ex ipsis piliformia uident, alij uelut lanarum filamenta, aut araneorū texturas. Quibusdā circa lucernas circuli apparent. Hæc autē ubi apparuerint, aliquādo pura pupillā apparet his qui negligentius considerant. Aliquādo uero colorem maris refert. Augescente deinde affectione, augescunt etiā accidentia: perfecta uero eadē, homo nō uidebit, pupillāq; colorem ad albedinem mutat, & omnino nō translucet. Plures autē sunt coloris species. Quædam enim suffusiones aërem assimilant, aliquæ uitrum referunt, aliæ albicantes sunt, aliæ ad cæruleū colorem magis mutantur, aliæ glaucescunt, quæ etiam incurabiles sunt. Curadi autem sunt qui suffusione tentantur, in principio sanguinis de cubito de tractione. Et si nihil impedit, etiā clysteribus acrioribus, & purgationibus. Deinde quoque cucurbita occipitio affigenda est cū scarificatione, & pituitam per os detrahentibus, ac narifusoriis, ex interuallis utendū. A uino uero abstinentū est per totam curationē, & ab omnibus replētibus caput. Itemq; a balneo, nisi quis lassitudinis ac tardæ cōcoctionis gratia ad lauandum se cogatur. Et tunc omnino nō in aëre balnei moretur, neq; in solio morā trahat. Sed paululū inscēdat, & cito exeat. Dieta uero omnis sit attenuatoria. Medicamentis autē utendū est, primū simplicibus, uelut melle, & oleo ueterij, ac foeniculi succo. Deinde etiā cōpositis liquidis ac siccis collyriis, quæ paulò post describētur inter cōmunia auxilia.

De mydryasi, hoc est, pupille dilatatione. Cap. LII.

Pupillæ dilatatio appellatur, quā pupilla colore quidē nihil abalienatur, multo uero latior quā pro naturali modo euadit, ut aliquando ad iridis circulum accedat, & quādoq; in totum uisum impediat.

Aliquando

Aliquando tamen vident, verum obscure, & quæ videntur ab ipsis, omnia minora putantur, diffuso videlicet spiritu visivo. fit hæc affectio propter humorum allapsum, qui aut aceruatim, aut paulatim feruntur, à quibus citra sensum uiformis tunica distenditur, & pupilla amplius dilatatur. Est autem affectio ualde ægre curabilis. Quum enim membranosa sit tunica uiformis, ubi semel distenta fuerit induratur, neque facile amplius contrahi potest. Accidit autem affectio hæc magis pueris, propter tunicarum debilitatem. Sunt & quæ ex natura nigros oculos habent, magnas etiam pupillas habent. Quapropter facile in hæc affectionem delabuntur. Curanda est autem affectio, si nihil impedierit, uenæ sectione in cubito, aut purgatione. Si uero hoc fieri non poterit, angulares uenæ soluantur. Deinde cucurbita occipitio affigatur. Utendū est & deambulationibus lætis ac pluribus, in locis umbrosis. Et omni modo conandū, ut materia ad infernas partes detrahatur. Quapropter in principio etiam clysteri utendum est, & infernarum partium frictione per alios. Post deambulationem & inunctionem, facies aqua marina proluatur, hyeme tepida, æstate frigida. Tota etiam facies in aqua mittatur oculis per tempus quoddam apertis. Quod si marina non adsit, parum salis aquæ miscetur, aut posca aquosa assumatur. A uino abstinendū est donec affectio fuerit soluta. Et tota diæta tenuior sit & uentri commoda. Balnei usus rarior sit, & tunc caput non ualde perfundatur. Pharmacis utendum est subadstringentibus, uelut rosa, croco, nardo, thuris cortice, pompholyge, spodio & acacia. Nam ualde acres pharmacorum facultates, humorum copiam attrahentes, distendunt membranas, & latiorē pupillā efficiunt. Quapropter & quæ uehementer astringunt, uelut est chalcitis, misy: & quæ amplius frigefaciunt, uelut ciuta, membranas indurant. Sed & amplius contrahere ac coarctare pupillam incommodum est. Nam hæc res pupillam ad tabem perducit.

De tabe pupillæ. Cap. LIII.

Tabes pupillæ dicitur, quum angustior & hebetior facta fuerit. Hoc autem plerisque contingit ex periculosis debilitatibus, aut ingenti capitis dolore. His autem maiora apparent quam pro naturali modo, quæ ab ipsis uidentur, propter pupillæ angustiam. Curatio nem porro in his contrariam midryasi facere oportet, ita ut exerceamus supernas partes, humeros ac manus, cum spiritus detentione. Et caput ac faciem diligenter confricemus. Deinde oculos summis digitis. Facies etiā aqua calida proluatur. Et caput ungento quodā moderate calefacere potente illinatur, quale est irinum. Et modico facto interstitio, oculi rarefaciente, & acriore, ac humiditate attrahente pharmaco sublinantur. Quale est hoc collyrium. Ammo niaci thymiamatis drach. i. crocomagmatis drach. iiii. croci drach. ii. æruginis drach. iiii. Trita cum aqua efforma & utere. Facit & Erasistrati liquida compositio. Victus sit optimi succi & sorbilis. Vinū fuluū & odorū. Somnus excipiat cibum. Sed & balnea conueniunt, & capitis ex aqua calida perfusio.

De macie oculi. Cap. LIIII.

Oculus macer esse, & alimentū non sentire dicitur, quum ex uehementi capitis dolore, aut in febribus acutis, paulatim humiliatur & cauatur, & in totum minor sit, & aliquanto obscurior, & uisum impedit. Con-

tingit autem hoc sæpe ex caluæ incisione & perforatione, quando sanè etiā ægrè curatur. Differt autem macies à tabe, quod tabes pupillā solam minorem facit: macies autem totū oculum minorem & humiliorē efficit. Curandi porro sunt sic affecti, spongiarum ex calida aqua expressarum circa oculos fomento. Lac quoque tepidū ipsis infundendū, & ab omni collyrii adhibitione abstinendū. Cibi datur ipsis multum nutrites & optimi succi. Vinū sit fuluū & tenue. Utendū est balneis, & capitis ex calida aqua perfusione. Exercitijs itē partium supernarum & spiritus detentione.

De expressione oculorum. Cap. LV.

Exprimuntur oculi aliquando ut prominentes permaneant. Et hoc contingit his qui strangulantur, & in athleticis certaminibus, & foeminis quæ in partus doloribus amplius distenduntur. Aut ex fluxionibus plurimis, quæ aceruatim à capite defluerunt. Qui igitur ex strangulatione in hoc inciderunt, his uena cubiti secetur. Si uero alijs crassi humores influentes oculos impetuerunt, purgentur ueratro nigro, aut scammonia. At expressiones oculorum in foeminis ex partus doloribus sæpe contingentes, purgationes per locos muliebres soluit. Quare has procurare oportet. In uiris autem post uenæ sectionem, aut purgationem, si permanserit affectio, cucurbita occipitio affigatur, & aquæ potus exhibeatur, & cibi contrahantur. Oculo uero imponatur lana melle imbuta cum modico croco, & hapsus lanæ superimponatur, & placida compressionē deligetur. Conducit his etiam post principium, aqua marina frigida faciei affusa, & intybi succus ac polygoni, & psyllij cum opio illitus. Et quæcūque alia comprimere ac contrahere possunt.

De confusione. Cap. LVI.

Confusio oculi plerumque ad uehementes plagas consequitur. Sed & ex uiformis tunicæ inflammatione contingit, ruptis in ipsa uasis. Pupilla uero colore turbida fit, & aut maior, aut minor seipsa euadit. Curandæ igitur sunt confusiones ex plaga, per uenæ in cubito sectionem. Et totus oculus sanguine recens macerati turturis, aut in illius penuria, columbe expleatur. Et mollis lana in ouo cum uino & rosaceo conquassato madefacta imponatur ac deligetur. Et postera die idem fiat. Tertia uero fomentum adhibeatur, & lac instilletur. Postea ouorum assatorum uitelli imponantur, cum melle & croco trito, linteolo illiti. Quum autem pupilla iam purgata fuerit, collyria ad antiquas affectiones destinata sublinantur, quale est aromaticū, & chiacū Apollonij, & similia. Facilius autem curatu est confusio in his quibus pupilla sola ampliatur, colore uero & figura simili permanet. Difficiliter autem curatur in his quibus pupilla diuisa est.

De his quæ in albo oculi nascuntur. Cap. LVII.

Omnia quæ præter naturam in albo oculi nascuntur, quæ quidem doloris exordia sunt, in quibus pili sæpe exoriuntur, & quæ non ualde à naturali colore euariant, curabis hamo apprehendens ac extendens, & postea scalpro pterygis destinato resecas. Deinde salem tenuem inspergens, & lanæ hapsus imponens ac deligans, & reliquam curam adhibens uelut in pterygiorum resectione. Quæ uero subrubra, & tumida, ac uaricosa sunt, dolorificæ & aspera, & tempora per consensum afficiunt, ea omnia fugere oportet uelut maligna, & pericula, ac oculorum prolapsum inducentia in chirurgia.

De pterygijs. Cap. LVIII.

Pterygium, unguis latinis quibusdā uocatus, dicitur quum album in oculo amplius augetur, aut carne superexcreuit, ex scabra quadā lippitudine, aut assiduīs fluxionibus. Incipit autem huius augmentum, sæpe quidem ab angulo magno appellato iuxta nasum: Rarius autem a paruo: Et adhuc rarius generatur a superna aut inferna palpebra. Extēditurq; usq; ad nigrum. Quum uero maius factum fuerit, etiam pupillam cōtingit, & uisum impedit. Facilia uero curati sunt pterygia albicantia, & angustū fundum habentia. His uero contraria, ægre curantur. Nam subrubra post curationem chirurgicā, cariem ac dolores dimidiæ capitis partis inducunt, attamen post symptomatū sublationē oculus liberatur. At pterygia in quibus etiā principia sunt suffusionis, curare nō oportet. His enim sublati, citius suffusio conflat. Sed neq; crassa pterygia curanda sunt, & euerfa, & eminentia, ac indurata, & quæ tēpora per cōsensum afficiūt. Sunt enim maligna & cancerata. Quæ uero usq; ad pupillā pertingūt, & propterea uisum impediunt, si tollantur, liberāt quidē oculum a fluxionibus, cicatrix autem quæ ex chirurgia iuxta pupillam succedit, nihilominus uisum impedit. Cæterum ex pterygijs ea manu curare oportet, quæ aucta ad nigrum se extendunt: Quæ uero parua & in albo sunt, ea cōadū est ut pharmacia cōprimamus.

Pharmaca ad pterygia. Cap. LIX.

Pterygia probe deprimit siccum ad scabiem destinātū, ex chalcitide & cadmia compositū, quod ad scabros angulos descriptum est. Et theodotum collyrium Seueri tritum ac siccum adhibuit, & omnia exterforia collyria, ad aspritudines & sycofes descripta, & quæ ad myocephala & staphylomata conueniunt, maxime ex uino parata. Archigenes autē ad pterygia, inquit, atramentū sutorij drach. II. salis ammoniaci drach. II. gummi drac. I. terito ex aceto, & collyria formato ac utitor. Aliud, celebre quod celerime ipsa consumit. Chalcitidis ustæ ut fulua euadat, drach. III. croci drach. I. tritis utere siccis. Aliud, experientia cognitum. Chalcitidis ustæ drach. x. cadmiæ drach. x. squamæ æris rubri drac. I. piperis drac. I. utere. Aliud, ex fundo tollēs pterygia. Atramenti sutorij torrefacti drac. II. æris uisti drac. I. siccum adhibe. Et post detractionem, collyrio ex rosas cura, aut ex croco collyrio. Aliud. Magnetē lapidem uiuum diligenter terito, & semel in die utitor. Aliud. Populi nigræ succū cum duplici melle illine. Aliud. Atramentum sutorium cum felle suillo, æquali pondere trita illine. Aliud. Sepiæ testas uistas, cū sale ammoniaco, æquis portionibus cere ac utere. Aliud, facit & ad sugillationes & hebetudines. lapidis magnetis uisui drach. III. æruginis drach. I. minij Sinopli drach. III. ammoniaci thymiamatis drach. III. croci drac. II. Mellis quincuncem. Hoc etiam ad albugines facit. Aliud. Glauclum tūditio, cribrato, & modica aqua terito, & sufficienti pompholygis cinere addito, collyria formato. Et utere cum aqua bis per diem. Aliud. Aes ustum cum pueri incorrupti urina terito ac utitor. Aliud. Squamæ æris rubri, nitri rubri, punicis, clematis, singulorū dra. III. Terito ex aceto donec siccetur, & utere. Reponito autē in testaceo uase puro.

Chirurgia pterygiorum. Cap. LX.

Ad pterygij uero sublationē ita chirurgiam aggredi-

mur. Palpebras inter se disparamus, & hamulo circa medium pterygij transfixo, leuiter distendimus, ut ne cuticula corniformis tunica eleuetur. Simul enim sublata maximas inflammationes inducit. Deinde acum accipimus, quæ filū & pilum equinum transmissum habet, & hanc distēto per hamulū pterygio subiicimus. deinde deligatū per subiectū filū pterygium distendimus, filum leuiter sursum trahētes, & fili principij ministro industriē tenendū prebentes. Nos autē utraq; manu pilū tenentes, sursum ac deorsum ipsum cōmouemus, & pterygiū subexcoriamus, initio a nigro facto usq; ad angulū. Deinde cōtinuitate ipsius ad nigrū exoluta per pilum, & distenta per filum, scalpro ad pterygia destinato funditus auferimus pterygij partē iuxta angulum, palpebras & angulū cauētes. Quibus enim palpebræ simul inciduntur, his cōcretiones fiunt. Quibus autem funditus angulus resecatur, his naturalis eius loci carnis decrementum succedit. Si uero fundum pterygij fuerit relictum, regeneratur, si non pharmaco aliquo ex prædictis fuerit consumptum. Congruentis igitur modi coniecturam facere oportet. Quod si ægri formidolosi oculos aperire non fuerint ausi, hamulo supernæ palpebræ submisso, leniter ipsam extra distendimus, atque sic uelut dictum est operamur. Post detractionem uero, muriam acriorem oculo infundimus, deinde lanam ouo imbutam imponimus, & oculum deligamus. Sequenti deinde die soluimus, & moderato fomento adhibito, album ac tenerum Seueri collyrium infundimus. Quarta uero collyrijs ad affectiones commodis utimur, de cætero uitantes tenera & incarnantia collyria. Sunt autem ad affectiones commoda, nardina & theodotia, & omnia ex uino sientia collyria.

De carnis in angulo magno incremento. Cap. LXI. Encanthidem uocant, quum magnus oculi angulus ad nasum auctus carne superexcreuit, id quod maxime in canibus contingit. Verum in hominibus redundat, qui in mari uersantur. Proinde si benignum fuerit hoc carnis incrementum, dolore uacat, & tenerum est ac laxum: Si uero malignum, durum erit & inæquale, & dolores punctorios inducet. Oportet autem benignum curare ac paruum pharmacis siccis, tum eo quod ex cadmia & chalcitide ad scabros angulos paratur, cum hoc ipso quod optimum est. Aluminis scissi, misyos torrefacti, atramenti sutorij, partes æquales. Hoc egregie consumit omne carnis angulorum incrementū. Utere etiam theodoto Seueri collyrio, sicco trito adhibito, & eo quod ad myocephala ex uino paratur.

Chirurgia incrementi carnis in angulo. Cap. LXII. At uero maius & malignū carnis in angulo incrementū, uolsella apprehensum resecare oportet. Si uero maior fuerit eminetia, acū duplex filum habentem transmittere ad fundum oportet, deinde filum cōstringere, & paruo interstitio facto, donec caro liuescat, scalpro auferre, & siccum scabiei destinatum adhibere: & hapsum lanæ aut cōduplicatum linteum superimponere. Postera uero die fomentum adhibere. Et post tertiam mellis usu curam absoluerē. Cauendum est autem ne unā cum carne præter naturam aucta, etiam ipsum angulū funditus tollamus, alioqui rhoeas, hoc est naturalis carnis in angulo decrementum succedet.

De sanguinis ex angulis eruptione. Cap. LXIII.
Fit & sanguinis ab angulis eruptio, maxime pueris, ob assiduos eiulatus ac distensiones aperitis circa palpebras uasis. Curadi autem sunt poscæ frigidaæ aut aquæ frigidaæ perfusione, tum super angulos, tum super caput facta. Infundendū etiā oul candidum per se, & cū aliquo collyrio ad tenues fluxiones conueniente. Utendum & infernarum partium deligatura & cibo crassefaciente. In perfectis autem ætati- bus cucurbita occipiti affigenda est cū scarificatione.

De concretionē palpebrarum ac contra-

ctione. Cap. LXIII.
Concreſcunt & agglutinātur palpebræ ad album aut nigrum in oculo, aut inter se, ulceratione prægressa. Quum igitur ad album concredo palpebrarum facta fuerit, & oculi motus impeditur, affectionē hanc Ancylosim uocāt, hoc est contractionem. Quæcunq; igitur cōcrectiones iuxta angulū factæ sunt utriusq; palpebræ, eas hamulis distentas dissecare oportet, & linamento indito disparare. Et postea uelut communia ulcera curare. Quæcunq; uero concrectiones factæ fuerint extremitatis palpebrarū ad oculi tuni- cas, eas cæco hamulo distendere oportet, & scalpro pterygiis destinato concretionem exoluere, deinde carnis incrementum sicco aliquo deprimere, & ære leuissimè trito palpebras sublinere, & oculum usq; ad perfectam curationem indeligratum sinere.

De pediculis palpebrarum. Cap. LXV.
Pediculi generantur in palpebris lati, parui, multi, ex ingluuie, & illuue ac mala diæta ortum habentes. Curado igitur adhibenda est primum, ut pediculi diligenter expurgentur. Deinde aqua marina tepida affundatur. Et postea subscriptū pharmacum loco adhibeatur. Aluminis scissi drachm. ii. staphidis syluestris obol. i. piperis obol. ii. æris uisti drachm. i. myrrhæ obol. duos, lapidis scissi obolos tres, mis- syos torrefacti drachm. i. terito ac utere sicco. Adhi- benda præterea sunt balnea, & caput discutientibus ac corroborantibus confricandum. Et exercendæ in- fernæ partes, & uictu boni succi utendum. Similis autē curado lēdibus quoq; palpebrarū adhibeatur.

De pilis pungentibus palpebrarum, & de duplici pilorum ordine, itemq; multiplici quam pha- langosim dicunt. Cap. LXVI.

Pilorum pungentium in palpebris exortum, Trichia- sim Græci uocant, quam sanè sub pilis naturalibus in palpebris aliq; exorti, & intro nuētes, tunicas pun- gūt, & oculorum fluxiones concitāt. Dicitur etiā trichiasis, quum ipsæ palpebræ laxatæ sunt, aut ipsa- rum extremitas intro nutat, ut pilī non facile appa- reant, nisi quis distendat ac disparet palpebras. Vo- cant autem medici palpebræ laxationem phalango- sim, aut casum. Pilorum uero subcretionem, dupli- cem pilorum ordinem, hoc est distichiasim. Fiunt autem hæ affectiones, & præsertim duplex ordo, ex multa humiditate. Qemadmodum enim in terra largitas aquarū plurimas herbas profert; sic etiā in palpebris, maxime ubi influentes humores mi- nime mordaces fuerint. Si enim id quod influit sal- sum fuerit, etiā naturales pilos reiiciet. Perfecta igitur pilorum pungentium curatio, est confutio pal- pebrarum sursum uersus. Quādoquidem uero ali- qui ob molliciem nō audent seipsos chirurgiæ sub- mittere, auxilium ferendum est ipsis quantum eius

fieri potest. Veteres itaque huiusmodi auxilla ad ipsos conscripserunt.

Pharmaca ut euulsi pili nō renascātur. Cap. LXVII.
Pungentes pilos euellito, & euerſa palpebra, sangui- nem ranarum recentem illinito, & frigeſieri ſini- to. Aut cimum sanguine ſimiliter utitor. Aut cha- mæleonem album urito, & cinerem sanguine rana- rum excipito. Et uſus tēpore ſaliua diluito, & præ- euulſis pilis loco illinito. Aliud. Succum Cheli- doniæ herbæ quæ etiā capnium dicitur, ſufficiente gummi excipito, ſiccato, ac parua collyria formato, & utitor uelut prædictum eſt. Aliud. Cochlearum carnes cum uiridium ranarum in harundinibus de- gendum sanguine, aut herinacel terreſtris cruore te- rito, & atramento ſcriptorio moderato adiecto ſic- cari ſinito. Et utere uelut dictum eſt, uitata pupilla. Aliud. Hirudines urito ac terito, & utitor aſidue pilis præeuulſis. Aliud. Intestina terræ in teſta ad cinerē exuſta, ac leuiſſimè trita, præeuulſis pilis in- ſpergito. Aliud. Lacertam in olla exurito, & ad ci- nerem tritum par pondus ſandarachæ adiecto, ac u- titor. Aliud bonum minimè moleſtum. Siliquas ſiccas non antiquas diffringito, & humorem qui in ipſarum cauitatibus uiſcoſior, modicus, ac melleus reperitur, ſpecilli nucleo exceptum, præeuulſis pilis loco illinito. Atque hoc aſidue facito. Summe au- tem facit, inquit Archigenes, herinacel terreſtris ſel, & ſanguis pari menſura, cum modico caſtorio. Ca- ſtorium itaq; leuiſſimè tritum sanguine ac felle ex- cipito, & uelut piſcium ſquamas formato. Utere au- tem ita ut pilos radicatus euellas, deinde ſquamam unam ſaliua ex ore ſeiuni dilutam euerſæ palpebræ illinas, & ad dimidium horæ in loco deſineas donec ſiccet. Dolore quidem afficiuntur ægri, ſed pili non amplius enaſcuntur. Aliud. Pſyllium & ca- cutæ ſemen, ac cedriam, pari portione uel ſperſitionis sanguine excipe, ac utere uelut dictū eſt, ne oculum contingas. Aliud. Linteum ex nauis uetus accipe, & in lucernam pro funiculo lucernario inde, & lu- cerna ex oleo cyprino impleta, fuliginem in æreo uaſe collige, ac utere pilos euellēs, & locum aſidue illinens. Et ſi renati fuerint, idem repetito. Aliud. Potamogitonis ſuccum & artemiſiæ ſuccum, æquis partibus adhibeto. Aliud. Fel uituli, & caſtorium, & gummi, æquis portionibus citra aquam conte- rito, efformato ac utitor, præeuulſis pilis illinens ter in die, & comperies ſucceſſum. Aliud. Porci ma- ſculi ſel, & adipem eiſdem, in fictile uas nouum den- ſiſſimum ac leuiſſimum mittito, & aceti acerrimi hemina quartam partem, & olei aleni tantundem affundito, & denſo linteo obligatum ad dies ſeptem ſinito, & poſtea diſfuſa in mortariū terito, & uelut unguentum excipito. Idem etiā in toto corpore probe facit. At uero alenum oleum, amygdalinum oleum eſſe dicitur.

Agglutinatoria pilorum. Cap. LXVIII.
Pilos in palpebris præter naturam introſum refrac- tos, glutinat maſtiche per ſpecillum calidum admo- ta, & ſic pilis ad proprium ordinem refractis. Bitu- men eodem modo. Glutinum ſimiliter. Cochleæ glutinoſitas acu excepta. Hieraci ſuccus. Medicamē torū agglutinatoriorū appellatorū liquor. Ammo- niacū thymiama. Compoſitum autem hoc. Reſinæ ſiccæ, picis ſiccæ, ſulphuris uiui, bituminis ſingulorū drach,

draç. ceræ drachmæ dimidium. Liquata reponito. Et usus tempore specillum igne feruifacito, & phar-
macum contingito, ac eo pilos reglutinato.

De futura palpebrarum sursum uersus. Cap. LXXIX.
Ad futuram palpebrarum sursum uersus faciendam, æger desideat ad sinistram chirurgi partem, humi-
lior ipso, ad splendidam lucem. Sunt autem ministri
duo probè periti adstātes, alter retrorsum, alter à la-
tere. Et chirurgus primū per collyrium, aut superfi-
ciarias scarificationes, notet sufficienter quantum in
palpebra redundat, & corrugatæ cutis refectionem,
ut neq; plus neq; minus quam oportet rescindatur.
Si enim latus resecta fuerit, æger lagophthalmus
euadit. Si uero angustius, rursus palpebra laxatur,
& pili similiter pungūt. Notetur etiam circa mediū
palpebræ iuxta extremitatē locus superficialis cesu-
ra. Post factā uero notationē, euerfa palpebra, sub-
sectionem intrinsecus facimus ultra pilos præter na-
turam exortos, quo ipsi ad naturales foras tendant.
Aliquando uero in ipsos pilos præter naturales, si
penitus insidi fuerint, subsectionē facimus, ut succe-
dens cicatrix ipsos rursus enasci prohibeat. Nihil
autem uetat etiā duas subsectiones facere, unā ultra
pilos præter naturam exortos, quo extremitatis pal-
pebræ fiat resiccatio. Alterā super ipsos præternatu-
rales pilos. Sit autem profundior subsectio. Adiu-
uat enim refractionē & palpebræ leuitatem: & ab
altero extremitatis siue marginis palpebræ termino
usq; ad alterū procedat. Deinde linteola parua dupli-
cata, figura triangulari imponantur, unū iuxta ma-
gnū angulū, alterum prope paruum. Super hæc
autē linteā minister qui retro adstat apices magnorū
digitorum firmet, & uno impetu palpebram disten-
dat, imprimēs digitum sub supercilio, quo æqualis
palpebræ tensio fiat. Signū autē sit tibi optimæ ten-
sionis palpebræ, quū media nota proprium seruari
locū, hoc est circa medium fuerit reperta. Post disten-
sionem uero, primū faciendā est obliqua & ad uerū
similitudinem sectio superficialis internē, ut ne ex
superna influēs sanguis chirurgiam impediāt. Sitq;
hæc sectio propinqua palpebræ extremitati. Deinde
de supernē luniformis sectio fiat. Initiū autē & ipsa
sumat ex internis à magni anguli loco, & delata ad
notam, rursus deorsum uergat ad parū angulū.
Sitq; etiā ipsa superficialior, ut ne musculi laedantur.
Deinde minister qui à latere stat, palpebram disten-
dat. Postea hamulus in circumscriptæ fasciolæ prin-
cipium transigatur, in sinistro oculo, ad parū an-
gulū, in dextro ad magnum. Distento autē hamu-
lo per sinistram manū, fasciola scalpro ad hanc rem
destinato subexcorietur, animaduersione habita ne
si profundior excoriatio fiat, musculi uulnerentur,
& incurabilem habeāt palpebræ laxitatem. Post cu-
tis autem excisionem, ad futuram sursum uersus ue-
niendum est. Et prima futura media fiat. Deinde u-
trinq; aliæ duæ, ut in totū quinq; fiant futuræ. Post
futuram, distēta palpebra propter uulnera, modera-
tum spleniū glutinosum futuris sub supercilio im-
pone. Super ipsas uero sectiones spleniola parua
glutinatoria & inflammationem arcentem uisum ha-
bentia imponantur. Postea lana ouo imbuta toti oculo
imponatur, ac deligetur. Quandoquidem uero
augetens & aeris ac salis fluxio illota, pilos natura-
les reijcit, & palpebræ marginem duram efficit: pi-

lis autem præter naturam subenatis etiam augmen-
tum præbet: difficilisq; sit in his palpebræ euerfio:
conuenit acum robustum filum habentem, per me-
diam marginem palpebræ trāsmittere, & filum sur-
sum trahere, atq; sic per specillum palpebrā pro ut
moris euertere, & sectionē, uelut dictum est, facere.

De futura palpebrarum deorsum uersus. Cap. LXX.
Quod si interna palpebra pilos pungentes produxe-
rit, futura deorsum uersus probatur. Et prius quoq;
in his sufficiens laxatæ superflue cutis resectio non
tetur. Nam & hic latiore fasciola excisa, euerfio con-
tingit: angustiore uero, inutilis est chirurgia. Post fa-
ctam notationem, linteā complicata uelut dictū est
angulis imponantur, & palpebra distendatur. Post-
ea minister digito malæ impresso, ipsam detrahat.
Fiat autem prima sectio luniformis inferior. Deinde
ad uerū similitudinem & obliqua appellata cir-
ca palpebræ marginem. Facienda est autem excoria-
tio, & futura, uelut antea dictum, & reliqua eodem
modo. Cæterum sola deorsum uersus futura con-
tenti sumus in interna palpebra, uisitata subsectione,
ut ne palpebræ euerfio contingat.

De euerfione palpebræ. Demosthenis. Cap. LXXI.
Palpebræ amplius euerri solēt, ulceratione prægressa,
& carne ipsarum superauicta. Aliquando etiam à du-
riore cicatrice palpebra contrahitur ac eueritur. Con-
tingit autē hoc magis circa internas palpebras. Cu-
randa uero sunt moderata carnis incrementa, arido
subiecto. Aeris uisti drachm. i. atramenti sutorij, mis-
syos tostī, chalcitidis tostæ, singulorum drachm. i.
Aliud. Aeris uisti drachm. viii. misyos torrefacti
drachm. ii. chalcitidis tostæ drachm. i. atramenti su-
torij drachm. i. Aliud. Ad inueteratas iam euerfio-
nes. Aeruginem in testa torrefactam terito, & per se
adhibeto. Aut plumbi uisti parem portionem am-
misceto.

*Chirurgia euerfionis palpebrarum. An-
tyli.*

Cap. LXXII.
Malora uero carnis incrementa scalpro auferre oportet,
deinde ære uisto trito contingere, aut aloë cum
manna thuris. Et sequenti die fomento adhibito simili-
liter curare. Tertia uero die post fomentum melle
utendum est usque ad perfectam curationem. Si ue-
ro maior fuerit euerfio, sic chirurgia faciendā est. Ex
interna palpebræ parte duæ sectiones fiant, literæ
Græcæ Λ, figuram habentes, ita ut angusta literæ Λ,
pars internē sit ad malam, lata uero supernē ad pal-
pebræ marginem. Deinde fasciola illa literæ Λ, fi-
guram referens excindatur, resecta simul etiam sub-
secta carne. Non est enim chartilaginosa interna pal-
pebra. Cutis tamen indiuisa seruanda est. Deinde
labia excisionis futura contrahenda. Sufficiet enim
una futura iuxta partes marginis palpebrarum fa-
cta. Sic enim incuruata & eleuata palpebra, ad in-
ternas partes reuertetur. Si uero cicatrix ex aliqua
causa extra palpebram facta, palpebram euerteris,
collenda quidem est, uelut dictum est, ex internis
partibus palpebræ fasciola illa literæ Λ, figuram re-
ferens, non profunda sectione facta, & labia sectio-
nis uelut dictum est, per futuram cōtrahenda. Post-
ea cicatrice forinsecus per hamum distenta, acum
duplex filum habentem, sub totius cicatricis car-
nosam molem transmittimus, à paruo angulo ini-
tium facientes, & ad magnum ipsam acum ducētes.

Deinde

Deinde acu sic posita, filum utriusque ipsius partibus subiungimus, & per ipsum totam carnosam cicatricis molem distendimus. Et sic ipsius excisionem facimus, tollentes simul cum carnosam mole, etiam infixam acui. Post chirurgiam autem, externam sectionem linamentis disparamus, & conduplicato linteo ex frigida aqua imposito, deligatione utimur usque ad tertiam, frigidam irrorantes, & linteum complicatum incumbere sinentes. Tertia vero die solvimus, & spogias ex aqua tepida adhibemus. Fomentum enim in his non conducit. Cauere enim oportet, ne forte glutinatio intrinsecus non succedat. Postquam uero exciderit suturae, corporibus glutinatis, de cetero impavidè fomentum adhibeatur, ad hoc ut etiam cicatrix tenuior fiat, & oculus mitigetur. Deinde repressura collyria palpebrae intrinsecus sublinantur. Externa uero sectio disparata seruetur, per omnem curationem mollioribus pharmacis adhibitis. Continget enim ex intrinseco cutis incremento, auxilium quoddam, ut palpebra intro uertatur. Si uero propter carnis in angulo magno incrementum, facta fuerit palpebrae eversio, exciso eo incremento, palpebra ad naturalem habitum reuertetur. Ceterum illud nosse conuenit, quod supernae palpebrae eversio curabilis est. Sed & illa quae ob infernae palpebrae resolutionem contingit, sanari non potest. Similiter & ea quae propter resectionem latioris fasciolae in futuris deorsum uersus contingit. Et quae ob latam cicatricem fit, ulceratione uidelicet praegressa, quemadmodum in carbunculis contingit.

De lagophthalmis. Demosthenis. Cap. LXXIII.
Lagophthalmi appellantur, in quibus superna palpebra reuulsa est, & apertus est oculus inter dormiendum, uelut in leporibus fieri solet. Contingit autem affectio aliquando ex futura sursum uersus, palpebra plus iusto reuulsa, ut oculum contingere non possit, aliquando ulceratione spontanea praegressa, uelut in carbunculis. Curandi uero sunt hi luniformi sectione in tota cicatrice facta, ut superior sectionis circumferentia sursum tendat, apices autem deorsum ad margines palpebrarum spectent. Postea rametis linteolorum sectio disparetur, & palpebra deorsum detrahatur, & aequalis naturali figurae fiat. At uero in conuulsis palpebris qua parte contrahuntur, istic sectio fiat, & palpebra similiter laxetur. Verum in curatione fugere oportet resiccata medicamenta, & aquam mulsam. Adhibendum est autem emplastrum tetrapharmacum, & succo foeni graeci perfundatur. Et in summa totus curationis ductus laxatorius ac impinguas in his assumatur.

De lippitudine dura. Demosthenis. Cap. LXXIII.
Lippitudo dura est, quum palpebrae duriores fuerint, & ipse oculus durior, & ad motum pigrior fuerit, dolescens ac rubicundus, & praesertim quum post surrectionem ex somno, palpebrae difficulter aperiri possunt, & nulla humiditas euacuatur, graues uero in angulis consistunt paruae, contortae, subaridae. Et quum ipsas palpebras euertere uolumus, non facile a nobis uerbi possunt, ob duriciam.

De lippitudine sicca. Cap. LXXV.
Lippitudo sicca est, quum subaridus factus fuerit oculus, & pruriginosus, & leniter dolens, citra duriciam palpebrarum.

De lippitudine scabra. Cap. LXXVI.
Lippitudo scabra est, quum anguli ulcerosi sunt, ac ru-

bicundi, & ualde pruriginosi, & palpebrae rubicundae, & lacrymae falsae ac nitrosae destillant.

Curatio lippitudinis durae, siccae, scabrae. Cap. LXXVII.
Praedictarum affectionum diligens cura habenda est. Neglectae enim suffusionum, glaucedinis, & lippitudinis diuturnae, ulcerationumque ac staphylomatum causa fiunt. Curanda itaque est lippitudo sicca, cum reliqua corporis cura, etiam per ea quae humiditatem ad oculos prouocant, qualia sunt sicca pharmaca postea describenda, stratiotica appellata, & collyrium diacentetum, ac similia. Dura uero lippitudo similiter curanda est, per pharmaca humiditatem excernere potentia, sublima Erasistrati liquida compositione ac similibus. Ad haec etiam mollendibus ac humectantibus utendum est, uelut calidae leniter temperatae prolutione. Et fomentum per spogias assidue adhibendum. Vitanda uero sunt pharmaca frigefacienda, meatus obstruentia, & agglutinatoria, & aquae frigidae affusio. Ex his enim oculus magis induratur. Si uero simul fuerit scabra ac dura lippitudo, (ex humorum enim acrimonia palpebrae indurari solent, ut anguli quidem erodantur & ulcerosi sint, oculus autem & palpebrae aegre moueantur & indurentur) in talibus praemisso spongiae fomente, primum per siccum ad scabritiem paratum medicamentum, anguli contingantur. Et moderato tempore interposito, rursus spogia fomentum adhibeatur, & pharmacum humiditatem detrahare potens sublinatur. Quale est Erasistrati liquidum, & collyrium stratioticum, & diacentetum. Est autem compositio siccis ad scabros angulos medicamenti haec. Chalcitidis crudae drach. v. cadmiae drach. v. Haec trita in ollam induntur, quae addito operculo, gypso oblinitur, & in uas acetum dilutum habens imponitur, ut olla forinsecus quidem madescat, non diffluat autem in ipsam humor, & finitur ad dies vii. Deinde siccatur in sole, ac teritur. Aliud. Philoxeni siccum, Achariston appellatum, (eod quod digna ipsi gratia referri non possit) ad corrosos angulos, & scabras affectiones, & lippitudines siccas. Cadmiae drach. ii. chalcitidis crudae drach. i. aloes obol. ii. aeruginis obol. ii. piperis grana x. florum rosarum drach. iii. Tritis utere. Aliud. Ad scabra lippitudinem. Cadmiae drach. i. aeris usti drach. i. spicae nardi drach. i. piperis torrefacti obol. ii. Terito cum aceto in sole, & siccato utere uelut probato. Aliud. Meneclis, ad corrosos angulos, facit ad delacrymationem. Spodij drach. iii. omphacii siccis drach. ii. spicae nardi obol. iii. piperis torrefacti grana xv. tritis utere. Aliud. Cadmiae sextantem, salis ammoniaci sextantem, solij malabathri sextantem, piperis unc. i. utere. Aliud. Facit & ad carnis in angulo decrementum. Costi quadrantem, aeris sextantem, fuliginis cedriae unc. i. misce ac utere. Aliud. Ad scabras lippitudines, sycofes, putredines, & carnem superexcrecentem, Cadmiae drach. iii. chalcitidis drach. vii. piperis grana quinquaginta, spicae nardi drach. i. Cadmiae & chalcitidem terito cum uino, & ubi siccata fuerint, nardum & piper leuissimè trita adijcito, & in puluillum reductis utitor. Aliud. Capitonis ad lippitudinem siccam, & corrosos angulos, ac oculos humectos, & palpebras ficosas. Cadmiam ad polentae magnitudinem confringimus, deinde melle Attico subacta in fictile uas mitimus, & operculo foramen habente imposito, eoque luto oblito, uas rectum inter prunas locamus,

locamus, ac uentilamus. Quum autem albidior factus fuerit uapor exhalans, sublatam ollam aperimus, & cadmiam uino uetere extinguimus. Deinde eius accipimus drach. viii. aeris uisti drach. viii. stibij drach. iiii. Et armenij si affuerit, drach. viii. & haec contusa ac cribrata, cum uino uelut collyrium terimus, & resiccatum tollimus ac urimur, per specilli nucleum sublimantes palpebras, mane ac uesper. Nos autem cadmiam, & reliqua omnia simul adipe uiperæ subacta torrefacimus, & postea uino extinctis siccatisq; ac tritis urimur. Aliud. Tomentum purpuræ ueræ drach. viii. cadmiae drach. x. aeris uisti drach. x. lapidis haematitæ drach. x. Omnia trita ac melle subacta, uelut praedictum est torreto, & extinctis uino, ac tritis & arefactis utitur. Aliud. Archigenis, ad omnia praedicta. Amurcam coctam terito cum melle, & utere. Utendum etiam collyrijs & siccis medicamentis, infra inter multi usus pharmaca describendis.

De defluio pilorum palpebrarum, quod uitium

& Madarosis, & Ptilosis, & Milphosis &

Græcis dicitur. Cap. lxxviii.

Madarosis & ptilosis extremitatis siue marginis palpebrarum affectiones sunt. Et Madarosis quidē, ipsum solum pilorum defluuū est, ex acri fluxione obortū. In ptilosi uero & crassescunt & callescunt hę partes, ut composita sit affectio ex madarosi & lippitudine dura. Quare etiam auxilia in hac similia sunt relatis ad illā. Optimum autē est ad ipsos pilos, siccum Philoxeni ad pruriginosos ac corrosos angulos. Facit & ad uisus hebetudinē. Cadmiae drachmas viii. salis ammoniaci drachmas ii. croci drach. ii. spicae nardi drach. ii. piperis albi drachmā i. utere. Aliud stibium muliebre, facit ad corrosos angulos, ac pilos. Stibij uisti & lacte muliebri extincti drachmas xiii. aloës, myrrhae, spicae nardi, singulorum drachm. ii. ordeï uisti leuissime triti drachmas iiii. utere sicco. Aliud. Ad ptilos & corrosas palpebras. Medullam bubulam ex anteriore dextro pede, cū fuligine terito ac utitur. fuliginem autem sic facito. Papyrū pro funiculo lucernario in lucernā inde, & oleo sesamino repletum accende, & supra lucernam leue testaceum aut æneum uasculum pone, eoq; fuliginē excipe, & paulatim per prunam collige, ipsaq; cū medulla trita utere. Facit etiam egregie uituli coagulū. Aliud Sosandri, ad milphoses, & inueteratas affectiones. Facit etiam ad carnis in angulo incrementū: Cadmiae, stibij, chalcidis crudæ, misyos crudī, singulorum drach. viii. Haec contusa & melle subacta torre uelut dictū est, deinde uino extinctis ac tritis, adijce spicae nardi drach. ii. croci torrefacti drach. ii. piperis drach. i. & simul contritis, utere. Cæterū simplicia ad ptilos, & corrosas palpebras facientia hæc sunt: Amurca cocta, lyciū indicum, armenium quo pictores utuntur: Nam cū aqua illitū consumit uisiosos humores, & pilos naturales auget: Rubigo ferri ad multos dies in sole trita, & cum uino ac myrrha in collyria redacta. Spodiū ceparū succo exceptum.

De abscessu in palpebris. Demosthenis. Cap. lxxix.

Abscessus in palpebris internos, apice ipsorum inciso, & humoris expressione, curare oportet. Deinde muria infundatur, & lana ouo imbuta imposita deligatur. Postera die fomentum adhibeatur, & mel sublinatur, & de cætero collyrium repressum instilletur.

Externos uero post sectionem & humoris euacuationem, impositis linteorum ramentis ex melle, & addita lana deligabimus. Quicunq; uero abscessus palpebrę chartilaginem corruerint, si quidē extrinsecus fuerint, eos possibile est ouo, ac melle purgatos, capitali sicco medicamēto incarnare. Si uero intrinsecus fuerint, euerfa palpebra, & nudata chartilaginis parte derasa, æs leuissime tritum adhibeatur, & supra palpebram ouum cū uino & rosaceo conuassatum imponatur. Postera die fomento adhibito, æs leuissime tritū inspergatur, & rursus supra palpebrā ouum ponatur. Tertia uero die mel palpebræ sublinatur. Et postea collyriū repressiuū adhibeatur.

De calculo palpebrarum.

Cap. lxxx.

Calculū in palpebris dicunt, quū euerfis palpebris, totis similia circa ipsas extiterint alba ac aspera, uariorū speciem præ se ferentia. Eorū curam facere oportet euerfis palpebris, & cute iuxta apicem tenui scalpello dissecta, ita ut per specilli concauitatē tumorem molis collectæ exscalpamus. Deinde æs uistū tritum adhibeamus. Et ouum cum uino & rosaceo in lana exceptum imponamus ac deligemus. Postera uero die, eadem curatio repetatur. Tertia mel sublinatur. At uero in totis forinsecus palpebris innascentibus, post dissectionem & scalpturam, splenium emplastrum tetrapharmaci imponito.

De grandine oculi.

Cap. lxxxi.

Grandine affici dicunt palpebras, quum euerfis ipsis rotundæ quædam eminentiæ pellucidæ gradini similes apparent, quibus dissectis humor euacuatur similis candido oui. Curatio autem faciēda est euerfis palpebris, & incisione per scalprium facta, ita ut humore excreto subiectū aridum pharmacum affricetur. Aeris uisti drachmas ii. squamæ aeris drachm. i. sandarachæ drachmā i. æruginis, salis ammoniaci, croci, singulorū drachmas iiii. myrrhę obulos duos, utere tritis. Flunt etiam aliquando extra palpebras grandines subduræ, fabis similes. Has si quis uiolentius contingat, dolores intentos inducit. Et quādoq; animi exolutionem. Has autem curare oportet cute iuxta apicem incisa, & scalptura per specillum concauum facta. Sanatur facile mellis & ramentorū ex linteis impositione, & fomentis. Si uero pharmacis ad grandines uti uelis, his utaris. Fici syluestris grossos coctos impone. Aut fici folia. Alia illud opima. Pollinis tritici quadrantem, sulphuris uiui unc. i. terito cum aqua, & formato pastillos, ac utitur. Faciunt & ea quæ ad ordeola descripta sunt.

De ordeolo siue præputiolo.

Cap. lxxxii.

Ordeolum aut præputiolum uocant, quum in palpebris forinsecus iuxta pilos maxime suppuratum quoddam tuberculum factum fuerit, figura ordeo simile. Facile uero curatur nuclei specilli calefacti fomento. Sed & ceræ albæ calidæ fomento id discuties. Aut de musca capite abiecto, reliquo corpore ordeolum confricat. Aut galbanum molitum modico intro addito impone. Aut cum cera emollita parum misyos crudī commollito, ac imposito. Faciunt & ficus siccae cum uino mulso coctæ, & cum modico galbano tritæ. Aut sagapenum cum aceto tritum illine. Facit etiam ad grandines. Fomentum uero loco adhibeatur per spongiam, & per panem calidum. Post humoris excretionem mel illinatur. Deinde collyria ulceribus commoda.

De gan

De ganglijs, atheromatibus, steatomatibus, & meliceridibus palpebrarum. Cap. LXXXIII.

Fiunt aliquibus extra palpebras etiam hæ affectiones. Curantur autem gangliaceraui & malagmati ad ganglia describendis, & aquæ calidæ affusione. Est enim nervi cōtortio ganglium. Melicerides autem, & parva steatomata, ac atheromata, curantur aliquando ustorio medicamento apici ipsorum imposito, donec incumbens cutis in profundum crustam accipiat. Deinde post crustæ casum, exscalpta tunica humorem continente per specilli concavitatem. Si vero tunica eximi non possit, per subiectum pharmacum erosivum cōsumatur. Sandarachæ drach. ii. arsenici drach. i. squamæ æris drachm. i. ueratri nigri drachm. i. elaterij drachm. ii. chartæ in cinerem exustæ drachm. ii. utere cum rosaceo. Magna vero chirurgiæ curantur, quemadmodum in reliquo corpore ex fundo ablata, una cum tunica humorem continente. Deinde labia cutis per suturam contracta curentur, uelut in futura palpebrarum sursum uersus fieri solet. Cauendum autem ne lata fasciola cutis in chirurgia auferatur, ut ne lagophthalmi fiant.

De uaricibus palpebrarum & malignis agnatis eminentijs. Cap. LXXXIII.

Varices in palpebris ne cures: Sunt enim maligni. Neque etiam agnatas eminentias in palpebris tumidas, dolentes & subrubras, & ad digitorum compressionē in seipsas se contrahētes. Sunt enim etiam hæ malignæ ac incurabiles.

De ægilope. Seueri.

Cap. LXXXV.

Ægilops abscessus est iuxta magnū angulum. Est autem affectio ægre curabilis, propter corporū tenuitatem subiecto osse corrupto. Ob situm autē uiciniam etiam ipsi oculo damnum infert aliquando, per naturale paruum iuxta angulū foramen. Incipiente itaque inflammatione, statim in prima die conandum est ut repellatur, ipso solo inflammato loco illito ex collyrio Antonino, aut alio quodā uehementer repellente, ac stupefaciente. Solet enim hæc illitio id quod confluxit dissipare. Si uero perseverarit inflammatio, tentandum est ut similiter uelut aliæ inflammationes curentur, per discussoria medicamēta, quæ citra mordacitatē agūt. Coafficitur enim oculus ex acribus, & in ipsa affecta parte inflammatio augetur. Nos autē in inflammationibus nōdum transmutatis, ex emplastro Barbari, aut Lænæ, aut Athenæ, aut ex salicibus, aut ex aceto & oleo parati usu, abscessū discutimus ac resiccamus. Asclepiades autē ad ægilopas pharmaca talia conscripsit. Succus illecebræ, quā quidam portulacā syluestrem uocant, aut semperuiuum paruum, succi solani, singulorū sexuncem, thuris drachm. viii. galbani sexuncem, mastiches quadrantem, thus tritum cū succis coquito & ubi dissolutum fuerit, galbanum præmollitum adijcito. Mastichen enim improbamus. Aliud. Thuris drach. viii. myrrhæ drach. viii. ladani drach. i. ceræ drach. viii. aluminis scissi drach. iiii. spumæ nitri drach. iiii. coaguli leporis drach. iiii. Tundito hoc pharmacum, & cum fece ungētis irini emollito. Si uero uictis discussorij medicamentis inflammatio suppurabitur, quam celerimē secare oportet, & humorem euacuare, ac subscrisptis uti. Bdelli, myrrhæ, ladani, spumæ nitri, colophonis, singulorū drach. iiii. ceræ drach. x. ungenti irini quantū satis est. Alij pro colophonia, oleū so-

lia trita habent. Et cum axungia ægilopi imponunt. Et sordes subalares oculum cū axungia eodem modo. Aut ueratri nigri radicem madefactam impone. Aut perdicium herbā pro cataplasmate adhibe. Aut farinam erui cū melle. Aut cinerem lignorum uitis aceto subactum impone. Aut staphidem syluestrem & ammoniacum thymiana cū melle impone. Aut alumen scissum cum terebinthina uelut splenium impone. Si uero ad angulū repserit, ad superficiem autē omnino non processerit, tunc scalpro ad uenę sectionē, aut pterygijs destinato, mediū anguli corpus diducere oportet, & bonam carnē ex profundo producere. Deinde ipsam enatā carnem resiccare. Id quod continget, si penitus non pinguiā loco adhibuerimus. Quare sanē in principio post apertionem lentacula cocta, aut malicorio cum melle utemur. Repurgato uero loco, & nascente iam carne, uittum leuissimē tritum, siccum inspergimus, & in eius usu perseveramus usque ad absolutam curationem. Est enim admirandum auxiliū, cuius efficacia satis expendi nō potest. Sed & alumen scissum leuissimē tritum, & modica terebinthina exceptū, ad emplastri formam, purgat & incarnat ac cicatricem tuā inducit. Oportet autem & in ulceris cavitatem de pharmaco indere, & forinsecus paruum splenium ex ipso imponere. Profecto nos hoc curationis ductu usi, alio auxilio ad recentes ægilopas non indigimus. At uero quæ ab antiquis ad hanc affectionem descripta sunt auxilia, huiusmodi sunt. Ægilopa curant, si non per profundū corruptum fuerit os, chamæmeli folia commansa imposita. Aut maluæ folia commansa cum sale impone. Post apertionem uero ipsa malua trita utere usque ad cicatricem inductam. Aut solanū maxime halicacabum, aut myrtum commansam impone. Aut cœnanthes, aut auriculæ muris folia. Facit & ægilopis frumentacei succus cum farina frumenti impositus. Et plantaginis folia manducata ac imposita. Thus item & columbinum sterus cōmiscantur ac imponuntur, & lapidescunt ac inhaerent usque ad inductā cicatricem. Aliud. Propolis, terebinthina & thus, paribus portionibus splenio illita adhibe. Facit & siccum pharmacū ex eruo cum melle. Aliud. Fel porci fumo resiccatū terito, ac exulcerato ægilopi imposito. Aliud. Thus tritū pice liquidæ excipe, & emplastri forma impone. Incipientes enim ægilopas hoc pharmacum dissipat. Iam uero ruptos sanat, ulceri inditum, & superimpositū. Aliud ad ægilopas experientia cognitum. Itemque ad strumas. Radicē lilij recentē ad emplastri formā terito, & imposito. Rumpit enim, & repurgat, & usque ad perfectā curationē cicatrice includit.

De uestione Ægilopis.

Cap. LXXXVI.

At in quibus affectio diuturna os corrumpit, aut ad angulum in fistulā abiit, cicatrice superficiel inducta, in his triangulari incubentis carnis detractione facta & angusta sectionis parte ad angulū adaptata, & deinde spōgia oculo imposita, cauteria ignita ipsi sectioni adhibemus, usque ad os ad squamæ remotionē inuertes, ita ut etiā obliquas in ulceris cavitare partes, & maxime supernas inuram. Si enim post primū cauteri admotionē spectaueris, apparebit tibi angustissima cauernula, quæ supernè ex obliquis humorē ulceri trāsmittit, uelut lacrymā. Quare oportet cauteriū cauernulæ foriter apprimere. Et ubi sufficiens facta fuerit

fuerit ustio, lenticulam coctam cum melle adhibere. Elapsa uero crusta, & ulcere aliquo modo purgato, alumen scissum tritū terebinthina liquida exceptum modica, ut emplastri forma fiat, cavitati ulceris indimus, & splenium ex eodē factum, supra ulceris cavitatē imponimus. Celerrimē enim repurgat, incarnat, & cicatricem inducit. Probē etiam incarnat ustrum leuissimē tritū inspersum. Vtere, & probabis.

De anchilope. Cap. LXXXVII.

Circa predictum locū ubi ægilops sit, colligitur etiam lentus humor melleus aut pulraceus, plerūq; in tunica contentus, dolorem nō inducēs, paulatimq; auget. Curatur autem chirurgia, quemadmodum etiam reliqua circa corpus atheromata, ita ut superficies dissecetur, & subexcorietur, & tunica humorē condnens funditus tollatur. Post sublationē autem ipsius, quo securā curatio fiat, & affectio non regeneretur, cauteriis ignitis crustas loco inurimus. Et deinde lenticula cum melle curamus. Elapsa uero crusta, alumine cum terebinthina, uelut antea dictū est, usque ad cicatricem inductam.

De carnis in angulo magno decremento. Cap. LXXXVIII.

Carnis in angulo oculi magno imminutio ac decrementum sit, quū exulceratione, aut pterigij, aut incrementi carnis ablatione, totus angulus funditus fuerit sublatus, & allabentem lacrymā continere nō poterit, sed ad malas defluit. Contingit hoc etiam aliquādo ex male curatis ægilops. Et uocatur hoc uitiū Græcis Rhoas. Dicuntur autē etiam Rhoades, qui ob assiduas fluxiones oculorum, semper lacrymantur. Curandi uero sunt illi quibus angulus funditus sublatus est, adhibito pharmaco locos densare potente ac consolidare, quale est quod tephurū dicitur. Si uero callus fuerit, præiricare oportet per aliud quod acrius medicamentum. Sed & chirurgia utendum est. Collū enim fascia circumdata cōstringitur, & uas circa nasum notatur. Deinde uas illud scalpro biangulari dissecatur. Deinde spōgia oculo imposita, cauteriū loco apprimitur, non usq; ad os, sed ut cutis & sectio solum flammam sentiat. Sic autem cauterium triangulare. Postea lenticula cū melle adhibetur. Vbi uero pura facta sunt ulcera, oculus disparatus seruetur, donec angulus carne purā fuerit repletus, ut ne concretio fiat. Probē facit in ipsis etiā alumen cum terebinthina. At uero oculos præ diuturna lippitudine flētes, aut humectos, curare oportet præ omnibus aquæ potu, & parco cibo, exercitijsq; ac deambulationibus, & capitis frictione ac rasura, & frigida perfusione. Est & diæta optimi succi ac incrassante utendū, & oculi sublinendi ex medicamentis meatibus obstruentibus, frigefacientibusq; ac adstringentibus. Post aggressionē uero frigida aqua & posca oculi proluatur. Optimū autem pharmacū ad hos experimento cōstans hoc est: Plantaginis folia exuccato & excolato, ipsumq; succum in fictili nouo ad solem exponito, & linteo tenui puro ueluto, quotidieq; agitato, & resiccatum tritum reponito, & pro collyrio sicco utitor. Stibij ad anguli magni decrementum Alexandri regis ualde bonū. Facit etiam ad pilosim palpebrarum. Terræ ampelididis, croci, nardi celticæ, æquales portiones tufas melle subigito, & in ollam missa, addito operculo foramen habente, eoq; oblito, prunis imponito, & non uenulato. Quum autem non amplius caliginosus

uapor per foramina exhalaret, ab igne tollito ac frigeri finito. Deinde tufa, cribrata, ac trita in tenuissimum puluillum pro stibio adhibeto. Aliud. Stibium ad Rhoeadas. Aeris usti sesquiunciam, stibij sesquiunciam, croci unciam i. spicæ nardi unciam i. folij malabathri trientē, rosarum uiridum sesquiunciam. Reliqua leuissimē terito. Deinde rosas per se bene leuigatas aridis unito, & simul tritis donec siccetur utitor. Aliud stibium, multa experientia cognitum. Aeris, cadmiæ, stibij, singulorum sextantem, piperis grana xiiii. chareophylli unc. i. spongiarum nouarum quadrantem, mellis quantum satis est. Aes, cadmiam, stibium, tufa sufficiente melle subigito. Deinde ipsa spongia excepta in ollam mitrito, oblito, urito. Et ad cinerem exactissimē tritū piper & chareophyllū adijce, & tufis, cribratis rursus exactissimē tritis utere.

De his qui tempora inurunt. Cap. LXXXIX. Quidam barbaris legibus seruientes, in diuturnis oculorū fluxionibus, tempora inurūt, aut per pharmacum, aut per medullā lignorū nucis iuglādis, quod hyscas appellant. Quidā etiā ferrum candefaciūt, & uestionē perficiunt. Ego itaq; eiusmodi affectionem ex temporū actione cōflatam uidi. Hi enim immodeste pharmaco usi, & uestione usq; ad profundum facta, unā cū alienis humoribus, etiā naturales consumpserunt, & ad extremā siccitatem oculum deduxerūt, & nō intelligebant se morbū incurabilē præparare. Quid enim aliud contingere poterat, quam quod hic contigit. Primum dolor molestus, & immodicus ardor. Quū igitur tentassemus per collyria obtundere dolores, amplius ægrū grauauimus. Liquidum enim collyriū oculo illitum, uelut arenulas quasdam producit, ab immodica caliditate torrefactum. Et quū rursus per ouū mitigare uellemus, rursus per caliditatem etiam ipsum crassefactū est, & uelut ad membranas quasdam redactū, quæ ægre ab oculis secedebāt. Sed & lacte usi sumus, & ipsum similiter inspissabatur, & in summa, uelut ab igne humores coacti inspissabantur. Proinde multo labore insumpto, quū foenigræci succū instillassemus, moderate dolorē mitigauimus. Nam & hic à morbo superabatur. Postea uero rationē ducē sequuti, ad rosacei usum deuenimus, tepesfaciētes hoc ac infundētes, ut etiam æger nobis absentibus, ipsius solius usu ab accedentibus alleuaretur. Quin & ad alia multa utile nobis uisum est rosaceum ad oculos. Si enim ex natura siccitas affuerit, ut ægre mobilis & penitus lacrymarum exors sit oculus, etiam his commodum est pro collyrio sublitum.

De arteriarum sectione. Seueri. Cap. xc. In chirurgijs circa caput & frontem, unus generalissimus nobis scopus est, ut ægrū à fluxionis affectione liberemus. Verū priuatas & uelut particulares aggressiones facimus, propter uires, propter accidētia, propter locos, propter materiæ fluxionum qualitatem. Quum igitur arteriarum genus unum sit, loci uero diuersi, nūc de posterioribus expendemus. Hæ enim uelut principia quædam earū sunt, quæ circa superficiem capitis existunt. Cōuenit igitur in magnis doloribus, cario, staphylomatis & prolapsibus, arterias in posterioribus capitis partibus secare. Statim enim utilitatem inde percipiunt ægri. Præradendi autē sunt loci, & sic pulsus exacte per tactū notandus

notandus, & spatium dimetiendum ab auribus triū digitorum, ad caluam posteriorem appellatā. Conuenit autem secare non obliquē, sed trāuersim, usq; ad os, & membranā caluam ambientem exactissimē radere, & sanguinis excretionem usque ad anīmi deliquium expectare, in quibus uidelicet ulres robustæ sunt, & dolor uehēmēs. Sic enim soples accidens symptoma. Deinde cuneolum sectioni parem indimus, & linamēta conuulsa plurimo cuneolo imponimus, & lanæ hapso posca imbuta pro linamentorū custode utimur. Deinde ligamento utimur sufficienter adstringentes, & ad frontem ambo principia ducentes ac deligantes. Postera die uino & oleo ligamentū rigamus, & non soluimus. Tertia die soluimus, & uibices moderatē proluimus, & os deradimus. Et postea quoq; ossis rasura utimur, & hoc facimus, usq; ad quatuor, aut quinque dies, donec os sanguinē emiserit. Hoc enim signū est sufficientis rasuræ. Cæterum medicamētis, quæ linamētis illinuntur, utendū est in his, ex pumice et cera ac oleo paratis. Et postea cephalico sicco appellato ex eruo utendū est. Sed & id quod a nobis præparatur, unice ad hos facit. Statim enim post ossis rasurā impōitū, carnē producit. Accipit autē farinæ triticeæ tenuissimæ par. ii. colophoniz liquidissimæ partē i. Hoc ubi siccū inspersum est linamētis & splenō, custos linamēti adhibēdus est ex aliquo pharmaco è cerulsa parato. Nā & ad cicatricem inducendā confert.

De caluariæ circuncisione. Cap. xcj. Sed & caluariæ circuncisionem, periscyphismū Græcis dictū, assumimus, in quibus diuturna & tenuis oculorū fluxio existit, & multa uasa fluxionem delegantia. Oportet igitur rasos locos notare, ut ne in coronalem futurā, aut tēporū musculos, sectio fiat. Facienda autē est sectio paululum supra frōtem trāuersa initio à tempore ad tēpus facta, ita ut mēbrana caluā ambiens simul dissecetur, & diligenter radatur. Deinde cuneolis sectioni inditis linamēta adhibemus, & reliqua consequēter facimus, uelut prædictum est in arteriarū sectione, assumpta ex uino, & oleo irrigatione. A tertio die curatio suppuratoria fiat. Deinde ea quæ resiccationem promittit. Si quidē igitur à solo sincipite oculi fluxione infestatur, prædicta sectione contenti sumus. Si uero una cum supernis uasis, etiā ex temporibus fluxio feratur, post factam relatam supernam sectionem, alias duas luniformes assumimus, unam ab utraq; parte. Habeat autē principium, tum ea quæ à dextris fit, tū quæ à sinistris, à principijs trāuersæ sectionis superne factæ, ita ut ex supernis ad tempora deferantur, usq; ad mediū frontis. Procedant autē luniformiter ad supercilia cōuersæ, ut ne temporū musculos iniuria afficiant. Sit autē figura trium harū sectionum similis literæ Græcæ τ, ita tamen ut apices ad internas partes incuruatos habeat hoc modo (). Oportebit autem & hic cuneolos sectionis indere, & cōsequētia facere, uelut antea dictum est: Porro dicunt Aethiopas à natiuitate frontem circuncidere, ut ne oculorum fluxione infestentur.

De frontis per submissum scalpellum exco-

riatione. Cap. xcii.

Frontis per submissum scapellū exco-riationem, hypospatismum Græcis appellatū, assumūt qui deformitatem cicatricis maximæ per circulum fientis in

frontis circuncisione, deuitant. Verum hæc curatio imperfectior illa est. Vnde magis frontis circuncisione periscyphismo appellato utendū est, ita ut rei magis necessariæ curam habeamus.

De uasorum sectione.

Cap. xciii.

Vasorum sectionē assumimus uno oculo affecto, & in oculorū perpetuis lacrymis, & in hemicrania. Assumimus autē in his, quibus manifesta & eleuata sunt in fronte uasa. Vas uero atramēto notamus, & summis utriusq; manus digitis, frontis cutem ab utraq; notæ parte eleuamus, & superficialiam sectionem in ipsam notam, ex directo uasis facimus. Et rursus paulatim subiacentes cuti membranas dissecamus, donec nudum uas apparuerit. Atq; sic hamulis duobus trāfixis labia sectionis eleuamus, & paulatim per scalprum subradentes, uas à circumscitis mēbranis liberamus. Et cæco hamulo subiecto, uas ex profundo attollimus, & ita eleuato acum duplex filum habentem submittimus, & mox ablata acu filū dimittimus. Idē etiā in altero uasis termino facimus. Et postea uas perpungimus, & euacuationē fieri sinimus. Sufficienti uero sanguine euacuato, utrosq; terminos uasis, per subiecta iā fila deligamus, & medium ipsius refecamus; atq; ita linamentis inditis, & hapso lanæ ex aqua frigida imposito, deligationē utemur. Postera die uino & oleo irrigamus. Tertia uero exoluimus, & moderata pfusione facta linamēta ex aqua mulsa indim⁹, donec exciderint fila. Et usq; ad perfectam incarnationē eadem utimur. Est enim bonum auxilium. At uero cicatricis inductionem per emplastrum melinum facimus, aut per id quod ex cadmia paratur. Leonides porrò, soleo, inquit, ubi mixta est fluxio, & à fronte, & à musculis temporum, iuxta paruos oculorum angulos tēporibus uicinos, supra fines supercilliorum, crustas inurere per cauteris nucleoformes, id uehementer cauens, ut ne temporum musculos contingam. At in fluxionibus à sincipite, constringo collum, & uasa in fronte magis eleuata noto, & hæc ipsa prærafis pilis inuro. Illitio ualde celebris ad diurnas fluxiones. Viperarum capita in olla probe exurito, & cinerē cum lupinorum amarorum decocto tritum temporibus illinito. Et miraberis de medicamēti efficacia.

De musculorum temporum cataplasmatibus, agglu-

tinatorijs, ac illitionibus. Seueri. Cap. xciiii.

Quandoquidem fluxiones ad oculos ex superincumbentibus locis suppeditantur: Nam hemicranæ, & caries, & fluxiones capitis, dolores oculorū augēt: operæpreclum esse puto etiam ad hos pauca auxilia referre. Utendum igitur est agglutinatorijs & illitionibus, uelut dictum est, in his quibus oculi fluxione infestantur, & in quibus uasa circa frontem ac tempora eleuata distenduntur. Nā si influxio non ex uasis circa frontem, & tēpora, ac palpebras contingit, sed ex profundius sitis agglutinationes & illitiones magis lædunt. Insuper autē si citra inflammationē fluxiones oculorū fiunt, agglutinatoria ipsas cohibent. Si uero inflammatio affuerit, humores ex circumscitis locis ad inflammatos impulsos, per compressionem magis distendent. Itaq; agglutinatoria ex similagine & ouis ac thure composita utiāda sunt. Resiccata enim distendūt uasa, & fluxiones augent. Quæ uero mollia permanent, aut distensionē non efficiunt, & tum frigiditate, tum adstrictione

uasa

uasa deprimunt, his utendū est. Si igitur calida fuerit intemperies quę lædit, Crocum, opium, myrrhā, thus, ex aqua trita, & ad strigmentitiam spissitudinem redacta illinimus, & statim Inducto somno, dolorem depellimus. Idē præstant & fluuiatiles strigiotæ cum aloë contriti. Sed & polygonum cū mastiche tritum ac illitum, dolorem mitigat. Et mādragoræ cortex cū thure mirificē facit. Et mastiche cū succo brassicæ illotæ trita mirificē relinquit. Item fabrorum fuligo, quam uulcaniam appellant, leniter cum ouo subacta. Et calx uiua cum ouo in frigidis intemperiebus. Et hirundinum stercus cum mastiche & oui candido.

Totius capitis illitiones Seueri. Cap. xcv.

Totum caput intemperie calida affectum, acacia cum uino trita illinendum est. Nā acetum in huiusmodi capitis illitiōibus uitare oportet. Facit & samia terra cum plantaginis aut solani succo trita. Si uero frigidior fuerit causa, ut æger clarē frigiditatem in capite sentiat, & lacrymas frigidas deferri, contraria calidæ affectioni auxilia adhibenda sunt. Nasturtio enim cum ouo trito multum profecimus. Et per erucæ semen cum aceto tritum idem effecimus. Sed & thapsia cum sinapi aceto trita, magnopere prodest. Et cochleæ Africane cum thure ex aceto tritæ, multā fluxionis illationem relidunt ac excindunt. Et hirundinū nidus cum stercore in ipso reperto, acetō subactus graues dimidiū capitis dolores sanat. Et euphorbium cum aceto tritū. Vtere etiā smegmatis & puluillis inspersilibus, supra ad diuturnum capitis dolorem descriptis.

Cataplasmata oculorum lippientium, Dioscoridis.

Cap. xcvi.

Cataplasmatibus uice imposita mitigant oculorum inflammationes, folia rubi aut auriculæ muris, aut tribuli uiridis, aut portulacæ, aut semperui, aut polygoni, aut intybi, aut coriandri, aut eupressi. Aut hyoscyami folia irita. Aut cucurbitæ ramēta. Aut peponis caro, aut calicum papaueris decoctum affusum. Aut ipsi calices cocti triti impositi. Commodus est etiam panis aqua madidus tritus cū modico rosaceo impositus. Et ouum cū rosaceo ac uino conuassatum, & hapso lanæ exceptū ac impositū. Aut ouorū assatorū uel coctorū uittellos, cū modico croco, & opio phaseoli magnitudine, ex sapa tere ac impone. Aliud Asclepiadæ, ad maximos humorum influxus ac dolores. Rosarum siccarum drach. i. opij drach. i. croci drach. i. efforma in pastillos cū passo, in quo melilotum coctū est. Et usus tempore ex ipsis terito cum passo, & ammixto pane imposito.

Aliud ad maximos dolores ac uigilias. Psyllij semine in feruente aqua coiectū, paululum sinito. Et ubi dissolutū fuerit, conuassato, ut emplastri formā acquirat, & ex eo oculū integito. Suauē enim somnū inducit. Aliud Demosthenis, ad dolores & prolapsum oculorum, egregiē facit. Calices papaueris in aqua mulla coquito, & ipsos quidē expressos abijcito, aquā mullam autē triticeo, aut ordeaceo polline ammixto imposito, modico etiam rosaceo adiecto. Aut polentę florē p polline, aut panē purā accipito. Cæterum cataplasmata omnino tēpora comprehendant, & supercilia cū frōte. Solam autē supernam palpebrā cataplasmate integimus, infernā non comprimētes, quo aperiri oculus possit, & lacry-

mam illatam excernere. Assidue uero permutentur, & maxime æstate, ut ne feruēfacta exacerbent. Ad contactum autem summē tepida apponantur, hyeme uero leniter calida.

Illitiones oculorum. Cap. xcvii.

In uehemētibus doloribus palpebras forinsecus illinere oportet, maxime quidem collyrio Nili ex rosīs, aut aliquo dolore eximēte ex croco parato, aut croco trito cum modico papaueris succo, affuso lacte aut hyoscyami succo. Aliā illitiō Asclepiadæ, ad doloris uexationes. Aloës, lycij Indici, rosarū uiridū, croci, opij, myrrhæ singulorum æquales portiones terito cum uino, & formato pastillos, ac siccato in umbra. Vsu uero expetente, passo dilue, & oculos ac tempora illine. Aliā illitiō repulsoria optima. Foliorum mali siccorum tusorum ac cribratorū lib. i. myrrhæ sextantē, glaucij sextantē, gummi sex uncē. Excipe aqua. Illitiō Asclepiadæ mordax, eue stiglo fluxionem cōpescēs. Facit & ad lippitudines scabras. Aeris uisti drach. iiii. croci drach. iiii. piperis drach. ii. opij drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Hæc forinsecus illita maximos humorū illapsum relidit. Verum uitare oportet ne quid de pharmaco in oculum præterlabatur. Aliud phloginū in scriptū linimentū. Aeris uisti ac loti drach. x. croci drach. v. piperis drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. opij drach. iiii. gummi drach. xii. Terito cum uino ueteri odorato adstringente. Aliā illitiō ex sandyce, ad perfrigerationes & resolutiones palpebrarum, quales cōtingunt & in his qui canino more conuelluntur. Facit etiā ad acuendum uisum ante balneum illita. Sandicis drachm. xiiii. crocomagmatis drach. vi. piperis drachm. iiii. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliqui adijciunt etiam opobalsami drach. iiii. & illinunt ad hebetudinem uisus.

De aridis collyrijs, Galeni. Cap. xcviij.

Ex aridis pharmacis quedā affectionē in oculis cōgrogari prohibent, humorū uidelicet influxiones impediētia, ex quibus oculi affligi solent. Præstantissimum autem ex his apparuit, & experientia iudicatum est, quod ego composui, inquit Galenus, & ob id apud multos in usu est, ac ferē per omnes gentes, quibus Romani imperant. Ac primū sanē ipsius cōpositionē scribā, quum præstātius esse putem, nullis omnino affectionibus corripī, quā eas quæ iam præoccuparunt sanare. Vtilissimū autē est sanis oculis pharmacū. Vritur lapis phrygius in sabaceas magnitudines contractus. Eum uero in ollam nouam missum, deinde forinsecus luto oblita olla, addito operculo foramen habente, eoq; oblito, ollam prunis imponimus. Quū autē lapis ignitus factus fuerit, tunc iā ollam in aliud uas purum euacuare oportet, & recenti butyro extinguere. Facta autem extinctione, rursus in eandem ollam missum, prunis adhibemus, ac uentilamus. Ignito uero lapide, ubi purum uaporem efferri uiderimus, rursus euacuatum extinguimus uino ueteri fuluo odorato. Deinde rursus missum in ollam lapidem, tertio urimus, & rursus extinguimus melle Attico non multo. Postremum autem melle extinguitur, ut mellis qualitas in lapide permaneat. Cæterum diebus trita ac præleuigata in promptu habere oportet, ita ut in reuissimū puluē redacta sint subscripta. Aeris uisti unc. i. piperis albi unc. i. folij malabathri unc. i. stibij

bñ drach. xii. His ammisce lapidis usti, tusi, cribra-
ti ac triti lib. i. Et postquam omnia simul probe fue-
rint unita, & reponere medicamentum uoles, adñce
opobalsami primarij drach. xii. Sit autem opobal-
samum tenue, & pellucens compage, non crassum.
Impedit enim crassitudo, ne siccum pharmacū eua-
dat. Utendum autem est ipso ad palpebras solas, in-
ducto specillo citra tunicarum oculi contactum. Ius
bēdusq; est homo cui hoc sublinitur, palpebras aper-
tas habere. Hoc itaq; à me compositum est, non per-
mittens hominem qui ipso recte utatur, oculorum
lippitudine apprehendi. Stibium ornandis palpe-
bris præseruatuum, pueris maxime commodum.
Stibij drach. xvi. plūbi usti ac loti drach. viii. Squa-
mæ æris drach. i. croci drach. i. florum rosarum, myr-
rhæ, spicæ nardi, thuris, piperis, singulorū drach. i.
palmularū ossa decē. Omnia in fictile uas cōlecta di-
ligenter torrefacito, deinde tuis ac tritis opobalsa-
mi primarij cōpage tenuioris cochlearia duo adñci-
to: Et tritis ac siccatis utitor. Aliud Seueri, facit ad
oculorū & palpebrarum pulchritudinē. Stibij qua-
drantem, purpuræ ueræ ustæ sextantem, spicæ nardi
unc. i. Vtere. Stibium ornans palpebras. Stibij
usti & loti drach. viii. ossium palmularū ustorum
drach. viii. atramenti sutorij drach. ii. nardi celticę
drach. ii. Vtere, cōstat experimēto. Aliud, faciens
ad decorē, angulos rarefactos ac humectos modera-
tē reliccās. Cornu ceruini usti, purpuræ ustæ, singu-
lorū drach. iii. folij scylmatis unc. i. Vtere. Stibiū
optimū ad tenuē fluxū, & corrosos angulos. Nutrit
hoc etiā oculos debilitatos, in multis affectionibus
cōprobatū, & mirifice omnibus se opponens. Facit
etiā ad ornatū. Inductū enim multo tēpore in angu-
lis permanet. Habet aut hoc modo. Carnis purpuræ
torrefactæ drach. iiii. succi anemones drach. vi. sti-
bi usti & uino extincti drach. iii. succi baccarū sam-
buci drach. iii. spinæ ægyptiæ drach. ii. ordeī usti
drach. ii. gallarum nigrarum drach. ii. acaciæ drach.
ii. mororū rubi aridorū ruforum drach. iii. costi tu-
si drach. iii. folij tusi drach. iiii. Singula seorsim ter-
rito, & simul in uase plumbeo reposito, ac utitor.
Aridū Danai, quod uelut res sacra in regia urbe uē-
ditū est numismatis cxx. & cū multo labore ab eo
impetratum. Præseruat ab omni lippitudine, palpe-
bris inductū. Aeris usti unc. i. unguis siue onychas
aromaticos ustos magnos tres, piperis grana xxxi.
ordeī usti grana xxxi. palmularū ossa usta ix. æreas
muscas xxxi. folij scrup. ix. sanguinis draconij scrup.
iiii. Aes accipe quod ab æris uasis dederaditur, &
in fictile uas missum, ac prunis impositū, ad triduū
ure, ita ut quotidie ter ipsum urina pueri incorrupti
extinguas, & postremū aqua dulci. Aereas aut mus-
cas accipe ex locis ubi boues degunt, aut si ibi nō re-
perias, ex mortuis animalibus. Aliud palpebras
ornans, pharmacū quod prosperē accōmodatur. Fa-
cit & ad diurnas lippitūdines. Stibij usti & ui-
no extincti drach. iii. plūbi usti ac loti drach. viii.
fuliginis thuris, spicæ nardi, myrrhæ tostæ, croci to-
sti, squamæ æris, singulorum drach. i. Tritis utere.
Aridum ad angulos calidiores & rubicūdos ac exas-
peratos: Seueri croci drach. iiii. cadmiæ lotæ drach.
ii. cerusæ drach. i. Aliud Seueriani, cerusæ bessem,
cadmiæ trientem, salis ammoniaci sextantem, piperis
sextantem, folij trientem. Aliud palpebras or-

nās, facit & ad lippitudinem siccā. Sanat etiā omnē
lippitudinē, post mitigatos dolores illitū. Aeris usti
leuissimē triti unc. i. cedriæ puræ trientē. Aes cū ce-
dria ad strigmētiā spissitudinē terito, & in arūdinē
mittito, & hanc obturatā forinsecus totā luto oblini-
to, & in clibano prunis obruito, & per diē ac noctē
finito: & exemptam terito, & collyrij Pelarij drach.
xxiiii. adñcito, & croci drach. ii. & folij scrupul. ii.
& utitor. Aliud siccū collyriū celebre, resiccans
multas fluxiones, & uisum acuēs. Optime quoq; at-
tenuat cicatrices. Aeruginis unc. i. cadmiæ unc. i. chal-
cididis unc. i. stibij unc. i. mellis mensurā congruam.
Omnia leuissimē trita, & melle subacta, in ollā mī-
tito, & addito operculo foramē habēte, oblinito, ac
urito donec tenuis uapor progrediatur. Deinde exē-
pto ac trito utere. Quod si ipsum paululū mordax
facere uolueris, post ustionem adñce piperis grana
xxv. Aliud aridū ualde bonū: Cadmiæ sextantē,
mellis sextantē, æris usti drach. iiii. salis ammoniaci
drach. ii. piperis drach. iiii. spicæ nardi drach. ii. Cad-
miā leuissimē tritam melle subige, ure, & uino auste-
ro extingue, & cum reliquis tere ac utere. Est dela-
crymatiuū. Facit & ad asperas palpebras. Aliud
siccū ad lacrymantes oculos, & eos qui à lōga lippī-
tudine nō probe sanati sunt. Est etiā præoccupatiuū.
Cadmię drach. viii. æris usti drach. viii. stibij drach.
iiii. Cadmiā cū ære in frusta crassiora contusam,
& melle subactā in olla exurito, uelut antea dictum
est, & uino ueteri odorato extinguito, ac siccato. Et
deinde stibium per se ustum in olla ammisceto, &
tuis cribratis ac tenuissimē tritis utitor. Quidam e-
tiā armeniaci drach. duas ammiscent. Hoc siccū
pharmacū sæpe cū uino uelut collyrium cōtrui, &
siccato usus sum, inducēs ipsum palpebris mane &
uesperi. Aliquādo autē etiā stibij drach. octo inieci.

Aliud siccū crocū, procatalepticū, id est, præserua-
tiuū. Aloës, croci, glauci, sarcocollę, singulorū uncia
unā leuissimē tritis utere. Aliud, quo utor, & affe-
ctiones illino. Sistit fluxionē in una die, si dēse ac sæ-
pe illinatur. Facit etiā ad egilopas, & palpebras cor-
rosas, & pilos pungentes in palpebris, post euulsos
pilos, pilorum locis illitū. Sarcocollę, croci, glaucij
flauī, aloës, chelidonię, singul. unc. i. myrrhæ troglo-
dyticę drach. quatuor. Chelidoniā tusam cribratā re-
liquis adñce, & cōtritis utere. Ego cū aqua uelut col-
lyriū cōtero, & sicco utor. Aliud siccū collyriū ce-
lebre, uisum acuēs, inoffensos cōseruās oculos. Sti-
bij scrup. iiii. fuliginis purpuræ ueræ, rosarū sicca-
rū, singulorū scrup. ii. croci scrup. iii. folij scrup. iii.
spicæ nardi scrup. iii. Tritis uere. Fuliginē aut sic fa-
cito. Lanā purpuræ cedria tinctā incēde, & pelui le-
uissimo, aut græco uase cōtege, & cōflatā fuliginē pen-
na collige, ac utere. Aridū albū, uisum acuēs. Facit
ad pruritus, & ustiones ex sole, & lippitudines inci-
piētes ex frigiditate, ante & post cibum. Cadmiæ
drach. ii. salis ammoniaci drach. i. piperis drach. ii.
aluminis scissi drach. ii. folij drach. ii. cerusæ oboli
dimidium. Terito cum uino albo, & siccato utitor.

Aliud siccū acre. Cadmię drach. xxiiii. salis ammo-
niaci drach. ii. spicę nardi drach. i. piperis albi drach.
i. tritis utere. Aliud optimum. Cadmiæ drach.
viii. croci drach. ii. salis ammoniaci drach. ii. spicæ
nardi drach. i. piperis albi drach. vi. Tritis utere.
Aridū Seueriani, Cadmię ustæ & lotæ drach. viii.
salis

salis ammoniaci drach. ii. piperis albi drach. ii. folij drach. i. cōtusis, cribratis, ac probe tritis utere. Aliud aridū acre, Cadmiæ drach. viii. testarū sepiæ sextan-
tē, salis ammoniaci unc. i. piperis unc. i. folij unc. i. utere, constat experientia. Aliud aridum uisum acuens, Oribasij. Radicis chelidoniæ sextātem, aloës sextantem, folij unc. i. piperis decorticatī drach. iiii. ueratri albi drach. i. Vtere. Aridum Apolloniū ad uisus hebetudinē. Cadmiæ drach. viii. fecis uini ue-
teris siccae ustæ drach. v. piperis albi drach. v. salis ammoniaci drach. x. sandarachæ drach. ii. folij drach. ii. nitri usti drach. iiii. Aliud aridū ad suffusiones & hebetudines. Viperam masculam totam uiuā in ollam mittito, & succi foeniculi cyathum unum adij-
cito, & thuris non secti granum magnum addito. Deinde totam ollam forinsecus luto oblitam, urito donec in cinerem redigatur indita, teritoq; ac utitor hoc arido medicamento uelut celebri. Faciunt & uiperæ capita usta, trita, & inducta. Aliud. Incompara-
bile. Veratri albi & piperis æquas portiones tu-
sas ac tritas adhibe per triduum, purgatione prius per uentrem facta, & per os ac nares. Aridum ad incipientes suffusiones, glaucedines, & pellicularum crassitiem, Cadmiæ drach. x. sandarachæ drach. iiii. ueratri albi drach. ii. folij drach. ii. utere. Ego si aliquando opus habeo
arido collyrio ad præsentēs affectiones commodo, hoc trito & in leuissimum puluillum redacto utor. Aliud siccum acuens uisum, experientia cognitum. Cadmiæ drach. viii. folij drach. viii. spicæ nardi,
drach. ii. piperis, croci, auripigmenti, salis ammoniaci, chelidoniæ, singulorum drach. ii. artemisiæ, folij malabathri, singulorum drach. i. utere.

De liquidis collyrijs. Galeni. Cap. xcix.

Liquida ocularia medicamēta cōponuntur ex suc-
cis, & liquoribus, felleq; ac melle, & ammoniaco rhymiamate, ita ut ammiscantur ipsis etiam modera-
tiora quædā, uerum uiribus nō repugnāta, myrrha in quā, & thus, & crocus, & galbanū, & quæcunq;
alia huiusmodi, quæ tunicas rarefacere, & crassitu-
dinē humorū ac spiritus attenuare possunt, & humi-
ditatē præternaturalē discutere, & tunicis oculorum per suum temperamentū, robur præbere. Liquidū
acuens uisum. Succū ex malis punctis expressum, in uas fictile Atticū leuissimum ac densissimum mitti-
to, & tenui linteo obligatum ad solē exponito, do-
nec mellis crassitudinem acquirat, & parem mēsurā mellis ad succū adijcito, & fictili uase exceptū repo-
nito. Inueteratum enim melius euadit. Quum autē dormire uolueris, ex hoc leuiter oculos sublinito. Hoc pectoribus, & scriptoribus, & aurisuforibus ac
senibus cōuenit. Aliud. Ampullam uitreā oleo ex-
pleto, & iniectis foeniculi folijs teneris in solē expo-
nito ad dies quadraginta. Et expresso foeniculo, oleo
utitor. Aliud uisum acuens. Adipē uiperæ in ui-
treā ampullā mittito, & ubi liquatus fuerit, specil-
lū in eo tingito, ac illinito. Hoc ualde cōmodū est. Aliud uisum acuens, Colocynthis semen tusum,
cribratū, ac leuissime tritum cū melle adhibeto. Ex
perimento cōstat. Aliud ad uisum acuendū, & ad
suffusiones ac cicatrices oculorū. Chameleontis nigri
radicem ustā, ac leuissimē tritā illinito. Aliud. Inte-
stina terræ in testa ad cinerem exure, & cinere trito
cum melle utere. Ego hoc arido usus sum ad albugi-

nes. Aliud ad inchoantes suffusiones. Mel, oleum
uetus, & foeniculi succū, æquis portionibus misce ac
utere. Aliud. Sagapeni drach. ii. spumæ nitri drach.
v. mellis lib. ii. Aliud Demosthenis. Ego uero sub
scripto utor: Caucalidis succū, coronopodis succū,
chamædryos succum, æquis portionibus excolato,
siccato, collyria formato, ac utitor. Si uero liquido
uti uoles, cum melle tritis utere. Aglaide liquidū
ad principium suffusionis. Floris æris obol. v. piperis
obol. v. croci drach. ii. castorij drach. ii. fellis galli
drach. i. omphacij drach. iiii. & dimidiam, spicæ nar-
di obol. i. lapidis hæmatitæ obol. ii. spumæ nitri
obol. ii. floris salis drach. x. x. x. opobalsami drach.
x. x. x. mellis quincuncem. Omnia trita in argenteo
uase reponito. Erasistrati panchrestos liquida cō-
positio. Ad inflationes pruriginosas, & lippitudi-
nem scabram, aures purulentas, ulceras ægre recipiē-
tia cicatricem, cynāchen siue anginā, & ad nomas in
ore ac pudēdis. Aeris usti drach. ii. myrrhæ drach.
iii. misyos tosti drach. iiii. piperis drach. i. croci sesqui-
drachmam, uini austeri ueteris cochlearia. iiii. passi
cretici cochlearia ii. trita rursus terito cum uino, &
ubi id combiberint, passum adijcito, & unita in æreo
uase ad mollem ignem coquito, usq; ad mellis spissi-
tudinē, & in ænea pyxide reponito. Alia liquida
ex succo uerbenacæ. Facit ad hebetudinē uisus, pu-
pillæ debilitatē & obfuscationē, facit & ad corro-
sos angulos, ad tenuem fluxum, & inchoantes suffu-
siones. Fellis capræ drach. viii. mellis attici sexuncē,
lycij indicij drach. iiii. piperis drach. iiii. succi uerbe-
nacæ rectæ deuncem, & sicci succi drach. viii. piper-
tusum ac angustissimo cribro excretum, postea diu
in mortario terito, & sicco succo adiecto, simul teri-
to. Deinde etiā liquidum succū, & mox lyciū addi-
to. Et ubi leuigata fuerint, mel adijcito, & mox fel-
lipsum & unita excipe, ac utere. Quidā ipsam herbā,
uerbenacā dico, tūdunt ac cribrāt, & drach. viii. adij-
ciunt. Si uero siccus medicamentum euadat, colly-
rium efformato ac utitor. Siccum cassij, ad uisum
acuendū & ad glaucedines, antiquas lippitudines, ui-
sus hebetudines, ac obscuraciones. Fel taurinum totū
in æneā pyxidē euacuatum, ad dies x. sinito, dein-
de trita adijcito, croci, myrrhæ, opobalsami, singul.
drach. i. piperis grana x. mellis Attici duplum fel-
lis. Et omnia simul trita in uas æneum inijcito, &
ad mollē cinerē ad mellis spissitudinem coquito, &
in ænea pyxide reponito, ac utitor uelut bono. Sim-
ul enim ut illitum est, efficaciam suam declarabit. Alia liquida Bolæ inscripta, ad suffusiones. Fellis fe-
lis partem unam, mellis Attici duplum, succi hiera-
cij parem mellis mensuram, misce & utere. Alia
ad suffusiones celebris. Fellis coruorum recen-
tium trientem, sagapeni persici drach. i. succi cyrenia-
ci unc. i. opobalsami unc. i. mellis dodrantē. Alia
ualde celebris, ex cuius usu successum habui. Fellis
capræ drach. iiii. opobalsami drach. ii. croci drach.
ii. spicæ nardi, cassiæ, lacrymæ oleæ æthiopice, alu-
minis scissi, medulæ struthocameli, myrrhæ, singul.
drach. i. mellis unc. x. viii. præparato diligenter, &
reponito in pyxide æris cyprij, ac utere. Alia,
Theriaces Andromachi drachm. iiii. succi cyrenia-
ci drachm. vi. opobalsami drach. ii. mellis non fu-
mosi drach. v. Theriacam primum uino ueteri dula-
ci dissolue, & opobalsamum ac mel adijce, & utere.

Alia

Alia liquida Apolloniæ, ualida cõpositio ad suffu-
siones. Sagapeni drach. ii. succi cyrenalci obol. ii. ue-
ratri albi drach. ix. rutæ syluestris drach. i. spumæ
nitri obol. iiii. mellis quadratam. Alia. Ompha-
cî drach. i. myrrhæ drach. i. salis ammoniaci drach.
i. opobalsami, lacrymæ oleæ Aethiopicæ, ammo-
niaci thymiamatis, singulorū drach. i. fellis hyænæ
drachm. ii. Excipe melle & utere. Alia. Fellis hyæ-
næ, adipis uiperæ singulorum sesquidrachmā, croci
drach. i. omphacî drach. i. opobalsami drach. i. myr-
rhæ drach. iiii. & dimidiā. Mellis quantum satis
est. Alia, ad suffusiones, etiam si fuerint diuturnæ.
Lapidem Scyticum cum felle aspidis tritum illine.
Breui liberat. Sit autem Aspis quæ Acotias appella-
tur. Fel eius reperitur ad dorsum hepatis annexum.
Alia, ad omnem uisus hebetudinem ac suffusiones,
facit etiam ad palpebras pungentes pilos producen-
tes. Mellis sextantem, opobalsami drach. ii. myrrhæ
drach. ii. succi cyrenalci drach. i. opobanactis drach. i.
utere. Alia, ad suffusiones, ut æger intra quinque
dies uisum recipiat, adeo magnū ac admirandū auxi-
lium est. Facit etiam ad asperitates palpebrarum. Et
raro quis tale habere potest. Adipis uiperæ, fellis
galli albi, floris æris, succi rutæ syluestris, lactis cani-
ni, opobalsami, æquis portionibus tritis utere. Ali-
quando uero pro æris flore, atramentum futorium
coniicio. Alia liquida nigra. Ad hebetudines, &
fluxiones, ac affectiones. Clauorum caligarū uete-
rū prælotorū ac probe siccatorū librā i. in sextar. i.
aceti acerrimi mittito, & per dies quinque finito. De-
inde in olla fictili aut ferrea, lēto igne donec ter ebul-
liat coquito & excolato, & mellis despumati & co-
lati lib. i. adijcito, & ad mollem ignem usque ad strig-
menticiam spissitudinē coquito, ramulis fortibus ab-
sinthii tribus simul colligatis agitando. Deinde ubi
coactū fuerit medicamentum, atramenti futorij le-
uissimē triti unc. i. inspergito, ac utitor per spicilli
nudeū angulos inde cõtینگens. Alia repellens flu-
xiones, & detergens oculorū tunicas. Attenuat etiā
cicatrices, & forinsecus supernæ palpebræ illita re-
pellit fluxiões, si statim ab initio illita fuerit. Melā
terig, uelut iā diximus de clauis, præparatæ, & mel-
lis parē mensuram, & succi fœnigræci tantundem, si-
mul mixta & excolata, ad lentū ignem coquito, assi-
due agitando donec mellis cõpagem acceperint, &
repositis utere. Cæterum fœnigræci succum præpa-
ra uelut dictum est in ulcerū oculorū tractatu. Sed
& dū excolas fœnigræci succū, ne exprimas ipsum,
sed spōte defluentē inijce. Si uero ubi paratū fuerit
pharmacum & frigefactum, grumi in ipso fuerint,
totum paulatim in mortarium transfundito, & dis-
solutis grumis reponito ac utitor. Alia liquida,
ad siccas eminentias, & omnem carnis extuberan-
tiam, & ad carnis in angulis incrementum, & ad in-
cipientes lippitudines. Misys tostī drach. viiij.
myrrhæ drach. ii. mellis quod satis est. Alia. Mi-
syos tostī drach. vi. atramenti futorij drach. iiii. myr-
rhæ drach. iiii. mellis quod satis est. Orisbasi li-
quida ad suppuratos ex ulceratione. Atramenti fu-
torij drach. viiij. croci drach. viiij. myrrhæ drach. iiii.
mellis lib. i. Alia liquida eiusdem. Mellis sextan-
tem, opobalsami drach. ii. succi cyrenalci sesquidra-
chmam, opoponactis sesquidrachmam. Ex eodem
liquida Balsi, ad suppuratos oculos. Croci, aloës,

myrrhæ, singulorum sesquiunciam, uini quadran-
tem, mellis sexuncem: Crocus teritur cum modico
uino: Deinde aloë & myrrha, & ubi ad compagem
redacta fuerint, inspissata melli adijciuntur, & unita
reponuntur in uitreo uase. Vtere hoc bis illinens in
die, aut si res urgeat, etiam ter, & oculum deliga. Re-
purgat, incarnat, cicatricem inducit, usque ad finem
illita. In plerisque uero post repurgationem, ad colly-
ria transimus, & maxime id quod inscriptum est
scutulare, capræ faciem præferens. Alia liquida
experimēto cõflans. Succu uerbenacæ recte, lycij in-
dici, æquales partes, hoc est, sing. unc. i. mellis tantū-
dē. Alia liquida ex adipe uiperæ. Mirificè facit ad
incipientes suffusiones, & hebetudines oculorum sa-
nat. Succu rutæ, opobalsami, succi fœniculi, succi
chelidonie circa sepes nascentis, adipis uiperæ in du-
plici uase eliquat, mellis non fumosi, singulorum
æquas portiones simul mixtas per purum linteum
excolato, & utere cõfidenter, ita ut aliquādo mellis
sesquiunciam, & reliquorum unc. i. coniicias.

Collyria ex croco, & ex succis diuersa. Cap. x.
Collyrium ex croco ad initium lippitudinū. Glaucij
drach. xxiij. sarcocollæ drach. xvi. croci drach.
viii. gummi drach. vii. tragacanthæ drach. iiii.
Arida omnia trita ac leuissima facta, tragacantha
madefacta excipe. Aut sic prepara. Sarcocollam
aqua terito, deinde glauciū cribratū adijcito, ac rur-
sus terito. Deinde crocū siccum leuissimē tritum, &
tragacanthā siccā in tenuissimū puluillū redactā,
& gūmi similiter insperge, quo eadē die aut poste-
ra in collyria redigatur. Nam collyria diu in morta-
rio manentia nigrescūt, & uires immutāt. Vtere autē
ipso, aquosum infundēs per ouū, lippitudine incipiē-
te. Incipiente uero declinatione crassum instilla. Con-
stāte autē declinatione siēte, cū aqua illine. Aliud
ex myrrha. Glaucij drach. xlvij. sarcocollæ drach.
xlvij. croci drach. xxiij. opij drach. vi. myrrhæ
drach. vi. tragacanthæ drach. xlvij. lapidis hæmatitæ
drach. vi. gūmi drach. xvi. Excipe aqua. Vfus est per
ouū. Aliud Phosphorus appellatū, ad dolorē, &
omnē inflammationē, & intētos humorū influxus.
Glaucij drach. xxiij. sarcocollæ drach. viiij. croci dra-
viii. opij drach. viiij. myrrhæ drach. viiij. misyos
ustī drach. viiij. gummi drach. xii. Excipe aqua.
Aliud Eucherion a colore bono dictū. Facit ad ea
quæ Phosphorus. Cōmodat & asperis palpebris.
Est & pueris cōmodū. Glaucij dra. lxxiiij. sarcocol-
læ drach. xxxii. croci drach. xxiij. opij drach. vi.
myrrhæ drach. vi. hæmatitæ drach. vi. tragacanthæ
drach. xvi. gūmi drach. xvi. Excipe aqua, & instilla
in principio per ouū. Aliud dolorē eximēs ex suc-
cis ad omnē doloris uexationē. Somnū inducit cõse-
stim. Glaucij drach. xlvij. sarcocollæ drach. xvi.
croci drachm. viiij. opij drachm. iiii. Lycij indici
drachm. iiii. succi rosarum drachm. iiii. succi man-
dragoræ drach. iiii. succi hyoscyami drach. iiii. succi
cicutæ drachm. iiii. tragacanthæ drach. xvi. gummi
drach. xlvij. Excipe decocto meliloti. Componi-
tur autem hoc modo. Accipe meliloti lib. i. aquæ
pluuialis sextar. vi. Coquito ad tertias, & excola li-
quorem ad pharmaci præparationem. Collyrium
ex succo polygoni. Succu polygoni sexuncem, ly-
cij indici drach. vi. aloës drach. iiii. myrrhæ drach.
iiii. thuris drachm. iiii. opij drachm. iiii. acaciæ ni-

græ primariæ drach. xii. Vini ueteris odorati quā tum satis est. Facit ad omnes in oculis affectiones, reprimat fluxiones, & sedat dolores. Amat autem balneū. Quare ubi illeuisti, lauare iube. Facit & ad ulcera. Collyrium ex succo Rhamni, ad chemoses & dolores, de quo quidam magnopere gloriantur. Aeris sextantem, cadmiæ sextantem, opij sextantem, aloës scrup. xii, croci scrup. xii, acaciæ bessem, gūmi bessem, succi fructus rhamni lib. i. Aquæ quantū satis est. Si uero abundas, succum fructus totum inijce, & gummi aqua macera. Collyrium è succo uerbenacæ, quod maximas humorum influxiones intra secundam illitionem exoluit. Croci drach. iiii. meliloti drach. v. i. glaucij drach. xii, opij scrup. iiii, amyli drach. iiii, gummi drach. i. terito, & succum uerbenacæ rectæ affundito, efformatoq; ac utitor. Est & alia efficax compositio, ut uix credi possit, facit ad lippitudinem, tumores laxos, & inflationes, omnemq; humorum influxionem, & desperatas in oculis affectiones intra tridū remouet. Croci drach. xiiii, amyli drach. xii, glauci drach. xvi, albuminis oui drachm. iiii, tragacanthi drachm. iiii, tere, & succum uerbenacæ rectæ affunde, efformatoq; ac utere. Collyrium ex succo foeniculi. Cadmiæ dodrantem, stibij bessem, misyos crudi sexuncem, omphacij sesquiunciam, chalcitidis unc. i. croci sesquidrachmam, folij unc. i. succi foeniculi bessem. Et rursus aliud foeniculum cum aqua pluuiali decoquito, & cum eo decocto prædicta terito ac efformato. Hoc multi præparatum habent.

Collyria unius diei, monohemera appellata. Cap. ci.
Collyria unius diei cum candido oui illita, plerūq; statim ab initio lippitudines absq; humorum multitudine factas curant. Reuera enim non parum sæpe hæc magnas inflammationes mitigauerūt, ut in uesperam quidem homo balneo usus sit, postera uero die collyrio nardino illitus fuerit ad instaurationē ac corroboracionem. Ammiscetur autem ad nardinum in prima illitione, parum quiddam de acris ac sistentibus appellatis collyrijs. In secunda uero illitione, paulò amplius quiddam de hisdem. Sufficiunt enim duæ pharmaci adhibiciones, & deambulatuncula aliqua non multa ante balneum, ad perfectam restitutionem. Collyria igitur unius diei, quæ priuatim seculenta nominantur, multam habent acaciā. Quædam uero aut omnino modicam, aut omnino non habent. Complectuntur autem in se, alia æris squamam, alia æsustum modicum, cum multis alijs quæ moderatè adstringunt, & concoquunt ac discutiunt. Talia autem sunt, crocus, myrrha, lycium indicum, Sed & castorium ac thus citra adstrictionē concoquunt, simulq; discutiunt. In quibus igitur adstringentia prædominantur, plurimum oui liquorem, & parum de pharmaco esse oportet, & præsertim si quid ex metallicis pharmacum in se complectatur. In quibus uero crocus, & myrrha, castoriumq; ac thus, & lycium præualent, paulò crassiore pharmaco utendum est. Fomentum præterea omnino adhibendum est ipsis per spongiā, si quidem mediocris sit dolor, semel aut bis in die; Si uero uehementior dolor urgeat, præstat ter. aut quater, & sæpius uti, in longis præsertim estiuis diebus. Fiat autem fomentum per meliloti ac foenigraci de-

coctum. Oportet tamen horum collyriorum usum uirare, in quibus humorum multitudo in toto corpore adest. Nam monohemera quum sint facultate frigida, obstructionem corporum, & densationem meatuum faciunt. Si uero materiæ multitudo in oculis fuerit, ruptionis corniformis tunicæ causa fiunt. Nos autem in recentibus lippitudinibus, Theodotio Seueri illito ex aqua, & spōgia forinsecus oculo imposita egnum ab affectione liberauimus. Et plerūq; balneo uti iubemus statim post primam illitionem. Cæterum Monohemera collyria hæc sunt. Collyrium Monomelum appellatum, eod quod ex unica specilli inductione, inquit, curat. Est autē multi usus. Facit ad diuturnas ac ægre solubiles affectiones, & maximè in quibus etiam palpebræ exasperatæ sunt, per subiectionem illitum. Oportet autē post illitionem diu claudere oculum. Facit etiam ad confusiones oculorum, & ad staphylomata. Est etiam pueris commodum. Vtere cum aqua diluto in his qui mordacitatem ferre possunt, in alijs cum ouo. In omnibus autem per subiectionem palpebræ subline. Si uero uehemens fuerit inflammatio, cum ouo infunde. Habet hoc modo. Cadmiæ drach. xiiii, æris drach. xii, chalcitidis tostæ drach. xii, opij drach. xi, piperis grana xxiiii, mellis sesquiunciam, gummi drach. xiiii, Excipe aqua. Mel postremū adijcitur. Pelarium, quod in principijs aquosum cum aqua dilutum adhibetur. In uigore uero aquosum cum ouo. Ad diuturnas autem affectiones crassius cum ouo. Deinde sensim progressu facto, etiā aqua ad ouum ammiscetur. Ad finem uero ex aqua sola diluitur. In ulcerationibus tamen minus efficax est. Cadmiæ drach. xvi, cerusæ drach. xlviii, acaciæ drach. xxiiii, opij drach. iiii, amyli, tragacanthæ, gummi singulorum drachm. xii, æris usti sesquidrachmam, mirrhæ drach. iiii, croci sesquidrach. Excipe aqua. Aliud pelarium Antoninus appellatū. Cadmiæ drach. xiiii, cerusæ drach. xiiii, acaciæ, opij, singulorū drach. xviii, gummi, tragacanthæ, amyli, singulorum drach. ix, myrrhæ drach. iiii, æris usti sesquidrachmam. Excipe aqua. Hoc magis facit ad exulcerationes. Aliud pelarium, quod Comitem uis uocant. Cadmiæ quadrantem, cerusæ quincuncem, pompholygis quadrantem, opij sesquiunciam, acaciæ, myrrhæ, gummi, singulorum drach. viii, tragacanthæ quadratē, amyli sexuncē, æris usti drach. iiii, croci drach. iiii, Excipe aqua. Est autem optimū ad chemoses, & reliquas lippitudines etiam in uigore, & ad omnes ulcerationes in quibus densæ factæ sunt palpebræ. Repurgat enim & replet ac cicatricem inducit. Maximè uero hoc utor, si pro pompholyge, cadmiā ter uisa ammixta fuerit. Pelarium Edessenum. Tragacanthæ, gummi, acaciæ, amyli, sarcocollæ, singulorum drach. ii, opij drach. iiii, cerusæ drachm. viii, cadmiæ drach. xvi. Excipe aqua.

De collyrijs sistentibus. Seueri. Cap. cii.

Collyria quoq; quæ sistencia appellantur, repulsoria sunt. Sistunt enim inordinatum fluxionis impetum. Et quædam ex ipsis Hermolai uocantur, quædam uero Hexacontarchia, ex eo, uelut puto, quod uniuersus ipsorum apparatus sit sexaginta drachmarum. Quædam autem Hecatontarchia. Multæ uero sunt etiam horū materiæ, ob quorū copiam medi-

cus indignatus, uelut in pelago uertigine affectus, à scopo aberrat. Oportet igitur omnium facultates discernere, & ad unum finem horum efficacias adaptare. Nosse enim oportet quod omnia sistentia collyria frigefaciunt & adstringunt, alia magis, alia minus. Sed & resiccant aliquo modo. Proinde ad calidiores lippitudines talia commodant, non tamen statim à principio, priusquam concoctio apparuerit. Optimū uero & admirandū nobis uisum est: Album Seueri collyriū, quod ex scenigræci succo præparatur, & cadmia, & cerusa, ac tragacantha. Et quod post ipsum scriptū habetur. At ubi ad concoctionem perducta est affectio, rursus ex multis sistentibus commodum reperimus Hecatontarchiū, & adhuc magis ipso, id quod post ipsum scriptum habetur. Recipit autem Hecatontarchiū: Aeris drach. xii. cadmiæ drach. xv. myrrhæ drach. iiii. acaciæ drach. xx. opij drach. iiii. gummi drach. xx. xii. Quidam etiā croci drach. i. Excipe aqua. Hoc collyriū aquosum ad illitionē assumptū, ad complicatas affectiones commodum compertū est, in quibus est inflammatio, & distentio, & fluoris influxio. Attenuat enim palpebras, & ipsarum densitates ac aspritudines exæquat, cum aqua illitū. Sed & uisus hebetudines sistit, adstringens ac uelut exprimens incubentes oculo humores. In his tamen qui subtili oculorum sensu præditi sunt, cum oui candido collyriū diluere oportet. Si uero oui candidum desit, panem purū non aridū, neque multū salis participem, aqua maceramus, & aquā excolatā ad illitionem accipimus. Si minus, farinā purā mades facimus excolamusque ac cremore utimur. Conuenit autem ut ne aceruatim auxiliorū mutationes faciamus, neque aliud illinamus, & aliud superillinamus. Oculus enim à peregrina innouatione magis perturbatur iniuria afficitur. Itaque hecatontarchio, uelut dictum est, utendū est ad complicatas affectiones, ita ut aquosum ipsum faciamus in usu. Hic enim est admirandus ipsius ductus. Est & aliud collyriū sistens, ex eadē materia constans, sed dissonantiā solum in apponderatione habens. Excedit autē præcedens in sua actione. Vidimus enim operum ipsius euentum. Sed & hoc à uulgo medicorum ignoratur. Accipit autē, Aeris uisli quadrantē, cadmiæ quadrantē, opij, myrrhæ, singulorū drach. iiii. acaciæ, gummi, singulorum septuncem & uncia dimidium. Excipe aqua. Hoc collyrium inenarrabilem quandam uim habet, & tempestiue adhibitum, desperatas affectiones sanat, & graues dolores mitigat ac sedat. Tempus autem adhibitionis eius est, lippitudinis uigor, quando concoctio facta fuerit, & gramæ in oculo conspectæ, & uelut subcructum quiddam in oculo apparuerit. Siue enim chemosis fuerit id quod affligit, siue palpebrarum inflammatio, congruum est ipsis hoc auxilium. Tantam enim quietem ex eius usu ægri consequuntur, ut quum antea diu uigilias tollerant, statim ab illitione somnū assequantur. Confidenter igitur ad pharmacum accurre, considerans num tenuis lacryma post collyrii illitionem defluat. Habebis enim & in hoc successus signum, si omnino non post illitionem lacryma defluat. In quibus enim ex prima illitione lacryma sistitur, sed in adstricti permanent, & uelut somnus succedit, in his statim sanitas expectanda est, ut non opus sit secunda illitione. Si uero adstrictio fiat in prima il-

litione, infundendum est ipsis oui candidum per se moderatē calefactum. Verum in secunda illitione aut tertia, ab eo symptomatis accidente liberabuntur. Primum enim oculus uelut re peregrina offensus, mordetur: Deinde uelut adsuetus, magis delectatur. Pruritus enim modicus ipsis oboritur cum quadam uoluptate. Atque hoc est signum successus. Nam corpora in profundo liberata, causas ad superficiem propellunt. Præcipiendum est autem, ut quibus illitum est pharmacum, oculos ne aperiant ante collyrii concoctionem. Commoti enim meatus rarefiunt, & collyrium ad profundum cōdescendens, mordacitatem inducit. Post concoctionem autem collyrii spōgias adhibere oportet, non magno facto somēto, & ipsū collyriū aquosius illinere. Distenditur enim palpebra in crassioribus illitionibus, ut ægre ferat æger, & palpebræ grauentur. In principio igitur cum ouo illinatur aquosius dilutum. (At uero coactio eius fiat in feruida cotē, calefactum enim crassius se ipso euadit). Nam sic adhibitū in dolore admirandū collyrium compertū est. Etenim ex hoc ductu etiam parua in ipso apparētem adstrictionē penitus excludimus. In uigore uero itidem cum aqua adhibeatur. In declinatione autē cum aqua, & sub palpebrā illinatur. Etiam si enim densitas relicta fuerit, & hanc itidem sanat. Magnopere quoque pueris confert. Curat enim etiā horum ardores. Possemus porro plura auxilia recensendo, maiorē legentibus difficultatem parere, uerum quū paruo labore susceperimus, imò potius experientia inuenerimus præscripta collyria, efficacias ipsorum simul cum præparationis modo candide exposuimus. Collyriū sistens ex oleo. Oribasij. Cadmiæ uisæ & lotæ drach. x. aeris uisli & loti drach. viii. opij, myrrhæ, singulorū drach. x. acaciæ drach. centum, gummi drach. centum uiginti. Terito ex aqua, & ad excipiendum adijce olei omphacini quadrantē, & drach. iiii. Adhibetur in principio aquosum cum ouo. Aliud ex oleo, uelut expertus sum, facit ad principia lippitudinis, & fluxiones, & ueteres affectiones, & ad corrosas palpebras. Cadmiæ drachm. xx. iiii. aeris drachm. xx. iiii. myrrhæ drachm. vi. opij drach. i. acaciæ, gummi, singulorū drachm. x. lvi. olei omphacini sextantem. Terito cum aqua. Collyrium Scutulare appellatum, capræ faciem præferens, & sistendi uim habēs, in principio quidem cum ouo crassum, & ad declinationes similiter. Ad uigores autem aquosum. Facit mirifice ad suppuratos oculos, & sordida ulcera paulatim repurgat, & dolorem euestigio eximit. Cadmiæ sesquiunciam, aeris sesquiunciam, croci drachmas iiii. aloës bessēm, lycij indicij sextantem, acaciæ sexuncem, opij sesquiunciam, myrrhæ drachm. iiii. tragacanthæ unc. i. gummi sexuncem. Hermolaus paruus. Cadmiæ unc. i. croci drachm. iiii. myrrhæ drachm. iiii. aloës drachm. viii. acaciæ drachm. viii. gummi drachm. xx. Excipe aqua. Vtere hoc ammixto alijs collyrijs lenibus, & infunde in principio cum ouo. Hermolaus magnus. Facit ad prædicta multo melius. Cadmiæ bessēm, spicæ nardi sesquiunciam, aeris sesquiunciam, croci trientem, aloës bessēm, lycij indicij sextantem, acaciæ sexuncem, opij trientem, myrrhæ trientem, tragacanthæ unc. i. gummi sexuncem. Excipe aqua. Collyrium Olympionici. Facit ad maximas doloris

tiexationes, & chemoses, & in summa est ex collyrijs prosperi successus, statim enim liberat. Cadmiæ lotæ drachm. viii. sibiij loti drach. viii. aloës drac. viii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. iiii. opij drac. iiii. gummi drach. viii. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura uero crassior sit. Ego pompholygis drachm. iiii. & thuris drachm. iiii. adiicio. Collyrium Ericerum Achariston appellatum, ab erica, & dignæ gratiæ desperatione. Facit ad maximas humorum influxiones. Ex huius usu in Aegypto successum sentunt, præsertim in agrestioribus corporibus. Cadmiæ drachm. xvi. æris usti ac loti drachm. viii. opij drach. iiii. seminis ericæ drach. iiii. acaciæ drach. viii. myrrhæ drach. iiii. gummi drach. xvi. Terito cum aqua & excipe. Vfus est cum lacte muliebri. Temperatura sit media. Vbi uero circa oculos affectio est, à collyrio abstinere oportet. Ego porro hoc usus sum. Cadmiæ drachm. xvi. æris usti loti drachmas iiii. seminis ericæ drach. ii. opij drac. ii. myrrhæ drachmā i. acaciæ drach. i. gummi drac. viii. Excipe aqua. Vfus in principijs sit aquosus, & lauato. In declinationibus autē crassum cum ouo illine. Aliud Ericerum, quod cum magno labore acceptu, uelut magnū donum. Facit ad prædicta multo melius. Et ad asperas palpebras, & ad ipsorum debilitatem. Si non prius mercedem acceperis, ne illinas. Cadmiæ drach. viii. æris usti drach. iiii. chalcididis crudæ drach. viii. aloës drach. vi. opij drach. iiii. croci drac. iiii. seminis ericæ drac. iiii. acaciæ drachm. xii. gummi drach. xii. Excipe aqua. Aliud Ericerum celebre, quod appellatur fissum Achariston, eò quod digna gratia ipsi rependi non potest. Facit ad fluxiones antiquas, & dolores maximos qui sunt citra ulcerationē, ab initio usque ad finem cū aqua cohibet diuturnos fluxus in ulcerationibus aquosum cum ouo. Aspritudines autē attenuat cum aqua, & albugines dederit, & diuturnas uisus turbationes sanat. Et post sublata pterygia commodū est. Attenuat enim pelliculas, & cicatrices planas efficit. Valde utile est in suffusis post perfunctionē. Per lenem enim adstrictionē, robur oculo addit. Est etiam pueris commodū. Cadmiæ drach. xvi. æris drach. iiii. seminis ericæ, opij, myrrhæ, singulorum drach. viii. acaciæ drach. iiii. gummi drach. viii. Huius equidem periculum ego non feci. Quæ uero de ipso dicta sunt, præstat id quod ipsum præcedit.

De lenibus collyrijs. Galeni. Cap. ciii.

Ex collyrijs lenibus appellatis quædam terrea essentiam habent citra frigiditatem aut caliditatem manifestā, in medio quodāmodo horum consistentia. Et ex his ipsis aliqua, modicā frigiditate aut caliditate participāt. Aliqua uero omnino nullā talē uim præferunt. Totū itaque genus ipsorum obstruendi uim habet, contrariā his quæ ab obturatione liberant. Qualis est Samius Aster appellatus, qui tenuiorum partium est quā terra simpliciter samia nominata. Et pompholyx lota, & cinis ipsius lotus. Et cadmiā usta ac lota. Huius autē parum quiddam facultatis extensoriæ adest, siue post uisionem, siue sine hac lauetur. Pompholyx autem & spodium modicam adstringendi uim habent, quemadmodū etiam uistū ac lotum plumbum. Est enim mordacitatis exors, habet autem & astrictionis quippiam. Est & amyllum lene, & cerussa lota, uicina est facultati plumbi

usti ac loti. Lene est item foenigræci decoctum. Et quod in ouis est album ac tenue. Et lac boni succi in horum genere esse putandum est, itemque gummi ac tragacantham. At stibium non lotum quidem, fortē adstringendi uim ostendit. lotum autem exoluuitur, ut propē mordacitatis exors euadat. Alterum porro genus est eorum quæ paruam habent mordacitatem, ex eo quod ammixta sunt ipsis quædam ex modicē adstringentibus: qualia sunt rosæ & thus, quum modicam quidem adstrictionem habeant rosæ, & parū de extensoria facultate ipsum thus. Quū autem moderatē calidum sit thus, ob id quandam concoquendi ac dolores eximēdi uim habet. Ex eodem uero genere cum ipso, in concoquendo ac moderatē discutiendo, putandus est crocus, & myrrha, quæ inter se differunt, eò quod crocus moderatē adstringit, myrrha uero citra adstrictionē discutit, & humiditates non instrenuē resiccāt. Adhibentur igitur à medicis lenissima ad affectiones ægrius curabiles, in quibus ulcus est aut solum, aut cum tunice corniformis corrosione, & uiformis prolapsu, sanie mordacissima effluente. In his enim nullum aliud pharmacum conuenire uidetur. Quum adstringentia quidem effluentem sanie detineant, & propter hoc ex mordacitate dolorem augeant. Acris uero affectionem intendunt. Laxatoriorum autem ac discussoriorum pharmacorū facultas, euacuare quidem potest quod generatur: neque autem ulceratum renutrire, aut cicatricem inducere, neque quod prolapsum est reprimere ac concludere. Quemadmodū neque concoctoriorum facultas, etiam si concoquere affectiones non parum possit. Quid uero dicere amplius opus est de pharmacis acidis aut amaras uires habentibus, quod huiusmodi affectiones mordent ac exacerbant? Ad maiorem autem malignitatem procedunt, quæ nitrosam ac salsam uim habent. Ad has igitur affectiones conuenire uidetur relatorum lenium pharmacorum genus, quod citra mordacitatem curare potest ulcera cū acri fluxione, per multum tempus uitiatos humores in affecta parte consumens ac resiccās, qui sanē uitiati humores bonum sanguinem locis influentem corrumpunt. Vocatur autem talia collyria à Medicis Libyana & Cygni, adhibentque ipsa oculis trita cum lacte mulieris boni succi, eò quod uisitare cupiunt obstructoriam uim ouorum. Quum enim serosa quædā extensoria pars in lacte contineatur, usus ipsius congruus fit ad propositam curationem. Ulcera enim quæ impletionē indigent, extensorijs citra mordacitatem opus habent. Si uero non affuerit tale lac, per foenigræci decoctum talia collyria terere præstat, quum etiam ipsum aliquam extensoriā uim habeat. Proinde quæ spodiaca ac tephrica collyria, à cinere & spodio appellantur, communem habent uim leniendi ac frige faciendi, & moderatē mordacitatis exortem.

De lenibus ac albis collyrijs. Cap. ciiii.

Aliud porro est album collyrium, quod multos laet, ob præparationis utilitatem, putatūque est à plerisque hoc nihil posse. Magnā uero ex hoc utilitatem percepī ad propositam affectionem. Egregiē itaque facit ad omnem calidam lippitudinem. Efficax est etiā ad pruriginosas ac corrosas palpebras. Nos enim sepe multis perpetratis in tali intemperie, nullū successum habuimus, serō autē aliquando huius copiam adepti

adepti, magnam uim cōperimus in ipso, in ægrè curabili ac ferè incurabili affectione. In tantū enim mitigatus est eger, ut ex deo esse collyrium diceret. Sed & ad suppuratos oculos eximie facit. Resiccet enim humorē ipsorum citra mordacitatem in breui tempore, & oculum imperturbatum conseruat. Curat etiam compediō rubores sub paruis angulis in albo oculi fientes. Adest autem ipsis iuxta mediū, uelut pustula quædam, à qua etiam totus rubor cōtingit. In prædictis igitur affectionibus, inter quas etiā ulcerationē posuimus, eximie facit, ut neq; fœnogræco opus habeamus. Nam & hoc in collyrii compositionem recipitur. Videtur autē ipso aliàs aliter, in doloris uexatione, cum oui cādido: sic enim ipsum statim mitigat. In quibus autē dolor non præualet, palpebræ uero crassefactæ sunt, etiam cum aqua infundimus. Aliquādo etiā illinimus. Et in summa ad omne lippitudinis principiū, reliquam collyriorū materiā superfluam ducimus. Excedit enim uis sua omnia eiisdē generis. Est enim lenius ac doloris magis mitigatiuū quā alia: alia enim opium recipientia & amyli, & quandoq; etiā myrrham, adstrictionem aliquā inducunt. Hoc autem collyriū ab his liberum est, nam crocē excedit in efficacia, & ad feruores ac ardores palpebrarū facit. Et ad solis æstus. Sed & tenues ac acres fluxiones obtūdīt cum aqua illitum, aliquando & cū rosarum decocto. Et glaucos oculos habentes, & eos qui prominentē habent crystallini humoris sitū, bene illustrat aquosum infusum. Et in quibus oculorum natura nō fert adstrictionē, his omnibus optimū est auxilium. Compositio autē collyrii hæc est. Cerusæ lib. i. cadmiæ semissem, tragacanthæ quadrantē. Præparatur hoc modo: Cadmiā racemosam prunis ignitis obruimus, & flā mā uentilando excitamus. Et ubi ignita fuerit cadmia, ablata lacte asinino extinguimus. Deinde rursus prunis ipsam obruimus, & ignitam rursus lacte extinguimus. Et tertio idē facimus. Deinde rūdimus & angusto cribro externimus, & in profundū quoddā mortariū coniectā, aqua fontana pura affusa terimus. Et postea desidere sinētes, per aquæ fusoriū instrumentū, aquā unā cū superstitē concrectione extrahimus, & rursus aliam puram aquam infundimus, & ubi satis cōtriuimus, & rursus desidere sinimus, rursus aquā per idē instrumentum extrahimus. Et hoc sæpe facimus, donec non amplius concretio aquæ superstat. Postea uero cadmiā exactē siccamus, & semissem siue sexuncem apponderamus, ipsamq; in mortarium collyriacum cōlectam, aqua pluuiali purissima affusa, exactissimē terimus, ut nulla asperitas linguæ occurrat. Atq; sic ad cerussam prædicto modo ablutam, cadmiā adijcimus, & ipsa ad dies x v. cū aqua pluuiali cōterimus. Et tunc tragacantham albā ac lucidissimam accipimus, eamq; lotam, & reiecto quod in ipsa est arenoso, in fœnigræci decocto maceramus, & per diem ac noctē solum macerari sinimus. Plurimum autem inijcere oportet de fœnigræci succo, præparato uelut dictum est in principio huius Sermonis capite decimo quinto. Nam à tragacantha, uelut à spongia, absorbetur. Postera igitur die in mortario puro paulatim tragacantham leuigamus, & alia prius trita in mortariū adijcimus, & probè per mixta patinis uitreis excipimus, & tenui linteo contexta, in locum humiditatis exortē, ubi uentus spirat, reponimus. Dehinc

enim collyrium, & efformationem moratur, si in humido depositum fuerit loco. Non enim tantum temporis postulat ad contritionem, quantū ad efformationem. Est itaq; hæc collyrii præparatio. Et poteris ex hac methodo, ad eiusdem generis materias trāsire. Talia autē sunt libyana, & tephra ac spodiaca appellata, itemq; cygnaria, & alba quæ ex rosis, & quæ ex corlandri succo præparantur. Quibus omnibus præferendum compertū est propositū collyrium. Optimum uero experientia iudicatū est & hoc, Cadmiæ ustæ ac lotæ uelut dictum est trientē, cerusæ similiter lotæ unc. xvi. amyli recentis unc. xvi. opij drach. iiii. tragacanthæ trientē: reliqua cum aqua terito. Tragacantham autem fœnigræci succo diligēter uelut dictū est præparatā, macerato. Amylium uero neq; acidū sit, neq; graucolēs. Aliud, Niamnon appellatū, tenerum, dolorē eximens, stupefactiuū, ex genere cygnariorum. Facit & ad ulcerationes, post primū uigorē dolore præsentē crassum illitum. Cerussæ lotæ sexuncem, cadmiæ ustæ & lotæ trientē, pompholygis per lintheum lotæ sextantē, opij sextantē, tragacanthæ sextantē, gummi sextantē. Excipe aqua. Aliud collyriū Asclepiadæ dolorē eximens, facit ad fluxionē omnis generis, ulcera, doloris uexationes, pustulas, prolapsus, chemoses, affectiones omnis generis. Cerussæ lotæ dra. viii. terræ samiæ drachm. viii. cineris pompholygis lotæ drach. ii. tragacanthæ drach. ii. opij drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Vsus est cum ouo. Aliud Athanasia appellatū. Cadmiæ ustæ & lacte asinino extinctæ, ac lotæ lib. i. opij quadrantē, cerussæ lib. i. succi mandragoræ lib. i. amyli ordeacei libr. i. Tere cum aqua, & ad efformationē adijce ouorū recentiu albumina, quantū satis est. Collyriū, Cignus reginæ, ad maximos dolores ac affectiones. Cadmiæ lotæ drach. xvi. cerussæ lotæ drach. viii. acaciæ flauæ drach. ii. opij flauī drach. ii. tragacanthæ drach. ii. gummi albi drach. ii. amyli drach. ii. Terito cū aqua. Et amylium postremū insperge. Nā si morā traxerit in mortario, acelsit, & collyriū acre facit. Ad excipiendum uero adijce ouorū recentiu quatuor candidū. Collyriū Bolæ. mitigat & cōcoquit omnē inflammationē. Cerusæ tostæ drach. xxxii. croci drach. iiii. opij drachmas quatuor, amyli recentis drach. viii. gummi drach. xxxii. Excipe aqua. Aliud collyrium ex spuma argenti quod Augustū uocant. Spumæ argenti ustæ ac lotæ sextantē, pompholygis lotæ unc. i. cadmiæ ustæ ac lotæ sextantē, amyli sextantē, gummi sextantē, tragacanthæ unc. i. Excipe aqua. Hoc maxime & dolores eximit, & fluxiones intercipit, & oculum imperturbatum seruat.

Collyrialibyana, & tephra, ac spodiaca. Cap. cv. Collyriū libyanum Asclepiadæ. Ad pustulas, epicaumata, ruptiones, coelomata, oculos suppuratos, chemoses, staphylomata, doloris uexationes, & affectiones. Deterit etiā cicatrices. Cadmiæ ustæ ac lotæ drach. xvi. cerussæ ustæ ac lotæ drach. xvi. stibij usti ac loti drach. xii. amyli drach. xii. cineris pompholygis drach. viii. plumbi usti ac loti drach. viii. tragacanthæ drach. viii. opij drach. ii. gummi drach. vi. Et ad excipiendū ouorū cādida viii. Oribasiū inexuperabile, collyriū inquit, Philumeni tenerū libyanū, ad suppuratos oculos, in uigore, ulcera, dolores, chemoses. Cadmiæ, cerussæ, pompholygis singulorum drach. xvi. stibij drach. duodecim, amyli drach. xii. plumbi usti, terræ

terre Samiæ, tragacanthæ, singulorū drachm. viii. gummi drach. vi. myrrhæ drac. ii. opij drac. ii. Excipe aqua. Vfus est cū lacte muliebri, aut cum ouo. Aliud lybianū Oribasij. Ad principia, & ulcerationes. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xii. amyli dra. xii. plūbi usti & loti dra. viii. cerusæ lotæ dra. viii. tragacanthæ drac. xvi. gūmi drach. xiiii. stibij usti ac loti drac. xii. terre Samiæ, pompholygis lotæ, singulorū drac. viii. myrrhæ drach. ii. opij drachm. ii. Excipe aqua. Aliud collyrium, Aster Magni, quod præparari solet. Cadmiæ lotæ drac. xxxii. plūbi usti ac loti drach. xxxvi. cerusæ lotæ drach. xxxii. stibij usti ac loti drach. xxxii. pompholygis lotæ drach. xxxii. thuris dra. viii. terre quæ Aster appellatur drach. viii. myrrhæ, opij, singulorū drac. iiii. tragacanthæ, gummi, singulorū drac. xvi. amyli drac. xxxvi. Excipe aqua. Asclepiadæ, aster in exuperabilis, dolorem eximens. Facit ad doloris uexationes, pustulas, staphylomata, ulcera sordida & serpētia, facit ad inueteratas affectiones. Et cicatrices exterit. Cadmiæ ustæ ac lotæ drachm. xvi. stibij usti drach. xii. cineris pompholygis lotæ drach. viii. myrrhæ drac. ii. opij drac. ii. tragacanthæ drac. viii. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliud collyrium Vranium, uelut Oribasius habet, ad ulcera, pustulas, ruptiones, inustiones, prolapsus, staphylomata, oculos suppuratos, corrosiones, nomas, carbunculos, & ad omnes magnas affectiones. Maximè conuenit ad ruborē ac glaucedine oculorū. In principijs aquosius infunditur. Quum autem tenuis fuerit & mordax & feruida fluxio, utere cū lacte. Vbi uero crassam fluxionē dissoluere uolueris, cū aqua. Cadmiæ ustæ ac lotæ sextantē, squamæ æris lotæ trientē, terre Samiæ ustæ ac lotæ sextantē, cineris pompholygis lotæ unc. i. opij drach. vi. gummi trientē, stibij loti sextantē. Excipe aqua, & utere cōfidenter. Collyriū Spodiaceum Demosthenis. Facit ad inflammationes & fluxiones, cadmiæ drac. xiiii. stibij loti drac. vii. cerusæ lotæ drachm. xiiii. terre Asteris drac. vi. thuris drac. iiii. opij drach. vi. gūmi drach. v. Terito cū succo foliorū oleæ. Succum autē sic facto. Tenera oleæ folia lauato, deinde in pila tundito moderata aqua affusa, ut sufficientem succū remittant, deinde exprimito, & per linteū purū excolato, ac utitor. Aliud Spodiaceū admittandū, tenerum, faciens ad fluxiones & epiphoras humorū impetuosas, ulcera, inustiones, pustulas. Cadmiæ ustæ ac lotæ drac. viii. stibij usti ac loti drach. ii. terre Asteris drac. iiii. opij dra. ii. gūmi dra. ii. Excipe aqua. Collyriū Tephron, inspissat ac adglutinat tenues fluxiones uelut præcedēs. Optimū uero est hoc ad calidas fluxiones. Cadmiæ ustæ ac lotæ dra. xxv. stibij loti drac. viii. terre Samiæ dra. vi. cerusæ drac. vi. opij dra. v. gūmi dra. viii. ouorū recentū albumina sex. Excipe aqua. Collyriū Philagrii penitus lene. Obfuscat enim fluxionū mordacitatē. Quapropter confidēt ipso utendū est in acris ac tenuibus fluxionibus. Obtundit enim has & reficcat. Hoc Syricum aut Sandycē appellāt. Pompholygis lotæ dra. xxv. cerusæ ustæ ac lotæ drac. xxv. terre Asteris, plūbi usti ac loti, singul. dra. xxv. gūmi albi dra. x. aquæ pluuiæ purissimæ nō olentis quod satis est, Singula seorsim usta lota, siccata, ponderata, adiecto ac terito. Et in fine gūmi addito, deinde amyli. Aliud

eiusdē, ad ulcerū repletionē, præsertim malignorū. Cadmiæ ustæ ac lotæ drachm. xxv. pompholygis lotæ drach. xxv. tragacanthæ drac. x. Excipe aqua. *Collyria ex thure.* Cap. cvi.

Collyriū ex thure ad fluxiones, & chemoses, & caua ulcera. Cadmiæ drach. viii. thuris drac. viii. cerusæ drac. xl. opij dra. vi. terre Asteris drac. vi. gūmi dra. vi. Excipe aqua. Vfus est cū ouo. Aliud Delicatū inscriptum. Ad inustiones, pustulas, chemoses, præsertim in his qui nullā omnino mordacitatē ferre possunt. Cadmiæ lotæ dra. viii. cerusæ lotæ dra. xlviii. thuris drac. viii. opij drach. vi. amyli drac. viii. gūmi drac. xvi. Excipe aqua. Vfus est cū ouo. *Collyrium Cleonis.* Cap. cvii.

Collyriū Cleonis, uelut Demosthenes habet, ad ulcera pura & iam cicatrice indigentia, ex cuius usu nos ualde laudati sumus. Nam profundissima ulcera & pura celerrimè replet, & compediō ad cicatricē perducit, tenuibus & obscuris cicatricibus relictis, & ulcera absq; inflammatione conseruat. Habet hoc modo. Spodij loti drach. iiii. plūbi usti ac loti dra. iiii. squamæ ferri stomomatis lotæ drach. i. gūmi dra. ii. Excipe aqua. Et utere cum lacte aut ouo. Vtimur autem ipso, inquit Apollonius, in profundiore ulceratione, cū cremore tragacanthæ aquoso. Quidā croci sesquidrachmā inijciunt, & pro spodio pompholygis, cadmiā ter ustā accipiūt. Est autem lene quidem & mordacitatis exors, uerū graue. Quare nunquam crasso ipso utendum est, sed aquoso.

Collyria ex rosis uiridia, ac alba. Cap. cviii.

Collyrium Nili ex rosis, ad dolores, fluxionē tenuem ac multam, pustulas, prolapsus, & ulcera sordida, & palpebras asperas. Rosarū uiridiū resectis unguibus drac. xiiii. croci corycij dra. xii. opij drach. i. spicæ nardi dra. i. gūmi drach. vi. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura sit liquosissima. Quidam etiam ad confusiones & pupillæ dilatationem ipso utuntur. Collyrium ex rosis Diagoræ, quod Magnū appellatur, aut uiride ex septuaginta duabus rosarum drachmis. Ad chemoses, & doloris uexationes, pustulas, epicaumata, siue inustiones, staphylomata, prolapsus, oculos suppuratos, fluxiones antiquas, lippitudines inueteratas, & affectiones ægrè curabiles. Rosarum uiridiū exunguiū drac. lxxii. cadmiæ lotæ dra. xiiii. croci dra. vi. stibij dra. vi. æruginis drach. ii. spicæ nardi drac. ii. opij drac. iiii. myrrhæ drac. iiii. gūmi drach. xiiii. squamæ æris drach. ii. Excipe aqua. Collyrium quo usus est Florus in Drusi matre, quæ parū abfuit ut ab alijs Medicis excæcata fuisset. Acaciæ drach. xlviii. rosarum siccarum drach. xlviii. meliloti drac. xlviii. spodij pompholygis drac. xiiii. croci drac. xiiii. malorum mandragoræ drach. xii. seminis hyoscyami drach. vi. opij drachm. vi. myrrhæ drachm. iiii. æris usti drachm. iiii. gummi drachm. xl. Vinī falerni heminas iiii. aquæ pluuiæ heminas iiii. Aquam & uinum misceto. Et in hæc rosas, melilotum, hyoscyami semen, & mandragoræ mala, aut si hæc non adsint, corticem inijcito, & ad triduum macerari sinito. Deinde expresso liquore ad pharmacī compositionem utitor. Vtere hoc uelut probatissimo. Aliud Philagrii ex rosis, ad inflammationes congruum, si suprā relato leni Philagrii collyrio fuerit ammixtū, Rosarum uiridium, exunguium

exungulum drachm. lxx. æris usti drach. xxxii. Tere cum uino odorato ueteri astringente, & utere. Collyrium album ex rosis nostrum inquit Oribasius, ad uigores & ulcera, & oculos suppuratos, inustiones crustas, & ulcerū sordes. Cadmiæ ustæ ac lotæ, stibij usti ac loti, rosarum recentium exunguiū, singulorum drach. xvi. cerusæ lotæ drach. viii. croci drach. viii. opij drach. iiii. gummi drach. xvi. Excipe aqua. Vfus est cum ouo aut lacte. In declinatione cum aqua. Aliud eiusdem. Facit ad uigores. Cadmiæ ustæ ac lotæ, drachm. xvi. rosarum recentium exunguiū drachm. viii. opij drachm. iiii. lactis drach. iiii. gummi drach. iiii. tragacanthæ drach. ii. amyli drachm. iiii. Aliqui etiam samij Asteris drachm. ii. Collyrium ex rosis album, quod cum hyoscyami succo præparatur. Cerusæ uncias xxv. croci quincuncem, opij librā i. myrrhæ quincuncem, rosarum uiridium exunguiū lib. i. cadmiæ ustæ ac lotæ bessem, gummi librā i. Cadmiam, trocum, rosas cum aqua terito. Deinde cerusam adijcitur. Succos autem & gummi, in hyoscyami succo macerato, & efformato. Vtere ad tenuissimas ac acres fluxiones, & in his quæ sunt cum ulceratione: generose repellit. Collyrium uiride ex Albano. Ad doloris uexationes & affectiones ueteres. Cadmiæ lotæ drach. viii. spodij loti drach. viii. æris usti ac loti drach. viii. opij drach. viii. galbani drach. viii. myrrhæ drach. viii. gummi drach. viii. Excipe aqua. Quidam spodium non adijciunt.

Collyria diasmyrna, & chiaca appellata ex uino.

Cap. cix.

Collyrium diasmyrnum odoratum Synerotis, pharmacum accommodatū ad inueteratas affectiones. Facit & ad rheadas, hoc est, angulos antrosos, siue carnis in angulo magno decemētum, & ad ægilopas. Cadmiæ lotæ drach. xxviii. lapidis hæmatitæ loti drach. xxviii. spodij pompholygis drach. xxiii. myrrhæ drachm. xlviii. croci drachm. xiiii. opij drachm. viii. piperis grana xxx. gummi drachm. vi. Terito cum uino ueteri astringente. Vfus est cū ouo in recentibus affectionibus. Temperatura sit aquosa. Aliud Asclepiadeū Paccij. Ad doloris uexationes, fluxū tenuem & multū, inustiones, pustulas, pellicularum eminetias, aspritudines, diuturnas affectiones, & eos qui à multis illitionibus læsi sunt, cōfestim opitatur. Cadmiæ lotæ dra. xii. Aeris usti drach. xii. croci drach. xii. squamæ æris lotæ drach. xii. myrrhæ drach. iiii. lapidis hæmatitæ drach. iiii. spicæ nardi drach. iiii. piperis grana xxxiii. rosarū siccarum drachm. iiii. opij drach. iiii. gummi dra. xii. Terito cum uino ueteri odorato astringente. Vfus est cum ouo. Temperatura uero aquosa. Collyrium Isotheon, hoc est, uiro par, ab aliquibus autem Isotheon, hoc est, deo par appellatum. Facit ad oculos suppuratos, & ulcera impura, ac caua, & fluxionum principia, præsertim in corporibus repletis, in quibus grammarum copia crassissimarum in oculis reperitur. Est & pueris commodum, & ad aspritudines bonum. Cadmiæ drach. viii. æris usti drach. iiii. rosarum siccarum drach. iiii. croci drach. i. folij drach. i. lapidis scissi drach. i. myrrhæ drach. i. gummi drach. vi. Tere cum uino uetere odorato astringente, & utere in omnibus predictis cū ouo aquosius per se infundens. Post perfectam uero resti-

tutionem cum ouo dilutum illine per subiectionē, & lauato. Si uero adstringantur post illitionem, cādidum oui infunde. Verum ad attenuandas cicatrices, cū ouo aquosius illine. Quidā etiam piperis grana nouem scripturæ adijciunt. Nos autem in his piper reijcimus. Collyriū Dionysius. Facit ad myocephala, aspritudines, fluxiones, heberudines. Maxime autē facit ad fluxiones inueteratas. Cadmiæ dra. xiii. æris drach. v. lapidis scissi drachm. iiii. lapidis hæmatitæ drach. iiii. casia drach. i. aloës drach. ii. croci drach. ii. spicæ nardi drach. iiii. folij drachm. ii. lycij drach. i. piperis grana xxxi. opij drach. i. myrrhæ drach. iiii. acaciæ drach. ii. gummi drach. vi. Tere cum uino Chio, aut alio austero ueteri, & utere uelut efficacissimo, etiam ad oculos purulentos, & aspritudines, in principijs cū ouo, deinde cum aqua. Efficacia eius superat omnem pollicitationē. Collyriū Chiacum. Ex Demosthene, inquit Apollonius, & ad pura ulcera & proserpentia, & eminentias, & ueteres affectiones, asperas palpebras, fycoses, euerfiones, clauos, staphylomata, omnes doloris uexationes, lipitudines scabras. Facit etiam cicatrices obscuras, & recentes ac crassas cicatrices attenuat. Oportet autem modō crassum, modō medium, modō aquosissimū sublinere. Et quandoq; ex interuallis, quandoq; assidue. Facit ad carbunculos & suppurationes: pus enim percolat. Et in summa ad omnia oculorū uitia optimū est. Spodij drach. iiii. æris usti drach. ii. croci drach. i. myrrhæ obol. iiii. opij tantundē, piperis grana xii. gūmi dra. i. Terito cū uino Chio, aut alio austero uetere. Aliud Chiacū Oribasij. Ad staphylomata & oculos purulentos, ulcera pura & sordida, & ad antiquas affectiones. Cadmiæ, rubricæ sinopiceæ, gallæ omphactidis, croci, rosarū recentium exunguiū, gummi, singulorū quadrantē, opij unc. i. Tere cū uino chio, aut alio austero uetere maris exorte. In principijs ad cygnariū aut pelariū quoddā miscetur. Cicatricē quoq; optimē inducit cū aliquo horū, & per se. Fuscū nostrum inquit Oribasius. Ad oculos purulētos, & magnas affectiones, & omnē ulcerationē, præsertim diuturnā: Rosarū exunguiū sextarē, cadmiæ teneræ dra. xxxiii. cerusæ drach. xvi. opij drach. xxxiii. æruginis dra. xii. æris dra. i. seminis ericæ drach. xii. stibij drach. viii. myrrhæ drach. vi. spicæ nardi drach. iiii. croci drach. iiii. acaciæ dra. iiii. nitri drach. iiii. lycij dra. iiii. aluminis scissi drach. iiii. chalcitidis ustæ dra. iiii. castorij drach. iiii. omphacij dra. ii. gūmi drach. xxxiii. Terito cū uino austero ueteri odorato, & utere aquoso, per foenigræci succū, aut ouū diluto. In progressu uero crassius adhibe. Collyriū Aromaticū, ex Demosthene. Ad inflammationes ex humorū crassiorū multitudine obortas. Attenuat breui ac diffundit, & discutit humores. Facit & ad impura ulcera. Pompholygis drach. i. æris usti drach. ii. myrrhæ drach. iiii. lapidis hæmatitæ dra. iiii. opij drachm. iiii. piperis grana xviii. croci drach. ii. gummi drach. iiii. Tere cum uino chio, aut alio austero. Collyrium Scylacium inscriptū, ex semine hyoscyami. Facit ad chemoses, & affectiones fluidas diuturnas omnigenas. Facit etiā ad staphylomata, & repellit fluxiones. Primū cum ouo aquosum, deinde etiā solidum illitū cum ouo. Cadmiæ, æris usti, lapidis hæmatitæ, chalcitidis uste, singulorū quadrantē, misyos sesquiunciā, ammoniaci thymiamatis

matris sesquiunciam, myrrhæ sesquiunciam, opij sesquiunciam, hyoscyami seminis unciam unam, aloës sexuncem, gummi sexuncem. Tere cum uino austero. Aliud collyriū mirifice facies ad myocephala. Consumit etiā prerygiā, & carnis in angulo magno incrementū deterit, itēq; cicatrices. Est & ad aspritudines cōmodum. Cadmiæ unc. i. æris usti unc. i. chalcitidis crudæ unc. i. æruginis rase drac. iiii. myrrhæ sesquidrachmā, croci drac. ii. salis ammoniaci drac. i. gummi drach. iiii. Terito cum uino austero. Collyrium Philagrii, de quo ita scribit: Tertium ab his est meum collyriū, quod appellamus Præseruatiū, repellens in principio fluxiones, & roborare potēs debiles & læsioni obnoxios oculos. Quare non solum in principijs lippitudinis, sed etiā sanis, præseruationis gratia ipsum adhibere oportet. Cytinorū, hoc est, florū malī punicæ, qui floribus anemones similes sunt, drac. xxv. acaciæ flauæ dra. xxxv. glaucij drac. xvi. aloës drach. v. myrrhæ troglitidis dra. iiii. atramenti Indici drac. vii. solij malabathri drach. i. omphacij sicci drac. iiii. gummi drac. v. opobalsami ad excipiendū drac. v. Terito cum uino uetere austero. Collyriū ex Bdellio & Styrace concoctorium. Philagrii. Cuius multā experiētiā habeo, non solū probē concoquētis, sed etiā læsiones ex frigore obortas citra inflammationem sanantis. Bdellij drac. vi. thuris masculi drachmas x. myrrhæ drach. x. sarcocollæ drach. v. castorij drac. ii. galbani drachmas v. styracis drac. v. croci drac. v. lycij drac. ii. ammoniaci thymiamatis drac. ii. gummi drac. ii. Excipe aqua.

Collyria ad aspritudines, & extensoria. Cap. cxx.
Collyrium ad aspritudines Phoenix appellatur. Facit & ad milphos, & diuturnas affectiones, & ad eos qui palpebras & angulos exacerbatos habent. Lapidis hæmatitæ usti ac loti drac. xxxii. æris usti ac loti drac. xvi. lapidis scissi usti ac loti drac. xvi. æruginis drachmas sedecim. Cadmiæ racemosæ drachm. iiii. opij drachmas sex, chalcitidis tostæ drachmas quatuor, gummi drachmas xvi. Excipe aqua. Collyrium ad aspritudines Mono inscriptū. Lapidis hæmatitæ sexuncē, lapidis scissi sexuncē, æris usti quadrantem. Cadmiæ lib. i. æruginis rase quadrantem, chalcitidis tostæ unciam unam, opij sextantem, gummi sextantem. Excipe aqua. Est & pueris commodissimum. Collyrium Theophiliū, ad pueros mirificum, & aspritudinibus cōmodum. Cadmiæ lib. i. æris unc. xiiii. æruginis quadrantē, opij lib. i. gummi lib. i. Excipe aqua. Vfus est cum ouo in principio aquosi. In declinatione uero cum ouo crassius illinito. Aliud collyriū, Xyster à deradendo appellatum. Facit ad albugines. Cicatrices attenuat, & oculum imperturbatū conseruat. Ammoniaci thymiamatis, minij sinopici, singulorū quadrantē, cerussæ, gummi, singulorū sextantem, pumicis tostī unciam unā, excipe aqua. Collyriū aliud ad aspritudines. Facit ad milphoses, ulcera, fossulas, ualde uetusta uulnera, staphylomata, myocephala. Lapidis hæmatitæ trientē, lapidis scissi trientē, æris usti trientē, cadmiæ sextantē, æruginis sextantē, chalcitidis ustæ unc. i. opij trientem. Rosas uirides si affuerint, sin minus, siccas, per diē ac noctē aqua macerato, & cum expresso ac excolato cremore terito. Aliud collyrium Xyster appellatum, celebre ad aspritudines. Pumicis usti, ostreorū ustorum, misyos usti, gummi & aqua-

les portiones aqua excipe. Collyrium ad aspritudines Eutonum, ab efficacie pertinacia uocatum. Ex Oribasio, Aeris usti drachm. xiiii. cadmiæ drach. xiiii. æruginis drac. ii. croci drach. iiii. opij drac. iiii. myrrhæ drac. iiii. gummi drachmas nouem. Excipe aqua. Egregiē facit ad asperas palpebras ac callosas, lippitudines scabras, euerisiones, fluxus diuturnos, citra ulcerationē, ammixto cygnario, aut collyrio ex croco, facit ad uigores. Sit autem quod ammiscetur decima ipsius pars. In summa palpebras euertere nō est opus, sed simpliciter illinere. Hoc alij Harmation, id est, currum. Alij opisthobares, à grauitate. Nos autem Eutonū uocamus. Aliud eiusdem, collyriū extensorium, inquit, Gryali, ad aspritudines ex duobus lapidibus. Hematitæ lapidis dra. xviii. scissi lapidis drach. xviii. æris usti drach. ix. cadmiæ drac. ix. æruginis drach. ix. chalcitidis ustæ drac. iiii. opij drac. vi. gummi drac. ix. Tere cum aqua & illine donec tolerarit æger, nō confricans palpebras, neq; subiiciēs specillū, sed per specilli nucleum explens oculum. Aliud eiusdē, ad multas affectiones. Chalcitidis drac. xxvii. cadmiæ drac. xxii. æris usti drach. xvi. lapidis hæmatitæ drac. xiiii. croci drac. xvi. misyos drac. xvi. myrrhæ drachmas sedecim, opij dra. xiiii. gummi dra. xiiii. Tere cum uino uetere. Collyrium ex oleo solij. Facit ad diuturnas fluxiones. Deprimi etiā aspritudines, & oculū corroboret. Syrii sexuncē, æris quadrantē, opij trientem, gummi drac. viii. Foliorū oleæ tenerorū à fibris depuratorū drac. viii. Cum uino spachite teruntur folia exactē fibris exemptis, ita ut per se in mortario biduū probē teras, uinum paulatim irrorans. Quum autē leuissima facta fuerint, es adijcto, & simul diu terito, & sic uinū affundito. Si enim ab initio infusum fuerit uinū, folia innatantia incontrita permanent. Contrito autē ære, syricū adijce, deinde opium, postea gummi, & efforma, ac utere ab initio infundēs. In declinatione uero etiā illinens. Ego uero, uelut Demosthenes iubet, folia in mortario mitto, ac cōtundo, uino sufficiente paulatim instillato, exprimoq; ac excolo, & cum uino excolato reliquatero, retrimento foliorū reiecto. Collyriū Harmation, id est, Currus inscriptum: quo usus est Ptolemæus rex. Exterit cicatrices. Acuit uisum, & ad aspritudines commodum est. Aeris usti ac loti drachm. viii. ammoniaci thymiamatis drachm. viii. corticis thuris drachm. viii. gummi drachm. viii. Excipe aqua. Vfus est cum aqua. Quædam descriptiones habent etiā æruginis drachm. ii. Aliud, ex lapide Hematite, ad uisū acuendū, cicatrices & callos extert. Ammoniaci thymiamatis drac. xiiii. æris usti ac loti drac. xiiii. lapidis hæmatitæ drac. xiiii. æruginis drach. viii. gummi drach. xiiii. Excipe aqua. Extensorium Oribasij. Facit in principijs, & ad chemoses, aquosum cum ouo infusum. Cadmiæ drac. viii. æris drachmas duodecim, croci dra. iiii. myrrhæ drac. iiii. opij drac. vi. lapidis hæmatitæ drac. xviii. lapidis scissi drac. xviii. chalcitidis tostæ drac. vi. æruginis drac. xii. gummi drac. ix. Terito cum uino, & utere cum ouo. Collyrium extensorium Philagrii per se adhibitum, & cum collyrio superscripto Philagrii ex rosis. Aeruginis dra. vi. pumicis drachm. xvi. testarum sepiæ drachm. xvi. gummi drachm. xxxii. His ego inquit adijcio, squam

squamæ æris drach. xvi. ubi fortius ipsum efficere uolueris. Collyrium Rinema, hoc est lima inscriptum. Facit ad callosas affectiones, & cicatrices exterit. Facit etiam ad suffusiones. Cadmiæ drachm. xlviii. ammoniaci thymiamatis drachm. xlviii. opij drach. xvi. lapidis hæmatitæ drach. xxiii. galbani drach. xvi. aloës drach. xvi. opoponacis drac. viii. fellis taurini drach. viii. salis ammoniaci drac. iiii. æruginis drach. xvi. myrrhæ drachmas xvi. gummi drachm. xl. Excipe aqua. Temperatura sit aquosa. Collyrium extensoriū albuginum, per uanam illitionem multā efficaciam ostendens. Facit ad pterygia, & carnis in angulo magno incrementum. Est autem collyriū lene & mordacitatis exors. Conchylj purpuræ carnis ustæ drachmas decem, æris usti drachmam unam, squamæ æris drachm. ii. æruginis drachm. vi. atramenti sutoriū drachm. iiii. aluminis scissi obolum unum, lapidis scissi drachm. i. lapidis hæmatitæ drachmam unam, stercoris crocodili drachmam unam, lycij drachm. i. succi omphacij sicci drachm. v. chalcitidis obolos duos, myrrhæ drach. iiii. thuris masculi obolos duos, corticis thuris drachmam unam, florum mali punice drach. i. Excipe aqua. Collyrium Heliadæ, albugines tollens ualde citò, ut mireris. Lapidis armenij quo pictores utuntur, gypsi, atramenti sutoriū, floris æris, æruginis, testarum sepiæ ustarum, ammoniaci thymiamatis, lapidis magnetis trahentis, lithospermij, gummi æqualibus portionibus utere, & excipe aqua. Aliud quod præparat Petrus Archiathros, & ipsi bonum testimonium præbet. Salis ammoniaci scrupulos sex, lapidis armeniaci scrupulos duodecim, seminis raphani scrupulum unum, seminis uiolæ albæ scrup. vi. ammoniaci thymiamatis scrupulos nouem, gummi scrup. xii. Excipe succo rutæ. Facit & ad suffusiones incipientes. Collyrium Pressum. De quo Apollonius dicit, optimum esse pharmacum ad cicatrices, & superexcrecentem carnem. Et ad asperas palpebras, & sycofes, & euerfiones palpebrarum: calculos item ac grandines, & induratas affectiones, & pterygia, & carnis in angulo magno incrementa, & lippitudines scabras, & pellicularum crassitudines, & multæ ac crassæ fluxionis depurgationem. Sed & aquosum ac multum fluxum cohibet. Consumit autem & depurgat securè, attenuatq; ac exterit sufficienter mordens. Verum oculum imperturbatum seruat, iucundissimumq; ac leuissimum est, & quod debet facit. Est autem hoc, Aeris usti ac loti obol. v. croci drachm. ii. myrrhæ trogloditidis obol. iiii. spicis nardi obol. ii. casie obolos tres, cinnamomi obol. ii. opij obol. ii. piperis grana xv. gummi drac. i. uini Chij aut alterius austeri odorati quod satis est. Quod si ad hanc descriptionem spodij drach. iiii. addere uolueris, ad omnem fluxionem ac lippitudinem optimum euadet. Collyrium Isidori Memphitæ ad acuendum uisum. Inungebam, inquit, non uidentes, & incipiebant uidere. Appellatur Rhinariū, id est, limula. Ego hoc præparauit. Ammoniaci thymiamatis drachm. xvi. æruginis uermiculatæ drach. xii. testarum sepiæ quod molle est, drach. viii. sagapeni drach. viii. opoponacis drachmas duas, succi cyrenalci drachm. i. gummi drac. i. Omnibus aqua prætritris, succi foeniculi drac. xii. adijce, & mellis Attici drac. xii. Et efforma col-

lyrium ac utere. At uero quidam amicus ipsum nunc sic præparat. Ammoniaci thymiamatis unc. xv. æruginis rasæ deuncem, & drac. ii. testarū sepiæ trientem, & uncia dimidium, sagapeni quadrantem & drachmas sex, opoponacis sextantē, succi cyrenalci sextantem. Excipe aqua. Gummi autem non recipit. Aliud, ad uisus hebetudinē, albugines, suffusiones, Harmatium, id est, Currus appellatū. Fellis hyænæ drach. iiii. spumæ nitri drac. iiii. gummi drac. ii. æruginis drac. iiii. sagapeni drac. iiii. galbani drac. ii. ammoniaci thymiamatis drac. ii. baccarū lauri decorticatorum drac. lxx. aristolochiæ rotundæ dra. i. Excipe aqua. Collyrium ad incipientes suffusiones, ut aqua etiā ex auribus fluat, uocatur Aureū. Sagapeni persici puri drac. viii. æruginis drachmas sex, ammoniaci thymiamatis drac. ii. gummi drac. ii. Excipe aqua. Tere & utere aquosum illinēs, & intra quinque dies efficaciam suā tibi comprobabit: splendidā enim reddet pupillā ac claram. Collyrium Martiani, quo inquit, in meipso usus sum ad imminētē mihi suffusionem. Chelidonij capnitidis circa sepes nascentis, rutæ, foeniculi, coriandri, herbas singulas per se exucato & excolato, & de succo uniuscuiusq; quadrantem cōijcito, & opobalsami drac. iiii. mellis Attici drac. iiii. adijcito, ac terito, donec strigmentitiā habuerint spissitudinē, & tunc succi conyzæ tenuia folia habētis uncia unam addito, ac terito. Et ubi probè habuerint ad excipiendū, gummi puri tusi ac cribrati quantū satis est pro tua uelut Medici cōiectura adde quo collyriū fiat, efforma ac utere, ad incipientes suffusiones cum uino. Ad hebetudines uisus cum aqua, illitū autem ad solē locato. Collyriū Proteus. Cui nullū simile est ad initia suffusionis, & ad omnē uisus hebetudinē. Cicatrices etiā ac callos exterit. Cadmiæ drac. x. cerusæ drac. x. piperis albi drac. i. succi cyrenalci drachmas octo, croci drachmas sex, opij drachmas decē, sagapeni dra. xii. lacrymæ oleæ Aethiopice drachmas duodecim, auripigmēti drac. viii. myrrhæ drach. xii. ammoniaci thymiamatis drac. viii. gummi drac. viii. opoponacis drac. xvi. opobalsami drac. xii. Excipe aqua pluuiali. Vfus est cū aqua. Collyrium Hermophili Thalassærum, hoc est, marinum, ad omnē hebetudinē accommodatum, & ad omnem incipientē suffusionem. Estq; odoratissimum. Cadmiæ drach. xvi. æruginis drach. iiii. atramenti Indici drachmas sedecim, piperis albi drac. viii. succi Medici drac. iiii. opobalsami drac. iiii. gummi drac. xii. Excipe aqua, & utere cū aqua. Temperatura diuersa est iuxta affectiones. Collyriū Indicum Regiū inscriptū. Facit ad principia suffusionum, & omnē uisus hebetudinē. Et cicatrices exterit. Cadmiæ ustæ & lotæ lib. i. & trientē, atramenti Indici sexuncē, cerussæ trientē, piperis albi sexuncem, fel hyænæ integrum quantū est, fel scarorū piscium decem, fel perdicū iiii. opij uncia unā, opobalsami sextantē, opoponacis sextantē, sagapeni sextantem, gummi lib. i. Excipe succo foeniculi. Collyriū fuluū Panchreston, ab omnimoda utilitate inscriptum, accommodatū ad scabros ac corrosos angulos, & intentos pruritus, & palpebras ficosas, cadmiæ drac. lxx. chalcitidis ustæ drac. x. piperis albi drac. x. gummi drachm. xl. Excipe aqua. Quidam adijciunt his etiam croci drachmas duodecim, myrrhæ drac. xii. Collyrium psoricum Ptolemæi, accommo-

datum ad scabros ac corrosos angulos, & intentos pruritus, milphoses, hebetudines: Pforici drach. x. l. sandarachæ drac. xxx. chalcitidis ustæ dra. xxviii. croci drac. xxxiii. myrrhæ drac. xii. opij drach. ix. calicæ drach. xii. piperis albi drach. x. l. piperis nigri drach. xvii. omphacij drac. xvi. misyos usti drach. iiii. folij drach. i. gūmi drach. xxxvi. Excipe aqua. Collyriū Hygieni aureū, ad corrosos angulos, & scabras affectiones, sandarachæ drac. xxxiii. piperis albi grana xii. myrrhæ drach. vi. croci drach. vi. gūmi drach. xii. Excipe aqua, & utere cū aqua. Collyrium Diacēton ex Demosthene, Aeruginis obol. iiii. misyos tantundē, succi papaueris tantundē, gummi drach. iiii. Excipe aqua. Facit ad prædictas affectiones, & ad uisus hebetudinem, & incipientes suffusiones. Attenuat etiam cicatrices. Sit autem calidum. Collyriū Stratiotæ compositio hæc est. Cadmiæ drach. viii. cerusæ drach. xvi. piperis albi drac. ii. æruginis, opij, omphacij, singulorū drach. ii. gūmi drachm. iiii. Facit etiam ad asperas palpebras. Collyrium extensoriū. Aeris usti, croci, ammoniaci thymiamatis, singulorum sextantem, gummi unc. i. Excipe aqua. Facit ad oculos purulentos, argema, nubeculas, caligines. Ad aspritudines uero cum melle. Collyrium celebre, priuatim ad cicatrices in oculis faciens. Facit etiam ad uisus hebetudines, aspritudines & pterygia. Testarum sepia, pumidis, squamæ æris, ammoniaci thymiamatis, æruginis, cornu ceruini usti, singulorū lib. i. myrrhæ sextantem, thuris sextantem, opij quadrantem, gummi bessem, ossium palmularū ustorum dextantē, mellis sextantem. Excipe aqua. Hoc præparabat Afer, & ualde ipsi confidebat. Nominabat autem ipsum Phœnicem nigrū, eò quod ossium ustorum palmularum, (quæ phœnices appellantur) dextantem recipit.

Collyria enstacta, hoc est, instillatitia appellata.

Cap. cxi.

Collyrium instillatitiū Pacclanum appellatū, cadmiæ drac. lxxiii. misyos dra. xxxii. stibij dra. xxxii. atramenti sutorij dra. xxxii. piperis albi drac. xxxii. æruginis dra. xvi. opij drac. xvi. opobalsami drac. xvi. gūmi drac. lxxiii. Excipe aqua pluuiali. Facit ad acuendū uisum, & callos exterit. Collyriū Aromaticū inscriptum, Aeris usti drach. xvi. æruginis dra. iiii. myrrhæ dra. iiii. spicæ nardi dra. ii. piperis albi drac. iiii. opij drac. iiii. croci drac. iiii. opobalsami drac. ii. gummi drachm. iiii. Excipe aqua. Aliud instillatitium nō perturbans, Oribasij. Cadmiæ drach. xvi. cerusæ drach. viii. opij drachm. iiii. opobalsami drach. iiii. æruginis dra. ii. omphacij drac. ii. piperis albi drach. ii. gūmi dra. v. Aliud instillatitiū, uisum acuens, cadmiæ ustæ, & urina pueri extinctæ drach. x. stibij dra. vi. atramenti sutorij sesquidrach. æruginis sesquidrachmā, piperis drac. ii. misyos drach. ii. opij drach. i. opobalsami drach. i. gummi drac. vi. Excipe aqua. Aliud nigrū, uisum acuens. Facit & ad corrosos angulos. Stibij usti ac loti drac. x. l. acaciæ drac. x. l. gummi drac. x. l. cadmiæ drach. xvi. nardi celticæ drach. viii. myrrhæ drachm. viii. croci drachm. viii. omphacij drachm. vi. opij drachm. vi. Excipe aqua.

Collyria ex cornu ceruino.

Cap. cxii.

Collyriū Asclepiadæ ex cornu ceruino. Ad ulcera, & pustulas, & cicatrices exterit. Cornu ceruini usti ac

loti drach. iiii. plūbi usti ac loti drach. iiii. squamæ æris lotæ drac. ii. thuris dra. iiii. opij drachmā unā, gummi drach. iiii. Excipe aqua. Aliud, ad calidiores affectiones, & acerrimas fluxiones cum ulceratione. Cornu ceruini usti ac loti drachm. xvi. spodij pompholygis lotæ drac. viii. squamæ æris drac. ii. croci drac. ii. acaciæ drach. viii. thuris drac. viii. opij drac. ii. myrrhæ drach. i. gūmi drac. viii. tragacanthæ dra. i. amyli drac. iiii. terito cum hyoscyami cremore. Collyriū ex cornu ceruino, uelut Oribasius habet, maxime quidē ad ulcerationes in uigore, clauosq; ac staphylomata, & huiusmodi omnia, ut non simul sint palpebræ densatæ. Et ad ulcera ægrè recipientia cicatricē, & resolutas cicatrices. Cadmiæ drachmas sex, acaciæ drach. x. l. stibij drachm. xxxii. plumbi usti ac loti drac. viii. cornu ceruini usti ac loti drach. viii. gummi drach. viii. æris dra. xvi. opij drachm. xvi. myrrhæ drachm. iiii. thuris drach. iiii. Excipe aqua. Vtere uerò ad caua ulcera cum lacte ad sordida, cum succo fœnigræci. Aliud collyrium è cornu cerui, efficacissimè exterit cicatrices in oculis, cū aqua illitum. Vtere etiā ad exulceratos oculos, cum ouo instillans. Aeris usti ac loti deūcem, & scrupul. vi. cornu ceruini usti ac loti tantundem, stibij loti sextantem, & uncia dimidiū, testarum sepia trientem, & uncia dimidiū, æruginis sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem, & uncia dimidiū, myrrhæ sextantē & uncia dimidiū, thuris sextantem & uncia dimidiū. Opij sextantem & uncia dimidiū, acaciæ quincuncem, & scrupul. xv. gummi deuncem. Excipe aqua.

Collyria Nardina ex Theodotia. Cap. cxiii.

Collyrium nardinū Zoili, ad ueteres lippitudines, & myocephala, & ulcera uetera ac staphylomata. Cadmiæ dra. viii. æris usti dra. viii. stibij dra. viii. cerusæ dra. iiii. castorij dra. iiii. spicæ nardi sesquidrachmā, aloës sesquidrachmā, folij, croci, chalcitidis tostæ, atramenti sutorij, lycij Indici, opij, singulorum drac. i. myrrhæ drac. i. acaciæ drac. x. gūmi drac. x. Excipe aqua. Collyrium nardinum Candidi leuissimum ac ualidissimè resiccans. Facit ad myocephala & staphylomata mirificè, & maxime glaucis oculis conuenit. Vtere etiam in his qui nullam omnino collyrij mordacitatē sustinere possunt. Cadmiæ ustæ & lotæ lib. i. cerusæ septuncem, stibij loti sextantem, croci trientē, myrrhæ troglodyticæ trientem, aloës unc. i. acaciæ unc. i. opij sextantem, spicæ nardi unc. i. gummi bessem. Excipe aqua. Theodotium nardinū. Culus multā experiētiam habemus in myocephalis, & diuturnis ulceribus oculorum, & confusionibus. Maximum extensorium est & uementer corroborat debiles oculos. Cadmiæ lotæ, stibij loti, acaciæ, gummi, singulorum drach. x. v. rosarum siccarum depurgatarū drach. xii. æris usti loti drach. viii. myrrhæ troglodyticæ drach. viii. castorij, lycij Indici, croci, folij, spicæ nardi, chalcitidis tostæ, cerusæ, glaucij, seminis ericæ, opij, gallarum omphacinarum, singulorū drach. ii. Excipe aqua. Vtere in principijs cum ouo instillans. In deditionibus cum aqua. Collyrium Nicariū Zoili, ex lacte nardinum. Ad affectiones & fluxiones diuturnas, ulcera, fossulas, myocephala, staphylomata, ueteres lippitudines. Tingit etiam cicatrices, & ipsas incōspicuas facit. Cadmiæ ter ustæ & muliebris lacte

& extinctæ ac lotæ drach. c. viii. stibij usti ac muliebris lacte extincti ac loti drach. x. æris usti et extincti ac loti drach. xx. cerusæ lotæ drach. xxiii. myrrhæ drach. xii. opij drach. xii. spicæ nardi drach. xii. aloës drach. iii. acaciæ drach. c. viii. gūmi drach. c. viii. Excipe aqua. Collirium Hygidium, quod quidā Ammonij dixerunt. Facit ad incipientes suffusiones, & inustiones. Et ad omne ulcus, & oculos purulentos, confusiones, chemoses, prolapsus, & ad diuurnam myocephala, staphylomata, unguis ulceris genus. Repurgat, replet, & ad cicatricem perducit. Eos uero qui ob aliquā causam, aut propter capitis aut oculi dolorē, dormire nō possunt, præclare ad somnū perducit, uelut somniferū medicamentum. Vtere cū ouo, aut lacte, aut aqua, tēperatura sit mediā aut crassior, pro sensus ægrorum subtilitatē. Habet autem hoc modo: Cadmiæ lotæ drach. xvi. cerusæ lotæ drach. xvi. castorij drach. vi. nardi Indici drach. iiiii. stibij loti drach. x. æris usti loti drach. xv. rosarum drach. xx. squamæ æris ustæ drach. v. Aloës drach. vi. casia drach. iiiii. myrrhæ drach. vi. lycij Indici drach. iii. lapidis scissi loti drach. iiiii. & dimidiā, croci drach. vi. plumbi usti ac loti drach. viii. & dimidiā, opij drach. iii. acaciæ drach. xl. gummi drach. xl. Excipe aqua. Est ex ualde celebribus. Collyrium Indarium: Piperis drach. ii. cadmiæ drach. iiiii. costi drach. i. stibij drach. viii. gallarum drach. iiiii. spicæ nardi drach. iiiii. nardi drach. iiiii. acaciæ drach. iiiii. gūmi drach. iiiii. opobalsami drach. ii. Excipe aqua. Facit ad uisus hebetudinem. Exterit etiā cicatrices. Collyriū Theodotiū Pacclanū. Facit ad maximos humorum illapsus, et doloris molestias. Liberat citra penæ sectionē. Cadmiæ ustæ ac lotæ drach. viii. æris usti ac loti drach. viii. stibij loti drach. xvi. croci drach. iii. castorij drachm. iiiii. æruginis drach. i. aloës drach. iiiii. myrrhæ troglodyticæ drach. iii. lycij Indici drach. ii. opij drach. ii. acaciæ drach. xxiii. gummi drach. xxiii. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura sit crassior. Collyrium, quod tumorē laxum palpebris inducit, appellatur Testamentū Aurifabri, reliquit hoc moriēs templo Ephesio dicatū, quō hī qui à Medicis relicti essent, in tēplo sanitatem cōsequerentur. Inuentum est autē ab Adriano Cæsare. Facit ad humorum illapsus, & aspritudines, & ad omnes desperatas affectiones, pustulas sanat, caua ulcera explanat, cicatrices incōspicuas facit, oculum imperturbatum cōseruat. Instillatur cū ouo aut lacte, prout necessitas expetit. Sit autem in omnibus dilutū aquosum. Optimū est infusum per ad acūdum uisum. Habet hoc modo: Cadmiæ lotæ drach. viii. stibij loti drach. xvi. spicæ nardi drach. iiiii. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. croci drach. i. castorij drach. ii. squamæ ferri stomomatis drach. iiiii. æris usti ac loti drach. xii. æruginis drach. ii. cerusæ drach. iii. piperis lycij, Indici, opij, thuris, opobalsami, casia sing. dr. ii. lapidis scissi drach. iiiii. æruginis uermiculatæ drach. iii. atramenti futorij drach. ii. succi foeniculi drach. iiiii. fellis capræ drach. iiiii. gummi drach. viii. Terito cū uino Aminæo aut Falerno, aut alio austero ueteri odorato. Collyriū Testamentū, uelut habetur apud Asteriū. Cadmiæ drach. lxx. stibij drach. lxxii. myrrhæ drach. v. & dimidiā, spicæ nardi drach. x. croci dr. x. castorij drach. vii. squamæ ferri stomomatis drach. xiii. folij drach. xiii. æris usti drach.

v. & dimidiā, piperis drach. vii. cerusæ drach. xiii. lycij, thuris, casia, opobalsami, singulorum drach. xiii. opij drach. vii. lapidis scissi drach. xiii. æruginis uermiculatæ drach. viii. atramenti futorij drach. xiii. gummi drach. lxx. succi foeniculi drach. xiii. fellis caprini drach. xiii. Terito cum uino aminæo.

Collyrium Theodotiū Magnum, Cadmiæ lotæ bessem, æris loti bessem, stibij loti uncias xxv. rosarū siccarū, cerusæ, chalcitidis, gallarū, æruginis, lycij Indici, croci, aloës, spicæ nardi, myrrhæ troglodyticæ, ramentorū ebeni, castorij atramenti Indici, thuris, opij, sarcocollæ, pōpholygis, singu. unc. i. cornu ceruini usti ac loti unc. i. acaciæ unc. xxv. gūmi unc. xxv. Excipe aqua. Quidam uero etiam folij uncia unam adijciunt, & amomi unc. i. rosarū uerō quadrantem, gummi uero & acaciæ, singulorum unc. xxiii. Reliqua autem eodem modo. Facit ad incipientes lippitudines, & exulcerationes omnes, & fluxum recentem, ac ueterem, inflammationes, carbunculos, oculos purulentos, nomas, puncturas, prolapsus, myocephala, staphylomata, palpebras asperas, & ad desperatas affectiones. Et ad ardores solis, aut caldis, aut pulueris, aut similis rei. Tollit etiā pterygia inflāmata cū butyro. Ad ulcera uero cū ouo adhibetur. Ad maligna autem cum lacte muliebris. Theodotium Seueri. Aliud quoddā collyrium etiā apud nos reperitur, inquit Seuerus, à ueteri quoddā descriptum. Et hoc quidem cōpositā materiā habet, uerum efficaciam diuersam. Nam omnibus simul relatis collyrijs cōmodius cōpertum est. Quare etiam ipsius præparationē referre necessarium puto, quū neq; oibus hoc sit notū. Recipit autē cadmiæ drach. xxiii. æris usti drach. xii. stibij drach. x. cerusæ drach. viii. chalcitidis tostæ drach. iiiii. misyos tosti drach. iiiii. ramentorū ebeni drach. ii. nardi Celticæ drach. iiiii. folij drach. iiiii. spicæ nardi drach. iiiii. croci drach. iii. castorij drach. vi. aloës drach. viii. lycij Indici drach. iiiii. rosarum siccarum drach. iiiii. gallarum drach. ii. opij drachmas ii. myrrhæ drach. viii. acaciæ drach. xl. gummi uermiculati drach. xl. Cadmiā prunis obruimus, & uentilamus, & ubi ignita facta fuerit, ablatam lacte asinino extinguimus. Subium uero in fictile uas coniectū, addito operculo, foramen habente urimus, & similiter lacte extinguimus. Vsa uero singula per se tusa ac cribrata lauamus, & diligenter siccamus, & deinde pōderata ad præparationem adijcimus. Ceterū gummi nō cōtulum inspergimus siccū, sed madefacimus: sic enim neq; lignosum quiddam, neq; arenosum, cū ipso penetrabit dum excolatur, & optima coactio collyrij fiet. Quidam ad relatā præparationē adijciunt etiā costi drach. viii. Et magis ita cicatrices exterit, inquit, & pterygia ac carnis in angulo incrementū consumit. Verū ad inflammationes & ulcera incommodus est coctus. Huius igitur auxiliij actiones ac efficaciam dicere non est facile. Audiētes enim uix crediderint. Nā desperatas affectiones ad naturalem statum reuocat. Et ut in summa dicā, omnia quæ Theodotij appellatis nardinis, & his quæ ex cornu ceruino parantur adsunt, multo plus in hoc comperiuntur: in recentibus enim affectionibus eo illito, & spongia oculo imposita, ægrum ab affectione liberauimus. In diuurnis autem ac desperatis, partim instillantes, partim illinentes, scopum attingimus. Nam in facili so-

lubilibus oculi affectionibus ipsum illinimus. In ca-
uis autem & sordidis ulceribus, diluto ipso utimur
cum ovo aut foenigræci succo. Quandoq; etiã cum
aqua mulsa. In myocephalis autem, crassius cū aqua
sublinimus per sublectionem. Sed & cicatrices simi-
liter attenuamus. Ad tantam autem tenuitatē perdu-
cit cicatrices, ut penitus nō cognoscatur per sensum.
Et in summa, inenarrabilem quādam uim possidet.
Etenim in staphylomatis, brassicæ succo dilutū col-
lyrium, & crassa copia oculo adhibitum, unā cū spō-
giæ deligatione, molem inconspicuam facit. Quin
& carnis in angulo magno incrementum consume-
re potest hoc collyrium tenuiter tritum, & in siccū
puluillum redactum, itemq; pterigia attenuare. Sed
& ad alia mirificum compertum est collyrium. Et

nos quoque permittimus posteris per experientiam
deductis, ut auxilio testimonium præbeant. Eā-
nīm quidam ad diuturna ulcera ac fistulas sedis ipso
usi, scopum auigerunt. Vnde non absurdum fuerit
etiā ad polypos ac ozaenas narium ipsum adhibe-
re. Collyrium ex succo foeniculi. Cadmiæ dodra-
tem, stibij bessem, misyos crudi sexuncem, æruginis
sexuncem, piperis quincuncem, atramenti futorij
sexquunciam, chalcididis unc. x. croci sesquunciam, fo-
lij unc. x. omphacij sesquunciam, spicæ nardi trien-
tem & uncia dimidium, opij quincuncem, & unde
dimidium, opobalsami trientem, gummi sextantē,
succu foeniculi bessem. Et rursus aliud foeniculum in
aqua pluuiali decoquito, & cum decocto illa terito
ac efformato. Hoc à multis præparatur.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN OCTAVO SERMONE AETII HABENTVR.

AD superciliorum ornatum. Cap. i.
De hypopijs, hoc est, ijs quæ sub
oculis fiunt suggillationibus. cap. ii.
Vingenta præseruantia faciem ne à so-
le aut uento exuratur. cap. iii.
Vt ne rugosa fiat facies. cap. iiii.
Ad faciei nigredines. cap. v.
Smegmata & medicamenta faciem niti-
dam reddentia. cap. vi.
Cataplasmata aestiua, odorum corpus
reddentia. cap. vii.
Potiones ad eos qui tetrum habent cor-
poris odorem. cap. viii.
Ad menti scabricem. cap. ix.
Ad faciei lentigines remedia, quibus et-
iam ad maculas à sole prouocatas,
& ad uaros uti licet. cap. x.
De maculis à sole prouocatis, quas Gre-
ci ipnidas appellant. cap. xi.
De stigmatis siue notis ex plaga illatis.
cap. xii.
De uaris faciei, qui tum Ionthi, tum A-
cne Græci uocantur. cap. xiii.
De ficosis faciei tumoribus. ca. xiiii.
Ad manantes menti papularū eruptio-
nes, ex Critone. cap. xv.
De impetiginosis tum menti, tum reli-
qui corporis tumoribus. cap. xvi.
Ad molestum oris odorem. cap. xvii.
Ad labiorum fissuras. cap. xviii.
De dentium affectionibus. cap. xix.
Ad inflammatas gingiuas. cap. xx.
Ad cruentas gingiuas. cap. xxi.
Ad excrecentes gingiuas putrescen-
tesq; ac tumentes. cap. xxii.
Ad corrosas & ab ulcere serpente in-
festatas gingiuas. cap. xxiii.
Ad parulidas, hoc est, gingiuarum inflā-
mationes. cap. xxiiii.

De epulide, hoc est, excrecenti gingi-
uarum carne. cap. xxv.
De gingiuarum fistulis. cap. xxvi.
Cura dentium à calido morbo doloroso
affectorum, ex Adamanto sophista.
cap. xxvii.
Cura eorum quibus ex frigidityte den-
tes dolore afficiuntur. cap. xxviii.
Cura dentium ab humiditate dolore affe-
ctorum, & laxatorum. cap. xxix.
De dentibus lima atterendis. ca. xxx.
Cura dentium à siccitate dolore affecto-
rum. cap. xxxi.
Cura dentium ob caliditatem & humi-
ditatē dolore affectorum. cap. xxxii.
Curatio erosorum dentium. cap. xxxiii.
Vt dens citra dolorem, & absq; ferro
tollatur. cap. xxxiiii.
Smegmata uaria ad denigratos liuen-
tesq; ac rarefactos dentes. cap.
xxxv.
De ancyloglossis, & qui uix loqui pos-
sunt. cap. xxxvi.
Ad ranunculū sub lingua. ca. xxxvii.
Ad linguā inflāmatā, desquamatā ac
tumore inflatā. cap. xxxviii.
Ad aphthas, hoc est, oris ulcera. cap.
xxxix.
De gurgulionis affectionibus. cap. xl.
De ablatione columnellæ. cap. xli.
De oris inflammationibus. cap. xlii.
Illitiones ori commode. cap. xliii.
Summaria doctrina de usu omnium illi-
tionū ad os apparatarū. c. xliiii.
De tōsillarū inflāmatiōibus. cap. xlv.
De crustosis & pestilentibus tonsilla-
rum ulceribus. cap. xlvi.
De āgina, et eius speciebus. ca. xlvii.
De glandulis. cap. xlviii.

De suffocatore uocacione. cap.
xlix.
De deuoratis in tōsillas spinis atq; his
quæ in asperam arteriam delabun-
tur. cap. l.
De arteriarum pharmacis. cap. li.
Ad inueteratas affectiones uariæ arte-
riacæ. cap. lii.
De destillatione siue catarrho, & na-
rium muco. cap. liii.
De tussi. cap. liiii.
De pharmacis dolorem leuantibus &
conferentibus tussi. cap. lv.
De suffitionibus. cap. lvi.
De orthopnoicis, anhelosis, & egrē
spiritum ducentibus. cap. lvii.
De cordis tremoribus. cap. lviii.
De sanguinis reiectione. cap. lix.
Curatio eorum qui ob destillationē
sanguinem expuunt. cap. lx.
De his qui ob frigiditytatem organorum
respirationis sanguinem expuunt.
caput lxi.
Curatio eorum qui iuxta alium quem-
cunq; tandem modum sanguinem ex
pulmone reiectant. cap. lxii.
Communes methodi exhibendorū au-
xiliorū in singulis reiectionis san-
guinis speciebus post sanguinis in-
hibitionem. cap. lxiii.
De asperæ arteriæ ulceribus. cap.
lxiiii.
De pectore suppuratis. cap. lxv.
De peripneumonicis. cap. lxvi.
De phthificis seu tabidis. cap. lxvii.
De pleuritide seu laterū morbo. cap.
lxviii.
De ea quæ pleuritis esse putatur, quā
tamen non sit. cap. lxix.

AETII

AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI SECVNDAB

SERMO QVARTVS, ET EX
ORDINE OCTAVVS.

*

*De faciei, oris, & tonsillarum affectionibus: Cui annexum est, De destillatione, & tussi,
aspera arteria, pulmonis, ac thoracis affectionibus.*

AD SUPERCILIORVM ORNA-
TV M. Cap. I.



QUANTVM quod ad hanc rem attinet, iam antè à nobis dictū sit, ubi de defluuio capillorum capitis, Sermonē sexto mentionē fecimus, dicemus tamen & hic nō importunè, sed ut habet, paucis. Illitio augēs

superciliorū capillos, atq; etiam aliarū corporis partium, eadē etiā eisdem nigros reddit. Nucū ponticarū interiora in uase figulino torrefacta contere, & pinguedine caprae syluestris excipe, atq; cū hoc ipso partes inūgi pręcipe. Aliud. Adiatū unc. i. ladanī sextātem, palsi cretici heminā unā, cōtunde ac subiuge cū passo: deinde torre, ut dictū est, ac rursus cum pingui caprae syluestris, aut ursi cōtere, & utere. Potes & huc accommodare ea, quorū meminimus Sermonē vi. Itē ex armeniaco lapide, de quo Sermonē ii. cap. xii. diximus, sicco trito supercilia inspge.

*De hipopijs, hoc est, his quæ sub oculis sunt
sugillationibus.* Cap. ii.

QUOD hipopia sub oculis fiant, ipsum nomen indicat: siquidem hypopium Gręcis hypophthalmiū significat, quod Latinis, sub oculis sonat. Sunt autē hypopia ex genere suffusionū sanguinis in locum contusum: fiuntq; ex plaga, quum tenuibus sub cute uenulis contusis, sanguis per fissuras sub ipsam cutē, affatim effunditur, neque id uno loco. In grumos enim coit statim, & liuet locus, progressuq; tēporis nigrescit. Quare medela occurrendum est, antequā nigrescat, cura potissimum ad hoc adhibita, ut coactus sanguis discutatur. Quod si tunícula quoq; rumpatur uenularū, ex quibus effunditur sanguis, miscendū est his quæ discutiendi uim obtinent, parum quiddā ex cōstringentibus. Nā si in principio sola discutientia exhibeantur, nō tantū id quod effusum est discutient, sed per ipsas uenarū contusarū fissuras amplius quiddā elicient ex sanguine in ipsis uenis contento. Quum uero in naturam suā redierint uenulae, etiā citra admixtionē cōstringentiū, ad discussoria trāseundū. Atq; ego sanè in principio utor Nil ex rosis collyrio, ex eo in aqua dissoluto, locū sugillatū illinens. Vtor autē pro fomēto, decocto melliloti & fœnigræci. Deinde collyrium quoq; in eodem decocto dissoluo, aut etiam in solo fœnigræci decocto. Quod si reliquę quēdā restiterint ipsius affectionis, dissolutis ex myrrha collyrijs in fœnigræci decocto, illino bis in die, prius tamen cum spōgia in decocto madefacta loco foto. Idē præstat in principio, nō præsentē ex rosis collyrio glauciū illitum, & sex olei coquēdo cōdensata. Inueteratū autē iam

malū ex sandice collyria tollūt, & quæcūq; præclarè omnino discutunt, qualia Diosco. inter facile parabilia enumerauit. Ea enim quæ sub oculis fiūt sugillata, inquit, & liuores iā inueteratos tollūt, raphani cortex cū melle illitus, bryoniæ radix uino aut cerato excepta, bulbus cū uitello oui impositus, aqua marina calida pro fomēto, aut muria uel salugo, caesus antiquus cū decocto hyssopi impositus. statim autē tollit sepiæ testa cū aceto illita, sinapi cerato exceptū, cucumeris syluestris radix cōtrita cū melle, lini semen cōtricum cū lacte. Critonis compositio. Ad liuores alē infixos. & ea quæ sub oculis fiūt sugillata, seminis uiticis albi drach. iiii. radice herbæ lanariæ siue radiculæ drach. tres, nitri rubri, corticis raphani, hyssopi, farinae fabarū, uniuscuiusq; drach. tres, mirobalani drachm. x. cineris pulmonis agni exusti drach. x. bulborū rubrorū drach. x. radice capsia aut succi drach. x. corticis thuris drach. unam: excipe cerato ex oleo rosaceo apparato, ac lincolo infariū impone. Oportet autē assidue amouere, cum cautione, ne locus exulceretur. Ego autem expertus sum, nucem pingue, uetustate rancidam, certissimū ad liuores remediū. Porro reclinato ac supino remedia adhibere conuenit, ut adhæreant spatio horarum trium quā optime contrita.

*Circumlitiones præseruantes faciem, ne à sole aut
uento exuratur.* Cap. iiii.

Circumlitio faciei, quæ aurea appellatur: Lupinorum siccorum sextarios iiii. aquæ pluuialis sextar. xiiii. inijce in uas æreū stāno obductū, sinasq; madefieri per triduū: quarta autē die decoque ad prunas usq; quò dissoluantur lupini: deinde per colū exprime liquorē, ac eū seorsim decoque, atq; ubi condensatus fuerit, in uas uitreū repone. Vbi uero uti uelis, quantum satis uidebitur accipe, & cū eo in modica aqua dissoluto faciē illine. Alia ualde laudata: Similaginē lorā & per pānū percolatā sinas desiderē, aquāq; abijce, fecem autem cum albumine oui permisce, donec mellis crassitiē accipiat, & cum hoc faciē obline uersaturus in sole: quum uero à sole recesseris, frigida multa ablue. Alia. Boni coloris faciē hæc reddat, atq; itē uniuersum corpus. Mastichē cū oleo omphacino dissolutā circūline: aliquādo autē & olei loco medullam ceruinā, aut uitulinam accipimus: aliquādo ceratū liquidum. Alia. Cupressi ac ilicis scobem in oleo decoctā oblini. Alia. Solani succum cum oleo illine. Alia. Nuces pineas cum modico aceto cōtere, adiecto melle sufficienti, ac oui crudi uittellis, atq; hoc ipso faciē oblini: neq; refert etiā si citra acetū eo utaris. Alia. Hęc in æstate conuenit, faciē præseruās: tragacanthi, ammoniaci thymiamatis, costi contusi, cuiusq; sextantem, aluminis liquidū drachmas

chmas III . thuris sextantem, amyli sexuncem, oua cruda recentia XIII . mellis libras tres, mulsi sextarios tres. Tragacanthū, ammoniacū, & thus in mulo madefieri per noctē unam, in uase uitreo finito: oua autē integra in acetū uetus & acre prosecta, per triduum macerato: alumē uero optimē lauato: dein de omnia simul in mortariū fictile coniecta ac diligenter cōmixta, melle cocto excipito, atq; utere, faciem ex eis oblinendo. Ante ingressum uero balinei medicamentum hoc tollatur, atq; id particulatim auellere conuenit leni tractu ex facie induratum: dein de aqua tepida abluere, & spongia abstergere: quod ubi factum est, manna thuris in albumine oui dissoluta, faciem illinito.

Vt ne rugosa fiat facies. Cap. IIII .

Faciem corrugatam extendit medicamentum hoc: cornu cerui non antiquū in aqua decoque, donec succulentum quid remittat, percola deinde ipsam aquam, & cū ea farinā fabaceā subige, ac pastillos informa, eosq; in umbra exicca. Vbi autem usus postulauerit, quantum opus fuerit in aqua dulci dissolue, ut cerati liquidi crassitiem accipiat, & cum eo faciem oblinere sube, atq; cum adglutinatum fuerit, faciem aqua tepida abluere præcipe.

Ad faciei nigredines. Cap. V .

Ad faciei nigredines his utendum est, iridis contritæ, farinæ prissanæ, farinæ fabaceæ, cuiusq; sextarium unū & dimidiū, salis ammoniaci, cornu cerui usti ammoniaci, thymiamatis, cuiusq; sextantem, in aqua dissolue, & pastillos informa, quos in umbra exiccatos adserua, atq; usus tempore, in aqua resolutos ante balineū faciei illini. Aliud. Farinæ prissanæ, thuris, iridis, farinæ fabarū, farinæ erui, spumæ niteri, costi, cuiusq; choenidis partē quartam, amygdalas amaras XX . informa cum cādido ouorū & lacte asinino, exicca in umbra, ac utere ut dictum est.

Smegmata & medicamenta faciem nitidam reddentia. Cap. VI .

Quandoquidē post unguentorum ablationem pleriq; faciem extergere conantur, utendū ad hanc rem cōpositionibus infra scriptis. Smegma illustriorē reddens faciem. Amygdalas decorticatas XL . thuris, spumæ niteri, gummi cuiusq; drachmam unam, farinæ fabaceæ drachmas XII . excipe oui candido, & in pastillos digere, quibus cum aqua solutis, passim tum in balineo, tum citra balineū utaris. Aliud. Smegma faciei celebre & admirandum, quod & faciem illustriorem reddit, & rugas expolit, asperitates pellit, incipientem elephantiasin arcet, si quidem cū alijs remedijs adhibeatur: usus eius etiam reliquo corpori cōueniēs est. Mastiches, thuris, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; uncia unam, tragacanthi sesquiclam, succi uuæ acerbæ immaturæ dodrantem, seminis peponis unā cum concluso in ipso humore dextātem, cādidi ouorum XXI . similaginis sextarios quinque: contunde omnia, ac cum candido ouorū, & humore peponis, succoq; uuæ acerbæ commisce, & in pastillos redige, ac exicca, post uero contusos ac attritos, in uase uitreo ad usum adserua. Smegma faciei, quod simul & ipsam rubicundam reddit. Farinæ erui, fabarū, lupini, prissanæ, ciceris, bulborum narcissi, cuiusq; sextarii Italici dimidiū, similaginis sextarium unum, contunde ac cribro tenuissimo excute: deinde oui candido commixta, in pastillos

digere, & in umbra desicca. Vsu uero expetēte, quantum libet accipe, & in aqua dissolue, atq; à balneo utere. Aliud faciem illustrans, & uniuersum corpus: dissolat autem & rugas, & cutem depurgat. Vitis albæ radicem delibra, ac in sole æstiuo exicca, deinde contusæ ac cribratæ Italici choenidis dimidiū accipe, iridis contusæ tantundem, myrobalani siccae decorticatæ tantundem, farinæ fabaceæ choenice unū: hæc in uino ueteri odorato subacta, in pastillos digere, quos in umbra exiccatos adserua: & usu expetente, contusis & cribratis cum aqua utere.

Aliud Cleopatrarē reginæ odoratum & preciosum. Costi, myrrhæ troglodyticæ, iridis, spicæ nardi, amomi, folij malabathri, cassiæ, floris iunci odorati, cuiusq; unc. I . Myrobalani lib. IIII . spumæ niteri lib. I . cōtundito, cribrato, utitor. cōfert uniuerso corpori. Aliud efficax & odoriferū. Floris iunci odorati, iridis cuiusq; drach. II . mastiches drach. I . contempe, & cum succo prissanæ crassissimo pastillos forma, & in umbra desicca. Vbi uero usus expetit, in aqua dissolutos illinito, & post horē spatium frigida abluito. Aliud, splendidam & erugatam reddens faciem, ac totum corpus: Farinæ fabaceæ Italici modium unum, similaginis Italicos sextarios quatuor, trifolij cōtusi sextarios quatuor, myrobalani tantundem, iridis contusæ tantundem, ammoniaci thymiamatis libram unā, costi tantundem, cādidi ouorum recentium crudorum sexaginta, seminis peponis unā cum humore choenice unam, succi uuæ acerbæ tantundem, subige & informa pastillos, quos sufficienter in umbra exiccatos à balneo illine. Præclarè facit, & ad eas quæ in collo sunt & reliquo item corpore nigredines. Aliud ad faciei nigredines, multo usu exploratum. Thuris sesquiciam, cerusæ probè lotæ, spumæ argenti in decocto cicerum alborum, ad solem frequenter ablutæ, amyli recentis, scobis marmoris albiissimi, mastiches puræ, spumæ niteri albensis, testarum sepiæ, singulorum unc. unā, saponis Gallici unci. duodecim, cādidi ouorum decem, appara, & utere, ut dictū est. Aliud mirabile faciem depurgans & illustrās. Farinæ foenigræci trientē, terræ Samiæ quæ Aster appellatur, quadrantē, amyli trientē, mastiches sexūcē, medullæ ceruinæ recentis sex uncem, tragacanthi trientem. Tragacanthū in lacte muliebri, aut asinino macerato, ac cum eo dissoluto, reliqua tenuissimè trita in pastillos digerito, quibus in umbra desiccatis, ut prædictum est utitor. Aliud smegma. Ricini seminis interioris dra. VIII . bulborū narcissi siccorū ac decorticatorum dra. VIII . similaginis dra. IIII . thuris dra. II . cādidi ouorum VIII . appara ut dictū est, & utere. Sapo quo usa est Pelagia patricia, ad faciem illustrandam. Saponis Gallici sexuncem, cerusæ sextantem, mastiches uncia dimidiū, medullæ cerui unc. I . spumæ niteri albæ trientem, ceræ albæ quadrantem. Præmacera saponem in aqua in uitreo uase ad dies V . aqua pluuiali quotidie permutata, & sapone excolato. Postea in ollam nouam immitte saponem, & sexta die rursus affusa pluuiali aqua, ad lentas prunas decoque, donec sapo dissoluatur. Deinde ceram & medullam adde, & ad dissoluta mastichē & spumā niteri insperge, olla amota, et assiduè per spatium commota. deinde etiam cerusam modica aqua trita adde, & medicamentū in testā

missum

missum contentè manu subige, & reposito in uitreo uase utere uelut dictum est. Smeagma ex Ruffi libris, ad totius corporis erugationē. Ficus pinguisimas, uitis albę radicem siccā delibratā, sepiaē testā uisam, farinā eruit: unumquodque seorsim contunde: dein de etiam simul, & modico adstillato melle, utere. Aliud smeagma, quod uniuersum corpus odore imbuat. Terræ cimoliæ bessem, iridis tenuissimè tritaē drach. xxiij. nardi Celticæ drach. xxiij. cyperī, cardamomi, styracis flauī & pinguis, cuiusq; drach. xij. styracē in uino ueteri odorato dissolue, & in prōpitiu habet: terrā uero cimoliā in fictile uas cōlectā carbonibus impone, atq; ubi satis cāduerit ab igne, eā ad dissolutum styracē inijce, deinde reliqua sicca tenuissimè trita insperge, ac simul sufficiēter unita in pastillos digere, quibus in umbra exiccatis, post uero tritis & cribratis utere.

Cataplasmata æstiuā, odorum corpus reddentia.

Ex Critone.

Cap. vii.

Quū sudores corpus uexāt, magna oboritur ex eis molestia, præsertim in æstate. Nā & sordes multas inuehunt, & tetrum odorē de se præbent. Quare subscriptis remedijs uti conuenit, non ad mulieres tantum, sed ad ipsos etiam uiros. Non importunum enim esse puto & in hoc smeagmatum tractatu harū rerū mentionē facere. Cataplasma, hoc est, inspersio totius corporis odorē bonum efficiēs, æstiuum. Rosarum siccarum quadrantē, calsiæ quadrantē, amomi, costi, spicę nardi, cuiusq; drach. ij. aluminis liquidi sextantē, dissolue in uino ueteri odorato, & in pastillos digere, quos in umbra exiccatos usu expetente contundito, ac cribrato, atq; in balneo inspergendos exhibeto, ita ut diligenter perfricent, & cū frigida aqua abluant. Aliud. Spumę argenti in decocto cicerū ad solē inalbatæ, amomi, calsiæ, folij malabathri, costi, spicę nardi, aluminis liquidi, iridis, omniū par pondus, appara, & utere ut dictū est. Potes autē præscriptis cataplasmatibus uti quocunq; tēpore uelis. Aliud odorum & lene. Rosarum uiridiū & tamē siccarū dra. xl. myrrhę troglodyticę drachmas octo, iridis Illyricę, spicę nardi, calsiæ, cuiusq; drach. viij. uino odorato subige, & pastillos informa: quibus ubi uti uelis, cōtritis & cribratis corpus insperge, maximè à balneo. Aliud. Amomi, calsię, spicę nardi, costi, folij, myrrhę, singulorū æquales portiones. Vini quod satis est, para ac utere uelut dictū est. Aliud. Calsię, iridis, myrrhę, aluminis optimi, pares portiones uino subige, & pastillos forma ac utere. Aliud. Iridis, spicę nardi, floris iūct odorati, cuiusq; drach. iij. amomi drach. ij. myrrhę dra. ij. meliloti drachmas quinque, appara & utere similiter. Archigenes autē inquit: Ad omnes corporis tetros odores, atq; eos qui grassonīa à Græcis appellātur, ante omnia cōducūt exercitiā. Inuēctiones, sicę fricationes, alui frequēs subductio. Sunt etiā cibi ad destruendū hoc malū cōmodi, itēq; illutiones. Cōueniunt itaq; oleū rosaceū, melinū, myrteum, iris sicca per se in puluerē redacta & intrita. Aut, alumē liquidū in aqua uel uino dilue, & myrrham tenuissimè trita admisce, ac ad mellis crassitudinē redige, & ex eo collū, locos sub alis, inguina, & reliquos exudantes locos inunge. Aliud. Aluminis liquidi drach. iij. myrrhę drach. iij. spumę argenti lotæ drach. ij. calsiæ drach. i. contere, & cum eis sub alis locos,

intermediā coxarum & inguina cōfrica: tollit enim euestigio eorum foetorē. Aliud. Calsiæ drach. iij. aluminis scissilis drachm. ij. utere cum uino per se.

Aliud. Mastiches quadratē, aluminis scissilis unc. i. utere cum uino. Aliud. Myrrhę troglodyticę, iridis illyricę, florum rosarum siccarū, æquales partes cōtunde, & cribra, ac forma pastillos cum uino, eosq; in umbra sicca, ubi uentus non spirat. Deinde cōtusos ac cribratos in pyxide repone coopertos, ut ne transpirent, & utere à balneo inspergens ac defricans locos leniter, atq; ita imbibi sine, & postea frigida ablue, & manet odor, de quo meritō mireris. Probè facit & alumen cum uino, & crocomagma cū myrrha. Et cupressi ramenta ac alumen cū uino.

Potiones ad eos, qui tetrum habent corporis

odorem.

Cap. viii.

His uero qui foetentē habent corporis odorē, eiusmodi potiones exhibere conuenit. Cardui radicē in uino albo decoctā propina, & efficiēt urinā crassā & foetentē. Aliud. Resinā terebinthinā oliuę magnitudinē cū pari melle decoque, & quotidie deglutiedā exhibe, & uinum insuper absorbendū. Aliud. Myrrhā & serpyllum paribus partibus terito, & in pilulas formato, quarum duas deuorandas dato, & uinū insuper absorbendum. Hęc etiam ad oris graueolentiam faciunt.

Ad menti scabricem, ex Galeno.

Cap. ix.

Flunt & in mento aspredines ut plurimum seroso humore à capite destillante, & præcedentibus fursuraceis in collo ac uicinis partibus squamis, aliquando autē usque ad auditorios pertingit ac perreptat meatus. Estq; omnino hęc affectio dolorosa, pruritus inferens, ac distendēs corpus: quare subscriptis remedijs est subueniendum. Critonis. Amurcam ex ollua prius quā exprimatur destillatē, decoque quousque cogatur, eaque assiduē locos inunge.

Aliud. Myrrhę uncia unā, ouorum crudorū uitellos quinque, myrrhā cum lacte dilue, deinde adijce ei oua, eaq; simul passo excipe, ac assiduē illini, & miraberis effectū. Aliud pharmacū efficax, quo multos hac affectione detentos liberauimus. Glaucij dra. xvi. gūmi drachmas quatuor, lacrymę oleę tā tundē, dissolue, & ad strigmentitiā crassitudinē cū passo redige, atq; assiduē illine. Exulcerata autē cute & circundolente, sequentibus utendum. Pinguis compositio ad faciei manantes & squamosas affectiones, ac asperitates, utilis etiam existit sedi, conuenitq; ambustis ab igne. Spumę argenti uncia unam, cerę tyrrhenicę trientē, ouorum assatorum uitellos tres, adipis anserini bene subacti trientem: spumam argenti in farinā redige, ac adijce ei oua, deinde his simul unitis infunde quantū sufficit lactis, ut ad strigmentitiā crassitiē redigatur, postea cerā liquefactam unā cū pingui, refrigeratāq; ac erasam, conijce, ac simul cōmisce, atq; in pyxide reconde. Vsu uero exigente, de eo quātum satis esse uidebitur accipe, ac cū rosaceo dilutum impone. Potes autem & sedis remedijs, & quę ad ambustos ab igne descripta sunt, cōsimiliter in hac affectione uti.

Ad faciei lentigines remedia, quibus etiam ad maculas à sole prouocatas, & ad uaros utilicet.

Cap. x.

Vitis albę itemq; nigrę radices cum oleo decoque, donec succulentę reddantur. Tollit etiam tum

lentigines, tum uaros, oleum amygdalarum cum cera, radix lilij cum melle. Maxime omnium autem lentigines delet gummi & nitrum æquali pondere, melle permixta. Aliud. Brassicæ semen aqua contritum illini, absterfo tamen & confricato prius loco. Vbi uero exaruerit atq; cutis attollatur, proluat aqua multa frigida, & illinito pingui anserino, aut medulla cerui, aut etiã cerato ex aliquo huiusmodi apparato. Cauedū autē est, ne quis post excoꝛiationē incidat in ea quæ faciē offendere possunt, qualis est aer frigidus, aut uentus, aut prolutio faciei. Aliud. Sandarachā attere cū melle ad strigmentū densitatē, & per dies sex illinito, arefacta autē cute atq; eleuata, utere galbano cū modico nitro & aceto dissoluto. Aliud, ad uibices ac lentigines: Columbe stercus cū aceti aceto tere ac utere, & miraberis. Ad diuturnas autē lentigines his utere. Radicis cucumeris syluestris sextantē, cimoliz unc. i. in puluerē redige ac reponē. Vsu uero expetēte, quātū suffecerit in aqua dilutū illini. Aliud. Bulborū depuratorū unc. i. thuris unc. i. cōtere, adiecto cochlearū terrestriū magnarum cruore. Oportet autē ipsas adhuc uisuas stylo pūgere, atq; id quod effluit mucosum, pharmaco inijcere: quod ubi usus tēpore dissolueris, melle exceptū inūge. Eūdem effectū præstat apī radix, sicca cū melle, & umbilici, ueneris radix, cerato liquido excepta ac illita.

Smegmata ad lentigines in calli modum obduras. Quandoquidem contingit aliquando sublati lentiginibus callosam reddi cutem, ac uix curabile fieri affectionem, utēdum est post lentiginū excoꝛiationem huiusmodi smegmatis. Farina erui choenici Italici dimidium, farinæ hordaceę tantundem, scille assatæ sextantem, omnia in puluerem redacta, candido oui excoꝛpe, & in pastillos redige, quos in umbra desiccatos adserua: usu uero expetente cum aqua dissolutos illinito, & post modicā temporis intercapēdinē frigida abluere iubeto: aut cremore in quo furfur maceratus est, maxime si adest inflammatio.

Aliud. Spumę nitri drachmas octo, alcyoni dra. viii. galbani drachmas octo, amygdalarum amararum delibratarum drachmas tres, melle excipe, ac illitum sinas areferi. Deinde sube faba dentibus contrita extergi, ac ablui aqua moderate frigida: cautosq; esse præcipe, ne aut à uento, aut à sole lædantur.

De maculis à sole prouocatis, quas Græci ἰσχυρίδας uocant, ex Critone.

Fiunt etiam in facie maculæ, quas Græci ἰσχυρίδας uocant, eò quod à sole prouocentur, maxime circa nasum & alium: & apparent sanè non in alto fixæ, sed instar flosculorum productæ, quare leniter eas confrictas auollere oportet, ac sinere areferi, cōmone req; ut uno aliquo ex smegmatum genere extergantur. Discutiuntur enim ab illis, aut certè ita abscedūt, ut digitis auelli queant. Verum non uiolenter id facere conuenit, sed leniter & paulatim. Quod si adhuc inhæreāt, nihilo leuiore reddite, subscriptis utēdum est. Brassica contrita, & illita, ad maculas à sole productas, & lentigines, atque omnia alia quæ mediocri extersione ac repurgationē indigēt, utilis est. Similiter autem & sepiæ testæ ustæ, aut testæ purpurarum, ac buccinorum cum melle illitæ. Oportet autem has testas in crudam ollam confectas in fornacem immittere ac assare. Oribasij ad maculas à sole prouocatas, uarosq; & utiligines. Farinæ erui li-

bras duas, seminis erucæ libram unam, amygdalarū amararū, cucumeris syluestris radicis, cuiusq; librā unam, in uino mulso dissoluta & contrita illini, ac post horæ spatium spongia absterge. Aliud ualde admirabile. Ceræ tyrrhenicæ drachm. xv. olei rosacei drachmas septem & dimidiam, pinguis anserini unciam unam, spumæ argenti loræ & dealbatæ undam unam, cerussæ unc. i. gummi drachmas quatuor, mellis Attici unc. i. dissolutis illini faciem: & post spatium horarum sex spongia deterge, ac laua cum sapone. Aliud Oribasij. Lupinos in lixiuio per triduum maceratos contere, & cum eis lentigines illini, donec auelli possint. Aliud. Saponem Gallicum aqua tritum modico adiecto melle inūge, & per horas tres inhærere sine, aut stercus columbinū linteolo exceptū ac in puluerem exustū, cum oleo contere, ac illine cōfidenter. Idem probè efficit myrobalanos contrita illita: itemq; bulbus crudus per se uel cū oui luteo & aceto aut melle. Exusti autem bulbi unā cū alcyonio illiti depurgāt lentigines: quod facit elateriū quoq; illitū, & cassia cum melle, brassicæ semen cū aceto, hederæ folia uino decocta, radix umbilici ueneris cū cerato liquido illita: aut cucumeris syluestris radix: aut fici uirgula in aceto decoque, ac cōtusis utere: quod idē & utiligines sanat. Aut rubiā oleo cōtritā, aut costū aqua cōtusum, aut nitri spumā cerato liquidiore exceptā, aut lupinos crudos cū lixiuio coactiliatorū decoctos & cōtusos, cū melle illini. Aliud. Radices narcissi delibratas in aceto decoque, ac tere, iniecta farina erui sufficere, & pastillos informa: quos in umbra exiccatos, in usum adserua. Qui ubi postulauerit contritos cū melle, ad uesperam illine: mane autē rursus abluī præcipe. Aliud. Lilij bulbos quinq; cōtere, & conijce spumæ nitri lib. i. deinde melle quantū suffecerit cōmistū illini, usquequo integrè curentur, ut iā antea dictū est. Aliud. Amygdalarū amararū partes ii. melanthij torrefacti partē i. unumquodq; seorsim contere, & cū melle cōmisce: illinito autē ad uesperā, maneq; abluito cū aqua dulci. Vtere autē uno aliquo ex smegmatis superius ad faciei nigredines præscriptis: itemq; his quæ sunt illis uicina, ac similia. Vtile autē est & hoc, præsertim si fuerint diuturnæ, buccina exure, ac cū melle contere, & ad uesperā illine: mane autem ablui cum aqua dulci præcipe.

Aliud ad solares maculas, ualde pulchrū. Qua in tegra in aceto macerato, donec testa quā tenerissima fiat, deinde superius perforato, ac extrahe ab eis candidū: post uero iridis Illyricę tusæ ac cribrate, & melanthij in tenuissimum puluerē redacti, & thuris equas partes cū eis cōterito, adiectoq; melle sufficere, ut dictū est, utitor. Quod si adhuc perseverauerit affectio, huiusmodi excoꝛiatorijs utendū erit. Excoꝛiatoriū macularū à sole prouocatarum & lentiginū. Melanthij quadrantem, seminis ocymij quadrātem, radicis ari quadrantem, aqua subigito & impōnito, ac sinito adglutinari: post aliquantū uero interstitiū detrahit, atq; aqua calida quā plurima proluit. Aliud. Quod ad callosam faciē cōducit, siue per ætatem, siue per continuā pharmacorū acriorū excoꝛiationē calli sint cōtracti, seminis erucæ sexuncem, ammi, cardamomi, radicis ari, costi, cuiusq; quadrantem, contundito, cribrato, ac reponito. Vbi uero necessitas exigit, quātū satis uidebitur accipito, acetoq;

acetoq; subactum imposito satis cōdensatū: quū uero adglutinatum fuerit, acetum aut aquam per spōgiam instillato. Facta autem excoaratione, multam aquā calidā adfundito: à prolutione uero subie tam mixturā panniculo laneo exceptā imposito. Cerusæ drach. viii. spumę argēti lotę drach. iiii. adipis anserini sexuncę, medullę ceruini sexuncę, cęsypī medicamēti quadrantē, adipis suilli recētis quadrantē, olei sesamini quantum sufficit. Oportet autē fomentū adhibere bis in die: eleuata autē cute, sequens ceratū est imponendū. Adipis caprini à fibris depurati & loti lib. ii. olei susini sexuncem, olei rosacei, & amygdalini, cerę, mastiches, cornu ceruini usti, salis ammoniaci, cuiusq; unc. i. terrę cimolię trientē. Ea quę eliquari possunt liquefacto & percolato, deinde rursus ad carbonēs lentē decoquito, & ad ea quę sicca sunt in mortariū adfundito, ac probē unitis utitor. De exulcerata mēti scabrie. Utendum est ad eā his, quę paulō pōst in capite uidelicet decimoquinto descripta sunt, ad manātes menti papularū eruptiones.

De stigmati siue notis à uerbere illatis. Cap. xii. Stigmata appellant, quę in facie, aut aliā quapiā corporis parte insiliunt, notas, quales uidemus in manibus eorum qui militiam exercent. Atramento autem utuntur illi talis lignorum spinę Aegyptię & maximē corticis libram unā, aeris usti sextantē, galularum sextantē, atramenti sutorij unciā unā, cōtundito ac cribrato, primumq; æs ustum cū aceto terito, deinde & reliqua cōtrita cōiuncto, affusisq; aque quidē partibus duabus, succi uero porri parte una, & probē unitis utitor. Oportet autem locis prius cū acubus punctis sanguinem extrahere, & primū porri succo illinire, postea uero ipsum adhibere pharmacum. Porro quibus eiusmodi stigmata extirpare penitus uolumus, illis subscriptas mixturas adhibebimus. Calcis partē i. nitri assati partē i. cum lixiuo coactiliā iorū terito, & nitro asperso locū prius præparato & extergito: deinde illinito continenter. Idē quoque ad uerrucas myrmecias dictas, efficax existit. Aliud, quod stigmata tollit. Piperis drach. ii. rutę dra. iiii. auripigmēti drach. iiii. cōtere, & adiecto melle, in pyxide sigulina reponere. Vbi uero usus experit, supra stigmata prius nitro confrieta, resinā terebinthinā impone, uinculo adhibito in dies v. postea autē die sexta solue, atq; acu stigmata penetra, & cū spōgia sanguinē exterge, salemq; tenuissimū in ipsas puncturas insperge: quē tamdiu inhærere sinas, donec stadia decem quis cursu cōfecerit: deinde prædictū pharmacū linteo exceptū impone, neq; soluas per dies quinq;: sequenti uero sexta solue, & stigmata scalpēdo expoli, atq; ubi quod nigrū fuerit detraxeris, rursus pharmacū ipsum illinito cum pēna. Eruit enim in uiginti diebus citra magnā exulcerationē, non relicto etiam uestigio cicatricis. Idem efficiunt mordendo erodentia medicamina in uulnerū tractatu descripta.

De uariis faciei, qui tum Ionthi, tum Acne Græcis uocantur. Cap. xiii.

Solet circa faciei cuticulam tuberculum oboriri, paruum quidem, sed durum, quod uari nomine appellatur. Id sanē à crasso humore producit. Quare cura eius per ea quę duriciem emolliunt, & tumorem discutunt, medicamina perficitur: quorum sylvam eiusmodi tibi parabis. Liliј radicem tritam cum mel

le illinito, aut cyclamini radicem cum melle, aut narcissi radicem cum melle, aut cassiam cum myrrha & melle, aut plumbaginem cum aceto, aut pulegium tenuissimē tritum, ac cerato exceptum impone.

Aliud, Mellis & aceti acerrimi, cuiusque æquales partes simul permixtas illini, ac digito circumtere. Aliud. Sepiæ testæ ustæ sextantem, costi sextantem, myrobalani unciā unā, contere cum aqua & illini, arefactum uero rursus humecta. Aliud. Costum contunde, & cribratum in tenuissimum puluisculū redige, deinde cum felle caprino commixtum in cerati modum effinge, & cum eo uaros ad uesperam illini: mane uero à somno, lacte, qualecūq; adsuerit, faciem abluere iube. Aliud. Alumen scissile quā tenuissimē contere, & resina terebinthina exceptū impone. Quū autē diu persisterint uari, his utendū erit, Saponis Gallici drach. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. i. thuris drach. i. dissoluito in aqua, & ad cerati densitatē reducto, sicq; illinito, ac post horę spatium ablui cū calida præcipito.

Aliud. Rhōis culinariј, hysopi, pulegiј, salis fossilis, seminis ocymī, cuiusque æquales partes, cerato rosaceo excipe, ac utere. Aliud, quod ad eminentiores faciei affectiones, itemq; pruritus efficax est, necnō ad principiū elephantiasis. Gummi albi & nitri æquas portiones, acri aceto dilue & illini. Vbi uero exaruerint, subscripta mixtura depurga. Saponis Gallici lib. i. ammoniaci, spumę nitri, thuris, mastiches, cuiusq; quadrantē, saponem, & ammoniacū in uase fictili cū aque choenice unā decoquito. Vbi uero dissoluta fuerint, sicca cōtrita ac angustissimo cribro excussa, inijcito: deinde transfer in pilā, probeq; cōtusum uitreo uase recōdito. Necessitate uero expetente faciem illinito, & post paruū interstitiū multa aqua abluito: prius leniter facie confrieta. Hoc pharmacum semper ad uaros utere. Aliud ad uaros, celebre. Nitri rubri sextantē, cimolię unciā unā, thuris drach. iiii. farinę erui unciā unā. Vtere autē hoc modo: Accipe halcyoniū, ac per se optimē cōtere, deinde iniecto oleo simul tere, & ex eo faciem ad uesperā illini. Mane uero à somno præscripta compositione exterge. Aliud smegma, quo per omnē curā uarorū uti conuenit. Farinę fabarū, farinę sesami, medullę peponis sicce, cuiusque drach. iiii. contere, & cum his exterge. Aliud. Nitrum cū myrrha tritum aqua permixtum exhibe, eoque extergatur.

De ficosis faciei tumoribus. Ex Galeno. Cap. xiiii.

Est & hæc una aliqua ex menti affectionibus, in hoc differens à uariis, quod non solum crassus existit humor à quo producit, sed serosa etiam tenuitate participat, ob quam & citius exulceratur, si quidem nō ut conuenit cures, & siccorib. etiamnum indiget remedijs, quā ea sunt quę uariis adhibentur. Oribasius ad Eustathium. Ficos appellant germina ulcero sa, rotunda, subdura, rubicunda, quę consequitur etiam dolor. Nascuntur autem ut plurimum in capite, atque etiam reliquo corpore, de quibus Crito sic scripsit. Ad ficosas menti eminentias, Critonis. Spumę argenti drach. iiii. thuris drach. ii. salis fossilis drach. ii. sandarachę drach. i. contrita simul impone. Aliud ualde præclarum. Elaterij drach. ii. salis fossilis tantundem, chalcanti drach. ii. sandarachę drachmā unā, misce: & cum specilli instrumēti, quod melā Græci appellant, extremo admota im-

imponere, præhumeſcato prius loco quo pharma- cum melius infideat: poſt impoſitionem uero cata- plaſmate ſeminis lini aqua diſſoluti ſuperne conte- ge. Aliud, Archigenis, ad capitis & menti ficos. Chal- canthi aſſati, aluminis ſciſſilis, glutinis, cuiuſq; æqua- les partes, ſquamæ æris duplum: glutinum in aceto maceratum dilue, & cum eo reliqua triſta commit- te. Vbi uero uti uelis, in aceto rurfus dilue, ac ex eo ficoſas eminentias inunge, & raſura tenuis linteoli contege. Inhæret autem pertinaciter, atq; citra cicat- tricem ficos depurgat. Vtor autem & hoc ipſo phar- maco ad callos fiſtularum leniēdos in collyria infor- mato. Quod ſi humidi ſint tumores, nimirum aqua effluēte ex eis, uelut à fonte, pura, ſubſcriptis reme- diis utendū erit. Paſtillus ad ficoſas menti eminentias. Reprimi autē omnes tumores qui accidunt illis, qui male cicatricem obdixerunt: quemadmodum uide- mus in hiſ, quibus palpebræ aut labia ſunt conſuta: Squamæ æris ſextantem, miſyos aſſati ſextantē, au- ripigmenti ſextantē, diphrygis drachmas tres, chal- citidis uſtæ drachmas quatuor, æris uſti drachmas quatuor, glutinis fabrilis drachmas quatuor: cōpo- ne & utere ut dictum eſt in priore. Nam & ob eius uſum, magnum nomen adeptus ſum.

*Ad manantes menti papularum eruptiones, ex Cri-
tone.* Cap. xv.

Conferunt quidem & hiſ plurima eorum quæ antea ad capitis ulcera manantia præſcripta ſunt. Proprie autem profunt hæc: Spumæ argenti, chalcanthi, ma- li cori, baccarum myrti, ſingulorum æquales partes cum uino & oleo myrteo triſta illinito. Aliud. Præclarum & hoc eſt: Verbenacæ ſupinæ drachmas octo, acaciæ drachmas octo, myrrhæ drachmas duas: cum uino triſta utere. Aliud. myrrhæ uncia unā, thuris ſextantem, acaciæ trientem, utere cum ui- no. Aliud. Spumæ argenti, ladani, baccarum myr- ti nigrarum, ſeminis hyoſcyami, mali cori, æquali- bus partibus cum uino & oleo myrteo aut roſaceo permixtis utere. Aliud, quod & ad ea quæ inſar- ſaui melle manant ulcera, melicerides Græcis appel- lata, cōducit: ſiue ea in mēto, ſeu in capite exiſtāt: quæ à Syris appellātur Sanalia. Spumæ argenti & bacca- rum lauri, æquales partes cum aceto ac oleo myrteo illinito. Experimentū enim bonū de ſe præbuit ſæpe.

*De impetiginofis tum menti, tum reliqui corporis
tumoribus ex Galeno.* Cap. xvi.

Præterea & hæc affectio ex mixto quopiam genera- tur humore, nimirum ſerolis & tenuibus acribuſq; humoribus unā cum craſſioribus permixtis: qua- propter etiam facile in pſorā & lepram tranſit. Indi- get itaq; hæc affectio pharmaciſ fortiter deſiccanti- bus. Quod ſi uero in pſorā aut leprā tranſierit, ad hoc quod deſiccantia remedia adhibēda ſunt, neceſſe erit & repurgantibus uti. Itaq; Crifo iſta ſcripſit, ad eas quæ in mēto prodeunt impetigines, lichenas appel- latus. Affectio, inquit, eſt inſuauiſſima, & pruritus inferens, & circumtenſionem, & periculum nō mi- nus. Proſcripſit enim aliquando per uniuerſam faciem, & oculos ipſos cōtingit. Quare diligentiſſimè cura utē- dum erit, ubi ea quæ iam longo tempore perſeuerā- runt, ab hiſ quæ recēs prodierūt diſcreuerimus. Ad recētes igitur impetigines cōueniūt hæc: Perdicij her- bæ folia cōtinenter in loco cōfrica, aut thus, aut am- moniacū cum aceto terito, aut etiā cū perdicij ſucco,

ac illinito. Aliud. Liquorem qui ex humidis ole- gnis dū cōburuntur effluit, illini. Idē facit quod ex brassicæ caule dū adurit, deſtillat, illitū. Aliud. Maluæ agreſtis ſemē depuratum collige, contere ac expreſſum inde ſuccū reponere, eumq; aſſidue illine.

Aliud. Portulacæ ſuccum cōtinenter illinito.

Aliud. Lacrymam ſylueſtris oleæ cū aqua diluta to, & adſecto modico ſtyrace, unito ac impoſito. Vbi uero ſā diu durauerint impetigines, uiticis ſo- lia cum aceto triſta illini, aut haſtulæ regiæ radicem in aceto decoctā & triſta adfrica. Aliud ad diuturnas impetigines. Chamæleonis nigri radicē in aceto decoque, cōtere, & illine. Verū quū ad diuturnas im- petigines multa & uaria excogitata ſint remedia, particulatim de ſingulis dicā, Inſitiū ſumēs à paſtillis. Paſtilli. Paſtillus ad impetigines in quacūq; corpo- ris parte cōſiſtāt: Alcyoni uſti drach. ii. ſulphuris ui- ui, thuris, pyretri, ſpumæ nitri, cuiuſque drach. ii. cha- mæleonis nigri radicis dra. iiii. haſtulæ regiæ radi- cis dra. iiii. glutinis drachmas quatuor. Glutinū in aceto dilue, & cū eo reliqua excipe, deſicca, & utere cū aceto. Paſtillus ualde celebris. Foliorū ſici ſiccorū dra. xii. chalcitidis crudæ dra. x. calcis uiuæ drach- mas octo, miſyos crudi drachmas quatuor, thuris drachmas quatuor, ſulphuris uiui drachmas octo, aceto ſubſige, & cum aceto utere. Paſtillus ad impe- tiginē. Qui & callos extirpat, & cicatrices ſupra opinionem: Thuris, teſtarum buccinorum uſtorū, ſimi columbini, alcyoni, gummi, ſingulorum æquales partes contere cum lacte, & informa paſtil- los, ac utere cum aceto. Paſtillus alius. Lacrymæ oleæ ſylueſtris drachmas quatuor, thuris drachmas quatuor, ſulphuris uiui, alcyoni, ſpumæ nitri, halicæ cōtuſæ & cribro excuſſæ, cuiuſq; drachmas octo, halicam in acetum multū atque acerrimū cōſectā tā diu decoque, donec uiſcoſa reddatur: reliqua uero cum ea ipſa cōmiſſa in paſtillos informa, ac cū aceto utere. Circūſcriptiones ad impetiginē. Ad impetigi- nes maxime ſeras: Nitri, chalcitidis aſſatæ, ammoni- aci thymiamatis, ſucci ſerapiadis tres teſticulos habē- tis, æquales partes cōtunde, & cū aceto illini: efficac- eſt & ad humentes impetigines, atque ego ſane uſus ſum, & ex animi ſententia ſucceſſit. Aliud. Sterco- ris dorcadiſ uncia unā, thuris uncia unā, contuſis ute- re cū aceto, ita ut cum nitri ſpuma impetiginē prius cōfrices, & miraberis. Aliud, quod & ad impeti- gines & uuliginē ac lepras ualde cōmodū exiſtit. Stercoris muris, chalcanthi, ſulphuris uiui, cuiuſq; beſſem, farinæ fabarum uncias xiiii. aceti ſextarios quatuor. Muſcerdam contunde, & cum aceto deco- que: atque ubi bis aut ter efferbuerit, ſulphur inſper- ge & chalcanthum, animaduerſione habita, ne effer- ueant & effundantur: deinde ubi parum ſaltem con- cocta fuerint, etiam farinam fabacā inijce, & ſimul ad ſtrigmentū craſſitiē decocta redige, & ablatis ac reconditis utere. Ad lepras quidē linteolo exceptū impone, ac poſt quintum tandē diem abſtrahe. Ad impetigines uero aceto diſſolutum cōtinenter in- unge. Illitio cocta, ad diuturnas impetigines, quæ citra exulcerationem eas ſummuet. Halicæ mo- la triſta ac cribro quā arctiſſimo excuſſæ uncias quatuordecim, chalcitidis, cimoliæ, ſulphuris uiui, miſyos, cuiuſque ſextantem, ſpumæ nitri, aluminis ſciſſilis, alcyoni, radicis haſtulæ regiæ, thu- ris

ris, lacrymæ oleæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, cuiusque uncia unā, acetī choenicas tres. Alcyonium, hastulam regiam cum aceto decoquito: atque ubi ad medietatem redactū fuerit, percolato. In colamento uero ammoniacum, thus, & reliqua sicca dissoluit: halicam uero in aceto quod superest decoquito: deinde reliquis adijcito, ac simul commisisis utitor. Aliud ualde præclarum. Acetī acerrimi sextarios octo, farinæ hordeaceæ uncias uiginti quatuor, mannæ thuris uncias quatuordecim, radicis ruminicis syluestris drachmas octo, radicis albucī drach. viii, ueratri albi drach. x, alcyoni drach. x, cardamomi drachmam unā, terræ cimoliæ drachmas octodecim, glutinis drachmas xvi, spumæ nitri drachmas xvi, uirgultorū halicacabī uiridium fasciculū quantum manu comprehendere potes, appara & utere ut dictum est. Quod si hæc affectio diutius producat, extendaturq; & in callos transeat, nihilominus his quæ dicta iam sunt utendum est: maxime uero congruum est quod sequitur. Misys, myrrhæ, thuris, aluminis scissilis, cuiusque drachmas octo, aloës, sulphuris uiui, cuiusque drachmas quatuor: hæc cū passo ad strigmentū crassitudinem redige, & his ac ter in die loco prius confrieto, illine: foris autem conseruandi pharmaci gratia pelliculam uesicæ, aut ex ouo suprapone. Oribasij lichenicum pharmacum, facit idem etiam ad pruritus. Chalcanthi, sulphuris uiui, nitri, thuris, æqualibus portionibus utere: ad impetigines quidem, cum aceto: ad pruritus uero, cum uino. Aliud, quod impetigines in paucis arceat diebus, ualde commodum, quare præexigendam suadeo mercedem. Sulphuris drachmas octo, calcis drachmas octo, chalcitidis crudæ drachmas octo, thuris drachmas quatuor, misys drachmas quatuor, foliorum capparis uiridium depuratorū drachmas duodecim, cum aceto tere, ac in forma pastillos, & utere. Emplastrum liquidum, multū ad impetigines experimenti, cuius rei nuper adeo periculum feci. Picis siccae, ceræ, resinæ colophonis, ueratri triti, olei, æquales partes. Per experientiam cōmēdatum hoc tibi habere, propterea & mercedē præexige. Quādoquidem uero plurimi sunt, qui illitio-num usum auersantur, malūtq; adhibere emplastra, utpote quæ neque per sudores obortos defluant, neque arefacta etiam cutem circumtendant, annectam & horum aliquot apparatus. Emplastrum ad impetigines, quod citra exulcerationem eas submouet. Ceræ, picis liquidæ, thuris, resinæ cerebinthinæ, sulphuris uiui, cuiusque sexuncem. Quæ liquefieri possunt, liquefacto, siccatq; cū eis committito. Aliud quod similiter citra exulcerationē opitulatur. Picis liquidæ libram unam, mannæ, sulphuris uiui, farinæ lupinorum, cuiusque unciam unam, galbani sextantem, Picem calefacto, & galbanum præmolitum adijcito: liquefactis uero, ac ab igne ablatiis reliqua inspergito ac unito. Vtere autem hoc ut uehementer commodo. Aliud, quod citra exulcerationem auxiliatur. Chrysocollæ siccae qua aurifabri utuntur, chalcitidis assatæ, misys assati, squamæ aeris, diphrygis, salis ammoniaci, terræ cimoliæ, cuiusque drachmas quatuor, æruginis drachmas duodecim, chalcanthi drachmas vi, lapidis asij, aeris usti, utriusque drachmas sex, foreos drachmas quinque, aluminis liquidi drachmas quatuor, contunde om-

nia diligenter, & adiecto aceto sedulo in sole subferuentis caniculæ æstu contere, donec ipsum pharmacum æruginem contrahat. Apparetur autem in alio quopiam mortario, thuris sextās, myrrhæ sextans, aloës uncia una, ladanī uncia una, opoponacis uncia una: hæc in aceto diluta & ad strigmentitiā crassitiem redacta, illis quæ antea in æruginem commutata sunt inijce, ac rursus contere, atque his omnibus aristolochiæ contusæ & cribratæ unclam unam adijce, & rursus tere. Quum uero omnia in formam emplastri redacta fuerint, liquecibilia liquefacto, ac affundito. Sunt autem liquecibilia hæc, ceræ drachmas centum, terebinthinæ drachmas cc, galbani drachmas nouem, olei libram unam, emollita in usum adseruato simul omnia. Hoc ipsum pharmacum duplici aspectu se uidentibus offert. Aliud, quod similiter ad dictas impetigines efficax est, ut etiā ea quæ intus relinquuntur reprimere possit. Picis, bituminis, resinæ pinus, ceræ, sulphuris uiui, mannæ, æquas portiones, olei cyprini quantum sat fuerit: Liquecibilia liquefacto, & inspergito sicca: in tenui autem pellicula excepta imposito. Emplastrū aliud ad impetigines. Picis siccae quadrantē, picis liquidæ unciam unam, salis unciam unam, resinæ colophonis, ceræ, sulphuris uiui, cuiusque unciam unam, nitri sului unciam unam, chalcitidis unciam unam, olei sextantem: utere. Excoriatoria impetiginum. Verum ubi iam affectio stabilis facta fuerit, & pharmacorum adhibitioni & molimini resistit, ut edū erit excoriatoris. Ea enim ex facili superficem auellunt. Excoriatorium impetiginū, quo Pamphilus usus est Romæ: & plurimum sanè profecit, quum in urbe mentagra grassaretur, quæ impetigo uera existit. Squamæ eris drachmas octo, auripigmenti drachmas quatuor, sandarachæ drachmas quatuor, aeris usti, ueratri albi, cantharidum, reiectis alis & pedibus, singulorum drachmam unam & dimidiam: unumquodque per se contere: deinde simul contusa cedria excipe, ac in densitatem strigmentitiā redacta, in pyxidem aeris Cyprini reponere. Vbi uero necessitas exigat, nitro ac modico aceto impetigine confrieta, pharmacum hoc cum specillo lato, spatho melam Græci uocant, illine: atque ubi iam adfricueris, modicumque temporis spatium intercesserit, cū specillo derade, ac rursus aliud illine: bisq; ac ter eodem repetito, locos illitos cum pellicula uesicæ bouillæ, aut alterius cuiusdam animantis contege: post pelliculæ uero impositionem fasciola leuiter colligato, ac finito pernoctescere, si quidem tamdiu sustineat: si uero non, ad horas aliquot, donec bullas exulscitet sanie crassa & glutinosa repletas: quibus productis lauare iubebimus, atque remorari aliquādiu in balineo: etenim hoc ipsum curā adiuuare solet. Sit autē calidius ipsum balineū. Quod si prohibeat quid balineo uti, fomenti utendum est calida aqua multa: quæ ubi iam ad molestiā usque affusa fuerit, extergere cōuenit, ac panē cū aqua multa subactū imponere. At ubi sordibus ulcera scatuerint, emplastrū uiride splensolo exceptū adhibeto, modico itidē de excoriatorio præscripto admixto. Exclusa autē sanie, & nullo amplius tectorio ulceri incumbente, exemplastro albo linteolum paruum illitum imponimus: eoq; utimur donec omnino ad cicatricem perducatur, quotidie fomento adhibito, ac no-

ac nouo spleniolo ex emplastro albo illito. Porro ante admotionē excoiatoriorum, uicinas impetigini partes munire oportet pharmaco quopiam ex his quae ab inflammatione locos tuentur, atque ita excoiatorium ad impetiginem solam adhibere. Excoiatorium ad mentagras, ut citra cicatricis uestigium ad sanitatem perducantur. Efficax est & ad alopedias ad solem uel ad ignem illitum. Vbi uero bulla producta fuerit, eā acu penetrare oportet, excluso autem humore, ceratis curare: cicatrice enim indurata, enascuntur pilli. Atque ita quidem ad alopedias adhibetur. Ad impetigines uero utendum est eo modo qui praedictus est in excoiatorio primo. Pharmacum uero ipsum huiusmodi est: Sandarachae, auripigmenti, squamæ aeris, ueratri nigri, culusque drachmas duas, elaterij drachmas quatuor, uentriū cātharidum drachmam unam, excipe cedria, usus autē iam antē ostensus est. Emplastra uiridia post excoiatoria adhibenda. Post ipsum excoiatoriorum usum, subiecta uiridia emplastra adhibenda sunt: nimirum ad ulcerum ipsorum repurgationem. Viride emplastrū, quo Pamphilus usus est ad mentagram, post eruptionem scilicet bullarum, Ceræ libram unam, resinæ pinus siccae libras duas, æruginis quadrantē, olei ueteris besselē, acetū acerri mī quantum suffecerit. Aeruginem ad solem cū acetō conterito, liquefibilis liquefacito, & frigefacta, ac in mortarium coniecta simul unīto. Aliud. Aeruginis drachmas II, mannæ drachmas IIII, galbanī drachmas III, adipis uitulini drachm. XII, ceræ drachmas octo, resinæ pinus drachmas octo, acetū quantum satis uidebitur, committe. Aliud, quod euchron, hoc est, boni coloris, appellatur. Aeris uisti quadrantem, aluminis rotundi, æruginis, salis ammoniaci, mannæ cuiusque sextantem, ceræ libras duas, resinæ pinus siccae libras duas, olei dextātem, acetū quantum ad sicca conterenda suffecerit. Emplastra alba ad cicatricem perducentia. Verum ubi iam per praescripta emplastra uiridia, ulcera ipsa repurgata uideris, utendum erit emplastris albis, quo absque cicatricis uestigio ad sanitatem perducantur, quare ne utiquam hæc reliquenda censeo, ut quæ ea multa ad tactum lenitate cōmittunt. Emplastrum album, quod aquosum appellatur. Hoc emplastro Magnus medicus usus est, post impetiginum excoiationem. Cerussæ, spumæ argenti, ceræ thyrrenicæ, aquæ purg, singulorum libram unā, olei omphacini libras duas. Spumam argenti, cerussam, & aquam simul contere, atque ubi tenuissima facta fuerint, oleum guttatim instillatum simul contere, donec sufficienter fuerint cōnita: deinde in fictili uase ad ignem adhibe, ac continenter agita: quum uero aqua cōsumpta fuerit, infice ceram: Atque hoc modo in mortarium infusa emollito, ac utere. Aliud. Cerussæ libras duas, misyos crudi sextātem, terebinthinæ unciā unam, ceræ sexūcem, olei libras tres, aquæ choenicas duas, compone ut praedictum est, ac utere. Licebit etiā uti ceratis sedis, & quæ ad ambustos descripta sunt tenerioribus.

Ad molestum oris odorem. Cap. XVII.

Ad grauem oris odorem, qui citra exulcerationē accidit: Irin in uino ueteri odorato maceratā, ad colluendum continuē exhibe, atque etiam in ore retinendam aliquandiu: aut myrrham in uino merato

dilutam colluendam præbe: aut acre acetum colluat quotidie, uespere dormitum iturus: mane uero spicæ nardi decoctum ore colluat, aut ipsam sub dentibus conterat: aut potamogetonis folia quotidie dentibus contrita expuat: aut rosarum floribus continuē confricato: aut fici syluestris radicem urito, & cinerem eius cum melle illinito: aut parum cyperi, aut floris iunci odorati contundito, & gingiuas continuē confricato: aut cimoliam cum sale terito & affricato. Aut hordeum cum sale, melle subactum & linteo illigatum urito, & contritis utere: aut similaginē melle subactam ac exustam adhibe. Aliud. Salis albi, pumicis, origani, cuiusque unciā unam, iridis sextantem, floris iunci odorati sextantem: his simul contritis dentes fricato & uniuersum corpus. Bonum enim odorem facit, & dentes dealbat.

Aliud, ad foetorem oris. Chalcididis crudæ drachmas XII, ueratri albi drachmas octo, trita illine.

Aliud. Chalcididis drachmas XII, cadmiæ drachmas octo, in aceto tere, & per aliquot dies ad solem æstiuum expone, deficcatoque utere. Vtile est & ad sanguinolentias gingiuas, itemque putrescentes. Bibant autem & ipsi ea quæ praescripta sunt illis, a quibus per totum corpus teter odor transpirat, in hoc ipso Sermone, capite octauo. Aliud, ad crassitudinem labiorum. Prominet in plerisque superius labrum, aliquando etiam inferius, ex defluxu uehementi a capite delato, ut præ densitate labrum intumescat, & ad sermonis prolationē præpediatur: ultra hoc, quod alias indecentia quadā faciem dehonestet. Quare curabis hos aut incisa uena, aut purgatos per consuetas excretiones. Post hæc aut adhibebis illitiones ac pophlegmatismos, quibus defluxus pituitæ a capite tollitur ac sedatur. Deinde illitionibus ad os descriptis illines palatum: quibus præmissis, porri succū cum oleo uetustissimo ad interna labiorum illini, aut foliorum brassicæ succum unā cum oleo ad affectum labrum continue admoue: aut glauciū cū uino, aut cimoliā, aut Musæ pastillum, aut pastillū ex halicacabis cū uino.

Ad labiorum fissuras. Cap. XVIII.

Oui internam pelliculam fissuris labiorum adglutina, aut quod pelliculæ similitudine, circa palmarum ossicula adheret, aut araneorum a trabibus dependentium texturam maxime albā. Eas uero quæ in altum magis se extendunt fissuras, cum adipe anserino, aut caprino curabis, aut cū medulla bouilla, aut ceruina, ita ut cū semper uiuo atque terebinthina unita, illinas. Aut gallā omphacinen tritā, terebinthina aut œsypo liquido, aut melle excipe, & impone.

Aliud. Gallā & mastichen quā tenuissime trita, œsypo, id est, lanæ succidæ sordibus, in formā cerati redactis, excipe, ac utere. Aliud. Gallarum unciā unā, cadmiæ unciā unam, cerussæ quadrantem, cōtere cum rosaceo, & illine. Aliud. Cyperi sextantem, gallarum unciā unam, aluminis scissilis drachmā unam, contere, ac siccū insperge. Aliud. Mastichen cum uino tritā & dilutam illine. Aliud. Fecem acetū ustam, myrteo aut rosaceo cerato exceptam, impone. Idem etiā ad magnas in extremis ac summis corporis partibus inflammationes conducit. Aliud. Testarū ouorum ustarum, gallæ, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum æquales partes lanæ succidæ sordibus exceptas impone. Ad omnia labiorum ulcera, & ad ea quoque quæ cacoethe appellat.

Ostrea

Ostrea uita tenuissimè trita insperge. Ego autè & non uita contritus, eisq; usus sum, neq; male cessit.

Aliud, ad fissuras labiorum. Muscè pastillum cum sapa aut uino dilutū, satis crassum illinito. Optime prodest & id quod ex amurca, ad ulcera oris quæ aphthas appellant, apparatur. Idèq; similia remedia efficiūt, quæ ad fissuras sunt descripta, atq; etiā pastillus ex halicababīs cū uino. Ad tubercula in labris.

Vt edū est & ad hæc præscriptis ceratorū formis, atq; etiā hoc ipso quod subiecti Radicis rumicis ustæ, nitrī usti, terebinthinæ ustæ, singulorū æquas portiones, cōtritas cerato excipe, & illine. Aliud. Adipem anserinum, melle ac solani succo mixto adhibe. Confrictis autem prius ulceribus, cum penna sæpe illini. Repurgat enim tubercula in internis labris oborta. Colluat autem ea & ante illinitionē & post eam, cum lacte.

De dentium affectionibus.

Cap. XIX.

Pars quædam ex tertia coniugatione neruorum à cerebro utrinque delatorum, distribuitur quidem in pelliculam quæ ipsum os, & linguam, ac gingiuas complectitur ac ambit, sensum eis supeditans. Ingenerat autem seipsam tum superiorem, tum inferiorem maxillæ inuoluens, ac omnibus dentibus ad eorū radices substrata, ut ob hanc causam inter ossa soli dentes dolore afficiantur. Illi ipsi sanè nerui delatum ad se nutrimentū suscipientes: quod in ipso liquidius existit, sibi lucrifaciunt: quod autem siccius quàm cōueniat existit, tanquam alienum à se abijciunt. Ea ipsa uero à neruis redundans superfluitas in concauitatibus locellorū, in quibus ipsi dentes sunt infixi, aggregatur, paulatimq; tenacior ac densior seipsa facta, ob diuturnam isthæ conuersationem, in ossium formā transmutatur. Atque hoc modo nutrimentū dentibus accedit. Itaque dentes hac nutritione suscepti, usq; in senectutem augescunt. Vnde sanè in senibus ob defectum connutrientis materiæ attenuantur dentes, mobilesq; fiunt, ac excidunt. Cæterum quantum augescunt ipsi dentes, tantum ex attritione ciborum cōsumuntur. Impossibile est autem citra nutritionem augeri. In uniuersum itaque duabus affectionibus dentes sunt obnoxii, & his quidem cōtrariis. Indigentia uidelicet, & abundantia eius quod defertur ad eos alimentū. Indigentia ergo sicciiores & alimentum non sentientes, atque ob id tenuiores eos efficit. Abundantia uero cōsimilem in eis dispositionem facit, ei quæ contingit in carnosiss partibus inflammationi. Huius igitur adfectionis cura iuxta eundē scopum fiet, quem propositum habent hi, qui inflammationibus medetur. Nimirum ut abundantia partim discutendo, partim repellendo euacuetur. Eius uero quæ indigentia alimenti contingit, tenuitatis dentium nullum remedium existit. Necessarium est enim laxari ac commoueri dentes, ubi compages eorū flaccidiores reddantur, quum nō solum ipsi dentes, sed & loculi eos continentes graciles fiant. Hæc igitur adfectio necessario accidit senibus, quibusdā citius, alijs serius. Auxilio autē eis erunt pharmaca adstringentia, quæ gingiuas confirmant, & ad arctius complectendum dentes adiuuent. Qui uero facile exterruntur dentes, eos, si quidem id ex mollicie eorū cōtingat, duriores reddere conuenit, & affectionibus minus obnoxios, per austera uidelicet & acerbata adhibita remedia.

Ad inflammata gingiuas. Cap. XX.

Gingiuas autem ob inflammationem dolore affectis, optimum remedium existit oleum lentiscinum con duplicato uasculo calefactum, ac in ore retentum: Sit autem recens oleum. Nocuum enim existit inueteratum. Repellit autem oleum lentiscinum citra asperitatem, & discutit absq; mordacitate quibus maxime indigent inflammata. Arqui asininū lac in ore retentum, ubi maxime infestauerint dolores, eos mitigat, ac ex tempore sedat. Et hoc quod ex uino ad tertiam usque mensurę partē decocto, apparatur, quod sapat dīcimus itemq; hepsēma, & palmularum stillamentum similiter ore retentum calidum uehementer lenit. Oportet autem aquam calidam ad palmarum stillamentum adfundere, quo crassities eius diluatur. Valet etiā semperuis minoris decoctū per se, aut cum rosaceo melle: aut cum sapa, aut palmarū stillamēto in ore retentum. Conuenit etiā inflammationis gingiuas hyoscyami succus, aut decoctum per se calidum, aut cum sapa ore retentum. Supra opinionem autem lenit succus portulacæ. Insensissimū uero inflammationis gingiuas est acetum, omniaq; acerbata, & acrida, & salsa.

Ad cruentas gingiuas. Cap. XXI.

Cruentis uero ob bilis acredinem gingiuas, præter opinionem utilis est foliorum hyoscyami succus, aut decoctum cum sapa, aut cum palmarum stillamento calidum ore retentum. Folijs autem ad manum non existentibus radicem eius decoque cum passo, & retinendum exhibe decoctum. Vtile est & alumen scissile cum myrto, si quàm tenuissimè trita adhibeantur. Vbi uero adstrictas iam cognoueris gingiuas, colluendā sapat calidam exhibeto. Aliud. Asclepiadæ, ad cruentas gingiuas. Balaustiorum, florum rosarum, ramorum myrti, singulorū æquales partes, cum posca dilutione decoquito, & liquore inde percolato, ac cum in ore retinendum exhibeto. Aliud. Ramorum lentisci, balaustiorū, radicis mali cotoneæ, singulorū æquale pōdus in posca decoctū exhibeto. Epithema ad sanguinē ex gingiuas erumpentem. Polentę partem unam, uinaceorum uult tantundē, succi sanguinariæ quantum satis est, cōtere, & ad ceratū crassitiem redacta, impone ad sanguinolentū locū, aut simul cū succo tādū tere donec arefiat, atq; hoc modo trita insperge. Aliud. Spongiā nouā siccam in sanguine taurino madefactā in uasē fictili exure, contere ac reponere. Vbi uero uel uelis, cineris ipsius drachmas quatuor accipe, thuris drachmas duas, chalcididis crudæ drachmas duas, & simul trita insperge. Aliud. Terebinthinæ aceto torrefactæ drach. iiii. aris drach. ii. tritis utere. Calidas uero in ore inflammationes & gingiuas corrosas, in quibus salsæ cuiusdam aut mordacis humiditatis sensus percipitur, maxn opere iuuant dulcium aquarum balnea, quæ superfluitatem quidem per sudores euacuant, sanguinis uero acredinem obtundūt. Quare si nihil prohibuerit, bis ac ter lauans, nō lædes. Illinendum est autem caput oleo rosaceo cū aceto.

Ad excrecentes gingiuas, putrescentesq; ac tumores. Cap. XXII.

Ad gingiuarum tumores, easdemq; excrecentes & putrescentes, conueniunt tum colluta, tum ore retenta, oleū ex immaturis oliuis expressum, oliuarū cōlymadum muria, cedria cū aceto, gallarū decoctū,

u pruni

pruni folia ex aceto decocta, cytinorum decoctum, corticis mori aut etiā foliorū eius decoctū. Arida uero & trita, gingiuis admoueri cōmodē possunt hęc: radix aristolochiæ, plantaginis semē tritū, bitumē tritū, feniculi radix usta, pulegiū ustū, diphryges, rubigo ferri, chalcantum assatū, gallæ, cytini, malicoriū, balaustia. Optime autē prodest gingiuis à fluore affectis: aceti & mellis, cuiusq; librā 1. aluminis sextantē. Decoque ad consumptionē aceti, & utere.

Aliud. Aluminis scissilis, myrrhæ & thuris, æquales partes cū melle illine, ac postea uino collue. Medetur autē ex his gingiuis & humore pregnantibus, lac asininū calidū collutū: foliorū oliuæ decoctū, aspalathi decoctū, Platanī folia in aceto aut uino decocta. Sicca autē adhiberi possunt, rubigo ferri, balaustia, & cytini. Aliud siccū. Quod ad putredines oris gingiuasq; depastas ac eruentatas efficax est: ad rōsillas etiā, ac glādulas & columnellā siccū admouetur: ad quassatos uero dentes, aceto dilutū detinetur in ore. Gallarū quæ omphactides appellatur, aluminis scissilis, æquales partes accipe, ac ut ualde efficaciter utere. Siccū floridū, quod Græci antherō appellāt. Cyperi dra. viii. crocomagmatis, myrrhæ, aluminis scissilis, iridis, cuiusq; dra. ii. croci dra. i. sandarachę dra. iii. permixtis utere. Alius siccus puluis, floridus Oribasij. Cyperi, croci, utriusq; dra. ii. aluminis scissi, sandarachę, iridis, gallæ, cytinorū, singulorū dra. iii. floris rosarum, dra. vi. misce ac utere. Ad putredines in ore. Foliorū oleę ustorū, radicis lactuæ, malicoriū, singulorū dra. i. costi parū, utere.

Ad corrosas & ab ulcere serpente infestatas gingiuas. Cap. lxx xiii.

His qui corrosas gingiuas habent cū tumore atq; etiā dolore, atque etiā quibus à serpente ulcere depascuntur, summe auxiliatur somentum hoc. Specillo auriculario lanam innecte, ac in seruēs oleum intinge, eamq; donec exæquentur gingiuis adhibe, & quousq; undiquaq; appareant albæ. Ita enim ulcus serpens sistitur, atq; ex sana carne id quod corrosum est connutritur. Post hæc autem utere adfrictorijs ad gingiuas descriptis. Proprie autem cōuenit galla tenuissimē trita, acerabuli mensura, cum myrrhæ magnitudine fabæ, quibus tritis utere siccis. Præter opionem autē ad corrosas, & quæ serpente ulcere infestantur gingiuas prodest id quod ex chalcitide & cadmia constat siccū. Sint autem chalcitidis crudæ drachmæ duæ, cadmiæ uncia una. Cadmia in aceto ad solē estiuū aliquot diebus sufficienter conteratur: deinde adijciatur quoq; chalcitidis, & similiter cū ea cōteratur, adfuso sepe aceto: post uero ambobus exsecatis, tritis & cribratis: utere siccis, sed cum cautione, ne quid ex pharmaco hoc deglutatur. Præclare facit etiā in serpente gingiuarū ulcere, id quod Helio caës, hoc est, sole ustum appellatur siccum, constans ex calcis partibus duabus, auripigmenti una & dimidia. Verū cōterere oportet & hoc ipsum in aqua, sub exoriente caniculæ ardoribus, ita ut ter aqua diffundatur, & postea pharmacū desiccetur. Cauendum etiā opem corrosis gingiuis affert, id quod ex chara usta constat siccum, siue per se solum, siue cū melle adhibeatur. Aliud, ad ulcera serpentina gingiuarum. Aluminis scissilis, florum rosarum, cuiusq; drach. ii. salis fossilis drach. iii. croci drach. i. utere

siccū, aut cum melle cocto. Floridum ad gingiuarū abscessus, ac ulcera oris profunda ac crustosa. Aluminis scissilis, cyperi, cuiusq; drachm. iiii. myrrhæ drach. viii. sandarachę drach. iiii. iridis drach. iii. croci drach. unam. Aliud: Cyperi drach. iiii. sandarachę dra. iiii. myrrhæ, croci, aluminis scissilis, iridis, cuiusq; dra. ii. utere siccū, & cū melle. Denudatas autē gingiuas carne implet pharmacū hoc. Seminis rosarū nō antiqui partes duas, calami odorati Indici partem unā, siccū tritū adhibe. Aliud. Florum rosarū dra. iiii. calami dra. iii. malicoriū drac. ii. aluminis scissi drach. i. Optime autē carnem gignit & hoc quod ex eruo constat, siccum capitale. Relatum est autem in his quæ uulneribus adhibentur remedia.

Ad parulidas, hoc est, gingiuarum inflammationes.

Cap. lxxiiii.

Parulis est inflammatio partis alicuius gingiuarum cum tumore, quæ ubi non dissoluitur, suppuratur. Quare in principio adiuuare oportet quo submitatur, per dissoluentes uidelicet collutiones, quales sunt succus pisanæ, decoctum seminis lini, aqua mulsa calida, aut mulsum. Deinde siccis deprimenda est eminentia carnis. Conuenit autem eis hoc: Sulphuris uiui, piperis, aluminis scissilis, partes æquales. Deprimat autem parulidas alumen omne ustum, aut etiā soris, si trita adhibeatur. Quod si suppuretur, ferro uenæ incisoria distractam & excisam linamento imposito disparato, aut cum linteoili rasura. Amat autē magis excisionem gingiuarū abscessus. Simpliciter enim incisi, in fistulam proficiunt. Post excisionem medicandum est ipsum huius per collutiones: & cauum quidem eius, eo quod ex eruo constat siccū capitale impleto: ubi uero ad æqualitatem perueneris, eo quod floridum appellatur utitor.

De epulide, id est, excrecente gingiuarum carne.

Cap. lxxv.

Epulis est excrecentia carnis ab inflammatione confecta, iuxta anteriorem dentem molarem, aliquando cum febre & uehementi dolore internarum molarum, ut neque os ægro aperire liceat, contingens. Primum itaque inflammationē soluere oportet per collutiones eam submittentem, qualis est aqua mulsa, succus pisanæ, decoctum seminis lini. Proderit autem & totam maxillam cataplasmate ex semine lini & aqua mulsa integere. Vbi uero inflammatio soluta fuerit, & hiare iam poterit infirmus, medicari oportet epulidem siccū deprimente: maxime eo quod iam in parulide dictū est, atque etiā eo quod ad serpentina gingiuarū ulcera descriptum est, ex chalcitide & cadmia. Imponenda est etiā rasura linteoilorū. Vbi autē serius caro cōsumeretur, siccū quod carnē excedit apponatur: uelut est ærugo per se, aut cum æqualis ponderis galla, aut siccum quod appellatur flauum: deinde rursus rasuram linteoili impone. Qd si adhuc morā traxerit epulis, forcipe arrepta, excindatur cum tenui scalpello, aut si maioris ensis loco paruo. Sequentibus uero diebus curetur huius per collutionē aquæ mulsæ, & per capitale siccū, rasura linteoili adimposita. Postremū florido siccū tota cura cōpleatur. Deprimat autē epulidas, galla per se, chalcitidis cruda & usta, soris ustum, alumen omne ustum, balaustia, squama æris in aceto ad solem aliquot diebus exposita, contrita, & rursus exiccata.

Probe

Probe facit & hoc; aluminis scissilis drachmas .ii. gallarum drachmas quatuor, salis torrefacti drachmam unam. Vtere sicco.

De gingivarum fistulis. Cap. xxvi.

Gingivarum fistulas dissecare ac explanare conuenit, atque post incisionem curare huius eo modo quē paulo antē diximus. Vbi uero usque ad radices propinquū dentis fistula ipsa extenderetur, conandū est, ut quātum possibile sit, per fistularia collyria explanetur, & per siccum, quod flauum appellatur, melle exceptum curetur, & consimili modo id quod constat ex eruo postea adhibeatur. Quod si confusio & perturbatio aegri non comitetur aut potius libenter hoc ferat, priuablis eum dente affecto. Hocq; modo eruetur & fistula, & confidet gingiua: atq; omnino facilis erit, ea quae deinceps requiritur, cura.

Cura dentium a calido morbo doloroso affectorum, ex Adamanto sophista. Cap. xxvii.

Gingiuīs dolore affectis propter inflammationem aut corrosionem, conuenientia ad hanc rem remedia locis affectis nudis adhibenda sunt, quae sanē aut omnis mordacitatis expertia sint, aut mediocriter acerba, & terrei temperamenti. Vbi uero dentes solū patiuntur, aut cum eis simul cōcreti nerui & pellīculae, tum ipsis curatiuis pharmacis, ea quae tenuium partium in sua substantia existunt adiungimus, quo uis ipsorum in profundū perferatur. Et si quidem frigidus sit morbus, calida tenuium partium adnectimus. Si uero calidus, ea quae refrigerare possunt, & simul tenuium partium existunt, commiscemus. Calida itaq; existente affectione, & uigente aetate, & temperamento calido, & regione & aeris statu cōsimili, ad collutionem oris preparabimus, in aceto albo decoctam radicem halicacabi, semperuluū minus, portulacum, perdicium, & glycyrrhizam. Quod si intolerabilis existat caloris sensus, utēdū est hyoscyami folijs, aut semine papaueris hortenſis, & semine lactucae, decoctis in aceto albo. Si uero unā cum dentibus gingiuae ipsae doluerint & inflāmatæ fuerint, acetū ut acutū & hostilē gladium deuita: suo enim acore gingiuas corrodit: maxime itaque cōsolatorium eis existit, lac asininū. Ego autem aliquando cuidam huiusmodi temperamenti existenti, & in hanc affectionem delapso, oleum rosaceū & myrteum in ore detinendum exhibui, & sanē urī sibi uidebatur hic homo, tanquā a face accenderetur. Niuē itaq; cū melle rosaceo miscui, & moderatē tepescē, quo frigoris uehementia frangeretur, & ore detinendū exhibui, & a dolore liberaui. Maximū etiam auxiliū affert, ea quae ex papaueris capitibus apparatus antidotus soporifera, si tepida ore retineatur. Similiter & lac asininū assidue collutum; & sapa quoq; ore retenta. Optimum etiā remediū eis existit, pastillus qui ex seminibus cōstat soporifer, & consimiles, sapa subacti, & affecto loco obducti. Oportet autem & caput madefacere ex rosaceo cum modico aceto diluto: idemq; auribus instillare cū aceto. Aut terrenos uermes oleo decoctos in propinquā aurē instillā. Aut millepedes sub aquario uase stabulātes, quae & aselli à Græcis appellantur, eodē modo. Similiter & araneos, & blattę interanea oleo decocta in aurē infunde. Nutriatur autē ex prāsana, halica, ouis, lactucis, & cucurbita, & quęcūque tandē his potestate sunt propinqua. A uino autē abstinēat. Ad cōmanducandū

uero exhibe subdolentem maxime dentem, herbae perdicij radicē, aut hyoscyamum: praesertim in balneo, ita ut contineat in ore succum ex eo donec inde egrediatur. Suffire etiā conuenit egro hyoscyami semē, aut canis mortui dētem. Inde enim statim dolor sedatur. Eodem modo etiā terrenos uermes suffito,

Cura eorum quibus ex frigidityte dentes do-

lore afficiuntur. Cap. xxviii.

Frigidus dentium morbus cognoscitur ex figura tum capitis, tum reliqui corporis, & ex ea quae praecessit diæta, itemq; exercitio, ac reliquis quae ad hunc ordinem referuntur. Medeberis autem diæta omni ad caliditatem ordinata. Sint itaq; cibi, prāsana cum pulgilio decocta aut cū ruta, aut cui post cocturā additum est piper, similiter & halica, olera, petroselinū, & similia. In potu exhibendum est uinum, modicū tamen, & mulsum, atq; etiam quod appellant Conditum. Sero uero ubi dormire uoluerit, confectionē ex calamintha cito penetrantem, aut potu, aut linctu deuorandam exhibe. Ad oris collutionem, in aceto decoquito origanum, calamintham, hyssopum, pulegium, dictamnium, satureia, tithymalli radicem, chamaeleonis nigri radicem, uerbenacę rectae radicem, eryngij radicem, uerbasci radicem, ueratri nigri & capparis radicem. Vnumquodque enim eorum aceto decoctum ac ore collutum dolores dentium sedat, qui a frigidityte sunt obordi. Ad eos uero quorū sensus citius afficitur, hęc cum posca decoquantur. Porro ex uino si decoquas praedicta ac colluas ter aut quater in mense, praemuniunt ac conseruant eos qui frigidiore temperatura sunt, ne dolore dentium adficiantur. Obseruatum est & pinguium lignorum, uelut cedarū ac picearum, decoctū ipsis prodesse cōtunduntur autem haec ac cū caricis decoquantur aduſo uino; collutum enim hoc ipsum dentium dolores mitigat. At uero & ipsas tedas contulas in oleo decoquere licebit, oleumq; calidum in ore continere. Quinetiam ipsas tedas conuassatas solas ore detinere cōmodū existit, circa affectum maxime dentē. Succus etiā balsami in ore retentus, non parua de se praebet cōmoditatem. Itemq; castoreū cum nardo auribus infusum. Quod si omnes ex aequo doleant dentes, in ingressu balnei cedriā in os coniectā usquequo egrediatur contineat, & dolore liber erit. Commodum etiā erit manducandas & loco dolenti admouendas exhibere, radicem pyretri, radicem tithymalli, & ricini. Similiter autem & theriacen, aut Esdrae antidotum, sapa dilutum ore detinendū exhibe. Praclare facit & Philonis antidotus illita, & quae appellatur Sotira. Suffito autē canis mortui dentē, ita ut sumps inde progressus ore excipiat. Post uero ipsum dentē uſtum, & modico aceto tritū, calidum ore retinendū prebe, & dolore liber erit. Poteris & alcyonium suffire. Capitis uero cura in primis habenda est. Ad id ergo huiusmodi insperſione utaris: helenij quadrante, iridis sextante, aristolochiae logae uncia unā. Quod si fortiter infestauerint dolores, fomentū adhibe ex milio, aut eruo, aut tritico torrefacto cū bacis lauri, modico adiecto sale. Vt ne putrescant molares immobilesq; conseruentur. Succi racemorum uitis albæ libram unam & dimidiam, corticis radicis mori sexuncem, decoque ad dimidium, calidūq; ore retinendum per septem continuos dies exhibe. Qui enim hoc utitur nunquam dentis dolore afficie-

tur. Collutio, proprie ad dentes ualēs. Corticis radicis hyoscyami drach. viii. pyrethri drach. iii. spicæ nardi drach. i. mellis dodrantem, aced libras tres: decoque cum aceto in fictili nouo, & percola: deinde adiecto melle utere.

Cura dentium ab humiditate dolore affectorum,

& laxatorum. Cap. xxxix.

Assumamus autem mox alium egrotum, qui uniuersam corporis mixturam, in primis uero capitis habeat humidiorē, uiuatq; delicatius, & domū habeat in humiliore loco sitam: instet autē tēpestas humida, & hora uernā, quā adficiat. Quisnā sanā mentē habens, his uis, non dixerit à superabundante humore in hoc morbum esse productum. Etenim quum nerui qui se ad dentes inserunt, permadescunt, laxioresq; fiunt unā cum circumadherentibus corporibus, necessariō dentes mobiles fiunt: uerum multis hoc citra doloris sensum accidit. Sæpe enim iam diximus, humiditatē per se non solere dolores inferre. Et dictū quoq; antea est, ob ætatē senilē quibusdam dentes laxari, & quod pharmacis adstringentibus gingiuas, ac densantibus easdem, senes queāt iuuari. Porro percussis etiam dentes laxantur, his maximo pere prodest alumen scissile, cū myrrha troglodytica tritū, ac inspersum ad dolentē dentē, atq; id ubertim & continuē facere oportet. Nā ipsum cōfirmat. Eos uero quibus ab humiditate uacillant, curare conuenit per diētā ad siccitatē ordinatā, & cū diuturniore abstinentia ciborū. Cibi itaq; eis cōuenientes sunt sordiles, halica, panis ex iure madidus, aut oryza, aut polenta cū aqua mulsa. Neq; male cōuenit eis miliū & lenticula, pisces muria cōditi, uolucres montanæ & sicciores. Ex oleribus, brassica, & similia. In potu aqua exhibēda est, sed nō multa. Quod si concoctio nil non officeret, aqua mulsa danda esset: itaq; si hanc ferre nequeunt, ad aquā modicū uini addatur. Tēpore autē ad afflictionis, fouere cōuenit locū cū milio & sale. Collutiones exhibendæ adstringentes, & desiccantes, aut salæ, nisi gingiue simul sint affectæ. Quare gallas, quas omphacitidas appellant, ex acri aceto decoctas, & alumen aceto permixtū exhibebimus: itemq; spinę Aegyptiæ semen, malicoriū, myrti baccas, cytinos, balauitia, oliuę folia, platani folia, compressi pilulas, rumicis syluestris radicē, lappæ radicē, folia rubi, & quæcūq; alia acerbā in se qualitatē complectūtur: ita ut his cū aceto puro, aut etiā aqua mixto, aut uino decoctis, os colluere præcipiamus, & in eo detinere adhibitū liquorem, sensui uidelicet uegrī maxime gratū & conuenientē. Iudicata etiam & perpēsa eorū quæ offerimus potentia, nimirum plusne an minus exhibere oporteat, iuxta exuperantis humoris multitudinē. Ego autē optimā ad collutionē oris expertus sum, oliuarū muria conditarum aquā, in quā uidelicet cōdiuntur. Etenim omnē oris humiditatē muria ipsa extergit: corporū uero hiatū & laxitatē, oliuarū spissamētū coercens corroborat & firmat. Aliquando etiam oliuarū albarū contusarū & expressarū accēpimus succū, eoq; cū rutæ succo & melle permixto, cōfricauimus dentes: postea uero inspersimus indicam nardum cū pari pondere aluminis rotundi, & salis duplo adiecto. Optime quoq; faciunt ad hanc rem illitiones acerbæ: uelut est confectio de moris ori ualde conducens, maxime si alumen scissile habeat adiectum, & ea quæ ex

nutum succo apparatus eodem modo. Aut alumen scissile, & misy pari pondere cedria excepta, in ceratū liquidū densitatē redige, & cum eis dentes illine, ac pituitam defluere permittit: deinde lacte asinino calido mordacitatē eleuant, aut uino dulci. Aut alumen, & myrrham troglodyticen inspergito, aut cū aceto, aut melle illinito. Siccæ autē insersiones semper eis sunt cōuenientes. Ultra hoc enim quod dentes commotos firman, etiam ex humiditate hiantes gingiuas cōmittūt. Itaq; spodiū cypriū loni, & exiccarū inspergēs, os collui præcipe ex aqua myrti aut rubi, aut alieuius consimilis decocti. Postea rursus spodio insperfo, quiescere iube. Aut etiam rubiginē ferri siccam trita admoue, aut fortī ustum. Aliud, ad laxatos dentes & gingiuas humectas. Aluminis scissilis in fictili usti drach. vii. myrrhæ dra. iiii. gal larum, florum rosarum, iridis, singulorum drach. ii. croci dra. i. utere. Aliud. Cornū cerui usti drach. viii. rhois culinarij drach. iiii. omphacis sicci drach. mas ii. balaustiorum drach. iiii. corticis pinus, myrrhæ, croci, singulorum drach. i. Aliud. Alumē rotundum cum duplo salis pondere tritum, dentibus ob humiditatē labantibus inspergito. Aliud. Myrrhæ, aluminis scissilis, amyli, pompholygis, æquales portiones, sicce, tritæ, insperse, labātes dētes firman. Aliud remedium, quod laxatis ac dolētib; dentibus præsentem fert opem. Aluminis scissilis sextantem, radicis struthij sicce tritæ uncia unā, contritis simul affectum dentem adsperge, teneatq; donec salua os impleatur: & tūc sanē ipsam expuat, & effundat, moxq; dolore liberabitur. Aliud, quod & dentes dealbat. Aluminis scissilis trientē, mastiches unc. i. thuris drach. iiii. folij drachm. iiii.

Aliud, quod & firmat, & corroborat dētes. Aeruginis, aluminis scissilis, aut magis quod appellatur phorimō, minij, singulorum æquales partes ure re sicco, aut cū passo. Aliud. Florū rosarum, balaustiorum, myrrhæ, mastiches, cuiusq; unc. i. chalcididis assæ, thuris masculi, corticis pinus, cuiusq; dra. iiii. salis ammoniaci unc. i. Utere sicco. Aliud, quod & ad exulcerationes oris cōmodū est usurpare. Rubiginē ferri, aut ipsum ferrum multa rubigine oppletū, igni candefacto, & in aceto puro, aut cum aqua diluto, aut uino, in his quibus sensus facile læditur, exstinguit, ac liquorem ipsum in quo extinctio facta est, ore cōtinendū exhibeto. Dentes enim firmat, & ulcera curat, præclarē etiam facit siccum, quod floridum appellatur. Aliud, Galeni. Quo ego utor, inquit Galenus, polytrichi palcarū ustarū sextarium unū: continet autem sextarius harū unc. xxviii. aluminis scissilis quadratē, aluminis rotundi quadrantē, spicæ nardi sextantē, folij unc. i. pipēris unc. i. pyrethri drachmas. v. confusa & cribrata gingiuis usque ad dentium radices adhibeto. Vile etiam existit his, thus cum pipere manducatum: itemq; rubus commanducata ac ricini radix. Prodest etiam Esdræ antidotus sapa diluta ac ore retenta, eodemq; modo theriace Andromachi. Quinetiam in uesperam potū accepta theriace magnificē auxiliatur. Scribit Archigenes, ut uerum & naturali modo ad labantes dentes accommodatum. Dentem, inquit, canis mortui in nomine eius, qui ægrē habet acceptum, super prunas pone, uaporemq; inde prodeuntem æger aperto ore admittat, & fir-

& firmabuntur ei dentes. Similiter autem & exustū canis dentem cum aceto calido tritum, ore retinendū exhibe. In his uero qui facile ab aceti sensu offenduntur præbe cum uino.

De dentibus lima atterendis.

Cap. xxx.

Solent ferè dentes moti ac labantes reliquis esse prominentiores, maxime quum ex uerbere hanc affectionem incurrerint. Quare uisum est mihi eos lima atterendos esse, in quantum scilicet præ alijs prominent, ne in loquendo uel etiam manducando, eos qui obijciuntur, offendant. Adtestatur autem & experientiam ipsum, quantum sanè ego eius rei periculum feci. Ferream namque limulā ad hanc rem apparatus, quo citius ac efficacius res procederet. Nam multæ aggressiones cōcutiunt dētem, quiete opus habētem, si modo aliqua spes est, moti dētis firmandi. Sic autem caput ipsius limæ obtusum, forma nuclei, & quam leuissimum. Itaq; aliquando quidem inæquales quædam dentū eminentiæ apparent, in quibus partes tantum aliquas lima atterere opus est. Aliquando autem æquali planicie extremitates prominent, quare equali etiam ac plana per limam attritione indigent. Oportet autem molle quoddam linteolum gingiuis ipsis usq; ad dentium radicē adhibere. Deinde leniter sinistrae manus digitis apprehendere, cauteq; ac citra offensionem limam adfricāre: ne dum limam tolerat, dens ipse cōcutiatur. Quod si omnino dolorem percipiat eger, dum lima adhibetur, aut ob id quod uehementius digitis dentes apprehendantur, quiescere statim conuenit, interimq; collutiones, dolorem mitigantes, offerre: deinde rursus, ut dictū est, rem aggredi, & paulatim lima deterere. Atque hoc non prima saltem die bis aut ter conari, uerum & secunda repetere: ita ut ægro imperes, ut neq; sermone nimium utatur, neq; ullum aliquem duriores cibū adsumat. Utatur autē cibus sorbilibus, aut pane madefacto. Quod si citra laxitatem, quibusdam dentes præter morem auget, eos similiter lima atterere oportet, ac collutiones eos cohibentes ac densantes offerre.

Cura dentium à siccitate dolore affectorum, ex Adamanto Sophista.

Cap. xxxi.

Quartus iam ex ordine subiiciendus est ægrotus, qui uidelicet à sicca intemperie afficitur. Eam autem efficiūt, autumnalis tempestatis cōstitutio in primis, & uita erūnosa, tenui accedente diæta. Præterea regio sicca, & ambientis nos aëris status cōsimilis. Ad hæc accedit id quod nunc adest corporis ipsius temperamentū siccū, & maxime si caput eiusmodi sicca intemperie est affectum. Sicis autē insidet semper, nisi adsit frigidity una cū siccitate. Minimū etiā spiritus enclunt sic affecti. Et ob siccitatē dolor intolerabilis ferè eos concomitatur: austerorum & acerbiorum usus maxime contrarius eis existit. Quare confectio ex moris sepe his uehementē dolorem induxit. Itaq; collutiones minimū adstringentes, & mediocriter humectantes apparare oportet: aquam calidā per se, aut furfurum decoctum, aut radicis dulcis, aut pisanæ succū, aut amylium cū sapa aqua calida diluta: lac per se, maxime asininū, malug decoctū, & alia quęcūq; his sunt similia. Cibus autem his conueniens est succus pisanæ, micæ madefactæ, cucurbitæ, malug, oua sorbilia, & quęcūq; his prosunt qui humectatione indigent. Atq; hætenus quidem simplicium intempe-

rum curam ostēdimus. Manifesta uero & hinc sic ea, quam cōpositæ requirunt: Nimirum ex dictorum mixtura cognobiles, & ex tēperatura ostensorū auxiliiorū curā accipientes. Verū propter eos qui se nuper ad hanc disciplinā contulerunt & in expertos ad huc, age paucis unius tantum cōpositæ intemperiei mentionem faciamus, quæ ut manifestum exemplum ad reliquas cognoscendas statuatur.

Cura dentium ob caliditatem & humiditatem dolore affectorum.

Cap. xxxii.

Sit sanè regio calida & humida, tempus autē anni uerū, & aëris quoq; status calidus & humidus, qualis est austrinus. Cōtingat itaq; eger, qui caput habeat, quod facile eiusmodi humiditate impleatur, cuiusq; coma plurima sit & subrufa, & totius corporis temperamentū calidum & humectū, & cōsimili quoq; utatur diæta. Quis autē, qui saltē probatus medicus haberi uelit, in hoc calidū & humidum esse morbum nō imaginetur? Medeberis igitur ita affecto bifariā: Si enim excessus naturę cōtingerit iuxta qualitates tantū, scopus curationis dirigendus est ad alterationem solam: Si uero una cum qualitatū excessu, & humorum multitudo adfuerit, palam est primum oportere corpus euacuare, deinde ad temperiem reducere: cuius rei in omni corporis intemperie memorem esse conducit. Eū uero qui à calido & humido morbo affectus est, de quo nūc dicere institui, per uenæ incisionē euacuare cōueniēs est, utpote à sanguinis multitudine exagitatū. Calidus enim & humidus sanguis ipse existit. Incidere autē oportet uenam cubiti superiorē, quæ Græcis humeralis appellatur: quæ si non contingat, eam quę media existit. Quod si quid prohibeat uenæ incisionem facere, modico & tenui uictu superfluum & non necessarium detrahit humorem. Atq; hoc modo etiam circa reliquas cōpositas intemperies operaberis: ita ut eas quę iuxta qualitatem tantum cōstituerint, alteres, & contrarijs qualitibus permutes. Eas uero quæ cum substantiā quadam cōsistunt, humore per conuenientes purgationes detracto euacues: nisi quid & in his purgationem fieri præpediat. Reliqua autem quę adferre oportet auxilia, ueluti sunt collutiones, & uictus constitutio, facile ex prædictis inuenire licet. Qui enim formam tractandi simplices morbos cognouerit, in promptu habebit & circa mixtos conuenientia remedia inuenire. Cognoscitur autē affligens humor, quum ex reliquis circa corpus signis, tum ex consequenti dolore. Flauæ namq; bili dolor pungitius comes existit. Picitam uero sequitur una cū frigidity distensio locorum: & fece quidē sanguinis siue atra bile affligente, sensus adest, uelut corpuscula quædam in profundo confringantur: ubi uero æqualiter omnes auget, multitudine eorum in corpore coaceruata, grauitas concomitatur. Verum enim uero & sapor ipse influentis humoris ægro specimen sui ostendit. Aut enim amaritudinem, aut salsedinem, aut acedinem sensu perceptat.

Curatio erosorum dentium ex Galeno. Cap. xxxiii.

Erosiones & cauernæ dentium ex influxu acrimie & erodentis maxime naturæ humorum generantur: quemadmodum etiam ulcera in cute, citra aliquam externam causam. Manifestum igitur hinc erit, quo modo sanandi sint erosi dentes: nimirum per excoctionem influentis uisidoli humoris, qui si paucus fuerit

fuerit, localia remedia ex desiccantibus pharmacis conflata suffecerint: si uero multus fuerit influens humor, totius capitis respectu habere conuenit: contingit autem aliquando caput affici, ob reliquum corpus affectum, quare in his uniuersi corporis cura nos gerere oportet. Archigenes itaque ad hos haec remedia descripsit: Sori resina, terebinthina exceptum, denti circumlinito, atque in cauerna indito. Praclare facit & hoc: Sulphur uiuum lycio exceptum cauernae impone, & prius depurgatum dentem per orbem ex eo integre: aut gallam tritam lycio aut resina terebinthina exceptam ad cauum intrude, similiterque depurgato denti appone. In maximis uero dentium doloribus summe prodest hoc: Senectam angulum uistam ac tritam cum oleo in mellis crassitudinem redige, eodemque modo, ut dictum est, utere. Aut senectam ipsam non uistam dentibus adfrica: inde enim excident, aut melanthium torrefactum ac tritum cum oleo similiter adhibeto: aut melanthium torrefactum & acris aceto adfuso tritum cauo denti indito ac circumlinito. Si fitur enim erosio, neque quicquam addet ultra.

Aliud. Melanthii partem unam, alii dimidiam, & salis parum quiddam, simul contrita circumponi eo, a dolore enim liberat. Proderit autem & ad erosiones dentium uti ea quae supra ad motos dentes descripta est collutione, ex succo uidelicet bryoniae & cortice mori. Aliud. Veratrum nigrum tritum & melle cocto exceptum in cauernam impone, & praemundatum similiter ex eo integro dentem. Aliud. Thuris partem unam, atramenti sutorii partes duas, contere cum passo, donec cerati crassitudo fiat: utere ut dictum est, & cito sedabis dolorem. Aliud. Galbani partes duas, thuris partem unam, contere cum passo ad cerati crassitudinem: utere ut dixi, & eo ipso die sedabitur dolor. Aliud. Alumen scissile in caua intrude, & a dolore liberabis. Aliud. Fel uris indito, & ab erosionem liberabis. Aliud. Rhododaphnes uirgultum exustum & tritum, insperge cauernis, & medeberis. Andromachi compositio, ad dentes molares, quae eadem hora dolores sedat. Piperis, pyretri, succi tithymalli, galbani, singulorum aequales partes, galbano exceptas, cauernis impone. Aliud. Asclepiadae. Eo, inquit, usus adseruauit caua dentium citra dolorem. Gingiber in aceto mulso decoctum, & probe tritum, in caua imposito, similiterque extrinsecus ad dentem admoueto. Praclare etiam facit ex duobus piperis generibus composita antidotus, cauis indita: atque etiam oleo amygdalino aut nardino aut rosaceo diluta, & in uicinam affecto denti auriculam instillata. Aliud. Ego autem ad caua dentium cum dolore affecta, Esdrae Antidoto utor, quam sapa diluta, & calefacta ore retinenda exhibeo. Mirum enim quam dolores ea mitiget, uerum si ad manum non adsit, theriaca Andromachi eodem utor modo. Fomentum etiam affecto denti adhibere conuenit huiusmodi. Origani sicci ramulos feruente oleo imbutos egro denti apprime. Aut ricini uirgulto similiter utere: aut staphida syluestrem scalpello probe adaptatam, ac affixam, itemque pyretrum adhibe similiter: aut cera super affectum dentem pone, eamque cum specilli extremo ignito apprime. Id enim contingere facere non ab re est. Est autem & haec quaedam fomenti species: primum optime praemundato dente, hyoscyami semen suffuso, exurgentemque hinc su-

mm aeger admittat infundibulo adhibito, ad affectum dentem: mirum in modum etiam erosiones dentium mitigat, canis mortui dens, quemadmodum & ante dixi, eodem modo suffusus & exustus in aceto tritus oreque retentus, probe etiam auxiliatur uermes terreni suffusi. oleum quoque in quo uermes terreni decocti sunt, in uicinam affecto denti aurem tepidum infusum, dolorem uehementer lenit. Idem praestat blattae domesticae capite detracto adeps, cum rosaceo liquefactus ac auri instillatus. Eodem modo & hederæ albæ adnos quinq; cum rosaceo tritos & in punice cortice calfactos in aurem assidue instilla. Auxiliatur etiam radicis hastulae regiae succus, itaque nasturtij similiter instillatus. Prodest quoque in uicinam affecto denti narem infundere anagallidis ceruleae succum, aut radicis betæ succum aut atramentum sutorium cum lacte. Apollonii. Cumini quantum tribus digitis apprehendere potes, myrrhe, magnitudinem fabae, interioris cucumeris syluestris, duplum cum lacte muliebri in collyria redige, eaque in utramque narem immitte: atque ubi tamdiu haeserint, donec quinq; stadia quis cursu conficere possit, extra here iube, fortiterque ipsum pharmacum emungere. Idem etiam ad aurium dolores eodem modo sumptum prodest.

Ut dens citra dolorem, & absque ferro extrahatur.

Cap. xxxiiii.

Quod si dentem tollere animus sit citra dolorem, hoc te pharmaco auferendus erit uehementer ad hanc rem congruente. Pyretrum acerrimo aceto in dies quadraginta conditum, deinde tritum, in usum adserua: qui ubi postulauerit, reliquos dentes cera praemuniatos custodito: ipsum uero qui dolet circumcirca purgatum hoc pharmaco integro, & post horae interstitium digitis extrahito, aut scapello exigito. Aliud. Sori acerrimo aceto, ad dies decem, in sole aestiuo contritum ac exiccatum, praemundato denti imposito, & excidet. Aliud. Sandaracham eodem modo apparatus, imposito. Aliud. Sori & tithymalli succum galbano excepta depurgato prius denti apponito. Aut cucumeris syluestris radicem, ut pyretrum apparatus, eodem adhibe modo. Aliud. Grana enidia trita ac galbano excepta, circumponito, & excidet. Aliud. Praclare facit lappæ herbæ radix feruenti cinere calfacta, & denti assidue apposita: pauca enim mora dentes tollit. Aliud. Cucurbitæ syluestris radicem cauo impone, & dentem eruet. Aut ipsam cucurbitam tufam & cribratam per aliquot dies in aceto macerato, donec ad mellis spissitudinem redigatur: deinde in eo ipso pharmaco scalpello frequenter dentem circūradito, atque os claudere parumper iubeto: deinde dentem digitis apprehensum trahere, & sequetur. Aliud. Vermes terrenos in testa exustos, in cineremque redactos contere, & circumraso prius denti ubertim adsperge, & per diem ac noctem excidet sua sponte. Itaque eo confidenter utere: ut mysterium enim celebratum est iam saepe. Poteris autem & citra scalpelli rationem inspergere, idemque opus patrabit. Aliud. Corticem radicis mori teneriorem tritum, ad dentem quem erutum cupis, solum impone, & excidet. Aliud. Sori, gallam, staphida syluestrem, alumen scissum, sulphur uiuum, piper longum in puluerem redige, & adiecta cedria subige: deinde ceram modicam liquefacta adfunde, simulque committe. Vbi uero uis uelis,

ex hoc, quantum opus fuerit emollito, ac depur-
gato prius denti circumponito. Aliud. Erucam
brasica natā frequētius ad ipsum dentē adhibe,
cadetq; sua spē. Enīc etia dentē syluestris oleæ lacry-
ma cauo eius indita. Itēq; rhus qua coria inficiuntur.
& lacryma & succus syluestris fici, itemq; tithymal-
li, Cauernā aut supnē galbano aut cera obturato.

*Smegmata uaria ad denigratos, liuentesq; ac ra-
refactos dentes.*

Cap. xxxv.

Liuent aliquando dentes per uniuersam ipsorum sub-
stantiā, nō dissimile quiddam inflammationi patiē-
tes, ob influxum uidelicet uidosorum humorum.
Quare consimili cum his qui erosionem passi sunt,
indigent curatione: nimirum per desiccantia phar-
maca: suntq; smegmata eis conuenientia. Apollo-
nius itaq; ad denigratos dentes hæc præscribit: Sal
fossile melle subactum in fictili uase torreto, ac tritū
modica myrrha misceto, eoq; dētes cōfricato. Aliud.
Pulegij ac salis æquales partes melle subige,
ac aceto acerrimo adfuso exure. Aliud, quod gin-
giuas adstringit. Polentam aceto acerrimo suba-
ctam in olla exure, ac contere, cumq; ea dentes con-
frica. Hoc enim & gingiuas ipsas cōercet. Aliud.
Cōmuniter autē ad omnes, eiusmodi dentifricij uti
mur: radice aristolochiæ exusta, aut osse ceruino u-
sto & trito, utere: nā & dēdum doloribus medetur.

Aliud. Cornu cerui ure, modicāq; mastiche ad-
mixta utere. Aliud. Talos ouillos exure, ac cōtri-
tis utere. Ad eadem pollent etiam buccina sale ex-
pleta & usta, pumex assatus & uino extinctus, sepiæ
testa usta, cōchæ uste, cochlea terrestris usta cū melle:
his autē singulis odoris cōmendandi gratia parū iri-
dis illyricæ miscetur, aut floris iunci odorati, aut ca-
lami Indici, aut spicæ nardi. Optimē autem facit, in-
quit Archigenes tum ad dētes à dolore præseruan-
dos, tum ad gingiuarū erosionē, atq; etiā decorē den-
tium pharmacū hoc: Lanæ succidas linteolo illiga-
tas ure, & salis torrefacti tertia earū parte admixta
contere, & pro dentifricio utere. Aliud. Mel &
salem in ceratū formā contrita, linteoloq; ligata exu-
re, deinde parū iridis illyricæ admisce, & dentes ex
eo confrica. Aliud dentifricium, Sulphur utuum
tritū dentibus adfricato. Smegma Oribasij. Sa-
lis ammoniaci, cyperorum, iridis, singulorū æqua-
les partes aliquandiu adfricato, postea uero gingi-
uas ex uino odorato colluito. Aliud smegma opti-
mum. Pumicis trientem, testarū sepiæ quadran-
tem, mastiches, aluminis scissi, foliorū malabathri,
cuiusq; unc. i. Aliud. Pumicis usti quadrantē, te-
starum sepiæ quadrantē, cornu cerui usti sextantē,
salis assati sextantē, spicæ nardi trientē, cyperorū un-
ciā i. costi scrup. iiii. Smegma pulchrū. Mar-
moris drach. iiii. foliorum malabathri unciam i.
amomi unc. i. cornu cerui usti sextantē, balaustio-
rū unc. i. iridis sesquunciā, mastiches drach. iiii, myr-
rhæ drach. vi. costi drachm. iiii. Bouis etiam talus
ustus optimē dētes extergit, motos firmat, affectos
à dolore liberat. Aliud dentifricium, quod oris
odorē cōmendat, dentes dealbat, & ab erosionē ac
labefactione custodit. Nitri, testarū sepiæ, myr-
rhæ troglodytiæ, æquales partes cōmitte, ac utere.

Aliud optimū. Aluminis scissi sesquunciā, ma-
stiches unc. i. iridis unc. i. rosarū calyces siccos un. i.
cōtritis utere, & aqua calida inde os collue. Aliud

dentifriciū. Buccinorū ustorū, salis torrefacti, testa-
rū sepiæ ustarū, scobis marmoris præconclij, singu-
lorū unc. i. costi scrup. viii. cōtusis utere. Aliud.
Timocratis, qd ad gingiuas humore pregnantēs &
eruētās, ad putredines, parulidas, hoc est, gingiuarū
inflammationes, motos dētes, dolētesq; oīa itē oris ui-
tia pdest. Accipe perdicij herbæ foliorū teneriorū
modiū italicū, salis albi & tenuis sextariū i. mellis
sextarium i. contunde simul ac in massam molliorē
redige, quā in ollā cōlectā luto obtura: ita ut circa os
operculi foramē relinquant, per quod cū uirga agite-
tur, ita diu autē super prunas positā torreto, quousq;
fumus inde procedens purus uideatur. tum sanē ab
igne ablata frige fieri sinito: atq; piperis longi drach.
iiii. accipito, piperis albi drach. v. piperis nigri dra-
ch. vi. pyretri dr. vi. aluminis scissilis usti & cū uino au-
stero extincti drach. ii. pumicis usti, myrrhæ, hyssop-
i, pulegij, seminis apij, singulorum drach. ii. mentæ
siccæ drach. iiii. iridis drachmas iiii. hæc omnia in so-
le prius exiccata, contundito ac cribrato, itaq; quæ
in olla usta sunt admisceto, ac utitor. In aliquibus
uero, utpote in frigidis dentium affectionibus, hæc
magis conueniunt, siue ex potu frigida, aut pōmo-
rum frigidorum comestione sint obortæ. Conue-
niunt etiam his qui à frigido humore afficiuntur,
ubi prius per collutiones ac manducationes pituita
sufficienter fuerit detracta.

De ancyloglossis, & qui uix loqui possunt.

Cap. xxxvi.

Ancyloglossi quidam sūt ex natiuitate, quidam ue-
ro ex aliqua affectione: Ex natiuitate sūt, quum
membranæ inferiores, quibus lingua innitur, dua-
riores & mutilæ è natura sunt productæ. Ex affec-
tione autem ancylosis & incuruatio linguae con-
tingit, præcedente ulcere, & cicatrice dura sub lin-
gua relicta. Qui hoc modo affecti sūt, difficulter
loquuntur, quare etiam Mogilali à Græcis sūt ap-
pellati. Qui uero ex natura ancyloglossi existunt,
principio quidem tarde in sermonem prorumpunt,
ubi uero loqui cœperint, citra obstaculū & satis fe-
stinanter loquuntur. Impediuntur tamen in prolā-
tione nominum aut uerborum, quorū aliās difficilis
pronuntiatio existit, ueluti in quibus R, aut L,
aut K, literæ, frequenter occurrunt: hos sanē adhibi-
ta manu per solam chirurgiam curare oportet. Ad-
eam itaque perficiendam ægrum desiderare oportet,
eiusq; linguam sursum ad palatū attollere: & si qui-
dem membranæ ipsæ curuitatis causa existat, incur-
uatio uncino eas apprehensas & extensas excindere, a-
nimaduersione habita ne simul subiactes uenas dis-
secemus. Si uero cicatrix curuitatis causa fuerit, simi-
liter uncino apprehensa extendatur, & quicquid
durum adest, & quod cum naturalī carnē non con-
sentit excindatur. Ab opere autem patratō aqua fri-
gida aut posca os colluat: postea inspergatur manna
thuris, imponaturq; linamēta conuulsa: sequētib;
uero dieb; curetur ulcus collutione aque mulsæ, aut
illitione unguētū Aegyptij, linamentis cōuulsis si-
mul impositis, ut per eorū interstitiū cicatrix didu-
cta, coalescat, neq; rursus eadē cicatrix relinquatur.

Ad ranunculum sub lingua. Cap. xxxvii.

Ad ranunculum sub lingua (est autem tumor earum
quæ sub lingua sunt partium, præcipue uenarum)
utendum sanē iisdem remedijs quæ ad aphthas oris

ulcera describemus, maximè tamè his quæ sunt ex eis fortiora. Proprie autè eis profunt etià hæc: æruginis rasæ, chalcididis, gallæ, æquales partes insperge. Cū passo potes etià pro collutiōe usurpare. Aliud: Farinam erui cū melle præfrictis locis, illine. Aut etià gallā tritā cum melle, aut rosarū semen eodē modo. In corporibus autè molliori sensu præditis, rhoēm rubrū cū melle: aut rhois drac. viii. florū rosarū drac. iiii. croci drac. ii. costi drach. ii. misyos, æruginis, æquales partes, cōmisce, & cū his locos sub lingua confrica. Decoctum uero foliorum oleæ colluant assidue. Aliud. Nuces iuglandes ueteres integras, unā cū cortice exustas contere, deinde piperis grana x. l. adijce, thuris grana mediocria iii. hæc cū melle sufficenti mixta illinito, & miraberis. Aliud. In inueteratis uero & perfectæ ætatis, eas quæ sub lingua sunt uenas dissecto. Extrinsecus uerò mento adhibendū ex ouis pharmacū, Magis autè conuenit id quod Græci uocant Sphæroni. Aliud. Artemisiā maximè uiridem cum sale tritam ad locos sub lingua adfricato.

Ad linguam inflamatam, desquamatam, ac tumens, et ad palatū ac gingiua. Cap. xxxviii.

Glaucium in cote cum aqua dilue, eodē locos illine, & eodem die sedabitur. Aliud, ualens etià ad linguæ exulcerationē. Palluri folia manducet & expuat. Vbi uero lingua inflatur, doloreq; afficiantur eius partes uicinæ, similiter & mandibula, ita ut loquela præpediatur, folia oleæ tenera trita, & oleo perfusa, illinito, egregie enim auxiliantur. Aut origanum passo decoctum colluendum exhibeto: aut pruni folijs cum melle tritis utere. Ad linguam uero cui superfides instar squamarum aut corticis decedit, optime facit, amurca æreo uase, donec cogatur, decocta, & illita. Ad linguam putrescentem, & fere demortuā. Succum foliorum uitis albæ cū misy permixtum illinito: depurgat enim, et carnē replei. Quidā etià hic mel adijciunt. Ut uero ad cicatricē perducatur, radicē uitis albæ, contritā et cribratam insperge. Melius autè erit eam melle permiscere, ne dissipetur. Ad linguæ abcessus. Quod si abcessus in lingua fiat, fursures in aqua decoctos donec liquor lubricus fiat, percolato, & huic succo mel adijcito. Simulq; calidū ore detinendum exhibeto. Hoc autè sæpe facere oportet. Aut enim abcessum discutiet, aut rumpet. A ruptura uero florido sicco utendum est.

Ad aphthas, hoc est, oris ulcera, ex Gal. Cap. xxxix. Quæ in superficie oris sunt ulcerationes, Græci aphthas appellant, habentes in se quiddā igneæ caliditatis: sunt autem ut plurimum infantibus, quum uiosum existit lac nutricis, aut aliās puer non probè concoquit: facile autem medelam recipiunt, utpote quæ ex his quæ mediocriter adstringunt, ut plurimum contingit. Aliquādo tamè diuturniores existunt, ob temporis uidelicet tractum, indissolubili quodam marcōre emergente, aut etià ea quæ appellatur Nome, malo nimis semper ulterius serpente. Fiunt etiā aliquando in his, qui ad perfectā ætatem peruenerunt, tum propter uitiosorum humorū ad os defluxum, tum propter acredinē eorum quæ bibuntur ac comeduntur. Cognitiono omnium facilis est, utpote uisui ac tactui subiecta. Ad tactum quidem, calidiores quàm conuenit loci sūt, tumoresq;

excitantur. Visu uero cognoscuntur ob colorem. Quæ enim rubicundiores existunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulentæ: albidiores, pituitæ. Liuentes uero & nigrefactæ, bilis atræ. Etenim qui ista probè discreuerit, singulorumq; simplicium uirtutem cognouerit, facile constituet modum utendi tum simplicibus, tum compositis pharmacis: consideratione simul super corporū naturis habita, num'ne molles sint, & humectæ, an duræ, & siccæ. Siquidem fortioribus corporibus, fortiora etiā remedia sunt adhibenda: imbecillioribus autem molliora: infantibus itaque conuenientia sunt, ea quæ in cibis eis offerunt mulieres, uelut est lens cum modico pane, & medulla ceruina, aut uulūna. Oportet autem mīscere cibis aliquid ex malis acerbis, pirisq; ac mēspilis: aliquando etiā lactuæ quiddam & intubi, ac portulacæ cibo admiscendum est, inflammata uidelicet ulceratione existente. Quod si infans ipse cibū capere non possit, nutricē eius huiusmodi uictu curare oportet: necnon ora infantum pharmacis conuenientibus illinire. Siquidem enim subrubræ infantum ulcerationes fuerint, à principio cū his quæ mediocriter adstringunt & refrigerant consequenter uero his, quæ citra mordacitatem discutunt. Si uero subflauæ ulcerationes fuerint, hīsdē similiter est utendum, uerū magis frigidis. Si uero subalbæ & pituitosiores fuerint, extergētibus utendū est. Si aut nigrae, his quæ generose discutunt. Ad maiores uero pueros, pharmacis eiusdem generis facultate præditis utaris, uiribus tantū ipsorum auctis ac extensis. Ad eos autè qui iam perfectæ ætatis existūt, durioraq; corpora habēt, efficacioribus remedijs utimur. Moderata itaq; remedia ad oris ulcerationes recētes hæc sunt. Omphaciū in uīno dissolutum aut mulso, rhus culinariū eodē modo. Pro infantibus in principio sufficit flos rosarū, ipsaq; rosæ siccæ cū mulso, aut melle rosaceo. Inueterato autem iam malo, in minoribus quidem pueris admirādā opem contulit hoc, inquit Asclepiades. Remedium Asclepiadæ. Gallas contusas aqua decoque, & cum decocto percolato parem mensuram mellis permisce, rursusq; decoque, donec ad mellis crassioris spissitudinē redigatur: eodē ut maximo remedio utere, ita ut locis illitū satis dū digitis adfrices, aut tomento lanæ purpureæ digito circumuoluto locis apprimas. In his uero qui perfectioris ætatis sunt, durioraq; corpora habēt, in uniuersum satis mihi fuit crudo misy uti, cū uīno adstringēte: quod sanè tū intendit, tū remittit uires suas, iuxta uīni uim aut magis, aut minus adstrictoriā, atq; etiā secundū quod densior aut liquidior uīni & misyos mixtura apparatus. Si uero sordidū apparuerit ulcus, misy cū uīno mulso tero. Alijs autè & qui adhuc fortioribus indigent remedijs, ærugo & cū uīno & cum mulso utilis existit. Neq; uero malū pharmacum his chalcitis existit cruda cum oleo trita. Illiniuntur autè ex his pharmacis, solæ particulæ oris affectæ. Quod si collutiones obtulerimus, siue mediocriter, siue intensè adstringētes, ea cautione utemur, ut fortioribus corporib; fortiores, mollioribus imbecilliores exhibeamus. Porro si in putredinē aphtha uertatur, nō conuenit amplius aphthā, eā affectionē appellare. Neq; enim ea quæ aphthas sanat pharmaca, his adhibemus, sed

sed fortiora, qualia quædam in capite De crustis oris paulò post dicentur. Atqui si putrescere incipiât, maxime in infantibus, præclare facit præscripta ex decocto gallarum & melle illitio, & anthera stomatica cū melle illita, et id quod ex rosarū floribus constat: rhoë, croco, et costo, quod ad colūnellas inflāmatas describetur, siccū pharmacū: oportet autem id illinire cū melle. Nec minus egregiè facit centaureæ minoris exustæ cinis illinitus cū melle, & sphæritis, hoc est, cupressus pilulas ferens, exusta eodem modo. Proprie autē, inquit Archigenes, facit cornu ceruinum ustum, tritum, & adfrictū. Ad aphthas autem quæ proserpunt summe efficax est, foeniculi radix usta, per se, & cū melle illita. Itemq; amurea in æreo uase, donec in mellis crassitudine cogatur decocta, ac illita. Aliud, quod & ad aphthas & ad reliqua oris ulcera cōducit, Aluminis scissilis sextatē, gallarū unc. i. cōterito, ac oleo subigito, aut digito in oleo madefacto siccū excipito, eoq; exulceratos locos quāplurimū extergito. Detrahit enim cutē, asperitates tollit, ulceraq; ad cicatricem perducit.

De gurgulionis affectionibus, ex Galenō. Cap. x. l. Gurgulionem quidam etiā columnellā appellant, uue uero nomine accipiēda est quædam in eo affectio, quum scilicet uux acino simile summum gurgulionis apparet. Lorū uero uocant aliam quandam eius affectionem, quum ex suffitu nimium ignitus gracilis sit, & loro similis propēdet. Verum hæ adfectiones raro circa gurgulionem accidunt: inflammatur autem frequentissime. Euenit etiam aliquando, ut extra inflammationem nimium humectus laxior fiat: uelut in destillationibus continuis contingit: itaq; inflammatione incipiente repellentibus pharmacis opus erit, quæ adstringētis facultatis esse oportet. Et si quidē moderatus fuerit humorū influxus, ea quæ moderate adstringunt sunt adsumenda, ubi uero fortius inualuerit, acerbæ etiam sunt adiungenda. Collutiones igitur moderate sunt ex palmis decoctis, aliquando in sola aqua, aliquando etiam adiecto modico melle. Similiter autem & ex rosis, radice dulci, pampinīs uitis, rubis, funco rotūdo odorato, terebīntho, rhanino, cypero, & siliquis. Itēq; ex radice mori, hypocistideq; & malis cotoneis, ac pliris austeris. His autē fortiores existunt, myrti, & baccarū eius decoctum, & uirgultorū molliū ilicis, & uniuersi quercini generis, similiterq; & glandiū: itemq; decoctum mespilorū & cornorum. Præclarissime autem omnium facit decoctum gallarum, rhois culinarij, eiusq; quo coriorum insectores utuntur, spinæ Aegyptiæ, myricæ, aut ericæ seminis siue fructus, utriusq; mali punici floris & putaminis. Horum unumquodq; & singulatim & cū alijs decoctum in aqua, gargarissandum exhibere oportet. Mirum uero quantum eorū mixturæ, simplicium & immixtorum usum excedunt. Vtilis est etiā affricus cochlearij frigidissima aqua repleti, & posca frigida in balneo colluta. Cōuenit quoq; arida trita gurgulionē admoouere, ita ut submisit & paulatim ad superiorem & extrinsecā regionē adferantur, & per cochleare aut specilli cōcauum supra linguā immittantur. Itaq; ex aridis moderata sunt, rosæ siccæ, & flos earum, & prædictarum plātarum germina exiccata, hypocistis, rheon ponticum, lapis coriariorum quo calceamenta ut resplendant expoliunt, &

Græcis ageratos, uelut non senescens, appellatus, & is quoque qui samius aster appellatur, & omphaciū siccum. His imbecilliora sunt minorisq; acrimonie, gummi, tragacanthus, sarcocolla, & amylū, quibus utēdum erit, ubi gurgulio à nimium adstringētibus remedijs fuerit compressus, aut à mordētibus ac discussorij irritatus. Fortiora prædictis sunt, lapidis hæmatites, necnon phrygius ustus, minium sinopicum, & terra lemnia, quæ appellatur sphragis, diphryges, fructus Aegyptiæ spinæ, rhus culinaris. Adstringunt enim hæc euidenter, citra tamen exasperationem. Acerba autem sunt, balauitia, & cylini, & malicorium, ac galla. Adstringunt etiam sufficienter omnia aluminis genera. Atq; hæc quidē simplicia sunt huic loco conuenientia. Ex quibus & cōposita fieri possunt, quum uehementi molle & lene quoddam adiungimus, aut discussorio quiddā adstringens admiscemus, iuxta temperaturam corporis cui medemur. Diuturnæ autē adfectioni impossibile est per repellentia perfectū auxilium adferre, maxime ubi ægroti corpus plurimo humore repletum, aut affecta particula natura debilior extiterit. Itaque sæpe in principio statim, aut paulò post omnino aliquid ex discutientibus ad adstringētia adijcere cogimur. Si uero uehemens adfuerit dolor, etiam ea quæ eum mitigant adnectemus, atq; quum multa omnino sint quæ discussoria uim obtinēt, à mollioribus est incipiendū. Ab acris enim inflāmata exacerbantur. Ob eā igitur rē cōposita in usum uenerūt, tum ad reliquorū membrorū inflammationes, tum ad eas quæ fiunt in gurgulione, uelut quū alumen miscemus cum iride Illyrica, aut thurē, aut myrrha. Tu uero perspecta caloris in ipsa inflammatione magnitudine, considerataq; influxus ad eam multitudine, atq; amplius in toto corpore humorū quantitate ac copia perpensa, uel eorum quæ adstringunt, uel quæ discutunt, augebis mixturam. Optimum autē pharmacum ad inflammatos gurguliones, tum in principio, tum in uigore adhibitum existit hoc rhois culinarij drac. octo, florū rosarū drac. iiii. croci drac. ii. costi drac. i. contrusa & cribrata in uitro reponere. Vsu uero expetēte dimidium cochleare in duobus aquæ mulsæ aquosioris cyathis dissolutum ad gargarissandum adsumatur. Vtilis est etiā eis pastillus ex croco, qui iris à quibusdam appellatur. Cōplectitur autem myrrhæ dra. viii. aluminis liquidi drac. ii. croci drachm. viii. dissoluitur in uino. Quidam etiam aloē adijciunt, quam nos reprobamus. Hic itaq; pastillus fluidioribus, & magis humectis inflammationibus summe conuenit, dilutus in uino ac illitus. Miscetur etiā gargarismis. In corporibus durioribus prodest quoq; pastillus Musæ. Prodest etiam efficacissime pastillus Andronis: facit & id quod Asclepiades descripsit, lapidis agerati drach. iiii. floris lapidis asij drach. iiii. terræ samiacæ drach. iiii. aluminis scissi drach. ii. croci torrefacti drach. ii. gallarum drac. i. cōtritis utere. Hoc etiam nos usi sumus, inquit Galenus, optimumq; sæpe sumus experti, præter quā quodd statim à principio, & quum rubicundus & calidus existit inflammationis tumor, minime adhibēdū uidetur. Vbi uero diutinum adest malum, & corpus prius est euacuatum, semel tantum in usum assumptum, magnam statim ostendit utilitatem. Ad laxatam columnellam, Gallarum

Gallarum drach. x x xii. diphrygis drach. xii. illini cum melle. Aliud philosophi. Apparatur temporis necessitate instante. Inueteratum enim uires amittit. Nuces uirides accipe & exsiccatas, & palmarum ossa, atq; de ipsis ubi uelis sufficenter exurito, & amborum æquales partes misceto, ac siccis tritis utitor. Sufficenter enim discussoria existunt. At uero quum in alijs adfectionibus, tum ad columnellas citra inflammationē laxatas, gallę omphacine, salis ammoniaci, amborum æquales partes, per cochleare admotæ, præter opinionē auxiliantur. Prædare facit & in his, cyrenalcus succus tritus adhibitus: qui si non adsit, ipsum laser. Aliud, ad columnellas laxatas. Mellis librā i. florum rosarū sexuncem, aluminis liquidissimi bessem, succi hypocyttidos quadrantem. Alumen, & mel simul decoquito, deinde reliqua trita adiecto, ac rursus paululum decoquito, eoq; utere aliquādo aqua calida dissoluto, aliquādo aqua mulsa ad gargarissandum, aliquando quoq; eius illitu ipsam columnellam reprimes ac eleuabis. Bonū hoc remedium esse adstruit Galenus, eoq; uti iubet. Aliud, quod & colūnellas tam excidēdas sanat: facit idē & ad ulcera gingiuas depascētia, omneq; oris ulcus serpens. Fructus spinæ Aegyptiæ, gallarū, fructus myricę, balaustrorū, foliorū malabatri, aluminis scissi, calsiæ, singulorū æquales partes. Utere sicco. Aliud, Asclepiadæ. Rosarum siccarum non madefactarū sextarium Italicū unum, nardi celticæ cum radicibus ac circumscita ipsis terra, fasciculum manipulare unū: simi columbini agrestis sicci ex ipsis nidis detracti drach. iiii. myrrhæ drac. viii. gallarum omphacitidū numero xlv. confusa & cribrata per arundinem insufflato, & per specilli cauum adhibeato. Aliud, siccū ad ualde laxatas colūnellas, itēq; tumentes. Piperis drac. i. myrrhæ drach. i. aluminis scissi drach. ii. gallarum drach. ii. contritis utere: questigio enim eas firmant, ac resiccant. Aliud parabile, quod & ad laxatā & suffocantem columnellam ualeat. Nitrum tritum digito excipe, & adfrica, destillabit enim inde plurima pituita, eaq; eructa, & sanabitur. Aliud naturale, Philumeni. Picem li quidam accipe, eaq; extremum pollicis tui infice, alteraq; manu sincipitis capillos distende, ac picē illine. Recurret enim statim uua. Quod si quis omnino ab adfectione uuæ & tonsillarū securus esse uelit, quotidie per morborum interualla quum lauetur, & a calido lauacro egreditur, modicam frigidā aquam sorbendo deglutiat. Quod ipsum & ad tussim, & lateris dolorem, humidisq; stomachi uitijs multis utile fuit. Per ea itaq; quæ dicta sunt in naturam suam reducere gurgulionem oportet, omni conatu & molimine adhibito, neq; festinandum ad eius excisionem.

De ablatione columnellæ ex Galeno. Cap. xli. Quod si cōtinuē adfligat colūnella, periculumq; sit ne suffocatio aut tabes inde inferatur: aut quum gracilis & loro similis sit, propterea quod alimentum nō sentit, quod sanē aliquādo accidere solet: aut quū resolutionem patitur: sit enim & hoc in aliquibus: tūc sanē refert utrū excidatur, an non. Optima eius auferendæ oportunitas existit, quum suffocatio urget, ut tum imminente periculo, ægroto auxilium feramus: itaq; quo manum commodius adferas, eger in splendentis & claro loco collocetur: & tunc quidem

os eius diducatur: mox uero immisso forcipe producatur, ita ut uolsellam huic rei idoneā, iuxta mediū ipsius colūnellæ, aut magis adhuc inferius adhibeamus: atq; ita pducta obtorqueatur. Obtorta enim uelut stupida efficitur, & uelut illaqueata curuatur ac liuescit, citra magnā sanguinis eruptionē. Quapropter immorari oportet aliquādiu, ac eā detinere quousq; æger tolerare possit: tuncq; auferre non supra forcipē incisionē facta, sed ad eius fundū. Quum enim pelliculis referta sit ipsa colūnella, & ob pductionē cedat, plixa sanē inspicitibus apparet. Vnde multi in experti medici, siue per errorē, seu per ignorantiā altius incidētes, eam funditus auferūt, maximiq; incōmodi autores ægro existunt. Quare relinquere oportet fundū eius circa palatum. Ab excisione aut ægro offerenda est posca diluta, qua leniter os coluat. uehemens enim ipsius allabentis plaga, sanguinis eruptionē excitat. Quum aut hinc morsum percipiat, aquā frigidā colluat, atq; hæc uicissim fiant, donec sanguis sistatur. Sequētib; deinde diebus ex radicis dulcis & palmarū decocto gargarissimus exhibeatur. Similiter & illitones ad tonsillarum inflammationes descriptæ. Porro Galenus ait, ab excisione semper diphryge utor, donec cicatrix obducatur. Cicatricem enim tum huius membri, tum reliquorum omnium exulceratorum probē constrin-

it ac committit. De oris inflammationibus. Cap. xlii. Quum uniuersum corpus multitudine humorū redūdatur, aut unius tantum alicuius noxi humoris multitudo in corpore augetur, conuenienter utimur incisione uenæ, aut purgatione, aut clysteri, & abstinentia ciborū. Quod si neutrū horū adfuerit, ad localiū auxiliorum opem statim confugimus, in principio quiddē reprimendo per ea quæ adstringunt & frigefaciūt: Ex adstringentiū sylua est atramentum sutoriū, & similia. Verum adeo fortibus, & quæ simul uim uenenosam complectuntur ac nociuam, minime conuenit uti ad oris adfectiones sanandas, nisi magna cogente necessitate. Plurimum enim nocuum mentum infert, si quid ex his ad stomachum ac uentriculum fuerit delapsum, aut ad asperæ arteriæ extremum & pulmonē. Inest autem huiusmodi remedijs & circa gustum insauitas quædā, quæ quidem usus tempore molestiam infert, & permanet etiam totam diem. De foeminis quid attinet dicere? maxime opulentis, quæ ob delitias in totum pharmacorū ad os descriptorum adfrictum egrē ferunt. Iam & uiros quosdā uideas, qui non ob delitias solum, sed ex natura fastidientē stomachū habent, atq; huiusmodi pharmaca non ferunt. Itaque ea quæ ex stomacis appellatis pharmacis, hoc est, quæ ori cōueniunt, mitiora existūt, & oculum cōplectuntur, & myrrhā, & alumen. Cæterum cōfectio ex moris & malis punicis, & similes quædā, cū solo melle medentur, habētq; gustū amplius suauē. Quin & cōfectio ex succo nucū cū solo melle apparata suauem exhibet saporem. At uero succus mororum pro debiliore habendus est pharmaco. Fortius uero, & quod nulli inferius existit, est succus corticis nucū. Inter hæc medium tenet, quod ad uim adstrictoriam attinet, succus mororum nascentium in rubo. His singulis admiscere potes, si quidem uehementius efficere uelis pharmacum, succum uuæ acerbæ nondum

nondum maturæ, pari pondere: aut si id non uideatur, eius dimidium. Andromachus coniicit, croci, myrrhæ, succi uuæ acerbæ immaturæ, aluminis scissi, singulorum drachmam unam.

Illitiones stomaticæ ori commode. Cap. XLIII.
Confectio ex moris.

Confectio ex moris sic adparatur, quæadmodum docet Eras: succi mororum heminas v. uini austeri heminam i. mellis heminam unā. Succum unā cum uino decoquito, donec ad strigmentitiam crassitudinem redigatur, deinde adiecto melle rursus decoque, donec probe cogatur: deinde in pila eis admisce croci sesquidrachmam, myrrhæ sesquidrachmam, omphacii sicci sesquidrachmam. Optimum autem est omnibus oris illitionibus simul incoquere, radicis dulcis drachm. viii. ad eiusmodi sanè mensuram, qualem præscripsi. Est enim radix dulcis natura mitis, & ob id asperitatem ex astringentibus illatam lenire potens. Facit, inquit Eras, hæc cōfectio tum ad tōssillas, tum ad inflammationes oris, illita, & gargarisimū modo colluta. Poteris autem succū mororū cum solo melle adparatum, in usum recondere, ob dulcedinē ori cōmendādam. Confectio ex malis punicis Galeni.

Accipe mala punica in uigore perfectæ, maturæ, & recedat, ita ut ex triplici eorū differētia, dulciū, acidorum, & austerorum, æquales partes unā cū corticibus in mortarium confectas, contundas, & ab eis succum exprimas: deinde confectiōnem adpares hoc modo. Coniice succi heminas quinque, mellis heminam i. radicis dulcis drach. viii. Prīmū uero succum cū radice dulci decoquito, ac percolato, deinde adiecto melle simul coagmentato, & utitor. Hæc confectio commodius exhibetur his qui oris inflammationem patiuntur, habentq; simul stomachū fractū, & qui cibū auersatur. Uilis est etiā bibita ad alui adfectiones. Expediit aut ei, ueluti reliquis oris remedijs adijcere, in principio quidem ea quæ adstringunt circa uigorē, ea quæ concoquunt, iuxta inclinationē, ea quæ discutunt. Facit etiā ad oris ulcera, & quæ adpellantur Aphthæ. Cōfectio ex malis punicis, Aesclepiadæ. Pharmacū ad os prospere accommodatū, quod etiā ad ulcera serpentia cōducit: Succī malī punici Italici sextarios vi, mellis lib. i. croci drac. iiii. myrrhæ drac. iiii. Succū perse satis diu decoquito: deinde adiecto melle rursus donec probe coagmetetur decoquito: postea in mortario crocum & myrrham simul cōmittito, atq; hoc ut maximo remedio, utitor. Remediū oris ex musto. Andromachi: quo inquit, ut pulcherrimo utor. Galla numero xxx. rhois quo coria inficiuntur chœnicē i. musti optimi ex uua aminæa alba sextarios sex. gallas contusas unā cū rhoē per diē & noctē in musto macerato: deinde ad quartas decoquito, & per linteolū percolato: rursusq; succū donec mellis speciei accipiat, decoquito, & adiecta croci drach. i. aluminis scissi drach. i. myrrhæ drac. i. probe misceto, & in usum recōdito. Facit enim & ad aurī & sedis quoq; exulcerationes. Cōfectio ex succo uuæ acerbæ, ex ferula medicamentario libro. Sorani. Illitio ad os adparata ex succo uuæ acerbæ, incipientibus inflammationibus accommodata. Valet etiā ad humore prægnātes gingiuas, & ulcera pura tōssillarum. Succī uuæ acerbæ ad coagmentationē decocti sextarii i. florum rosarū drac. xii. croci drac. iiii. mellis

heminā i. adpara ut prædictū est. Eodē modo etiam adparatur confectio ex succo malorū cotoneorum & pirorū, pirastrorūq; & mespilorum, ac mororū rubi, similiterq; ex aliorū pomorū succo, atq; item cornorum: nisi quod plus mellis inijcitur ad ea quæ magis adstringūt. Succus enim pirorū & reliquorū pomorū ac fructuū aliquādo æqualē portionē mellis admittit. Eorū uero quæ plurimū adstringunt, ueluti est succus corni, aliquādo duplū mellis suscipit. Cōfectio ex nucibus, Galeni. Fit etiā ex succo uiridiū nucū pharmacū ori cōmodū, hoc modo. Extrinsecum corticē nucis uiridē, quo tinētores utuntur, in pilā confectū contunde, succumq; expressum per linteolū excola: eiusq; heminas v. mellis heminā i. & radicis dulcis drac. viii. hoc modo cōmitue. Succū unā cū radice dulci usquequo cogatur decoque, & percola: deinde adiecto melle simul decoque rursus, ac utere iuxta eā quā describemus methodū. Est itaque pharmacum ex nucibus omnium efficacissimū. Verum stomacho utilissimum existit id quod ex malis punicis est confectum.

Summaria doctrinæ de usu omnium illitionum ad os adparatarum. Cap. XLIII.

In principio inflammationū, oibus oris remedijs utiliter quiddā ammiscetur ex his quæ restrictorię facultatis existūt ac repellūt. Quapropter cōmodū est solum succū cū melle adparare, ac reponere: Sūt autem restringētia parabilia quæ in principio miscere conueniūt: rosæ, flos earū, baccæ myrtil, myrtus ipsa, lentiscus, rubus, omphaciū. Post hæc cytini et balaustia, malī punici cortices, gallæ, fructus spinę ægypticę, omnia aluminis genera, rhus cū culinarius, iū quo coria inficiuntur: horū unūquodq; aqua decoquitur donec probe cogatur, atq; ita percolato decoctū illitionibus cōmiscetur. Optimus est etiā malī punici succus in principio ammissus. Frāgēda autē sunt ipsa mala ac cōtūdēda in mortario unā cū corticibus suis. Deinde exprimēda ac percolāda decoquēdaq; donec in totū cogatur, atq; sic in præsentēs illitiōes ex eis ammiscendū est. Quod si sumptuosius adparare uelis pharmacū, nēpe diuitibus utendū, adijcies corticem calsiæ, indicā nardū aut celticā, aut foliū malabathri. Post principiū autē ubi cōstitērit influxus, sufficit confectio ex moris, croco modico ac myrrha adiecto, ad inflammationis concoctionē. Quum uero ad uigorē peruenerint inflammationes, parum utendū est illitionibus oris. Verū collutionibus & gargarisimis mitioribus inflammationem concoquere oportet, uelut est ea quæ ex fursuribus fit, & radice dulci. Aliquādo etiam remedium oris ipsum decoctū ex carlicis constans gargarissandum exhibere conuenit aqua mulsa permixtū, aut sapa calefacta, aut cū sola aqua calida, non præsentē melle aut sapa. Optimum cēsetur circa inflammationum uigorē oleum lentiscinum cōduplicato uasculo calefactum, & ore retentum: uerūm cauēdum ne sit inueteratum. Vbi uero iam concocta fuerit inflammatio, & dolorum uehementia quiesuerit: tum sanè & discussoria ad oris remedia admiscemus, cuius generis sunt, hyssopum, pulegium, thymus, calamintha, thymbra, menta, in sapa, aut aqua mulsa decocta & percolata, ita ut ex decocto cuiuscunq; tandē istorū oris remedium permisceatur. Ex parabilibus discussorijs est decoctū caricarū ad mellis spissitudinē redactū. Nā singula

singula prædicta efficaciora fiunt, si diutius coquantur. Fortius aut prædictis existit spuma nitri, & nitrum ipsum maxime Bernicariū uisū, atq; nitro adhuc potētius est sulphur uisū. Porro ad diuturnas et obduratas inflammationes adhibenda sunt ea quæ præclarius discutere possunt: cōtusa uidelicet ac cribrata, de quorū numero hæc sunt. Si diuites existat egri, costus & amomū, & quod appellatur macer, perquā calidū & adstringēs, & succus sanæ cyrenaicus ad discussionē obduratarū inflammationū aptissimus, aut aliquis eorū qui ei successerūt, uelut est laser. Pauperibus autē pro sumptuosis illis pharmacis adijcere cōuenit dictamnū, aut acorū, aut meon, aut pyretrū, aut parū cardamomī, aut sinapis. Sit aut pondus singulorū quæ adijciuntur, iuxta eā quā in principio diximus apponderationem. Nimirum ut ad libras quinque succi, una mellis adijciatur, & annexorū sint drachmæ quatuor uel quinque.

De tonsillarum inflammationibus ex libris

Philumeni.

Cap. XLV.

Tonsillæ frequentissime inflammationē incurrunt: calidi enim & humidī sunt earū loci. Verū hac adfectione magis arripiuntur hi qui plurimo sanguine abūdāt: & pueri, utpote mixturā habentes tenerā & multo cibo se explētes: & infantes adhuc lactētes ex haustu lactis id malū cōtrahētes. Infertur autē hæc adfectio plerūq; à nimia meri potione, & à multa ac auidiore deuoratione ciborū, maxime acriū & asperorū: acceditq; ita adfectis difficultas trāsglutiēdi, & dolor aliquādo etiā febris. Incipiente itaq; inflammatione, cibū subtrahere oportet, & aquæ potū exhibere, præsertim febre simul irruēte. Exhibēdi etiā gargarismi adstringētes & repellētes, uelut est lēticulæ decoctū cū rosis, myxis, & palmis: reliquaq; quæ in principio inflammationis gurgulionis adsumuntur. Cauendū autem ne mel in principio ad gargarismos cōijciamus, ne per acrimoniā malū iritemus. Verū quum uehementius adfectio ipsa inualescit, & periculum suffocationis suspectū est, uena cubiti incidēda est, repetita sanguinis detractione: maxime si iuuenis sit æger, & multo sanguine abūdet, cibi autē offerendi sunt sorbiles & uentri cōmodi: quod si uēter nō probè egerat, inijciendus est clyster: infantum uero uētres glāde immissa, & sedis illitionibus irritare oportet. Post euacuationē gargarissent decoctionē surfurum calidam aut pissinæ succum, in quo decoctæ sunt uuæ passæ, aut sapā tepēfactā, aut decoctū radicis dulcis, aut pasum cum decocto ficuum & hyssopi. Hæc omnia tepida exhibenda sunt, frīgus enim nō tolerāt inflammationē, sicut neq; plurimū calorem. multū autē proderit oleū amygdalinū auribus infusum. Extrinsecus leniter fouere cōuenit spōgijis expressis, & cataplasmata quoq; imponēda sunt ex farina ordeī aut semine lini, aut foenigræci, aut his simul mixtis. Remittēte autē iā inflammationē & decrescēte, mel in gargarismos admiscere cōuenit: quod in principio & in augmento minime facere oportebat: quo tēpore etiā calidiores gargarismi profunt. Extrinsecus aut lana mollis oleo tinēta collo circūponēda. Quod si ex usu acriorum collutionū aut illitionum inflammatio exaspere tur, & mordacitas inde accidat, leniores gargarismi colluendi sunt, quales sunt, succus pisanæ, aut halicæ, & micarum filiginearū cremores, qui tepidissimi offerantur: lac uā tepidū gargarisandū. Remittē

te autē inflammationē et dolore prædicta oris remedia sunt illinēda, immisso digito medio, ita ut cum leni adhibita illitione partes tonsillarū, quæ intumuerūt, cōprimatur, quo contentā in se materiā excludant. Verūtamē non uolenter cōprimere oportet, quæadmodum quidā faciunt, qui autores ob id fiunt, quo inflammatio amplius augeatur. Si tamē obtigerit aliquis ab eiusmodi curatione læsus, cōtēti erimus exhibitione gargarismatū lenientium, nihil illinentes. Permanēte uero ac immorante diutius inflammationē, atq; ubi tonsillæ ipsæ subrubri coloris fuerint, neq; melius à prædictorū remediorum admotione habuerint, permutationē in pus expectare oportet: cito enim tonsillæ abscedunt. Abscessu autē factō, inflammationis signa augescunt, & exacerbationes ad uesperā fiunt fortiores, cū horrore & inæqualitate, aliquādo etiā cum febre. Quare ubi suppurationē futuram speramus, coadiuuare oportet ut quā citissime fiat. Sint autē gargarismi eis exhibēdi calidiores uelut aqua mulsa calida, & decoctū caricarū ac hyssopi. Verū ad molliendos & maturandos tonsillarū abscessus, maximopere auxiliatur unguētum quod appellatur Aegyptiacū, quod ex resina therebinthina, & melle & oleo dulcissimo adparatur: & extrinsecus cataplasma impositū ex ordeacea farina & foenogræco cū decocto caricarum & althææ ac melle. Quū autē pus perfectū fuerit, dolores minuuntur, et inflammationis tumor mollior redditus digito cedit: tunc sanè acriores collutiones exhibēdæ sunt, atque prædictæ quoq; oris illitiones. In cibo accipiāt frusta panis aqua macerata quā maxima, & reliqua similiter quæ eis p cibo offeruntur acruatim ingerāt. Vehementiore enim ex his circa tonsillas obuolutiōe facta cōsimili modo tumores adficiuntur, ueluti sectionē sustinerēt. A ruptura autē aqua mulsa gargarisanda p se, postea etiā admixta lēticula & rosis, atq; his sanè immorādū est, donec penitus ad cicatricē perducatur. Neq; uetat sepe adijcere quiddā ex prædictis oris remedijs. Quod si ruptura eis serius contingat, ob soliditatē uidelicet corpusculorū incubentū, inferatq; inflammatio ipsa dolorem, diducere abscessum cōuenit ad proliscēdā puris excretionē. Leonidæ. Itaq; si perfectæ ætatis sit æger, eū desiderare facito, postea diducto ore linguā cū specillo lato, aut instrumēto linguæ deprimēdæ apto, deprimito, ipsumq; abscessum cū scalpello aut adcula penetratēdi ducito. Si uero puer sit æger, caput eius intra genua eius qui manū admolitur cōtineatur. Deinde facta abscessus dissectione caput eius inclinetur ad humeris cōmodiorē exclusionē. Ab opere autē patrato aquā lactei teporis frequēter colluāt. Post mulsa autē intercapedinem ab opere patrato, & in sequētib; deinde diebus aquam mulsam gargarissent: adhibeat q; eis unguētū ad exulceratas tonsillas cōueniēs: quale est quod ægyptiū crocū appellatur, & quæ ei similia existūt. Est autē Aegyptiū hoc. Unguentum ægyptiū crocū. Croci dra. iiii. mellis sesquilibram, olei rosacei sextantē, succi foenigræci & seminis lini decocti quadrantē. Crocum in succo dissolue: deinde oleo adiecto, ea simul commisce, et mel prius depumatum cōijce, & permixtis utere.

De crustosis & pestilentibus tonsillarum ulceribus.

Cap. XLVI.

Crustosa & pestilenta tonsillarū ulcera ut plurimum nullo

nullo præcedente tonsillarum fluxu Incipiunt, aliquando autē à consuetis fieri inflammationibus, maxime efferatis perficiuntur. Fiunt autē frequentissime pueris, atq; etiā ætate iam perfectis, maxime his qui uisiosis humoribus abundant, in his quæ uere contingere solent pestilentibus constitutionibus. In pueris uero oris ulcere, quod aphtham uocant, præcedente omnino perficiuntur. Sūt autē partim alba, maculis similia, partim cinereo colore, aut similia crustis, q̄ ferro inuruntur, accidit autē ægris siccitas in trāsglutinatio, & suffocatio coaceruatim incidit, maxime quū rubor subeat mentū, aut ubi hæc acrimonia præterierit. Nome quæ depascitur, locos excipit, succeditq; unā putrefactio. Archigenis. Festināter itaq; auxiliū adferre oportet his qui sunt ætatis perfectæ, atq; cōfidēter uenā brachij incidere, si quidē nihil sit, quod id fieri phibeat. Multæ enim uirgines circa uigoris ætatē mēsiū purgationē appetētes, hac affectione apprehenduntur, quæ præcipuæ uenæ incisioe opus habet. Incidēde autē sunt in eis tali uenæ, & unica sanguinis detractioe facta euacuanda, nō autē ad usq; animi defectionē. Deinde glandulis & sedis illitionib. ac dysteribus utendū erit, itemq; cucurbitulis iuxta lumbos, ac colligationibus extremitatū, atq; omnibus modis conandum est, ut diuersio ab affectis partibus fiat. Postea etiā gargarismis uti cōuenit, uelut est lenticulæ decoctū, & myxarū ac palmarū cū melle & ptilanæ succo, deinde fursurū decoctum in decoquēdo uiscosum factū, adiecto melle. Potest etiā remediū oris ex moris, & maxime id quod ex malis punicis cōstat colluendū exhiberi, hydromelite permixtū. Philumeni. Infardetur autē hydromelidi & costus & iris, ac aristolochia, & similia post principiū. Probē autē facit id quod ad columnellas præscriptū est. siccū pharmacū ex rhoē, flore rosarū crocōq; & costo. Foliorū etiā glaucij siccorū decoctū optime facit, quāquam gustus uehementē amarū existat. Ego autē & glaucij succo cuius ad collyria usus existit, in aqua mellis meraciore diluto, p̄ gargarismate utor, aut etiam cū iridis decocto. At uero fruticulis ipsius sicci, glaucij inquā, cōtusi & cribrati optimus usus existit si insuffletur. Conādū autē est in uniuersum ne digitū quidē locis admoveamus, aut leni saltē tactu manū admoliamur. Etenim inscī ad quos maxime in rebus dubijs homines cōfugiūt, uehementius illinūt, simulq; inflamatū locū comprimūt, simulq; crustā detrahūt, qđ minime facere conuenit prius quā eleuatā, & uix innitentē crustā cōspiciamus. Quod si enim adhærentē adhuc crustā auellere aggrediamur, ulcerationes magis in profundū pcedunt, & inflammationes cōsequuntur, augēturq; dolores, & in ulcera serpētia proficiunt. Itaq; sicca quidē remedia insufflare cōuenit: liquida uero cū pinnula illinire, ita ut quantū licuerit quā penitissime pinnula immittamus. Viēdū est etiā cōpositione ex semine rutæ syluestris ad anginā descripta, & ea quæ ex uistis hīrūdīnibus cōstat, ita ut cū melle liquefactas illinamus, & cū hydromelite permixtas colluēdas exhibeamus. Profuit etiā aliquibus aristolochia & iris, & chalcitis adhibita cū melle. Aliquādo etiā Andronis & Musæ pastilli. Mirabiliter autē crustas auferit caninū recrementū melle illitū, & uistarū hīrūdīnū cinis, & cēraurē minoris uistæ cinis cū melle, & cochlearū terrestriū maxime nudarū uistarū cinis

cum melle. His uero de quibus medici desperarunt, fel crocodili exliccatū & tritū ad crustā insperge, aut illine cū melle. Oportet autē post iritationes à pharmacis eiusmodi factas, lenire cū radicis dulcis decocto, et qui ex uino scybelite, mastiche chia, myrrha, & croco cōstat gargarismo, deinde cū amylo & tragacantho. Cohibito autē iā ulcere pascēte, lac gargarissandū, samia terra permixtū: et febrilū quoq; curā habere cōuenit: uehementes em incidere solēt: atq; in repurgādis explanandisq; ulceribus maxime sollicitū esse: cōuulsionē enim infantes plurimi passi sunt in ulcerū repurgatione: aliqui uero uia trāsglutinandi exliccata, sunt strāgulati. Sunt etiā quibus corroduntur gurguliones, atq; ubi diutius perstiterint ulcerationes, & in profundū proserpserint, cicatrice iam inducta, adstrictiorē uocē edunt, reflectiturq; ipsis potius in ipsas nares. Nam et ego puellam noui, quæ post quadragesimū tandē diē consumpta est, quum se iam à morbo recolligeret. Verū ad septimū usq; diem plurimi periclitantur. Vbi uero inflammationes & ulcera serpētia semper amplius extendantur, forinsecus fomētū adhibere oportet, & cataplasmatibus cōmunibus uti, cū cautione ne refrigeremus. Felicitē enim res procederet, si intrinsecus detentā materiam extrā queant transferre. Contegantur itaq; semper post cataplasmata, partes circa mentū, cū nardino & cyprino cerato, cū circumpositione lanarum molliū. Vbi autē crustæ solutæ fuerint, & ulcera ipsa mundata, antheris, hoc est, floridis remedijs utendū est. Sanant enim in totū ulcerationes ipsas, tum sicce adhibitæ, tum illitæ cū melle. Sunt autē crustarum tum oris, tum tonsillarū, cōposita pharmaca huiuscemodi. Asclepiadæ illitio ad exulceratas inflammationes. Florū rosarū drach. viii. croci drac. iiii. ba-laustiorū drac. i. myrrhæ drac. i. nucū pinearū repurgatarū drac. iiii. Subactis melle ad illitionem utere. Asclepiadæ, ad oris putredines. Rhois culinarij dra. iiii. acaciæ drac. i. omphacij drac. i. medullæ ceruinæ aut uitulinae drac. iiii. in uino dulci diluta, melle despumato excipe, & ad illitionem utere. Andromachi remediū oris odoratū ac tenerū, ad inflammationes ac crustas optimū. Nucū pinearū depuratarū drac. iiii. amyli dra. ii. aluminis scissillis dra. i. florū rosarū drac. i. croci drac. i. mellis quantū suffecerit.

Aliud, ad omnes tum oris, tum tonsillarū adfectiones. Rhois culinarij dra. iiii. florū rosarū drac. i. croci drac. i. costi drac. i. illine cū melle, aut cū aqua mellis gargarissandū exhibe. Critionis ad crustas. Misy assatum aut crudum illine cum melle: statim em eas tollit. Sint autē misyos drac. iiii. & libra una mellis, quo modo etiā uti poteris chalcitide. Archigenes autē inquit: Ad crustas optime conuenit stercus caninū cū melle: quod tum optimū erit, quū ossibus canes fuerint nutriti. Magnoperē enim auxiliatur, neq; odium sui inducit in cibo oblatū. Licebit etiam uti plurimis eorū quæ ad anginā descripta sunt auxiliorū. Aliud Archigenis, ad crustas in ore: Hīrūdīnū uistarū & stercoris humani æquale pōdus cū melle illine. Accipiendū est stercus nō quodcūq; obtigerit, uerū puerū bīduo prænutrire oportet pane & lupinis, ac uino modico, atq; deinde tertia die stercus eius accipere & exliccare, atq; repositū seruare. Vbi uero expetere cōtrito uti. Efficax enim & ad anginas existit. Experti etiam sumus, inquit Galenus,

pharmaca à Sorano descripta præclare facere, quæ sanè ille iuxta dictionū seriē descripsit. Remediū ad crustas oris cōferēs & ad gingiuas humore pregnātes & graucolētes. Misyos usti drac. viii. Iridis illyricę drac. iiii. croci drac. i. In puluerē redige, ac pyxide lignea repone. Vtere autē p se uel cū melle. Florida cōpositio, ad prædicta similiter efficax. Iridis illyricę drac. iiii. sandarachę dra. iiii. cyperi dr. iiii. aluminis scissi dra. ii. myrrhæ dra. ii. crocomagmatis dra. ii. In puluerē redige ac utere. Quidā etiā flores rosarū, & gallas adijciūt, singulorū dra. ii. Vtere autē ad putrefacta, et ad abscessus gingiuarū sicco: ad crustas uero cum melle. Philagrī, ad oris erosiones. Seminis lentisci nōdum denigrati drac. iiii. gallarū dra. iiii. costi dra. i. folij dra. i. utere. Theodori, ad tonsillarū ulcera, gingiuarūq; & pudendorū, ad putrefacta & carbunculos. Aluminis scissilis, sandarachę, myrrhæ troglodyticę, singulorū æquale pondus accipe, ac utere sicco. Hermi, ad omnes oris adfectiones, ab ulcere quod aphtha adpellatur usq; ad crustas & carcinomata. Ericę semē tritū, succo hyoscyami excipe, & utere cum melle. Aliud, ad ulcera quæ serpūt in ore, gingiuis, ac lingua. Misy cū succo foliorū ultis albæ, quā bryoniam adpellant, dilue, et cōiecto simul melle tere, ac ad illitionē utere. Diuinitus extergit ac repurgat. Vbi uero repurgata fuerint & carne explera, bryonię radicē cōculam & in puluerē redactā adhibe. Ea enī ad cicatricē perducit. Aliud eiusdē, ad oris putrefactiones, ulcerationes, & ulcera quæ serpūt. Foliorū ultis albę quadrantē, aluminis scissilis tritē, misyos crudī dra. iiii. atrametī sutorij dra. ii. cōtere quousq; arida fiant, & in puluerem redactis utere siccis. Repurgat, explet, reprimūt illatū fluxū. Ego uero præcedēs expertus sum. Collutione autē utendū est ad oīa oris ulcera, & ea q; serpūt, putrefactionesq; & gingiuas denigratas. Verbenacę rectę decocto ex uino, quod calidū ore retinēdū exhibe. Aliud diuinū remediū. Oleæ uiridis folia aqua decocta colluenda exhibe.

De angina, et eius speciebus, ex Galeno. Cap. XLVII. Anginæ quatuor differētiæ existūt. Vna, quū fauces fuerint inflāmatæ: fauces autē pharinga Græcis appellatā, uoco intra os locū, ubi tū stomachi, tum asperæ arterię extrema cōueniūt. Altera quū neq; circa oris regionē, neq; iuxta fauces, imō nec forinsecus, quicquā adparet inflāmatū: & tamē suffocationis sensus infestat ægrū iuxta asperæ arteriæ extremū. Tertia, quū exterior gutturis regio unā cum interna fuerit inflāmata iuxta mētum. Ad hæc autē & circa ceruicē quēdā adfectio oboriri solet, ex luxatione & discessu cuiusdā in collo uerticuli in anteriore regionem: unde cauus apparet locus, & quū extrā attingitur, dolore adficitur: qđ cōtingit ob distracta intro uerticula, & cōsistēre circa musculos faucium, aut extremitatis arteriæ inflāmatōnē. Hęc autē species, pprie cynāche à ueteribus est adpellata. Lingua enī à luxato uerticulo iuxta radicē suā impulsā, ex proprijs locis excedit, & difficultas magis circa respiratiōnē infestat, unde cogūtur aperto ore semp hīare, atq; aērē adtrahere. Oēs autē prædictæ adfectiones cōmunē habēt difficultatē trāsglutiēdi: ita tamē ut in aliā plus, in aliā minus hoc malū augeat. Accidit etiā eis potū adsumptum ad nares reflecti. Atq; hæc sanè sunt adfectiones: curatio autē earū in paucis uariat.

Aretæus autē inquit, Anginæ causæ multæ existunt, maxime aut frigiditas magis quā ardor, & plagæ, & ossa ex piscibus ad tonsillas impacta, et potus frigida, ebrietas, nimia satietas, & quæ spiratione attrahūtur mala. Archigenes autē ait: Occulta anginæ causam esse in quibusdā, neruos qui ad stomachū deferuntur, dum male adficiuntur, et post inferioribus mēbris, pulmōni inquā & cordi, respirandi principiū inflāmant. Arterijs uero quæ carotides adpellantur, itemq; alijs adiacentibus inde inflāmatōnē trāsmittūt. At uero quod hi qui sic adficiuntur nō fiant attoniti, inde est quod huius adfectionis causa intēperies sola existit, nō etiā coartatio locorū. Cōueniunt igitur, inquit Archigenes, eis ea quæ uomitoriā uis obtinēt, uelut est elaterium, & squama eris illita cū melle. Ego autē, inquit, ab occulta angina præhēsos ex sinaplis gargarismo releuo, moxq; in balneū induco, atq; ita multos à periculo liberaui, quibus adfecta particula, obliuioni tradita fuit, p distributionem uidelicet in uniuersum corpus sanatos. Aretæus autē inquit Cucurbita accipiat, priusq; infra umbilicū adhibeatur, mox ad latera deorsumq; & scapulas, ita ut assidue à loco uno ad alterū trāseratur, & in admodone ex supernis locis deorsum trahatur. Quod si uehemēter urgeat suffocatio, sinapi aqua tritū & uili panniculo exceptū pēctori impone. Ad delingendum uero cōueniunt eis: sinapi, nitrū, hyssopum, scylla assa, sulphur uisū, omnia paribus portionibus cū mellis cochleario permixta delingenda exhibe. Archigenes. In principio igitur compendiarium & præceptum auxilium omnis angina requirit, quandoquidem autē ferē iuuenibus accidit, euestigio cubiti uenam eis incidere oportet, nisi quiddam maioris periculi impediatur: auferre aut sanguinem parce, non usquequo animi defectio sequatur: citius enim hi animo linquuntur, & aliās sanè ex refrigerationibus & animi defectione perfacile materia à faucibus ad pulmōnē defertur, et inuitabile periculū infert. Curandū etiā ut modica fiat diductio uenæ. Nā quum in alijs, tū in magnis uenę diductiōibus acruadm animi defectus irruat: neq; tamē angustiores facere uenæ incisionem cōuenit, ne sanguis uelut percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, quæ causa huius adfectionis existit. Utile est autē eis repetita detractio in sequēti die, nisi præpediat egri timor, aut animi deliquiū. Quod si quid uenę incisionē fieri prohibeat, per clysterem infundendū est centaureæ, absinthij, calaminthæ, & aristolochiæ decoctū, admixto melle & plurimo nitro: postea etiā purgatiua danda, quæ magis p̄stutam ducunt: cōuenientissimum autē aliquādo in angina esse uidetur, elaterium: uerum non oportet nisi cum sero lactis & mico in sero cocto ipsum propinare. Conuenirent etiā eis ex aloë & colocynthide catapoda, si modo queant ea deglutire. Si uero confidentior contingat medicus, bonum est et hīerē Archigenis ex colocynthide drac. iiii. cum aliqua ex prædictis decoctione per clysterem infundere, ubi prius aliquo stercorum eductiuo euacuauerit. Post uniuersales autē euacuationes, cucurbitas adponere oportet, et si quidē tumor circa maxillas, aut sub mēto persistat, in ipsum tumorem, & cū scarificatione plurimum sanguinem extrahere, saleq; respergere scissuras, & cōfricare. quod si nullus extrinsecus

trinfecus tumor adpareat, ueluti fieri solet in ea quæ occulta adpellatur cynanche, retro sub colli neruo insignenda erit cucurbita iuxta primū uerticulū, et cōstanti adtractione utendū, & frequentius cucurbita auellenda. Ea enim instantia factis uertebrarū discessibus, ac luxationibus probe se opponit. Deinde ubi paulisper à reliquorū remediōrū adhibitione quiesueris, cataplasmatīs utendum, tum eadem die, tū etiā in sequenti. Maiorē uero spem in sequentibus dieb. in illitionibus & gargarismis reponere conuenit. Itaq; ubi initium sit cū multa inflāmatione, ea quæ leniter adstringunt offerēda sunt primū; uelut est rosarum, lentium, palmarumq; decoctum, flos rosarū ex hydromelite, rhus cum hydromelite decoctus, et decoctum myxarum. Quod si excoriatio contingat corpusculorum, panis cremor exhibendus est calidus, aut surfurum decoctum colluant, aut etiam lac solum. Ego autem, inquit Archigenes, siccū pharma cū in promptu habeo. Ex rhois culinarij drachmas viii. florum rosarum drachmas iiii. costi autem & croci, cuiusq; drachmas ii. Ex quo sanē in aquā mulsam inspergo, & in gargarismate utor, atq; inflāmationes & ulcerationes tōsillarum facillime sano, etiam si contingant quibus illæ ad summū progressum minentur. Quin & illitiones mansuetiores inflāmatis cōmodæ sunt, uelut est ea quæ ex moris cōstat, & rhois culinarij cremor in hydromelisi coctus donec cogatur. Oportet autem premacerare sufficienter rhoēm ipsum, donec abūde aqua mulla ex eo colorem accipiat, & in sapore ulm eius repræsentet. Probe etiam facit mali punid integri unā cum cordicibus fracti ac contusi succus melle permixtus: ita ut ad succi partes tres una mellis cōiiciatur, & donec cogatur decoquatur, ac illinatur. Quod si ad directorū remediōrum malum cedat, sed semper multitudo humorum augeat, uenæ sub lingua incidēdæ sunt, aut quæ sunt in fronte, aut etiam circa magnos angulos oculorum: forinfecus autē assidue lanæ circum collum ponantur oleo calido madefactæ, aut ceratū ex oleo cyprino adparatum adhibeatur, aut si malis ex gleucino siue musteo. Quod si diutius moram traxerit, abscessum expectare oportet, & tū sanē conuenientius erit ficuum decoctum ad colluēdum: multoq; magis si hyssopū ei cōiiciatur. Neq; uero incōmodus fuerit in his qui aliquo modo sunt exulcerati, crocus cū aqua mulla: & decoctū radicis dulcis. In uigore autē omnīū utilissimus existit succus posanæ aut halicæ ore collutus: nā et à multis malis liberat, et abscessus metum eximit cōfestim. Qui si nō adsit, surfures probe cocti ei succedere possunt. Atq; hæc quidē his cōueniunt. At in angina siue inflāmatione ac ulcere, ubi sola multitudine ægri obturati periclitantur, in his quæ acriora sunt periculū est faciēdū. Sunt enim tunc etiā in principio cōueniētiōra: post uniuersales tamē euacuationes: itaq; hydromeli meracius p̄fuerit, si cū eo hyssopū aut origanū decoquatur. Si uero in superioribus partibus, aut iuxta fauces malū persistet, sinapi tritū cū aqua mulla et percolatū gargarissandū exhibebimus. Cōuenit etiā cassiæ decoctū, & iridis, & radicis panacis, gentianæ, cetauræ, aristolochiæ, agarici, & radicis cucumeris agrestis: unūquodq; autē cū hydromelite satis diu decoquatur, donec succulentum reddatur. Vfus sum etiā in occulta angina ex sinapi garga-

rismo, & sæpe à periculo ægros liberaui. Illitio autē his ualde cōueniens, his inquā, qui citra exulcerationem anginā patiuntur, est ea quæ ex semine rutæ syluestris adparatur: & quæ ex uistis hirundinibus constat: quarum apparatū paulo post unā cum alijs remedijs describā. Iuuantur etiā fotu uaporis intra os accepto hoc modo. Origanum, hyssopū, saturciā, feniculi semē, cum aceto plurimo & nitro feruefacto in olla diligēter operata, operculo foramē habēte in medio, deinde arundine ori ægri & foramini adaptata, sinas foueri. Si uero ex feruore arundinis os aduratur, ouum uacū parū utrinq; perforatū ore contineant, & per ipsum arundo immittatur. Mollius autē fomētum fuerit, si pro aceto poscā affuderis, aut aquā. Cæterū magis lancinantiā offerre illis oportet, quo rursus infurgat caro, & transmutare queat eam quā in profundo pertulit coarctationem. In dubium enim sæpe uenit & ferē desperationem præ feritate morbus, ut & odiosa exhibere quibusdam necessarium fuerit: si quidem humano stercore quosdā usos esse constat pro illitione, & magnū sanē cōmodum repperunt. Alij autē recentī uli sunt, alij uero exiccato et trito, ita ut cum nardo uel myrrha id permiscētes foetorem celaret. Ab acrioribus autē & his quæ dilanantē ulm obtinent, ad mediocria est trāseundum: uelut est Andronis pastillus, et similia. Vtilia etiā his sunt, ea quæ uomitoriā ulm obtinēt, maxime illis quibus grauitatis sensus circa uentrē hæret. Archigenis remediū, quo utor, inquit, ad occultas anginas, mirabiliter etiam cōducit anhelosis. Elaterij oboli dimidiū, spumæ nitrī obolos tres, sinapis drac. i. contere cum aqua et informa. Mouet autē uomitum elaterium cum oleo aut melle tritum & penitissime illitum. Multo autē efficacius id præstat, si squama æris ei cōmiscetur, aut ipsum æs ustum, oleo cyprino tritū & illitum. Probe etiā facit fel tauri illitū, & nitrum cum aceto mulso potatum, & cetauræ succus cum melle, & aselli sub aquario stabulantes uase cū melle delinēt. Quidā nasturtij semē tritū bibēdum exhibuerunt quātum cochleari accipi potest cum aqua mulla. Nec ita lōge post pituitā uomuerunt illi crassissimā & tenacem, statimq; à plurimis molestijs sunt liberati. Aliud. Stercoris gallinacei albi, & colore cerusam referētis bonā copiā exiccata & reposita adserua. Vbi uero usus postulat, quātū cochleari accipi potest, in aqua aut aqua mulla dilutum ppina. Etenim desperatos etiā sanat: quod si bibere nequeat, tritum cū melle q̄ penitissime illini. Aliud, ad idē. Cetauræ drach. viii. nitrī dra. viii. salis cōmunis dra. viii. cōtere et reponere siccū. Vfu uero exigēte melle imbue, et cum pinnula illine, aut quomodo uidebitur utere confideter. Nā periculū eius factū est. Aliud. Absinthiū cōtusum & cribratum, adiecto nitro trito, illine cū melle. Aliud. Elaterium cum felle taurino & melle cōtritum illine. Cōpositio ex semine rutæ syluestris ori cōmoda, Andromachi. Ad anginas & desperatos, inquit, hac utor. Sūme etiā prodest stomachicis, & ad tormina intestinorum, fabæ magnitudinis exhibita ex frigida: Seminis anisi, seminis apij, floris iunci odorati, ammi, aluminis scissi, iridis illyricæ, seminis rutæ syluestris, quod quidā harmala, alij besafa adpellāt, cinnamomi, myrrhæ troglodyticæ, aristolochiæ lōge, singulorum unc. i. cassiæ, cro-

comagmatis, rosarū siccarū culusq; unc. i. costi qua drātē, cineris hirundinū recēs ustarū quadrātē, croci sesquunc. spicē nardi dra. iiii. amomi dra. iiii. gallas omphacitidas numero octo, cōtere & melle excipe ac utere. In principio quidē pharmacū hoc cū decoctione aliqua mediocriter adstringēte, quales sēpe diximus, dilue. Iuxta ulgorē uero cū pisanæ succo. Iuxta remissionē autē & declinationē melle aut hydromelite, aut uino mulso. Inueterata autē & uelut indurata inflammatione aceto mulso. Philagrius autē inquit, Aliquādo post prædictas uniuersi corporis euacuationes, & adhibitiones cucurbitularū, & incisionē uenarum sub lingua, miscemus etiā alia q̄dam ad præscriptū pharmacū, quæ partim quidē irruētē fluxū restringunt, partim autē oīa quæ iā incidēt discutunt. Cōiunguntur autē ex rutæ cōpositione dra. viii. gallæ omphacitidis dr. viii. & stercoris canini albi, ac humani stercoris sicci, cuiusq; dra. viii. Verū quēadmodū & antē dictū est, stercus canū accipere oportet eorū, q̄ antea p̄ bīduū ossibus sunt nutriti, humanū uero ex pūero bīduo pane & lupinis nutrito. Vomitoriū Martiani, q̄d & ad opertas & manifestas anginas prodest: præexige, inquit, mercedē. Aeris usti dra. xii. atramenti sutoriū dra. xii. myrrhæ dr. i. elaterij dra. i. spumæ nitri dra. i. fellis taurini dr. iiii. excipe melle & cū pinnula quā penitissime illine. Archigenes autē inquit: Stercus humanū quale prædiximus accipe & exicca, ac in uili pāniculo ligatū exure, atq; cū aqua mulsa dilutum propina. Est em̄ remediū eorū qui iā suffocātur. Antonius uero Musa inquit: Stercus caninū quale prædiximus accipe & exicca, cōtusq; & cribrato utere ad anginas cum melle, quā penitissime illinēs, ut trāsglutire possint. Eo em̄ nullū potētius pharmacū noui, inquit Gale. neq; ex angina laborantibus, neq; ad magnas tonsillarum inflammationes, neq; ad glandularū tuberculorumq; gutturis suffocationes iā periculū minantes, p̄bē facit etiā cū aceto mulso & pice liquida illitū caninū stercus. Summe etiā auxiliatur ad anginas, cōfectio ex ustis hirūdīnibus, cuius cōpositio hæc est. Cōpositio ex hirūdīnibus ustis. Cineris hirūdīnū syluestrium ustarū dra. viii. croci dra. ii. spicē nardi dra. i. excipe melle, & permisce hoc modo ubi iā incubuerint adfectiones. Oportet autē exurere hirūdīnes hoc modo: Pullos hirūdīnū uiuos nō deplumes, addito cōgruentis modi sale in fictile uas coniicimus, idq; obturatum super prunas ponimus, donec puluis & cinis fiat, quo cōtrito utimur. Aliud, ex hirūdīnibus, itidē ualēs ad anginas. Hirūdīnū ustarū numero xi. succi myrti uiridis cyathos xii. myrrhæ obolos iiii. mellis cyathos ii. hirūdīnū pullos exure et contere, deinde omnibus simul mixtis utere. Aliud cuius experimentū constat. Folij, costi, garophylli, piperis, cuiusq; unc. i. sandarachæ trientem, excipe melle despumato, & illine. Aliud. Cochleas nudas citra testam in hortis repertas in ollula exure ac cōtere, cinereq; melle excepto utere. Est em̄ eiusmodi remediū, quod præsentem opem affert. Simili modo etiā cancerorū ustorū cinere utendū est cū melle: & decoctū quoq; cancerorū ore collutū utile existit. Ego autē cancerum in aquæ hemina tritū percolo, ipsamq; aquā calefactā gargarissandā exhibeo: crassa em̄ educit multa, & releuatur cōsestīm æger. Aliud. Centauream mino-

rem siccata exure, cineremq; illine cum melle.

Aliud. Maxillæ porcelli ustæ unc. i. stercoris canini albi dra. iiii. malicorij unc. i. gallarū unc. i. costi dra. iiii. piperis torrefacti scrupulos vi. misce cum melle ac utere. Valde autē magna sollicitudine ac cōtentione opus est etiam tum quum malum remittere uidetur: etiam ea quæ iam ex profundo corporū circa fauces adtracta sunt, ex improviso in pulmonem transferuntur, si negligantur, atq; ita repentina mors ægro inferitur.

De glandulis.

Cap. XLVIII.

Omnibus hominibus carunculae quædā exiguae naturales iuxta utraq; tonsillas extant, antiades Græcis, Latinis glandulae appellatae, quæ quū naturalē modū seruant, nihil molesti inferunt. Verū ubi iuxta affectionis proprietatē augetur, & modi maioris q̄ secundū naturā suam fiant, tunc sanē & transglutinationis & spirationis difficilis causæ existunt. Cōsistunt autē ferē in totum citra inflammationē, & paulatim etiā augetur. Aliquando autē & inflammationē patiuntur. Diducto itaq; ore manifeste apparent glandularum tumores maiores, citra quidē inflammationē tonsillarum corpusculis cōcolores. Inflammatae uero rubicundæ & inferētes dolorē. Quare quum inflammatio affuerit, gargarismis & illitionib. ad tonsillas inflammatas descriptis est utendū. Quū uero citra inflammationē cōsistunt, conari oportet ut per cōmoda pharmaca paulatim deprimantur, & per admodi digiti cōpressionē. Remedia autē ad glandulas absq; inflammatione auctas talia conueniunt. Gallæ omphacitidis, salis ammoniaci, aluminis scissi, cuiusq; unc. i. adhibe siccum. Aliud. Myrrhæ sextatē, gallarum dra. viii. misyos dra. ii. salis torrefacti dra. ii. utere sicco. Aliud. Gallarum, misyos, myrrhæ, aluminis liquidī æquales partes accipe, & siccis utere, uel cum melle. Aliud. Asclepiadæ. Remediū ad glādulas accōmodatum: gallarum omphacinarum dra. iiii. diphrygis dra. i. myrrhæ dr. iiii. croci dra. iiii. mellis quantum suffecerit. Hoc pharmacū citra ulcerationē glandulas reprimi. Aliud. Apolloniadæ. Diphrygis dra. ii. chalcitidis assatæ dra. ii. gallarum dra. i. croci dra. i. myrrhæ dra. i. excipe melle & utere. Chirurgia. Verum si pharmaca uincantur, excindere glādulas oportet. Quod ut cōmodius fiat, æger in claro & splēdido loco collocetur, & diducto ore unaquæq; glandula uncino producat & excindatur: excinditur autē ex ea id quod supereminet, iuxta medium eius, quod præter naturā excreuit. qui em̄ dum omnē quæ præter naturā accreuit carnē excindunt, etiā naturalē carnē ex fundo auferūt, periculosę sanguinis eruptionis autores fiunt. Post excisionē autē posca frigida colluēda detur, ad sanguinis uidelicet inhibitionē, & post eā frigidissima aqua. Postquā autē sanguinis eruptio constiterit, satis lōga interapedine tēporis facta aqua mulsa tepida exhibeatur. Sequētib. uero diebus etiā cū ea illitiones adferātur, quales sunt ad ulceratas tonsillas descriptæ. Raro autem, quando uidelicet ulcera eminentiora adparent, florido sicco ipsas tonsillas attingimus. Per hoc enim eminentiæ deprimuntur, & cicatricis inductio perficitur.

De suffocatorum reuocatione.

Cap. XLIX.

Reuocantur aliquando suffocati ac strangulati, aceto ori infuso cum pipere, & semine uricæ: uerum diffi-

cultus

culter tractari possunt ut admittant: cogere itaque oportet ac ori infundere, ad uomitionemque irritare. Rubore autem circa collum dissoluto, statim respiciunt ac relaxantur: quare oleo multo calido & lana, aut cerato, collum assidue circum circa est amplectendum. Similiter etiam naufragos reuocare oportet, si quidem respiratio adhuc in eis seruetur: prius autem in caput ipsos suspendere conuenit, ac cogere quo absorpta aqua euomant, siue pinnularum, seu digitorum irritatione, forinsecus uero manuum impositione iuuare oportet uentris firmitatem.

De deuoratis ac fixis in tonsillis spinis, atque his quae in asperam arteriam delabuntur. Cap. I.

Si in asperae arteriae extremum, atque ipsam adeo asperam arteriam, aliquid eorum quae deglutiuntur praeter lapsum fuerit, tussis prouocanda est, per acetosam aliquam qualitatem: & sternutatorium quoque naribus admouendum. Ex uehementi enim agitatione, & instantia, & spiritu simul cum uiolentia quadam expulsiōe adiuuante, eiusmodi consueuerunt excerni. Si uero iuxta tonsillas, aut iuxta principium stomachi seu gulae spinae aut ossa fuerint infixae, ita ut oculis subiaceant, atque plurima sui parte extra tonsillas promineant, uolsella apprehensa extrahere oportet. Quum uero in inferioribus gulae locis quid adhaeserit, hoc modo educatur, Spongiam paruum resina terebinthina madefactam, aut carunculam crudam recentem incisam, una cum filo ualido ipsi alligato, deglutire coget, & mox comprehensam per alligatum filum rursus extrahe, hoc enim modo saepe etiam id quod infixum fuit, simul extrahi consueuit. Conuenit etiam panis recentis interioris buccellas deglutendas exhibere citra commanducationem: aut carum aliquantisper circummanducatam, non tamen penitus dissolutam. Quum autem ad fundum usque ipsorum corporum penetrarit, neque extrahi potuerit, aqua mulla gargarisanda exhibeatur, & cibi sorbiles, uelut pisanum cum melle, aut halica similiter: aut miscra aqua mulla calida maceratae offerantur, forinsecus uero ceruicis atque uniuerso collo lanam oleo calido imbutam imponere oportet. Similiterque cataplasmate calido laxante ac deprimente collum contegere conuenit: uelut est id quod ex semine lini cum aqua mulla adparatur. Hoc enim ductu tum locus ipse superatur, tum spina commota, simul cum his quae deglutiuntur, deducitur. Aliud, ad educationem eorum quae in tonsillas deuorata sunt. Statim te ad aegrum desidentem conuerte, ipsumque tibi attedere iube: ac dic, Egrederere os, si tamē os, aut festuca, aut quicquid tandem existit: Quoadmodum Iesus Christus ex sepulchro Lazarum eduxit, & quoadmodum Ionam ex cetio. Atque adprehensio egri gutture dic, Blasius martyr & seruus Christi dicit, Aut ascende aut descende.

De arteriarum pharmacis. Cap. II.

Asperae arteriae extremum & subiacentem ipsi asperam arteriam, cum suis propriis musculis, pellicula quaedam fortiter complectitur & ambit. Quando igitur adfectio aliqua siue iuxta eam ipsam pelliculam, aut circa extremum ipsius arteriae musculos contingit: remedia quae uim medendi eam obtinent, arteriaca communiter adpellantur. Afficitur autem pellicula haec aut ob nimiam humectationem, aut asperitatem, aut ulcerationem. Vocis enim nocumēta, uidelicet eius interceptio, hoc est non posse loqui, & rauditas in lo-

quendo, ad plures causas consequuntur: aliquando quidem propter diuturnos ex capite defluxus, aliquando uero propter suppurationem thoracis & raudem. Ex uociferatione etiam magna & plurima raudedo uocis oboritur, & ob frigidi & insueti flatus inspirationem, & ob plurimam ac insuetam potationem uini meraciorem. Verum haec affectiones magnitudine inuicem distant. Etenim uehementius humectis uocis instrumentis, uocis interceptio contingit: mediocrius autem rigatis, uox rauca perficitur. Itaque qui ex uehementi clamore, amplius uoce uexantur, consimile quiddam patiuntur his, qui reliquis corporis particulis fatigatis, & ex labore afflictis, afficiuntur. Nam & pellicula quae arteriae extremum atque ipsam asperam arteriam ambit, per magnas uociferationes extra prolato spiritu percussa, inflamatur. Et iuxta arteriae extremum, ultra hanc plagam, musculorum ipsum mouendum actio offensa, maiorem affectionem operatur. Musculi enim illi uocem operantes, ob magnas uociferationes, non solum ab erumpente spiritu percussi laeduntur, uerum etiam superextensi uehementer, maximam sustinent lassitudinem. Curatio autem horum coincidit cum his, qui alias particulas corporis habent fatigatas. Balneum enim dulcium & bene temperatarum aquarum, magnopere iuuat omnes phonaseos Graecis appellatos, qui uocis exercitio magno utuntur: citharodos inquam & praecones, & tragoedos, quum contendendo oblaeserint uocem. Quoadmodum autem oleum forinsecus illitum omne corpus a fatigatione refoecillat: sic & cibi mordacitate carentes & deprimentes, ac laxantes, tum affectam arteriae pelliculam, tum ipsos musculos, et pharmaca arteriaca uim obstruendi meatus habentia iuuant. Quum igitur afflictiones ac lassitudines uelut distendentes circa extremum ipsius arteriae musculos, & ipsam pelliculam generantur: in principio quidem lenissima edulia conueniunt: pharmaca uero obstructoriam meatuum uim habentia. Sedata autem inflammatione aliquod ex modice repugnantibus est adhibendum: deinde rursus aliud, sed priore praestantius, ut paulatim ad medium repurgantium perueniatur: deinde ab hoc adhuc fortius discussorium adhibeatur, ut hoc modo semper ad uehementius progressus fiat, quando uidelicet diutius ueluti indurata adfectio in uocalibus organis perstiterit. Primi itaque ordinis erit tragacanthus, & gummi, & asfer samius, amyllumque, & ex halica ac trago probe decoctis sorbitio: lac etiam conueniens est, & dulcissimi panes, oua sorbilia, & nuxes pineae madefactae, sesama, & sapa quae sireon quoque & hesperema adpellatur. Haec itaque inflammationis affectionibus circa arteriam arteriaeque extremum conueniunt: quibus utendum donec moderator inflammatio fiat. A uini autem potu abstineant hoc tempore in totum. Postquam autem inflammatio moderator reddita est, passum theracum exhibendum est, & sapa: butyrum quoque conueniens est, & amygdalae una cum sorbitio decoctae, lac item ac mel diutius cocta, amylo ipsis insecto, quod si non adsit, panis filigineus siccus contusus & cribro excussus, lacti dum coquitur infarciendus est. Manifestum itaque est quod per huiusmodi uictum, tum pellicularum, tum musculorum circa arteriae extremum atque ipsam arteriam, inflammatio sedatur. Relinquitur autem humiditas

multa, propter quam impossibile est uocem esse claram, nisi rursus edulius utatur & pharmacis mordacitate carentibus & repurgantibus, uelut est faba elixara, & pisana, & semen lini torrefactum. Hæc enim medium obtinent, inter ea quæ mediocri uel prædicta sunt, & ea quæ meatus obstruunt pharmaca. His autem amplius repurgat resina terebinthina, & itus cum despumato melle, amygdalæ amaræ, brassicæ & probe decocti porri. His uero adhuc fortiora sunt, farina erul, hormini semen, trididis radix & panace. Omnibus autem prædictis maxime mollibus, passum creticum, deinde theracum & scybelites conuenienter miscentur: sapa quoque quæ sireon & hepsena uocatur, ex musto ad tertiam partem mensuræ decocto adparata omnium maxime meatus obstruit, citra etiam mordacitatem meatus lenit. Quod uero ex caricis adparatur decoctum ad mellis spissitudinem, magis discutit ac repurgat. Omnium itaque simplicium pharmacorum uires nosse oportet, cum qui aliquod compositum est facturus. Qui enim eas nouerit, etiam eis quæ ab alijs composita sunt recte utetur, maxime quum indefinite fuerint descripta. His igitur præexplicatis, arteriacas compositiones à ueteribus descriptas subnectemus. Arteriaca ad uocis asperitates, in principijs exhibita lenissima: gummi drach. ii. tragacanthi drach. i. sapa sextarium i. Gummi & tragacanthum contusa et cribrata, cum sapa conterere donec dissoluantur, deinde super prunas fumum non emittentes decoque, donec non inquinent testæ instillata. Exhibe autem ex ea sub lingua tenendum. Alia arteriaca. Gummi quincuncæ, paksi sextarium unum, mellis lib. i. Gummi modica aqua dilue, & ad reliqua collectum super prunas non fumantes decoque, ut prædictum est. Ante somnum uero delingendum exhibe. Antonij Musæ, ad uocis interceptiones. Brassicæ uiridis cauliculos depurgatos manducandos exhibe, & quod instar palcarum exuccum est ex puere iube: succum autem ipsum deglutire. Aliud. Succus eryngij aqua decocti heminam i. succi ficum aqua decoctarum tantundem, gummi leuissimum trici drach. viii. decoque simul diligenter, donec ad arteriacæ crassitudinem redigatur, & delingendum exhibe ex eo ante somnum usque ad cyathum mensuram. Alia arteriaca, ad asperitates, raucae tates, tussesque & sputum sanguinolentum. Amygdalarum amararum decorticatarum numero xxv. seminis lini torrefacti drach. iiii. tragacanthi drach. ii. ouul in fermento assati uicellum, tragacanthum in modica aqua maceratam, una cum reliquis omnibus passim excipe. Si uero sonus uocis sit fractus, mel per passum ammisce, maxime si ex pectore aliquid educi oportet. Aliud. Brassicæ succum cum melle decoctum delingendum præbe, & confestim auxiliabitur.

Ad inueteratas affectiones uariæ arteriacæ. Cap. lxi.

Oribasij ad asperitates & suppressam uocem.

Croci drach. vii. radice dulcis, spicæ nardi, cuiusque drachmas iiii. myrrhæ drach. i. thuris drach. i. seminis hyoscyami drach. i. mellis despumati unc. vi. piperis albi grana l. exhibe sub lingua tenendam magnitudine fabæ. Alia arteriaca sub lingua tenenda, ad suppressam uocem, raucosos & eruenta relectantes. Tragacanthi drach. vi. gummi drach. vi. myrrhæ drach. ii. obolos ii. thuris sesquidrachmam, piperis albi grana xx. croci drach. i. succi radice dulcis drach. vi. carnis phœnicobalanorum numero iiii. paksi Cre-

tici quantum satis est. Gummi & tragacanthus contusa & cribrata passim macerantur cum radicis dulcis succo: quod si non adsit succus, radicem tusam, & donec cogatur decoctam coniungimus quadruplici potest. Alia arteriaca, quæ etiam ad tussim prodest. Seminis lini contusi & cribrati, uuarum passerum pinguium sine uinaceis nucum pinearum tostatum, nucum auellandarum mundatarum, æquales partes in farinam redactas melle cocto sufficienti excipe, et cochleare exhibe ante somnum. Eclegma quo utimur. Vini scybelitæ sextarium i. gummi sexuncæ, mellis dodrantem. Gummi pauca aqua præmacera, deinde omnia simul contrita in diplomate decoque acutere. Aliud, Charixeni. Succus radice dulcis drach. vi. tragacanthi drach. vi. croci drach. ii. myrrhæ, thuris, cuiusque drach. i. spicæ nardi drach. i. paksi protropi choenices iiii. decoque donec in mellis modum cogantur, siccis probe commixtis, acutere. Eadem enim potestate ualeat qua & sequens. Aliud, sub lingua tenendum ad suppressam uocem, ac reliquas circa arteriæ affectiones. Tragacanthi drach. x. gummi drachm. xii. myrrhæ drach. iiii. thuris drach. iiii. carnis phœnicobalanorum numero vi. radice dulcis drach. vi. paksi protropi aut theracis quantum excipiendis his satis est. Sic autem passum ipsum præcoctum ad mellis crassitudinem. Exhibe fabæ Aegyptiæ magnitudine sub lingua detinendum, & dissolutum deglutendum.

Alia arteriaca faciens ad uocem fractam, raucosam & suppressam, inflammationes tonsillarum: utilis est phonascis & ante & post certamen exhibita: suauiter refrigeratos: prodest ueteri & recenti tussi, spuentibus sanguine, & sursum relectantibus, & coeliacis: conducit etiam ad anhelitus foetorem. Croci drach. iiii. myrrhæ drach. i. succi radice dulcis drach. i. paksi Cretici sextarios iiii. passum ad tertias decoque, & cum eo prædicta excipe ac utere. Aliud, ad ulceratam arteriam, Charixeni: conuenit etiam phonascis, hoc est, qui uocis exercitio utitur ante certamen, & post exhibita: facit & ad circudolentes oculos, extra imposita lana ex eo madefacta, & ad interaneorum adfectiones delineta. Gummi drach. xii. tragacanthi drach. xii. thuris drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. ii. succi hypocistidis drach. ii. paksi scybelitæ sextarium unum. Gummi & tragacanthum contundito & cribrato unumquodque seorsim, et cum modico passim diluito, reliqua uero fracta & præmacerata similiter cum modico passim conterito. Crocum uero in raro laneo panno ligatum, in ollam appendito, in qua reliqua coniecta, ac assidue agitata decoquuntur: deinde extracto croco, et probe contrito, reliqua omnia in pilam coniectantur, & ut cocta sunt cum croco uniantur, & utitor. Alia arteriaca, ex cuius usu sæpe magnam laudem adsequutus sum. Nuces pineas sexaginta, amygdalas amaras delibratas quadraginta, carnem phœnicobalanorum vi. succi radice dulcis scrup. xii. croci scrup. i. myrrhæ scrup. i. tragacanthi scrup. vi. paksi Cretici quantum sufficit. Quibus uero educatione ex pectore opus fuerit, mel & sapa adde. Alia, Andromachi. Pinguedinis gallinæ recentis quadrantem, mellis heminam i. decoque simul, & cum rutæ ramulis agita donec cogatur. Exhibe eam sedunis, & post cibum, & ad noctem. Sorbitio ad suppressum sonum maxime ab humore: conuenit etiam phonascis. Porros in aqua ad tertias decoque, atque ipsos quidem abijce

abijce, aquę uero halicę succum ammisce, & mel, & ouorum lutea III. quę ubi commiscueris ad tertias decoque, & excola; deinde adfusa sapę optimę sextario uno, rursus donec cogantur decoque, ac ramulis anethi circumagita. Da ex ea mane & uesperı cochleare unum. Arteriaca necessaria, phonadis comoda: expertus sum etiā eius ualorem ad raucescentes ob humiditatem plurimam. Costi, folij, spicę nardi, amomi, piperis, calsię, mastiches, culusq; drachmas quinque, opij drachmas duas, mellis & succi mororum æqualiter mixtorum quantum satis fuerit. Excipe pharmacū cum eis, quo uiscosa coactio reddatur, & utere. Exhibe sub lingua tenendum magnitudine nucis auellanae: caueto ne nimis solidum facias, ut facilius sub lingua liquecat. Alia arteriaca, ad affectiones asperę arterię, & pulmonis ad reiectātes sanguinem, & omnia uicia manifesta: maxime uero prodest crebrum & rectū anhelitum ducentibus. Scillę depurgatę costę drac. VI. seminis lini drac. II. seminis urticę drachmas duas, succi uerbenaę exiccatę drachmas duas, thymi drachmā unā, farinę erui drach. II. pulegij, iridis, betonicaę, anisi, nasturtij, apij, seminis foeniculi, seminis anethi, piperis, foeni gręci, culusq; drac. I. excipe melle. Atico, exhibe mane & uesperı quātum cochleari accipi potest. Alia, ad arterię adfectiones, & pulmonis ulcera, reiectiones puris et sanguinis, destillationes ad pectus, & ad educationem eorum quę in pulmone coaceruata sunt ualde efficax. Resinę terebinthinę, croci, thuris, myrrhę trogloditicę, terrę quę Aster appellatur, cinnamomi, nucum pinearum purgatarū, radicis dulcis, singu. dra. III. amomi, tragacanthi, carnis palmarū pinguiū culusq; drac. III. spicę nardi drachmas duas, calsię drachmas duas, costi drac. unam, galbani depurati obolos quatuor, mellis Attici libras sex. Mel & terebinthinam in diplomate decoque, atq; ubi cōdensari coeperint, galbanū præmolitum ammisce, ac donec non inquinarent amplius decoque, deinde agitando frige facito, & cum reliquis cōtusis in pila permisceto. Vsus eius est sub lingua detentę. Alia, quę similiter ad omnia prædicta efficax est. Spicę nardi drach. III. croci drach. I. piperis grana triginta, radicis dulcis drach. I. nucis pinearum depurgatarum numero centum, styracis drach. II. balaustiorum drach. III. tragacanthi drac. I. cinnamomi drac. I. amomi drach. I. thuris drach. I. mellis sesquilibram, aut pasai Cretici heminas VIII. passum in duplici uasculo siue diplomate coquitur ad mellis spissitudinem, & ad reliqua arida in pila trita affunditur. Tragacanthus autem tunditur, cribratur, & diluitur unā cum styrace in uino modico dulci, atq; ita ammisceatur, exhibe ex eo cochleariū unum. Expertus enim sum ambo hæc adscripta magna celebritate probari. Compositio ex capitibus papaueris uaria. Capita papaueris centum & uirgini in aquę sextarios tres coniecta ad dies quinque macerato, deinde ad tertias decoquito, & abiectis capitibus ad aquam mellis sextarium unum ammisce to, quibus simul ad spissitudinem mellis decoctis, ita ut non diffuant, croci, myrrhę, acacię, succi hypocistidis singu. drach. I. infarcito, & ante somnum delingendum exhibeto. Prodest reiectandibus sanguinem, coeliaci ac disentericis. Ego autem ad huiusmodi ex capitibus papaueris compositionem, quā-

do scilicet ad libram unam aquę, decem papaueris, capita inijciuntur, prædicta commisceo, & pro pharmaco fluxiones sistente ac repressiuo utor. Alia, ex libris Asclepiadę, panacea Mithridatis. His qui uocis exercitio utuntur ante et post certamen utilis, facit ad glandularum inflammationes, columnellā laxatam, & ad gingiuas humore turgentes, & ulcera serpentia oris, ad motos dentes, & destillationem, tulsim ueterem & recentem sanguinem spuentes ac sursum reiectantes. Vtorea aliquādo citra admixtionem, aliquando autem passo aut scybelite uino, aut aqua calida diluta. Etenim ad consillarū inflammationes atque consimiles adfectiones utendū est pharmaco hoc diluto: ad eas uero quę in profundo hærent, immixto & puro. Verum compositio ipsa hoc modo habet. Radices filicis quā crassissimę diligenter lauantur, donec terrenę sordes in totum discedant, deinde refrigerantur, in frustra digitali magnitudine dissectę: ex quibus lib. III. accipimus, & capita papaueris agrestis mediocria centū & quinquaginta, radicis symphyti depuratę, corticis radicis mandragorę, rhei pontici, rosarum siccarum, iridis illyricę, radicis dulcis, balaustiorum, singulorum quadrantem, calsię tridentem, nardi celticę sesquundam, aquę pluuialis sextarios quindecim. Omnia prædicta crasso modo contunduntur, & per triduum madescunt, deinde sequenti die in diplomate ad tertias decoquuntur, exprimuntur, & percolatur: in huius autem decocti parte, subscripta per diem & noctem maceramus. Sunt autem gummi puri lib. I. tragacanthi pellucidi lib. I. myrrhę trogloditicę sextans, succi radicis dulcis sextans, croci sextans, succi hypocistidis sextans, mastiches uncia una. Sequenti deinde die diligenter, & paulatim hæc trita diluimus, & quod superest ex ipso decocto ac expresso liquore, paulatim adijcimus. Et postea uinum scybelites, aut theracum, aut aliud dulcissimum, sextariorum XXXIII. mensura in uas fictile diffusum decoquimus, donec ad mellis crassitudinem redigatur: deinde adiectis etiam tritis omnibus rursus ad coactionem decoquimus, & ablatis utimur. Datur ex hac quātum cochleari excipi potest.

Compositio ex capitibus papaueris, ad tusses humidas, dolore adfectam arteriam, & fauces, & ad destillationes a capite ad pectus: utilis est etiā ad uigilias. Capita papaueris Thebaici mediocria unā cum ipso semine decem, aquę pluuialis sextarium unum, radicis dulcis parum quiddam, per diem uinum præmacerato, deinde donec flaccida tactu fiant capita, decoquito, exprimito, & percolato, ac ad decoctum dimidium eius mellis adijcito, & rursus super prunas ad mellis crassitudinem decoquito, ac utitor. Accuratioꝝ huius antidoti adparatus, atq; etiam partim usus prædictus est Sermone quinto de proprijs ægrorum potionibus, loco. Quod si magis adstringens alui profluuiorum facere uelis, & sanguinem spuentibus commodum, succi rhois rubri drachmas duas adijce, & acacię drachmas duas: hæc autem in passo diluta, tum demum quum ab igne ablaturus es pharmacum, in ollam conijce, & parumper feruefieri sine, ac utere, cochlearium exhibens ante somnum.

De destillatione siue catarrho, & narium muco,
ex Galeno

Cap. LIII.

x 4

Destilla

Destillationis & muci causa est cerebrum, quod quidem à frigore ad frigidā intemperiem deducitur, ab æstu uero calescit & repletur. Vinū quoque ultra modum potatū caput replet, & balnea calidiora, & largior perfusio capitis ex aqua calida, maxime si aliās calidius caput existat: & cibus sanè qui in uentre incoctus perseverat, neque infra excernitur, in caput impetū facit. Repletū itaque caput rursus ad subiecta membra humores demittit: & si quidem ad nares hoc ipsum excrementū defluat, Coryzan siue mucū adpellare consueuerunt, & Latini amplius grauedinē: si uero ad gurgulionē, morbum Vnā appellatū generat. Est autē affectio circa gurgulionē consistens, aut aliās ipsum gurgulionē tumidū facit. Promptissima itaque est ad nares & ad os defluxus delatio, quāuis aliquibus etiā ad oculos, aliquando & ad aures deferatur. Atqui delationem ad os etiā stomachus siue gula excipit, & aspera arteria, atque ipsum adeo arteriæ extremū. Quod sanè extremū, ob ipsum ad se delatū à capite defluxū superhumectatū, in principio rauosam uocem producit, & progressu temporis etiā paruā. Quod si amplius augetur malum, uox ipsa in totum perditur. Nam ipsa aspera arteria unā cū suo extremo permadescit. At si acrior fluxus ipse existat, non tantū uocis damnum prædictæ particulæ patiuntur, sed grauissima etiā erosio accedit, talis naturæ, quales circa cutē accidere sepe uidemus citra ullā externā causam, eoque modo etiā pulmo ipsis exulceratur, uocaturque hæc affectio tabes. Quod si ad gulam & in uentriculum fluxus deferatur, si quidē frigidus existat, in frigidā intemperie corpora perducit, calidus uero in intemperie calidā: exulcerat etiā ea temporis progressu, in principio uero appetitioni nocet & concoctioni. Si itaque frigidus fuerit defluxus, tardas concoctiones & cruditates, ac ructus acidus efficit. Si uero calidus fuerit, in corruptionē adiget cibos, unde nidorose, aut foetentes, aut acide eructationes producuntur, aut etiā alterius culusidā quæ nominari nō potest, aut etiā nomē habentis qualitatis. Vbi uero altius penetrarit nocumentum, etiā intestinum selunum adficit, & ad colū usque pertingit, atque ad mesenterij uenarum uasa, per quæ ad hepar distributio atque digestio alimentī contingit, aliquibus itaque deiectio appetitus accidit, aliquibus uero appetitiones præter naturā, quas adpellat caninas, aut etiā uitiosorum ciborū concupiscentia, qualis mulieribus prægnantibus pica morbo infestatis contingere consuevit. Manifestum autem est & gurgulionem & consillas adfici. Quin & parulides & glandulæ, & dentiū erosiones, ulcerationesque & putredines oris, ad serofas ex capite in ipsum os destillationes sequuntur. Cæterum uulgus Medicorum aut gurgulionē refecat, aut pharmaca exhibet quæ per asperam arteriā sputi electione in pulmonē dilapsa educant. Alij uero uentris curam gerunt, quemadmodum alij dentium, & oris, aut etiam affectionum in naribus, aut oculis, aut auribus curam moliuntur. Principium inuentionis Galeni. Melius autem erat, mea quidē opinione, uelut fontem malorū excindere, sanato uidelicet capite, quod si impossibile sit facere, ob uehementiam naturalis intemperiei, omnino tamen eius saluti consulere oportet, indicatione ex figura ipsius accepta quomodo ei subueniri possit: non enim mox, uelut aliqui Medici omnibus capi-

tibus semper ex thapsia & sinapi cataplasmata adhibent, sic et te facere uolo. Etenim si à calida intemperie caput uexatur, omnia calida pharmaca nocua existunt. Oportet itaque ipsos balneis multis calidis potabilium & dulcium aquarum consolari, simulque generatos in capite uapores calidos discutere, & temperaturam omnem in melius mutare. Nocturnus autē est eis usus aquarum natura sua calidarum. Quæcunque enim sulphurentæ sunt, & bitumē olent ob caliditatem suam, contrarię sunt capitibus natura calidis. Quæ uero aluminosæ, coarctatione sua caput offendunt: uerū calidas dulces non adpellamus suā natura calidas: neque enim inuenire est quæ suapte natura calidæ existant, ac non aliqua medicamentaria qualitate participant. Qui uero caput uehementer calidum & perustū habent, & ob id assidue à destillationibus uexantur, his melius est hora æstiuā ex rosaceo ungi, ex solis rosis et omphacino oleo citra spissamētorū adiectionē adparato. Quædā autē capita propter calidiorē arteriarum temperaturā, tū uentrigine, tum dolore apprehenduntur: in quibus etiā arteriarū incisione utimur. Quare considerare oportet præcedentē destillationis causam, & præhabita diætā, atque ita remedia contraria afferre: in uniuersum autē pauco cibo & quiete utendum est, uitato etiā frigore & calore: si uero cibi incocti amplius in uentre innascent, ad uomitū æger est inhortandus. Philumeni. Valde utile est his qui destillationē patiuntur, si eorū plantæ pedis cū pice in oleo plurimo dissoluta cōstanter fricentur, ex eadēque inguina & sedes perungantur, nares uero ex thure & myrrha cū uino & oleo contritis, ac ad mellis crassitudinē reductis illinantur, & unguentum irinum simul naribus instilletur. Melanthium etiam torrefactū linteolo illigatum odorent, aut hedychroō manibus teneant & assidue odorēt, aut cyphi eodē modo. Cōueniēt etiā inflammationē arcētia emplastra frōdi imponere, uelut est Icesic, & emplastrū oxerū adpellatū, itemque barbarū cruentis uulneribus destinatū, & athena. Gargarissent autē assidue passum scybelites, aut sapā calidā: sorbitionibus uero utantur decocto hyssopi, ficuū & nucū pinearū, atque iridis, itē halica ex passo decocta. Si uero ab his nihil leniatur destillatio, neque tamē amplius augetur, sed eodem modo ad plures dies persistat, præsentissimū auxiliū capitis irroratio existit, maxime in æstate, & capitis temperatura calidiorē. Oportet autem in balneis ex alto frigida aqua delabente caput subdere, ut uolentium inde sustineat insultū: euectigio enim densitatem dissoluit. Animaduersionē tamen habere oportet, an thorax inde facile offendi possit: consuevit enim promptē à capite frigiditatem transsumere ac fortissimas uexationes perferre. Porro diuturnas destillationes foris clyster sanat, aut uomitus à raphanis selunis factus, aut purgatio exuberantis humoris, & irrigatio capitis ex unguento irino, aut optimo nardino. His uero qui cōtinua & in ueterata iam destillatione adficiuntur, caput radere oportet, & factis scarificationibus bituminosa emplastra imponere: pharmacis autē deglutitijs utendū huiusmodi. Eclegma ad destillationē. Mellis sextantem, butyri recentis unciam unam, decoque, & in duas partes diuisum delingendum exhibe, his qui educatione opus habent. Manducatio ad eandem. Semen hormini, semen papaueris nigri, semen lini

torrefactum æquis portionibus cōtunde, & cribro excute, melleq; cocto excepta commanducandam mane exhibe. Probè etiam ad destillationes facit antidotus ex capitibus papaueris soporifera, ante somnū exhibita: etenim somnū dulcē infert, & reprimit influxū. Eius adparatus paulo antè inter arteriacas compositiones dictus est, & in quinto similiter Ser mone de proprijs ægrorū portionibus loco. Cata potiū ualde celebre ac dolorē leuās. Styraçis dra. vi. myrrhæ dra. i. & dimidiā, terebinthinæ drac. ii. opo panacis dra. ii. iridis dra. ii. piperis albi, spicæ nardī, nitri, seminis hyoscyami, opij, culusq; dra. i. arida cō tundito ac cribrato, reliqua uero in pila citra liquo ris admixtionē contusa simul committito, & grana in erui magnitudinē informata ante somnum deglu tiēda exhibeto, neq; quicquam ultra sorbitiones ad mitrito. Dantur ad summū grana iiii. medium iii. minimum ii. Aliud, quod etiam dolorē leuās, tum tussis, tum destillationi opitulatur. Styraçis, drach. iiii. myrrhæ drachmam unam, opij drach. i. galbani drac. i. contunde in pila, & sapa affusa subi ge, & catapotia erui magnitudinē informa, quorū similiter ad summū iiii. exhibe, medium iii. mini mū ii. absorbeant etiā insuper passi calidi diluti cya thos duos. Asclepiadæ remedium. Pyrethri, costi, utriusq; drach. ii. piperis albi drach. i. contusa & cri brata reponē. Vsu uero expetēte apprehēsis naribus pharmacū adtrahere præcipe. Aliud. Piperis dra. ii. seminis urticæ drach. ii. croci, myrrhæ, costi, culus que drachm. i. Vtere ut dictum est. Caseus autem te ner & recens comestus utilis est, & cauliculi bras si cæ crudi à leiunis comesti, similiter & brasica deli catior cocta & comesta. Qui uero calidiori prædicti sunt tēperatura, lactucæ cauliculos parumper ferue factos comedant, in posca uero ipsos intingant.

De tussi. Cap. liiii. Tussis causæ uarię sunt. Nam & humor à capite ad as peram arteriā destillans tussim efficit, & asperitas so la pelliculæ asperā arteriā intrinsecus ambientis tussim iritat: qui præterlabitur etiam cibi ac potus tussim mouēt, & lumbrici stomachū infestantes, tussis culas paruas excitant: & acris humor stomachū per turbans, ac irritatiuam aliquam qualitatem ad fau ces demittens, imaginariā tussim producit, quemad modum etiam in his qui stomachi morsum sentiūt, & saliuæ ad eū influxu uexantur, euenire solet, quū nihil molesti iuxta asperam arteriam obuersetur. In temperies quoq; frigida respirationis instrumento rum, tussis causa existit: uerum hi moderate ac mini mē uolenter tussunt, adeo ut non solū per spiritus compressionē, retinere queant & impedire tussim, sed sanare etiam sæpius, per respirationis inhibi tionē frige factas particulas calefacēdo. Signum au tē ob solam intemperiem frigidā tussientium est, si per crebras inspirationes iritentur, frigiditate uide licet exinde intensiore facta & aucta. Quādo igitur hi leniter inspirant ac aērē adtrahunt, & in calida do mo uersantur, parū uel omnino nihil tussunt. Quæ uero cum titillatione partium, ab utraq; palati par te contingunt tussis, palam ostendunt defluxum à capite ad asperam arteriam deferri, itemq; ad pul monem. quod si nihil expuant sic adfecti, tenuē esse defluxum indicat, qui expulsionē spiritus dissectus, præ tenuitate sua rursus fluxum reflectit, id uero ex

humore per sputū reiecto manifestè apparet: crassio rē enim priore habet compagem, etiā si sit à spiritus impulsione reiectum. Manifestum autē est, quod hu mor in pulmone & thorace deſentus, in morbo late rali, inflammatione pulmonis, & iabe, maxima tussis causa existit. Medemur autē tussi à tenui defluxu fa ctæ, per antidotum ex papaueris capitibus inspissan tes, aut per alterius cuiusdā pharmaci dolorem leuā tis usum, & per cibos boni succi. Si uero crassus aut uiscosus fuerit affligēs humor, per ea quæ extenuāt & discindunt medebimur. Instrumentorū autem re spirandi frigiditatem per caleſcentia emendamus. Quæ uero ab asperitate fit, per lenientia & mordaci tatē arcentia sanatur, qualia sunt ex arteriacis cōposi tionibus simpliciora. His itaq; præexplicatis, ea quæ à ueteribus descripta sunt ad tussim remedia subne stemus. Nos uero ad præscriptā methodum animū conuertentes, atq; uniuscuiusq; simplicium pharma corum uires docti, facile ad quamcunq; affectionem cōueniētia remedia afferemus, etiā si à priſcis indefi nite sint descripta. Remedia autē hæc sunt. Styraç, nucis auellanæ magnitudine deuoratus, tussis sedat ac destillationes. Utilis est etiam ad raucedinem.

Aliud. Ficus siccas pingues in uino dulci meraco madefactas, unā cū uino deuorādas exhibe, hoc tussis mitigat. Terebinthinā & mel coctum delingēda præbe, & uinū dulce dilutū insuper absorbendū: hoc enim attenuat, & educit. Aliud. Filicē cōtusam & & cribratā passo instar polētæ insperge, & absorbēdā exhibe. Prodest etiam sanguinem reiectantibus.

Aliud, quod ad tussis noctu molestiā exhibentes cōducit. Mētæ ramulos tres tritos, affuso aceti co chleari, ante somnū absorbēdos præbe. Adiuuat cō coctionē, stomacho utile est, & crassitiem discindit.

Aliud. Nucū pinearum torrefactarum, amyli, radicis dulcis, seminis urticæ, seminis lini, culusque sextantem, iridis, piperis, hyssopi, seminis nasturtij, amygdalarū amararum, singulorū unciam unā. Ex cipe melle probè despumato, & præbe ex eo cochlea rium mediocriter. Compositio ex marrubio ad tussim. Marrubij sextantem, hyssopi uncia i. iridis drac. iiii. pulegij drac. iiii. calaminthæ montanæ drach. iiii. bulborum scillæ scrup. vi. nucem unam pineā bonam & integrā, caricas pingues v. aquæ sextariū unum & dimidiū, mellis heminā unā, utere. Ecde gma tussientibus aptum. Nucum pinearū repurga tarū drach. xii. palmarū pinguis dra. xviii. iridis dra. xii. seminis lini torrefacti drac. viii. tragacanthi drach. xii. amygdalarum dulcium delibratarum drac. xvi. mellis despumati quantum sufficit. Traga canthum in uino dulci modico maceratam & dilu tam, primum cum despumato melle decoquito, atq; ubi semel ebullierit, reliquis in mortario probè con tritis affundito, & utitor, cochleariū exhibens mane & uespere de digito delingendum. Mellis enim tan tum adijcere oportet, ut delingibile pharmacū fiat.

Aliud eclegma ad tussis recentes. Vini dulcis ueteris sextariū unum, mellis Attici libram unam, decoque, cum rutæ ramulis assidue agitando, exhibe ex eo mystri i. mensura. Est etiam utile stomac cho. Alia remedia ad tussim cōducuntia. Copra rium, hoc est, placentula, tussi accomodata. Semi nis lini cōtusi & cribrati, uux passæ pinguis & exa cinatæ, cuiusque sextariū Italicum unum, nucum pinea

pinearum torrefactarum, nucum auellanarum repurgatarum, singulorum sextarium dimidium, piperis sextantem, myrrhæ unciā unā, croci unciā unā, mellis sextarios quatuor. Semen lini contusum cum melle decoquito, atque ubi coactum fuerit & inspissatum, reliqua optimè contrita ammisce to, & simul unito. Exhibe ex eo magnitudine nucis auellanz. Ad tussim inueteratam remedium optimum. Cumini, piperis, seminis urticæ, cuiusq; unc. i. mellis despumati sextarium i. contrita cum melle subigito, ac parumper seruefacito, reponito, ac uti- tor ex eo præbens cochleariū delingendū. Aliud admirabile. Piperis, pulegij, hyssopi, calaminthæ, cuiusque sextantem, petroselinū unc. i. mellis despumati sextarium i. da cochlearium. Aliud simplicius bonum. Mellis quadrantem, butyri recentis quadrā tem, cumini quā tenuissimè triti drach. iiii. Mellis prius despumato butyrum ammisce, & simul calefa- ctis cuminum insperge, & paulatim delingendum cochlearium unum exhibe. Aliud, ad tusses pitui- tæ repurgans. Hyssopi unc. i. pulegij sextantem, iri- dis, sinapis, seminis nasturtij, anisi, piperis, singulo- rum un. i. tusa ac cribrata, melle despumato suffiden- ti excipe, & cochlearium exhibe. Hyemis autem tē- pore, & febre non infestante accepturum, piperis se- xtantem adijce, & pro aniso, foeniculum aut cumi- num, & pro nasturtio sinapi, ut sit sinapis sextans si- ue unciæ duæ. Aliud, ad diuturnas tusses. Comæ hyssopi, pulegij, de superiore anno, ammi, piperis, erui rufi decocti, iridis cuiusque sexuncem, spicæ nardi drac. iiii. terebinthinæ trilentē, butyri recentis sextantem, mellis despumati sextarios ii. Butyrum & terebinthinā cū melle liquefacto, ac reliquis uni- to: utere exhibitio cochleari paruo. Aliud, thoracis affectionibus cōmodum. Lomentū fabaci fricti ac tenuissimè triti septuncē, seminis lini septuncem, iri- dis contritæ quadrantē, nucū pinearū torrefactarū dra. ii. pulegij triti dra. ii. seminis urticæ dra. i. pipe- ris dra. iiii. mellis despumati choenice m i. Mellis des- pumato lomentū insperge, ac parūper decoque: de- inde reliquis in mortario ammixtis utere. Aliud, Acholij. Hyssopi, pulegij, ammi, piperis, erui rufi, iridis, cuiusq; dra. vi. terebinthinæ drach. iiii. spicæ nardi dra. iiii. butyri recentis sextantem, mellis des- pumati sesquilibrā, utere. Aliud, ad tussim ex sty- race. Amomi sextantē, cassiæ sextantē, styracis sesquū- ciā, spicæ nardi sesquunciā, croci unc. i. piperis unc. i. mellis despumati sextarium i. exhibe cochlearium.

Ad tussim sicā. Siccam tussim sanant etiā paulo antè præscripta pharmaca. Aliquādo autē & aquæ seruefactæ sorbitio. Qui enim ob pituitæ crassitudi- nē nihil educere possunt, ab humectantibus plus emo- lumentū sentiunt: maximè eo quod quodammodo simul extenuatoria participant facultate.

De pharmacis dolorem leuantibus & simul con-
ferentibus tussi. Cap. lv.

Hocce pharmacorum dolorem leuantū genus, hi qui ante ætatem nostrā fuerunt, cōposuerunt, tussicibus & sanguinē reiectantibus præcipuè conducens, atq; etiā his, qui ultra has affectiones tabescūt: itemq; ad alios dolores & affectiones quæcunq; circa pulmo- nē & pectus, ac asperā arteriam, reliquaq; interiora mēbra cōsistunt, præterquā quæ propriè colicæ appel- lantur. Differunt enim hæc à colicis similiter anody-

nis, hoc est, dolorem leuantibus appellatis, tū aroma- tū & odoratorū seminū, tū eorū quæ urinā cient ad mixtione. Colicæ autē facultates ac cōpositiones his uehementiores sunt, excellentē uim stupefactoriam complexæ, ob multitudinem uidelicet eorum quæ refrigerands naturæ existunt, uelut est hyoscyami se- men, & cicuta, papaueris succus, & mādragoræ cor- tex: quibus sanè ad colicos necessariò ob doloris ma- gnitudinē utimur. Atqui in thoracis affectionibus aliqui styracem & crocum ammiscuerunt: aliqui au- tem calefacientia: alij etiam aromatica, & cum pau- ca ul adstrictoria exiccantia: quidam etiam nobis fa- miliaria, uelut anisum, apium, foeniculum, daucū, & fesei, quæ uehementū pharmacorum uires & inlu- cunditatem obtundunt, ampliusq; urinā expellunt: quidā etiam ea quæ asperitates leniunt addidere, ue- lut est tragacanthus & radix dulcis, ac uinum dulce. Quæcunq; autē ex eis de pharmacis stuporem indu- centibus, minus participant: ea etiam tabidis exhibe- mus. Sunt autem à ueteribus cōposita doloris leua- menta huiusmodi. Catapotium. Pharmacum ad tussim accomodatū, inueterata maximè existēte affectione. Efficax est ad diuturnam destillationem, dolorē capitis difficulter spirantes, & inflammationes pulmonis, ad uesciæ quocq; ac uulue affectiones, inscri- bitur Panacea, ab alijs etiā Stichus. Myrrhæ, opij, piperis, styracis, castorei, galbani, æquales partes cū sapa dulci subige, & in catapotij figuram redige, ac ciceris magnitudine exhibe: absorbeat autem à sum- ptione aquæ mulsæ cyathos duos. Harmonia.

Aliud pharmacū uehemēter efficax quod harmoniæ adpellatione inscribitur: ualet ad destillationes, & in- exuperabilē defluxū. Styracis, castorei, piperis, car- damomi, cuiusq; drac. iii. opij, myrrhæ, seminis hyo- scyami albi, cuiusq; dra. iiii. passo probe cocto exci- pe, & catapotia ciceris magnitudine informa, & an- te somnū præbe deuorāda. Alia confectio, ad tusses diuturnas egregiè & cōtinuè ualēs: itemq; ad humē- tes & ob humoris crassitudinem diu durantes, quæ Symphonos adpellatur, & febrē optimè sedat. Ea omnes ueteres celebres usi sunt. Piperis, opij, carda- momi, cuiusq; drac. i. croci, sulphuris uiui, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, cuiusq; drac. iiii. mellis co- cti cochlearia iiii. Hoc enim modo nos apparamus: uerū sunt qui gentianæ, & dauci, cuiusq; drac. ii. am- miscēt. Alia, ad tussim & tabē Isothymos appel- lata. Folij, petroselinū, hyssopi, rosarū siccarū, anisi, opij, croci, costi, seminis hyoscyami, myrrhæ troglo- dyticæ, spicæ nardi, iridis, æquales partes cū melle suf- ficienti subige, datur fabæ magnitudine ad noctem:

Alia, isotheos adpellata, ad tussim, tabem, omnes morbos internos, & certo circuitu affligētes affectio- nes. Spicæ nardi dra. ii. myrrhæ dra. i. croci, costi, pi- peris albi, cuiusq; dra. i. galbani dra. i. secis opobalsa- mi, cinnamomi, mandragoræ succi sicci, castorei, cu- iusq; dra. ii. seminis dauci sesquidra, cassiæ sesquidra. mellis despumati quātū satis erit. Facit ad dolorē sto- machi, iecoris, pulmonis, oculorū, sanguinis reiecta- tionē, abscessus dysentericos, uolulū, renū ac coxen- dicū affectiones, difficulter spirantes, dolores laterū, unice tamē iliorū ac præcordiorū, profluuiū mulie- bre, & muliebres suffocationes. Prodest cōtra letalia uenena ante & post cibū sumpta, & ad omnē sangui- nis eruptionē cū frigida, ad uiperæ & phalagij mor-
fuit in

sus in uini cyathis III. quartanarijs ante febris accessione datur ex ea oboli II. cū uini cyathis II. sed pro loco tamen antea ægro. Sanat ægre spirantes, & qui nisi erecti spiritum ducere nō possunt, & anhelosos, etiam si iam ad multos annos affectio durauit. Sanat quoque antiquas à capite ad pectus defluxiones.

De suffitionibus. Cap. LVII.

Quamquam antea sufficientissimè de suffitionibus dictum sit, in Sermonè De clysteribus & euacuantibus, ac alijs quæ ægris offeruntur, qui sanè tertius huius operis fuit, dicetur tamē nūc quoque, sed paucis. Pastillus suffumigabilis tussientibus & orthopnoicis commodus. Abrotoni, sandarachæ, sinapis, cardamomi, æquales partes cōtundito & cribrato, & cū aqua in pastillos redigito ac suffito, ita ut æger ore fumum suscipiat. Alius pastillus. Sandarachæ sextantē, terebinthinæ sextantem, costi scrupulos sex, folij scrupulos VI. mastiches scrup. VI. laferis scrupulos III. piperis grana XL. redige in pastillos ac utere eodē modo. Alius. Castorei, sandarachæ, galbani, sulphuris uiui, colophonij, propolis, terebinthinæ, mastiches, croci, chamæleuces æquales portiones, cū aqua in collyria redige, & ipsa per infundibulum suffito. Si uero non adsit chamæleuce, his conyzam parua aut capparidis corticem adijce. Aliud bonum suffumigium, per experientia à nobis inuentum, quatuor speciebus constans. Styraeis, terebinthinæ, sandarachæ, mastiches, æquales partes excipe, ac similiter utere. Creditur anhelosos & purulentos sanare: itemque tussim & laterum affectiones, quemadmodum etiam ea quæ paulo antè hic sunt præscripta, atque ea quoque quæ tradidimus in tertio Sermonè. Epithema ad tussim optimū, ex fertula campana. Sapsuci, fertulæ campanæ, prasin, iridis, cuiusque sextantem, myrrhæ unc. I. thuris quadrantem, resinæ pinus lib. I. olei irini lib. I. utere.

De orthopnoicis, anhelosis, ac ægre spiritū ducentibus. Ex Galeno. Cap. LVIII.

Qui frequenter respirant citra febrem, quemadmodū solent à uehementi cursu fatigati, eos asthmaticos, hoc est, anhelosos, Medici uocare consueuerunt, ab accidente uidelicet, hoc est, anhelando: eosdem etiam ab altero accidente orthopnoicos adpellant: desident enim ac pectus erectum habere uidetur, ob timorē, ne suffocentur, & stratum quoque iuxta superiores partes, ad quas pectus ipsum reclinatur, erectius sibi adparant, ne dormientes strangulentur. Inspiratio enim minor ipsis contingit, quam respirationis frequentia ex postulat, quamuis pectus plurimū ipsis diducatur. Ex quo manifestū fit, coarctationē locorū præter naturā intrinsecus adesse, cuius etiā manifestè ægri sensum perceptant. Fit autē coarctatio locorū inspirationis, quum aut crassorum & tenaciū humorū multitudo pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor quispia abscessui similis in ipso consistat. Similiter autem difficulter spirant, qui asperā arteriā à multa destillatione habet repletā, aut quadam defluxione ex ulcinis locis acruatim in ipsas arterias delabere. Distinguuntur autē inter se hæ affectiones: nepe quod destillatio etiā sanis ex manifesta causa repente accidit, in totum ferè citra febrem concomitantibus etiam proprijs destillationis signis. Si uero tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessariò febris consequitur, neque ita diu post, inflammatione

in pus trāsmutata, pus reijcitur cum tussis. Si autem crudum tuberculum gignatur, uelut Andipatro Medico contigit, iuxta leues pulmonis arterias, hi neque grauitatē magnam sentiunt, neque ab orthopnoea in tantum infestantur. Qui uero propriè orthopnoici & difficulter spirantes adpellantur, in totum febrem non habent: grauitatis autē sensus eis contingit, neque quippiā purulentū per spurū reiectant. Porro curatio prædictarū affectionum quiddā cōmune habet, quiddā etiam cuique proprium. Cōmune quidem ut superflua substantia humoris has affectiones generatis consumatur, & expēdatur. Proprium uero, ut si à crassis & tenacibus humoribus fiant, per extenuantia & incisua pharmaca cōsumptio fiat: si uero à tumoribus abscessui similibus affectiones fiant, per extenuantia & desiccantia consumantur: quæ curatio omnibus in profundo corporis abscessibus cōmunis existit. Vini autem potio ambabus conuenit, tenuis saltē temperaturæ, in uniuersum aut paucus potus conuenit, quibus abscessus alicubi adest, multus uero, quibus brōchia tenacibus & crassis humoribus sunt obstructa. Etenim repurgantia hos humores pharmaca necessariò tusses commouent, uerum non facile per sputum reijcitur ob crassitudinē id quod repurgatum est: humectatione igitur multa indiget, quo facilius efferatur: & ob id sanè largior potus anhelosis est exhibendus. Pharmaca uero eis conueniūt incidentia citra uehementem calefactionem. Crassi enim & tenaces humores à uehementi calore uiscosiores redduntur, glutinosi, & ut difficulter auelli possint: quapropter maximè prodest eis acetum scillinum, & ipsa quoque scilla assa cum melle trita & delincta, & acetum mulsum ex ea adparatum. Maximum autem remedium inquit Archigenes, purgatio frequentior existit per pharmaca fortiora: & uomitus à radicibus, per interualla suscepti. Cataplasmata uero ex ficibus & ordeacea farina: magis uero ex loliacea habente resinā & mel ac cerā ammixta, infarciri potest etiam ei iris & manna. Malagma ta autem conueniunt, quæcunque exulcerāt cutem & attrahunt saniem, quale est Cissophontis, & quod constat ex baccis lauri, & quod ex semine rosmarini constat, & emplastrum ex herbis, & quod scesiū adpellatur, itemque quod uocatur Thraseæ. Quod uero cyziceniū emplastrum dicitur, si irini cerati æqualem sibi portionem assumat, & uniuerso pectori imponatur, humiditates cōsumit, & habitum corroborat. Omnium autē conuenientissimum huic affectioni hocce est, inquit Archigenes. Emplastrum nigrum Archigenis. Ceræ lib. I. resinæ pinus sicce lib. I. iridis sesquilibram, bituminis lib. I. picis lib. I. æruginis unc. I. myrrhæ sexuncē, thuris sexuncē, radicis cucumeris syluestris, centaureæ, lapidis asij, styracis, cuiusque sextantem, misyos crudi sesquiunciam, chalcidis crudæ sesquiunciam, salis ammoniaci unc. I. galbani, terræ cimoliæ, terræ ampelidis, cuiusque unc. I. olei lib. II. aceti lib. I. aut ut ego soleo lib. II. styracem cū modico oleo liquefactū in mortario pbe cōtere, metallica uero cū aceto dissolue, herbas autē cōtunde, & cribro excute, liquefactis uero quæ eliquari possunt, & percolatis, ac ab igne ablatis, cōtrita adijce, atque herbas insperge, omnibus autē simul unitis & emolitis utere. Hoc sanè multos occultos abscessus discutit, & in uaporē resoluit, alios autē aperit: quicunque

autem

autē ita rupti sunt, & fluidi tamen adhuc permanēt, eos mirabiliter exiccat: eiusmodi enim pharmacis uix aliud præstantius reperiri possit. Cōueniens est etiā prædictis affectionibus Amythaonis epithema, atq; eo adhuc magis Polyarchion, maximē tempore coarctationis locorū. Pectus uero cū urticis cōfricetur accēdatur, ac scilla decorata fricetur, dein de lauacro ac oleo calido loci rubefacti curētur: alsi duē autē lenioribus solutius aluum emollire oportet, quale est, enici acetabula duo optimē contusa, & cum sero lactis decocta, ita ut percolatum serum, & modico melle permixtum bibatur. utendum est etiā ex thymo, lasere, & pipere salis confectionibus, quibus addita est scammonia, aut etiā his quæ fiunt ex rosmarino. Ego uero etiā herbarū sabine optimum usum expertus sum, si per seipsam drach. pondere trita sumatur, & sequenti die duarum drachmarū pondere, tertia triū. In aliquibus autē & quarta die usq; ad quartā drachmā pondus auxi. Quod si bene procedat purgatio, simulq; cruenta educat, non est quem nō melius spirātem in posterū reddat. Porro interiectis duobus aut tribus diebus, absinthium potandū exhibui, maximē si stomacho æger langueat, quod si non contingat stomachum languescere, irim bibēdā dedi, aut abrotonū, aut castorium ex aceto mulso. Mirum in modum autem efficax est, quod ex elaterio cōstat, & octaobolon appellatur. Elaterij æreolos II, spumæ nitri obolos III, sinapis drach. I. hæc in aqua diluta in octo carapotia informo: manēq; duo, tantundemq; uesperī exhibeo. Purgat enim citra molestiā supernē, aliquandiu quidem permanēs & soluens. His uero qui robustiores sunt, post triū dierū spatiū rursus exhibeo. Atqui quæ ex colocynthide cōstat hiera nostra, hoc est, Archigenis, assidue præbita mihiorem spirandi difficultatē correxit sæpissimē, atq; id breuē & perfectē. Verū si magis in profundo hæserit, auxiliatur cum aceto mulso scillitico potata. Aliud ad difficulter spirantes, qui etiā asthmatici appellantur, Aristolochiæ clematidis, abrotoni, sulphuris uiui, seminis rutæ agrestis, cacuminū thymi, ammoniaci thymiamatis, æquales partes cum aceto tritas in pastillos redige, & ex eis obolos III, exhibe cum aceto mulso ad triduū. Alia remedia asthmaticis commoda, ex Asclepiade & Dioscoride. Aristolochia rotunda cū aqua bibita, anhelosis auxiliatur: itē centaureæ maioris radix, & minoris succus: & stoechas trita ac cum aqua potata, & sphōdylī semen, & calaminthæ montanæ coma, & hyssopū, & iris, ac melanthiū, & radícula & uitis alba, itē asellos, qui & millepedæ appellātur, sub aqua rīo uase stabulātes, sextarij mensura in fictile uas cōlectos, ad carbonēs ignitos torrefacto, atq; ubi inaluerint, terito, ac melle exceptos cocto, ante & post cibum duorum cochleariorū mensura delingendos exhibeto. Aliud. Scillæ crudæ succū exprime, & cum eiusdem mēsuræ melle permixtū ad prunas decoque, eiusq; cochlearia duo delingenda præbe ante & post cibum. Summē autem hoc prodest, cuius densq; elus rei periculum feci, inquit Archigenes. Aliud, Archigenis. Radicis centaureæ maioris drachmas VI, petroselinī drach. VI, ammoniaci thymiamatis drach. III, sulphuris uiui, bituminis, cardamomi, radicis panacis, seminis urticæ, iridis Illyriacæ, cuiusque drachm. II, thuris, myrrhæ, castorei, ni-

tri, sagapeni, abrotoni, polij, chamæpityos, saluie, cuiusq; drachm. I, piperis albi drac. III. Hæc omnia trita cum melle miscentur despumato, dantur ex hoc oboli III. Etenim assidue potatum hoc, quibusdam perfectē medetur, citra molestiā autē efficax existit, dato hoc cum hydromelitis calidi cyathis III.

Aliud, quo etiā ego uitor, ad multos usus cōmodū. Scillam fuluam manum magnitudine sua implētem, fermento obductam, in furnum cōficio, ut quā optime assetur, deinde ubi mollissima facta fuerit, superficiei eius exusta reiecta, reliquū optimē contero, atq; ei quantum trimembri sectione facta, duæ assatæ scillæ partes ponderant, tantum farinæ erui albi adijcio, & ammoniaci thymiamatis drach. III, radicis panacis drac. III, iridis, & abrotoni, & acori, cuiusq; drac. II, piperis grana XX. hæc omnia si mul trita & unita in orbiculos digero pondere sesquibolares; ex eis autem drach. I, aut etiā obolos tres, aut duos, cum tribus cyathis lactis asinini recēs multū, aut aquæ mulsæ exhibeo. Pueris uero tantū unum orbiculum præbeo. Aluum hęc mensura mouet: quod si hac amplius quiddam exhibeas, & urinā des, & cōpactā ac instantē mali irritationē dissolues: etenim & comitiales sanat, & uulū stragularā, & lumborū languidos dolores, & febres debiles ac per circuitum repetentes. Cū aceto menses ducit per crassitudinem suppressos, ad quos cōsequuntur uerigines, interceptiones uocis, contractiones, dolores articulorū, pigrities, & spirandi difficultas. Euestigio enim sanguinem euellit, & ab omnibus molestiis liberat: quare tenuitatem huius pharmaci ne contempnas, sed abundantem uirium eius supellectilem, quasi per manus a maioribus traditam assumes. Alia potio ad suspiriosos. Polij, abrotoni, castorei, chamæpityos, ammoniaci thymiamatis, æquales partes melle excipe, & fabæ magnitudine exhibe. Quidam spumæ nitri albi cochleare, in aquæ mulsæ cyathis tribus exhibuerūt. Aut hoc modo. Spumæ nitri drach. IX, piperis drach. I, laseris drachmam unā, da cochleare cum aqua calida. Alia. Castorei drac. VII, ammoniaci thymiamatis dra. VIII, piperis grana XL, excipe passo, & fabæ magnitudine præbe in aqua mulsæ. Alia. Abrotoni drac. II, radicis bryoniæ drach. VIII, rutæ hortensis dra. VIII, castorei drachmas quatuor, artemisiæ drachmas III, epithymi drac. III, datur ex ea scrupulus unus & dimidiū cū aceti mulsi cyatho I. Alia. Iridis drach. VIII, ammoniaci thymiamatis drachmas III, datur drach. I, cū hydromelitis cyathis tribus. Alia. Herbarū sabinae, his qui integra ætate consistunt, scrup. VI, alijs uero scrup. III, buryri scrupulos XII, mellis sextatē, Præbe delingēdam ad dies VII, & intermissione per triduum facta rursus præbe. Pastillus doloris leuamentū orthopnoicis & ægrē spirantibus præbens. Opij drac. I, sulphuris uiui, plātaginis, seminis hyoscyami, succi radicis dulcis, styracis, myrrhæ, thuris, terebinthinæ, cuiusq; drac. II, croci drachm. I, cum uino maris experte contere, ac in pastillos triū scrupulorum digere, quos bibendos exhibe. Porro si radicis dulcis succus non adsit, ipsam radicem fractam ac tusam satis diu decoquito, atq; hoc totū cum decocto eius committito. Alius, Andromachi, ad idem. Scillæ assatæ, sulphuris uiui, bituminis, æquales partes, melanthij drachmas II, castorei drach.

drach. ii. anisi obol. iiii. cum aqua pastillos informa trium aut quatuor scrupulorum: exhibe ante somnum, cum aquae calidae cyathis duobus. Catapotium, suspiriosis dolorem leuans, Rutae uiridis sextantem, styracis sextantem, terebinthinæ sextantem, opij drach. iiii. ex his catapotia siliquæ pondere singula informa, tria quoque ante somnum exhibe deuoranda, à sumptione autem ebibant aquae calidae cyathos duos. Remedium pulchrum Philagræ, ad anhelosos. Radicum symphyti in petris nascentis, radice centaureæ maioris, iridis illyricæ, singulorum sextantem, aquae sextariū i. radices fractas per biduum in aqua macerato, deinde ad tertias decoquito, & percolato, & tantundem mellis decocto adijcto, rursum quoque donec cogatur decoquito: deinde rheum pontici contusi ac cribrati unc. i. inspergito ac uncto. Exhibe circa primam horam diei cochlearia duo. Quod si non adsit rheum, centaureæ maioris radicem contusam & cribratam unciae pondere iniice, aut eodem modo radicem symphyti. Hocce pharmacum pulmonis & thoracis firmitatem & robur præbet, simul quoque humores ad eum delatos repurgat, desiccatur, & expellit. Aliud, ad orthopnoicos. Boli armeniacæ drach. i. cum uino diluto bibendam præbe. Ad tussis autem inde sequentes antidotum, Isotheum appellatam, paulo ante inter tussis remedia descriptam, exhibe ante somnum nucis auellanae magnitudine cum aqua mulsa. Assiduus enim huius antidoti usus in totum ab hac affectione liberat, etiam si fuerit inueterata: confidenter itaque ea utaris. Quod si non adsit, pæoniae antidotum præbe: quæ ipsa quoque si haberi non possit, eam quæ zopyrios appellatur, quarum descriptiones in Sermone De colicis habentur. Suffusiones etiam eis sunt commodissimæ: de his in tertio Sermone plenissime dictum est, & paulo ante inter remedia tussis. In earum autem usu undique stragulis contegantur, atque ore sedulo hiantes fumum fortiter admittant: mucus enim & lacrymæ multæ sputum quoque uberim ducuntur, & per uehementem tussim pituita uel scosa ex profundo effertur. Verum quod latere tenolim, antequam ad eiusmodi rerum ac landinationum adhibitionem perueniatur, uentre subducere oportet, uel per clysterem, uel pharmacum solutiuum. Profunt etiam suspiriosis fricationes pectoris, ex pumice cum nitro, fece uini uista, cum flore lund odorati. Cuius generis & hoc est. Auripigment, pumicis, spumæ nitri, cuiusque unc. i. alcyonij sextantem, hæc contusa & cribrata cum unguento aliquo caloris commisceto, pectus quoque & dorsum donec ignescant confricato. ex frequenti enim huiusmodi perfrictionis adhibitione spirandi difficultatem & tussim, omnem quoque purulentam pectoris affectionem propulsabis. Ceterum inueterato malo, & medicina omni frustra adhibita, ad unctionem confugiendum erit: itaque iuxta medium commissuræ clauicularum, utrinque una crusta inuratur, cum cautione tamen ad motus manibus & distenta cute, ne aspera arteria oblaedatur. Deinde alie duæ paruæ iuxta carotidas colli arterias infligende paululum sub mento utrinque una, incumbentis cutis tantum perustione facta. Infligendæ autem adhuc alie duæ sub mammillas, inter tertiam ac quartam costam: rursum quoque alie duæ retrorsum uersus inter quintam ac sextam costas. In medio etiam pectore unam inurere oportet: & iuxta principium ossis pe-

ctoris (quod à capitis gladii similitudine xiphoides Græcis appellatur) supra os ipsius uentris, unam similimodo. Et adhuc alias duas inter octauam & nonam costam utrinque unam. Tres etiam retro inurendæ sunt crustæ, una iuxta medium dorsum, reliquæ duæ ab utraque uerterbarum parte, paululum infra mediam crustam. Omnes autem infra collum inustas, mediocriter latas esse conuenit, neque ualde in superficiem consistentes, neque rursus nimium profundas. Vlcera autem crustarum satis multo tempore fluida permittere oportet.

De cordis tremoribus, Ex Galeno. Cap. LVIII. Cordis tremor siue palpitatio, multis tum adulescentibus, tum senibus inculpate sanis accidisse uisus est. Doleat autem caput ita affecti, citra aliquam alteram externam causam: atque omnes hi ex uenæ incisione opem ferunt: aliqui etiam ex eis in totum ab hac accessione sunt liberati per extenuatoriam dietam & pharmaca consimilia, post uenæ incisionem adhibita. Noui autem & ego quendam, qui singulis annis, ueris tempore, tremoris accessione afficiebatur. Hunc ubi expertus essem per triennium ex uenæ sectione luuari: in quarto per uenæ sectionem euasit, antequam hoc malo apprehenderetur: atque hoc modo pluribus deinceps is agebat annis, consentanea simul utens dieta: ueruntamen & is quoque ante senectutem factus functus est, quemadmodum alij omnes. Aliqui quidem in febribus acutis comprehensim animo destituti, similiter mortui sunt: aliqui uero etiam citra animi deliquium, stuporis attoniti modo affecti, repente ultimam cum morte commutarunt. Plures autem hac affectione laborantes ad ætatem peruenerunt, minorem quidem annis quinquaginta, quadragesimum tamen ætatis annum exceperunt.

De sanguinis reiectione, ex Galeno. Cap. LIX. Sanguis qui ex pectore & pulmone, aut aspera arteria educitur, omnino cum tussi reijcitur. Si uero ex locis circa fauces, aut gurgulionem sanguis feratur, per excreationes excernitur. Si uero ex aliquo loco oris aut gingiuarum, simpliciter expulitur. Aliquando autem à capite aut partibus gurguliosis delatus sanguis, ad asperæ arteriæ extremum incidit, & tussim commouet, imaginationem quoque facit uelut ex pectore educatur. Itaque si quis pluribus ex ordine diebus sanguinem excreet & emungat, neque capitis dolore, aut grauitate aliqua quæ etiamnum adsit, antegressis, neque plaga istic illata: considerare oportet diligenter omnem narum meatum, atque etiam oris locum illum ubi nares ad palatum sunt perforatæ. Contingit enim aliquando hæc accessio, hircudine ad locum hunc affixa. Ceterum aliqui per uomitum citra tussim sanguinem ex uentre reieciunt, aut ex uenis adiacentibus in ipsum delatum, aut hircudine deuorata. Verum sanguis uenarum ex hepate aut splene in uentre delatus grumulosus est, niger quoque euomitur: qui uero ex hircudinis præsentia procedit, tenuis est, & saniosus siue ex uentre, siue ex naribus, siue ex stomacho profertur. Atqui & localis dolor qui comitatur, affectam particulam ostendit. Si enim ex stomachoeductio fiet, non magna sanguinis eruptio continget: graciles enim sunt stomachi uenæ. Sed & cum nausea ac uomitu sanguis effertur, et in deglutiendo mordacitas percipitur, maxime si adstringentia, aut acris deglutiantur: si uero ex uentre educatur, nauseae plurimæ

mæ comitantur & uomitus, & si à cibo sumpto e-
ductio cōtingat, sanguis cibus permixtus efferetur.
aliquādo etiā pituita ac bilis simul euomētur. Si ue-
ro ex hepate & splene sanguis in uentrē deferatur,
aderit tumor. Si uero ex pectore & pulmone, aut
aspera arteria sanguis expuatur, impossibile est eum
citra tussim per sputum reijci. Fit autem sanguinis
eductio ex pectore, aut ob uenæ rupturam, aut oris
uenarum apertionem, aut ob corrosionem. Venarū
itaq; pulmonis rupturæ cognoscuntur ex eo, quod
post aliquam præcedentē causam manifestā, statim
sanguinis eductio consequitur. Præcedentem autem
causam dico, delapsionē ex alto, aut si grauius ali-
quod corpus pectori inciderit. Aliquibus autē ob
clamorem magnum, quomocūq; editū uasis ue-
narum ruptura accidit: & citra manifestam externā
causam copia sanguinis cum crudo ac flatuoso spiri-
tu, distendens pulmonis uasa, rupturam efficit. Cæ-
terum ob sanguinis multitudinem factæ rupturæ co-
gnitionē exhibet sanguinis effusio repente & coa-
ceruatim facta. Magna enim pulmonis uasa existūt,
ac arteriarum speciem habentia: sanguis aut in eis te-
nuis & calidus est, perq; saltum spiritus ui ac impe-
tu excernitur. De uenarum apertione. Venarū
autem ora aperiuntur, si quidem dispositiones præ-
cesserint calidæ: ueluti si calidis balneis plurimis
usus sit homo, habitetq; in calida regione, consimili
existente maxime anni tēpore, cibus quoq; et portio-
nibus calidis utatur. Etenim multitudo sanguinis ca-
lida existens, uenarum pulmonis incubentiu ora ape-
rit & dilatat, atq; hoc modo coaceruata effusio con-
tingit. De uenarum corrosione. Quibus uero ex
corrosione uenarū pulmonis sanguinis euacuatio
contingit, his per intervalla modica sigillatim cum
tussi expulsi. Ipsa autem uasorum corrosio ex acri-
bus contingit humoribus, siue à capite in pulmonē
delabentibus, seu in ipso pulmone generatis. Possi-
bile est etiam propter corrosionem, coaceruatā san-
guinis eductionem cum tussi fieri. Quum enim præ-
cedenti tempore per modica intervalla sigillatim,
ut dictum est, & cum tussi sanguinē expuerit quis-
piam: & post sequentibus dieb. neq; casus, neq; alia
quædā externa uiolenta causa acciderit, & tamē san-
guinis eruptio multa prodierit, magnā corrosionē
factam esse ostendit. Multi autem hoc modo affecti
particulas pulmonis simul cum sanguine extulerūt,
aut rectoria ulceribus obducta. Impossibile itaque
est latere eductionē propter corrosionem uenarum
factam. Quare diligentem animaduersionē habere
conuenit, nūmne spumofus sit sanguis: nam & hoc
firmissimum signum eductionis ex pulmone exis-
tit: deinde nūmne bronchij particula quædam, aut
tuniculæ arteriæ seu uenæ simul efferatur. Horū em̄
nihil apparet in his, qui ex succingente thoracē mē-
brana sanguinem spuēdo educūt. Maximum etiam
signū elationis ex pulmone est, si omnino citra do-
lorem efferatur. De eductione sanguinis ex alijs pec-
toris partibus. Sanguis autem qui ex alijs pec-
toris partibus educitur, nigrior est, & iam in grumos
coactus, cum tussi etiam & dolore reijcitur particu-
læ affectæ, ac foetidum odorē de se præbet: aliquan-
do & pure ammixto efferatur. Verū hoc signum cō-
mune est. Si uero iuxta asperā arteriā ulceratio fiat,
paucissimus sanguis expulsi, paucissimo omnino

pure permixtus, doloris autem sensum iuxta exul-
ceratam arteriæ partem æger percepat. De sangui-
nis à capite eductione. Si uero à capite sanguis de-
feratur, si quidē plurimus sit, plurima adest capitis
grauitas aut dolor: si paucus, pauca. aurium sonitus
iuxta proportionem affectionis, rubor faciei: uenæ
frontis emicant, & uertigines accedunt. causa autem
ista præcedens manifesta est, nimirum plaga, aut fri-
giditas, aut calor, aut ebrietas. Vinī enim potatio
larga cumulatim caput replet, & cumulatim etiam
ex rupto uenæ uase effundit. In parua autē ebrietate
modicum adest sanguinis sputum, & consueta fieri
per nares sanguinis excreatio cohibetur: aliquādo et-
iam ad palatum conuersa, imaginationem exhibet,
ueluti ex pectore sanguis ipse educatur. Si itaq; à ca-
pite sanguis deferatur, titillatio palati accidit, & fre-
quēs excreatio, atq; hoc modo expuunt: iritantur eo-
nim ad tussim, & tamē non ualde tussunt. Si autē à
palato ad asperā arteriā destillat, tum tussunt, & qd̄
delapsum est educunt: & ob id quidā decepti, ex pec-
tore eductionē fieri autumāt. Defluit aut aliquādo
à capite per gulam seu stomachum in uentrem, uo-
mituq; reijcitur, atq; ob id putatur à stomacho pro-
dire. Habet autem & suam figuram sanguis à capite
delapsus. Est em̄ nō adeo crassus, colore nigro, levis,
æqualis, immixtus, altero uidelicet aliquo pure uel
pituita, & cū excreatione statim se in linguā infert
rotundus, facileq; reijcitur per sputum. Si uero pala-
tum consideraueris, densius atq; uelut exulceratum
ipsum inuenies, & ut plurimū sanguinolētū, ppter
destillantē ad ipsum à capite sanguinē. Curatio autē
his qui sanguinē à capite educunt, sufficit simplicior
& exigua. Adstringentia enim per collutiones pala-
to adhibita frigida sufficiunt: nā à calidis & rarefa-
centibus collutionibus plus sanguinis erūpit, qua-
re signum id est adeo à capite prodeuntis eductionis.
Si itaq; à capite feratur, multūq; sit quod defertur,
euacuatione opus erit. Quare citius per nares, aut p
uenæ alicuius incisionē euacuare oportet, ne per ne-
gligentiam consuetudo fiat sanguini in hos locos de-
labendi.

*Curatio eorum qui ob destillationem sanguinem
expuunt. Cap. LX.*

Qui ob destillationē sanguinē expuunt, his uenā inci-
dere oportet statim in principio, acri simul clystere
adhibito & euacuata aluo: deinde confrictis quā-
plurimū manibus, brachijsq; ac cruribus per phar-
macū calefactorium ac ex tenuatorium, extreme eo-
rum partes colligentur, postea uero capiti raso phar-
macum ex stercore syluestrium columbarū im-
pone, & post horarum trium interstitium in balneum
deducto, citraq; capitis cum pinguedine contactū
lauato: post uero capite mediocri pileo cōtecto for-
bitione multa ex solis austeris pomis connutrito:
deinde dormire uolenti, theriacen Andromachi ex
uisperis recens adparatam exhibero. Sequēti autē die
omnibus corporis partibus, capite tātum excepto,
cōfrictis in quiete adseruato, rursusq; in uesperā the-
riacen exhibero. Quod si ex his destillatio sistatur,
tertia die mane mel parum coctū præbeto, quiesce-
req; finito, ac totū corpus defricato. In cibo exhibe
pitisanæ succū, modicūq; panē madefactum. Quarta
autē die mane post acceptum ex uisperis pharmacū,
rursus plurimū mellis præbeto, capiti simul phar-
maco

maco ex stercore columbino imposito. Deinde locis & mediocriter nutritis, quinta die ea quæ humores qui in pulmonem defluerunt, uehementer repurgare queant exhibeto. Post uero per interualla ad caput cerato ex thapsia apparato utaris. Vniuersam autem curationem renutriendo ac refocillando corpori destinatam impendito.

De his qui ob frigiditatem organorum respirationis sanguinem expuunt, ex Galeno. Caput LXI.

Qui uero ob frigiditatem membrorum respirationis rupis pulmonis uenis, sanguinem expuunt, his eue stigio uenæ secare cōuenit, secundaria facta detractio ne eadem die, & postridie similiter, uidelicet ut paulatim euacuationem faciamus, & ut ad contrarium diuersio fiat, quam antrispasim Græci appellat. Eius enim gratia uenæ sectio adhibetur. Deinde fricatione extremarum partium, & ut dictum est, ligatione facta, in uesperam ex seminibus pastillū exhibeto. Sequenti uero die post repetitā sanguinis detractio nem, uniuerso pectori ceratū ex thapsia imposito, quod in uesperam rursus ne ulterius quàm cōuenit calefaciat, detrahito, atq; iterum pastillos ex seminibus dato. Tertia autem die ex thapsia ceratū ad horas circiter tres rursus imposito, hominemq; lauato. Cibū autem præbe primis diebus sorbitionem, tertia autē ad succum ptisanæ, pisces qui facillē cōco quantur probeq; conditi sunt additante somnū etiā rursus pastillum ex seminibus exhibe. Nam & somnum conciliat, & dolores leuat, & exiecat. Inflammatione autem ruptarum uenarum sedata, & partibus ad bonam temperiem redactis, ea quæ thoracē repurgant præbe, adhibito simul usu theriacis ex uiperis apparatus. Deinde etiam lactis potū, alijsq; cibis utaris. Hoc modo sanē eos qui se mox eodem die medicandos exhibent, poteris curare, non tamē similiter qui post duos aut tres obueniunt dies. Alii qui enim eorū immedicabile ulcus habēt, maximē qui per uidosos humores erosionē sunt passi. Quorum aliquibus sputum ipsum sanguinis aut murtæ saporem exhibere referunt.

Curatio eorum qui iuxta alium quemcunq; tandem modum sanguinem ex pulmone reieciunt. Cap. LXII.

Difficiliore autem curam ulcera in pulmone consistētia habent: conari itaq; oportet quæadmodum nos fecimus, ita ut ægro præcipiamus, ne respiret ualde, & ut sileat semper. Incidere aut statim uenam oportet in cubito internam, ac sanguinis detractio nē reiterare, bis, aut etiam ter, paulatim, gratia diuertēdi. Non enim euacuatione indigent tales, nimirum ab affectione ipsa euacuati. Quapropter etiam fricationibus utantur, aut etiam totius corporis membrorum cum latis linteolis constrictione. Posteaquā uero hæc exacta fuerint, primum quidē poscam dilutam & tepidam bibendam exhibere conuenit; ut si quis sanguinis grumus in ulcere hæreat, inde dissolutus ejiciatur, neq; quicquam obstat, bis & ter in tribus horis hanc potionem iterare. Post hæc autē pharmaca inductoria & obstruendi meatus uim habentia, simulq; adstringentia exhibeantur, aut ex posca diluta in prima sanē die, aut ex decocto malorū, aut baccarum myrti, aut alterius cuiusdam adstringentis. In uesperam uero rursus exhibendū est pharmacum: abstineatq; eger ab omni cibo, si uirum robur adsit: sin minus, satis erit sorbitionem præbere.

Optimum autē est & secunda die rursus parum sanguinis detrahare ex eadem quæ prius incisa est cubiti uena, si modo uires ad id tolerandū sufficiant. Cibus etiam & pharmacis similiter utendū usque ad diem quartū, pectore in orbē madefacto, æstate quidem ex uino, oleoq; melino & rosaceo, hyeme uero ex unguento nardino. Si uero emplastris uti uelis, optimum pharmacum nostrum Barbarum appellatum habebis. Conducunt etiam reliqua ex bitumine, aceto & pice apparatus, & maxime quod ex salicibus, & quod ex lolijis cōstat. Maximū em hoc est, cui diligenter attendere animum oportet, ac mox facta uasorum ruptura inde remedium offerre incipere, quo cruentū adhuc uulnus cōcrescat, prius quàm inflammatio appropinquet: etenim si inflammatio præuenerit, parū spei est ad huiusmodi uulneris cōglutinationem, quippe quæ se in multum tempus extēdit. Eluere enim oportet, tum pus, tum serosum sanguinem ipsius ulceris: posteaquā inflammatio fuerit soluta: reliquam autē curam, quemadmodum ad tabidos fieri solet, ordinare. Ex Archigene. Porro si à stomacho aut uentre sanguinis reiectiones cum uomitu procedant, uena incidēda est in cubito superior, humeralis appellata, etiā si ex hepate in ipsum uentrem deferatur. Si uero à splene sanguis feratur, quod ex tumore circa splenem considēte cognosces, incisa uena quæ inter paruum & anularem digitum in sinistra manu est, probē ac propriē auxiliaberis. Cæterum & cibos & potus magis adstringētes dare conuenit his, qui ex uētre per uomitum, citra tussim sanguinem reieciunt, non tamen uehementer & actu frigidos: Ex uehementi enim frigidityte plagæ inferuntur: Quare suffecerit, si nō calidi existāt, neq; nimiam humectationē inferāt: fontana igitur aqua, nō ualde frigida, neq; multa, in potu exhibeatur: Et cibi pauci similiter mediocriter frigidi, ac naturæ quoq; adstringentis.

Communes methodi exhibendorū auxiliorū in singulis reiectionis sanguinis speciebus post sanguinis inhibitionem. Cap. LXIII.

Ex Galeno. Primum periculū in reiectione sanguinis est, ne ultra modū eius euacuatio fiat. Curatio autem post eius cohibitionem eiusmodi existit. Reiectionis quidem sanguinis quæ ob apertionem fit uenarum, per obturationē occlusionemq; dilatari oris ipsius uenæ curatur: quæ uero ob uenæ rupturam fit, per cōglutinationem sanatur: quæ ob corrosio nem, per renutricationem, & ea quæ carne implent corrosa. Obturatur quidem dilatatum & apertū os uenæ ab adstringentibus. Conglutinatur autē rupta uena ab iisdem, & quæcūq; in compositione eis amixta citra mordacitatem desiccant: ac glutinosum quiddā in se complectūtur, uelut est lemnia terra, et quæ samius aster appellatur, & his similia. Renutritur autem corrosum à cibis boni succi, & pharmacis carne explentibus, siue sarcoticis à Græcis appellatis. Conueniunt igitur adstringentia eis qui non tussunt, qui corpus boni succi habent, & qui ob apertionem oris uenarum, aut rupturam sanguinem reieciāt. Adstringit autem optime acetum, & portulaca comesta: succus autē eius bibitus efficacior existit: plantaginis succus cyathis tribus, aut sanguinariæ succus eodem modo: Succus uuæ acerbæ in sole probē desiccatus drac. una, rhois aut gallæ decoctū

cyathi mensura, cortex glandis maxime castaneae drachma i. radicis rubi decoctum mensura cyathorum trium, mora rubi, & flos balaustrorum drachma i. acacia & hypocisthis eodem modo. Vinacea cochlearii mensura, similiter lapathi acuti semen. Efficacius autem operatur radicis althaeae decoctum, radicis symphyti decoctum, atque ipsa quoque sicca trita potui inspersa, centaureae radicis drachmae duae, quas febricitantibus cum aqua, febre carentibus cum uino exhibebis: lapidis haematitae drachma una cum mali punici succo, aut coralli lapidis eodem modo, radix equiseti. Mora ualde cruda & immatura. Forinsecus autem pectori irrigatio adhibenda ex uino adstringente cum oleo rosaceo aut myrteo. Si uero multa sanguinis eruptio fiat, maxime in aestate, & citra tussim eius refectiones contingant, neque debilis sit aeger, sed robustus & carnosus: Acetum pro uino adhibendum est, non in sordidis amplius latis, sed spongiosis exceptum, fasciaque lata aeger conuinciendus. Aliquando autem acaciam, aloen, aut omphacum aceto permiscere conuenit, & cutem ex oleo myrteo praeillinare, ne mordacitas ex irrigatioe succedat, aut etiam emplastrum Barbarum, aut ex salicibus, aut aliud simile impone. Quod si aeger ferre nequeat ex irrigatione prouenientem iniucunditatem & molestiam, neque toleret item emplastrorum incommoditatem, huiusmodi cataplasma est ad mouendum: ex palmis uidelicet & acacia, alumine, malicorio in puluerem redacto, symphyto, polenta aut lentium farina apparatus. Si uero neque cataplasmatum grauitatem ferre queat, neque calidum sustineat, illitionibus utendum. Loti itaque aut melpili corticem, & rhoem culinarium, paucaque rhamni, aut sanguinariae folia in aceto decoquito: deinde in eo decocto aloes succum, aut acaciae, aut omphacii, paucumque gummi diluito, & pectus ac dorsum ex eo illinito, atque ubi exsiccatum fuerit, rursus inungito, quo crassitudinem accipiat illitio seu unguentum, & ne denudati frigore circueuniantur. Illa uero hora qua arescit illitum, ab aegro multus aer est arcendus. Quod si inflammationes succedentes febres inferant: solent enim uehementer acutae irruere & periculosae, aliquando etiam lenes & obtusae, quum uidelicet in tabe sunt transiture: tum omnis ueluti in febribus est ordinata dieta: non tamen aceruatim, sed quiete & paulatim, ut ne rursus rumpantur coagulata, abstinendum a uino & sorbitionibus, ammiscenda quae leniter adstringunt, uelut sunt palmae, & similia. Cataplasmate utendum pane calido, deinde semine lini. Vbi uero perseveret malum, omnia ut ad tabidos facienda. Exsiccatoriā porro citra mordacitatem uim obtinet succus ocymini: qui si aceto commisceatur, conuenientior fiet, & est quoque nobis in usu familiaris, citraque formidinem eum porrexeris. Adstringit autem & desiccatur simul rheon ponticum. Assumere autem oportet hanc ipsam poticam radicem ad recedentes ac inueteratas sanguinis refectiones & ad pectoris fluxiones, in principio quidem ex posca decoctam. Si uero per circuitus redierit refectionio, omnino parum quiddam bibendum praebere cum aqua. Quum uero asperitas & tussis molestiam intulerint, passo cretico decocta, deinde contritam praebere. Magis autem desiccatur arefacta in potum inspersa. Exsiccatur etiam citra mordacitatem samius aster, & minimum sinopium, & terra lemnia bis in die data drachmae

pondere ex aqua. Citra mordacitatem etiam & praclare omnino desiccatur bolus armeniacus, ut nihil eo hac parte praestet: eius itaque drach. i. exhibere potes cum aqua confidere. Exsiccatur etiam coagulum hœdi, cerui uero magis inspissat. Quod si stomachus aeger sit, semel exhibere quod adstringit, & semel quod desiccatur. Aliquando autem mane adstrictorium damus, circa sextam autem horam desiccatorium, in uespera uero quod inspissat. Quando uero inspissantibus opus fuerit, amyllum detur, & gummi, ac tragacanthus, quodlibet per se, atque etiam inuicem permixta. Simplicia ad sanguinem reiectentes pharmaca. Huius generis, inspissandum uidelicet, est & gluten piscium, & symphytum manducatum ac deuoratum. Cibos etiam eiusdem cum praedictis pharmacis facultatis exhibere oportet, tum his qui propter apertionem uenarum, tum qui ex stomacho sanguinem reijciunt: nimirum adstringentes, uelut est halica ex posca, aut micae panis eodem modo, aut oriza, oua mollia, rhoem culinarium tenuissimè tritum infarctum habentia, plantago cocta, intubum, lens cum praedictis condita, aut lapathum acutum: in quibus uero inspissantem materia magis opus est, lac coctum refrigeratur, daturque tum ob corrosionem, tum a stomacho sanguinem educantibus. Hi enim adstringente materia et carnis expletionem opus habent: aliquando autem lacti cocto amyllum infarcitur, ac modicum omniino coaguli. Cauere enim oportet immodicum eius usum, neque statim post eius admixtionem lac ipsum exhibere, sed post aliquantulam dilationem: ualde enim in uentre concretum mortem inferre consuevit. Conducit etiam palmas cum halica decoquere, aut cum similia gine. Inspissant autem simulque adstringunt oua crassiora rhoem infarcta, maxime si sint assata, lens cum posca decocta, miliū coctum. Fugienda autem in omnibus uehementer adstringentia, & excellenter inspissantia. Eligenda uero simpliciora & minus molesta ex uniuerso genere eorum quae sunt praedicta. De compositis ad sanguinem reiectentes pharmacis, Galeni. Iuxta primam quidem rationem ex adstringentibus & desiccantibus ac inspissantibus pharmaca componuntur ad curationem reiectionis sanguinis conuenientia. Quum uero adstrictoria, & tenacia ac desiccantia, uias pracludant, & difficulter per corpora digerantur, uel quadam opus habet praeparante ac aperiente eis uias ipsas, & ob hoc ipsum calida & tenuia partium eiusmodi pharmacis miscentur, quae iuxta omnem ipsorum considerationem contraria sunt sanguinis sistendae reiectioni. Miscentur etiam eis stuporem inducentia, quo profundiorum somnum inducant: quae sane commodissima sunt his qui a tussis lancinantur omnibus, maxime tamen qui simul sanguinem reieciunt. Hi igitur scopi sunt compositionis pharmacorum ad sanguinis reiectionem conuenientium: quae uero per experientiam cognita sunt a priscis medicis composita pharmaca, deinceps dicentur. Potio hæmoptosica comoda. Lapidis coralli, terrae samiae quae aster appellatur, succini, mastiches, cuiusque drach. vi. amyli, thuris, gummi, cuiusque drach. ii. Exhibe cochlearium unum siccum cum posca, aut cum aliqua praedictarum decoctionum. Alia potio. Terrae samiae asteris, lapidis agerati, terrae lemniae, aequales omnium partes accipe, & ex eis cochlearium unum praebere cum cyathis duobus decoctionis plantaginis. Alia

Alia. Terræ lemniae drachm. xvi. terræ asteris drach. viii. sarcocollæ drach. iiii. gummis drach. ii. præbe cochlearium cum decocti palmarum cyathis duobus. Sit autem decoctum ipsum crassum. **Alia Andromachi.** Coralli torrefacti drac. i. thuris obol. iiii. acadæ drac. i. balaustiorum obolos v. gummis obol. ii. candidum ouorum duorum. Huius quartam partem cum aquæ cyatho uno & dimidio exhibe. **Alia, Asclepiadæ.** Radicis sanguinariæ manipulum, radicis symphyti tærandem, rhois rubri acetabulum, aquæ sextarios iii. decoque ad tertias, & expressi, ac percolati liquoris cyathum unum præbe, & ad singulas exhibitiones gummis triti drach. i. coniice. **Alia ualde præstans,** cui testimonium præbeo. **Thuris,** terræ asteris, cuiusq; drac. viii. croci drach. i. amyli drac. i. succi plantaginis sicci drach. i. contusorum & cribratorum cochleare unum dato. cum posca. **Alia,** per experientiam. **Coralli** drach. viii. thuris drach. viii. dato cochlearium cum uino myrtide diluto. Eadem etiam ad fluxum muliebrem efficax est. **Pastillus ex electro.** Præclare facit ad hæmopticos undecunque sanguis efferatur, ad tussim ueterem & recentem, tabidos, cruenta reiectores, supuratione pectoris, tormina intestinorum, uelice fluctiones, & ad inflatos: est etiam aurium affectionibus commodus. **Psylli** drachmas quadragintaquinque, ramentorum elestri, iridis, mastiches, croci, cuiusq; drac. quatuor, opii drachmas quindecim. **Psyllium** in aquæ calidæ sextarios tres coëctum, parumper maccato: atq; ubi uiscosum ac lubricum factum fuerit, liquorem inde exprimito, eoq; præscripta diluito: terito, ac pastillos informato. Ex his obolos tres cubitum ituris exhibeto. **Pastillus Dosithei,** ualde celebris. **Virgultorum rubi** sextantem, radicis symphyti, fructus spinæ ægyptiæ, succi hypocythidis, lycii, opii, thuris, rhei pontici, terræ asteris, singulorum sextantem, rhois culinarij quadrantem, rosarum siccarum drachmas quatuor, baccarum myrti quinquuncem, croci, terræ lemniae, corticis qui macer appellatur, cuiusq; drachmas duas. Excipe succo plantaginis, aut uino scybelitæ, & informa pastillos. Eos cum decocto symphyti aut sanguinariæ exhibeto.

Alius pastillus, ex cuius usu magnam nominis famam sum adeptus. **Terræ asteris** quadrantem, amyli recentis quinquuncem, tragacanthi, sesquidæ, gummis quadrantem, glutinis piscium unc. i. aceti quantum suffecerit. Gluten more eorum qui arcus faciunt dissoluto, per triduum in sufficienti aceto maccatum, quarta deinde die exemptis ex eo pelliculis repurgatum paulatim tolle, & in mortario cum pistillo contunde, & quam diligentissime dissolue, aut super calidum cinerem pone. Difficulus enim solubile existit. Vbi uero solutum fuerit, rursus in ære aut ferro, aut, ut dictum est, cinerem calido cum aceto decoque, & sufficienti tempore assidue agita, ut quam crassissimum fiat, deinde in mortarium coniectum satis diu utere. Atque unumquodque prædictorum per se contusum ac cribratum in promptu habens, maxime tamen tragacanthum, in mortarium ad dissolutum gluten insperge, omniaq; diligenter unita uitreis lancibus solidis excipe, & exicca, pastillosq; informa mediocres. Durant autem aliquandiu donec formentur. Eos cum posca exhibe, & utere ualde confidenter. **Pastillus ex Corallio,** qui nunc

celebris & in usu apud omnes empiricos existit. **Terræ asteris,** balaustiorum, coralli, succi hypocythidis, acadæ, myrrhæ, rhei pontici, dauci, omphacii, tragacanthi cuiusq; undam unam, thuris sextantem, opii drachmas quatuor, amyli scrupu. sex. aluminis scissi scrupulos duodecim, terræ lemniae scrupu. vi. rhois rubri quadrantem, radicis dulcis sexuncem, symphyti radicis trientem, gummis scrupu. xviii. croci scrupulos sex, fructus spinæ ægyptiæ drach. quatuor. Dilgere in pastillos cum succo plantaginis, aut uino austero uetere, & exhibe ante somnum obolos tres cum posca. Facit etiam ad tormina intestinorum. **Pastillus ex ægyptia spina,** quo plurimum utor. **Pharmacum Clidion** appellatum, quod prospere omnibus sanguinem reicientibus conducit: itemque coeliacis, intestinorum torminibus, & stomachi fluxionibus. **Cytinorum,** fructus spinæ ægyptiæ, balaustiorum, acadæ, succi hypocythidis, singulorum drachmas sex, lycii, rhei pontici, opii, cuiusque drac. quatuor, myrrhæ drach. iii.

Contusa & cribrata diligenter baccarum myrti, aut rosarum decocto excipito: aut uino myrtide, & in pastillos redigito, & iuxta cuiusque uires cum rosarum, aut baccarum myrti, aut pampinorum uitis, aut palmarum decocto exhibeto, aut cum frigida aqua. Quod si lycio non abundes, hoc modo apparere potes. **Rhus,** qua corporum tinctores utuntur in quadrupla aquæ portione ad triduum maceratur, uirga frequenter agitata: quarta autem die decoquitur usque quò aqua ipsa rhois comam exæquet. Et tunc quidem rhus expressa abijctur: aqua uero percolata, donec in mellis spissitudinem cogatur decoquitur, atq; ita pharmaci adijctur. Quum uero bibendum præbes hoc prædictum pharmacum, spongas posca madefactas stomacho aut pectori impone: atque ubi restiterit sanguis, pectus aut locos fluxione laborantes ex omphacio in aceto diluto & aliquid tepidum tepidum inunge. Conuenit etiam sanguinem reiectibus pastillus Philippi, qui in tractatu De intestinorum torminibus describetur. **Positio ad sanguinem reiectantes.** **Succi saluæ cyathos** duos, mellis undam unam, exhibe salinis in potu, & euestigio sanguinem sistes. Quæ grumos sanguinis concretos dissoluant. Sanguinem in grumos concretum lixiuum ex cinere fidi, & uitis, & quercinum dissoluit, similiter etiam thymus & saturia, cum aceto. Coagulum leporis aut hœdi, ciceris magnitudine ex aceto: Itaq; mox ubi quis ex alto ceciderit, ac sanguinem reiecerit, lixiuum per se bibendum exhibeto, aut cum modico aceto.

De aspera arteriæ ulceribus. **Cap. LXIII.** Quæcunque in aspera arteria ulcera fiunt, iuxta pellisculam eam intus ambietem, & maxime prope eius extremum, aut in ipsa adeo arteriæ extremitate, sanabilia omnino existunt: Et nos non paucos hoc modo affectos curauimus. Reijciunt autem hi per sputum purulenta pauca ac cruenta, aliquando etiam tectoria quædam ulcers obducta, sensusq; doloris ab eis manifeste percipitur iuxta exulceratum locum. Hos itaq; in quiete adseruare oportet supinos reclinatos, atq; his quæ capiti subiiciuntur sublimius instratis. Admonere etiam ut quantum possibile sit renitentur, & ne tussiant: Deinde forinsecus loco affecto desiccantia imponere. Velud sunt Emplastra Barba-
rum,

rum. Ex salicibus, & ex lolijs adpellata, ac eis similia. Pharmaca aut eis exhibenda sunt, quae supra ad ulcera inter arteriaca, & ad pectore suppuratos sunt descripta: Quae etiam sub lingua detinere conuenit, ut paulatim liquefacta in asperam arteriam delabantur: tum uero maxime obniti, & non tussire. In potu autem exhibendum est lac quotidie recens mulctum ab adstante adhuc animali, adijciendum etiam mellis quiddam his qui lac difficulter concoquunt, & quibus in casei modum in uentre concreuit.

De pectore suppuratis, ex Archigene. Cap. LXV. Empyici, hoc est, pectore suppurati uocantur, quibus abscessus in succingente costas intrinsecus membrana, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, ac uacuum ruptus est, & in uacuum pectoris locum effusus inter pulmonem & membranam costas succingentem. Qui si non quam citissime per sputum reijciatur, tabidi fiunt febricitant aut pectore suppurati indefinenter heciceni, hoc est, habituales febre. Rumpuntur autem suppurationes, aliquae quidem sursum uersus, aliquae uero deorsum. Quae deorsum rumpuntur, in aluum & intestina, ac uesicam transfunduntur, per uasa quaedam transmissione ad ea membra facta. Quae cunctae uero sursum rumpuntur, in uacuum uidelicet thoracis locum, periculosiores existunt. Cognosces autem suppuratos hoc modo. Quum lateris dolor praecesserit, deinde uehementes febres geuerint, & ex magna parte quocumque dolor, grauitatis autem sensus remanserit intus in lateribus in profundo thoracis, simulque transfluere aliquid appareat, iuxta multiplices reclinacionis permutaciones, & maxime quum ab uno latere in alterum decumbunt, tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus saepe sensibilliter in reclinacionibus ipsorum auditur. Cognoscitur itaque suppuratio facta tum ex praedictis, tum quod nihil relatu dignum per sputum reiectarunt in eo qui praecessit uehementi lateris dolore. Nouissimus autem quosdam citra febre suppuratos, ex seroso aut pituitoso humore ex reliquo corpore in uacuum thoracis delapso, isticque putrefacto. Itaque quibus ex gymnasiotorum exercitijs, aut ex casu aliquo saepe sensibilis conuulsio facta est, quae dolorem circa profundum thoracis intulit, Nitrum, acetum, & oleum cyprinum conijciantur, his addatur rosmarini semen, Canchry appellatum, large probeque contritum, aut pyrethrum eius loco, seu staphis syluestris: haec simul calefiat, deinde excolata ipsis locis ex lana succida repletis irrorentur, aut cum lana imponantur. Uulsi enim haec irrigatio existit, saepeque sola malum omnine disculsi. In quibus aut inflammatio praecessit, ultro uenam cubiti incidere oportet, si nihil phibeat, & mediocriter euacuare, ut alleuatio tantum aliqua contingat. Nutrire uero ex pitisanæ succo & aqua mulsa, excretioni consulendo, & in quiete diligenter custodiendo. Ad primum quidem ex oleo pingui irrigaciones lana conuoluta exceptae ac impositae conducunt. Quod si febris absit, passum etiam moderatum cum multo oleo commisceatur, lanaque succida excipiat. Haec enim irrigatio in his qui febre carent, usque ad tertiam sufficit dies. Si uero febres simul adsint, & ruptura consequatur ipsius puris, rutaceo, aut anetino oleo, foeniculum aut flos cypri madescat: Aut quod magis ad hanc rem conueniet, ipsum oleo incoquatur cum radice maluae. Conuenientius est autem oleum cyprinum, cum spissamentis apparatum.

Haec autem calefacta & lana molli excepta imponantur. Post haec autem cataplasmata adhibere conuenit ad febres quidem sedandas, ex pane in aqua mulsa decocto, ulridi apio, aut foeniculo, simul decoctioni iniecto, aut apij aut foeniculi semine insperso. Commodius autem ad haec butyrum pro oleo adijcitur. Deinde cataplasma quoque ex semine lini adhibeatur: quod si maius malum sit, etiam foenugraecum addatur. Quod si frigiditas suppurationis causam praebuit, irionis etiam semen cataplasmatibus indatur. Tardatibus autem suppurationibus, ordeaceae farinae caricas coctas addere oportet, & althaeae radicem, terebinthinamque resinam ac stercus columbinum. Fit etiam ad tardantes rupturas utile cataplasma ex solo stercore caprino, quod & collectionem maturat et disculsi. Optimum etiam discussorium est ex lolijs cataplasma, si bitumine permisceatur. Ablatis autem cataplasmatibus, ce ratis affectae partes contegantur ex butyro apparatus, & habentibus quoque admixtam irin, parum de bacis lauri, & rutam. Etenim ad hoc quod a frigore tumentur, adiuuant etiam refectionem. Tempore refectionis congruit emplastrum ex succis constans, & mnaseae, & simpliciora melina, postea uero icelji & quod ex lolijs apparatus. Si uero fluxus tumor immineat, id quod Thraseae appellatur, erit aptum. Ego uero assidue eo quod ex syluestri cucumere constat uitor, omnium enim efficacissimum existit. praescriptum autem hoc est in anhelosorum tractatu. Adiuuare igitur oportet puris excretionem quocumque reperire cognoscatur. Quod si ad aluum proreperit, magis emollientia sint ea quae offeruntur: si uero ad uesicam serpat, ea quae urinam magis cient adhibenda. Si uero per tussim puris repurgatio fiat, nihil conuenientius aut familiarius exhiberi potest quam pitisanæ optimo melle permixta. Caeterum ea quae urinam cient, cibis commodè ammiscantur, undecumque tandem puris excretio contingat. Commoda est etiam faba cocta in omni suppuratorum differentia exhibita, si ei parum ex seminibus erui maceratis, & duplici ex aqua decoctione dulcoratis adijciatur. Alij comestio quoque utilis ad repurgacionem existit. Inter potionum genera simplicissima est aqua mulsa cum tride & plurima radice dulci decocta, utilis est & radice dulcis succus commanducatus, & cum ammixto sesamo temperatus. Conuenit etiam hyssopum aqua mulsa decoctum. Eclegma autem prodest hoc, Nucum pinearum, tum quae pityides, tum quae strobili appellantur, amygdalarum amaranum, seminis lini, amyli rectis, aequales partes, mellis quantum suffecerit. Optimum autem est & piperis parum ac seminis irionis addere. Quod si tussis infestet, butyrum recens tepidum cum melle tepefactum delingendum praebet. Aliud eclegma, internos abscessus repurgans, ut etiam pelliculas maximas educat. Cardamomi drach. vii. sagapeni drach. iiii. myrrhae drach. iiii. opij drach. ii. castorei drach. ii. piperis dra. i. cum aqua in pastillos duorum obolorum pondere redige, & cum aqua calida pastillum unum pro una uice exhibe. Thespiana ad internos abscessus. Seminis apij drach. iiii. opij drach. iiii. melanthij drach. iiii. castorei drach. ii. seminis dauci, iridis, sinapis, cuiusque drach. vii. excipe melle cocto, & praebet nucleis auellanae magnitudine ex aqua. Eclegma ex eruo, suppuratis commodum. Erui madescenti & inde torrefacti, decorticati, & in fari

nam redacti, drac. viii. nucum pinearum drachm. viii. amyli drach. vi. piperis drachmas v. succi rutæ drach. i. mellis cocti quantum suffecerit. Eclegma magnum ex marrubio. Spicæ nardi, piperis, succi marrubij, culusq; unc. i. mellis libr. iiii. uini ueteris dulcis libras ii. Succum cum uino & melle decoque, atq; ubi ea coacta fuerint, sicca cōtusa & cribrata insperge, ac simul unitis utere. Aliud. Amomi sextantem, casia quadrantem, styracis calamitæ sesquidram, spicæ nardi sesquidram, croci uncl. i. piperis unc. i. nasturtij drach. iiii. thuris drac. iiii. mellis libras iiii. utere ut optimo. Antidotus Panchrestus ab omnimoda utilitate appellata. Conducit tussis antiquæ, suppuratis, orthopnoicis, tabidis, præcordiorum distensionibus, & omni inflationi. Mouet menses foeminarum, & quæ ex abortu aut partu relinquuntur, secundas etiam ac partus educit, & uesicæ abolet affectiones. Terebinthinæ drachm. viii. styracis drach. vi. myrrhæ drac. v. croci, iridis, galbani, culusq; drach. iiii. seminis hyoscyami, cordis mandragoræ, irionis torrefacti, opopanacis, culusque drac. ii. piperis drach. i. spumæ nitræ drach. i. cū passo coque in pastillos, ex quibus obolos ii. cum aquæ mulsæ cyathis iiii. præbe. Alia antidotus Aristarchi, Paulina appellata. Vm habet admirandā. Prodest tussientibus, relectatibus sanguinē, tabidis, suppuratis, pulmonis abscessibus, conuulsionibus, & rupturis: ad stomachi subuersiones, bilis per uomitum ac secessum eruptionem, coeliacos, dysentericos, uesicæ affectiones, uteri strangulationes, et ad febres per circuitum repetentes, una hora ante exacerbationē exhibita. Facit & ad malū habitum corporis, & ad eos qui alimentū nō sentiunt, ad exitia lia pharmaca, & uenenatorū morsus. Habet autē hoc modo: Cinnamomi, costi, galbani, castorei, opij, piperis nigri & longi, styracis, singulorū unc. i. mellis sextarium i. Sicca contundito ac cribrato: galbanum aut cum modico melle decoquito ac excolato: deinde omnia simul unita in uase uitreo reponito, ac sabæ Aegyptiæ magnitudine exhibeto cum aquæ mulsæ cyathis duobus irrorato de pollice modico aceto. Vtere etiam his quæ ad tabidos describemus. Exhibe quoq; confidenter antidotum Isotheum appellatam, ad tussientes supra præscriptam. Licebit et præonia appellata antidoto uri, quæ in Sermonē tertio & decimo cum alijs multū usus antidotis describetur. Farinas quoq; apparare conuenit ex eruis albis madefactis primum, deinde refectis ac decortatis & mola tritis. Hæc enim farina & lacti dū decoquitur adijcitur, ammixto etiā melle, et uehementer cōmoda redditur. Admisceatur etiam alijs sorbitionibus: & eclegmata ad difficulter purulenta reijcipientes apparata, ex hac consunt. Commodum est autem & amygdalas amaras delibratas. sorbitionibus infarcire. Facilem autem puris retractionem facit porrum capitatum cum sorbitionibus decoctū, atq; etiam per se aquæ incoctum, & in cibo acceptum. In potu aqua offeratur probe cocta: si uero uino opus habeat, theræum detur, aut aliud dulce paucum. Ab aceto autem & omni alio uinoso genere, et ab aqua quoque frigida abstineant. Tempore uero quo cicatrix obducitur, uinum scyllinum utile est præpotatum, aut absinthites, & cœnanthinum in uomentibus & purgatis per uesicam: hyssopites uero & scyllinū

his qui per tussim: pulegiatum, qui per aluū purgantur: maxime si nigricantia subeant una cum purulentis, aut grumosa quædam coactiones. Quoniam autem per interualla colligi solent & rūpi quoque supurationes, curam adhibere cōuenit ne post factam earum curationem recurrant: id fieri potest per lactis potationem, & hieræ ex colocynthide constantis purgationem. post etiam dropaces locis adhibeantur, & smegmata seu extensoria aciora cutem rubescere potētia, & epithemata eiusdem usus, uelut est id quod ex euphorbio fit: item quod ex baccis lauri. Assumendæ etiam arenæ ingestiones: & acrium ciborum comestio utilis eis ex iis per interstidia adhibita, maxime uero alliorum coctorum. Multos autem suppuratos post cicatricis obductionem illæ sos conseruauimus per salamentorum comestione. Assidue etiam acetum mulsum præbendum est, sit autem ex scylla apparatus. pectus quoque assidue ex abrotoni decocto repurgandum: item ex centaureæ & hyssopi alijsq; consimilibus decoctionibus frequenter potatis. Quod si sæpe puris collectio cōtingat, securius est crustas per cauteria pectori in orbem inurere: quemadmodum in anhelosis est prædictum.

De peripneumonicis.

Cap. LXVI.

Peripneumonia inflammatio est pulmonis, cum febre acuta. Cōsequitur autem affectos thoracis grauitas absq; dolore. Quod si pelliculæ ipsius, quæ cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexæ, sint inflamatæ, etiam dolorem percipiunt, & spirandi difficultas simul irruit, & surrecti sedere uolunt. Pulmo enim cordi incumbens suffocationem infert. Rubicunda eis est facies, & maxime malæ, nasus in summo fit limus, uenæ temporum eleuantur, prostratus est appetitus, respiratio calida, linguæ siccitas, aquæ frigida, magis autem aëris frigidi cōcupiscentia, tussis sicca. Si uero quid efferatur, spumosum est ac biliosum, & aliquādo cruentum & floridum uehementer, quod etiam pessimæ significationis existit: & si quidem mortale malum fuerit, uigiliæ amplius aderunt, aut somni breues stuporem ac delirium inducentes: & imaginatione mētem uicissim perturbante non sentiunt ualde præsentia mala: extremitates frigide, ungues liuidi incuruātur, quarta aut summū septima die hi moriuntur. Verū si ad salutem permutetur morbus, sanguinis eruptio ex naribus abundanter sequitur, aut alui exturbatio multis ex euntibus biliosis & spumosis humoribus. Aliquando autē inflammatione in pus commutata, per uentrem aut urinam pus excernitur, statimq; ab omni molestia liberatur. Quod si in pulmonē irruerit acuatim, aut suffocat, aut cū grauibz accessionibus in tabē permutatur. Itaq; si nihil obstitit, statim uenā secanda est in cubito, & si sustinuerint uires, ex utroq; brachio sanguis extrahendus. Primum quidē modicus & non usq; ad animi defectionē, ut uidelicet adseruetur ad repetendā detractionē. Si uero quid prohibeat fieri uenæ incisionem, acri clystere subluere oportet ex decocto hyssopi, et colocynthide, & ruta melleq; ac oleo plurimo, iniecto etiā nitro ac sale. Eorū uero qbz uenā incisa est, sedē illi in re oportet his q̄ flatus educūt, & secessum iritant: uelut est mel cū cymino & ruta, ac modico nitro. Post uniuersales aut euacuationes peripneumonicis aqua

mulla in potu exhibenda est, in qua decoctum sit hyssopum; aut iris sicca trita, mensura duorum cochlearium aquae mullae inspergenda. Quod si suffocatio urgeat, etiam nitrum inspergere conuenit ad decoctionem hyssopi. Cibus sit extenuatorius, pitisana cum origano aut hyssopo decocta, aut modico pipere trito ad eius succum insperso. Aliquando autem sal pro nitro commendendus est, prout expeditur, & sustinuerint vires. Porrum etiam capitatum bis coctum praebetur, & halica cocta ex aqua mulla: quae omnia inflationis sint expertia. Potus exiguus sit quantitate: humiditas enim noxia pulmonis existit. Sub lingua autem detinendum praebere mel in pastillos redactum, cui in decocto inspersa sint hyssopum & calamintha quam tenuissimè trita. Vt quoque conuenienter eclegmatis quae in pleuritidis describuntur: atque uniuersa dieta eorum qui à peripneumonia conualescunt, eadem sit quae pleuritidorum & suppuratorum. Pectus uero lanis cooperiatur cum oleo & nitro. Conuenienter etiam cera coctegere tum pectus, tum latera, ex oleo rutaceo, aut cyprino apparato, quod habeat simul iridem siccam tritam inspersam, aut eplihema ex cera, & terebinthina, medulla ceruina, cefypo liquido, butyro, & iride tenuissimè trita imponatur. Sint autem horum partes aequales.

De phthysicis seu tabidis, ex Galeno. Cap. LXVII.

Phthisis proprie est exulceratio pulmonis, ad sanguinis spuidones consequens, quum uidelicet sanguinis eruptione suppressa, ulcus non fuerit coagulatum, neque cicatrix inducta consequitur etiam phthisis in suppuratis & peripneumonicis, aliquando etiam in adfectionibus pleuritidis, difficillimè autem curatur ulcera pulmonis, propterea quod citra tussim non repurgantur: tussientibus autem mutuo ulcus dirumpitur, ipsisque quasi per circulum reuoluuntur mala. Iancinatis namque à tussi inflammationis, altera rursus maturatione inflammatio opus habet, rursusque periculose per tussim pus repurgare necesse erit: quare ex omnibus difficilis curatio ipsius subornatur, quod neque pharmacorum vires ulcus perungere ualeant, prius quam in uentre permiscetur: & quod iuxta respirationes pulmo semper mouetur, & tussiendo lacinatur. Progressu uero temporis cartilagine quoque asperè in pulmone arteriae aduruntur: quemadmodum in externis ulceribus ossa, quae sculpturam ad squammularum discessum ac detractionem non admittunt. Diuturna autem pulmonis ulcera etiam si aliquando curentur, callosas tamen & fistulosas reliquias post se in ipso pulmone relinquunt, quae temporis progressu ex leui occasione facile refricantur: unde contingit aliquando & rectorium ulceri obductum, & modicas sanguinis guttas una cum alijs quae inde per sputum reijciuntur, efferrit: ut alio plane principio opus sit ad ulceris curationem. Notae autem quae ex sputo sumuntur, in tractatu de febribus sunt praescriptae, nimirum quinto huius operis sermone: unde superfluum existimo hic de eis uerba facere. Medicari itaque pulmonis ulceribus oportet, eo apparatu quo facile sursum efferantur humores, cura simul adhibita ne alij congregentur. Itaque cataplasmata in principio assumenda sunt, ex semine lini & tenuissimo polline, cum decoctione foenigræci & althææ, oleoque & melle ammisceri possunt, etiam ipsis althææ folia trita. Adhibeantur autem hæc omnia statim post exacerbationum remissionem. Post

temporis deinde intercapedine, ad cerata transiendum ex buryro & oleo laurino ac cera apparata. Repurgationis autem tempore, epithemate utendum est, ex terebinthina, & oleo cyprino, & buryro, & ex medulla ceruina, ac adipe taurino, iridisque farina, & cefypo, hoc est, lanæ succide sordibus, aequalibus omnium partibus commistis. Possit etiam emplastro Mnaseæ, aut aliquo ex simplicioribus melinis utendum. Locis autem fluxione laborantibus, id quod ex salicibus constat adhibendum, quod etiam exiccationis tempore conueniens existit. Sicut & hoc quod ex syluestri cucumere apparatus supra ad anhelosos descriptum, & quod ex solijs sit eodem modo. Ne autem cutis ipsa distendatur, primum locum ipsum inungito, atque ita glutinosa pharmaca imponito: sic enim facilius auelluntur. Optimum autem ad eos malagma tempore quo cicatrix obducitur, hoc est, Cerae libr. i. picis libr. i. uisci quercini unc. i. ammoniaci thymiamatis trientem, gallic hypodisthidis, aluminis scissilis, acaciae, malicorij, seminis apij, rhois culinarij, cuiusque uncia i. olei myrtini aut rosacei trientem. In hyeme autem paulo plus. Sicca cum succis in aceto conterere, liquefactisque quae eluari possunt, & ab igne ablatis viscum inijcere: ad quod deinde liquefactum in cacabo etiam reliqua trita coniicere, ac simul unita in pilam transfunde, & emollitis utere. Inter pharmaca uero potabilia simplicissimum est aqua mulla per se, & cum amylo, aut iride & radice dulci in ea decoctis. Omnium autem conuenientissimum phthysicis est lac asinum potatum: quod si non adsit, bubulum aut caprinum, & cæcri crudum tritum cum lacte potatum, aut coctum in cibo sumptum, assidue iure eorum in super absorpto. Conuenienter etiam eis adeps ceruinus recens in sorbitionibus eliquatus. Quod si molesta tussis incubuerit, thymus tritus & hyssopum melle cocto excipiuntur, & sub lingua tenenda exhibentur. Congruit etiam butyrum recens cum mellis & terebinthinae aequalibus partibus decoctis. In his uero qui tolerare possunt, plus butyri accipiat, si tamen recens existat: optime enim repurgat. De hac itaque mixtura cochlearium unum semel detur. Bonum est et amygdalas amaras maxime cum pitisana decoquere, & porrum capitatum cum pitisana, aut altera sorbitione decoctum, aut etiam per se bis coctum accipere. Vinum autem thereum & scybelites praebetur, mediocri tamen ualde mensura. Eclegma uero phthysicis congruum tale est. Mellis optimi libram unam, uuarum passarum pingulum exacinarum sextantem, croci, iridis, seminis hyoscyami, tragacanthi, cuiusque drach. iiii. styracis flauae unc. i. nucum pinearum drach. v. amyli unc. i. Exhibe ex co cochlearium semel. Tragacanthus in uino dulci modico teritur: styrax uero in pila dissoluitur reliquis coniectis ac permixtis. Aliud. Foeniculi succum cum pari melle decoquito, & ad sextarii mensuram croci drach. i. rhei pontici drach. ii. aliquando etiam hypodisthidis drach. i. adiuncto. Quod si iuxta asperam arteriam extremum asperitas adsit, coniicere & radicis dulcis tritae drach. ii. detur cochlearis mensura à cibo. Aliud. Scillam optime assato, eiusque medium siue medullam terito, & ad unam scillae sex mellis partes coniicito, & semel inde cochlearis exhibeto. Aliud eclegma celebre. Marrubij, hyssopi, iridis, radicis dulcis, pulegij, dictamni, saluiae, caricarum, palmularum passarum, sing. unc. i. crassius contudito, ac in aquae sextariis

tribus ad triduum madefacito: deinde ad tertias decoquito ac percolato, mellisq; libra i. adiecta, rursus donec cogatur decoquito, & post farinæ orobi scrupulos xii. terebinthinæ unc. i. amyli drac. iiii. mastiches tritæ drac. iiii. tragacanthi unc. i. adijcito. Tragacanthū primū in modico decocti madefactū conserito: deinde adiectis ei reliquis siccis, etiā ea quæ decocta sunt affundito, simulq; coactis uitior, exhibitio ieiunis cochleari. Licebit & ante somnū exhibere, experimento eius utilitas cognita est. Aliud, ad phthysicos fluxioneq; thoracis laborātes. Seminis cucumeris satui desquamati drach. vii. amygdalarum delibratarū dra. iiii. seminis lini drach. ii. seminis papaueris albi drac. ii. Cōtusa & cribrata cū tragacanthi cremore cogito, & in pastillos digerito. Iuxta utriū autē tolerātiā alijs drachmā i. alijs obolos ii. præbeto: eis qui febre carent, cū uino dulci & myrti cremore: febricitantibus uero, cū cremore solo. Aliud, quod & ad phthysicos & suppuratos præclare facit. Farinā erui albi succo scillæ subactā exiccato: aut scillā assatam ac tritā, farināq; erui subactā eodem modo exarescere sinito. Vsu autem expetente, pastillos ipsos exiccatos contundito ac cribrato, melleq; permixtos cochlearis mēsurā ieiunis dato. Optimè eū repurgat. Aliud, multo usu cognitum, citra molestiam repurgās. Farinæ erui unc. i. hyssopi quadrantē, seminis urticæ quadrantē, iridis unc. i. mellis quantum suffecerit. exhibe ieiunis cochleare, ac confidenter utere. Aliud, experimento cognitū, quod ad phthysicos & suppuratos facit: magis tamē frigidis tēperaturis cōducit, Iridis illyricæ sextantē, farinæ erui albi sextantē, hyssopi, pulegii fumo nō siccati, seminis urticæ, cuiusq; dra. vii. piperis gran. xii. Excipe melle, ac præbe cochlearia ii. mane unū, alterū ad uesperā. Potes et catapota inde formare, atq; alternis dieb. exhibere. Aliud, phthysicis, & tussis ueteri aptum. Cardamomi torrefacti drac. xvi. thuris, galbani, iridis, piperis, cuiusq; dra. iiii. cassiæ, croci, myrrhæ, cuiusq; dra. iiii. opij drachmam i. cōtundito ac cribrato: & cum aquæ cyathis tribus, ac passis duobus, cochleare i. aliquando etiā duo præbeto. Licebit etiā pastillos inde formare cū passo. Aliud coptarium, siue placenta, ad phthysin, ex eclegmatum materia apparata. Ex amygdalis uidelicet amaris decorticatis, nucibus pineis recentibus, propter oleaginosum in eis saporē aqua præmaceratis: semine lini, amylo recēti hoc modo. Nucum pinearum quæ pityides appellantur sextantiū i. seminis lini sextantiū quartā partē, amyli quinque, piperis drac. i. mellis boni cocti & despumati quantum satis erit. In his qui caput quod facile obligitur habent, pityidas uitare oportet, proq; eis semine urticæ cōijcere. Eclegma ex orobis apparatus Dionysio prætori. Erui albi torrefacti & desquamati, ac triū unc. i. costi trientem, croci sextantē, iridis unciā i. nucum pinearū unc. i. piperis grana i. seminis lini, uuarum passerarum à uinaceis depuratorum, terebinthinæ, sing. unc. i. butyri drachm. iiii. mellis quantum his cogendis satis erit. Summe hoc phthysicis auxiliatur. Antidotus ex orobo, ualde celebris, ad phthysicos suppuratos, & inueteratā tussim: optime repurgat, & cicatricem obducit. Amygdalarum amararum delibratarum sextantē, farinæ erui trientē, hyssopi trientem, iridis trientem, amyli sex-

tantem, piperis, panacis radicis, croci, cuiusq; scrupulos vi. succi omphacii exiccati drac. iiii. nucū pinearum torrefactarum sextantem, mellis despumati libr. i. acetū unciā i. Farina erui in aceto per diem unum maceretur, postea simul coactis omnibus, ex eis cochleare unum ieiunis præbeatur. Alia antidotus ad phthysicos, quæ etiā ad omnem tussim inueteratam conducit. Amygdalarum amararum decoriscatarū sextantem, seminis urticæ torrefacti dra. iiii. succi radicis dulcis sicci, radicis symphyti, cuiusque sextantem, terræ asteris, nucum pinearū torrefactarum, seminis lini torrefacti, sesami, uuarum passerarū à uinaceis depuratorū, sing. sesquunciā, farinæ erui albi sextantem, iridis unc. i. terræ lemnis unc. i. sapæ & mellis quantum suffecerit ad eorū coactionē. Exhibe ieiunis cochlearis mensura: aliquando etiā ante somnū. Vtere & uaria ex capitibus papaueris cōpositione, supra ad destillationes descripta, exhibēs ex ea ante somnū. Vtere & his quæ ad suppuratos sunt descripta, itē arteriacis remedijs supra præscriptis conuenientissima etiā eis est cōfectio isotheos appellata, ad tussim descripta: & antidotus pæonia, quæ in Sermonē xiii. cum alijs multæ utilitatis antidotis, est relata: ea confidenter utaris. Prodest & Mithridatis cōfectio, & quæ Esdræ inscribitur, miro modo: itē ex uiperis theriace Andromachi, per interualla exhibita: quæ omnes in tertio & decimo Sermonē sunt descriptæ. Ultra opinionē autem efficax est, bolus armeniacus drachmæ pondere ex uino tenui albo. Catapotion phthysicis ualde commodum & bonum, cui nullū cōparari potest: faciens ad omnē tussim inueteratam, & purulentas reiectiones: quod in tribus diebus utilitatē suam demonstrat. Styracis flauis, piperis albi, myrrhæ troglodyticæ, castorei, galbani puri, opij Achaici, aut Asiani, omnium æquales partes, cū galbano & styrace subige, ac catapota infornata erui magnitudine, quorū tria aut v. ante somnū exhibe deuorāda: calida aqua insuper ad sorbendū data, & admirandam uim uidebis. Porrò diutius perseverante malo, ac iā inueterato, cauteria ad mouere oportet, pectore in orbem inusto, quæadmodum in suspensorum prædiximus curatione.

De pleuride siue laterum morbo. Cap. LXVIII. Pleuritis exquisita & propria, inflammatio est membranae intrinsecus latera succingentis, dolorem pungitiuum uehementer inferens cum acutissima febre. Cōsequitur hac affectos spirandi difficultas, & tussis aliquando quidem sicca, aliquando uero cū reiectione, ac primū quidē cruentorū: inflammatione uero matura facta, purulentorum, pulsus adest durus, & secantis quippiam modo habens. Si itaq; dolor circa mammas innititur ac usq; ad clauiculam se extendit, citra dilationē cōfidenter uena secāda est. Si uero deorsum ad præcordia uergat dolor, corpus purgandū. Quod si mediocris infestet dolor, & nō pungitiuus: neq; adsit tussis, neq; febris acuta, non opus est magna remedia adhibere. Clyster eū efficacior eis primū infunditur, deinde euacuatione aliquod operæprecium faciēte, adhibetur etiā irrigatio ac fomēratio lateris affecti: itē sacculi ex furfurib. et pulegio ac mēta impleti: et dicta extenuatoriā uim habēs. Archigen. In his uero q acuto morbo, ut diximus, infestatur, si qdē circa mamas ac clauiculā hæreat dolor, ue-

nam incidere oportet, ut dictum est, in brachio, non eo quod recta ab inflammato latere procedit, sed opposito. Sanguinis autem multitudo extrahatur, non usque ad animi deliquium, periculum enim ne in peripneumonia morbus permutetur; si quidem refrigerato ualde corpore, pulmo rarus & calidus existens lateris uicinus propter & facillime morbum susceperat. Itaque modicum extrahere oportet, & post sufficientem temporis intercapedinem, rursus repetita incisione modicum auferre. Quod si animi defectionem timeamus, usque in sequentem diem eius repetita ablatio differenda erit. Deinde clyster alio adhibeatur, si non ut conuenit, feratur. Clysteri autem confidenter uti oportet ex oleo rutaceo, eliquatis in eo terebinthina & butyro: deinde sorinfecus latus ex oleo calido solum, in quo ruta, anethum, flos cyperi decocta sunt. Latam item sulphuratam, aut ipsum sulphur inspersum habentem, adhibe calido oleo imbuta, ita ut insperso modico thymo trito imponatur, leniterque ac prouide colligetur, atque hac sane irrigatione utendum est ad tertiam usque diem: quarta deinde cataplasma adhibeatur ex polline ac lini semine, melleque ac oleo rutaceo: sitque uehementer leue ipsum cataplasma. Quod si liquidior relectio existat, farina etiam lolij, & seminis irionis ammiscenda, aut foenum graecum ac nitrum inspergendum. Si uero repurgamento liquido prodeunte adhuc perseveret dolor, suppuratum fieri hominem spes est. Quare sinapi etiam in cataplasmatum commiscendum, & nasturtij semen, ac rosamarinij semen canchry appellatum, itemque pyretrum: aut farinam lolij, ceram, & bituminis, cum oleo eliquatis permixtam impone. Cura etiam adhibenda est ut calida permaneant cataplasmata: quod hoc modo fieri potest. Oleo calido uescam bubulam semiplenam reple, eamque frequenter cataplasmati admoue. Post septimum autem diem, si eodem modo dolor persistat: cucurbita lateri affigenda est, & cutis scarificanda. Manifestissima enim in pleuritidis utilitas ex cucurbitulae appositione apparet: uulnuscula autem scarificati loci sale aut nitro inspergenda, si quidem sustinere queant: in alijs uero lintecolum oleo madefactum ac sale conspersum imponatur. Sequenti deinde a scarificatione die optimum est rursus cucurbitula affigere, quo sanguinis saniosus ex impactis uulnusculis extrahatur. Haec enim detractio priore commodior existit: non enim sanguis, sed sanies in secunda detractio auferitur. Tertia uero die post sanguinis detractio, ceratum cyprinum aut rutaceum tum pertusae cuti, tum uniuerso lateri imponendum: neque unquam affectus locus nudus relinquendus: quod si permutati in pus humoris signa appareant, & non per exhalationem discutatur, coadiuuare permutationem oportet, althaea & caricis in complexum cataplasmatum coniectis. Post uero etiam epithematis utendum: relectionis maxime tempore, huiusmodi mixtura apparatus. Butyri, terebinthinae, oesypi, id est ex lanae succida sordibus pharmaci, ceram, medullae ceruinae, iris, omniū aequales partes coniice, modico oleo cyprino aut rutaceo ammisce. Optimum est etiam sulphur tenuissimum tritum cerato liquefacto inspergere. Admirabiliter quoque eis auxiliatur brassicae radix sicca, una cum cauliculis exusta, cinere eius axungia ueteris suilla sufficiente excepto, ita ut ne perfluat in corpus, ipsumque inquinat. Praclare enim discutit, & mi-

tigat dolores. Probè etiam auxiliantur brassicae, itaque cupressi folia tenera trita, & cum axungia imposita, aut marrubium eodem modo, aut cinis sarmetorum, aut ficus pingues cum pari axungia commixtae. Eundem usum praestat stercus caprinum cum axungia impositum. Aliud epithema, pleuriticis ualde commodum. Opopanacis unc. i. foliorum rutae sextantem, olei cyprini lib. i. ceram sex unc., terebinthinae sex unc., galbani sesquiunciam. Opopanax in oleo cyprino dissoluitur: galbanum autem cum rutae folijs conteritur: quae uero eliquari possunt, liquefiunt, & refrigerata tritis ammiscuntur. Aliud, experimèto cognitum. Rutae sextantem, sulphuris uiui unc. i. nitri sesquunciam, adipis suilli trientem, ceram sex unc., olei cyprini sex unc., buri, oesypi liquidum utriusque sextantem, terebinthinae unc. unam. Aliud epithema ad pleuriticos, in quibus dolor diu perseverat. Ceram, resinae pini, picis, baccarum lauri decorticatarum, singulorum lib. i. ammoniaci thymiamatis sex uncem, galbani trientem, pyretri sextantem, aeruginis unc. i. nitri sextantem, euphorbij unc. unam, alij tantum dimidiam accipiunt, olei laurini aut communis antiqui trientem. Appara & utere. Rubefacit cutem, & grauitatem leuiorem facit. Epithema foetidum, pleuriticis commodum. Resinae pini lib. unam, ceram sex unc., rutae uiridis trientem, olei cyprini sex uncem, sulphuris uiui, opopanacis, sagapeni, galbani, cuiusque drachm. iiii. De potionibus pleuriticorum. Potionibus luuantur pleuritici in principio quidem aquae mulsae, in qua ruta est decocta, post etiam hyssopum, aut calamintham, aut origanum, aut iris, aut radix aristolochiae. Alia, euestigio auxiliatur. Radicis phu fasciculum in tribus aquae sextarijs decoquito: & expresso liquore ad sextarium unum, mellis trientem conijcito, rursusque decoquito, ac cyathos tres ante cibum exhibeto. Alia. Chamaepityos manipulum in tribus aquae sextarijs appara, & utere, ut dictum est. Alia. Stoechadis tenuissime tritae drac. i. exhibe ex aqua mulsae, aut simili modo chamedryn, aut chamaepityos modo apparatus praebe in potu. Prodest & dracunculae radix cocta in cibo sumpta, aut ari radix eodem modo. Sub lingua uero tessellas ex melle cocto eliquantes deuorent. Eclegma autem eis conueniens hoc est. Eclegma ad pleuriticos. Seminis urticae, seminis lini, nucum pinearum, amyli, singulorum cyathum unum, amygdala amara decorticata x. v. piperis grana quinquaginta. Noces pineas ac lini semen parumper torreto, deinde alia trita ac cribrata simul cum his melle despumato sufficienti excipito, et ieiunis cochleare unum exhibeto. Aliud. Butyrum recens cum pari mellis mensura decoquito, ac inde cochleare praebeto. In plurimide uero diuturna exhibe seminis balsami drac. i. ex aqua mulsae, aut etiam gerasiae dra. i. radicis cetaureae maioris dr. ii. ex uino, aut radicis symphyd ex aqua mulsae. Quod si liquida & cruda relectet, conuenit hoc: myrrhae troglodyticae dr. ii. croci dra. i. piperis gra. x. v. mellis despumati lib. i. cogito simul, ac inde cochleare dimidium praebeto. Oribasij antidotus ad pleuriticos & oes pectoris fluxiones. Seminis rosamarinij, opopanacis, sagapeni, castorij, anisi, fescelis, culusque drac. viii. myrrhae, opij, cuiusque drac. iiii. bituminis dra. iiii. & dimidia, piperis dra. ii. thuris sesquidrach. Vtere, araci magnitudine exhibes cum hydromelitis cyathis iiii. Antidotus alia pleuriticis ualde

ualde cominoda. Baccarū laurī dra. viii. seminis rutæ syluestris drac. octo, aristolochiæ longæ dra. vi. myrrhæ drac. iiii. gentianæ drac. iiii. mellis despumati lib. i. Datur nucis pōticæ magnitudine, aut fabæ, aut araci. Prodest suppuratis, cōuulsis, itēq; ruptis. Cæterū & antidotus quæ ex quatuor rebus appellatur, præclare facit. habet autē hoc modo: Gentianæ, myrrhæ, aristolochiæ, baccarū laurī, æquales partes melle cocto excipe, & fabæ magnitudine præbe: his qui febre carēt ex uini cyathis iiii. febricitantibus uero cū aqua mulsa. Efficax est ad conuulsiones, rupturas, orthopnoeā, tormina interaneorū, et morbū regiū, & eos qui uenenū hauserunt: resistit etiā serpētū uenenis potata: præstat idē & ad morsus locum imposita. Quidā eā mysteriū appellāt. Alia antidotus ad pleuriticos pharmacū acōmodatum. Extrahit menses & partus, & quæ à partu relinquuntur secundas. Dictāni, sagapeni, opoponacis, trisaginis, cuiusq; drac. iiii. myrrhæ, seminis rutæ syluestris, herbæ sabinae, comæ cetaureæ minoris, piperis, cuiusq; dra. octo, radicis gētianæ drac. vi. baccarū laurī dr. xvi. aristolochiæ rotundæ drac. ii. mellis despumati quātum cogendis his satis est. Datur nucis auellanae magnitudine cū hydromelitis cyatho i. cibi porro pleuritidis exhibendi sunt sorbiles qui in principio uērrē subducant: uelut est ptisanæ succus cū melle, citra salē aut alterius rei admistionē. Post hęc etiā nō colata integra ptisana exhibēda: deinde micę quoq; ex aqua mulsa, quod si à melle abhorreat æger, oleum optimum in principio ptisanæ affundes, decoquesq; simul capitatū porrum, deinde modico sale condies, et exhibebis. Remittente uero ac declinante iam malo in petrosis aquis degentes pisces exhibendi, & colūbæ, omnisq; diæta tenuis cōstituēda. Alius autē assidue subducatur, in maximis præsertim doloribus: sed tamē cauendū ne fortiora solutua exhibeatur. Mastichen itaq; tenuissime cōterito, eiusq; scrupulos ix. cū cum aqua tepida, aut lactei teporis aqua præbeo. Solutur etiā à calida alius. Vbi uero hanc portionē obtuleris, amygdalas amaras decortecatas x x. In promptu habe: easq; tritas cum pauco melle delingendas præbe, aquā etiā calidam modicam insuper bibendam. Profectu autē ex his consequente, etiā cum subscripta Asclepiadæ hiera purgabis, quo omnes morbi reliquæ extergantur: quę enim relinquuntur à morbis, recidiuas facere cōsueuerūt: & non pura corpora quo plus nutries, eo amplius lædes. Hiera Asclepiadæ, quę omnes abscessus in profunda corporis parte cōsistentes unā cum tuni culis ipsorum educit, phthisicis ac pleuriticis cōmoda: facit & ad eos qui assidue reuomunt cibū. Colocynthidis medullæ drac. x x x ii. marrubij, stoechadis, trisaginis, cuiusq; drac. x iiii. myrrhæ, spice nardi, piperis longi, floris iunci odorati, cassiæ, cinnamomi, cuiusq; drac. iiii. croci drac. iiii. radicis cetaureæ maioris drac. iiii. galbani drac. iiii. Excipe melle cocto, & pleuriticis duarum nucum ponticarum magnitudine exhibe ex aquę mulsæ cyatho i. phthisicis uero & suppuratis unius tantum nucis magnitudine itidem ex aqua mulsa.

De ea quæ pleuritis esse putatur, quum tamen non sit.

Cap. LXVIII.

Ex cruditatibus plurimis, & cibis humoris crassi ac pituitosis, ueluti sunt bulbi, ac fungi, & consemiles:

crudi humores ulcosi, & tenaces in corpore generantur: qui aliquando repente se in uacuum thoracis locum ingerunt, aut in ipsum etiam pulmonem. Multitudine itaq; sua succingentem latera intrinsecus pelliculam distendentes inferunt dolores: ut imaginatio factæ inflammationis in expertis exhibeatur: quin etiam uias spiritus intercipientes uehementem spirandi difficultatē inducunt. Vnde quidā medici errore seducti, uena cubiti incisa, multoq; sanguine euacuato, mortis causam ægris præbuerunt. Quare interrogare oportet, num eo cuius mentionē feci, uis sint cibo, diligentēque perdiscere formam ipsius respirationis, contingere etiam pulsus, & tactu explorare caloris qualitatem. Etenim in his non ob dolorem respiratio ut plurimum intercipitur, sed quod uias spiritus sunt obturatæ, & respirationis forma uelut laqueo collo circumdato contingit. Supini autem ferē in totum decumbunt semper, præ impotentia etiam, neque probē loqui ualentes. Ut plurimum uero non febricitant hi: aliquando & frigidius solito corpus eorum inuenitur. Quod si febre afficiatur aliquando, debilissima ipsis febricula existit, minimēq; sunt siticulosi: & quod ad hæc uel maximum signum est, pulsus difficulter mouetur, minimus & tardissimus præter solitum morem existens. Horū itaq; curatione suscepta, calefacientia, incisua, & repurgantia intrinsecus & extrinsecus offeremus: & primum quidem à simplicioribus incipiemus. Clysteri ergo cōsuetuero aluum à stercorebus repurgabimus: deinde etiam efficaciori utemur ex decoctione calaminthæ, aliquando centaureæ, mellēque plurimo, ac nitro et oleo. Colocynthidis autem in his quod ualde stomacho aduersetur deuitanda. Post alui euacuationem rutam & anethum in oleo decoquemus, & ex eis quā plurimum fouebimus affectos locos: lanas etiam oleo madefactas imponemus. In potu dabimus aquam mulsam, in qua hyssopum, aut pulgulum, iris, caricæ plurimæ sint decocta. Succum etiam ptisanæ tenuissimum exhibebimus cum melle, quo inde uenter leniter subducatur. Eclegma autem ipsis commodum huiusmodi est. Seminis urticæ, hyssopi, iridis, nucum pinearum, amygdalarū amatarum, singulorū æquales partes, modico pipere adiecto, optimo melle despumato excipe, ac inde ad summum cochlearium unū ieiunis præbe: deinde interstitio facto, exhibe aquā mulsam, ut dictū est, ac post horas duas succum ptisanæ: tertia deinde die ex farina ordeī, ac semine lini, multoq; foenogracæ cataplasma imponatur: adiciamus etiam sinapi tritum, & laurī baccas, ac parum niri, & ex liquidis oleum rutaceum, aut cyprinū, aut anethinū. Apparendum autē est eo modo, ut thoracem & costas cōprehendat. Ablato autem cataplasmate, thorax cerato ex butyro & terebīthina, cæsypoq; liquido, et cera, taurino adipe, ac iride, æqualibus portōibus acceptis contegatur. Aliquando etiam ex medulla ceruina & oleo cyprino. Sulphur quoque uisum cerato liquefacto infarciendum. Stomacho uero lanam conuolutam, unguēto nardino ac modico uino madefactam imponemus, eiq; incumbere semper sinemus. In his uero quibus suffocationis periculum imminet, uomitorijs ad anginam descriptis confidēter utemur, & maxime eo quod ex elaterio, sinapi ac nitro constat, primum quidem ipsum cū oleo & pauco

pauco melle quàm penitissimè illinendo: deinde etiam bibendum, quemadmodum illic diximus exhibebimus. Assidue etiam aquam mulsam absorbendam præbebimus, in qua hyssopum est decoctum. Porro humoribus dissolutis reiectare eos incipiet, & tussis in eis augetur: quare antidotum isotheum appellatam, tunc eis ante somnum exhibebimus, nucis auellanae magnitudine ex aqua mulsam. Sõnũ enim dulcem infert, & humores quo facile sursum efferantur præparat, ac tussim sedat, doloresq; dissipat. Est autem supra ad tussim descripta. Quando uero etiam uenter eis non bene excernit, mastiche tenuissime trita scrupulorum nouè pondere cū aqua tepida, aut lactei teporis bibenda offeratur, deinde amygdalæ amaræ decorticae trita ex melle præbeantur delingenda, & aqua calida post eorũ summationem absorbenda. Feliciter autem procedente curatione, & columbarum pullos in cibo offeremus,

cum porro capitato cocto, anethoq; & oleo, modico sale & pipere adiecto. Vinum bibant fuluum, uetus, mediocri mensura. Atqui edegma prædictum ex semine uidelicet urticae quotidie sejunis præbebimus. Ante somnum uero isotheum antidotum alternis aut singulis diebus, donec ab omnibus molestiis ægri liberentur. Ceratum autem quod pectori adhibetur, singulis diebus renouetur. Et si quidem uenter adstrictus sit, mastiche cum amygdalis & melle præbeatur. Edegma Galeni, ad diuturnum pectoris dolorem citra febrem. Fœnumgræcum aqua macerato, deinde decoquito, & prima aqua diffusa, & palmarum pingulum carne adiecta rursus coquito, ac exprimito succum: quem deinde melle largius permixtum rursus ad prunas decoquito, donec ad mediocrem spissitudinem redigatur: & ex hoc multo antè reliquum cibum tempore delingendum exhibeto.

OCTAVI SERMONIS AETII

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

NONO SERMONE AETII

HABENTVR.

DE cardiacis. Cap. I.
De his quibus atra bile stomachus infestatur. Cap. II.
Ad eos qui flauā bilē euomūt. Cap. III.
Ad eos qui stomacho exuruntur, & siticulosi sunt. Cap. IIII.
De singultu. Cap. V.
De bulimo, hoc est, ingēti fame. Cap. VI.
De animi deliquio, ex Philumeno, Cap. VII.
De his, qui in balneo animo linguuntur. Cap. VIII.
De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione, ex Galeno. Cap. IX.
De nausea, ex Galeno. Cap. X.
Cataplasmata & epithemata ad nauseas & uomitus. Cap. XI.
De cholera seu bilis effusione. Cap. XII.
De stomachi adstrictione. Cap. XIII.
De humoribus à capite in uentrem destillantibus. Cap. XIII.
Dieta conueniens his qui stomachum habent dissolutum, aluum autem adstrictum. Cap. XV.
De stomachi inflammatione. Cap. XVI.
De stomacho exulcerato. Cap. XVII.
De his qui à stomacho, comitialis mor-

bimodo conuelluntur. Cap. XVIII.
Viridis aspidis usus. Cap. XIX.
De appetitus perditione. Cap. XX.
De appetitu canino. Cap. XXI.
De appetitu canino, qui ex immodica transpiratione, ac cutis exolutione contingit. Cap. XXII.
De uitioso appetitu. Cap. XXIII.
De cruditate, Galeni. Cap. XXIII.
De crapula, Philumeni. Cap. XXV.
Quæ cura aluo adstrictæ exhibenda, ex Galeno. Cap. XXVI.
De inflatione, Galeni. Cap. XXVII.
De uoluulo, Archigenis. Cap. XXVIII.
De his qui ab acri humore coli dolore infestantur, Galeni. Cap. XXIX.
De his qui à frigidis & pituitosis humoribus, coli dolore infestantur. Cap. XXX.
Pharmaca ad colicos. Cap. XXXI.
De antidotis dolorem leuantibus, insusq; colicis accommodatis. Cap. XXXII.
Quæ colicis infundantur, & per anum subdantur. Cap. XXXIII.
Cataplasma colicum, ex libris Seueri. Cap. XXXIII.
Quomodo aluum fluxione laboran-

tem curare oporteat, ex libris Philumeni. Cap. XXXV.
Cura eorum qui ex debilitate, alui fluxione laborant, ex Galeno. Cap. XXXVI.
De coeliaca affectione, Archigenis. Cap. XXXVII.
De colliuatione. Cap. XXXVIII.
De lubricis, ex Herodoto. Cap. XXXIX.
De lato lumbrico. Cap. XL.
De ascaridibus. Cap. XLI.
De abscessu in intestinis. Cap. XLII.
De dysenteria, hoc est, torminibus intestinorum. Cap. XLIII.
De tenasmi cura. Cap. XLIII.
Cura dysentericorum. Cap. XLV.
Cura eorum qui aurum aut es, aut tale quippiam deglutiuerunt. Cap. XLVI.
Communia remedia dysentericorum, quæ supernè exhibentur. Caput XLVII.
Composita pharmaca, quæ supernè exhibentur. Cap. XLVIII.
Quæ infernè dysentericis infundantur. Cap. XLIX.
Epithemata dysenterica. Cap. L.
De lienteria. Cap. LI.

AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI TERTIAE

SERMO PRIMVS, ET EX

ORDINE NONVS.

*

De stomachi, alui, ac interaneorum affectionibus.

De cardiacis.

Cap. I.



QUOMODO eos, qui cardiaci appellantur, curare oportet, aut eos etiam qui aliter ob stomachi afflictionem animo linquuntur, iam absolutissime praedictum est in quinto huius tractationis sermone, ubi ad febrilem curam hanc annexuimus. Nunc uero quum affectionem stomachi ac alui remedia opportunè ex ordine describemus, necessarium uisum est & hic paucis eorum mentionem facere. Cognoscemus igitur eos qui cardiaci dicuntur, quum acuta febris & maxime aestuosa affliguntur hoc modo. Pulsus si inuenero densum & obscurum, & extremarum partium frigiditatem, sudores circa faciem & ad pectus usque glutinosos, & odorem corporis terrestrem nares percellentem, & pulsus circa ipsum cor uehementiores & magnos, & ad haec accedant desperatio, angor animi, & corporis tactatio. Hoc modo affectum, cardiacum esse dico. Os uero uentris primum est quod in ipsis afficitur, per consensum uehementer oblaedens cor ipsum, propter uiciniam. Porro ueteres os uentris cordis appellatione Cardian uocarunt, ab accessionibus nimirum quae ex eo accidunt & inferuntur. Aeris itaque frigidi admissione & uentilatione eis auxiliari oportet. Spogia igitur ex posca frigida imbuta, facies permadescat, & aqua lactei teporis paulatim absorbenda praebeatur. Odoramenta autem uaria offerantur, malum cotoneum, pulegium, cucumer, & similia. Stragula eis incubentia collantur: operimenta uero quibus coelegantur, mollia sint, & usu priore detrita: pauimentum irroretur, ac folijs consternatur myrti, platani, ac quercus, maxime uero uitis atque ipsis etiam rosas. Solè autem domus in qua decumbit non admittat, siue minimè alta, sed depressior, et non ualde lucida. Exudantibus uero partibus myrtus sicca trita inspergatur, aut cimolia, aut oenanthe, aut ordeum: imprimis uero collo & thoraci, & locis sub alis ac inguinibus ea sunt adhibenda. Eodem modo auxiliatur malicorium cum manna inspersum: aut galla per se, & cum sulphure uiuo, aut samia terra admixtum habens gummi. Illinuntur etiam ad coercendos sudores, oleum myrteum, oenanthinum, rosaceum, melinum, & lentiscinum. Circumscissa autem sudores cohibet, manna & amyllum candido: uel excepta, aut bulbus albus, & piper, ac urticae semina, et gummi, modico cerato myrteo excepta, aut uel candido subacta, quae sanè crassius inungere conueniunt: adglutinantur enim & exarescunt, & porissima in eis spes consistit naturalis caloris reexuscitandi. Neque uero pinguefactae cuti huiusmodi inunctiones sunt adhibendae: uerum linteolo probè prius extersae inungantur. neque mox ubi calor apparere incipit, auferantur, sed postquam sufficere extremæ corporis partes fuerint calefactae, quod ubi contigerit statim tollantur, et tho-

rax cooperiatur, atque sicubi uarosum quippiam aut ucerosum ex inunctionis adustione circa thoracem appareat, blande tractetur, ac aliquo ex his quae ad ambustos ab igne descripta sunt, pharmaco locus curetur, maxime uero conueniet id quod ex ordeo constat. Extremæ uero corporis partes, siue ad genua usque & cubitos, siue usque ad locum sub alis & inguina sint refrigeratae, fece usta & sulphure uiuo conspergenda, aut pyretro, aut piperide, aut bulbis tritis cum pipere illinenda à brachijs usque ad digitos, & à femore usque ad extremos pedes, gracilibus linteolis simul circumpositis. Idem praestat sinapi & pyretro, ac adarce. Porro mollibus corporibus, sufficit aliquando oleum sicyonium aut gleucinum illitum, cum multa frictione ac calefactione partium extremarum: quanquam nihil ueteris piperis ac ceræ modicum his ammiscere, quo spissiora fiant, & melius adhærescant. Fasciculus quoque ex lana pura in oleo calido madefactus incubat semper circa uesicæ regionem. Capitis fomera frigida sint, qualia ad phreneticos sunt descripta: frons spogia ne madescat, sed ex acacia, galla, terra samia, ac syluestris punici flore illinatur. Optime facit etiam omphacium, & gummi, uerum unumquodque eorum ex rosarum decocto aut succo, aut aliquo consimili diluatur prius, & deinde illinatur. Quod si quis sanitatis tempore nimium repletus existat, & stercora antiqua recto intestino insideant, tunc sanè clysteri simpliciore euacuare oportet: ex succo ptisanæ, et modico melle, paucissimoque sale, & oleo quoque modico adiecto. Illinenda est etiam singulis diebus sedes ipsa ex cumino, ruta et nitro, cum modico melle commistis, ob inflationem uidelicet educationem. Si uero nulla stercora in intestino recto subsideant: neque alias etiam excrementorum multitudo insit intestinis: aegri autem cibum non sentiant & tabescant, ptisanæ succum aut halicem per clysterem infundere oportet tepesactum, coquassato cum eo ouo crudo. Ultra hoc enim quod ea quae stomachum inferne molestia afficiunt, euocat et educit, etiam alimentum optime corpori sufficit ex languore ob non acceptum cibum misere affecto. Auxiliatur ite cardiacis cataplasmatibus modo, stomacho, ac sinistrae mammae imposita, folia rubi cum pane, aut myrti folia, ipsa quoque myrti baccae, aut papini uitis, aut plarago cum pane, aut mala cotonea & palme, aut intubuscerato exceptus. Imbecillioribus potentiam cum palmis imponere sufficit, aut palmas uiuo madefactas unciae unius mensura conterere, deinde adiectis aloes drachmis quatuor, mastiches drach. iiii, simul tere, & affuso eliquatae ceræ sextante, & olei, si quidem hyems sit, neque multus caloris sensus aegrum contingat, nardini: in aestate uero rosacei, aut melini triente simul misce, ac utere eodem modo. Quod si ex uisceribus quoddam inflammatum sit, panem cum modico uino et melle decoctum impone, admixtis in his qui imbecilliores sunt malis repurgatis, aut oenanthe. Reprimunt autem sudores stomachum quoque & cor ipsum firmitatis autorem placat ac cohibet ca-

z

taplasma

cataplasma ex palmis, & oenanthe, & acacia, rosis, alu-
mine, hypocisthidae & rhoë rubro: ita impositum ut si-
nistram mamam atque ipsum ventrem complectatur: sit ex-
tremum tactu molle & leue, ac assidue permutetur. Reuocato autem ex accessione aegro, si loci quidam circa præ-
cordia sint inflammati, puidere oportet ut per communia cataplasmata ab inflammatione liberentur. Cibi of-
ferendi, panis ex aqua frigida, aut ex uino albo & tenui frigidoque ac diluto: pedes suilli, taliisque, & rostra:
ex uolucris macrae, & non foetidae, in pisanæ deco-
ctione eliquatae, aut etiam per se. Frigida autem hæc ex-
hibeantur, si caloris sensus circa stomachum sit, et eger
inflammatione non uexetur. Alijs calida exhibenda, si-
militer autem & potus calidus dandus, uinum tenue, al-
bum, dilutum: immodicam autem uini exhibitam mul-
titudinem pulsus aegroti ostendet. Eo usque enim
exhibendum est uinum, donec pulsus subremulus
esse desinat, & robustior fiat.

De his quibus atra bile stomachus infestatur. Cap. II.
Ex Herodoto. Quibus stomachus ab atra bile in febribus uexatur, similes accessiones cardiacis patiuntur. Accedunt autem ad hæc, fortis stomachi morsus, cum eius exolutione, & capitis uertigine, ac frigido sudore, paruusque & obscurus adest pulsus. progressu uero temporis augetur morsus, atque hinc in dolore quod difficulter leniri potest, transit. Cæterum manifeste apparere flauæ bilis uomitus has accessiones leuiiores reddit, atque autem bilis soluit. Vomunt autem ferè in totum hoc modo affecti pituita acidam in uentre coaceruatam ex assidua cruditate, propter uentris ipsius debilitatem. Qui uero citra febrim ab atra bile stomacho infestatur, his accedit tempore quo humor ipse generatur et producit, tristitia, & somnus cum accessione imaginationum alienarum, contractioque & dolor poplitum ac surarum. Acutius quam antea consueuerunt, cernunt, & defectum habent appetitum: ructus autem & excreationes foetidas & pisces olentes. Coaceruata uero bile cum multa desperatione intolerabiliter ignescunt, ut omnia eius membra ardere uideantur: in primis autem stomachus uelut à palis igne candefactis purgatur, afficitur. Sudores animi deliquium inducentes per omne corpus destillant, & ferè semper sputi influentis reiectione uexantur, quum morsum sentiunt, multamque habent uomen diu cupiditatem. Et aliquando quidem frustra lactantur, quandoque autem pauca quædam biliosa aut acidam pituita, quæ in uentre defluerunt euomunt, modicoque tempore à malo leuati, rursus idem patiuntur, atque in uniuersum his qui ueratrū sumpserunt similes existunt. Pulsus autem aliquando densiores, aliquando etiam rariores & minores fiunt, plurimum uigiles permanent, & si quidem dormierint cum perturbatione æstuosiores exurgunt, ebulliente ut uerisimile est delato in uentre humore. Sæpe etiam acceptum cibum unam cum atræ bilis humore euomunt: ferè in totum enim post duas ab accepto cibo horas accessione apprehenduntur, maxime quum acre aliquod aut salsum cibum aut potum ingesserunt. Excrementa alui retinentur, aut præter naturam incocta excernuntur. Effertur autem aliquando & bilis inferne per aluum, atque adiuuat affectionis declinationem. Aliquando autem ob retentam bilem, etiam atræ bilis affectionibus, & delirij mentis alienantibus sunt apprehensi. Quod si contingat, siue febris adsit, siue non, si quidem iuuenes sint, sanguineque abundet, & reliqui numeri ad uenæ incisionem requisiti adsint, uena secanda est, repetita

sanguinis detractione, & hoc tamē per infusum clysteris, corpore prius euacuato. Atqui ad animi usque deliquium id facere non oportet, propter stomachi imbecillitatem. Colligenda autem adstrictæ extremæ corporis partes, & ad paucum cibum aegri cogendi, stomachus uero lanis succidis fouendus est ex aceto plurimo, modicoque rosaceo, aut melino, aut lentiscino. Quod si amplius permaneat stomachi imbecillitas, ex rosarum succo foueantur, siue intubi aut portulacæ cum rosaceo: adstringentia etiam & lenientia cataplasmata imponantur. Qui uero unam cum morsu circa uentrem ac intestina inflantur, his conuenientissimum est acre acetum, in quo pulegium est decoctum, & cuminum calidum forinsecus uentri per spongiam impositum. Dolore uero perseverante, alumen liquidum cum atramento sutorio trito, & aloë melle excepta imposito, & alumine in acetum coniecto & calefacto, stomachum per spongias foueto, aut aluminis ac aloës æquales partes cerato myrteo exceptas ad os uentris apponito, aut hederæ folijs in uino decoctis uentrem integito, aut plantagine cum sale trita, aut marrubio cum pane & rosaceo subacto, aut bulbis rufis cum pari podere aluminis cooperito. Optimum enim hoc est, inueterato malo remedium: quin & bulbi ipsi cum nitro triti & impositi celerem curationem præstant. Optime etiam conducit eis gregarij bouis stercus aridum uino decoctum & impositum. Epithema quoque ex seminibus adhibendum: ite bulbi cum stercore bouis ac nitro permixti. Ex Dioscoride. Conuenientissimum omnium his qui atram bilem generant, inflatisque, & morsum sentientibus, pulegij decoctum existit potatum, aut aqua in qua ferrum est extinctum: ite intubi succus potatus: bibant autem aquam, eamque calidam. Si uero plurimi caloris sensum percipiant, frigida danda, sed modica, & maxime tempore exacerbationum. Aestuantibus enim & in anxietate existentibus, omniisque miseria afflictis, frigida ad absorbendum concedenda, per interualla tamē, & non ultra cyathi mensuram. Non enim humectatione opus habent, sed refrigerationis tantum gratia, frigida permittitur, et ut mellior intrinsecus temperatura fiat. Utilis est ipsis & mentis succus cum succo mali punici dulcis. Quod si aquam bibere non possint, parum uini aquosi concedendum est inter cibos, calida aqua probe diluta. Cibus maxima ex parte sit frumetaceus, et optimi succi in omnibus: simplicior autem & qui facilius concoquit ac commutari possit in febricitantibus. His uero qui febre caret, adijci possunt ex oleribus, lactucæ cauliculi ac maluarum, pisces petrosi aquis degentes, & ex uolucrum genere, non graue olentes, macræ & motanæ: ex ostreis quæ testa integuntur, herinacæ recetes. A salis uero & acris in totum abstinere. Molestas autem mordacitates & nauseas, hausta plurima tepida aqua per uomitum soluatur. Si uero id non bene tolerant, quiescere iubeto, & extense manus palma stomachum foueto, quo delatum ad ipsum biliosum infernè per aluum excernatur. Quod si uenæ incisionem non faciamus, secunda ac tertia die per clysterem euacuandum est, & modico cibo aeger connutriendus, deinde in potu exhibendum pulegij decoctum ieiunis, reliquaque supra dicta. Fomentum etiam ex aceto adhibendum, & cataplasma ex stercore bubulo ammixtis bulbis & nitro. Porro postquam febris cessauerit, aut ubi etiam in totum non febricitauerint: & tamē diutius malum molestia affligerit, & irritationes per longa interualla

terualla repetuerint, purgandum est corpus ex hiera Archigenis, aut Ruffi. Qui uero spuri multitudine stomacho uexantur, his conyza arida maximè tenuis māducanda, aut pulegium, & mastiche chia ex aqua potanda. Exhibendū est etiā lac in potu hīdem quēmadmodū in proprio capite de ipsis ex professo est ostensum. His uero qui stomachū ualde exolutū habent, serū lactis per acetū mulsū fīsi exhibeatur, ita ut ad primū seri haustū epithymi tenuissimè trīti scrup. i. x. & scammoniae obolum i. aut ii. iuxta uirium tolerantia inspergamus. Deinde serū ipsum per interualla paulatim bibāt, sitq; eius potati mēsurā ad minimū quinque cyathorum. Bonū est & cucurbitulā ad dorsum affigere, aliquando etiā ad stomachi regionē, & scarificatione facta, sufficientē sanguinem ex fissuris extrahere. Quo uero penitus affectio hāc destruat, quotidie horā unam ante ciborū sumptionē exerceantur, ac frigida lauēt, maximè in mari, & arena sub caniculæ ardoribus obruantur. Abstineāt autē ab omnibus atra bilem generantibus, maximè carnibus bubulis, uino nigro, brassicāq; & lēte. Diligentissimè autē de ipsorum diēta in sexto Sermone, ubi de atra bile affectis egimus, est prædictū. Quod si inflatio eis augescat, ruiā & cuminū in oleo decoquamus; indeq; uentrē quā plurimū irrigabimus, ex eodēq; oleo quincuncē per clysterē infundemus, si tamē clysteri stercorū eductiuo prius ipsos euacuauerimus, in quo decocta sint ruta & cuminū. Deinde splentum magnum aluo ac uisceribus imponendum ex epithemate quod ex seminibus cōstat. In cibo uero succus prisanæ detur, qui ex aceto, melle, cumino, & aniso sit conditus. post etiā gallina hīdem cōdimentis apparata exhibeatur, potus uero sit uinum rufum mediocri mensura.

Ad eos qui flauam bilem euomunt. Cap. iiii.

Ex libris Philumeni. Qui flauam bilem euomunt, siue in febribus, siue citra febres id contingat, eis cōueniunt ea quæ ad nausē, ac nimiam stomachi humectationē describēt. Quare omnibus ad illos descriptis odoramentis, manducatorijsq; & fomentis utatur. Decubitus autē eorum, à cibo præsertim & potu supinus adornetur, & spōgia ex posca imbuta ad os uentris imponatur, maximè si non uillis & contemptibilis sit dolor. Fricatio etiā & constrictio iuncturarū manuum, ubi pulsus exploramus, adhibeatur, & reliquarū similiter extremarū corporis paratiū. Cataplasmata autem ex palmis, malicorio, & similibus accipiāt, quæ ex uino quidē aut posca sint decocta, cū pane autem & acacia, & hypocistide permixta ac contrita; quin & rhus & syluestris punicis mali flores cōmodè cataplasmati admiscantur. Atq; uniuersi corporis curatio ex oleo fiat, modico nitro ammixto, quo sudorē ex cute eliciamus, & fluores transferamus; & ob id etiāalui per inferna excretio plus quā oportet facta uomitus desiccet, quare ex absinthio & aloē potionē cōueniēter exhibebis. Ac uero affectione diutius perseverāte, si ægri uires nō repugnēt, etiā hieræ cataporia ex colocynthide ab Archigene descripta apparabimus, deq; eis minimū drachm. i. summum iiii. dabimus. Et si nihil obstat cataplasmate ex sinapi præcordia rubefaciemus. Præclare enim sensum ipsum ad cutē transfert. Verū hāc diuturnæ affectioni remedia cōueniunt. Tēpore autē exacerbationis & circa accessionis acumē, cucur-

bitula plurimū auxiliatur cū multa flāma ori uētris affixa, fortiterq; abstracta, rursusq; secūdo ac tertio adglutinata. Cibus quales uomētibus solemus exhibemus, sæpe & paulatim sumēdos, & quotiescūq; reuomuerint acceptos, toties alios post modicum interuallū offeremus. Ante cibum aquā tepidam dabimus, & uomere cogemus: bilioso enim humore circū circa adhærente unā cū aqua reiecto, stomachus elotus ac leuior redditus statim retinet oblatum sibi cibū. Mitigat autē dolores & stomachi morsus portulacæ succus tū per se, tum cū ungueto nardino aut melino mixtus. Qui uero stomachū habet uehementer exustū, eis utile est lapathi acuti semen, triū obolorū pondere ex aqua; aut mastiches tenuissimè tritæ cochleare bibendū præbe ieiunis ex aqua. Maximè omniū autē morsus sedat lac asininū: aut si hoc non adsit, bubulū recens mulctum potatū, absq; dilatione enim auxiliatur: si uero neq; hoc adsit calidū, quartā eius partē aquæ addere oportet, & feruefactū bibendū præbere. In balneū quoq; & ad uini potationē celerius ducēdi sunt qui bilē uomūt, quouidelicet ad cutē materiā transferamus. Cæterū & uinū subadstringēs firmitatē corporibus addit, ac cibos retinere cogit. Utendū est etiam aliquando ceratis ex lentiscino aut cenanthino oleo, admixtis absinthio, aut aloē, aut galla, aut cenanthe.

Ad eos qui stomacho exuruntur, & siticulosi sunt. Cap. iiii.

Sitis fit aut ob penuriā humiditatis, aut abundantiam caliditatis: siccitatis remediū est somnus, caliditatis uigilia. Verū his qui ob multū uini potum sitiunt, frigida aqua potata auxiliatur. Quibus autē longo iam tēpore stomachus estuat, eis auxiliatur, simulq; sitim sedat, radicis dulcis succus potatus, atq; ipsa etiā radix ex aqua, pampinorū uitis cremor, & portulacæ succus. Ab imbecillitate autē uires recolligētib; sitim sedāt, ficus siccae cibo acceptæ, & symphytum in petris nascens cōmanducatum. In cataplasma eis uero ad stomachi ardores conducunt, sanguinaria, intubum, sonchus, apium hortense, pampini uitis, portulaca, unumquodq; cum polenta aut pane. Qui in superficie uruntur, his ramentorū cucurbitæ succus opitulatur cum rosaceo, aut omphacii succo. Sitim autē quæ in febribus oboritur, lenire solet capitis irrigatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, ex alto nimirū sincipite irrorato. Sitim etiā adimit stomacho exustis cucumeris semen cōmanducatum, decorticatū uero & tritū ex aqua potatū ualde hīdem auxiliatur. Eodē modo prodest lactucæ semen manducatū & potatum: item semen portulacæ. Aliud adipsos, sitim optimè tollens. Cucumeris satiuoli seminis decorticati dra. viii. tragacanthi dra. iiii. tragacanthum contundito & cribrato, semen uero contrito, eisq; quorum crudorū recentium cādida adijcito, & simul omnibus contritis cataporia informato, ac in umbra exiccato. Ex his deinde unum sub lingua detinendū præbeto, ut paulatim dissolutū deglutatur. Aliud adipsos, ad stomachi nimiam humectationē commodū, in his præsertim quibus humida & calida dispositio adest. Rosarum uiridium unguibus earum resectis drachm. vi. radicis dulcis drachm. iiii. spicæ nardi drachm. iiii. excipe uino dulci, & redige in catapotiorum formam, indeq; ciceris magnitudine sub lingua detinendum præbe, refrige-

rat, & firmitatem addit. Aliud. Seminis cucumeris, seminis portulacæ uiridis, tragacanthi, cuiusq; drach. iiii. radicis dulcis drach. ii. Excipe portulacæ succo, & in cataporta redige magnitudine fabæ, & utere uno pro uice sub linguam exhibitio: Absorbeant etiam malorum cotoneorum cremorem, aut pisorum, aut omphacii succum cum aqua. Aliud adipson. Seminis portulacæ uiridis, seminis peponis, succi radicis dulcis, tragacanthi, singulorum æquales partes, aqua subigito, & ad fabæ magnitudinem reducto, ac utitor.

De singultu.

Cap. v.

Singultus accessio stomacho accidere solet ob repletionem, aut euacuationem, aut frigiditatem: aliquando etiã ob humorum acrium & medicata qualitate prædicatorum mordacitatem, quos ubi uomitu reiecerint, statim à plurimo singultu liberantur. Quin & hi qui pharmacum ex tribus piperis generibus biberunt, aut ipsum adeo piper, si statim uinum à sumptione eorum ingesserint, omnino singultunt. Cibus quoq; in mordacem qualitatem corruptus aliquos singultire facit, & oris uentris frigiditas singultum inducit, maxime uero omnium pueris frequenter singultus accidit ob stomachi frigiditatem, & alimenti corruptionem. Fit etiã in febribus singultus, stomacho præsertim aut aliquo alio uiscere inflamato. Frigiditate itaq; singultum præcedere, oleum lana exceptum stomacho imponendum, in quo ruta, cuminum, & absinthium sint decocta. In potu etiã ruta cum uino exhibenda, aut apium in aqua mulsa decoctum, aut cuminum tritum, aut calaminthe, aut asarum, aut pulegium, aut dictamnium, aut celica nardus, quodlibet eorum per se aut simul mixta. Vtile est & acetum scyllinum sorbillando acceptum. Castorium autem eis qui integræ sunt ætatis, tum ob frigiditatem singultuentibus, tum ob humorum multitudinem similiter affectis, drachmæ pondere ex posca dandum: quin & stomacho forinsecus impositum utrisq; commodum existit cum oleo sicyonio aut antiquo. Quando uero ex repletionis singultus oboritur, quomodo in totum frequenter consistit, uolento motu opus habet. Vomitus itaq; remedio fuerit, & extremarum partium adstrictio, compressio spiritus, uociferatio concinna, cum plurimo clamore, deambulatio longa & concitata, gestatio atq; adhuc magis equitatio, cucurbitulæ cum plurima flamma pectori, stomacho, & dorso affixæ: sternutatio etiã conuenienter prouocatur, eis qui ob humorum multitudinem singultunt. Singultui autem ex euacuatione oborto maxime contraria sternutatio existit: sanantur autem hi per alimendi conuenientis assumptionem, & per ea quæ defectum explent. Singultus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tæanis obortus, mortem non longe abesse præsignat. Cæterum & his aqua mulsam assidue bibendam exhibere conuenit, aut aqua purâ mediocriter feruifacitâ. Conducit & castorium ex aqua mulsâ potatum pondere triui obolorum. In his uero quæ à malo uicti sunt, præclara remedia recusanda sunt. Porro mordacitate singultum producente, primum sufficiens remedium uomitum ipsum reperiemus: deinde etiã sensus stupefactionem, & morsum inferentium alterationem ac discussionem. Stupefiunt itaq; sensus per refrigerantia. Alteratur autem mordacitas per obtundentia. Eiusmodi mixturæ facultatis subiectum pharmacum existit, & quæ ei assimilari possunt. Habet autem hoc modo, Asclepiadæ phar-

macum, ad eos qui stomacho exuruntur, & ad uementes singultus, uoluulosasq; stomachi affectiones. Costi, spicæ nardi, chrysobalani, croci, rosarum uiridum, mastiches, cuiusq; drachmas iiii. asari, aloës, cuiusq; drach. ii. opii drach. i. subige cum psyllii cremore, & digere in pastillos, quorum tres pro uice dato. Ego uero chrysobalano reprobata, pastillo qui aster appellatur ad hos utor, qui paulo mox ad stomachi subuersiones describetur. Obtundit autem mordacitatem, & ex ea obortum singultum sedat, intubi succus potatus, cucumeris semen decortecatum tritumq; bibitum: lactucæ semen eodem modo, item portulacæ succus potatus, ipsaq; portulaca in cibo sumpta: myxarum decoctum in potu acceptum: maxime omnium tamen præstat lac recens mulctum potatum.

De bulimo, id est, ingenti fame.

Cap. vi.

Bulimos ex stomachi frigiditate oboritur, indigentiaq; ac uirium imbecillitate, & ab externo frigore fere in totum initium capit. Vox ipsa Græca est, & à Latinis magna fames interpretatur. Fames enim in principio multa adest, quæ tamen non usquequaq; perdurat. Nam postea repente animo linquuntur, cum extremarum partium refrigeratione, & spiritus defectione. Et sanè quidam in locis desertis, aut in balneo in malum istud collapsi, ex instanti perierunt, auxilii facultate destituti. Peregrinationes autem & itinera longa, maxime per niuem facta, affectionem hanc inducunt. Eos itaq; qui in itinere, aut aliâs fame magna citra febrem infestantur, refouebimus ac reuocabimus aceto aut pulegio ad odorandum exhibitio, aut terra quęcunq; tandem obrigerit aceto conspersa: item pomis ac alijs qui inueniri possunt fructibus. Auxiliatur & panis recens naribus admotus, & caseus boni odoris, caro suilla assata aut cocta: & in uniuersum omne quod ualde nutrit, maxime uero quod nidorosum ac probe conditum habet odorem: his enim ut plurimum multi refocillantur. Cæterum & extremarum eorum partes fasciis cōstringendæ sunt, manuumq; ac pedum summitates calide aque feruentiori imponendæ, & ipsi quoq; stimulis eorum maxillis, crinibusq; ac auribus uellicatis excitandi. Reuocatis autem ab exolutione panem ex uino diluto offeremus, aut aliud quiddam eorum quæ acuatim uires reparare possunt, uelut sunt, oua sorbilia, halica cum uino. Compediosissimum enim auxilium ex cibo sperare possunt, quem etiã si oblatum acceptare non possint, oris indere oportet uolenter, cogereq; ut ipsum transglutiant. Euestigio enim & à fame & ab animi deliquio liberantur, & celeriter excitantur. Accedit etiã in febribus, raro tamen, neque cito, uerum circa uigorem ac declinationem. Si itaq; remissionis exacerbationum febrilium tempus, eius accessio irruat, aut circa exacerbationis declinationem, in trepidum eis cibi sunt offerendi. Si uero in principio accessionis febrilis, aut in uigore apparuerit, per prædicta odoramenta conabimur eos primum reuocare; maxime per ea quæ frumetacei generis existunt: uelut est, polenta aqua madefacta, aut posca, aut panis calidus uapore adhuc emittens. Fricatio etiã extremarum partium adhibeatur, & cataplasmata ex palmis, aut malis cotoneis, aut polenta, in uino diluto decoctis, atq; hæc usq; ad remissionem facere oportet, ut oportune cibum offeramus. Quod si ex his nihilo melius habeant, audendum est per ciborum ingestionem auxilium

auxillum adferre, farinae itaq; crassioris cochleare unum ex aqua multa, quae lactis speciem ac teporē in tactu de se praebet exhibeto. Buccellas item unam atq; alterā uino madefactas. His enim refocillati ac respiciētes, ex improviso deinceps usq; ad remissionis tēpus perueniunt, in quo tū corporis curationē, tū sufficientē ordinabimus cibū. Vitabimus autem omnino in his qui hac affectione sunt apprehēsi, longiorē cibi dilationē ac inediā, & ne alternis tantū diebus cibū offeramus. Verū solerti rationatione facta, singulis horis simplicissimum modicumq; cibum dabimus. Assidui enim bulimi & exoluūt & in animi deliquia incidunt, quibus aegrē auxillum reperitur.

De animi deliquio, ex Philumeno. Cap. VII.
Animi deliquium siue in febribus, siue extra febres contingat ex praemanifesta causa, uelut est, plurima sanguinis aut uētris excretio, aut assidua surrectio, aut motus, aut dolor, aut timor; auxillum fert ex causarū ablatione, de quibus absolutissimē in febriū tractatu à nobis est praedictū, quāto uidelicet Sermone. Dicitur autem summam, & paucis etiam hoc loco de hīdem. Frequentes igitur surrectiones eis prohibendae sunt, & acuatim facta euacuatio cohibenda, doloresq; mitigandi; causae etiam quae timorem inducunt soluendae, siue forinsecus accedant, siue ex humoribus in corpore oboriantur. Extremae corporis partes animi deliquis irruentibus constringantur: cucurbitae etiam aliquando tum posterioribus, tum anterioribus stomachi partibus affigantur, & in latus etiam apponantur. Caput autem agitatū leui manus impositione cum coarctatione etiam cōprimatur. Odoramenta quoq; offerantur, & apertis oris digitus aut penna immittatur, facies uero ac stomachus uehementissimē fricetur. Hoc enim modo praecurati refocillantur, uiresq; recolligunt, neq; in periculum animi deliquij incurrunt. Reuocatis autē, si quidē febre careant, cyathi III. aut IIII. frigidae aquae in potu exhibendi, quam tamen paulatim & per interualla absorbeant, aut cremorem palmarum, uuarum passarum, malorum cotoneorum, rosarū, aut pampinorum, aut alicuius consimilis, aut uuae acerbae nondū maturae succum cum frigida aqua. Aut mentae ramulos tres tritos cum mali punici dulcis siue acidi succo praebeto absorbendos: aut polentam cum punici succo. Forinsecus autem stomacho ea imponenda sunt quae supra ad cardiacos & bilem uomentes sunt descripta.

De his, qui in balneo animo linguuntur. Cap. VIII.
Qui in balneo animo linguuntur, aut magis animo linqui inelplunt, eos celeriter educere oportet, neq; multa aquae infusione humectare. Qui autem iam inciderunt, celerrimē exportandi sunt: & reliquum quidē corpus leui quopiam uelamine cooperiendum: facies uero spongia frigida imbuta madefiat, aut frigida aspergatur. fricanda etiam facies, stomachusq; & pedes: os quoq; aperiendum pennarū aut digitorū immisione, omniq; modo conandū quo humor ipsius animi deliquij autor euomatur, aqua tepida ori instillata. Esi enim nihil inde euomant, stomachus tamen irritatione firmatur, quae animi deliquium soluit: auxiliatur etiam ad oris apertionem auditoriorum meatum cōpressio, similiterq; ossium quae à petrae duritia, lithoidea, hoc est, petro-

sa appellantur. Qui uero uilioris sunt conditionis etiam alapis sunt caedendi, capillorum quoque facta euulsione. Et uociferatio quidem unius, utilis est: multorum autem & simul edita, nocet. Cæterum à uehementi animi deliquio cōualescentibus, tū in calidam, tum in frigidam aquam demissiones, uelut mortis causae timendae. Aut enim laxatis corporibus, calore discusso & resoluti pereunt: aut à frigidi- tate adstrictis, extinguuntur.

De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione, ex Galeno. Cap. IX.

Quae supinitas stomachi appellatur, ex intemperie quacumq; tandem oboritur, nullis humoribus uitiatis. Oboritur etiā ex multitudine humorum, nulla tamen maligna qualitate accedente: stomachus enim à largo humore fortiter madefactus, ad similitudinē amplitudinis totius uētris laxatur, adeo ut cibus obuolui, eosq; contegere non possit, & propterea circa ipsum humores supernatant, quos ubi uentriculus abrumpere omni impetu annititur, anxietatis accessionem perfert, ac prius quā cibus praebetur, extremae imbecillitatis. Facilius autem haec affectio curatur, inter reliquas stomachi affectiones longo tempore perseverantes. Opus uero habet pharmacis humorem desiccare ualētib; cohibereq; ac adstringere laxatum corpus. Itaq; si in profundum usq; humiditas extendatur, & crassa tenaxq; existat, pharmacum miscere oportet extenuatorium & uelut consumptiuum, quale est acetum & acētū multum. Si uero eiusmodi humiditas non existat, neq; in profundum usq; corporum extendatur, adstringentia sola ad curationem sufficiunt. Magnum autem signum ad cognoscendum, frigidane sit an calida haec affectio, sensus aegri praebet: siquidem aut nullam, aut aliquam sitim perceptet. Supinitates igitur stomachi ex uitiatis humoribus oborte, picra curatur, quemadmodum paulo post dicitur, utpote quae cellerrimē uitiatum humorem repurgat. Subuersiones uero & nausae ex imbecillitate stomachi factae, per intemperiei correctionem sanantur, & per incumbētis humiditatis desiccationem. Si quidem autem calida affectio existat, carapotia ad ipsa & sitim tollentia exhibeantur, quae ad eos qui stomacho exuruntur sunt descripta, & maxime quod ex rosis, spica nardi, & radice dulci constat. Ad frigidiores uero & humectiores affectiones conueniunt subscripta. Asclepiadae, ad stomachi subuersiones. Succus acinorum mali punici acidi sextarios III. succus mentae sextariū I. conijce in uas fictile, & decoque assidue agitando, & ubi coacti fuerint ablatis recodito, & ante cibum mystrum unum aut duo exhibeto. Aliud. Vuam acerbā immaturam arefactā, contusamq; & cribratā in promptu habe, & cochlearij mensura ex aquae frigidae cyathis duobus praebet. Aliud, quod calidioribus dispositionibus magis commodū est, si cut etiam praecedens: Mala punica matura & in uigore perfecta quinque aut sex numero, integra una cum putaminibus contunde, & infusis aquae pluuialis sextariis tribus usque quo ad tertias omnis liquor redactus fuerit decoque, exprime, ac percola, liquoremq; expressum rursus per se decoque, donec ad mellis spissitudinem redigatur: ac inde cochleare unum aut duo exhibe: his qui febre carent, cum uino: febricantibus uero, ex aqua. Aliud ualde bonum

num; Succo mali punidacidi, ac intubi, æqualibus portionibus permixtis, mentæ siccae tenuissimè tritæ, parum quiddā inspergè, & cyathi mensura bibendum præbe. Idem facit oxylapathi semen tritum ex aqua potatum: similiter & semen portulacæ. Vere etiam confidenter ad stomachi subuersiones, amazonum pastillo, & eo qui alter appellatur, quorum compositionem paulo post in nausæ tractatu describo. Vere quoque cataplasmatibus & epithematibus, quæ mox post sermonem De nausea describentur.

De nausea, ex Galeno.

Cap. x.

Nausæ ex uitioso humore tum calido, tum frigido gignuntur. Qui in uentre continetur, aut in concauitate ipsius innatat, aut in tuniculis eius infartus instar uisci adhæret, atque ægrè auelli potest: aut serosior & medicatior existens in ipsis uentriculi tuniculis, uelut aqua in spongia, imbibitur. Atqui eiusmodi humores ex uentris intemperie tum calida tum frigida aliquando generantur. Aliquando autem ex alijs partibus prius affectis in ipsum uentrem, uelut excrementa illarum confluunt, utpote ex hepate, aut splene, aut capite, aut ex uniuerso corpore. Quando igitur aliæ partes prius afficiuntur, omni modo uniuscuiusque propriæ accessiones concomitantur: & ipse æger primum affecti membri læsionem sentit: aut enim caloris sensus iuxta affectum membrum ipsi contingit, aut frigoris, aut grauitatis, aut etiam tactui nostro durum succubit. Si uero uniuersum corpus uitiosis humoribus repletum est, id ipsum ex colore, & eruptionibus papularum circa cutem cognoscitur, atque ex ipsa adeo urina. Quod si nihil horum adsit, certum est uentrem ipsum aliquo modo egrotare. Si itaque cibi in uentre nidorosi sunt, nullo huiusmodi cibo assumpto, uelut sunt pisces, aut oua in sartagine fricta, aut alij cõsimiles, necesse est rationari causam calidam esse, quæ hoc in uentre operatur. Si uero accescunt in uentre cibi, nullo huiusmodi cibo sumpto, uelut sunt pisces, aut oua in sartagine fricta, aut alij cõsimiles, necesse est considerare frigidam causam esse, aut atræ bilis humorẽ uentrem infestantem. Manifesta autem erit cognitio & scientia causæ, quā habes suspectā: frigidis enim pharmacis cibisque ac potibus statim adiutum hominem uidebis, si quidem calida dispositio extiterit. Si uero frigida, calidis cibis & pharmacis iuuabitur, à frigidis uero lædetur: cæterum & sitis ad calidam affectionem concomitatur: sitis autem ferre in totum carent, qui frigidam intemperie habent, nisi falsa sit pituita. Atqui ex diligenti uomitus inspectione eiusmodi quoque cognoscuntur affectiones. Si enim intemperie quadam uenter afficitur, assumptos cibos ad intemperiei naturam permutat, ut appareant uomitu redditus cibi, citra alicuius humoris complexum, in nidore aut acorem permutationem suscepisse. Si uero humor quispiam uitiosus amplitudini uentris innatet, & cibum corrumpat, ipsi cibi manifeste eiusmodi humore madefacti apparent, & in illius naturam permutati. Quum uero cibi amplitudini uentris innatent, humorẽ ipsum assilientem producunt, qui ubi infartus, aut imbibitus, ut dictum est, in uentris tuniculis fuerit, si quidem calidus sit, siticulosos facit, & ciborum inappetentiam inducit: si uero frigidus sit, ciborum appetentiam excitat, & sitim extinguat. Nausæ autem utriusque accedunt, & inanes uomendi iritationes, quæ lancinant tantum, & nullum

humorem educunt. Prædictum autem & antea est, quod si tenues humores & uenenosi existant, quos etiam Græci *χρημα* hoc est, serosos appellant, per profundum solidorum uentris corpusculorum procedunt, & uelut aqua in spongia imbibuntur. Si uero tenaces sint, circa internam uentris superficiem uisci modo adhærent. Serosi itaque humores, utpote tenuium partium existentes, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum, uomitum inducunt, perpetuo nimirum motu uersati. Qui uero superficiem uentris infartus adherent, ante cibum magis inanes uomitiones mouent. Diligenter itaque considerare oportet, num uentris tantum affectio hæc sit, aut alicuius alterius membri. Deinde qualis affectio existat, an calida, aut frigida, humidæ aut sicca. Et si quidem ex alia quadam parte, aut ex uniuerso corpore humores in uentrem confluant, priorem curam membri prius affecti habere oportet: ita tamē ut neque uentrem ipsum negligamus. Qui enim primum affectam particulam curat, uelut fontem omnium in uentrem influxionum excindit. Ventre autem solo affecto, dispositionis in ipso qualitate cognita medebimur. Calidam itaque intemperiem semper refrigerare oportet, in quocunque tandem membro existat, frigidam autem calefacere: eodemque modo humidam desiccare, & siccam humectare. Innatantes autem amplitudini uentris humores euacuari, siue per uomitum, siue inferne per aluum commodus id fiat. Qui uero in tuniculis uentris infartus adhæret, aut imbibitus est uitiosus humor, per repurgantia ipsumque incidentia ac euacuantia pharmaca est curandus. Intemperaturæ enim in humoribus consistentes pharmaci humores euacuantibus opus habent. Qui uero absque uitiato humore, ab intemperie sola quacunque tandem, maxime tamē calida & sicca infestantur, in tabe omnino perueniunt, pharmaco euacuante purgati, etiā si exhibitum pharmacum imbecillus existat: quale est ex aloë picrum appellatum. Quomodo igitur unamquamque intemperie, siue simplicem, siue mixtam curare oportet, iam prædictum est in quarto huius tractationis Sermonedictur tamē oportune & hic de eadem re, sed paucis. De intemperie frigida. His itaque qui ex frigida intemperie afficiuntur, pharmacum ex tribus piperis generibus commodum existit, aut quod ex calaminta constat, aut aliud quoddam cõsimile, ex uino tenui aut aqua potatum. Forinsecus autem stomacho mastichæ chiā, unguento nardino dilutā & tritam, purpureaque exceptā lana imposito. Vinum uero exhibendum est rufum, subadstringens & uetustius, & cõsimiles etiā cibi. De intemperatura calida. His uero qui à calida intemperatura afficiuntur cum mediocriter adstringentibus & refrigerantibus forinsecus stomacho ac uentri adhibitis, medeberis, ita ut quanto magis calor excellat, eo amplius refrigerantia adaugeas. Cibum autem exhibebis haliçā ex uino albo & tenui, & subadstringente: ex uolucris, macras & non foetidas, ac quæ his cõsimiles existunt. Si autem humor tenuis biliosus aut serosus in uentris amplitudine continueatur, tenuissimo pilasque succo exhibitio uomere cogimus, digitis aut pinnis immisisis. Aut aloë dra. i. cum aqua tritam potandam damus: calidorum enim in uentre humorum optimum pharmacum est aloë, & in una sæpe die stomachicos sanat: si uero pituitosi aut uiscosi & crassi humores amplitudini uentris innatent, aceto mylso utendum est, in quo ex incidentibus.

ciddibus, ac repurgantibus, mediocriterq; calefaciē-
tibus quēdam sunt decocta: his uero quibus uisiosus
humor intrinsecus circa superficiē uētris infartus ad-
heret, ut egrē auelli possit, ex aloē picra appellata cō-
posito utilis existit, quæ uiscosum humorem repur-
gare cōsuevit, crassumq; extenuare, per uires eorum
quæ cū aloē sunt cōmixta: quod si serosa humiditas
tuniculis uentris sit imbibita, quæ ut prædictum est,
non solum ante cibum, sed post acceptum etiam uo-
mitus mouet, primum Amazonū pastillus cōueniē-
ter exhibetur, qui picræ est subscriptus. Mediocriter
enim per hunc uomitibus prohibitis, deinde ex aloē
picra appellata utimur. Culus cōpositio hæc est:
Aloēs drach. c. xylobalsami, mastiches, croci, spicæ
nardi, asari, cinamomi, cuiusq; drac. vi. cōtere & re-
pone arida, & exhibe perfectō pondere scrupulorū
xii. ex aquæ frigida aut calida cyathis xii. Andro-
machus ad prædicta etiam floris lunci odorati drac.
vi. adiicit: & aloē lotā cōijcere iubet. Verū quod
cognoscere operæ precium est, ad uētris subductionē
illota aloē cōuenientior existit: quæ enim lora est,
multū à medicamentaria facultate deponit: quā cōfi-
dentius etiā exhibere quis possit, eis qui nō ualde fe-
bricitat, & quibus firmitatē uentri addere uolumus.
Quare scire oportet ex uitiatīs humoribus affectio-
nes circa stomachū & uentrē, per pharmaca ex aloē
utiliter subduci & euacuari posse: quæ in maximam
perniciē perueniunt per adstringentiū eduliorū, po-
tionū, ac pharmacorū exhibitionē. Asclepiades autē
picrā eodem quo Themison modo apparare iubet.
Habet autem hoc modo: Aloēs dra. c. mastiches, cro-
ci, spicæ nardi, asari, cinamomi, cuiusq; un. i. & pro
xylobalsamo carpobalsami unc. i. cōtundito ac per
angustissimū cribrum excutito, siccumq; ne in aērē
transpiret adseruato, & drac. i. tantū ex frigida præ-
beto, nisi menses ciere uelis, nam tum præstat præbe-
re ex uino. Educit mēstrua foeminarū: facit & ad uul-
uæ affectiones: propriē autē ad stomachi subuersio-
nes: conducit hepaticis, affectionibus renū atq; om-
nino admirandā potentiā habet. Ad refrigeratos au-
tem & qui pituitā crassā & uiscosā in uentre ha-
bent, subiectū pharmacum cōmodum existit. Calefa-
cit enim & extenuat ac diffecat crassitiem, uiscosita-
temq; repurgat. Habet autē hoc modo: Corticis ra-
dicis foeniculi uiridis sexuncē, acetū sesquifextariū,
aloēs quadrantem. Cortex cum aceto ad tertias deco-
quitur: deinde percolato aceto mellis atulci unc.
xv. adiungimus, & ad mellis crassitudinē coquēdo re-
digimus, & cōtritæ in mortario aloē paulatim hoc
ipsum acetū multum coctū affundimus: postea uero
simul unita tollimus, ac utimur. Datur ad summum
mensura cochleariorū trium. Alia cōpositio quæ
dulcis appellatur. Aloēs septuncē, iridis sextantē,
mastiches sesquunciam, nardi celticę uncia unā, pipē-
ris drachmas quatuor, myrrhę dra. iiii. acetū choeni-
ces septē, cyathos septē, mellis libras tres, sextarium
unū, corticis radiceū foeniculi libras tres. Corticē foē-
niculi in aceto præmaceratum ad tertias decoque &
percola, residuoq; aceto mel adijce, ac rursus deco-
que usquequo probē cogatur, deinde sicca in morta-
rio simul ammisce, & cochleariū unū exhibe. Cōdu-
cit frigidioribus temperaturis, & aluū pituitosiorē
mediocriter soluit, & caput leuius reddit. Amazo-
num pastillus. Facit ad uoluulosas stomachi sub-

uersiones. Voluulosas autem fortes stomachi sub-
uersiones appello, quemadmodū enim in uoluulis
uomitibus cum uehementi cōtentione fiunt, & sterco-
ra reuomunt: ita etiam alios uomitus cōcitatos uol-
uulosos appellare possumus. Consequuntur autem
huiusmodi uomitus, ubi magna molestia affectis
membris à serosis medicamentisq; ac uenenosīs humori-
bus est illata: & si aliquo modo imbecillior fuerit
uēter, geminatur malū ex mordacitate. Quapropter
ita instruenda curatio est, ut simul odoras qualitates
affectis membris offeramus: quales sunt aromatum
quorundam & seminum in ciborum usum uenien-
tiū: uelut est anisum, & apiū, & similia. Quemadmo-
dū enim graueolentia omnia stomachū subuerrere
consueuerunt: sic odora corroborant, maxime quæ
nobis sunt familiaria, & in cibo accipiuntur. In quib-
us itaq; cōiectamus serosos humores in uentris tu-
nículas imbibitos esse, his hoc pharmacū magis con-
ueniet. Quibus uero circa superficiem uētris tunicu-
larum infartū adherent, eis picra utilis exhibetur.
Quod si exhibitā picrā reuomant, cōiectare opor-
tet mixtā esse affectionē, & tū tuniculis imbibitos,
tum superficiē infartos humores, in uentre abunda-
re: quare utile fuerit pastillum præbibendum exhi-
bere, ut mediocriter uomitū prohibeat: deinde autē
pharmaco picro uti. Est autem pastilli cōpositio hæc:
Seminis apij drachmas vi. anisi drachmas vi. comæ
absinthij dra. iiii. myrrhæ drach. ii. piperis drac. ii.
opij drac. ii. castorij drac. ii. cinamomi drach. vi. in
pastillos fēdigito, & ad summum drach. i. exhibeto.
Ego uero, inquit Galenus, præscriptum pharmacū
citra myrrhæ admixtionē apparare cōsueui, ob me-
dicamentariā eius uim, piperis pro eo cōijciens dra.
ii. ita ut in uniuersum piperis drach. iiii. accipiātur.
Datur stomachicis ex uini diluti cyathis iiii. Chole-
ricis autē siue bilem effundentibus ex aqua frigida.
His autem qui cibum reuomūt, si quidem siticulosi
fuerint, & calor sensus eos circa os uentris infestet,
& sanitatis tempore frigidam bibere sint aduerti, si-
militer ex frigida præbe: si uero non ita habeat, ex
calida. Coeliacis, & ad intestinorum tormina ex de-
cocto myrti, splenicis cū acetū multū cyathis tribus.
Asclepiadæ pastillus inexuperabilis, aster appella-
tus. Pharmacū quod prosperē accōmodatur, dolorē
leuans, somnum inducens, multæ omnino utilitatis:
etenim morbos circa stomachum mirabiliter sanat,
acidos ructus & difficilem concoctionē aufert, inte-
stinorum tormina, & uoluulos, inflationesq; curat.
Prodest hic pastillus ad capitis dolores potatus, &
aceto dilutus forinsecus frōri illitus. Ad dolores au-
rium facit perdicij succo liquefactus: facit & ad densi-
tū dolorem tritus & galbanō exceptus, aut fici suc-
co, & cauernę inditus. Ad oculorū affectiones & flu-
xionū impressiōes passo diluitur, & lana ex eo irri-
gata imponitur. In tonsillarum affectionibus tepesa-
ctus ac dilutus ex aqua mulsa præbetur gargarisan-
dus. Vtilis est ad omnē sanguinis fluxū uino. myrti
te dissolutus. Ad destillationē inueteratasq; & recen-
tes tussis affectiōes, uino scybelite aut thereo eliqua-
tus. Prodest suppuratis, & phthisicis marrubij deco-
cto liquefactus, prodest dysentericis, cholericis, &
sanguinē reiectantibus, sanguinariæ succo dilutus
prodest ad omnium reptiliū plagas ex rutę decocto
potatus. Soluit per circuitum, repetentes febriles ac
celiones,

cessiones, si duabus horis ante aduentantem febrem ex uini diluti cyathis III. exhibeatur. Foeminarum menses ciet artemisia succo dilutus ac potatus, facit & ad uelice affectiones uino mulso solutus, quomodo & ad uulue strangulationes prodest potatus, facit ad articulorum dolores & podagram gentiane decocto dissolutus ac potatus. Compositio autem eius hoc modo habet: Castorei, opij, myrrhæ, culusq; drac. III. spicæ nardi, calsiæ, terræ lemnisæ, corticis mandragoræ, culusq; drac. III. croci drach. VI. dauci, styracis, anisi, seseleos, seminis hyoscyami, culusq; dra. VII. myrrham, styracem & opium in uino odorato dissolue; reliqua autem confusa & cribrata insperge, ac simul unita in pastillos redige, ciceris magnitudinem æquantes, quibus in umbra de siccatis utere. Et de pharmacis quidem quæ in potu sumuntur hætenus. Decubitus autem sursum uergens in omnibus quomodocumq; nauseantibus & uomitibus adornetur, in conuenienti & affectioni contraria domo. Quæ frigida quidem sit, affectione existente calida. Contra uero calida, ubi frigida affectio existat. Extremæ corporis partes fricentur, manibusq; calefactis palpentur, quin & uolentius adstringantur, deinde pedes & manus in aquam solito calidior rem demittantur. Odoramenta autem admoueantur naribus olfacienda boni odoris: uelut rosæ, mala cotonea, pulegium, menta, malabathrum, spica nardi. Caput uero fomento olei dulcis frequentius irrigetur: in calidioribus uero ex rosaceo. Stomachus absinthij cremore irrigetur, rosaceo in calidioribus amixto: nardino autem in frigidioribus, aplo insuper, aut cumino, aut petroselino adiuncto. Ex quibus si nullum commodum sentiat, ad cataplasmata ex palmis transeundum, quæ paulo post dicentur. Conueniunt etiam ea quæ aloën, absinthium, & mala cotonea accipiunt, & aliquando quoq; alumen. Idem præstant & cerata ex his apparata. Si uero inflammatio circa præcordia existat, communia cataplasmata adhibeantur. His qui stomacho exuruntur, frigida etiam aqua quam plurimum decocta, deinde rursus refrigerata absorbenda præbeatur, ita ut cyathi unius mensura, aut duorum, aut etiam trium, paulatim tamē absorbeatur. Colluta etiam & in ore retenta, nausæas tollit, his quibus propter obstaculum aliquod potus eius negatur. Eodem modo assumitur posca diluta. Portulaca etiam comanducata, & ossa myxarum, & cucumeris semē cochlearij mensura mirabiliter prodest. Porro affectione diutius permanente, & cibis præ morbo non retentis, cucurbita ad os uentris cum plurima flamma affigatur, donec locus rubescat, atque ipsa adhuc affixa cibis præbeatur. Ad quotidianas autem nausæas, & accensum cibum, ac uomitus, coriandri semen tenuissimè tritum, cochlearij mensura, ueluti farinam aquæ inspersum bibendum præbe, aut mastiches cochleare ex frigida aqua, aut lactucæ albæ semē cochlearij mensura ex aqua, præbe his qui stomacho exuruntur.

Cataplasmata & epithemata ad nausæas & uomitus. Cap. XI.

Cataplasmata ad eos qui cibum non retinent, quos ueteres propriè stomachicos appellauerunt. Farina fœni græci, & malux semen aridum tritum, mellis commisceatur. Si uero præ duritie contundi non possit, malux semen, ipsum decoctum & tritum mo-

dico oleo adiecto in malagmatis formam reducto, & uisor. Aliud. Lolij & irionis farinam subige cum melle, & pro oleo liquidam picem ammisce. Ceratum autem conuenit ex olei irini sece, ceræq; ac modico castorio. Aliud ceratum. Ceræ quadrantē, olei irini sexuncē, galbani unc. I. opopanacis dra. III. castorij dra. III. Opopanax aceto teritur. Manifestū est autem talia in frigidis dispositionibus adhiberi. Cæterū epithemata hæc ad prædictas affectiones per experientiam, ut Galenus inquit, conducunt: nō modo eorum qui ea descripserunt, uerum nostro quoq; iudicio comprobata. Asclepiadæ epithema ad stomachi subuersiones & choleras, siue bilis effusiones. Oenanthes, croci, florum rosarum, sertulæ cæpanæ, mastiches, singulorum drach. VIII. cum passis palmis subige, modico rosaceo affuso, & uestis detritæ panniculo excipe, stomachoq; ac uetri impone. Aliud. Oenanthes, omphacij, florum rosarum, mastiches, singulorum drach. III. aloës, aluminis scissi, utriusq; drac. III. uini dulcis myrtel quod satis est. Trita excipe palmis passis, & utere. Aliud epithema, ad stomachi imbecillitatē, & dolorem, & ad eos qui cibum retinere non possunt. Palmarum passerum sexuncē, oenanthes unc. I. thuris unc. I. mastiches unc. I. ceræ lib. I. unguenti nardini aromatis inspissati libr. II. uini quantum sufficit. Palmas in uino ueteri maceratas optime cōtere: deinde mastichen & thus unum quodq; per se optime tritum adijce, ac rursus simul tere. Liquefactæ autem cum unguento nardino ceræ oenanthem tenuissimè trita insperge, simulq; unita & refrigerata ad reliqua in mortariū conijce, & probe remollitis utere. Aliud epithema, ad stomachi subuersiones, & circa ipsum uexationes, facit & ad particulares inflammationes. Oenanthes bessem, croci, rosarum siccarum, sertulæ campanæ, mastiches, ramentorum electri, sin. dra. III. carnis phœnicobalanorum quadrantē, uini myrtitis quantum sufficit. Arida cōtunde & per angustissimum cribrum excute, & uino myrtito diluta ad cerati crassitudinem rediget. deinde palmarum carnem adijce, simulq; contunde, & cerato ex oleo rosaceo apparato excipe. Post uero lineteolo infarum ad os uentris impone. Prodest etiam oculorum inflammationi.

De cholera seu bilis effusione. Cap. XII. Cholera appellatur quum ob multas cruditates uomitus biliosus & nidorosus & acidus oboritur, ad plures horas continuè perseverans, & uenter inferne eadem excernit, sequiturq; sitis, & exudatio, & impeditus pulsus, musculorumq; manuum ac pedum, maxime uero surarum contractio & tensio. Si quis igitur mox in principio, aut coaceruatim, ea quæ efferruntur cohibere aggrediatur, is maioris mali autor erit: inutilia enim quum sint, euacuatione opus habet, quare conuenit si nō sponte ferantur, oportunè fricare, aqua tepida exhibita, ac egro uomere iussos aqua enim multa mordacitate operatur, torsionesq; auget: aqua uero oleo mixta, auget fluxiones. quare aqua tepida potata uomant, quotiescunq; quidē cibis nimium fuerint expleti, prius quam illi corrumpantur. Adiuuare etiam oportet per sedem excretionē: aluū enim uelut uenenū insidens, & uentrem ac intestina rodit, & humores ex uniuerso corpore ad trahit. Per uomitus itaq; oportunā prouocationē, uomitus ipse soluitur & cessat. Quū uero humorū excretio

excretio quæ fuerit: colliquamentū autē & tabefactio-
nis signa in excrementis ipsis appareant, ueluti si sint
rasuræ similia, strigmenticiaq; & mucosa, & gracili-
tas per ambitum corporis fiat, & maxime si uenter
confidat & adstringatur, pulsusq; imminuatur ac
præter modum condensetur, tunc sanè uentrem co-
operire & fouere oportet, membraq; & artus ac mu-
sculosos similiter locos, oleo multo calido impin-
guare, & uinculis adstringere extremas corporis
partes. cataplasma quoq; uentri imponendū ex pal-
mis & oenanthe, quibus hypocisthis, & acacia, &
rhus ruber, & malicoriū sint ammixta. In potu ue-
ro frigida aqua cyathi mēsurā præbeatur absorben-
da: cauendū tamen ne nimīū frigida existat. Acerua-
tim enī exhibita reuomitur: & quæ ualde frigida
est, aliquando innatum calorē stupore suo extremē
offendit, aut inflammationem stomachi aut uisceris ali-
cuius efficit. Inspergantur autem aliquādo aquæ sor-
bendæ pampini uitis, aut mali punici succus modi-
cus instilletur. Si uero & hoc reuomat, crassa etiam
sorbitiō ipsa faciēda est, per micarū intritionem, &
per cochleare exhibenda. Etenim si acruatim deuo-
retur, aut reuomitur, aut infrā detrahitur. Anniten-
dū est etiam ut priore sorbitione uomitū relecta, rur-
sus altera exhibeatur: dandus itē mali punici succus
cū mentæ succo absorbendus, micis minutissimē tri-
tis adiectis. Sit autē acidi mali punici succus, & mul-
ta quantitate mentæ succum excedat. Quod si acio-
ra sint ea quæ excernuntur, cucumeris semen mace-
ratū, desquamatū & tritum ex aquæ cyathis III. præ-
beatur: datur etiā utiliter cum amylo. Post uero som-
nus procurandus, & quies omni modo. At uero ubi
intolerabilis effusio existat, & pulsus emolliatur,
apprehendatq; frigiditas & exudatio, aliquādo etiā
singultus, ad uinum transeundū est mediocriter ad-
stringens, neq; uiribus ualidum, & quod dulce quī-
dē sit, non autem odorū. Interant autē in ipsum mi-
cas, aut halicā inijciant, si fieri possit, calidū, si uero
non, frigidū: atq; ita paulatim & per interualla co-
chleare absorbeant. Sitim uero arceat polenta tenuis
sine sale uino diluto inspersa & absorpta. Vini mul-
titudine uitanda est, ac omni arte conandū ut ipsos so-
piamus, ex rosīs ac myrto domus paulimento cōstra-
to. Odoramenta quoq; naribus admoveantur, mala
cotonea, & similia. Reliqua autem omnia eo modo
adhibeantur, quo supra in æstuatibus febribus est præ-
dictum. Illusiones etiam soporiferæ circa frontē assu-
mantur. Aluo autem adhuc egerente, amyllum cum
decoctione capitum papaueris per clysterem infun-
datur: simul enim & cohibet & refrigerat, & som-
nū inducit. Ad uomitus uero coercendos cōmandu-
care cōuenit, succumq; deuorare, mespilorum, malo-
rū cotoneorum, pyrorum crustum minorum, & uuæ,
maxime quæ uinaceis interpositis seruatur, & pensi-
lē quoq; unā cū uinaceis expedit manducare. Ad cō-
tractiones autem in musculis factas, uestis detritæ
panniculi oleo calido madefacti conueniunt, contra-
ctis musculis impositi: & cerata humida aliquando
castoreū accipientia, & ex sicyonio aut irino oleo fa-
cta. Quibusdā eorum etiam maxillares musculi do-
lent: quos quum lana operire non sit facile (est enim
inlucundum, & sudor quoque inde elicitur) illitio-
nibus leniter factis molliores reddere oportet. In ci-
bo exhibendi sunt pedes suilli cocti, pulli columbi-

ni & gallinarum, perdices, palumbi, turdi, & consi-
miles his existentes. Asclepiades autem cholerici
eiusmodi electum planè remedium describit, inutili-
bus tamē omnibus prius sufficiēter euacuatīs. Bacca-
rū myrti nigrarum exactatarū Italicum sextarium
unum, florū rosarum tantundē, carnis palmarū nu-
mero uiginti, aquæ potabilis sextarios sex. decoque
ad tertias, & expressum ac percolatū liquorē rursus
per se decoque, donec ad sextarium unū redigatur:
cui deinde passi myrtiæ sextarium unum affunde,
rursusq; decoque donec ad mellis crassitudinem co-
gatur, & utere. Datur ante & post cibum cochleari
mensura. Vtere etiam ad hos potionibus & epithe-
matibus ad stomachi subuersiones præscriptis.

De stomachi adstrictione.

Cap. XIII.

Oboritur aliquibus post cibum acceptum, circa cōco-
ctionis & digestionis tempus, stomachi adstrictio
itemq; alui. æstuat autē uniuersum corpus, maxime
uero manuum ac pedum extremitates: & facies ipsa
rubescit: pulsus autē in densitatem permutatur. Hos
multi etiam febricitare existimant. Nocumētū au-
tem omne circa digerendi alimenti difficultatem cō-
tingit: consistit enim ut plurimum in aridis & con-
densatam habentibus carnem, spiritu circa uias con-
cluso & coarctato: utpote qui per uapores ab alimē-
to prodeūtes inspissatur, & ob id quod non effletur
immodicē concalescit. Curantur autem hi in princī-
pio quidem constrictione & colligatione extrema-
rum corporis partium, frictioneq; brachiorū, crū-
riumq; ac coxarum: sæpe etiam extremitatum com-
pressionē, ita ut præcipiamus ipsis ut desideant, &
decubitus quoque formā erectiorem faciant. Quos-
dā & lectica gestare expedit, donec alimentū omni-
no subductum digeratur. Ante augmenti tempus di-
ligentiore totius corporis curatione utēdum est, stu-
dio adhibito ut carnem mollem & humectam red-
damus. Vtilis itaque eis tunc ex oleo inunctio exi-
stit parum nitri habens admixtum. Inclīnante autē
morbo & ulgore præterito, aquæ infusio ad manus
pedesq; lauandos commoda est, quo tempore ali-
quando & calidæ plurimum potum non improbo:
nos enim remittente morbo, & paulo longioribus
existentibus interuallis, plurimos ante cibum laui-
mus, & uehementer iuuimus. Perfectiore autem de-
clinatione apparente, etiam uinum exhibendum est,
quo tota affectio corrigatur. Cibi autem sint facile
digestibiles, & quibus cōcoquendis corpus sufficit:
quos diuidere etiam conuenit, maxime si bis cibum
sumere sint adueti. Quod si in uisceris inflammatio-
ne, adstrictionis stomachi accessio contingat, illam
ipsam prius curatione aggredi ac demoliri oportet,
per fomentum & cataplasmatum adhibitionem.
Cæterum hæc ipsa adstrictionis stomachi accessio
frequentius in eis apparet, qui hepar præter naturā
dispositum habent.

De humoribus à capite in uentrem destillantibus,

ex Galeno.

Cap. XIII.

Capite ex intemperie affecto ut multa generat superua-
canea recremēta, omnibus subiectis organis inde no-
cumentū infertur, recrementis uidelicet ad ipsa dela-
tis, & promptissima quidē ad os & ad nares delatio
existit: deferuntur autē & ad thoracē, aliquibus etiā
ad aures. Delationē autem ad os, stomachus excipit
atq; aspera arteria. De aliorū sanè mēbrorum nocu-
mento

mento, iam prædictū est. Quū uero ad stomachū fluxus deferatur, & frigidus existat, ad frigidā intemperiem corpora perducit, calidus cōtrā in calidam: hic exulcerat quoq; tēporis progressu: in principio uero appetitū nocet & cōcoctioni. Si igitur frigidus fuerit defluxus, tardas cōcoctiones & cruditates efficit: si uero corruptus, in corruptionē adiget cibos: unde nidorosa, aut foetida, aut acida eructationes producuntur, aut etiā alterius cuiusdam quæ nominari non potest, aut etiā nomē habentis qualitatis. Vbi uero altius descēderit nocumentū, etiā intestinum ieiunū afficit, & ad colum usq; pertingit, atq; ad uenarū mesenterij uasa, per quæ ad hepar ipsum alimēti distributio contingit. Et quibusdam quidem deiectione appetitionis accedit: aliquibus uero appetitiones rerum præter naturā, quas appellat caninas, aut etiā ciborū uisiosorum cōcupiscētiæ. Optimū itaq; est in his uelut fontē malorum excindere: capitis uidelicet sanitati prospiciendo: aut si hoc impossibile sit facere, ob uehementiam naturalis intemperiei: omni no tamē eius salutē consulere oportet: indicatiōe ex figura eius accepta, quomodo ei subueniri possit: non em̄ quēadmodū aliqui medici, qui ad omnes diuturnas capitis affectiōes semper ex thapsia & sinapi cataplasma imponunt, sic & te facere uolo. La uacris itaq; multis calidis potabiliū & dulciū aquarum cōsolari eos oportet, discussis simul calidis in capite uaporibus, & omni tēperamēto melius permutato. Nocuius autem est eis usus aquarum natura sua calidarū: quæcūq; em̄ ex eis sulphurentæ sunt, ac bituminosæ, ob caliditatē suā caputibus natura calidis aduersantur. Quæ uero aluminosæ, coarctatione sua caput offendūt. Solis itaq; dulcibus aquis extra læsionē uti poterint. Quicūq; uero ualde calidum ac perustū habent caput, his melius est ut æstatis tempore ungantur optimo rosaceo, ex solis rosas ac oleo omphacino præparato. Aliquādo uero caput euaporationes calidas ex uentre suscipiens, dolore ac intemperie afficitur. Et propterea uētris curā habere oportet, ipsiq; robur indere, ut biliosus humor aut omnino nō cōfluat in ipsum, aut quāmcēlerrime euacuetur, atq; hoc per absinthij, & picræ ex aloë cōpositionis potū. At uero quæ forinsecus adhibētur uētri in his ungēta, moderate sint adstringētia. Tale autē est æstate melinū, hyeme uero nardinū. Aut mulierū ungēta quæ foliaria & spicata appellant. Nam & ipsa calefaciunt ac roborant uentrem. Vere autē idoneum est mastichinū. Quod si non solū caput calidos serosos humores ad uentris locos demittat, sed etiā ipse uenter propriā intemperiem calidā habeat, refrigerantibus edulijs ac potibus & illitionibus semper uti conuenit, ita ut plus aut minus permutatio saltē in his fiat. Similiter autē etiā ubi ambæ partes, uenter uidelicet ac caput, frigidam habuerint intemperiem, calidis quidē edulijs ac potibus et illitionibus uti oportet, uerum ulres ipsorum permutare, iuxta anni tēpora temperamēto ipsorū aucto, aut remisso. Cæterū grauis mixtura est, quū aut in uentrē calidū defluerunt ex capite frigidi ac pituitosi humores, aut in frigidū calidi. Intractabilior est autē ea, in qua in calidū uentrē pituitosi ac frigidi humores deferuntur. Pessima uero ubi cū his etiā uenter supprimitur. Corrūpuntur em̄ humores in uentre morā trahētes, ut & mordeāt ipsum, & uisiosos

uapores ad caput remittāt. Etenim pituita in uentrē defluēs calefacientibus ac attenuantibus opus habet. Os autē uentris ubi natura calidum fuerit, a calefacientibus. Quare conari oportet in his, ut pituita in uentrē defluētē, per ea quæ nō ualde calefaciunt secemus. Quale est acetum mulsum simplex, cuius præparationem inter concoctoria referemus. Quū uero pituitosus humor a capite in frigidū natura uentrē defluerit, huius affectiōis medela facilis est, si mane simplex pharmacū ex tribus piperis generibus cōstans sumatur. Sed & solum piper exacte tritum, aquæ ammixtum bibere licet. At uero absinthij potus ita affectus ualde aduersatur. Pituitosum em̄ humorem ipsorum uentri infarcit. Sed neq; aloë sola per seipsam his prodest. Biliosi enim humoris attractoriam uim habet, non pituitosi. Et propterea bene inuenta est compositio picra appellata, quæ propter aliorū acrium ac calidorum ammixtionē crassos ac uiscosos humores secat. Verū fieri nō potest, ut quis hac assidue utatur, quēadmodū ea quæ ex tribus piperis generibus constat, & similiter quæ ex calamintha. Etenim si omni hora etiam his utatur, qui frigida uētris intemperie laborat, nullum amplius nocumentum experietur.

Dieta conueniens his qui stomachum habent dissolutum, aluum autem adstrictum. Cap. xv.

Grauis & ægre tractabilis cōplexus huiusmodi corporis apparatus ac dispositio existit, in quo dissolutū, & nauseabundū est os uentris, quod stomachi quoq; appellatione uenit: aluus uero est adstricta: quæcūq; enim ipsam ad egerendum impellunt, ea omnia stomachū subuertūt, utq; & in eo cibi innascent, & nauseabundus sit efficiunt, ad quæ necessario consequitur, cibum quoq; non probe concoqui. Si uero rursum ea quæ stomacho grata sunt edulia eis exhibueris, ad tres aut quatuor dies aluus inde adstringitur. His igitur in tempore diēta cōstituēda est, ac in principio quidē exhibenda sunt olera ex oleo & garo condita, & alia quæ uentrem emollire consueuerūt. Postquā uero sufficiens nutrimentum ingesserint, ad extremum aliquid eorum quæ stomachū corroborant, accipiant: uelut sunt poma et pyra, & aliqua mali punici genera, quæ citra acorem adstringunt. ipse autem homo affectus, omnibus his partim experimento cognitis, quodcūq; tandem minime notuum & iucundissimum repperit, eo deinde utatur: neq; tamen multum ex singulis horū generibus acceptandum est, sed quāntū imbecillitati stomachi curandæ suffecerit. Facile enim solubilis aluus ita affectis sit, quando, ut dictum est, a cæteris cibis aliquid eorum quæ stomachū adstringunt comederint. His enim os stomachi corroboratum, ea quæ uentri innascent, deorsum propellit.

De stomachi inflammatione. Cap. xvi.

Os uentris quemadmodum & ipsum hepar, eorum quæ adstringūt complexu semper quidē opus habent, multo maxime uero ubi fuerint inflammata. Si enim per laxantē diētam ac ductū, citra eorū quæ corroborant admixtionem curentur, periculum uitæ incurrunt. Medici namque qui laxante diēta in eis utuntur, uelut est oleum dulce per se, animi delinquentes ipsi autores existunt: neque enim ullum noui stomachicum aut hepaticum, qui in eiusmodi medicum inciderit, seruatum. Oportet itaq; siue oleū sit, quo

quo inflammationem patientes fouentur, siue cataplasma ipsis imponatur: semper aliquid ex adstringentibus amisceretur: uelut est unguentum nardinum, aut melinum, aut ipsum malum cotoneum in oleo decoquere, mastiche simul ammixta. Ceratum autem quo assidue in stomachi inflammatione utor, hoc est. Ceræ tyrrhenicæ unciam unam, unguenti nardinum tantundem, uel quantum sufficit, aloës dra. i. mastiches dra. i. Quod si maiori adstrictione indigeant, ita nimirum imbecillitate & dissolutione existente, ut neque cibos continere possint, omphacii succi sicci dra. i. aut succi absinthii tantundem est ammiscendum: aliquando etiam ambos addere oportet, & tertium quod ipsis conuenit, hypocistidis succus existit, & oenanthes, & rhois rubri succus, iuxta eam quæ adest uide licet dispositionem. Cerati autem amplitudinem augere oportet iuxta proportionem & mensuram reliquorum pharmacorum: uelut si quatuor drachmæ aliarum rerum congregentur, cerati nardinum uncias quatuor esse conuenit, duas quidem ceræ, duas reliquas unguenti nardinum. Quod si durius adhuc pharmacum ipsum appareat, apponendum est unguenti nardinum quantum omnino satis erit. Aliud ceratum. Ceræ trientem, rosacei unci. x. gallarum, aluminis scissi, aloës, florum rosarum, mastiches, singulorum drach. i. Vtere in his qui uehementi adstrictione opus habent. Cataplasmata autem inflammatis conuenientia, fiunt ex hordeo & semine lini, melleque & unguento nardino, modicoque uino, adiecta mastiche & absinthii coma. Ad diuturnas autem inflammationes & iam induratas, magis uaria pharmaca adhibere oportet: quæ & emollientium generis & discussoriorum existunt: uelut est quod fit ex sertula campana, seu meliloto. Compositio autem eius multorum modorum est, propterea quod omnibus iuxta præcordia inflammatis conducatur: magnaque differentia eius sub alia atque alia forma apparati existat: alius enim apparatus circa stomachum inflammationibus, alius inflammato hepatis, aut spleni utilior extat. Epithema stomachi, quod Philagrius composuit, & frequenter apparatur. Ceræ quadrantem, oenanthes unc. i. aloës sextantem, mastiches sextantem, ammoniaci thymiamatis, bdellii, cuiusque unciam i. adipis anserini trientem, styracis unc. i. oesypi bellem, olei rosacei libras ii. uini quantum sufficit. Stomachicum contusum, Andreæ Comitis. Cypheos, styracis, terebinthinæ, cuiusque quadrantem, bdellii, aloës, mastiches, cardamomi, cuiusque sextantem, comæ absinthii unciam i. propolis trientem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, ceræ unc. x. contunde & utere. Ceratum emolliens & relaxans ad induratas inflammationes. Olei sestarium i. aque cyathum i. adipis suilli recentis sexuncem, ceræ trientem, chamæmeli quadrantem, scille quadrantem, anchusæ sesquicentiam. Epithema ex meliloto, Oribasii. meliloti bellem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, bdellii quadrantem, myrobalanorum sextantem, oenanthes sextantem, cardamomi unc. i. croci, cyperti, iridis, myrrhæ, zingiberis, aloës, amomi, spicæ celticæ, cassiæ, cuiusque unc. i. ceræ librâ i. terebinthinæ unc. xvi. melini, aut nardinum aut rosacei lib. i. Aliquando & succi balsami sextantem, thuris unc. i. Arida contusa & cribrata cum modico uino in pila conterito: reliqua uero in uino diluito, & liquefactis quæ liquefcere possunt, affusisque, omnia simul unito ac utor. Aliud ex meli-

loto, ad omnem præcordiorum induratum inflammationem, & ad colicos ac dysentericos, quod & in Alexandria apparare consueuerunt, quo uti soleo, hoc est: Meliloti, cyperorum, myrrhæ, nardi celticæ, cuiusque unc. i. croci drach. viii. cardamomi drachm. viii. cypheos drach. xvi. ammoniaci thymiamatis drach. xl. terebinthinæ drach. lxxx. ceræ drachmas c. lx. olei cyprini drachmas c. xx. uini quantum sufficit. Epithema ex mastiche. Terebinthinæ dodrantem, ceræ unc. xviii. mastiches dodrantem, adipis taurini dodrantem, mellis lib. ii. rosacei lib. ii. Epithema aliud, ad induratas stomachi inflammationes, & ad omnem duriciem, ac diuturnam in ipso affectionem: in sensibus præsertim & qui uergentis sunt ætatis, experimento clarum. Colophoniam pellucidam sextantem, ceræ puræ unc. i. mastiches puræ unc. i. olei communis coctare unum tantum. Omnia depurata in ollam coniecta super carbones liquefacto, assidue agitando, donec exploratum habueris quod in frigidam aquam destillata in pastilli modum emollire ac cogere possis. Vtere, non contempta ipsius utilitate. Epithema stomachicum ualde celebre, ad stomachi inflammationes & duricias, itemque debilitatem. Micarum filiginearum quadrantem, carnis palmarum pingulum unc. i. meliloti unc. i. comæ absinthii drachm. iiii. mastiches unc. i. aloës drach. iiii. adipis anserini recentis sextantem, ceræ quincuncem, olei amari præ immaturitate acerbis sexuncem, styracis unc. i. pilularum chamæmeli unciam i. palmas, melilotum, chamæmela, ad uesperam in saram maceranda conijcito, & sequenti die lento igni decoquito, exprimito & percolato, atque in decoctio micas maceratas rursus percoquito ac conterito: styracem uero per se cum pauculo oleo liquefacto, atque ita solum micis tritis ammisceto, & ceratum affundito: post uero liquefactis quæ liquefcere possunt, aridisque inspersis simul omnia in mortarium diffundito, ac subactis & simul unitis utor. Ante pharmaci impositionem stomachum ex oleo et modico uino irrigato, in quibus absinthium sit decoctum. Emplastrum ex micis emollientis, relaxans, ac diffundens: facit ad inflammationes in quocunque tandem loco induratas, emollientis, & discutiens, ac firmitatem addens. Radicis althæe lib. i. phoenicobalanorum lib. ii. foeni græci lib. i. seminis lini lib. i. chamæmelorum, melilotorum, singula sexuncem, uini ueteris odorati adstringentis sextarios octo, spumæ argenti, cerusæ, colophoniam, cuiusque lib. ii. ceræ lib. i. terebinthinæ lib. i. olei ueteris lib. ii. aquæ lib. ii. panis filigineis aridi contusi & cribrati lib. v. Herbarum uino præmaceratarum, deinde decoctarum exuccatur, in succo uero panis contusus & cribratus maceratur. Sequenti deinde die spuma argenti & cerusa in aqua teruntur, & adiecto eis oleo, donec non amplius manus inquinant, decoquuntur, eisque liquefacta iniunguntur: atque ab igne ablatis, fermentata panis farina emollita paulatim ammiscetur, assidue tamē omnibus cum spatula agitat: & post in mortarium collectis, ibique primum pistillo, post etiam manibus fortiter emollientis utor. Epithema Nilei, ad induratas tum stomachi, tum hepatis inflammationes. Ceræ lib. i. croci drachm. quatuor. ammoniaci thymiamatis sextantem, rosacei aut nardinum lib. i. Crocum & ammoniacum aceto trita diluito: ceratum autem liquefactum & refrigeratum eis affundito, ac cunctis utor.

De stomacho exulcerato. Cap. xvii.
 Ulcere in stomacho aut uentre existente, omnium acrim
 rerum comestione abstinere oportet: succo autem pista
 nae, aut halicæ uti modico ammixto melle, quo per
 ipsum ulcera repurgentur & extergantur. In cibis
 enim exhibere oportet, aliquando quidē ea quæ ul
 cera repurgant, aliquando autē & quæ dolores mi
 digant, & mordacitatem obtundunt. Post repurga
 tionem uero quæ carne explent, deinde quæ ad cic
 atricē perducunt: uelut sunt ea quæ adstringunt. For
 rinsecus autem epithemata his cōueniunt ex palmis
 & malis cotoneis, ac polenta. Ceratum uero impo
 nendū ex melino aut rosaceo, ammoniaco thymia
 mate, & thure ammixto. Epithema autē eis conue
 nit Nilei. Et tempore inductionis cicatricis empla
 strum ex salicibus, & quod lœseum appellatur.

*De his qui à stomacho, comitialis morbi modo con
 uelluntur. Cap. xviii.*
 Quidam homines ubi diutius ieiunū permāserint, præ
 sertim cum tristitia interim affecti, aut ira concitati,
 aut curis anxie torti fuerint, comitialis morbi acces
 sione compræhendantur, & concludunt cōuulsi. Plu
 res autē eorū qui hoc modo afficiuntur, gracilis ha
 bitus sunt, & assidue bilis in stomacho ipsis efferve
 scit. His sanè stomachus subtiliore sensu præditus
 existens, & cerebrum per consensum affectū, uniuersum
 corpus conuulsionis modo lancinat. Commu
 nis autem consilium omnibus hominibus medicinæ
 quidem ignaris, rationatione autē nō inexercitatis
 subiiciam, ne quēadmodū plerique uulgo homines
 rationis expertū animalium more usuāt, eorūq; mo
 do se habeāt: uerū per experientiam iudicēt, qui cibi
 ac potus eis nocēat: itē quales ac quāti officiant mo
 tus. Similiter autē et circa rei ueneræ usum obseruēt,
 nū innocuus eis existat, an cōtrā nociuus: multos em
 noui, qui ex rei ueneræ usu maximū periculū in
 currerunt. Oportet itaq; hos ipsos bonā & exquisi
 tā cōcoctionē sibi puidere: & tertia aut quarta diei
 hora panē diligēter apparatus accipere: solū quidē, si
 non siticulosi existant: si uero urgēte, ex uino dilu
 to mediocriter adstringente & albo. Hæc enim uen
 trem corroborāt, & caput nō percellunt, quēadmo
 dū fortia facere cōsueuerunt. Exhibere etiā eis opor
 tet ex aloë pharmacum, bis aut ter in anno. A super
 fluis em recremētis totum uentrem repurgat, & ad
 propria munia obeūda efficaciter corroborat. Vidi
 autē & alios in ore uentris comitialis morbi modo cō
 uulsos, quum uehementi cruditate laborassent, aut
 uino multo meraciore se ingurgitassent, aut intem
 pestiuius re ueneræ fuissent usi. Quosdam etiā in
 febribus uidi repente conuulsos: qui bilioso uom
 itu succedente, euestigio ab omnibus afflictionibus
 sunt liberati. Quidam autem ex ita affectis fusca uo
 muerunt: quidam uero porri succo consimilia: qui
 dam à multitudine uisidorum ciborum aggraua
 ti, sensus ac motus priuati munere à sopore grauissi
 mo sunt apprehēsi ac detenti, quousq; ea quæ os uē
 tris compresserāt, omnia euomuerunt. Multis uero,
 nō insomnia modò, sed & somni perturbātes, & de
 liria, ob uisiosum humore in ore uentris congrega
 tum, accesserunt. De Inflatione autē & præcordiali ap
 pellato morbo, nullus est qui non uerba fecerit, quo
 modo uidelicet tristes, et desperātes, & moesto adspe
 ctu reddat, & (ut uniuersum dicam) nulla re ab iis

qui atra bile afficiuntur differētes aut inferiores. Ap
 parer autem & hos uehementius post cruditates præ
 dictis accessionibus apprehendi: plerique autem ex
 ipsis splenetici sunt: quæ res facit ut æstimemus, &
 quendam ex splene confluere in uentrē uisiosum ac
 serosum humorem. Curatio uero his conuenit eadē
 quæ ad affectos ab atræ bilis delirij est prædicta, in
 eo quò de capitis affectiōibus egimus Sermone. Itē
 ea quæ paulò antè est descripta, de his quibus atra bi
 le stomachus infestatur, & qui uentrem habent in
 flatum.

Viridis iaspidis usus, Galeni. Cap. xix.
 Viridis iaspis lapis stomacho, qui & os uentris appet
 latur, utilis existit pro amuleto appensus, cuius rei
 multum experimentum fecimus. Oportet autem si
 lo innexos ex collo suspendere, eo modo ut lapides
 os uentris contingant.

De appetitus perditione. Cap. xx.
 Ventrem natura promptuarium creauit, ueluti terrā
 plantis: dedit & indigētiae sensum, cuius impetu ani
 malia ad cibum ac potum concitata, ijs se explent:
 & uocatur quidē eiusmodi expletionis desyderiū,
 Appetitus. Contingit autem ob indigētiae sensum,
 quum uenæ ex cibis in uentre ad se attrahunt, uelut
 emulgentes & exugētes: quam exuccionem quum
 uenter ferre nō possit, sed inde ueluti diuellatur, hu
 ius angoris remedium cibum exquirat. Itaque exu
 ctionis sensus, ipsa fames existit, & Appetitus appel
 latur, naturale opus, non animale existens. Huius
 modi autem appetitum euacuatio præcedit: & con
 tingunt sanè quinque accessiones ordine mutuo se
 ipsas consequentes: Quarum prima, Euacuatio est: se
 cunda, Appetitus naturalis membrorum euacuatorum;
 deinde per uenas ex uentre Exuctio: post, Exu
 ctionis sensus: et quinta, Appetitus animalis, qui om
 nium postremus existit. Itaq; appetitus perditio
 contingit, aut ob sensus exuccionis uenarum perdi
 tionem, aut quòd exuctio non fiat, aut quòd corpus
 non euacuetur. Contingit autem sæpe etiam ob im
 moderatam uentris & intestinorum fluxionem, &
 ob biliosi humoris in uentrem delationem, tenacisq;
 & acris, ac porri speciem habentis: & ob pharmaci
 portionē: & ob sanguinis immoderatam detractionem:
 & in continuis ac uehementibus febribus, sto
 machi & uentris inflammatione, item hepatis, uen
 licæ & uulue. Contingit etiam in colica & uoluu
 losa affectione. Maxima autem quòd quis non esu
 riat, causā caliditas existit, quæ solida corpora laxā
 do exoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit:
 humida autem diffundit, atq; amplius extendit. A
 plurimis etiam alijs causis appetitus perditio cōtin
 git. Itaq; si iuxta principium morborum accesserit,
 aut iuxta uigorem, quum uires adhuc sustinere pos
 sunt, nihil molestiarum infert: modico enim alimē
 to ægri opus habent. Si uero in declinatione totius
 morbi appetitus perditio accedat, aut in diuturnā
 imbecillitate, aut uiribus debilitatis, aut ex immodi
 ca euacuatione, periculo nō uacat. Augetur autē affe
 ctio hæc & ab ætate. Incōmode enim hoc malo pue
 ri afficiuntur, utpote qui natura uoraces sunt, & assiduo
 fomite opus habent. Quare magnus præter na
 turam excessus significatur, si pueri appetitus perdi
 tione fuerint affecti. Siquidem igitur ex uitiatorum
 humorum præsentia, appetitus perditio contingat
 antequam

antequam aliam curam adhibeamus, delatos in uentrem humores, uomitu reiiciendos præordinabimus. Quod si ægre uomant, sorbitiones exhibere oportet, quæ eiusmodi humores infernè expellere cosueuerunt. Deinde per ea quæ ad hanc rem comoda sunt, corpora ad bonum perducemus temperamentum. Si uero ex uirium imbecillitate appetitus perditio accedat, considerare oportet qualis in temperles uires exoluit: & per contraria eam ipsam corrigere. Si uero ob inflammationem, aut obturationem alicuius alterius membri, appetitus perditio concomiteretur, tum & illius habere curam conuenit. Conandum est etiam ut per odoramenta appetitum reuocemus: per polentam uidelicet posca madafactam, aut uino odore diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pyrorum, aut cucumerum uiridium maturorum cremore. Inunctione item leni & non nimium sedula idem conabimur, ac moderata corporis fricatione, atque etiam pedum ac manuum palpatione ac cōtrectione accuratior. In sessus etiam lumbos ac pectinē amplectentes adhibendi sunt, & aquæ affusiones, ac gargarisationes: absorbtiones quoque aquæ frigide modicæ & dulcis. Ab istis enim moliminibus sæpe ad accipiendos cibos profecerunt, quin & digitorum in os immisione stomachus lancinatus sæpe ad accipiendos cibos est conuersus, quare hoc ipsum tum ante curationem, tum post eam est faciendum: uomuntur enim aliquando biliosa aut pituitosa quædam, quæ perditum appetitum in quibusdā sunt causa, atque ita ab hac accessione eos liberabis. Cibi apparentur plures & uarij ac optimo apparatu, & ultra dulcedinē etiam illicientes & appetitum irascientes: frumentacei in primis generis, ac multi alimēti: uelut est halica ex decocto palmarum, aut prunorum damascenorum lota, aut ex aqua mulla diluta præparata, oua sorbilia, panis ex calida aqua lotus, aut si ita adsueuerint, frigida. Diuitibus autem, gallorum testes exhibendi sunt, & ex uolucris non graucolētes, & macræ ac montanæ: pedes suilli in decoctione plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gustauerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori offerendum est. Omnia autem quæ exhibentur, eiusmodi esse conuenit, ut facile deuorari possint: quæ enim multa commanducatione indigent, in lucunditatem quandam afferunt, & appetitum auertunt. In his uero qui iam prompti sunt, cupidior cibum accipiendi, cōlectare oportet ne sufficientem mensuram excedamus. Considerare etiam oportet, num ob naturalem infirmitatem, an consuetorum ciborum cupiditatem simulent appetitus perditionem: quod si ita contingerit, quantum in nobis est, grauiter oburgatos ad monebimus, ne utilibus negligant obtemperare. Quod si non obtemperent, sed præ alimentum negligenda contabescant, uicissim contemnere ac negligere eos oportet, ac cibum parum deteriolem exhibere: postquam primos affectionis dies, cataplasma ex palmis, malis, cenanthe, absinthio, & aloë stomacho imponere: licebit & ceratis uti ex eadem materia apparatus.

De appetitu canino. Cap. XXI.

Contraria appetitus perditioni affectio est, quæ caninus appetitus appellatur: plures enim cibos appetit, atque quum appetitum cohibere nequeant, in ingerendis nimis cibis modum excedunt: deinde multitudine

eorum aggrauati, & assumptos citra nocumētum ferre non potētes, ad uomitum diuertunt: deinde rursus cibo se explentes, rursus ad uomitum reuertuntur, quæ admodum canes: ex hoc autem aliquando & ad uomendi consuetudinem delabuntur. Sæpeque etiam alijs affectionibus obnoxij fiunt, coeliacis uidelicet & dysentericis, atque aquæ inter cutem: propterea quod prius quam priores cibi sint cōcocti, alios ingerant. Quod si huius accessione causa humor quispiam uitiat & acidus existat, qui os uentris mordeat & iritet, appetitumque exciet: frigidus enim humor uitiat exuentioni consimilem mordacitatem infert, ciborumque appetitionem exulscitat, & affectionis naturalis, quæ fames appellatur, modo corpora ipsa uacua reddit, tuniculis eorum coactis & adstrictis: quapropter & egestionem multam ex ipsorum uentribus procedunt, crudis existētibz nimirum cibis, aut semicoctis. Itaque ubi cognouerimus ab humoribus pituitosis & acidis fieri hanc affectionem, qui in ipsum os uentris impacti, ac uelut aqua in spongiam imbibiti, cogantur & iritent & ad appetitum exulscitent, puerum appellatum pharmacum conuenienter exhibebimus, quod non tantum calefacere potest, sed disseccare, ac repurgare, extrahereque ex profundo oris uentris imbibitum humorem, & per aluum inferne euacuare: quin & robur uentri addit, ut ne facile nocturnum humorem susceperet. Exhibeatur autem pōdere drachmarum quatuor ex uino cum aqua calida diluto: si uero puer hac affectione laboret, & ob amaritudinem bibere nequeat, si quidem possibile fuerit, in cataplasma drac. duas huius pharmaci digeremus, melleque forinsecus oblinentes deuoranda dabimus cum ouis sorbilibus aut ptisanæ succo: quod si neque sic tolerare queat, ea quæ disseccare & repurgare calefacereque possunt, in cibis annectemus: ueluti sunt allia, porri, thymus, satureia, origanum, pulegium, & quæ his similia existunt. Potum autem præbebimus ante cibum multum ac acruatim bibendum, calidum sanè aut certe tepidiorem. Sorbitiones item appetitum destruentes, ueluti sunt pulles cum melle multo & oleo plurimo, aut adipe anserino, gallinaceo aut suillo: ex oleis cōuenit malua, cerebella item & pinguiora uolucris partes, pisciumque eodem modo, & omnino quæ appetitum auertunt, ac satietatem inducunt, & quæ magno cumulo accepta, modicè alunt. Ammiscere etiam cōuenit panibus dum fermentantur acriora & urinam ciētia, similiter & uino quod in potu sumunt, uelut est cuminum, anisum, petroselinum, & quæ eius generis existunt: ad uinum etiam piper & mel & spica nardi ultra ea quæ dicta sunt, coniiciantur. Panis uero non sit recens, neque ualde bene fermentatus. Vinum uero quod bibunt, colore fuluum, substantia tenue, odoratumque, & non ualde uetustum. quod tū ieiunis, tū sumpto cibo plurimum præbeatur, quantum uidelicet bibere possint. Ventrē enim ex calfacit, & humorum destruit acorē, ut sæpe solum suffecerit cum pinguibz & oleosis cibis ad perfectam curationem. Abstinerē autem oportet ab omnibus acidis ac adstringētibz cibis ac potibus, maxime uero à fructibus. Bellaria eorum sint pistacia, amygdalæ, nuges pineæ, colymbades etiam oliuæ exhibendæ ex melle. Conandum est etiam, ut lac ipsis exhibeamus, tum per se, tū cum passo aut melle: ita tamen ut obseruemus ac uitemus in eis, quibus in stomacho acescere consuevit: in his

enim maius nocūmentum quā utilitas consequetur. Probe uero concoctum non solum appetitum obtundit, sed & aluum obturatam emollit, fluxionesq; eius sistit, apparandæ etiam ex ipsa lacte potiones & placentæ, ueluti sunt dulciaria & oryza. Viscera uero cataplasmate hordeaceæ farinae contegere utilissimum existit. Lauare autē per interualla oportet, cuticulamq; ipsorum large pinguefacere.

De canino appetitu, qui ex immodica transpiratione, ac cutis exolutione contingit. Cap. xxii.

Est & alia canini appetitus species, quum uniuersum corpus rariū existens, & per obscuram respirationem exhaustum, præter modum in assidua alimentis indigentia cōstituitur. Cōtingit autē id, aut ex facultatis retentiuæ in toto corpore imbedillitate, quæ cibus dominari nō potest; aut ob plurimi caloris fortitudinē, qui instar ignis cibos consumit, & cutē rarefacit, ac exhalationē efficit. His sanē uētris egestionibus lōge pauciores procedunt, quā pro eorū quæ ingeruntur modo ac proportione. Et stercora quæ egerunt, existunt sicciora. Itaq; pharmacū ex aloē eis insensibilem existit, item extenuatorij generis & discindentes tum potiones, tū cibi. Cutem enim magis rarefaciunt, exhalationē mouēt, ac appetitū augent. Quare eorū qui hoc modo affecti sunt, cutē cōdensare ac spissiorē reddere melius est, cū oleo quopiam ex immaturis oliuis expresso, in quo myrtus, aut rosæ, aut eius generis quippiā ad lentū ignem sint decocta, ad mixto etiā alumine scisso in aceto acerrimo prius trito, intantū ut ad strigmentitiā formam unguentū reduci possit. Abstineant autē à balneis calidis, consimiliq; aëre, ac uini potu, & ab omnibus quæ tum intrinsecus calefacere possunt. Ducantur ad lauacra frigida, si quidem nihil id fieri prohibeat; utpote corporis gracilitas, aut membrum aliquod refrigeratum, thorax nimirum, aut aliud quoddam. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & ægre corruptibiles. Eius generis cochleæ existunt, & totum ostreorum quæ testis integuntur genus, si ex duarū aquarū reiterata decoctione apparētur: & polypi eodē modo. Carnes suillæ in uigore existentes; maxime uero uētres & uulua. Bubulæ quoque pinguiore, & omnia simpliciter pinguis, & quæ uentri innatant, tardeq; concoquantur, ac digeruntur. Ex ouis, ea quæ coquendo sunt indurata, aut sartagine fricta. Et similisgo absque melle ex pinguibus fuscis appaata, similiter & dulciarij panes, & oryza, & panes nō fermentati. Iuxta proportionem autem quantum accessio imminuitur, tantum ex crassi humoris cibus est detrahendum, & ex adstringentibus forinsecus ad motis imminuendum. Aliquando enim sedata uementis appetitus accessione, in aliud grauius malū transido contingit: nimirum quum corpus ex crudis & crassis humoribus repletur.

De uitioso appetitu, ex Galeno. Cap. xxiii.

Vitiosas ciborum qualitates concupiscunt, qui in uentriculis uētris superfluum uitiosum recrementū imbibitū habēt; id autē maxime mulierculis uitioso humore repletis euenire solet, quum uterum ferunt, & uocatur hæc affectio pica. Concupiscunt autē in ea maxime quidē acida & acerba, aliquādo etiā acrisa, quandoq; etiā terram, aut testas, aut extinctos carbones, aut alios quosdam absurdos cibos: atq; hoc affectu plures ex ipsis infestantur usque ad secundū aut

tertium mensem completum: in quarto uero quiescere incipit malum, partim quidē uitioso humore per uomitū euacuato, partim uero cōcocto & per tēpus consumpto, utpote quū mulier modico cibo usa sit, propter appetitus ab eduljīs nutrientibus auersionē: quā & foetus in utero auctus plurimū alimenti ad se trahit, adducto simul cū sanguine & uitiatō humore. Porro idē affectus uiros quoq; infestat, quū & ipsis uitiatō humor quispia ad os uētris fuerit delapsus. Cōueniēs autē eis remediū, Amazonū pastillus potatus existit: post uero etiā ex aloē cōfectio pica appellata. Euacuato autē plurimo uitioso humore, exhibendus est eis mali punice dulcis succus, mēta sicca inspersa, aut aliud quippiam eius generis, quod est ad stomachi subuersiones ac nauseas præscriptū. Cōueniunt etiā muria cōdite oliuæ albæ, & quæ colymbades appellantur. Itē amygdalæ amaræ à ieiuniis acceptæ, & antidoti ad letalia pharmaca aptæ. Quomodo uero à pica appellato morbo mulieres infestatas curare oporteat, in muliebribus remedijs dicitur.

De cruditate, Galeni. Cap. xxiiii.

Concoctio, est iuxta qualitatem permutatio, quæ nutrire potest. Contingit autem à uentre sibipsum cibos assimilante: quapropter manifestum est, quod circa permutationem, offensæ concoctionis accessio continget, si itaq; cibi in totum non permulentur, cruditas ea accessio appellatur, & est perditio & perfecta priuatio actionis: si uero permulentur quidem cibi, uerum non ut oportebat, uitiatam significat concoctionem, non autē ut antea eius priuationē: aut enim tardat, & nunquam propriā transmutationem suscipit, & difficilis cōcoctio appellatur: aut cibos omnino corrumpit, ac transmutat in alienam qualitatem. Atque hæc quidem concoctionis offensiones existunt. Causæ autem ipsarum sunt intemperies uentris, inflammationes, scirrhi, abscessus, & quæcunque eius generis existunt. Aliquando autem uentre nihil male affecto cibi crudi permanent, aut propter immoderatam ciborum ac potuum ingestionē, aut ob uitiosam ipsorum ciborum qualitatem, aut ex intemperstia, aut etiā inordinata sumptione, aut ob recrementum uitiosum, aut ob uigilias. Cæterum ex uitiosis ciborum qualitatibus, & recrementis quæ iuxta uentrem consistunt, cum corruptione cruditas oboritur: aliquando & ex inordinata sumptione, si quidē poma, aut mala punica, aut aliquid aliud tale primum comederint, deinde olera assumant ex oleo & garo, aut etiā alia quæ uentrem emollire consueuerunt. Intemperstiam autem acceptionem appello, si prius quā prior probe subierit cibus, prædeat, aut etiam præter consuetam horam. Corruptions autem sunt, nidorosa quidem in calidioribus & biliosioribus: acidæ uero in frigidioribus natura & magis pituitosis. Eodē modo & de excrementis quæ in uentre præexistunt iudicandum erit: quæcūq; enim ex eis pituitosa & frigida sunt, acidæ corruptiones efficiunt: quæ uerò calida & amara bile mixta, nidorosa. Ipse quoq; uenterculus aliquo modo affectus, si quidē frigidus morbus existat, acidæ permutationes facit, calidus uero nidorosa. Tardas autem cōcoctiones, cibi difficulter corruptibiles faciunt, & si ultra quā uires tolerant sumuntur, itemq; uigilias. Quum uero citra corruptionē perfecta cruditas oboritur, ut quales accepti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnem

ita omnem suam qualitatem, ex hoc cognoscere datur uisum esse uentriculum, aut ab immoderata ciborum multitudine, aut per uehementem refrigerationem insiti caloris. Vt nequis igitur in cruditatem incidat, cautione in omnibus prædictis est utendum, ut neque in multitudine, neque in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neque in acceptionis oportunitate, neque in ordine delinquant: & ut quaecumque concoquere ualeat, ea tantum ingerat, & non quæ appetitus exoptulat: mensuræ enim maxime omnium diligenter respectum habere oportet, appetitumque refrænare, & neque plus quam uires tolerant accipere, neque quæ natura difficulter concoquuntur, uelut sunt carnes naturæ duræ: natura autem dico, uelut carnes bubulæ, & conuulsiuæ: ætate uero, si macerata animalia seniores existant. Cauendum est etiam à partibus carniū multo nutrimenti existentibus, & pinguius salisque condimento seruatis, ac uetustis. Ex oleribus, quæ igneæ sunt naturæ, ualdeque frigida item quæ in flatum pariunt, incommoda existunt. Ex piscibus, qui duras carnes habent, et repositione arefacti. Abstineant quoque à cibis corruptis & foetidis ac graueolentibus. Vitent fructus dulces aut flatus generantes & immaturos: bellaria quæ difficulter concoquuntur & oleaginosa, & quæ ægre diuidi possunt, uelut est sesamum, quod commanducationem ob paruitatem suam effugit. Non minus autem uitandi cibi peregrini & inconsumpti ac medicamentariam uisum habentes, quales frequenter placentis ac panibus immiscetur. Iuxta tempus autem accipiendi cibi neque impetuose, neque aceruatim, neque solidis partibus aut absque commanducatione eos ingerere oportet: neque etiā potus cibum interpellat: id enim unitionem ciborum impedit, singulosque uentri innatare facit. Ex condimentis uero oxyporon quoddam, quod cito penetrat, assumere non incommodum neque iniucundum existit: maxime uero huiusmodi. Caroi drachmas xvi. foeniculi drachmas sex, seminis apii drachmas octo, ligustici drachmas octo, ammi drachmas octo, piperis drachmas decem: aliqui autem & zingiberis drachmas tres, in frigidioribus temperaturis, omnia melle excipiantur, & cum carnibus ac piscibus exhibeantur. Melius autem est cum cibo & piper maxime longum exhibere, in his qui magis pituita abundant: uentri enim flatus crassitudinem dissoluit: & quæ circa præcordia consistunt, inferne ad aluum propellit: concoctionem etiam omnium maxime piper adiuuat, quod si forte non adsit, albo utendum erit: quod si neque hoc adsit, nigro. Utendum etiam alijs concoctionem iuuantibus pharmacis, quæ ad finem huius capitis sunt subiecta. Post acceptum cibum uexationes inæquales ac conturbantes uitandæ, item æstus & refrigeratio: hæc enim concoctioni ciborum resistunt. Adiuuant autem eandem frictio pedum, calidius contubernium, & calefactio præcordiorum. Quod si grauitas adsit circa uentrem, & ex ea molestia quædam in uniuersum corpus diffundatur, expassa manu os uentris apprehendendum est, aut puerulus carnosus admouendus. Ex his enim sepe alimentum corruptio ni proximum est conseruatum. Cæterum quum ructus iniucundus proueniens manifeste corruptionem factam indicat, citra cunctationem ad uomitum ueniendum est, atque aqua tepida ingesta, omnia corrupta ad excretionem cogenda. si enim in uentre permanse-

rint, & torsionem, & dolorum, & grauitatis capitis causa existunt: aliquando autem bilis superne ac inferne effusionem, aut profluuium uentris, aut etiam febres inducunt. Quare eos qui difficili concoctione apprehendi solent, longo ante tempore adsuuuiemus ut facile uomant: commodissimus enim in plurimis periculis uomitus existit. Quod si quis natura difficulter uomat, aut ob aliquam aliam incommoditatem uomere impediat, omni modo conandum est ut cibis subeat, & ex præcordijs deducatur. Ad hæc erectior decubitus appareat, ut ea quæ capiti subiacentur sublimius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistru latus fiat: atque si quis uigilijs infestetur, citra corporis uexationem permaneat, eademque decubitus formam obseruet: frequentes enim agitationes cibos perturbant, intestinaque inflata reddunt, flatus autem cibum sursum uergere facit. Si uero quis ob nullam causam male dispositus sit ad frigidæ potum, non inconueniens erit cyathum unum aquæ frigidæ puræ absorbere: corroboratus enim inde uenter celerrime quæ in ipso herent extrudit, & ad subiectas partes demittit. Sequenti deinde die in quiete æger assuetur, fricationemque pedum utatur, & præcordiorum concalescentia, donec murmura & flatus circa intestinum rectum eruperint, eructationesque cum qualitate mansuetiori recurrerint: & tunc sanè exurgere conuenit, primūque alius ea quæ corrupta sunt egerat: deinde ad deambulationem moderatam æger procedat, atque otium agat, propter commotos uapores ex corruptione in caput delatos. Post hæc autem ad quotidianas actiones mens applicanda est citra perturbationem ac indignationem: deinde rursus uenter cogendus est ad eorum quæ reliqua sunt excretionem. postea quiescere iubebimus, atque aqua calidior pedes perfundere ac fouere: frigida uero pura facie proluta, in lecto quiescere omnibus conatibus somnum illiciendo. post quæ modica deambulatio, deinde balneum suscipiatur, quod calidius solito existat: cæterum resectis prius uiribus lauetur, corporeque nitro consperso exudet, atque hoc modo in calidius solium descendat: deinde etiam in frigidum insiliens, largiore oleo uniuersum corpus pinguefaciat. Commodissimum est etiam aqua calida in balneo hausta uomere: uelut abluendo ea quæ in stomacho desident biliosa aut pituitosa. absinthij quoque prælibatio à balneo quod conuenit facit, & aliena uentri adherentia extergit. A lauacro cibum capere conuenit moderatum, & cui concoquendo corpus sufficit. dabimus itaque herinaceos marinos æcetes, aut caneros fluuiatiles, ita ut ab eorum acceptione, malum aut oua sorbilia, aut pisces in petrosis aquis degentes adsumant, & ex uolucris non graueolentes & macras. A reliquis autem carnibus abstineant, & à leguminibus ac cepis, salsamentisque, & quæ elus generis existunt. A bellarijs item, & omnis generis placentis, & à fructibus dulcibus ac facile aculentibus in uentre. his enim omnibus concoquendis egre sufficit uenter, ampliusque infantis naturæ ea ipsa existunt. Non solum autem qualitates eorum quæ in cibo exhibentur permutatas esse conuenit: sed etiam multitudinis adhibere modum. ea enim quæ facile concoquuntur, his quæ non concoquuntur paria sunt, si præter modum ingerantur. Deinde uero somnus imperturbatus, & æqualis procuretur, illito uentre ex unguento nardino. Pharmacum concoctio-

nem adiuuans, ex malis cotoneis, Galeni. Pharmacū ex malis cotoneis conueniens est apparando appetitui in his qui eum perdidērunt, conuenit & concoctioni, in his qui non probè concoquunt cibum, & ut summam dicam, uentrem robustiorem reddit, eisq; qui debile habent hepar, utile existit. Manifestum autē esse arbitror, quod ieiunis exhibere hoc oporteat, mystri mediocris mensura, quanquam nihil offendat, etiā si quis à cibo ipsum accipiet. Recte etiā exhibetur, si pranso atq; inde coenare uolētī præsumentū detur. Oportune uero duabus ante cibum horis datur. Apparatur autem hoc modo: Ex malis cotoneis maiora iucundioraq; & minus acerba, quę uidelicet struthia appellantur, eligito, expressiq; eorum succi sextarios Romanos duos accipito, ac mellis quā optimi parē mensurā ammisceto: aceti uero sesquiseptariū affundito, hisq; simul ad prunas ardentes moderate decoctis ac despumatis, zingiberis quadrantem, piperis sextātem adijcito: atq; hoc modo rursus ad ardentes prunas, donec ad mellis crassitudinem perueniant, decoquito. Quod si magis adstringens ipsum facere uelis, etiam ex carne malorū cotoneorū appara. His uero qui intemperie uentris calida afficiuntur, & qui quomodocunq; tādē bile sunt referti, magis cōuenit, zingibere & pipere de tractis, succū malorum cum aceto ac melle solo decoctum præscepta cōmensuratione exhibere. Quando uero medię temperaturę fuerit uenter, ut neq; biliosa neq; pituitosa in eo aggregentur recrementa, dimidium prædictę cōmensurationis tum piperis, tū zingiberis radicis inijcere expediet, ita ut piperis quidē uncia i. zingiberis uero sesquiuncia coniiciatur. Si uero frigidioris temperamentī fuerit uenter, zingiberis triēs, piperis quadrās, aut unc. ii. s. ammiscatur. Licebit etiam iuxta mediā cōmensurationē apparare, atq; ubi opus fuerit usus tempore reliquum adijcere. Pharmacū concoctionē adiuuans, Diospoliticū appellatum. Conuenientior autē diospoliticū pharmaci usus erit, in his præsertim qui aisi duē inflātur. Duplex autem compositio eius existit: aliquando quidem æqualibus omnium partibus cōfectis, cumini uidelicet & piperis rutęq; & nitrī: hoc enim modo magis aluū subducit. Aliquādo autem reliqua singula inter se parī pondere miscentur: nitrī uero dimidium aut quarta pars adijcitur. Præstat cuminum cōiectum æthiopicū esse, piper autem longum aut album. Cuminū in acerrimo aceto maceatur, deinde moderate torreatur. Sint & rutę folia prærefacta. Recentia enim superfluo humore abundant. His autē omnibus tenuissimè tritis, mel despumatum sufficienti mensura ammiscetur. Aliquādo tamen sola hæc citra mellis admixtionem trita & exiccata, repositaq; adseruantur, ac pitisanæ succo insperguntur, aut alijs etiam cibarijs, quibuscunq; tandem maximè conuenire uidentur. Ammiscetur etiā ipsum mel usus tempore, exhibeturq; inde cochlearij mediocris mensura ante cibum. Porro peregrinationis tempore præstat ipsum pharmacum aceto subactum in pastillos redigere, atque usu expetente similiter cum melle exhibere. Crasso autem modo cōtundere oportet ea quę ad huiusmodi pharmacorū compositionem coniiciuntur, ea gratia, ut ita uenter melius inde subducatur: tenuissimè enim trita & in puluerē redacta, ad emolliendam aluum inepta red-

duntur. Cæterum urinam nō modicam cient. Crassiora uero iuxta uentrem persistunt, quum angusta uenarū ora penetrare non possint. Pharmacū ex tribus piperis generibus, Galeni. Hoc autem modo dispositis, frigidum uidelicet & pituitosum habitum nactis ac inflatis, ex tribus piperis generibus pharmacum conueniens existit, si quidem nō nimis medicato ac uario modo apparetur, quemadmodū multi id cōficere solent: ut satis operosum sit eis, qui hoc accipiunt, ea quę ad eius compositionem ingrediuntur concoquere, uelut est ammiū, & fœseli, & ligusticum, & quę eius generis existunt. Talia itaq; ex pharmaco hoc sunt adimenda, ampliusq; & helenium, spicęq; nardi, & cassia. In promptu autem duplicem eis apparatus habere conuenit, quemadmodum nos sumus consueui. Alterum quidem simplicem, his qui nō concoquunt cōuenientē, & qui recēti circa uentrem frigore, aut pituitoso humore affliguntur. Alterum medicamentarium, quo maximè in defluxionibus à capite ad thoracē utimur. Simplex igitur quo etiā ad crudos humores, circa primas & magnas uenas cōsistentes utimur, hoc modo habet. Ad quinquaginta drachmas uniuscuiusque trīū piperis specierum, sufficit ammiscere anisi, cacuminū thymi, & zingiberis, singulorum drachmas octo, atque hoc sanè simplicius existit pharmacum: quam adhuc simplicius apparari possit, si citra zingiberis admixtionem paretur. Alterum autem ex hōdem cōstat: uerum ad quinquaginta uniuscuiusq; triū piperis specierum drachmas, singulorum ex his tribus, aniso uidelicet, cacuminibus, thymi, & zingibere drachmas xvi. coniicimus. Pharmacum ex calamintha oxyporon, hoc est, citro penetrans, quod polyetes, id est, annosum, appellatur. Prædictorum quidem igitur pharmacorum caliditas circa primas uenas extinguitur, minime per uniuersum corpus se diffundens: quemadmodum id quod ex calamintha constat, solet, & ei similia. Neque enim uolumus ea quę cum cibo cōcoctionis gratia exhibemus, in uniuersum corpus diffundi, sed tantū concoctionē ciborum in uentre adiuuare, itemq; humorum crudorum in primis ac magnis uenis contentorū. Quare quemadmodū in Diospolitico pharmaco dictū est, nō nimis in puluerē redigere oportet ea quę ad concoctionē solam adiuuandā apparantur. Hoc uero pharmacū in uniuersum corpus usq; ad cutem ipsam digeritur ac distribuitur: quare hīs ipsum exhibere cōuenit, quibus crudorum humorū multitudo in solidis animalis partibus consistit. In talibus enim, omnium quę ego noui optimum, id quod ex calamintha constat, existit. Attenuat enim crassa & uiscosa: discutiitq; ea similiter, urinamq; & mēses ciet. Compositio autem eius talis est. Calaminthę montanę, seminis petroselinī, pulegiī, fœselis, culusq; dra. xii. seminis apiī, cacuminum thymi, sing. drach. iiii. ligustici drach. xvi. piperis drach. xlviii. mellis despumati quātum suffecerit. Aliqui & zingiberis unciam unam adijciunt. Iucundissimū autem est quod plurimum mellis ammixtum habet. His uero qui dulcia auersantur, & à mellis usu abhorrent, parū in compositione ammiscatur. Quidam tamen mellis libras iiii. & dimidiā ammiscēt. Potest & absq; melle siccum adseruari, eodemq; ut reliqua modo salibus cōmisceri, edulijq; ac liqua

ac liquamentis inspergi. A cibo uero nunquā, neque hoc, neque aliud quoddam pharmacum, quod uehementem penetrationem facit, accipiatur: distribuitur enim ac digeritur simul cum ipso aliquid crudorum ciborum, & obturationem operatur. Vfus eius conuenit post matutinam fricationē, duabus ante exercitiū balneumque horis. Aceti mulsi apparatus ac usus, Galeni. Pituitosis in uentre humoribus etiā acetum mulsum conuenit, quod hoc modo apparare oportet, Melle optimo ad prunas decocto ac despumato, dimidia eius mensura acetum affunditur, atque ita rursus ad prunas decoquitur, quo ipsorum qualitates optime permisceantur, & ne appareat gustantibus acetū acor. Ad eos uero qui acetū multitudine auersantur, hoc modo apparato. Aceti pars una accipiatur, despumati mellis duae, & aquae partes quatuor. Quod si fortius facere uelis, tantum acetū, quantum mellis coniicies, & absque aqua apparatus. Praestat autem iuxta sensum eorum qui accepturi sunt, mixturę congruentē modum iudicare, nō uero secundum quod nostri sensus perceptant. Quod enim naturę accipientis familiarissimū est, id iucundissimū existit, & ob id etiā utile & accommodatum. Nocentissimū autem contrā est, quod minimē iucundū. Ceterū usus tempore aqua calida mixtū, uelut uinum exhibendum est, prout aegro iucundius uisum fuerit. Pharmacū ex malo citrio, tardē concoquentibus cōmodum. Carnis mali citrii lib. i. hyssopi, rutę, origani, cuiusque fasciculū exiguum, acetū heminas iiii. per quinque dies ac noctes aceto macerata ad tertias decoquito, & expressa reſcito: ad acetum uero mellis sextarium i. ammisceto, rursūque ad mellis crassitudinē decoquito, deinde asari, mei, piperis, cuiusque sextariē inspergito. Mane & uespere exhibetur. Pharmacum ex uino scybelite, Archigenis. Vini scybelite sextarios iiii. succi rutę sextariū i. fisonis, piperis, cuiusque unc. i. zingiberis sextantem, petroselinū unc. i. mellis sextarium i. Liquida ad compagem crassam decoquito, aridaque inspergito, ac cochleariū unum aut alterū exhibeto. Efficax est ad tardas concoctiones, ac inflationes, itemque colicos. Vinum autem scybelites est, quod sua sponte ex papis uuis destillat, utpote uinum uitro effluentibus uuis. Sales Iamblichi. Salis ammoniaci libram unam, salis cappadocici sexuncem, piperis quadrantem, zingiberis quadrantē, seminis cnici scrupulos xviij. seminis erucę scrupulos xvi. ammiū scrupulos xvij. hyssopi scrupulos xvij. silphij scrupulum i. cacuminum thymi, phylli, seminis apij, petroselinū, cuiusque scrupulos xvij. origani unc. i. Cōtundito ac cribrato, indeque dimidium cochlearium, cum ouis forbillibus, aut cum pilana leiunis exhibeto, potes & cum carniū aut piscium liquamento exhibere, aut quomodocumque tandem uelis. Huius medicamenti auxiliarem facultatem nemo pro dignitate laudare potest. Quare ut breuiter dicam, ad frigidiores temperaturas non reperias aliud pharmacū, quod conuenientius crudos humores concoquat: unde & colicis prodest, uentrem citra molestiam mediocriter mouens.

Sales Poletis, aluum emollientes, pituitam a capite dissoluentes, per palatum transpirantes, reliquasque distentiones attenuantes. Salis torrefacti splendidissimi drachmas cxxliij. floris chamæmeli aridi & cōtusi tridentem, conyzæ tenuis tridentem, calaminthæ

montanæ tridentem, radicis eryngij montani, origani, cuiusque tridentem, silphij tridentem, piperis tridentē. Contusis & cribratis utere. Sal dodecatheos, hoc est duodecumanus, seu duodenarius. Hyssopi tridentem, pulegij quadrantem, cumini sextantem, ammiū unc. i. salis torrefacti uncias triginta. Cōtundito & cribrato, proque quotidiano sale, utcumque placet, utitor. Qui enim eo assidue utitur, nullis morbis per omne uitę tempus infestatur. Pręcipuē tamen caput allevat, & uisum acuit, pituitamque in thorace congregari non sinit: concoctionem bonam operatur, & mesentericas maximē uenas ab obturatione liberat, & renes repurgat. Quidam & origani sextantem adijciunt. Ego uero semper spicę nardi unc. i. annecto. In hyeme amplius piperis unciam i. addo. Ad eos quibus alimentum in uentre acescit, utiliter hoc remedium adhibetur. Piperis drach. iiii. seminis anethi drach. i. cumini drach. iiii. contere, ac exhibe cochlearium ante somnū ex uino diluto. Embamma optimum ad intinctus, concoctionem adiuuans. Cumini, piperis, foliorum rutę, mentę uiridis, anethi uiridis, cuiusque drach. iiii. pulegij sesquidrachmam, salis unc. i. gari albi cochlearē i. mellis cochlearium i. Utere, ualde enim cōmodum existit. Postea, cōcoctioni ualde commoda, Cyrilli Archiepiscopi. Pulegij, seminis feniculi, seminis apij, cuiusque scrupulos sex, caroli sesquiscrupulum, seminis coriandri sesquiscrupulum, baccam lauri unā, cyperi, folij malabathri, costi, cuiusque scrup. i. salis sexuncem, acetū sextarium i. Sicca contundito & cribrato, acetoque ammixta ad paucas horas macerato, ac utitor.

De crapula, Philumeni. Cap. xxv.

Cruditates ex uino multo obortas, crapulas appellamus, easque consimili methodo tractamus, qualē ad difficultatem concoctionis pręscripta uidē solemus. Itaque his qui ad frigidę potum adsueuerunt, aliasque stomachum habent æstuosum ac exustum: aquę frigidę purę cyathi duo aut tres per interualla ad absorbendum exhibendi sunt post uero per somnum meridianum turbationibus depulsis, confestim eos in balneū inducemus, prolixiorēque exudatione procurata, ab aquę tepidę haustu ipsos uomitū facere cogemus, aut digitorum tantum immisione eundē lacessemus. Deinde prędictos cibos exhibebimus, dilutiore ac pauciore addito potu, donec caput a grauitate liberetur. Statim uero a principio caput ex olei omphacini fomento irrigetur. Sequenti autem die bonę concoctioni consulatur. Optimum autem fuerit, si quis uinum absinthites ad plures dies a balneo prębibat, itemque post matutinas deambulationes. Prodest & acetum scillinum absorbere i. mystri mensura: deinde in quiete breui sanē tempore degere, atque ita ad reliqua facienda procedere, quemadmodum in capite De cruditate est prędictum.

Que cura aluo adstricta adhibēda, Galeni. Cap. xxvi.

Recrementorum iuxta uentrem retentio, aut propter acceptos cibos ac potus contingit, aut propter uentrem ac intestina. Et propter cibos quidem, aut ob ciborum ac potuum acceptorum tum qualitatem, tum quantitatem, aut propter ordinem, & utendi modū contingit. Ob qualitatem quidem, si acerba & austera ac sicca temperatura & commixtione cōstent ea quę accipiuntur. Ob quantitatem uero, si plura aut pauciora & citra conuenientem exhibeantur mensuram.

suram. Circa ordinem autem retentio excrementorum contingit, si arida & acerba prius, humida uero pinguiora & dulcia postea ingerantur. Circa modum uero utendi, si bis cibum accipere conueniat, & semel omnem assumat. Quae uero circa uentrem ac intestina consistit recrementorum retentionis causa, ea & ex natura ipsorum, & ob acquisitam contingit dispositionem. Causae itaque circa naturam ipsorum, sunt uisiosae corporum constitutiones. Octo autem existunt uentris acquisitionis intemperaturae. Quatuor quidem simplices, caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas; reliquae quatuor commixtae, caliditas simul cum humiditate, caliditas cum siccitate, frigiditas mixta humiditate, frigiditas mixta siccitate. Oportet autem unamquamque intemperiem in eam magnitudinem excedere, ut euidenter excretiuam facultatem imbecilliores reddat, aut in uentre solo, aut in gracilibus intestinis, aut etiam crassis, aut simul in omnibus praedictis, quemadmodum in uoluulis fieri consuevit. Ad haec amplius & in febribus aliquando aluus adstringitur, ob acrimoniam uidelicet resiccantibus & consummentibus humores: aliquando autem materia ad alios locos diuersa, per ipsos ipsos exclusa. Sudoribus enim multis per cutem exclusis aluus coarctatur, & stomacho ex fluxione affecto stercus cohiberi coningit: propter inflammationem item intestino recto uiscinam, ipsumque deprimentem, uelut est uesicae, aut uulue, & propter ulcerationem aut dolorem circa eas partes oborta, excrementa recurrunt. In his uero qui a morbo uires recolligunt, uenter cohibetur, propterea quod plurima digestio ciborum in corpus fiat, & ob id exiguum & aridum, & quod difficulter excerni potest, stercus relinquitur. Ad haec etiam uenter adstringitur ob flauae bilis cohibitionem, quae ad intestina delabi consuevit: ea ipsa enim in animalis, quod secundum naturam habet, confluens intestina mordet & irritat, & ad excretionem excitat recrementorum. Quapropter etiam semper cibo uacuum ieiunum intestinum reperitur, in quod procedit meatus, qui ex bilis succoprince uesica bile ad intestina deducit, atque ob has sane causas uenter adstringitur. Commune autem in omnibus praecipuum est, ut causae noxam inferenti contrariam curationem opponamus. Proprium uero ut secundum singulas causas cuique quotidie contraria remedia exhibeamus. Et si quidem ex paucorum ciborum acceptione homo aluum habeat adstrictum, plures simulque humidiores ei offerantur: si uero siccioribus sit usus, humidiores quidem dentur, non autem multi. Si uero austeri & acerbis cibi retentionis fuerint causa, dulces & pingues exhibeantur. Si uero ob permutatum ordinem adstrictio fiat, in eum qui conuenit, reducat. Si uero semel cibum accipiendo, quum bis id facere oportuerit, uenter cohibeatur: non solum bis, sed & saepius conuenientes cibi dentur. Eodem etiam modo recentes intemperaturae per contraria curentur: ita ut exsiccata corpora humectemus, humecta uero resicemus, & calefacta quidem refrigeremus, refrigerata uero calefaciamus, atque in coniugatis siue mixtis qualitatibus eadem iuxta proportionem faciamus. Cohibita autem quae ad intestina defluere consuevit bile, aut ob crassitudinem, aut ob biliosorum meatuum obturationem, extenuatoria dieta utendum est. Similiter autem omni conatu instare & reniti oportet, ad reliquas alui adstrictae causas tollen-

das, atque uiscerum quidem inflammationem soluemus, ubi per ipsam cohibitio contingat, materias uero ad intestina conuersas deducemus, si quidem alio proreptent: quae autem medicinali materia id fieri possit, in simplicium pharmacorum Sermone est praedictum in principio huius tractationis, atque in eo qui hunc sequitur, De purgantibus pharmacis inscripto. Communis autem omnis quomodocumque euenierit, adstrictiois alui curatio talis est. Ex decubitus figuris erectior eis conuenit, & ad sinistram latus reclinatio. Et silentium quidem ac quies uentrem cohibet, motus autem & deambulatio impellunt. Paucus potus, & non praepotare, neque inter medios cibos potum accipere, uentrem resiccant: praepotatio uero & multa potio stercora humectant. Somnus cocoquit, & recrementa fluida facit: uigiliae uero materias distrahunt, & suspensas tenent. Plurimum autem ciborum qualitates possunt, quare eas quae uentri gratae sunt exhibere oportet, quanquam omnino melius fuerit absinthij succum dare, aut ex aloë catapotia deuoranda. Quibus si nihil proficimus, duris quoque adhuc stercoribus insidentibus, & lumbis aggravatis, circumtensisque & inflato uentre superiore, humectantibus immorari cibis absurdum. Saepem enim lapidis modo recrementa indurantur, & in intestino recto condensantur, quare accepti cibi stomachum quidem & uentrem humectant & effeminant, ad intestinum uero rectum peruenire non possunt: ut inde aliae quaedam molestiae consequantur. Melius igitur in istis fuerit aluo prorsus succum per clysterem infundere, ammixto oleo & melle, aut maluae aut foeni graeci uel fursurum decoctum similiter cum oleo & melle: utendum etiam gladiis ac illitionibus sedis. Alumen autem liquidum melle tritum donec indurescat decoquitur, ex eoque sedes illinitur, & facile quidem plurima stercora prolestat, quanquam inde aliquandiu dolore afficiantur. Optime autem facit & cyclamini succus cum melle illitus, & in tomento quoque appositus. Mercurialis etiam uisida contrita, & ad glandis modum redacta, excutatur & supponitur, ualde quoque comoda existit. Alia glans, purgatoria uim habens. Comae absinthij contrusae ac cribratae drach. iiii. nitri drach. iiii. elaterij drach. i. melle cocto excipito, glandes quoque informato ac subindito: fomento tamen prius ad locum adhibito. De his autem absolutissime in tertio huius tractationis Sermone est praedictum, ubi etiam pharmaca purgantia quae circa umbilicum illinuntur, descripsimus, eorumque etiam quae per os exhibentur ac uentrem emolliunt, tum simplicium, tum mixtorum remediorum mentionem fecimus, quare superfluum existimo hic de eis producere sermonem. Absinthij emollientis utilis apparatus. Costi un. i. spicae nardi scrupulos iiii. folij scrupulos iiii. mastiches scrupulos ii. mellis sextarios duos, uini sextarios decem. Absinthium bonum, emolliens, & dulce. Sisonos unciam unam, floris fandi odorati scrupulos vi. mastiches scrupulos duodecim, folij scrupulos ii. spicae nardi scrupulos duos, mellis sextarium unum, uini sextarios quinque. Absinthium amarum pituitosis magis conueniens. Agarici, folij, amomi, spicae nardi, calsiae, cuiusque scrupulos tres, costi scrupulos ii. rosarum siccarum scrupulos ii. aloës scrupulos vii. mastiches scrupulos duodecim, mellis sextarium i. uini sextarios v. Aliud, atra bile abundantibus, & pituitosis

pituitosis similiter cōmodum. Folij scrupulos vi. spicæ nardi scrupulos sex, agarici scrupulos quatuor, epithymi scrupulos xii. mastiches scrupulos xii. aloës scrupulos quinque, mellis sextarium unum, uini sextarios v. Aliud optimum. Folij, spicæ nardi, cassiæ, amomi, culusque scrupulos iiii. costi scrupulos iiii. agarici scrupulos iiii. mastiches scrupulos i. aloës scrupulos xii. mellis sextarium i. uini sextarios quinque.

De inflatione, Galeni.

Cap. xxvii.

Inflationis principium cibus male concoctus existit.

Cōtingit autem flatuū generatio in uētre, ex humorib. in ipso pituitosis, aut ex cibis in uapores per mediocrem caliditatem resolutis. Perfecta enim frigiditas nullum omnino uaporem efficit, propterea quod neq; omnino attenuat, neq; consumit, neq; dissoluit etiā ipsum cibum: uehemens autē caliditas cibum attenuat, si flatuosa natura existat, & tunc sanè nebulosus flatus generatur, uerum paucus, adeo ut per unū aut alterum ructum euacuetur. Mediocris uero caliditas minoris efficacit̃ existens, cibos quidē dissoluit, non autem perfectē consumit: unde sanè flatus generatio contingit. Vna autem eademq; ratione quemadmodum extrinsecus frigidissimæ & aquilonares in hyeme constitutiones, & calidissimæ æstatis tempore consistentes, purum aërem reddūt: quæ uero inter has mediæ existunt, nebulas gignūt: sic eodem planè modo, in animalium corporibus, neque in extrema caloris debilitate, neque quum uehementer calor inualefcit, sed quum inter hos excessus medio modo habet, flatuosum recrementum generatur, atque hoc ipsum ubi per stomachum excluditur, ructus operatur: per sedem uero aut strepentem, aut absque strepitu flatū. Quum uero neque per os, neque per sedem excernitur, inflationem appellatam producit. Archigenis. Accedit affectus stomachi grauitas & distentio, multosq; fallit tanquā in ipsum solum dolor innitatur: etenim malū ipsum aliquando quidem iuxta totum pectus, aliquando uero retro iuxta collum ac dorsum, atq; ipsa uentribula irruiūt: sæpe autem & utrinq; occupatos tenet: aliquando autem & tumorem circa os uentris efficit, ructusq; inanes fiunt modicē alleuantes, inhibitiōq; flatuū qui per aluum excerni cōsueuerunt. Succumbit autē & tumor ipse iuxta uentrē, ad manuum impositiones subluxus cedens. Quibusdā eorum & dolores accidunt, & appetitus perditiones, ac capitis dolor: si uero ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cū dolore amplius distenduntur, qui sæpe ad clauiculam usque desertur ipsasq; scapulas ac uniuersam spinā, ultra hoc quod & ructus cohibentur: ut aliqui iam non dissimile quiddā suffocationi se perpeti æstimant. Leuantur autem alimento infernè subeunte, & flatibus siue per ructus, siue per intestina exclusis. Eos igitur qui nō ita diu ante cibum sumpserūt, primum uomere præcipe: deinde uero fouere oportet cum lana in fasciculum conuoluta & leuiter calido oleo madefacta. Si uero dolor urgeat, fomentū fiat per uesicam bubulam aqua & oleo calidis semiple-nam. Glandes quoque confidenter & citra dilationē supponendæ sunt, ex rebus flatus prolestantibus in formatae, uelut est rutæ semen & cuminum æquali pondere cum melle cocto, ac modico nitro coacta,

Inedia etiam affectioni necessaria existit, per unam quoque atq; alteram horam tempore fricationis, irrigationes ex oleo conueniunt, in quo absinthium, ruta, & anethum sint decocta. Lanæ uero conuolutæ cuminum tritum, aut apij semen, aut sisonis magis inspergatur. Deinde & cucurbitæ adsumantur inanes multæ, & cum multa etiam flamma admotæ. Perseuerante autem diutius affectione, cataplasmata ex semine lini, ordeacea & foliacea farina imponatur: tunc cumino etiam trito, semineq; anethi, aut apij aut foeniculi, aut chamælæ, aut tragorigani, aut centaureæ coma, aut eryngij semine, uel radice: ex hydromelite etiam & oleo, in quo ruta, baccæ lauri, & melanthium sint decocta. Ammiscendū est & bitumen, oleumq; laurinum. Si uero inflammatio una cum inflatione adest, pro calefacientibus ea quæ relaxant ammiscere oportet, uelut est anethum oleo incoctū ammixto adipe gallinaceo aut anserino. Cibus uero frumētacei generis sit & paucus: post multum etiā assumpti cibi tempus, potus tandem præbeatur: a cibo fricationes extremarū corporis partium adhibeantur. Alius uero tum per cibos, tū per aloē subducatur. Cerata etiā imponantur ex oleo apparatus, in quo cucumeris syluestris radix sit incocta. Ad finem uero malagmatis utendum, quæ ex seminibus aut lauri baccis constant. Marciani irrigatio siue fomentum, ad eos qui ex morbo circa septū transversum inflationē habent, & murmura circa interiora, aut quibus uiscera inflammata sunt, aut inflantur. Rutæ uiridis trientē, foeni græci sexuncē, meliloti trientem, absinthij trientē, foenum græcū in pauca aqua diem unū præmacerato: deinde reliquis ei adiectis, atq; olei sextarijs iiii. affusis, ad non fumantē ignem decoquito, percolatoq; ac in eo lanam conuolutam quā plurimū madefacito. Si uero dolor intendatur, in solium ex oleo apparatus eos imponemus, si tamen nihil id fieri præpediat, althææ itaque radicē, lauri folia, foenum græcum, pulegium, rutā, in aqua decoquemus, & oleo ad decoctum affuso, eos inscendere faciemus: quod ubi feliciter processerit, cibum accipiant, panē ex aqua, & pisces teneras carnes habentes. Qui uero se iam recolligunt, diæta restituendis uiribus apta utantur: sinapismisq; & cucurbitulis cū multa flamma post exercitia admotis, uomāt. Si uero fixa perseuerauerit accessio ipsa, tēpore exacerbationis cataplasma ex sinapi imponendū est, & paulo post aloës drachma una propinādā, aut smyrnij semen ex uino. Aristolochia autem longa siue rotunda drachmæ pondere potata flatum dissoluit, & tarde concoquentes suuat: quod & calaminthæ decoctum, aut etiam polium decoctum cum melle modico & paucissimo pipere tenuissimè trito, facit. Ouillus autem talus uisus & potatus torminibus ac inflationibus medetur. Aut rhamni folia uiri-dia trita in pastillos redige, eosq; in umbra exiccatos drachmæ pondere exhibe: non febrientibus, cum uino diluto, febrientibus uero cum hydromelite. Facit & ad uoluuolosas affectiones, omnesq; inflatuos dolores miro modo: per ructus enim ac flatus infernè prodeuntes discusso & resolutomalo sani fiunt, inquit Dioscorides. Vtile etiam eis castorium ex posca bibitum existit, drachmæ pondere acceptum. Idem quoq; forinsecus cum oleo sicyonio impositum, etiam si cum torminibus

& inflationibus prædictæ affectiones cōtigerint, eas sanat. Acetum uero scillinum tum ante, tum post cibum absorbeant, aut ante somnum. Apparatur autē simplicissimè hoc modo. Scillæ repurgatæ & dissolutæ libras v. aceti sextarios XLVIII. sub caniculæ ardoribus ad dies quadraginta insolato, ac utitur. Oxyportion etiam quod cito penetrat eis conueniēs est huiuscemodi: foliorum rutæ drach. XXXII. cumini drach. XII. ligustici, caroi, seminis apij, piperis, zingiberis, helenij, nitri, culusq; drachmas VIII. exhibe cochlearium quomodocunq; uelis congruenter. Exhiberi etiam potest ad noctem ex tribus piperis generibus pharmacum, erui magnitudine: robustioribus uero, Aegyptiæ fabæ. Alio autem adstricta citra dilationem clyster infundendus: balneo uero ex interuallis utendum est tempore remissionis. Præfricent autem istis tum dorsum, tum stomachum, conspergantq; nitro assato: solijs etiam calidioribus utantur, & à balneo cibis detur, minimè inflans, & post omnem cibum uinum meracius exhibendum. Cibus autem ipsorum diuidatur, ita ut in prandio tertiam, in coena uero reliquas duas accipiant partes. Fructuum uero atq; olerum humidorum esum semper habeant suspectum. Mulrum autem potum tanquam infestissimum hostem deuitent.

De uoluulo, Archigenis. Cap. XXVIII. Voluulus, adfectio est intestinorum, letalem dolorem inferens, causa adfectionis, continua ciborum corruptio existit, præsertim si multi accipiantur, uarij, & ad quos non adsueuimus, & maximè ex pinguibus carnibus. Oboritur etiam ex plagis quibusdā, & frigore uehementi, & ex acruata frigida potione, maximè si ab exudantibus accipiat. Cōtingit & his quibus Intestinum in scrotum unā cum stercore delapsum est: indeq; uolūter retrusum, ex eoq; inflammatum existit. Fit etiam ob ueneni potionem, & ob induratum sterces circa tenuia intestina impactum, in uno loco dolore innitente circa tenuia uidelicet intestina, ut admota manu durities tactui succubat, quam adfectionem chordapsū ueteres uocauerūt, hoc est, intestinorum emollicionem. Et multi sanè ex dolore statim Intereunt. Alijs uero inflammatio suppuratur, rursusq; Intestinum ipsum denigratum ac putrefactum excidit, eoq; modo deficiunt. Familiaris autem hæc adfectio ætati puerili est, euidunt tamē naturalis beneficio humiditatis. Senibus uero nō ualde familiaris est: si tamē ipsi hanc adfectionē incendant, ferè nunquā conualescunt. Accedit egris dolor circunvolutus, stomachi nimia humectatio, exolutio, ructus inanes nihil alleuātes, murmura intestinorū, cohibitio perfecta stercoreis & flatuum. Si uero intendatur affectio, omnia sursum feruntur, ob idq; & uomitus pituitæ ac bilis accedunt, frigiditas totius corporis, dolorq; plurimis etiā spirandi difficultas. Morituris autē amplius sudor frigidus, urinae difficultas, podex ita adstrictus, ut neq; specilli extremū suscipere possit: aliquando & sterces uomitu reijcitur. Si quidem igitur cibus crudus uentri insidere uideatur, aqua mulsa cum nitro exhibitā uomere cogemus: deinde rursus aquam calidam puram dabimus, ut mordacitas obtundatur. Si uero nihil crudorū ciborum in uentre contineatur, omni conatu enitendū est, quo tum flatus tum stercorea infra trahantur: idq; per glādes illidonesq; & clysteres, magna

diligentia in singulis adhibita perficiendum. Glandes itaq; conueniunt ex semine rutæ & nitro, cuminoq; ac melle. Valent etiam quæ ex brassicæ cauliculis apparantur cū melle cocto: ex profundo enim attrahunt. Cæterum glandulas longiusculas facere oportet, quæ adstrictiorē internam ani partē sphincterē Græcis appellatam, trāsire queant, quibus appositis, podex per spongas calidas foueatur, quibus sanè cyclamini succus utilissimè excipitur, quanquā cum melle etiam ac nitro idem illitus efficaciter optulatur. Idem facit centaurea cum melle & nitro: uerum in his conandū ut quā penitissimè illinantur. Per clysterem autē oleum infundatur, in quo cuminum, ruta, althææ radix aut folia, foenum græcum, centaurea, cucumeris syluestris radix, sint decocta: adijciatur autē & butyrum, & resina terebinthina, ut inde crassitudo infuso ipsi accedat, per ampliorē etiam fistulam largius infundatur, iuxta corporum rationem, aliquando usq; ad duarum heminarū mensuram. Quin & clysteres ex prædictis apparentur. Probè facit & syluestris cucumeris radix contusa, & in aqua satis diu decocta absinthio adiecto: si quidē ad decoctum ipsum mel & nitrum, oleumq; ammiscantur. Si uero sterces durius intestinis insidere cōiectamus, aut inflammationis obstructio adsit, althæam ac foenum græcum cū caricis decoquamus, butyroq; & anethino oleo plurimo ad decoctū adiecto, per clysterē inijciemus, & quamdiū quidem queāt, retinere præciplemus. Optimum autem infusum hocce est: Bituminis drach. IIII. nitri drach. I. aloës unc. I. olei rutacei dodrātem. Commodum est etiam cuminum, rutam aut absinthium cum oleo coquere, deinde percolato modicum salis inijcere, aut opopanax drach. I. aut galbani drach. IIII. Profunt & caricæ ac ruta in oleo decocta. Eiusmodi autem infusa ante cibum infundere oportet, & maximè quod ex asphalto apparatur: urgente uero malo etiā à cibo. In soliu etiam aqua & oleo refertum desiderare eos conuenit: in aqua uero althæa, ruta, & conyza decoquantur. Fomenta quoq; adhibenda sunt ex fufuribus, & per pyrateria phacota, id est, uaporatoria uasa lenticulata, & per uelicas bubulas ex oleo semiplenas. Cōueniunt etiam fomenta ex lanis oleo madefactis, in quo cuminū, anethum, ruta, conyza maximè parua, & nasturtium sint decocta. cuminum quoq; per se tritum uentri inspergendum est, deinde lana imponēda. Cōuenit enim ab irrigationibus incipere, ipsisq; etiam inter cataplasmata uti. Cataplasmata uero ex melle sint apparata, aut hydromelite meraciore: assument autem semen lini, foenum græcum, pollinem hordeaceum, loliaceā farinam, & fabarum. Infarcendum est etiam ipsis plurimum rutæ & cumini, anethiq; semen aut apij, aut rutæ semen siccū: inspergantur autem hæc crassa, & post impositionem calefiant, posteaq; assidue permutentur. Post hæc cucurbite affigantur, primum quidem ad remotos locos, inanes: deinde ad ipsos etiam dolore affectos, scarificationesq; profundiores fiant, salēq; impacta uulnuscula conspergantur, quibus postquam cicatrix fuerit obducta, malagmate ex seminibus utendum, aut eo quod ex lauri baccis constat. Potus eis conueniens est anethi decoctum. Est enim usitatum & accommodum. A potu panem in aquam feruentem coniice, eiusq; frusta calida confestim edenda

edenda præbe. Hoc enim modo seruabitur, etiam si iam instet ei suffocationis periculum. Orisbasius autem inquit: Anethū in aqua & oleo decoquatur, atq; ita bibatur, deinde frusta panis ex aqua feruenti præbeatur. Mirum in modum enim inde iuuantur, inquit, etiam si iam sterco uomāt. Ruta etiam ac cuminum trita & potui inspersa commoda existūt, & sinapis arida trita inspersa. Commodum est etiam maluæ semen, tritum ac potui inspersum. Balsamū quoque non adulteratū, in potu utile existit. Alius potus. Bituminis drachmas quatuor, cum modico nitri contere, & ex aqua bibenda confidenter præbe.

Alius. Radicis panacis drac. ii. nitri dra. i. cumini drachmas ii. excipe melle, & nucis ponticæ magnitudine ex aqua calida præbe. Alius. Castorij, anisi, piperis, culusque æquales partes cōmisce, atq; inde sesquidrachmā ex aceto mulso præbe. Asclepiadæ potus, qui & recremēta multa soluit. Elateriū sufficienti terebinthina exceptum, in catapotiaq; redactum, deglutendum præbe, aquamq; insuper bibendam. Aliud ad uoluulum remedium, quod uentrem soluit; confert etiā anhelosis, splenicis, aque inter cutem, ex lapide laborantibus, urinæ difficultati, paralyticis, tremoribus, comitialibus, uulua strāgulationi, mensesq; ducit. Medullæ scillæ crudæ, ammoniaci thymiamatis, iridis, culusq; drach. l. galbani drac. x. v. opopanacis drachmas xii. Scillam seorsim cōtere, deinde ammoniacum cum acerrimo aceto tere; postea etiam galbanum & opopanaca, simulq; mixta omnia in catapotia redige: ex quibus drachmam unam deuorandam præbe, & uinum dilutum insuper bibendum, aut aquā mulsam, aut acetū mulsam. sit autem liquoris mensura cyathorum quatuor. Concoctionē adiuuat, si ante cibum deuoretur, ultra hoc quod aluum facillimè soluit. Felicititer usi sumus, inquit Archigenes, ad uoluulos absque inflammatione, hiera nostra ex colocynthide ponere drachmarum duarum, aliquando etiam trium in catapotia redacta. Aut enim uomitu reijcitur ipsum pharmacum cum multa bile ac pituita, aut in fra ad intestinū progressum omnes causas adfectionem operantes secum subducit. Doloribus uero per seuerantibus, & maximè quibus infusi clysteres nō infra rursus prodeunt, etiam ea quæ dolorem leuāt exhibenda, itemq; cōuenientes antidoti ante somnū. Communissima igitur & optima, ea quæ ex piperis constat, & Andromachi ex uiperis theriaca existit, post eam uero quæ Mithridati nomen debet. Propriè autem in his colicæ antidoti faciunt, qualis est uel in primis quæ Zopyrios, & quæ Pæonia appellatur, quarū descriptiones in xiii. Sermonē cōtinētur. Si uero à uenenoſo pharmaco quis in uoluulum incidat, aquam tepidam multam bibēdam dabimus uomereq; cogemus, deinde oleum calidum in potu dandum, aut pinguiā iusecula, ut rursus uomant ex moderato eorū potu. deinde ita parumper quiescāt, & statim postea theriacen accipiant cū uino dissolutam. Cibi eis exhibeantur boni succi: alius uero lacte scisso euacuanda. In eo autem uoluuli genere, quod chordapsū appellari diximus, in quo in uno loco dolor innititur, ut admota manu durities & tumor tactui succumbat, circa tenuia uidelicet intestina, subitum periculum instat, ut plurimum tertiam aut quartam horam non excedens; quando ue-

ro ad suppurationem inflammatio uergit, aut longior remoratio contingit, neq; ea ferè citra periculum existit, quāquam sint qui ex eis sunt seruati. Venæ igitur sectio ante localia remedia assumenda est, deinde cucurbita, & reliqua cūra quemadmodum in inflammatione fiat. Danda uero & his assiduè ex uiperis theriaca ciceris parui magnitudine ex aqua calida infusum, etiam immittendum ex his quæ inflammationibus conducunt, uelut est fœni græci & maluæ decoctum, cum oleo & butyro. In potu exhibetur rosmarini decoctum, florisq; iunci odorati, mei, fœniculi, & maximè omnium anethi. Probè etiam ad eos facit, foliorum rhamni uiridum tritorum, & in pastillos redactorū, exiccatorumq; drac. i. ex calida aqua exhibitā. porro ex conuulsione aut ruptura obortos uoluulos uenæ sectione curare oportet, locosq; ubi dolor insignitur profundioribus fissuris impactis scarificare & diducere, lanisq; succidis irrigare: antidotos etiam dolorem leuantes bibendos præbere, uerum clysteres omnino deuitare. Si uero uoluulus propter intestini in scrotum delapsionē contingit, confestim tentandū est, ut decubitu sursum uersus uergēte adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atq; post leniter citra uiolentiam ac compressionē, ligamento adhibito contineatur. Si uero iam ex compressionē inflammation oborta sit, torminaq; ac inflationes accedant, etiam hos ipsos uenæ sectione curandos censeo, in inediaq; ad tertium usq; diem seruandos. In principio uero lanis succidis ex uino & oleo madefactis irrigandos: adhibito postea etiam cataplasmate crudæ hordeaceæ farinæ. Aliquando autem & inflammatae partes commodè per ambitum scarificantur, per althææ quoq; ac fœni græci decoctum & oleum utiliter irrorantur ac adsparguntur.

De his qui ab acri humore coli dolore infestantur,

Galen. Cap. xxi.

Quibus in colo & intestinis acris & mordax insidet humor, hi à calidis cibis ac pharmacis itemq; infusis læduntur, & à cibis abstinentes magis iritantur. Melius autem habent ex temperamentum inducentiū & mordacitate carētiū usu. Tenuēs enim & acres humores uehementissimū inferunt dolorem, aliquādo uero & conuulsiones, maximè ubi circa os uentris fuerint aggregati. Accedunt quandoq; & animi deliquia, & humiditates sudoris frigida. Hoc itaq; modo affecti, calida potata ac uomitu reiecta biliosum humorem excernunt, quicq; etiā ærugini aliquādo in colore similis existit. hic quidē igitur humor ubi in uentre cōstitit, mordens, & animi deliquia inferens, per uomitū expurgare ipsum oportet. Vbi uero in intestinis aggregetur, per sedem infundere conuenit ea quæ humores eluere atq; citra mordacitatē repurgare possunt, cuiusmodi est pisanæ succus. Cibi uero boni succi & qui non facile corrumpantur eis exhibendi, attenuantibus & calefacientibus uitatis. Oportet enim infestantem humorem aut euacuare, aut temperare. Exempli uero gratia mentionem faciam quorundā à nobis curatorum. Quidam etenim quadraginta annorum, qui colicus esse putabatur, à perfusionibus & fomentis, cataplasmatiscq; & acrioribus infusis non modo nō iuuabatur, uerū & magis exacerbabatur, & ubi mel cū pipere accepisset, extremū dolorem incurrit, & ubi fœni græci succum

succū cum melle sumpsisset, plurimum fuit irritatus. Coniectationem igitur feci, mordaces in ipsis intesti-
norū tunicis imbibitos esse humores: non facile cor-
ruptibiles et exhibui cibos; deinde ubi uidissem eū
minus à dolore infestari, uisitati humoris purgatio-
ne et opus esse cognoui: cæterum pharmaco ex aloë
amaro hominem acerrimè purgare minimè ausus
fui; nimirum ob dolorem ac indigentiam, tempo-
risq; diuturnitatem uiribus attenuatis. per interual-
la itaq; mediocria paulatim purgatione per picram
ex aloë facta, in paucis diebus ipsum perfecte sana-
ui, nullo altero remedio admoto. Alter quidam
adolescens nō paululū antea à colicis doloribus ue-
xatus, accepta scamonia purgatus est: quumq; pro
ratione accepti satis multū fuisset euacuatus, illa ma-
ximè membra quæ prius habuit imbecillia morfu
infestata sensit, ut inde quasi fluidā quandā & dolo-
rosam circa intestina haberet affectionē. Itaq; & hūc
curavi, colica remedia reijcere iussim, & ex halica
cū aqua calida decocta nutriri, grana mali punici si-
mul incoctis. Quumq; totā noctē absq; dolore dor-
misset, mane exhibuimus ei rhois succū dilutiore bi-
bendū: ut si qua ulcerosa adfectio circa intestinū esset
oborta, eā adstringeret, siue quippiā ex superioribus
partibus ad affectam influeret, id ipsum repelleret. In
prandio etiā halica similiter cū mali punici acinis &
aqua decocta uti iussimus. In uesperam uero panē
ex uino quopiam austero ac ueteri madefactū dedi-
mus. Cōcessimus etiam ut ex austeris fructibus pro-
libitu, modicè tamen, caperet. Tertia autem die quū
eodem modo fuisset refectus, in quarta hausta the-
riaca perfecte sanus euasit. Alium autem quendā
similiter affectum æstatis tempore quum plurimū
sicciret, eodem uictu curauimus, ampliūque frigidū
porum ei indulgimus. / Cæterum euacuato humo-
re, & remanente adhuc dolore, ad stupefacientium
usum confugere oportet. In huiusmodi enim affe-
ctionibus non solum quod sensum stupefacit, sed &
quæ humores tenues inspissant, caloremq; refrige-
rant, maximè optulantur.

De his qui à frigidis & pituitosis humoribus coli

dolore infestantur. Cap. xxx.

Quum uero crassi & lenti fuerint humores, qui dolo-
ris causa existunt, nequaquam stupefacientia erunt
offerenda: etenim alleuantur quidem ex eorum usu,
ob sensus uidelicet stupefactionē: uerū rursus pelus
inde habent, quod amplius per ipsa humores inspif-
sentur, & difficulter omnino excerni possint. Atqui
nauseæ unā cum uomitibus magnæq; & frequen-
tiores illis oboriuntur. Vomuntur autē pituitosa &
corrupta, retinentur excrementa, adeo ut ne flatus
quidem excernatur, neq; ructus etiam procedat. Sæ-
pe enim ueluti sursum reuoluitur dolor, ac plurimū
occupat locum; aliquando uero ex loco ad locum
digressus uehementius augetur. Manifesta uero co-
gnitio coli affecti est, quādo aliquando quidē alius
dolor infestat, quā pro renū situ, aliquando au-
tem longe inferius: si enim iuxta renū situm dolor in-
nitatur, atq; id in uno loco cum dolore ac grauitate,
renū affectionem eam esse censendum est. Conside-
rande autem ad hæc urinæ: aquosæ enim & puræ in
principio à nephriticis minguntur: quemadmodum
in sequenti tempore subsidentiā habentes asperā, de-
inde exquisitè arenosam. In colicis uero etiam si ege-

rat aliquando uenter, tamen flatuosiora excernitur: sæ-
peq; stercora aquæ inuehuntur boum stercoribus
compage non absimilia. Contingit etiam quando-
que humorem aliquem frigidum cum ipsis excerni,
quo facto confestim melius habent. Per fomenta au-
tem & cataplasmata nephritici quidem doloris mi-
tigationem accipiunt, laxatis uidelicet iuxta obstru-
ctum lapidem corporibus. Colici uero parumper
quidem uidētur mitiores redditi: paulo post uero ue-
hementius intenduntur eis dolores, diffusis uidelicet
per adhibitarum fomentationum calorem humoribus,
generatisq; flatibus, qui plurimam distentionē
operantur. Quomodo igitur oportet dolores ex fri-
gidis in intestinis humoribus obortos curare, ita ut
neq; uehementibus irrigationibus, neq; cataplasma-
tis calefiant? A calefacientibus enim diffunduntur
& inflantur omnes frigidi accrassi humores, qui in
testina distendendo augent dolores. Conuenit itaq;
ipsos dissecare & concoquere citra uehementem ca-
lorem, & per minimè instantiū usum. In exacerba-
tionibus igitur consimilis colicorum cura fieri de-
bet, qualis ad uoluulosos est prædicta. Irrigationes
uidelicet ex oleo rutaceo & si yonio & anchino,
inediæq; & fomenta ac cataplasmata, infusa item &
glandium admotiones, illitionesq; sedis. Vomitus
uero ante coenā, si quis facile uomat, præ omnibus
auxiliatur. Vbi uero malū ipsum producit ad plu-
res dies, infusio in solium ex oleo repletum adsumē-
da est: aut si hoc fieri non potest, ex aqua & oleo re-
pleatur, in quibus althæa, pulegium, ac lauri folia, si
miliaq; sint decocta. Fomentum uero siue uaporo-
riū adhibeatur ex fursuribus & milio, & cataplas-
mata quoque ad uoluulosos prædicta. Post dies ue-
ro septē purgatio ex hiera Archigenti suscipiatur.
Licebit tamē & nō purgare, uerū ab acrim ciborū
esu inchoare. Quādo uero alium ipsum omnium
minimè inflat nisi febris adsit, cōfidenter ipsum affe-
remus, Sitis autem sequitur acrim rerum comestio-
nem. Præalleuetur itaque præcedente uictu eger, ubi
ad acrim rerum esum procedere uolet: aquæq; po-
tu utatur. Flatu autem uentoso infestante, egregium
remediū cucurbita sæpius affixa, cum largiore flam-
ma existit: ut incantationi similem effectum præstare
uideatur, & in quacūq; corporis parte apponatur,
confestim à dolore liberare ac perfecte sanare cogno-
scatur. Quod si humor quoq; unā cū flatu adfuerit,
euestigio quidem à dolore leuantur, mox uero rur-
sus redeunt dolores, maximè ubi quippiā peccauit
circa diætā fuerit admissum: aut si plus quā oport-
uit, calefecerint ipsa membra. Maximum autem si-
gnū & hoc tibi fuerit ad affectionis cognitionē. Ne
calefacto itaque manifeste, sed diætā attenuatoria
utaris. Oportet autem & ante infusorum usum, cu-
curbitam dolētib; locis adhibere: indeq; oleo ruti-
ceo, & huiusmodi cūctis infusis uti. Multi uero acce-
pto clystere uehementer dolent, & uitreo humore
excreto statim liberantur. Febre autem ut plurimum
carent, sicutq; in totum non infestantur. Nascuntur &
in colo lapides, sed raro: quare oportet eos urinam
cientibus, & stomacho gratis uti, sanitatisq; tēpore
etiā uenam secare, & catapotijs ex aloë gratia præser-
uandi uti. Quādo quidem autem colum ipsum in
quibusdam debilitatum ex leui occasione, & per
interualla quædam dolores inferre cōsuevit: melius
uique

utique fuerit exquisitior diæta uti, & curâ quoque adfectioni conuenientē subornare. Qua de causa ubi à somno surrexerit æger, uentrē exonerare tentet: de inde ad deambulationē procedat. Deambulet autem & hyemis tempore, nisi frigidior sit ær, aut ipsius debilitas hoc nō permittat: idēq; faciat in loco sub dīo, aëri exposito, & patenti: primum quidem lentius, post uero cōditius. Quiescatq; ubi crura incaluerint fuerintq; delassata. Deinde domum reuersus bibat ali- quod pharmacum adfectioni conueniens, modicēq; quiescat: & ubi quotidianæ alicui ac consuetæ actioni uacauerit, per horam equo uehatur, assidue ei insi- dēdo: quod si facere non possit, in curru: si autem im- becillior sit, per nauigium. Iacens enim uectari pote- rit, quum omne corpus unā cum nauigio cōmoue- tur. Post uero ubi molestiam ex uectatione obortam modica deambulatione excluderit, leniter exclam- met, aut concinne cum uociferatione procedendo le- gar: deinde rursus modicē quiescens ad inunctionem ac frictionem exuatur. Exercitatione itaque facta, & cura admota cibum accipiat circa sextam horam, ut & ad cœnam sufficiens interstitium fiat. partiat autem cibos, maioremq; eorum partem in cœna assu- mat. Vtilissima enim colicis ciborum partitio exis- tit: præpotato igitur absinthite uino, panem in cliba- no coctum recentem probe apparatus accipiat cum oliuē colymbadibus muria cōditis, aut paucis uuæ pensilis acinis, aut ficis uiridibus tribus aut quatuor: deinde à potu, nisi ualde urgeatur, abstinat. Si uero siticulosus sit, modico potu uehementiæ sitis medea- tur: otioq; & iucunda animi uoluptate fruatur. Dein- de per circuitum adfectione repetente, deambulet: ci- bosq; probe disposito, ad cœnam accedat. In cœna si siticulosus sit, modicum præbeat, & post paruum interstitiū cœnet: ex uarijs quidem pauca, & commo- ditatibus abunde referta. Potus mediū cibum non di- rimat, sed post ipsum referuetur, qui sufficit etiam po- tus exhibeatur. multa enim potatio incōueniens affe- ctioni existit. Non longo deinde à cœna interuallo facto, ad somnum diuertat: & si quidem noctu sitis urgeat, ei parce medeatur, aqua paulatim absorpta. Atque de quotidiana quidem diætæ ordinatione ha- tēnus. Cæterum paucis subnectam etiam commo- dos adfectioni cibos, potionesq; & pharmaca. In uni- uersum igitur omnia quæ colicis exhibentur, attenua- toriæ sint diætæ. Panis itaque neq; sit aridus, neque calidus, in clibano coctus, aut si is nō adsit, in furno. Olera autem cruda quidem nō sunt danda, cocta ue- ro conueniūt, cichorium, intubū, rarius autem caulī cū lactuca, cucurbita in calido cinere assata, cocta enim stomachum ledit: malua cōcta: uerum nihil ho- rum absque pane exhibendum. Dandē etiam colym- bades oliuē cum aceto mulso ac ruta præparatē. Ab alijs uero abstinendum. Legumina omnia per se qui- dem adfectioni incommoda sunt. Verum uarietatis gratia aliquātum adsumatur lenticulā cum beta col- liquata, optimēq; contrita, aut cum ptisana: aut faba cum ptisana diligenter subacta. Cæterum rarum le- guminum usum probo, ptisana excepta: commoda enim hæc est, lapathum cum ea colliquato. Conuenit etiam fassamentum piscium petrosi locis degentiūt itemq; limaria non inueterata, nec muria condita. Pi- pere autem & ruta cum aceto mulso condita exhi- beantur. Ex carnibus conueniunt in primis uolu-

crium, secundo loco pisciū numerātur, tertium ordi- nem terrestrium carnes habent. In unoquoq; genere omnia inconsumpta reprobanda. Inter ea uero quæ pro consuetudine in cibum nostrum accipimus, ui- tanda sunt dura, siue natura, siue ætate talia existant: item quæ neruosa ac fibris referta habent carnē, graueolētiāq; ac foetida, & quæ alijs mali sunt succi, aut grauioris qualitatis, & pingula, atq; ea etiā quæ omnino macra sunt & infirma, & quæcunq; præ hu- miditatis multitudine disfluunt. Quapropter ex pis- cibus, hi qui in fluminibus & stagnis degunt, uitan- di sunt. Ex marinis autem, qui in petris degunt, his qui intra pelagi profundum uersantur, sunt præferē- di. Qui tamen in profundo maris degunt, littoreis præstant: & littorei rursus, potiores sunt his qui in marinis paludibus nutriūtur, etiāq; his qui in ma- gnarum urbium stagnis uictum quærunt. Eligendi autem sunt maxime lupi & aselli mediocri magni- tudine: scari autem & turdi ac gobi tenerrimi qui- dem sunt, & facillime secedunt: alimentum autē pau- cum, roburq; corpori addunt. Scaros autem hic non magnos intelligere oportet. Mulli autem & scorpij & passerēs, nutrimenti quidem ac roboris gratia omniū gratissimi existunt, grauiorem autem omnē habitum reddunt, ut ob eam causam frequentiore eorum usum uitare oporteat. Murenas autem & lo- ligines, sepiasq; & polypodas, omniaq; simpliciter mollia, ut quæ difficulter cōcoquantur, inflationes pariant, noxios humores generent, cenfeo reprobā- da. Ex his uero quæ testa integuntur, squilla omniū minimū noxia existit: cancer turbationem inducit: gammaro autem siue astaco pro uoluptate fruatur. Ex ostreorum porro genere, purpure, & buccina re- liquis præferenda: deinde pelorides præstant: postea herinacei recētes: deinde quæ propriē ostrea appellā- tur: reliqua uero relinquēda. Ex uolucrum genere, gallinæ omnibus præstantiores. sint autē seræ, & in- motantis altæ, deinde perdices, & palūbi, debilis nu- trimenti gratia exhibēdi, turturesq; feri ac per agros nutriti & colūbæ. Fugiēda omnia uolucrum genera, quæ in aquis degūt, tanquam graueolētia, & quæ superfluitatibus multis abūdēt. Ex quadrupedum animantium genere præstant carnes suillæ, tū cōco- ctionis & alimēti roborisq; quod inde corpori ac- cedit, gratia, tū quod facile secernatur. secundo loco hoedinae habendæ: reliquæ uero domesticæ fugiēdæ. Ex syluestribus & feris paucae, uarietatis tātum gra- tia dētur. Omnes autem carnes quas exhibere uells, ad duas dies promptas & paratas habere oportet, in hyeme præsertim, ut friables reddantur: ex aqua etiā omnes coquantur, quæ enim in sartagine fricta sunt, quantum fieri potest uitentur. Cauendum etiam à uis- ceribus omnibus: sunt enim frigida, & turbationē mouent: difficulter concoquuntur: grauiāq; sunt, & saniosa, ac foetida: nimiasq; humectationes ac nau- seas producunt: maxime tamen omnium cerebrum. Pulmo sanè hoedinus bis assatus, ac in cibo acceptus superabundans alimentum subtrahere uidetur. Qui uero eum lacte replent, deindeq; coquunt, aut assant, uoluptatis gratia non utilitatis respectu id faciunt: multoq; magis qui eum frustatim concisum in sar- tagine torrent. Sale conditū arietis pulmo maxime uetustū, difficulter & grauiter à uentre exuperatur. Cochleæ autem terrestres succulentæ in cibo sum- ptæ,

ptg, obluſtari & ſeſe opponere colicæ affectioni ui-
dentur. In liquamentis & cōdimentis cōueniunt, cu-
minum, menta, ruta, ſiſon, ſcœniculum, organiū, am-
miū, thymum, piper, zingiber, daucus, ſuccus ſil-
phij, acetum, mel, garum, uinum. Pyrethrū uero &
liguſticum, ac helenium, ſimiliaq; magis medicamē-
taria ſi prædita ſunt: & ob id in quotidiano uſu ac
diæta uitāda. In uniuerſum autem, ut ſummatim di-
cam, unius coniectionem facere oportet, ut ſcilicet
accepti cibi optime cōcoquātur. Particulatim uero,
ut ne ſiccitas excremēta apprehendat, neq; fatigetur
uēter in multis cibis cōſidendis: ne uēter ciborū qua-
litatibus obluſtetur, ueluti ſi ægre eas cōficiat, &
nimiam humectationem ei inferant, ne noxiū humo-
res generentur, neq; in uētre, neq; in uniuerso corpo-
re. Omnia enim inutilia recremēta ex leui occasione
ad affectū ac infirmum mēbrum detruduntur. Qua-
re uitare cōuenit omnia dulciora & placentas: plu-
rima etiam ex bellarijs ac fructibus: ſucunditatis ta-
mē & gratificādi ſtomacho gratia, uua alba dulcis
præ arſiditate corrugata cū pane præbeatur: ſicusq;
maturæ cuticula auulſa: uua etiā uinaceis exemptis.
Reliqua uero omnino ſunt fugienda. Vinum ſit ſub
adſtringēs, album, tenue, pellucidū, mediocri ætate,
tēperatura diluſiore, modiceq; bibatur. Quod ſi ſitis
à cibo accedat, aqua calida præbeatur. Inſenſiſſima
enim ipſis frigida exiſtit. Dulces autem prælibatio-
nes ex uino & melle apparatus, propomata Græcis
appellatæ, eō quod ante cibos biberentur, omnes de-
uitandæ. Atq; hoc ſanè modo ea quæ ad colicorū di-
cā pertinent, diiudicantur. Colicum remediū ex
ſtoechade, nephriticis commodum. Hoc omnes ue-
teres interiorū membrorū affectiones curauimus.
Datur autem ex ordine diebus xxx. & perfectē ab
omnibus affectionibus liberat. Stœchadis drach.
xviii. radicis panacis drach. v. agarici drach. ii. cina-
momī, myrrhæ, ſeminis braſſicæ ſylueſtris, iridis,
mādragoræ, hyoſcyami albi ſeminis, coſti, nardi cre-
tici quod phu appellāt, ſpicæ nardi, piperis, opij, cu-
ſuſq; drac. xii. (accipio autē piper longū) mel drac.
xviii. ſeminis cicutæ drac. xxi. dauci drac. viii.
Cōtuſa excipe melle deſpumato, ac exhibe robuſtis
ſcrup. ii. reliquis obol. iii. febre carentibus, ex uino
mulſo: febrilentibus, ex aqua. Infuſum quoq; nucis
ponticæ magnitudine cum oleo in quo ſœnum græ-
cum & ruta cocta ſunt, colicorum dolores ſedat.

Pharmaca ad colicos.

Cap. xxxxi.

Conuenientiſſimum ad colicos pharmacū uinum ab-
ſinthites exiſtit, ſi prælibatione à balneo aut exerci-
tio opus habent: eſtq; etiam nō ſidentibus ualde cō-
modum, ſi laxiore ac debiliore apprehendēte aluo,
cyathi temperati menſura ante aridorum ciborum
comestionem accipiatur. Apparatur autem uinū ab-
ſinthites, & pro occasione, uirgis recentis & pleni
abſinthij quindecim numero, per diem ac noctē in
ſiſtilli uaſe uini tenuis & adſtringētis mediocriter ue-
tuſti maceratis: menſura autem uini ſit ſextariorum
trium. Decoctū etiā herbæ ipſius, ubi ſemel tantum
ebullierit, pari modo ad uinum quod alias pro con-
ſuetudine bibunt, admixtū, uſiliter à balneo ac exer-
cicio præbetur. Melius autem eſt quod ubi oſiū ſit
ſic præparatur. Selibra abſinthij in amphoram uini
optimi recētis, quod muſtū appellamus, conijctur,
oblinitur, in eaq; permittitur, donec muſtum ceſſauit.

rit feruere: deinde abſinthium quidem abijcitur: ui-
num uero reponitur ac inueteraſcit. Habet autem
omnino amphora ſextarios octo & quadraginta.
Vinum abſinthites aluum corroborat potenter, &
quicquid ſubricum inferne in aluo ac in teſtiniſ hæ-
ret, citra animaduersionem detergit: bilis generatio-
nem præpedir: flatuſq; alios quidem depellit, alios
uero auertit: quodamq; modo ſpiritum diſpenſatio-
ni præfectum deſecat. Aloē etiā optima trium dra-
chmarū pondere deuorata aptiſſima eſt, ubi nō pro
ratione ciborum egeſtio excrementorum fiat. Quæ
admodum autem optima aloē etiam ſola ſanitati
reſtituere poteſt: ita uſioſa medicamētaria ſuperflui-
tate uentrem replet. Intercidentes uero obiter infla-
tiones ſylueſtre cuminum, quod & ethiopicum ap-
pellant, cochlearij menſura ex aquæ calidæ cyathis
duobus aut tribus potatum diſſoluit: aut ſiſon ſimili
modo: aut rutæ ramuli in aqua ipſa feruefacti. Ca-
ſtorium etiam aſidue potatum totius affectionis ap-
paratum demolitur, omnibuſq; medicamentis præ-
ſtare reperiuntur: datur eiſ drachma una in tribus
cyathis optimæ aquæ muſſæ. Lupi autē ſtercus ma-
xime album ex aqua, aut uino albo & tenui ſumme
colicis auxiliatur, inquit Galenus: non ſolum in ac-
ceſſionibus & iritationibus, ſed tempore etiam in-
teruali. Aut enim perfecte morbuſ ſedat, aut ita præ-
parat, ut ad tempus aliquāto mitius adſligat. Melius
autem ſtercus cenſetur, quod non in terrā delapſum
reperimus, uerum in fruticem aut herbam excretū.
Oſſa quoq; in ipſo ſtercore inueniuntur, quæ ipſius
animalis concoctionem effugerunt, quæ ſi trita bibā-
tur, magnopere colicis auxiliantur: quare mundiori-
bus hominibus repurgatoria exhibenda ſunt cum
ſale ac modico pipere mixta, aut alio quopiam ad
commendationem odoris. Mirum in modum etiā
manifeſte colicos ſuuat, inſtar amuleti alligatū ipſis
ægroti idem lupi ſtercus: oportet autem ſilum quo
amuletū colligatur ex oue à lupo diſcerpta ſumere,
cum ſtercoreq; ipſo in pelle ceruina excepto, ac ſilo
colligato, illa præcingere. Si uero non ſuppetet lana
ex ouicula à lupo diſcerpta, ligamentū ex ceruina iſ-
dē pelle accipere oportet. Corydus ſit paſſerculus,
qui & corydalus, hoc eſt galerita, appellatur, ſim-
plici iure coctus, aſidueq; unā cum iure acceptus,
ſummopere colicis prodeſt. Vtilitatē enim ex eo ex-
pertus ſum, inquit Galenus. Cæterum paſſerculis,
quos pyrgitas à turribus, & troglitas ab antris &
cauernis appellant, ſimilis eſt, qui ſanè circa urbium
muros uerſantur ac degūt: uerum hiſ maior eſt cory-
dalus ipſe: habetq; in capite ueluti criſtam ſiue galeā
ex pennis ſponte naturæ enatam, & circa uſas reperi-
tur hyemis præſertim tempore. Aliud. Talum
ſuillum uſtum & tritum, totū ex aqua bibendū præ-
be. Aliud. Thymi cacumina in aqua ad tertias de-
coquito, & ad percolatum decoctum mel deſpuma-
tum adijcto, bibendumq; præbeto. Aliud. Radi-
ces uerbenacæ rectæ tenuiter conciſas in aqua ad ter-
tias decoquito, ſelunisq; per quinque dies bibendum
decoctum hoc præbeto: & colicis medeberis. Vtere,
eſt enim experimento cognitum. Aliud. Hoc iſ-
dem experimento conſtat, eoq; ipſe liberatus ſum.
Mentam uiridem aliquandiu decoquito, decoctūq;
bibendum ad dies tres exhibeto, & nunquam dolo-
re adficietur. Cauendum autem ne olla in qua men-
tam

tam decoquis, per tres dies terram contingat. Remedium uero hoc eiusmodi est, ut praesentem opem ferat; estque multo usu cognitum. Lauri etiam teneriora uirgulta arefacta comedenda praebe per tres dies, quibus mentae decoctum potant. Aliud mirabile. Marrubium in uino mulso decoctum bibendum praebe. Liberabiturque aeger a dolore, neque unquam postea incidet in affectionem. Aliud. Rhamni folia uiridia trita in pastillos informa, & exicca: drachmamque unam inde exhibe febre carentibus, cum uino: febricitantibus uero cum hydromelite. Facit & ad uoluolos, omnemque dolorē flatuosum miro modo. Per ructus enim ac flatus exoluti a malo, sani fiunt. Aliud. Rhamni succum poculi mediocris mensura tantundemque passii cretici misceto: dumque in solium in balneo descendit, bibendum praebe: plurimumque tolerare id iubeto. In frigidae autem aquae solium nequaquam conscendat. Experimento cognitum est. Ex apparatus uero pharmaci hocce nobis familiare est, inquit Archigenes. Castorium & ammiū tenuissime trita duorum cochlearium mensura praebe ex aqua mulsa. Secundum uero locum hoc habet. Castorei drach. iiii. ammi, seminis apij, foeniculi, culusque drach. i. exhibe eo modo quo praecedens. Aliquando autem pro apio panacis radicem adijciens praebeo, assequorque rite quod uolo. Praestabile est & hoc. Anisi, castorei, aequales partes misceto, indeque drach. i. ex uino mulso exhibeto. Aliud. Gladiolum unā cum radice exsecatam, contusam, & cribratam cum piperis granis undecim bibendam praebe, diuturno malo hoc medetur. Caeterum duo efficacissima ex multis omnino colici pharmaci usus approbatione praestantia, inquit Archigenes, unicuique comunicabo. Sagapeni, piperis, galbani, pyrethri, croci, spondylii, myrrhae, culusque drach. i. radicis panacis drach. viii. excipe melle, & ad cerati consistudinem redige. Vbi uero usus expetat, manipulum i. chamæleucis aut chamæpitrys in uino optimo, leui, anniculo heminarum quindecim mensura, usque ad tertias decoque. In hemina deinde decocti una, ex pharmaco ad fabae magnitudinem dissolue: idque semel primo mense bibendum praebe: secundo deinde mense bis: & tertio ter: atque hoc modo usque quo quinquies exhibueris, secundum menses auctione facta procedes: nisi alui ramenta inde succedant. ea enim leniter detrahare hoc pharmacum consueuit.

Alterum uero ad dissoluendas accessiones, ualde efficax existit. Myrrhae stactae, opopanacis, succi cyrenaidi, croci, pyrethri, galbani, sagapeni, culusque drach. viii. olei picini drach. i. mellis despumati quantum suffecerit, ut ad cerati spissitudinem redigatur. Ex hoc pharmaco drachma una, in tribus cyathis passii cretici diluti calidi liquefacta exhibetur. Neque uereor hęc etiam in accessionibus, nisi ex cruditate laboret aeger, praebe, atque etiam in interstitijs per aliquas dies ex his affectionē expugnare, ualdeque mihi ex sententia res procedit. Theriace porro Andromachi ex uiperis constans interualli tempore assidue accepta, prohibuit ne facile ab accessionis irritatione rursus impeterentur. Antidotus Zopyrios appellata, praesens auxilium in debilibus doloribus existit: facit ad colicos & alui inflationes, & incipientes aquae inter cutem suffusiones, maxime eam quae tympanites appellatur: ualet etiam ad iocineris affectiones:

prodestque his qui uenenum hauserunt. Myrrhae troglodyticae drach. v. spicae nardi drach. v. croci drach. iiii. floris iud odorati drach. iiii. & dimidia, calsiae drach. iiii. cinamomi drach. iiii. thuris dra. i. piperis albi sesquidrachma, costi dra. i. Excipe melle despumato, ac nucis pōticae magnitudine praebe ex uini mulsi, aut passii ueteris cyathis duobus, aut ex aqua. Exhibeatur etiam in colica diuturna, habita tamen prius corporis cura, paululum ante horā cibi sumēdi, ad dies ex ordine quindecim: deinde ubi ab eius exhibitione per quinque dies quiesueris, rursus exhibe ad dies decē: iterumque post multorum dierum interapedinē, parū praebe, donec ea amplius opus non habeat aeger. At qui propria sua efficacia corpus se melius repraesentaturū promittit, tū carne, tū colore, tum sensu, tū firmitate. Archigenes porro Zopyriū antidotū sic parare iubet. Spicae nardi drach. vi. floris iunci odorati dra. v. myrrhae dra. v. croci drach. iiii. calsiae dra. iiii. cinamomi drach. iiii. piperis drach. vi. costi obolum, thuris obolum. Caeterum praeter opinionē colicis conueniens antidotus est, quae pæonia appellatur. In ipsis enim uehementibus accessionum irritationibus ante somnū exhibita compescuit dolores, somnumque dulcem simul produxit, ac morbum dissoluit. Quidam etiam ipsam cum oleo infundentes scopum attigerunt. Descripta autem habetur in tertio decimo De theriacis Sermone huius uidelicet tractatus: quare ea ipsa censeo confidenter esse utendum.

Aliud ualde bonū oxyporū, cito penetrans, tū colicis, tum inflatis commodum. Cumini trientem, piperis albi, cacuminum thymi, foliorum rutae, nitri, singulorum unc. i. cōtere cū aceto, ac redige in pastillos pondere unius aut duarum drachmarum. Exhibe iuxta cuiusque uires cū aqua calida. Aliud. Sisonis, calsiae, foliorum lauri in umbra exiccatorū, singulorum drach. viii. petroselinī drachm. iiii. spumae nitri albae drach. v. excipe melle, ac utere. Aut cochleare eius sicci ex aqua mulsa, in qua ruta decocta est, praebe. Aliud. Cumini syluestris cochlearia iiii. seminis coriandri, foeniculi, anisi, apij, seminis rutae, culusque cochleare i. piperis grana ix. uini sextarium i. Haec tenuissime contrita uino permisce, & quotidie cyathum unum bibendum cū aquae cyathis tribus praebe. A potu autem eger deambulet, & probe concoctionem iuuabit. Poteris & ipsum uinum calefactū praebe. Aliud Asclepiadae, quod ab omni affectione penitus liberat. Corticis salicis uiridis drach. v. zingiberis drach. iiii. piperis drach. ii. palmas passas iiii. rutae uiridis ramulos v. aquae pluuialis sextarios iiii. Omnia simul ad tertias decoquito, atque ad horas siue dies tres pro qualibet uice cyathos duos exhibeto: & post triginta dierum spatium idem rursus facto: quo per anni spatium unus, triginta & sex potiones contingant. Hoc enim pharmacū potatū hoc modo totam affectionem aufert.

Aliud. Cornu cerui recens enau adhuc capillis obsidi, tenerimisque ac uisti, cochlearia maioris modi iiii. piperis albi grana ix. myrrhae parum quid, ad commendandum odorem. Contere omnia, eisque cochlearum terrestrium magnarū unā cum testis suis tritarum, quantum uisum fuerit adijce: omniaque simul trita, & uino salerno mari mixto trium cyathorum mensura permixta, & ad mites prunas in uase fictili calefacta, ac sedulo, ne quid in fundo resideat,

agitata, præbe bibenda, ita ut nihil reliquum maneat: atque id maxime tempore accessionis, & ieiunio adhuc ægro fiat. Deinde uero cibum qui facile conficitur præbe, atque hoc ex ordine ad dies tres exhibe. His uero qui cochleas sumere non possunt, reliqua præbe sicca cum uino. Porio ad colicos, quæ etiâ inflatis, & difficulter concoquentibus, uoluulosisque est accommodata.

Abfinthij, pulegij, piperis albi, cumini syluestris, baccarum lauri decorticatarum, omnium æquales partes exiccatas ac tritas, cochlearij mensuram præbe ex aqua calida. Vtereque eo confidenter. Aliud colicum remedium per experientiam receptum. Baccas lauri .x. piperis grana .vii. opopanaca magnitudine ciceris. conijce in aquæ cyathos .iii. totumque simul seruefactum bibendum præbe, quiescatque inde æger, & perfecte sanitate restituetur. Oportet autem, inquit Galenus, ad utrosque masculi, ad feminas muliebris sexus herinacel internam membranam accipere, exiccareque ac contundere: eiusque partes tres prædictis ammiscere. Aliud, ad colicos præclarum. Colocynthida maximam non solum ferro perforatam, sed & semine electo euacuatam, ita tamem ut id quod instar comæti in ea est relinquant, uino ueteri dulci quantum eius capere potest exple, eamque per noctem integram reponere: mane uero uinum ipsum per panniculum diligenter exprime, ac percola, ut nihil ex medulla eius in ipso potu residuum maneat: uinumque ipsum calefactum bibendum præbe, quo facto æger deambulet & liberabitur.

De antidotis dolorem leuantibus, infusisque colicis accommodatis, Galeni. Cap. xxxii.

Pharmacis dolorem leuantibus, medici uti consueuerunt, ubi magnus adest dolor, aut uigiliae, aut ne ob uolentiam tussim lacrimantur ægri, uelut in sanguinis reiectione, & destillationibus à capite contingere solet. Verum in illis mediocritas exhibere solemus: quales sunt ex seminibus constantes tussi accommodatae facultates, quæ & ipsæ omnino aliquid ex sopore inducentibus pharmacis admixtum habent: uerum modicum id est inter multa adeo semina, quæ & boni odoris sunt, tenuiumque partium, & urinam clent: cuminum dico, daucumque & anisum, & quæ his similia existunt. Cæterum quæ ad colicos apparantur pharmaca dolorem leuantia eiusdem quidam generis cum illis sunt, uerum longe maiori facultate prædita, atque id ob magnitudinem in eis doloris. Opium igitur fortissimum est stupefactiuum: ammiscere autem ei oportet, ea quæ aut dolorosam affectionem concoquere possunt, aut humores ab ipso factos discutere, aut secare & attenuare, aut secundum totam ipsorum substantiam permutare. Scopus enim nobis in his est, primum quidem ut sensum stupidum reddamus, deinde ut nihil in posterum ex stupefactiuo pharmaco relinquamus, quod membro nocumetum inferre possit. Amplius autem, ut quod maximum est, affectioni opitulemur. Ad hæc itaque respectu habito, uidetur mihi debito modo & iuxta rationem propositum componere pharmacum: ex hyoscyami quidem & opij permixtione, quicumque altior somnus ac sopor, sensitiuaque facultatis stuporem inducere uelit: quo uero citius digeratur, omnemque profunditatem affectionum corporum penetret, calefactum ammiscere oportet, pilas uidelicet ac euphorbium & pyrethrum, quæ nocuos humores discutere possunt, & repurgare uiscosos, secareque crassos, & flatus uentosos attenuare, concoquereque & euacuare. Neque uero parum concocto

riae facultatis frigidorum præsertim humorum in indica nardo existit: quemadmodum autem ex aromaticis nardum coniecit Philo, sic & hi qui ei successe runt, alij aliud adiecerunt: florem lunci odorati, cassiam, amomum, ac costum. Quemadmodum autem rursus crocum coniecit Philo concoctorium pharmacum ad humorem & affectionem crudam: ita alij myrrhamque & castorium ammiscuerunt: plurimumque ex ipsis, neque id male, etiam familiaria nobis semina, apij uidelicet & cumini, anisi, ac dauci, & petroselinij, & quæcunque eius generis existunt, adiecerunt, quod uidelicet amarorum pharmacorum infucunditatem lenirent, ad digestionemque & urinæ expulsionem totum pharmacum impellerent atque inhortarentur. Si uero uaporum aut humorum crassitudinem attenuare oporteat, & hoc ipsum per ea contingit. Prima itaque, ut apparet, ex omnibus uetustioribus præclara Philonis antidota existit, de qua ipse hæc scribit.

Philonis antidota. Philonis Tharsensis medicum magnum mortalibus inuentum ad multarum affectionum dolores, siue colum quis doleat semel datum, siue secur, siue etiam urinæ difficultas, aut calcularis morbus, aut orthopnoea, aut tabes infestet. Sanat & conuulsionem & pleuritidem, ac sanguinis reiectionem, aduersusque mortem se opponit, omnes uiscerum dolores sedat, tussimque & suffocationem, singultumque & destillationem. Hanc etiam Andromachus in suis commentariis retulit, hoc modo de ea scribens: Colica antidota admirabilis, qua uxor & ad uoluulosos, & ad eos qui stercora per uomitum reijciunt in maximis doloribus: datur magnitudine fabæ ex cyathis tribus aut quatuor aquæ frigidae. Compositio autem hoc modo habet. Piperis albi drac. x. l. opij drac. xx. croci drac. x. seminis hyoscyami albi drac. x. l. spicæ nardi, euphorbij, pyrethri, cuiusque drach. ii. excipe melle cocto, ac utere. Alia antidota colica, Nicostriati Iphorheos appellata, duobus talentis emptæ, faciens ad stomachicos qui cibum continere non possunt, oculorum affectiones, & magnas uexationes, & dolores uulvæ, ex hydromelite in quo ruta sit incocta. Croci sesquidrachmam, myrrhæ drac. ii. spicæ nardi drac. ii. costi, piperis albi, piperis longi, galbani, cuiusque drac. i. cinamomi, succi mandragoræ, castorij cuiusque drach. ii. seminis dauci sesquidrachmam, alij drach. iii. & dimidiam eius conijciunt, opobalsami drachm. iii. sagapeni drac. iii. cassiæ drachm. iii. excipe melle despumato, & fabæ magnitudine præbe.

Quæ colicis infundantur, & per anum subdantur. Cap. xxxiii.

Haec generis sunt etiam, quæ sedi applicantur, quæque ad leuandum dolorem per anum, tum subduntur, tum infunduntur. Opium itaque ex genere eorum est, quæ fortiter sensum stupidum reddunt, ac somnum soporiferum inducunt. Atque hæc facit tum per se solum, tum cum pari castorio in sapa aut oleo rutaceo imbutum, tomentoque exceptum, & ano inditum. Miscere enim hæc pharmaca oportet quopiam uires ipsius opij mitigante, nocumetumque quod inde membrum inferitur impediens, ampliusque affectionem iuuante. Aliud, quod subditur colicis, ad dolorem leuandum. Castorij, croci, opij, myrrhæ, styracis, æquales partes in collyria longa redige cum aqua, & utere. Infusum ad colicos mirabile. Cedriæ quadran

quadrantem, picis liquidæ semissem, castorij sesqui-
undam, opij sesquiunciam, piperis grana .lx. unito-
cum, digito medio, uel eo qui index appellatur, usq;
ad primam flexuram uncto, & simul cū olei ruta-
cei cyatho .i. inquinato, ammixtaq; butyri unc. .i. tere-
binthinæ sesquiuncia, tepesactum per fistulam am-
pliolem infundito: subsidet enim & dehiscit, ac ab
unionē discedit. Aliud infusum, quod ante somnū
acceptum, somnum conciliat, dolorem lenit, conco-
ctionemq; probe iuuat. Succī absinthij drachm. .
i. iii. opij drach. .i. iii. aloës drachm. .x. ii. picis liquidæ
unc. .i. cedriæ unc. .i. myrrhæ unciam unam, centa-
uræ drach. .i. iii. castorij drach. .x. costi drachm. .vi. ma-
stiches unc. .i. foliorum rutæ unciam unam, styracis
unc. .i. mellis & terebinthinæ liquidæ quantum ad
coactionem sufficit, quo ad mellis crassitudinem re-
digatur. Vsu uero expetente ex pharmaco hoc drach-
mas plus minus quatuor, iuxta ægri uires ac ætatē,
in diplomate cum oleo cyprino, gleucino, anethi-
no, telino, in quibus cuminum contusum coctū est
dissolue, modicumque butyrum ammisce. Et ubi al-
uum per clysterem stercoreis eductuum prius eua-
cuaueris, deindeq; laueris, & cibum exhibueris, ac
caput ex anethino aut omphacino illeueris, ante
somnum infunde. Vtere, experimento enim con-
stat. Aliud, quod inferne infunditur, quo ego usus
magnum nomē assequutus sum. Castorij drac. .i. iii.
croci sextantem, allij tamen drac. .ii. tantum habent,
opij trientē, myrrhæ drachm. .i. iii. succi rutæ drach.
ii. nitri rubri drach. .ii. quidam uero pro nitro spicā
nardi scribunt, excipe melle despumato cocto. Vsu
uero tempore nudis auellanae paruae magnitudine,
aut fabæ tantum accipe, ac in uini mēsurā unā dissol-
ue, affusaq; olei rutacei mēsurā una, ut uidelicet duæ
mēsuræ sint in totum, permisce, ac praeloto ægro,
ante somnum infunde. Cæterum præscriptas ad do-
lorem leuandū antidotos & infusiones uitare opor-
tet, ne in nimis assiduum usum conuertamus: sedant
enim cōfestim dolores, causas uero intus reseruant:
& aut paulo post animi deliquium inferunt, & mor-
tem, aut diuturnas & indissolubiles affectiones red-
dunt. Aliud infusum mirabile. Butyri quincun-
cem, adipis anserini, adipis gallinacii, medullæ cerui-
næ, terebinthinæ, culusq; sextantem, adipis ursini
unc. .i. cumini, foliorū rutæ, castorij, cuiusq; quadrā-
tem, euphorbij recētis drach. .vi. opobalsami septun-
cē, nardi celticæ trientē, unguētī nardini lib. .ii. olei
rutacei sextarios .i. iii. Vtere hoc ipso in uehementi-
bus doloribus: euacuatione tamen prius per clyste-
rem facta, & post horæ spatium mēsurā unam
mediocris poculi tepesactam infunde, quiescereq; lu-
be, ac aliquandiu pharmacum retinere: atque ita di-
uina eius uidebis facultatē. Aliud infusum, quod
etiam causas euacuat, ac dolorem leuat, facit & ad
diuturnam renū affectionem, & ad calculosos: eosq;
qui inuoluntariē urinam eijciunt. Allij capita ma-
gna tria, rutæ uiridis manipulares fasciculos duos,
olei dulcis lib. .i. iii. Allia decorticato, & cū ruta ac o-
leo donec torrefiat coquito, atq; id ad prunas sumū
nō emittentes facito, ac deinde percolato, ad oleūq;
butyri lib. .i. affundito, picis liquidæ sextarij italici
quartam partem, cedriæ tantundem: unito, ac in ui-
treo uase recondito. Vsu autem expetente, sextantē
inde, aut minus iuxta ægri uires accipito, oleoq; &

uino pari mēsurā acceptis, ita ut totū hemina una
fiat, cōmisceto, tepesactumq; infundito. Aliud in-
fusum. Olei cyprini lib. .v. castorij sexuncem, anti-
dosi reglæ quæ etiam tetrapharmacum appellatur,
sexuncem, emplastri ex succis sexuncem, terebinthi-
næ sexuncem, butyri sexuncem, baccas lauri centum
& unam, baccas allij magnas quinquaginta unam,
cumini lati unciam unam, rutæ manipulum unum,
Baccas lauri & allia mundato: latum uero cuminū
& rutam in pila tundito, & in hemina una uini uete-
ris dulcis macerato. Sequenti uero die affuso oleo
& butyro, in diplomate decoquito, percolato, ac re-
liqua ammisceto, pariterq; castorium cum oleo tri-
tum. Vitor. Vbi uero usus postulauerit, pharmaci-
culus sextantem accipito, & adipis anserini liquefa-
cti itidem sextantem ammisceto, tepesactumq; inijci-
to. Infusum colicum admirandum. Foeni græci
ac lini seminis æquales partes, quantum satis uidebi-
tur accipito, & in aqua præmacerata decoquito, atq;
ubi succus inde prodierit, quantum ad usum satis ui-
debitur percolato, ac in eo ipso quod percolaueris,
lanas succidas eluito, expressisque lanis, ad aquam,
salem & oleum moderate adijcito, simulque unito,
ac tepesacta infundito.

Cataplasma colicū, ex libris Seueri. Cap. xxxiiii.
arinæ cicerum nigrorum, seminis brassicæ, farinæ foe-
ni græci, singulorum æquales partes decoque cum
melle; oleoq; cyprino, modico uino affuso. Est &
alterum admirabile remedium, cuius efficaciam ex-
perimētum ipsum approbauit. Accipit autem foe-
ni græci partes .ii. baccarum lauri contusarum, ma-
stiches chiæ, & terebinthinæ, singulorum partē unā.
Coquitur cum uino & melle. Epithema colicis,
inflatis. Silphium plurimum cerato cyprino
excipe, & impone. Ego uero, inquit Archigenes,
etiā castorij paululū admisceo, efficaciusq; redditur
ad stomachi præsertim inflationes. Aliud epithe-
ma ad colicos, inflatos, coxendicum dolores, pleuri-
ticos, ac stomachicos, & diuturnū uomitū cibitra-
hit etiā, ac duritias emollit. Ceræ, picis, resinæ pi-
nus, adipis taurini, baccarum lauri, singulorū quincun-
cem, ammoniaci thymiamatis trientem, galbani
quadrantem, piperis sesquiunciam. Aliqui etiam cā-
chryos quadrantem, ammiq; tantundem cōijciūt.

Aliud. Ceræ libras .ii. celtici nardi, floris luncti
odorati, cassiæ, cyperi, cuiusq; sextantem, colopho-
niæ libras .i. terebinthinæ sesquilibram, thuris, py-
rethri, culusq; sesquiunciam, euphorbij unciam .i.
costi drachm. .xxx. unguenti irini quantum suffe-
cerit. Arida in uino rigata ac exiccata cōtundito &
cribrato, atq; ita liquefactis inspergito. Ad finē etiā
opobalsami sextantē aut quadrantē ammisceto. Fa-
cit quæcūq; etiā polyarchion; maxime tamē inflatis
conduci. Vtendū quoq; ad colicos paulo mox sub-
scripto polyarchio appellato, atq; eo quod ex baccis
lauri constat, quod ad hydropicos describetur, & si
qua his similia existunt. Propriè autē colicis conue-
nit, inflamatisq; & inflatis, quod in epistolis Archi-
genis refertur, ex seminibus constans. Ceræ drach-
mas centum, terebinthinæ drach. .i. ammoniaci thy-
miamatis dra. .i. opopanax, iridis illyricæ, anisi, me-
liloti, nitri, adipis taurini, foeni græci, seminis apij,
culusq; drach. .xxv. mellis sexuncem, acetū cyathos
duos. Arida contundito & cribrato: ammoniacum

autem in aceto mulso per noctem unam maceratum reponito, postera die liquecibilia feruefacito, in mortarioq; cum pistillo tusa commisceto. Hoc epithema hoc modo purum citra aliarum rerum admixtionem impositum, cutem exasperat, eisq; qui vitio sis humoribus amplius abundat, serpiginosum pruritus excitat: quare in his qui teneriores carnes habent, ex cerato rosaceo quantum tibi satis videbitur pro curandi corporis ratione, ammisceto. Dropax etiam assidue super omnem ventris amplitudinem inijciatur, atq; etiam super dorsum. Cõponatur autem is ex pice & resina, modica cera, sulphure, bitumine, manna, nitro, adarce. Intenditur autem usus eius si calidiori & non pinguefactæ cuticulæ admoveatur, atq; etiam inter exercitia incumbere sinatur. Aliquando etiam balneum suscipiatur, ex nitro assato toto corpore large consperso. Huiusmodi enim dropacis usus utolentius adfectionem destruit, sicut & sinapismus & thapsiæ usus multis q; antea exquisita digesta sunt usi, & per alium, si quidem adstricta fuerit, sunt euacuati, affectionem omnem excidit. Porro dropacum & sinapismorum apparatus in tertio Sermone sunt descripti. Aliud, Archigenis, uile quidem, uerum ob efficacem ipsius lenitatem in precio habendum. Picis liquidæ libras II. ceræ sexuncem, sulphuris uiui, nitri, aluminis scissilis, culusq; quadrantem. Ad picem liquidam præcoctam usquequo non amplius inquinet manus, ceram inijcito, qua liquefacta ab igne tollito, aridaq; tenuissime trita inspergito, unito, emollito, ac utitor. Flatus inferne educit, cutem uellicando iuctude afficit, ac per omnia colicis auxiliatur. Prodest etiam coxendiculi doloribus, & articulis refrigeratis, lenisq; indurato. Epithema ex bacis lauri, ad colicos. Ceræ, colophonis, picis sicce, spumæ nitri albi, ammoniac, cuiusq; sextantem, bacarum lauri decorticatarum sesquilibram, piperis sextantem & unciam dimidium, ammi, canchryos, iris, cuiusque sesquiunciam, galbani sesquiunciam, unguenti irini librâ unam. Quod si canchrys non adsit, pyrethri cõjce, & liquefacta cum siccis permisce. Hoc etiam approbat Oribasius. Polyarchion, quod in Alexandria præparatur. Calsiæ, amomi, rosarum, cyperi, cardamomi, spicæ nardi, nardi celticæ, folij, tridis, ænanthes, cõpositiõis hedychroi, mastiches, croci, meliloti, succi absinthij, ammoniac, thymiamatis, aloës, bdellij, myrrhæ, culusque unc. I. xylocinamomi, piperis cõmunis, helenij, styracis, cypheos, thuris, cuiusq; sequiunciam. Succos cum aridis commixto, ammiscetoq; xylobalsami scrup. XII. floris iunci odorati scrupulos XII. terebinthinæ sexuncem, unguenti nardini bessem, rosacel. lib. I. hederæ unc. XVI. opobalsami sextantem. Succulenta uino diluta terito. Polyarchion, quod dialemma, id est intermissio, appellatur: quod ipsum & in Alexandria præparatur. Castorij unc. I. piperis longi sesquiunciam, myrrhæ, opobalsami, hedychroi, foliorum malabathri, calsiæ, radicis panacis, spicæ nardi, cuiusq; quadratē, costi sextantē, amomi sextantem, cinamomi sesquiunciam, aut pro eo calsiæ quadrantē, floris iunci odorati trientē, croci sextantē, cyperi, cardamomi, tridis, aristolochiæ longæ, aristolochiæ rotundæ culusq; sextantē, pyrethri trientē, ammoniac thymiamatis quadrantē, aloës quadrantem, ceræ lib. IIII. terebinthinæ lib. IIII, resinæ trientem, unguenti nardini lib. III. quod

etiam styracis sextantem addunt, uini uero quantum omnino sufficit. Polyarchion multo experimento cognitum, quo confidenter ad omnes diuturnos frigidiores, præsertim circa uiscera morbos utaris, ego sanè eius usu semper clarus euasi. Styracis pinguis sextantem, foliorum malabathri sextantem, unciamque dimidiam, malorum cotoneorum repurgatorum uncias XV. masuaphij uncias duas & dimidiam, spicæ nardi, croci, cuiusq; sextantē, dimidiamq; unciam, micarum purarum sextantē, cypheos sextantem, ænanthes quincuncem, carpobalsami sequiunciam, comæ absinthij unc. II. & dimidiam, mastiches unc. II. & dimidiam, chareophylli unc. I. scrupulos VI. ammoniac thymiamatis unc. XX. colophonis unc. XVI. opobalsami unc. XII. & dimidiam, olei gleucini deuncem, nardini sextantem, melini unc. XX. propolis sextantem, rosacel sextantem unciamq; dimidiam, mellis cochlearia uiginti, terebinthinæ chizæ unc. XX. ceræ unc. XV. uini spathite quantum sufficit ad reliqua cum eo conterenda, & ad rigandas micæ. Arida quidem omnia contundito & cribrato, mala uero cotonea concisa cum uino spathite coquito, ac per se terito, deinde ammoniacum & mastichē cum uino conterito. Styracem uero cum opobalsamo in altero mortario dissoluito, atq; omnia trita ac dissoluta simul unito, liquefactisq; quæ liquefieri possunt, & ab igne ablatis arida infareito, ac donec refrigerentur agitato: deindeq; ad ea quæ in mortario trita sunt adijcito, ac unito, adiecto etiā simul melle, post uero emollito ac optime subacto, tanquam ualde probato utitor. Aliud epithema præter opinionem efficax ad omnes præcordiorum uetustissimas etiam affectiones, præsertim in stomacho ac uentre. Quibusdam etiam quibus aqua inter cutem iam suffundi incepit, profuit. Duritias enim in stomacho unice dissoluit, supra hoc quod uisceribus robur & firmitatem addit. Compositio hoc modo habet. Resinæ pinus libras XX. ceræ libras quinq;, terebinthinæ deunces duas, olei lētiscini uncias XVI. gleucini uncias XVI. thuris quincuncem, ladani quadrantem, ammoniac thymiamatis, nardi celticæ, succi absinthij, mastiches, bdellij, calsiæ, culusque quincuncem, cardamomi, floris iunci odorati, tridis, baustiorum, singulorum trientem, carpobalsami quadrantem, chareophylli quadrantem, herbæ sabine quadrantem, stactæ albæ quadrantem, piperis sextantē, suffimentorum subscriptorum libras IIII. ænantharum quantum sufficit. Suffimentorum uero quæ ad huius epithematis compositionem conijciuntur, apparatus hic est. Liliorum alborum depuratorum lib. II. styracis pinguis libras duas & dimidiam, folij lib. I. careophylli trientem, costi trientem, spicæ nardi trientem, mastiches quincuncem, amomi sexuncem, onychum aromaticorum ustorum & extinctorum, opobalsami, singulorum bessem, carpobalsami sexuncem. Apparato ac redigito in pastillos, eisq; ad præscriptam compositionem utaris.

Quomodo aluum fluxione laborantē curare oporteat: ex libris Philumeni. Cap. XXXV.

Aluus tum in febribus, tum citra febres, fluxione laborat, maiori uero difficultate eorum, qui febricitant, cura perficitur, coniecturaq; exquisitior opus habet. In principio enim aliena à natura salubriter euacuare consuevit, ipsa uidelicet natura undiquaque ad superfluum

perfluum & incommodum reſciendum cogere, quæ admodum in febrilibus morbis frequenter fieri uidemus. Conuenit itaque rebus ſic ſtantibus, aut uſquequo naturâ omnem curam ſuam impenderit expectare, aut ipſius etiam motus adiuuare. Etenim obluſtari & excretionis cohibitionem moliri, maiorem morbum facit: ſiquidem quæ cohibentur ſuſum perlata dolores capitis, aut phrenitidas, aut lethargos, aut parotidas inferunt planè pernicioſos. Quare in principio ea quæ in corporis commoditatem utiliter excernuntur, minime inhibere oportet. Poſtquam uero ſam diutius perſeuerauerint fluxiones, non ſolum ſuperflua euacuantes, uerum habitum uelut colliquantes, uiresq; cõſumentes: tunc ſanè reſiſtere eis oportet, tũ per ea quæ per os ſumuntur, tũ quæ per anum infunduntur, atq; ea quæ forinſecus imponuntur. Si itaq; bilioſa pura recremẽta prodierint, in magis ſalubria permutare ipſa oportet, non tamen per cohibitionẽ eos curare. Bilioſum enim tũ in uentre, tum in leiuno inteſtino aggregatum, atq; poſt coacervationem retentum maxime lædet: nam & ſtomachum ſubuerit, & uifceribus inflammationes inferit, & ſicim accedit, & febres inſtaurat, omnesq; prædictas affectiones in capite efficit, atq; in totum grauiorem affectionem reddit. Lac igitur in tali incommoditate bubulum aut caprinum tepidum, recens, mulctum ac potatum auxiliatur, aut ad ignẽ decoctum, aſſidueq; agitatũ, donec ad tertias ſe reductũ: quod ipſum & per fluuiales ſilices, ferriq; laminas igni cãdefactas ac in lacte extinctas fieri poſteſt. Cæterũ in decoquendo ſuperſtante concretione ſiue ſpumam myſtro aut pinna auferre oportet. Hoc enim nullum compendioſius remedium ad fluxiones bilioſas reperire poſſis. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipſum in nidore aut etiã acore conuerſi conſueuit, maiusq; nocumentũ quàm cõmoditatem inferret: tũ ſanè in præſens ipſum exhibere uitabimus: aquæ uero quarta parte ad lac ipſum aſſuſa, decoctionẽ faciemus, donec dimidiũ totius cõſumatur, atq; hoc modo exhibebimus. Et hæc quidem ad bilioſas fluxiones ſufficiant: ad alias uero ubi ſufficiens iam euacuatio ſit facta, fluxioq; ipſa adhuc perſeueret, irrigationes adhibeantur ex oleo omphacino, aut roſaceo, aut melino cum uino: efficacius autẽ his myrteum eſt, ſi uehementiori indigeat adſtrictione, tertia aut quarta uini parte ei admixta. Quod ſi robuſtiora corpora cõtingant, gallæ, malicoriũ, cuſpreſſi pilulæ, in ipſa irrigatione incoquantur. Cum num etiã tritum lanæ cõuolutæ infarciatur, & apũ ſimiliter ſemen pari pondere: urinam enim iritat, fluxionesq; ad inteſtina eò diuertit. Cæterum & ſedes ipſa ex decocto quopiam prædictorum adſtringentium foueatur. Perſeuerante autem adhuc fluxione, etiã cataplaſmatis ex palmis & acacia & alumine erit utendum: ceratis itẽ ex oleo myrteo apparatus. Conueniunt quoque emplaſtra ex eadem materia apparatus. Parabile uero & efficax hocce eſt. Mora præ immaturitate adhuc acerbiora, & albicantia, ſemitem accipe, probeq; cõtere: deinde ceratum ex oleo omphacino apparatus, ita ut ceræ in eo uncia ſit, olei uero ſextans, adijce, uni, & utere. Idem faciunt cruda mora exierata cum ouo trita ac illita. Porro in ueteratæ ſam affectioni epithema ex cœnanthe conuenit, & ex micis emplaſtrum in ſtomachicis deſcri-

ptum, quod ſpumam argenti & ceruſam admixtam habet: item reliqua quæ in ſermone de cœliaca affectione deſcribuntur. In potu uero accepta uentris fluxus, poſt ſufficiẽtem inuiliũ euacuationẽ, ſanant: capilli ueneris decoctum, paliuri folia, uinacei uuæ triti, ſpica nardi, ſpinæ albæ radix, quin & cœliacis & ſtomachicis eadem opitulantur. Mora etiam immatura & adhuc acerba ad ſolem pluribus diebus deſiccata, deinde trita & reſoſita, uſuq; expetente bibita, magnum pharmacum alui reſtrictiuum ſiunt, ut ad diurnas etiam cœliacas affectiones commode exhibeantur, aliasq; omnes quæ fluidæ exiſtunt, atq; etiam dyſenterias. Contunduntur quoq; & obſonijs ammiſcentur, quemadmodum rhus culinariuſ conſueuit. Magis tamen aluum cohibent rubi mora immatura & acerba eodẽ modo exſiccata, & in potu exhibita. Illitione autem optima ad fluidam aluum eiſmodi utaris. Acaciæ, maſticheſ, cœnãtheſ, cuiuſq; æquales partes accipe, ac unumquodq; per ſe cõtere: deindeq; permiſce, ac ſicca ad ſerua. Neceſſitate uero exigente ouo ſubaſta aluo illinito, faſciculumq; lanæ purpureæ imponito & obligato. Malo uero adhuc perdurante, etiam dorſum inde illinito.

Cura eorum qui ex debilitate alui fluxione laborant: ex libris Galeni.

Cap. xxxvi.

Vnumquodq; membrum propria actione perſungitur, quum temperamentum ſuum iuxta naturam adſeruat. Seruabitur autem temperamentum, ſi refrigeretur, ubi ad caliditatem fuerit diuerſum: contraq; caleſciamus refrigeratum: humectemus uero exſiccatum, & rursus deſiccemus humectum. Iuxtaq; eandem proportionem etiam tractemus eos, qui ex harum intemperierum complexu & coniugatione afficiuntur. Oportet enim ſemper exceſſui contrarium opponere, uſquequo ad moderationẽ, & in id quod iuxta naturam habet, membrum ipſum reducat. Ratione igitur edoctus ſum etiam octo differentias curationis imbecilli uentris eſſe. Calidæ intemperiei cura. Vidisti namq; & tu ipſe aliquos quidẽ per diem unam, quosdam autem ampliori ſpatio, frigidæ potu curatos: quorum aliquibus nõ ſolum recentem frigidam fontanam exhibui, ſed etiam coctã & poſtea niue adobrutam & refrigeratam. Eduliã etiam hoc modo refrigerata eos accipere, uidiſti me concedentem: maxime ſi à plurima caliditate uexarentur. Dedi autem & lactis ſpumam ſimiliter refrigeratam, & frigida iuxta ipſorum uires poma eodẽ modo refrigerata: piſſanam quoq; citra ſalis aut alterius rei admixtionem probe coctã, aliaq; eius generis infinita: unicum ſcopum refrigerandi propoſitũ habens. Prohibui autẽ ne abſinthium aut aliqua adſtringentia conſtingerent. Frigidæ intemperiei cura. Alios autem ex frigida intemperie laborantes, ſimiliter ab adſtringentium uſu prohibui, omnibus uero modis caleſcit: uino ueteri facultatis plurimũ calidæ exhibitio: itemq; cibis caleſcientibus cum pipere. Humidæ intemperiei curatio. Quibuſdam uero humidam uentris intemperiem habentibus, medicationis ſcopũ in exſiccando feci, dedi q; eis edulia ex natura ſicca: carnes probe aſſatas, & paucũ potum: omniumq; adſtringentiũ uſus his cõuenientiſſimus exiſtit: in quibus enim humiditas multa ac ueluti mador circa affectum membrum adest, citra tamẽ humorum uſitationem, ita ut quantitatũ tantum ex

cessu adfligant, ac uelut perstillantem ipsum uentrē reddant: in his commodissimus existit ciborum ac potuum, itemq; pharmacorum adstringentium usus: exoluto nimirum ac languido tunc facto ægroto membro. Cura uentris ob siccitatē immodice fluidi. Alium autem siccissimum iam factum, ut tabidis simillimam figuram haberet, in cōtrarium omnino habitum deductum curauit. Huic quum in principio exigua intemperie uexaretur, à siccitate uidelicet humectatione indigente, medici qui cum curandum suscepserant, absinthium bibendum dederunt: malaq; cotonea, ac similia in cibo, extrinsecusq; similiter adstringenda adhibuerunt, atq; hoc modo totum aridū hominem reddiderunt. Hunc ipsum nos curauimus uniuerso corpore eius omnibus modis humectato. Qualis autem est senectus in sanis, talis est sicca intemperies in ægris: ut etiam incurabilis existat, ubi perfectē compleatur. Perfectum autem complementū in hoc est, si solida substantia similarium corporum aridior fiat. Est autem & altera quædam siccitas eorum corporum, quæ ex substantia humore compacta constant, uelut est caro & pinguedo. Alia etiā tertia siccitas est, quum humiditas ex qua membra connutriuntur est deperdita. Circumsunditur autem ea ipsa humiditas circa omnes animantis partes, instar roris in ipsis dispersa, quam impossibile est ipsis membris apponere citra nutrimentum: quare difficilissima omnium huius affectionis cura existit. Alia autem siccitas est, quæ circa paruas arterias ac uenas cuiq; membro proprias consistit: hæc ipsa ob sanguinis penuriam contingit. Omnes uero has siccitatis species extreme offendunt austerorum ciborum ac potuū pharmacorumq; exhibitiones. Consumunt enim etiam si quid in ipsis innatū ac insitū humoris relinquatur, partim quidem exhaurientes, partim uero exprimentes per meatus in interiorē latitudinem alui, partim etiam ad alia membra depellentes. Curare igitur has siccitates conuenit, tum conclusos meatus laxando, tum quod ad circumiacentes partes depulsum est attrahendo, per humectantemq; cibum unumquodq; simile membrum propria humiditate replendo: quemadmodum nos arefactū penitus à medicis hominē curauimus. Balneū itaq; temperatissimum his conuenit: ita ut æger aliquandiu in tepērata aqua moretur. Præstat autem prope exteriores balnei fores calidē solū locari: neq; enim aëre omnino ad ipsos indigemus. Oportet etiam gestando ipsum in balneum inducere, atq; inde educere. Deinde ex oleo antequam induatur inungere. A balneo uero statim lac asininum recens mulctum exhibendum, asina in domum in qua decumbit æger deducta: paucissimo enim tēpore in ambiente aëre lac ipsum morari oportet. Parum etiam mellis optimi tepidi lacti ammiscendum, atq; ita usq; ad secundum balneū quiescendum. Postea uero mediocriter & accurate fricatū, secundo lauabimus diligētī confectione, tum ex ruētibus, tum ex uentris tumore facta, an exhibitus cibus sit rite confectus: modicum uero tempus à primo balneo usque ad secundum intercedat, horarum iiii. aut v. puto, maxime si tertiō etiā ipsum lauare uelis: id si non uelis, non refert etiam plurimum. Lauabis autem tertiō, si aduersus sit balneis plurimis uti: & hoc sanē minime negligamus, quo à singulis balneis priusquam induatur, oleo eū

inungamus. Cæterum si lactis usu delectetur, etiam à secundo balneo ipsum propinabimus: si uero non, ptisanam probe decoctam, aut hālicam instar ptisanæ decoctam dabimus, indeq; statim rursus quiescere iussim, postea ad tertiū balneum ducemus: aut cōtrā, ad coenam, si lauare nō uelit. Panis ei præparetur elibanites, purus, recēs, probe assatus, fermentum & salem mediocriter admixta habens. Pro obsonio sit piscium quispiā petrosi aquis degentiū, aut asellus ex iure albo. Atqui & alæ & testiculi gallinaceorū lacte nutritorū conueniunt: perdices item ac auiculę montanę ac molles carnes habentes. Verum quæ in palustribus ac fluminibus degunt uitanda: omniaq; duras habēda carnes, & grauecolentia, pingulaq; & fibris referta: & ut summā dicā, caput cibi sit ut bene nutriat, & facile concoquatur, minimeq; uiscosus sit, neq; superfluitatib; abundet. In potu sumat uinum album colore, tenuēq; substantia, & modice omnino adstringens, purūq; & parum aquę ferens, quo nomine accipi uolo, id quod quum temperatur modicā omnino aquę admixtionē perferre potest. Scopus autē quantitatis potus in hoc sit propositus, ut nūquam uentriculo innatet, neq; fluctuationis aliquę sensus faciat. In cibis uero spectetur, ut quantū possibile sit, uentrem non grauent, celeriter concoquantur, & inflationem non pariant. Atq; hoc sanē modo maxima corporis siccitas curatur. Quū uero mediocris siccitas existit, utpote quū uires nō extreme sunt collapsæ, pleniorē diētā sufficere expedit. Proponatur autē siccitas similib; quidem prædictę, cum qua tamen frigiditas sit coniugata: in tantum igitur prædictis ex calefactū sylvia miscebimus, quantū membra fuerint refrigerata. Ponatur autem primū mediocriter ipsa esse refrigerata: apponemus itaq; paulo antē dictis, in lactis quidē usu plus mellis: in uini uero usu, idē quidē genere dabimus, minus autē priore aquosum, & plurimum annorū. Cæterum & edulia omnia calidiora exhibenda, non solū ex naturali tēperatura, sed à recenti etiā qualitate. Ex unguēto etiā nardino assidue uētre inungemus, ut nunquam aridus fiat: si uero nardinum non adsit, mastichino erit utendū. Sed & ipsam mastichen cū nardino unguento terere licebit, lanāq; purpureā ex eis imbuiā uētri adhibere. Si uero frigiditas multa intemperiei sicce copuletur, ut coget ferē ad uberius calefactū, primū quidē affectionē grauissimā esse scito, & quę difficulter corrigi potest, multaq; diligentia opus habet. Vbi uero ipsdē usi fuerimus, quæ ad mediocrē frigiditatē sunt descripta, speramus sanē quanquā longiori temporis tractu nos affectionē sanatos: ita tamē ut à uehemēter calefactibus abstinemus. Demus autē amplius quiddā ex melle depumato unā cū lacte, atq; etiā ipsum per se ampliori modo: itemq; decoctū ac in pastillos redactum. Vinum uero uetustius eis eligendum. Optimum autē pharmacum in omnibus his quo frequenter picatores utuntur, existit. Eo itaq; uniuersum uentrē illinire oportet, atq; mox prius quam refrigescat auellere: uerum hoc non sæpe in diē, quorundam more, facere oportet: Discutit enim hoc modo, non uero bono sanguine membrum ipsum replet: nos autem non discutiendi gratia, sed ob sanguinem bonum ex uicinis partibus attrahendum, eius usum approbamus. Auxiliatur etiā omnibus his puellus carnosus dormientibus

mientibus acclīnatus, ita ut superiorem uentrem semper contingat. Quod si ex ordine multae siccitati caliditas non ualde multa misceatur: in hac primam uisus rationē seruabimus: ita ut mel prorsum non gustent: uinum uero minime uetus accipiant, quod sit album & tenue, & ætare annum nō excedat. Edulia etiā tepida exhibebimus quæ lactosa, hoc est lactis teporis appellantur, si hyems, ad sitim æstate uero, uelut aquæ fontanæ cōueniunt edulia, quæ nō summè frigida sunt. Ventrē quoq; omphacino aut melino oleo illinemus. Si uero maior caliditas adsit, etiā dilutiores uini temperaturā faciemus, frigidumq; dabimus, quemadmodum fontana aqua in medio uere esse solet. Nosse tamen operæ pretium est febrilem similem hanc affectionem esse, atq; si quis contentio sius eos refrigeret, periculo non uacare.

De coeliaca affectione, Archigenis. Cap. xxxvii.

Non omnis uentris fluxus coeliaca affectio proprie appellatur: neq; enim si cibi crudi & incocti infernè prodeunt, neque si corrupti ac in peregrinum habitum mutati sunt, coeliaca affectio uocatur: uerū tunc solum quum leuia & humecta excrementa egeruntur: uentre præ imbecillitate ea digerere nequeūte. Sequitur autem ipsos assidua egestio, aliquando foetida cum animi deliquij sensu, aliquando uero etiam sanguis flauus ac tenuis unā cum his quæ egeruntur destillat: & ob eam causam cibū auersantur, decoloresq; & uehementer graciles fiūt, corrugata insuper eorum uniuersa cute: & uenæ sanè quæ in uentrem deferuntur, fluescunt: & ad magnam omnino desperationem res deuenit, si morbus diutius duret, ægris ad cōuenientem diætā pigrescēdibus. Si itaq; morbus autumnō incipiens ad hyemem usq; se extēdat, difficilīus omnino curatur. Causæ autem affectionis sunt, assidua cibi corruptiones, & peregrinorū eduliorum ingestiones: amplius autem si frigiditas aut uehemens ardor insit, similiter etiam plagæ uentrem lædunt: & in morbis quoq; longis, uenter male affectus adfectioni huic obnoxius fit. A medicis quoq; purgantis potione quidā coeliacam affectionem inciderunt. Nosse tamen oportet, quod aliquando quidem per circuitus malum hoc adfligit, tēporibus quibusdam aluo restitante, quibusdam uero ordinate per certas horas fluente: aliquando uero incessanter apparet. Quin & hoc nosse oportet, quod sæpe non solum permanet appetitus, uerum etiam amplius augetur: & ob id corruptionibus acruatim perq; uices factis, omnia mala augetur. Recente igitur morbo, diligenter inuestigandæ sunt ipsius causæ, ut ab eis maxime nos adseruamus. siue igitur corruptiones præcesserint, cauendum ne amplius fiant, simulq; uisiosi humores ex eis generati euacuandi: siue peregrinorum eduliorum ingestio causa existat, ea ipsa auferre oportet: siue labor, aut fatigatio, aut aliud quippiam ex prædictis, ab eis similiter abstinendum est, ægriq; in quiete adseruandi, atq; si ferre queant, in inedia: aut certe omnino modico cibi usu. Aliquando autem etiam larga portione utendum, ægerq; ad reuomendum cogendus, maxime si humores in uētre collectos perceptemus. Deinde attente exquisitæ diætæ insistendum, donec affectio in totum tollatur. Consistit autem exquisita diætā in electione qualitatis ciborum. Quod si tamen in principio difficilis appareat morbus, etiam

reliquis præsidij utendum. Primum igitur media inspicienda sunt, atq; si inflammatio, aut similis inflammationi dispositio circa uentrem reperiatur, cataplasmatibus utendum est, quæ ex professo inflammatio nem soluunt, ac fluxus retrahunt: qua in re, palmæ cōmode semini lini ammiscuntur. Cæterum cataplasmata ipsa minime calida apponere oportet: sed tepida saltem: atq; si intendere eorum uim uelis, acaciæ quippiam & hypocisthidis, aut malorum cotoneorum, aut aluminis recte ammiscueris. Magnifice autem profunt lentiscus & rubus simul cocti: acetum quoq; nullum appositum in cataplasmatum cocturā assumitur. Summe uero commodam utriq; affectioni nouimus lolīaceam farinam simul cum eis incoctam. Inflatione autem plurima infestante, cum inuā aceto mulso inspergimus, rutamq; & anethum. Manifestum est autem quod ad cataplasmatum retentionem, quo contentius inhercant, etiam rosaceum adhibemus, ac parum uini: ampliusq; lentiscinum, aut oenanthinum, aut myrsinimum. Oportet autem lana excepta ipsa imponere. Cæterum optimum ad ipsos tale cataplasma existit: Malis maxime cotoneis & palmis, absinthijq; coma in uino decoctis, uinum ipsum percolatur, ac sapæ cretice tertia pars ei affunditur: deinde simul calefactis polenta tenuis inspergitur, & absq; oleo decoquitur. Oleum uero quo uenter illinitur sit melinum. Post cataplasmata conuenient cerata ex myrsinino aut lentiscino oleo apparatus: quæ tamen ex adstringentibus quædam habeant admixta, ex acacia dico, & quæ eius generis existunt. Apulsiuum etiam his ceratum est ex oleo myrsinino apparatus, quod mora immatura ac acerba trita, parumq; sanguinariæ habet admixta. Porro ubi diuturnum fuerit malum, etiam ad mala gmata transeundum est: summopere uero concludnū eis uidetur, quod ex seminibus constat, & ad colicos est præscriptum: itemq; quod ex lauri bacis, quod ad aquam inter cutem describetur. Postea etiā adhibenda ea quæ uehementer rubefaciunt cutem. Quod si adfectio adhuc intendatur, etiam dropaces adhibēdi medicamentaria uel præcellentes, bitumenq; habentes & adarcen: post dropacem uero, morsum balneo secundum caliditatem mordaciore curare oportet: duabusq; post dropacis amotionem horis sinapismi adhibendi ex sinapi & caricis: ita ut modico tempore impositos sinamus, oleoq; inde ad locū circumfuso, ad balneum ducamus. Atq; id semel facere non sufficit, sed bis ac ter: neq; enim hoc ipso aliud efficacius remedium in prædicta corporis constitutione apparari potest: & ob hoc non multo tempore inherere id oportet, ne loco nimium exusto, secunda & tertia huius præsidij admotio prohibeatur. Mirabiliter etiam uomitus efficaces sunt, tum à cœna, tum ieiunio facti, nimirum quæ corrupta sunt euacuantes, & quæ ad intestina dilapsa sunt attrahentes & conuerrentes, ac proprias uentris actiones reuocantes. Si uero liceret ab his ad eos qui à raphanis sunt transire, maiore compendio affectio ipsa expugnaretur. Quidam etiam ueratri albi purgatione usi sunt: & si subiectæ uires eius auxiliij sint capaces, præ omnib. huius usus eligatur. Ego uero ad coeliacos prius quàm uires extreme deficient, purgatione humori conuenienti utor. Aliquando autem medicati quidam &

acres, aut etiam serosi humores tuniculis uentris aut magis intestinorum infartu aut imbibiti rodunt & iritant, atq; ex omni corpore humores ad locos circa uentrē & intestina aduocant, diuturnarūq; fluxionū causa fiunt. Cæterum ex egestis recrementis & ex cōsequentibus accessionibus, affligentis humoris specie coniectare oportet, atq; ita cōuenientē exhibere purgationē. Præstabilius tamen est pīeræ ex aloē cōpositioni scammoniae scrupulum i. aut amplius, si uires tolerant, ammiscere, & cum aqua mulsa præbere. Quod si ex atra bile sit humor infestans, epithymū adijcere oportet, & post affligentis humoris euacuationem, eis uti, quæ affectis mēbris firmitatē addere possunt: cuius generis sunt ex malo punico eclegmata, ad stomachi subuersiones descripta. Illud etiā notatu dignū, quod aliquib. fluxiones ex adstringētum usu oboriuntur: uētre nimirū ab ipsis lēso propter imbecillitatem aut mollitiē sensus. Videtur autē, inquit Archigenes, ad alui fluxiones, hiera mea, drach. ii. ex ea exhibitis, ad eorū quæ in uentre ac intestinis insident deterfionem, ut nullū enī aliud hæc ipsa quā rectissime emēdat & corrigit, deinde theriaca utor. Vt etiam, inquit, zopyrio mea ad colicos descripta, ad fabæ magnitudinē ex ea præbens cū duobus cyathis pāsi ueteris, aut acetū mulsi boni paulo ante horā cibi sumendi, ad dies ex ordine x. v. deinde ubi ab eius exhibitione per v. dies quiesceuerit, rursus exhibeo ad dies x. atq; hoc tādū facio donec nō amplius opus habeat æger. Præstat etiā exhibere quæ ex duob. piperis generibus constat cōpositionē. Omnino igitur simplicia pharmaca & facile digestibiles cibos exhibere oportet debili existente aluo. Si uero febricitent etiā, eo magis adstringētum sylua erit uitāda. Quod si tamē prædicta remedia circa affectiōis solutionem nihil efficiāt, uisio adsumatur. Perurere autē superiorē uentrē oportet, interualis duorum digitorū mēsu aut ampliorib. etiā factis, ulcerationesq; seruare ad multum tempus ad fluxionū in uētre transitū ac deriuationē. Licet autē & per pharmacū crustas infligere, si quis ignis admodonē formidet. Postremū quidem igitur locū inter prædicta remedia uisio habet, propter nimiam seueritatē: si quis tamen uirili animo præditus sit, prius quā cōcidant uires, post præsidiorū firmitatem addentiū usum, quodam modō uisione uti potest, quæ sola se affectiōis difficultati opponere consueuit. Atq; huiusmodi quidē est quæ forinsecus coeliacis adhibetur cura. Operæprecium est autē & per adstringentes potius auxilium ferre, ubi humiditas imbecillitatis causa existat ac fluxionū. Plantaginis itaq; semen siccū tritum ac potatū præclare facit, tum per se, tum alijs etiam admixtis. Quidam etiam gallinarum uentriculis utuntur exlccatis ac tritis potui inspersis. Eandē efficaciam & struthocamelorū uentriculi habere creduntur. Proderit & lapathi semen tritum, maxime uero oxylapathi. Cornu item cerui tenerimū uisū cum modica galla præbe bibendum: aut nucum iuglandium corticem quo tinctores utuntur, siccum tritum cochlearij mensura ex aqua. præbe: aut quercinam glandē contusam ac cribratā cochlearij mēsurā instar farinæ uino austero insperge, ac exhibe: aut cæcri marini uel fluuiatilis testam uisā cochlearij mēsurā præbe cum aqua: aut thuris granū fabæ magnitudine in uini nigri cyatho uno dissolutum, sanguina-

riæ succo pari mensura ammixto præbe, aut gūmis albi uermiculari unciam unam tritam ex uini nigri cyathis tribus præbe: aut uuarum passerarum uinaeos, siue etiam uuarum torrefactos: exhibe cum polenta aut canis stercus siccum, cum quodam odorato: aut plantaginē siccam contusam & cribratam dato: aut bituminis quātū satis esse existimas, deglutendum præbe. Bonum est etiam corticis quercinæ glandis decoctum: itemq; pelliculæ decoctum, quæ sub cortice quercus reperitur. Castanæ corticis decoctum, aspalathi decoctum, radice pæoniæ decoctum, atque ipsa etiam radix sicca, trita, potui inspersa. Corticis loti arboris decoctum. Calicum item papaueris torrefactorum drachma una ante somnum cum uino diluto potata: quin & semen capitum papaueris tritum exhibitum egregie auxiliatur. Mirabiliter autē acerba & immatura mora profunt sicca trita in potu exhibita, quemadmodum de alui fluxione est prædictum, eodem modo & rubi mora immatura & acerba exhibenda. Utendum & simplicioribus ad dysentericos descriptis medicamentis, maxime his quæ ex pomis sunt adparata. Commoda sunt quoq; ea quæ urinam cient, fluxionem sæpe transferentia: uelut est, apium, foeniculum, anisum, adiathum, acorus, damasonij foliorum dra. i. & quæ his potestate assimilantur. Ex cōpositis prodest pastillus Thrasandri, & qui ex seminibus constat, ad dysentericos scripti. Pastillus item ex spina, & ex electro, ad sanguinem per sputū reijcientes descripti. Omnium uero maxime antidotus theriace ex uiperis cōstans prodest: multoq; adhuc magis quæ Esdre inscribitur, efficaciter enim auxiliatur. Mirifice quoq; coeliacis cōducit antidotus desposynos appellata: cuius cōpositiō hæc est. Spicæ nardi, cinamomi, piperis, costi, hyoscyami, croci, seminis papaueris, opij, omnia æquali pondere accipito, cōtundito & cribrato, ac cū melle unito. Datur ex ea duorū scrupulorū pondus ex uino. Orisani, ad coeliacos. Baccarū myrti nigrarum cochleare unū & dimidiū, rosarum siccarū, cœnanthes, singulorum cochleariū dimidiū, palmarū carne sufficienti excipe, & pastillos informa, ac exhibe dra. i. cū aqua, aut uino dilutus temperato his qui febris carēt. Aliud, ad coeliacos. Lauri uirgula iii. piperis grana xxxiii. cumini grana quinquaginta unū, cōtere, ac præbe febre carentibus cum uino, febricitantibus cum aqua: pro una autem uice hæc in potu sumuntur. Cæterum simplicia & antidoti oportune ante cibum exhibentur: pastillus autē dolorem leuans, ante somnum. Malagmate uero cōcoctorio in alui fluore per omnia huiusmodi utaris. Bdellij, ammoniaci thymiamatis, cæchryos, cusi, q; sesquidrachmā, opopanacis drach. vi, styracis drach. vi, myrrhæ sesquidrachmā, piperis grana centum & triginta, galbani drach. vii. terebinthinae drach. vii. ceræ drach. tredecim & dimidiā, adipis suilli drach. xvi. Siccissima conterito & cribrato: molliora uero in pila tundito, ac sicca inspergito: pila itemq; pistillo ex unguento irino illitis, ut molle ad tactum & glutinosum reddatur. Vermes autem terreni in testa ad cinerem exusti, & ieiunis cum uino exhibiti, uentris fluxiones sistunt: eorum itaq; tres aut quinque exhibeto. Porro cognitu dignissimum & hoc est: infinita scilicet remedia hoc nomine prædicata esse, quod aluum sistere possint:

uerum feri profectus est omninū meminisse: & cauē dum etiam ne nimium largus fiat eorum usus: quam plurimi omnino morbi ab aceruata pharma corū uicissitudine delentur, qui aliās non facile hominem relinquunt, si diēta solum exquisita utatur. Vna autem tutissima & compendiosissima uia ad affectionis extirpationem diēta existit. Diēta coeliacorū. Coeliacū oportet mox ubi à somno surrexerit, faciēq; proluerit, ad deambulationē prodire, ita ut pro uiribus progrediatur. Deinde frictionē simpliciorē adhibere, parce uidelicet & minime cōtente fricando maxime uentrē, oleo uero quo cōfricatur, canchry & pyretrum incoquatur, quo postea detergo, corpus ex oleo dulci impinguetur. Balneo autē ut plurimum renundamus, aliquando tamē ad lassitudinis uel alicuius alterius rei medelā ipso utimur. In balneo uero smegmate quopiā utatur, quod cutē lancinare ac pertundere potest, uelut est nitrū assatum, sex uini uista, & quæ eius generis existunt. Ab inunctionibus & balneo prandendū est: perspicendum uero, si quicquam aliud ut cibum diuidamus. Duas itaq; tertias partes cibi in coenam referuet, atq; ipsum etiā qui in prandio exhibetur panē dimidia tum per se sumat: reliquū uero cum obsonio simplicid. Frumentaceum enim alimentum naturæ homini maxime cōuenientis existit. Oleribus autē raro uescatur: inflationes enim pariunt, minime apti sunt etiam omnes arborum fructus, insuauibus humoribus uentrem & stomachum replentes. Cæterum à prandio deambulationibus indulgendum, & animi aliqua laxamenta adhibenda: somni enim diurni nocentissimi sunt, nisi lassationis sensus adsit, aut nox uigilata præcessit: uesperī autem à coena dormiat. Ex frumentaceis igitur conueniunt panis clibanites, halica, oryza: uerum sorbitiones ex milio non probo, quum concoctu difficiles & uisiosos humores miliū producat. Ex leguminibus non inepta est lenticula assata, & cum plantagine cocta, utile est & palmas sorbitionibus incoquere, malāque cotonea, eisque simili ut prædita. Ex oleribus brasiica eligatur duabus aquis decocta, cum oleo ac modico garo: paucissimōque aceto: intubus itē coctus & cichorium, pastinacaque ualde ex cocta cum simplicid liquamento. Varietatis autem gratia eis etiam carnes exhibendæ, ex gallinis, columbis, aut auiculis montanis, ex pedestribus etiam tenerimē & friabiliores coctę omnes, concoctis simul quibusdam fructibus, aut pomis, aut myrti baccis. Bellaria modice præbenda, uelut sunt amygdalæ, palmæ, nuces, atq; ea uoluptatis gratia tantum ac dulcoris degustanda. Fructus sint minime inflantes: uua modica pensilis: in pomis ac piris similibusq; mediocritas seruanda, atq; hi ipsi cum pane exhibendi. Vinum conuenit subadstringens. Omnis autem liquor qui in potu exhibetur paucus sit, & post omnem cibū præbeatur. Multus enim potus uētris fluxionibus insensibilissimus existit. Nosse tamen oportet, quod in his qui cum mordacitate fluxionibus infestantur, optime facit lactis potus: ita ut in principio calidum ac recēs mulctum detur: postea uero ad medietatem decoctum aut etiā ad tertias, quemadmodum in alui profluuiū est prædictum. Hoc enim modo exhibitum simul sistit ac temperat fluxiones. Cæterum in quibus lac ipsum in nidorofam aut acidam qualitatem permutatur,

quarram partem aquæ affundito, prædictoque modo decoquito, ac exhibero.

De colliquatione. Cap. XXXVIII.

Quum uero per uentrem quiddam excernitur, quod non ab accepto cibo aut potu prodit, sed ab humoribus ex corpore in uentrem defluentibus, assimilaturq; ei quæ tum per uomitum reijcitur, tum inferne procedit, flauebilis: differt autem ab ea tum graueolentia, tum quod flauus quodam modo excrementum apparet, strigmentisq; crassitudinem habet, aliquādo uero & oleosum aut adiposum existit. Colliquatio morbus is & syntexis uocatur. Recens enim compacta substantia pinguedinis ac carnis ab ardenti febre resoluitur & colliquatur. Diutius uero perseverante malo, ex ipsis etiā solidis partibus aliquid colliquescit. In qua pessima febricula frigida purissimę frequēs potus remedio existit: eiusdem etiam qualitatis cataplasmata & epithemata ad pectus & præcordia adhibere oportet: cibi quoque refrigerantes exhibendi: reliquaq; quemadmodum in estuantibus, ac in habitū conuersis febribus dictū est, faciēda. Quod si in uiscerum inflammatione hoc contingat, ualde periculosa adfectio est, & cum prædictiōe remedijs prædictis uti oportet. Porro si acrescit ac mordax quod excernitur, intestinaq; inde ignescant, mordacitatem lenire oportet per infusiones, ubi urgeat malum, nullo exacerbationum respectu habito, præter quàm circa initium accessionis. Infundatur autē succus oryzae ad tactum tepidioris, itēq; lac tepens. Si uero mordacitas cum tormine contingat, ptisanæ succus infundendus est cum ouis crudis ac conquassatis, admixto rosaceo, aliquando uero bituminis etiam dra. i. ammiscenda. Quod si dolor adhuc perseveret, bis ac ter etiam prædicta infundantur. Conuenit quoq; his lac potatum, ad quod quarta aquæ pars est affusa, quemadmodum dictum est, decoctione ad tertias facta.

De lumbricis, ex Herodoto. Cap. XXXIX.

Lumbrici & in febribus, & circa febres nascuntur, tum multitudine, tum magnitudine, tum colore, tum temporibus etiam differētes. Circa initia enim morborum generati, substantiam suam ex subsacite corruptione capiunt: circa uigorem uero ex malitia morbi: circa declinationem autem ex permutatione omnium in melius, qui sanè citius separantur: natura enim ipsos, reliquorum recrementorum instar, foras propellit. Censentur autem peiores ex ipsis, maioris minoribus, paucis multis, & albis rubris. Videntes etiā mortuis deteriores. In infantibus autem & pueris, atque his qui ad pubertatem accedunt, maxime abundant. Cæterum hoc malo affectos incredibilis morsus stomachi ac uentris cōcomitatur, tussiculaq; tenuissimæ ac frequenter fricantes, quū tamen nihil reijciatur. In somno tremūt, & præter rationē exurgunt. Quidā uero & linguā foras protrudunt, oculosq; claudūt, ac tacturni sunt, exciātesq; molestē ferunt, ob imbecillitatē uigilare nequeunt. Quidam autem oculos sanguine suffusos habent, & pulsum inæqualem, obscurum, deficientem & recurrentem. Quibusdam etiam appetitus perditio accedit. Pueris insuper dum dormiunt manducatio lingue, cum exertione, cui accedit conformatio oris in modum lactentium aut accipientium cibum: uerum hæc paucō tempore & per interualla fiunt.

Aliqui

Vermin significat

Vermin significat

Aliqui uero infantes cum clamore præter rationem exurgunt, citoq; rursus collabuntur. Aliqui etiam dentibus frident: quod contingere uerisimile est, an malculis attrahentibus cibum, mordentibusq; uentrem ac intestina. Iam uero & ad stomachum quosdam processisse constat, nausæarumq; & morsuum fuisse causas. Sæpe etiam per se sursum reieciuntur: aliquando uero cum pituitoso quopiam humore. Quidam etiā infantes neglecti motu pulsus destituuntur, ac refrigerantur, atq; eorum instar qui animo linquuntur, tenuē quendam ac frigidum sudorē exudāt, & ut plurimū liuescunt. Contingit autē aliquādo faciem fieri rubicundā, maxime circa malas: uerū color hic rursus in pallorē solito maiorem trāsit. Alij autē instar delirantiū peregrina in somnis loquuntur. Alij decubitū transmutant cōtinue dormientes, angoreq; uexantur, ex locoq; ad locum sese uicissim profectant. Verū paucos omnino ex ipsis morsum confiteri constat. Pleriq; enim in mentis inopia ac taciturnitate degunt. Porro qui à rotundis lumbricis infestantur, etiā cibū auersantur, & si quid acceperint reuomunt, aut nausæabundī uix deglutire possunt: febres in eos cum uehementi extremarum partium refrigeratione irruūt. Quibusdā autē ueter ad tympani modū inflatur. Ex Hippocrate. Lūbrici circa aluū his signis deprehenduntur: si somnolenti sint non permittente morbo, & extremæ partes frigidae, & cordis siue oris uentriculī dolor, urinae conturbatae, & lingua humectatur. Item qui animalculis in uentriculo abundant, spuō replentur: & si tenuis quispiā prodierit lumbriculus, amplius non spuunt. Quicunq; igitur in ore uentriculī lūbricos habent, ferē in totū ipsos uomitu reieciunt. Quibus uero in intestinis insunt, ipsos inferne externunt. Omnes autē nausæabundī sunt, uomuntq; quæcūq; acceperunt. His qui punguntur similes sunt: totoq; corpore cōtrahuntur, & repente acruatimq; mouētur, ac tormina accusant, interaneorūq; dolores. Eua porationes quoq; ad caput delatę, uertigines inducūt. Quia & diæta quæ præcessit, ostendet tibi lūbricorum generationē: ex crassioribus nimirū & quæ difficulter cōficiuntur, & largius ingestis, & maxime frumētaceis, contingente: quos itē balneis à cibo ufos fuisse cōperies. Cæterū cura ipsorū, alia cōmunis est, & cum ea quæ febricitantibus cōuenit coinci dens. Alia uero eis proprie cōducit. Quū igitur ambigua adhuc affectio existit, & rationalis quidem suspicio adest, incerta tamen, neq; planē cōperta, mī tioribus sanē remedijs uti oportet. Ab acrioribus enim febres magis exacuuntur, si adfectionem falsō habuerimus suspectam: ubi uero cōstans ac euidentis cognitio contigerit, ad tēpora morbi animū intēdere oportet. Ad eos enim qui circa primas horas nascūtur, acrioribus remedijs est utēdū: & magis utiq; si iuxta declinationē totius morbi adparuerint: eos uero qui uigēte morbo apparēt, mītijs curabimus: atq; id eo magis, si inflammationes & tensiones uiscerum cōcomitentur. His igitur cataplasmata adhibeantur ex semine lini crassiore lupini farina, parī mensura admixta. In potu pueris ante cibū myxarū decoctum amixta menta præbeatur. Eis autem qui ad integram etatem peruenerunt, absinthij aut abrotoni cremor. Vtriusq; uero etiam si febricitent, et si trimēstres tantum infantes existāt: uermes terreni cum

cum sapa confidenter exhibeantur: si uero sapa nō admittant, cum hydromelite, aut ut libet, præbeto nihil ueritus, neq; uilitate contempta septem numero dato. Quod si nō nuda sit suspicio, sed certa deprehensio lumbricorum, cataplasma ex lupinorum farina, in hydromelite decocta imponendum, cui aliquando etiam bryoniae radix adijciatur. Umbilicus autem felle taurino expleatur, aut melathio cum lacte muliebri trito, aut absinthio, aut abrotono, aut bryonia, pinguibus ficibus admixtis. Spina uero uniuersa ex medulla ceruina inūgatur. In potu etiā his uermes terreni septē cocti ac triti cū sapa præbeantur, aut ut libet alijs tenuissimè triti. Efficax est & abrotonum, & santonicum, & absinthium decoctū, unumquodq; aut cū ficibus aut palmis exhibitum. Aliquando autē hæc confusa & cribrata, & cū melle in catapotia redacta, deglutienda præbentur. Dari potest etiam chamæmelorum decoctum cum modico rosaceo, uehementer enim efficax existit. Egrege quoq; facit cretica sapa cū rosaceo potata. Aliud. Nuces pineas in aqua calida macerato, teritoq; ac rosacei cyathum unum affundito, & cum uino optime temperato tribus horis bibendas præbeto. Inde enim enecatī, tum uomitu, tum secessu ejiciuntur. Commodè quoq; in cibo sumitur senectio uiridis, ac barba hircina. Eosdem etiam auriculæ muris succus, & calaminthæ ac mentæ decoctum, citra molestiam educit, quod & brasicæ semen ac petroselinū facere perhibentur. Superior autē uenter cerato integratur ex absinthio oleoq; cyprino adparato: aluo autē adstrictæ glans immittēda, præsertim pueris, quæ si nihil profecerit, clyster adhibendus morbi uigore remittēte: ex absinthij, aut abrotoni, aut cetauræ decocto, cum melle ac nitro. Cæterum lumbricos, qui circa uigores febriles nascuntur, quosq; malignos appellamus, per simpliciora remedia subducere conabimur. In cataplasmata igitur absinthium, abrotonū, ac santonicū miscebimus, aliquādo etiā lupinū. Olei autē omphacini propinabimus eis, qui facile id ferunt, cyathum unum. In sorbitiones uero mellis plurimum coniiciendum: & pitisanæ quoque oleū plurimum omphacinum incoquendum, halicam itē in myxarum decocto præbebimus tum per se, tum cum aqua mulla: præbibitiones uero ex oleo semper augebimus: multæ enim cōmoditates existunt. In uniuersum enim omnia quæ lumbricos educunt aut per acredinem occidendo, aut per amaritiē subducendo, aut ad excretionem irritando, aut per consequentē ad ea quæ exhibentur lubricitatem, efficaciam cognoscuntur. Extrahuntur enim simul, ut uerisimile est, per sorbitiones lubricas ufas reddētes, aut etiā per inuicinatam aliquam efficacem qualitatem. Viuentes equidem uicinas intestinorū partes adprehēdunt: mortuæ uero unā cum stercore euacuantur. Prodeunt autē quedā adhuc uiuæ, uerum uertigine affectæ, & si ita dicere libeat, seminecatę. Prosunt autem & his uermes terreni. Porro per pharmacorum potiones enecatōs lumbricos, citra dilationē per glā dulas extrahere oportet: uitiosa enim ex ipsis exhalatio procedit, quæ & appetitū & digestionē lædit. Atqui ad nausæas ex lūbricis obortas, lācinationesq; stomachi, salis granū in ore detineant, deglutiantq; liquefactum. Acredo enim, ut apparet, eos statim infra subsidere cogit. Oboriuntur autem & in alui fluxione

signa lumbricorum

*signa lumbricorum
febris, et sine*

xlione lumbrici: eos fluorem inspissando, & concoctione cum per cibos, tū per cataplasmata, in melius permutando, curare oportet. In quātum enim fluxiones inualescūt, tantū etiā lumbricorum generatio augetur: uicissimq; fluxu cessante, lumbrici interquiescunt: quare diligenter conabimur ut aluū adstringamus, firmitatemq; ei adiciamus. Coniicienda itaq; in cataplasmata, aliās ad fluxiones sistendas cōcinna ta, ea quę ad lumbricos sunt prædicta, & quę fluores non exacerbant: uelut est absinthium, abrotanum, santonicum: iamq; etiā malicorium, acacia, & balauſtia, eisq; similia, cum cruda hordeacea farina. Cerata quoq; imponēda ex his apparata. Viēdum & præporationibus, inter quas reliquis omnibus plātaginis succus est præferendus. Ad utrāq; enim affectionē, ueluti dixi, efficax existit. Licebit autē & in hoc casu uermibus terrenis, quemadmodum antea dictum est, uti. Ceratum ad lumbricos. Farinæ lupinorum, absinthij, farinæ hordeaceæ tenuissimę, cuiusq; drac. vii. fellis taurini unc. i. scobis cornu ceruini drach. iiii. ceræ quadrantem unciaq; dimidiū, olei secundarij sexuncem.

De lato lumbrico.

Cap. xli.

Lumbricus qui latus appellatur, in his qui febre carēt abundat, & in longis ac diuturnis enascitur morbis. Est autem latus lumbricus, si ita dicere libeat, permutatio pelliculæ intrinsecus tenuia intestina ambiētis, in corpus quoddam uiuum, quod continuos stomachi morsus infert, & ad cibos incorrigibilē appetitum: ceterū ea quę accipiuntur non succenturiata digeruntur, sed cito excernuntur. Consequitur affectos corporis gracilitas, & imbecillitas cum tarditate, assiduusq; famis sensus. Quod enim uiuificatū est in intestinis, ubi recēs exhibitum cibum cōsumpsit, postea ipsa solida corpora arrodit. Minime uero fallax signum erit, si cū recrementis quædā cucurbitæ semini similia excernātur. Porro cura penitus cum præcedenti cōcordat: præporationes enim cōueniūt amaræ & acres, aliq; item comestiones. Aut enim in regre excernuntur, ut incredibilem magnitudinis de se præbeant adspectū: aut etiā prodeunt in partes concisæ. Et semel sanē exolutæ non amplius secūdariorio congregātur. In potu igitur etiā his uermes terrenos, ut dictū est, exhibebimus. Proprie autem ad ipsas auriculæ muris succus facit, duorum cyathorū mensura, cum uno zythi cyatho potatus: celerrime namq; ipsos educit. Aliud, ad latos lumbricos, quos carias, hoc est institas, uernacula uoce appellant. Nitri, cardamomi seminis, piperis, singulorum æquales partes commisceto, & cochlearij mēsurā inde præbeto: confestim enim educit. Aliud. Corticis radicis mali punicæ acidæ in suprema parte delibrati, piperis, cuiusq; drac. quatuor, cardamomi drac. sex, marrubij drach. duas, mellis despumati quantū sufficit, præbe ex eo cochleariū post aliq; comestione.

De ascaridibus.

Cap. xlii.

Ascarides etiā lumbricorum species sunt, circa extremas intestini recti, ac primam internam adstrictiorē ani partem, sphincterem Græcis appellatam, consistentes, uehementemq; pruritum his locis inferentes. Et pueri quidem assidue ad egerendum iritantur, à contraria uero instantia, & aduersus eas contentione, ac ut plurimū ab excretionē melius habent. Qui uero ad integrā ætatem peruenerunt, causarum mo-

lestiam inferentium animaduersionem habentes, digitos in anum immittunt, ac procidentes educunt: quin & ignitis lapidibus, aut litorcīs calculis à sole perustis fouendo, mordaces pruritus leniunt. Cæterum quum quidam præ pusillanimitate nihil horū auxiliorum admittant, minime malum ipsum negligere oportet, sed citra dilationē curare, atq; his qui falsi diuersum sentiunt causas indicare, ac curandi uiam demonstrare. Porro causæ huius accessorij mali, cibi sunt, & frigiditates, alimentiq; corruptiones, quas præstat prius uitare. Huius uero signa potissimum ex recrementorum græueolentia sumuntur. Postea pueri quidem acri muria infusa sunt euacuandi, aut absinthij decocto oleo ammixto. Calidiorē quoq; sublutionē esse conuenit, à qua ubi prodierint recrementa, affecti loci illinendi, ex simplicibus quidem acacia & hypodisthidis succo, rhoisq; succo cum alumine liquido. Compositis uero Andronij pastillo, & sphragide polyidæ inscripta, & lanæ succidæ pastillo, ac quę his similia existunt. Coacta enim ab adstringentibus caro corroboratur, aptitudinemq; ad animalculorum generationē amittit, atq; ascaridas ipsas excludit. Perfectiores etiā ætate similiter euacuandi acrioribus ac calidioribus infusis, uelut est muria & centaureæ decoctum: deinde cedria eis infundenda: ad quam rem corneā fistulam undiquaq; perforatam apparare oportet, circa fundum amplam, ac magnitudine locis conuenientem, quam ultra adstrictiorem ani partem inditam cedria explemus, ita ut cedrię immissio palam tū per amplitudinem, tum per transversa, undiquaq; contingat: post uero quiescere subemus, sæpe eundē curationis modum repetentes. Aliud, quod & pueris & qui perfectæ sunt ætatis conuenientissimū & efficacissimum existit. Carnem ueterem saltam, pinguedine deraſa, sublongam & rotundam formabimus, atq; ita adaptatam podici atque adstrictiori ani parti intrudemus, ligamentoq; adhibito, quam diu sustinere possint, inditam sinemus: deinde soluemus, prædicta q; infundemus atq; illinemus: idem etiā remedium sæpe repetemus. Cibi uero frumētacei generis, boni succi, ac qui facile concoquuntur, præbeantur.

De abscessu in intestinis.

Cap. xliii.

Oboritur aliquādo abscessus in intestinis, ad cuius eruptionem eliquationes aquosi puris consequuntur: quare ignari ac inexperti hoc uiso decipiuntur, dysenteriam hanc affectionem esse putantes: & sanē ut uerum fatear, si post eruptionem diuturna sit exulceratio & perseueret, eo modo quo dysenteria curatur, uerum in principio neutiquam consimili curatione subducitur. Vnde etiā quosdam ægros periclitatos esse cōstat, male ab indoctis medicis tractatos, qui statim in principio dysentericas infusiones adhibuerunt. Pro uiribus itaque affectiones hæ inter se distinguantur. Iudicatu enim faciles existunt. In abscessu enim semper dolor pulsabilis præcedit iuxta affectum locum innitens: neq; morsus, neq; decursus adsunt, quales in dysentericis præcedere consueuerunt. Deinde mutatione in suppurationem incipiente, rigores inæquales consequuntur, febresq; circa uesperam maxime irruentes: postea ubi perfecta humidi mutatio fuerit facta, omnes molestiæ minores fiunt, uehementesq; dolores remittunt: deinceps

menta & sanguis floridus, & sordes plurimæ excrementis ammixtæ: tenesmi etiam aderunt uolenti, si piusq; ad excretionem incitantur, quum tamen nihil excernant; neq; ualde esuriunt, neq; sitiunt, neq; febriunt, nisi ulcus sit cancerosum. Porro primum periculum ex ulcere serpente ac depascente dysentericis impendit: secundum uero ex sanguinis eruptione, tertium autem ex fluxu à locis ab imbecillitate affectis consequenti. Ceterum ab ulcere serpente ac depascente pueros magis opprimi adparet, usq; ad ætatis uigore calidum, namq; & humidum huius ætatis corpus est, quare ad putrescentes morbos perferendos magis sunt parati. A sanguinis autem eruptione, magis hi qui in ætatis uigore consistunt, infestantur, & qui à natura multo sanguine abundant. A fluxionibus autem seniores amplius læduntur, & qui malo corporis habitu sunt præditi. At uero ubi ulcus proserpturum est, dolor concomitatur. Acris enim & liquida cum torminibus recrementa egeruntur: deinde & odoribus & coloribus uariata una cum mordacitate. Febres uero quoq; prauæ accedunt, inediaq; ac corporis lactationes consequuntur: æstus ite continuus ac sistis. Iam uero ulcere serpente ac depascente in pelus procedere, ramena excernuntur: feculentaq; multa ac nigra efferuntur, & sordes magnæ intestina ambiuntur pellicularum, si in crassis intestinis exulceratio consistat. Quum autem sanguinis eruptio futura est, exolutio totius corporis, animi deliquio similis præcedit, ac grauitas loci. Ea uero quæ egeruntur, lenta sunt ac uiscosa, deinde cruenta. Postremum etiam grumi multi excernuntur, primum quidem flauis, ad finem uero nigri & graueolentes. Manifestum autem est, quod uires quoq; eorum subuertentur, sudoresq; effundentur: aliquando autem & conuulsiones ad plurimam euacuationem consequuntur. Atqui fluxione laborantes, curationis tempore compacta stercorea excernunt, deinde non longè post ulceris rectorium splendidum una cum stercore effertur. Modicè namq; ab infusis fluxus sistitur, deinde paulo post ulceratio excoriatur. Ceterum si alicubi certe in intestino recto ac colo consistens dysenteria facillè curabilis existit: quæ uero in tenuibus intestinis hæret, difficulter curatur, maxime uero in seluno. Iam uero & hæ quæ post abscessuum eruptiones fiunt dysentericæ, graues sunt, propterea quod uires delectæ ita sint per coincidentes inflammationibus febres ac dolores. Graues sunt quoq; quæ cum uehementi inflammatione oboriantur, quæq; cum febre ac perditione appetitus. Pessime uero dysentericæ sunt, in quibus quæ excernuntur porri ad spectum habent, suntq; nigra, plurima, uaria, graueolentia, & quæ una cum excrementis sordes pelliculis magnis commistis excernunt. Veruntamen & mulieres, quam uiri, senes & pueri, quam iuuenes & in ætatis uigore consistentes, difficiliter curam accipiunt. His prædefinitis à tenesmi affectione curam dysentericæ incipiemus, quum plerisque inde dysenteria initium sumat.

De tenesmi cura.

Cap. XLIII.

Quemadmodum iam prædictum est, in plerisque dysentericis tenesmus præcedit. Est autem adfectio hæc ad excernendum promptitudo, quæ differri ac deuari non potest, nihil tamen præter quam pauca cruentum ad spectum habentia propellens, & post ea quædam mucosa. Vbi uero stercore fuerit excretum, ægri alleuantur. Iam uero & inflammationem cum laxo

tumore, ex continuis distentionibus circa locum obortam esse constat, quæ stercoris insidentis suspicionem præbet, quod exitum quærat. Cæterum recrementa in ipsis concocta & compacta fere in totum excernuntur, paucio sanguine post recrementa destillante, stercorei minime admixto. In principio igitur si grauis distentionis sensus circa anum uentrem fiat, & maxime circa dextram partem, collecta re oportet stercoreum multitudinem in cæco intestino insitam esse, quam furfurum ac foeni græd decocto infuso eluere oportet, melle oleoq; ac modico nitro ammixto. Quod si huiusmodi nihil apparuerit, statim in principio ex oleo myrsinino aut rosa-ceo, cum uino & cumino, pectinem, inguinatq; ac inter anum & scrotum intercapedinem, perinæon Grecis appellatū, fouere ac irrigare oportet. Deinde lac caprinum recens multum heminae mensura, & nequaquam minus præbendum: uerum non aceruatim, sed sigillatim partitum. Sequenti deinde die lac ipsum ad dimidium decoquatur, ablato eo quod in decoctione concretum superstat, atque ita exhibeatur. Si uero pituita sit quæ ægrum infestet, aut præcesserit frigus, rutam in uino albo decoquito, atq; uinum ipsum calidum meracum bibendum dato, ac assidue bitumen, picem siccam, coriandri semen & cyperum suffito: undiquaq; autem ægro coniecto suffimentum supponatur. Est autem & pastillus suffumigabilis ad tenesmos ac intestinorum dolores approbatus, hic. Picis sicce sextarē, bituminis unc. i. sulphuris ului un. i. bitumē ac picem cum modico aceto liquato, sulphur autem uiuum tenuissimè tritū adiuncto, hisq; simul unitis pastillos informato. Vsu uero expetente in calidum cinerem coniectos suffito. Bitumē autem in refrigeratis, etiam cum ptisanæ succo infundito. Glande quoq; suppositida in eis huiusce modi utendum est. Oleo raphanino si adsit, aut communis, si non illud haberi queat, alia decoquito ac conformato: deinde ladanum & ceram paulatim adiuncto, quibus liquefactis & ab igne ablati, modicum lycij addito, unito, ac tomēto excipito, sediq; quam penitissimè indito. Ad anum uero uentrem ac lumbos hoc adhibeto. Ladanum & styracem unguento nardino, oleoq; suffumigabili appellato dissoluto, ac lana exceptum imponito, ac colligato. Efficacissima autem sunt in tenesmi affectione fomenta sedis admota. Gallas igitur in aceto decoctas cum spongia adhibeto, aut glomis texturæ gynædorum per successione foueto. Efficax est & malicorium similiter decoctum, myrtiq; baccae, ac rubus, quæq; his similia existunt. Furfures quoq; in aceto decocti, ac feruenti ligamento excepti, commodè sedi adhibentur. Infectiones etiam ex prædictis utiliter suscipiuntur. Verum cui per nostram experientiam cognito testimonium merito præbemus, tale est. Later perquam uentustus & à fumo denigratus una cum contentis in eo paleis tunditur: deinde feruenti aceto subactus, linteoq; illigatus sedi subditur. Hæc autem statim ab excretionem admoveantur, & maxime si dolor infestet. Iuuantur etiam per spogitidem herbam sede extersa. Si uero exulcerationis principium oboriat, inflammatioq; adsit, ptisanæ succus infundatur, paucioris simul cum eo decoctis. Quod si acris sint quæ efferuntur, lac tepidum infundatur. Vehementiori autem inflammatione infestante, oleum ro-

C lacum

faceum leniter calidum infusum ac pluribus horis detentum, doloris uexationem dissoluit. Si uero laxius intestinum rectum fiat, lentum ac malicorij decoctum infundatur. Similiter autem & si exulcerationis principium adsit. Si uero uigiliae una cum dolore consequantur, sed collirium soporiferum subdetur, quod ad dysenterias est descriptum. In eis autem quibus iam ulcus serpens depascitur, subiecta ad dysentericos cura utemur. Epithema dysentericis. Croci, myrrhæ troglodyticæ, cyphij, mastiches, succi absinthij, aloës, palmarum, acaciæ, masuchæ, ladani, malorum cotoneorum, cumini torrefacti, cadii ouorum assati, panis usti & in uino macerati, olei melini aut rosacei.

Cura dysentericorum. Cap. XLV.

Principium curationis dysentericorum a quiete & modico cibo fiat, undecumque tandem fluor procedat, & mediarum corporis partes lana oleo modico dulci imbuta cōtegantur. Vehementi autem mordacitate infestante, rutaceum sit oleum, & cuminum tritum lanæ conuolutæ inspergatur, maxime ubi inflationes & tormina affligant. Quod si hæc augescant & intendantur, ad cataplasmata confugiendum erit, & hoc maxime si inflammationis sensus percipiatur. Multis enim non dolorum tantum, uerum etiam totius mali obliteratione cataplasmatum comoditas induxit. Adparentur autem hæc ex polline in posca usquequo cogatur decocto: quem deinde linteolo complicato illigatum totis illis impones: fluor enim ipsum decoquit, quandoque autem & palmas, malachæ cotoneæ, ac malicorum cum aceto cocta ammiscemus: quod si ardor adsit, symphyti radicem tritam, aut solanum, aut perdicium, aut plantaginem adijcimus. Stomacho uero imbecilli & exoluto, polentam cum cœnæthe, aloëque & omphacio annectemus: inflatione autem simul infestante, anisi, foeniculi, apij, ac trionis semen addimus: & si lumbrici simul cum recrementis excernantur, melanthium, aut cornu ceruini ramenta, aut adeps ceruinus, aut coriandri semen non incommode admiscuntur: quod si dolor uehemens adsit, prædicta cum lini semine commisceantur, & aceto mulso decoquantur. Si uero sanguis multus efferatur, acacia, hypocisthis, & alumen cum palmis ac malicorio decoctis & tritis apte concinnantur: si autem liquida & cruda prodeat, quod eis qui uires debilitatas habent euenire solet, mel coctum per se, aut polenta ammixta, pelle exceptum imponitur. Aliquando autem & opij parum, aut hyoscyami semē, hypocisthidemque & acaciā ac myrrham, apijque semen satis largum, itemque foeniculi & anisi inspergitur. Quod si frigoris sensus adsit, pellem agninam leuē liquida pice imbuito, calefactamque aluo imponito. Ego uero, inquit Archigenes, superioribus quidem intestinis adfectis, pastillum aliquem ex eorum genere qui supernè per os exhibentur dissoluo ac melle probè cocto, aut palmarum pingulum carne exceptum impono. Neque enim impescere parcendum est in his qui de uita periclitantur. Inferioribus autem intestinis adfectis, ac mucosis multis infernè prodeuntibus, & eiusmodi etiam occupante madore: ex pastillis qui infernè per anum infunduntur, tres aut quatuor palmarum carne exceptos impono, semperque mihi iuxta uotum res acta succedit. Mirifice etiam emplastra quæ cruentis uulneribus adaptata sunt, cōducunt, postquam quiescerint inflammationes, uen-

tri ac lumbis totis usque ad dorsum imposita: qualia sunt Barbara appellata, & quæ ad fracturas apparentur, uelut est quod Isis uocatur. Atque de his quidem quæ forinsecus imponuntur hætenus. Dicendum autem deinceps de his quæ intra corpus assumuntur. In principio igitur post tertiam diem permittentibus febribus, lacte recens multo adhuc calido utendum est, melle tepido ei ammixto, atque in eius usu ad tres dies perseverandum, quantum nutriendo corpori suffecerit exhibendo: sequentibus deinde diebus melle adepro, & modica aqua (quartæ nimirum lactis partis mensura) affusa, paulum decoquimus ac exhibemus. Deinde post alias tres dies ad dimidium decoquimus, & post alias tres, ad tertiam, similiter per tres dies, atque ita eis præbemus. Primum enim lac depurgat, simul ea quæ in corpore sunt cōtemperando: postremum uero aluum sistit. Non scio enim an aliunde grauior molestia dysentericis oboritur, quam ex eorum quæ egeruntur acredine contingit. Oportet autem insuper & panem madefactum a lactis acceptione offerre. Pulces etiam ex lacte apparatus, tum pharmacum, tum nutrimentum optimum præbent: uelut est oryza cum lacte, dulcarii panes, amyllum, & oua lacti commista. Quod si adhuc fluxus perseverat, inde ad eorum quæ aluum sistunt sylvam trāseundum est. Ex quorum genere, alia quidem influentes humores obducunt & inspissant: alia uero, corpora plus iusto rarefacta & laxata adstringunt, alia autem resiccant. Pulces igitur ex halica apparatus: nam hæc & probè nutriunt, & aliquo modo obducunt. Cōdiantur autem paucissimo sale, ac modico oleo & anetho, aut pro oleo magis adipe gallinaceo, aut anserino recenti. Quæ uero ex oryza eodem planè modo parantur, præcedentibus magis resiccant. His autem adhuc amplius quæ ex milio fiunt. Quæ autem ex rhoë apparatus pulces, magis adstringunt. Ego uero, inquit Archigenes, eas hoc modo adorno. Rhoem culinarium in aqua pluvia per noctem macero, deinde diligenter expressum aquæ cōmitto. Farris apparatus: ex Archigene. Quod uero Latine in regionibus Romæ uicinis far appellant, hoc modo apparatus. Frumentum modico tempore aqua madefactum, indeque extractum ac in pisalam confectum, ueluti ptisanam a cortice repurgato. Vbi uero corticem exuerit, tollito atque in sole siccato: deinde manibus tritum donec penitus a cortice fuerit mundatum, crassissime molito, ita ut granum unum in quatuor aut quinque partes redigatur, & siccum adseruato. Vfus autem tempore halicæ modo coquitur, & a sanis in cibo sumitur. Pro egris uero uariè apparatus, & epithematis quoque ammiscetur. Quidam spicas frumenti adhuc uirides tollunt, ex ipsisque far concinnant, quo modo & suauius & iucundius redditur. Far quod clusinum appellatur. Porro frumentum ipsum rursus madefactum, manibus sedulo confrico, atque ita percolatum ipsius succum coquo, anethi ramulis assidue agitando: coit autem celerrimè uelut glutinum quo ad librorum compactionem utimur; quo facto ipsum sale, ac paucissimo oleo siue adipe condio, sicque hoc modo non solum commodum, sed etiam iucundum. Apparatur autem puls ex siccis item panibus, quos aliquando quidem posca, aliquando uero palmarum, aut malorum cotoneorum, aut pirorum, aut filii-

aut filiquarum, aut rhois, ut dixi, cremore contulos coquo, eisq; aliquādo ex fauo albo ac optimi mellis pleno aliquid admisceo. Ex adstringentiū numero lenticula quoq; proditur, quæ probè assata cū planta gine aut malis punicis cōtusis decoquatur, acetoq; ac modico oleo cōdiatur. Vtiliter etiā lenticulæ far du sinum ammiscetur. Olera quidem non ualde probo, decentē tamē eorū degustationē nō prohibeo, uelut seridis coctæ, plantaginīs, brasiæ his coctæ, ad quā post primam atq; item secundam decoctionē aqua diffusa, poscam feruentem affundimus, rursusq; donec liqueat decoquimus. Intubum quoq; ac fisarū cum liquamēto simplici exhibemus. Damus & ouorum assatorum lutea tantum cum modico aceto ac rhoē, paucissimo oleo ammixto. Carnes autem dysentericis non ualde commodæ existunt, dandæ tamen eis qui diuturno malo uexantur. Ex his uolucrum eligendæ, deinde syluestrium ferarum uerū ex his omnibus faciliē solubiles & non graueolentes, teneramq; carnē habentes ac adstringentē, reliquis præferendæ, uelut est inter uolucres perdix, palumbes, & similes. Ex pedestrib. uero carnes dorcadis, capreæ, ac leporis. Ex marinis, aselli, perca, loliginis ac mulli: singulæ uero in posca ebulliant, myrti baccis cum eis incoctis, deinde assatæ cum familiaribus edulīs præbeantur. Fructibus quoq; parce utantur: si tamen stomachus langueat, pirum coctum, aut cotoneum malum concedemus, aut uiam quæ in cado, siue olla, aut etiā interpositis uinaceis adseruatur: me spila item ac punicum malum. In potu à principio quidē aqua pluuiā, quæ nō sit ex domibus plumbo infectis delapsa, utendum est. Talis enim aqua potata etiam sanis dysentericā propinat, quod si pluuiā optimā non adsit, fontana utemur: puteorum aqua semper deuitata, utpote quæ subsalsa est, ac uentrē perturbat. Cum aqua autem fructus adstringentes coque re oportet, maxime uero acinos. Post uero ubi uires fuerint delectæ, etiam uinum præbendū, quo stomachi sanitas firmetur: sit autem uinum adstringens, & non ualde uetustum. Ante cibum uero corpus inunctionibus, & faciei prolutione, similibusq; curetur, quæ in febriū tractatu sunt relata. Atq; hætenus quidem de diætā. Iam uero ad remedia quæ infernè adhibentur transeundum. Magnis igitur intestinis affectis etiam infusa adhibeantur: & si quidem tenesmus infestet, priscanæ succus infundatur, adipe caprino aut hircino admixto. Vbi uero corpora excoriationem incurrant, halicæ aut oryza succus magis appositus erit: triticea etiam priscana ad tenesmos ac excoriationes accommodata cēsetur. Aliquando in uehementi tenesmi ad egerendum promptitudine, muriæ usu ægrum ab omni dolore liberauimus. Sufficiunt autem ex ea drachmæ sex, heminae uni: calidæ aquæ illiquatæ: si uero succo alicui eam ammiscueris dra. viii. inijcto. Præstantius tamen oliuarum albarum muria conditarum liquamē censeatur, tepidum heminae mensura infusum, & sanè per assiduum eius in tenesmi cura usum optimè successit. Si uero ex ueteri chirurgiæ perpulsionē, aut aliā subtiliore sensu prædita existant circa sedem egroti loca, anus assidue & maxime ante acrum aut adstringentium pharmacorum infusionem, adipe anserino aut suillo perungatur, & fistula quoq; clysteris crassius illita immittatur. Cæterum post distensionum exolutionem, aspe

ritates quæ circa intestinum sunt, quæ quidem mediocriores, per muriam resiccantur: quæ uero relinquantur succis magis adstringentibus curantur: ueluti gallæ in uino decoctæ, aut tritæ & uino insperse, malicorij item ac corticis pinus, & baccarū myrti nigrarum. Quod si ardor consequatur, oua cruda duo cum uino modico, ac largo rosaceo conuassata infunduntur. Qui uero caput, quod facile adficiatur habet, in his seminis lini succū recusamus, utpote caput replētum. Portulacam autem cum priscana (si possibile est) decoctam, aut cum aqua: si id fieri non queat, succo eius cū rosaceo & ouis crudis permixto infundimus, in his præsertim q; ardoris adfectio nē circa intestina habent, aut qui aliās à calidorum infusorū ardore sunt lēsi: ex rosaceo uero quarta ipsius succi pars sumatur. Mirifice etiā seminis lini succus facit, cum candidis ouorum, & lacte asinino sesquicochlearij mensura permixtus: pro quo si non adsit, bubulum accipere non incōmodum erit. Porro inflammationibus erysipelatis, ciborum ac potuum citra mordacitatem adstringentium usu conueniens existit. Infusa uero eis cōueniunt, plantaginīs succus, malicorij, perdicij, portulacæ, semperuiui: uerum singulis acaciæ aut hypocisthidis succum admiscere oportet. Efficacius autem in erysipelatis glaucū infunditur cū aliquo ex prædictis succis, aut Andronis pastillus, aut Musæ inscriptus. Quod si sanguis destillet, sanguinariæ succo utēdū aut plantaginīs cū acaciā, hypocistide, aut balauftio. Si uero sanguinis impetus uehementer urgeat, quemadmodum etiam si maxima inflammatio subest, præsertim in his qui plurimo sanguine abundant, uena incidenda, si uires non resistant, & maxime in quibus consueta sanguinis excretio cohibetur. Auferre autem oportet neq; multū neq; coaceruatum, ab utroq; enim uenter conturbatur. Omnium uero maxime cauebimus ne animi deliquiū fiat, quare desidenti etiā dysenterico uenā secabimus: hac enim desidentes forma dū secatur uena, minus reliquis animo linguūtur. Secare autē oportet in dextro cubito uenam humeralem appellatam: neq; enim similiter hac uena incisa, uires labefactantur, & insensibiliter quodammodo furtimq; sanguis aufertur. Quod si hæc non appareat, necessariō mediā secamus. Inferiorē autem incidere ob subiacentem arteriā uitandum: ceterum fissurā omnino tenuissimam infligemus: nō enim ob multitudinem sanguinis euacuandā sectionem facimus, sed ut materiam quasi per riuos transferamus. Paucus autē sanguis etiā multo tempore emissus, inflammationem mitigat, & sanguinis ad intestina delationē reuellit, innatūq; calorē sensim refrigerans, somnum magis quam animi deliquiū inducit. Est autem optimū dysentericis remedium somnus. Si uero quid uenę incisionē fieri prohibeat, ex eorū quæ sanguinē sistūt amixtione infusionē facio. Quæ in re lanarū succidarū cinis optimè facit, aut ex spongia noua uisā. Spōgiam autē ipsam liquidā pice imbuere oportet, aut sanguine taurino, cineremq; eius in olla exustæ: in aliquē ex prædictis succis inspergere, atq; hoc modo infundere. Succī aut in his ad infusiones apti sunt, ex plātagine, sanguinaria, ac similibus. Quin & lincolū alumine liquido imbutum, deinde uisū, præclare sanguinis eruptiones sistit. Sumē autē conducentē cognouimus asinini stercoreis succū, maxime si à pa-

stura prodeat animal mōtana & adstringente: quod si non sufficit ipse succus, stercus plantaginis succo madefacto, exprimito ac infundito. Adhibeātur autē simul & epithemata, & quę per os accepta sanguinem sistunt, & qui sanguinem spuentibus commodi sunt pastilli. Præter opinionem uero eis prosunt, maceris cortex, & mali punici flores, æquali pondere contusa & eribrata, si inde scrupuli duo cum ulno adstringente propinentur. In his etiam frigida, extra offensionem tamen, infusa apparentur. In reliquis uero dysentericis tepidiora, aut leniter calida. Vlcēribus enim frigidum infestum est, nisi sanguinis eruptio simul adsit. Si uero exulceratio absque fluxione relinquatur, plura ne infundatur, quā lac bubulum, aut caprinū, cui lycij drachmæ tres sint ammixtæ: optimè faciunt & terræ samiac drachmæ IIII. aut amyli drach. IIII. cum plumbi usti drachmīs II. triticæ pisanæ ammixtæ ac infusæ. Aut cerusæ drach. II. cū succo inhiato, egerq; sanatur, ubi uero fluxione adficiatur, & nimium humecta sit exulceratio, charta usta, aut lentiscus usta, aut cinis pōpholygis, aut aridum ex charta cōstans pharmacum, similiaq; cum succo plantaginis infusa, aut etiam cum altero consimili succo ægrum, à malo adseruat. Quod si uehementior sit fluxus & humectatio exulcerationis, ea quæ à callis indurata corpora leuigare ac à callis liberare possunt adsumantur: itemq; ea quę humecta resiccare & exurere, exolutaq; adstringere possunt: uelut est sabinae herbæ decoctum, item saluæ, polij, ac pilularum cupressi, ex pastillis uero Musæ inscriptus, & qui ex lanis succidis ustis constat, & cōsimiles. In potu uero Thrasymandri pastillus, & qui croceus appellatur, consimilesq; qui supernè per os sumuntur, præbeantur. Cibi etiā magis resiccantes eis exhibendi. Si uero serpens depascant ulcera ipsa, si qui dē in intestino leiuno consistant, paruam omnino salutis spem promittunt. Si uero circa tenuia intestina fiant, minus graue malum est, attamen periculo non uacat. Si autem in colo fiant, ut plurimum sanabilia existunt. Verum quemadmodū in externis ulceribus depascētib; ita & in his statim in principio, ubi depastio apparuerit, crustas inducēda & exurere ualentia adhibere oportet: si enim ad magnitudinē peruenierit exulceratio, inutilis horū usus fuerit, cæterū ulcera circa ieiunū ac tenuia intestina, per potiones curantur, ea uero quę crustas inducūt in potu accipi non possunt: quare sorbitiones & eclegmata ex tergere ac repurgare potētia, his sunt exhibēda: estq; pisanæ succus cum melle absorptus his aptus, atq; ipsum adeo mel per se induratum, & in decoquēdo in pastillū coactum, quod comestū ulcera potēter repurgat. Sorbitiones item ex eruo apparatus, cōueniētissimæ sunt eis qui in superioribus partibus ulcus depascens habent. Apparantur autem hoc modo. Eruum in aqua calida sepe permutata ad horas octo madescere sinitur, deinde donec testam omnem abiecerit, manibus in aqua confricatur: post uero roquitur, & prima itemq; secūda, tertiāq; & quarta aqua diffusa, semper ubi prius decoctum diffunditur, rursus alia aqua feruens affunditur, quæ ubi post quartam tandem decoctionem fuerit diffusa: acutum mulsum ad ipsum sufficienter infundatur, & cum quintæ aquæ affusione ad compagem succi pisanæ decoquendo reducatur, atq; hoc modo absorbeatur. Hali

ca etiam cum lacte bubulo decocta non incommoda efficitur. Maxime uero omnium prodest eis lac bubulum recens mulctum ac potatum. Quicquid uero tādē eis datur, ualde modicum sit. Hi enim præ alijs dysentericis paucio cibo indigent, sitiq; uexantur. Pharmacum autem loco exhibeantur quęcunq; aristolochia rotūda participat, radiceq; panacis, ac iridis, alumine scissili, moris, & mali punici flore. A uiro uero abstinēat, depastionem enim dilatat. Quod si circa intestina crassa ulcus serpendo depascens consistat, ea quę per sedem infusa crustas inducunt, adhibeantur: cuius generis sunt pastilli Faustini, & consimiles, & maxime qui Nymphodoro est inscriptus, quo etiam nos utimur: itē qui ex thallia, id est, oleæ ramulis constat, quorum omnium compositiones paulo post dicemus. Cæterum cum attentione crustam inducentibus uti oportet, excellentem ipsorum facultatem reuerendo. Porro cancerosa & maligna, quę cacoethe Græci appellant, intestinorum ulcera ferē in totum incurabilia existunt, neque tamē circa auxilium relinquere oportet, sed uehementes dolores mitigare: optimum autem & his est asininum lac recens mulctum potatum: si quis enim eius usum sustinere possit, nullumq; aliud nutrimentum accipiat, plurimam salutis recuperandæ spem habebit. bonum est & bubulum ac caprinum recens mulctum, si illud non adsit, bonum est & scissile lac cum amylo. Præbeantur autem eis & oua cruda, ac iuscula gallinarum & perdicum. Succus etiam præbeantur omnes qui facultate obtundendi dolores præstant: infusa quoque eiusdem generis sint: pharmaca item his cōueniunt omnia, quæ ad dysentericos à uenentorum acceptione factos, conducunt. Cæterum irrigationibus & cataplasmatibus neque curantur cancerosa & maligna ulcera, neq; mitiora sunt. Vtere autē & ad eos infusis ad cancerosam uulnam describendis, & pharmaco ad canceros mammarum, ex ulno adriano & rhoē qua coria tinguntur, apparato. Porro si à uenenati pharmaci potione, ubi mors periculum fuerit deuitatum, dysenteria oboriretur, his quæ à uenenorum potu conueniunt, erit utendū. Triplicis autem modi remedijs in his qui uenenum biberunt utimur, uomitorijs uidelicet, & obtundentibus atq; extinguentibus: in quorum numero etiā acria comprehenduntur. Vomitoria itaq; remedia mox à uenenti potu sunt accepta. Extinguentia uero quæ acria sunt, tanquam ulceribus minime conuenientia, recusamus. Alterum igitur tantum genus extinguentium, hoc est, aromatica adsumemus: itemq; ea quæ obtundendi vim habent. Ex cibis itaq; conueniunt pisanæ succus, aut halicæ succus cum anetho decoctus, aut palmis aut mali punici acinis. Itē radicis dulcis succus: cum his etiam tum galline, tum perdicis decoqui possunt donec eliquescat: cerebella itē ac pedes eliquata præbeantur, & sorbitiones ex amylo & lacte, quibus anserinus aut gallinaceus adeps est ammixtus. Ex pharmacis autē eis cōducunt quę de uenenis referuntur in tertio decimo Sermōe. In potu uinū non inconueniens est tenue & album, nisi febris aut inflammatiō adsit. Cæterū cataplasmata & somenta in eis quibus ex bilis acredine dysenteria oborta est, uitabimus. Quod enim leue & bene succulentū in intestinis est, id distrahit ac diripit: quod uero nulli usui est, & mordax, in ipsis relinquunt.

Cura eorum qui aurum, aut æs, aut tale quippiã deglutierunt. Cap. XLVI.

Si quis auro, aut ære, aut ferro, aut aliquo alio huius generis deglutito, sanguinem per uentrẽ egerat, malum aut seminis lini succo multo, in potu exhibito, lapsum facies deglutit, supra hoc quod & in intestinis oborã lenies asperitatẽ. Ego uerò, inquit Anrysus, quum quidã per iocũ anulum aureum deuorasset, & ramentosa ac cruenta infernẽ egereret, ob sculpturã uidelicet asperitatẽ: in ipso enim auro capitulum inerat asperẽ concludatum: non sum immoratus his quæ lubricas uias reddunt, sed cõfidenti animo ad ea quæ fortiter purgant pharmaca sum progressus: quare contigit unã cum recrementis anulum excidere: quo facto, homo ipse ex pũsanæ succo, ac sorbilibus ouis nutritus, tertia die sanus euasit.

Communia remedia dysentericorum quæ supernẽ

exhibentur. Cap. XLVII.

Porro ubi memor fueris remediorũ iam antẽ in unaquaq; dysenteria specie dictorum, expedire inuenies, iuxta eundẽ planẽ modũ, quomodo & cõmunibus remedijs, quæ nunc dicenda supersunt, utaris. Cõmixta enim reperies hic remedia omnia simpliciter scripta quæ dysentericis cõueniunt: nimirũ adstringentia, obtundentia & resiccantia. Et simplicia quidẽ quæ tum dysentericis, tum coeliacis in potu dantur: alia quidẽ adstringẽdo, & firmitatẽ addẽdo, humoresq; inspissando, uẽtrem cohibet; alia autem obtundendo, alia etiam urinam clendo, ac fluxionẽ transferendo. Quæ itaq; urinã clent, omnibus sunt manifesta, & sæpe in hoc opere descripta, quibus etiã hic uti oportet. Quæ uerò adstringunt cõmmoda eis hæc sunt: lapathi syluestris maximẽ semen, alterius autẽ lapathi tum semen, tũ radix, trita aquæ inspersa ac potata, siliquæ aridæ comestæ, rhus cultinarius, gallæ, spinæ Aegyptiæ semẽ, malicoriũ aridum tritũ, rubi radix, unumquodq; eorũ cum aqua ad tertias decoctum, aut tritum potui inspersum, laudanum cũ uino austero, acaciæ succus, hypocisthidis succus, lysimachia, balauistiũ, siderioidis heradæ folia & radix, salicis folia, symphyti radix & folia & semen, rheon ponticum, althææ radix, gnaphalium cum uino austero, hippuridis succus cum passo, loti arboris baccæ, & ligni lotini scobs, potui inspersa & potata præclare faciunt, cortex thuris tritus potatus, lemnia terra quæ sphragis appellatur, minium sinopicum, cœnanthe polentæ modo potata, holoschoeni lunci fructus torrefactus, uerbasci radicis drachm. ii. mora acerba in sole desiccata, ac trita liquorĩ potando atq; obsonijs inspersa, mora rubi acerba similiter exhibita, acini uuæ, ac uuarum passifarum tum aridi triti, tum in cinerem exusti, plantaginis semen aridum tritum, similiter folia & radix, maceris cortex. Ex eorum autem numero quæ aliquo modo adstringunt, uerum magis obtundunt, est asfer famius, & amyllum. Obtundit autem tragacanthus & gummi. Resiccant coagulum leporis ex aqua, cornu ceruinum ustum, herinaceorum testæ ustæ, itemq; ostreorum, & cancrorum maximẽ fluuiatium, atq; etiam marinorum testæ ustæ ac tritæ; egregiẽ facit & saluæ decoctum.

Composita pharmaca quæ supernẽ exhibentur.

Cap. XLVIII.

Vinũ uetus adstringens ad tertias decoquito, mellisq;

optimi equale pondus adijcto, rursusq; donec in cõpagem cogatur coquito, & ante cibum mystri mensura exhibeto. Aliud Asclepiadæ. Ouum recens in uas quoddam euacuamus, putamineq; eius mel optimum ac uinũ uetus adstringens, malicoriumq; tenuissimẽ tritũ demetimus, piperisq; granis x. adiectis, hæc simul in sartagine torremus, atq; tertiã inde partẽ ielunis cũ pane præbemus. Sũmẽ etiã prodesse quod sequitur scimus. corticis thuris, seminis plantaginis, æquales partes tritas, uino diluto ad trium cochleariorũ mẽsurã insperge, ac ante cibũ exhibe. Caninũ etiã stercus album, tritũ, lacti scissili & per filices decocto inspersum, summẽ dysentericis auxiliatur, si lac ipsum in cibo sumatur. Cæterũ canẽ ipsum per præcedens triduũ, nullo alio cibo quàm ossium comestione nutrire oportet. Aliud ualdẽ approbatũ, cuius usu scimus multos à morbo liberatos. Gallarum tenuissimẽ tritarũ, piperis, rhois culinarij, malicoriũ tenuissimẽ triti, singulorum æquales partes misce, ac cũ uiscellis oui subige, & in mali punici uacuam testã cõijce, ex eodemq; sumpto putamine ossis testæ contege; deinde totã mali testã fermento forinsecus oblini, & ad prunas assa: post uerò ex hac ipsa mali punici testa repurgata cochleariũ ante cibũ edẽdũ præbe. Aliud quod & coeliacis prodest. Baccarũ myrti nigrarũ cochlearia iii. anisi, rosarũ siccarum, cœnanthes, acaciæ, singulorũ cochleare unũ. Palmarũ carne subige, ac drachmã unã præbe. Si cœnanthe haberi nõ potest, uuas immaturas siccatas cõijce.

Aliud Marciani, ad eos qui neque potum, neq; cibũ accipiunt, sed pro desperatis habet. Baccarum myrti albarũ quincuncẽ, malorũ cotoneorũ medicorum ac pulchrorum numero duo, aquæ sextarios iii. scobis corticis arboris loti sextantem & uncĩ dimidiũ. Decoquito simul donec sextarij duo reliqui supersint, ac quantum possint bibendũ præbe, idẽq; etiam per clysterem infundito. Eiusdem facultatis est loti scobes potatus, atque amplius adhuc eo præstat eius decoctum. Quod si lotus non adsit, cortice pini utaris. Aliud Marciani. Aloës ad carbonum formam exustæ unciam i. malicoriũ usti unciam i. seminis lini usti unciam i. contere & præbe cochlearia duo, his qui febre carent cum uino antiquo. Ego uerò, inquit Marcianus, quotiescunque hoc exhibeo, duorum terrestrium herinaceorum membranam internam, quæ cibum complectitur, desquamata adijcio. Quare hanc membranam illotam accipito, siccata, ac adseruato. Per se enim huiusmodi pelliculæ potatæ uentris fluxiones sistunt. Aliud Marciani, cuius uilitatẽ ne cõtemnas; seminis anethi, apij, scœniculi mōtani, piperis, sing. un. i. in testacẽ pilã cõijcito, atq; ubi probẽ cõtriueris, herinaceorum terrestriũ internã membranam illotam, ac per se cõtusam & cribratã unc. i. pondere immisceo. Deinde uinũ purum uetus quantũ satis uidebitur, in nouũ uasculum infundito, & laminã ignitã ex ferro quod stomaoma uocant, nõ minorẽ libra in uino extinguito, & adiectis aridorũ drachmis duabus bibẽdum præbeto. Tantũ enim ad summũ datur, atq; hoc medicamine multos ille desperatos seruauit. Aliud multa experientia cognitũ. Cochlearũ terrestriũ maximẽ montanarũ, uistarum, carnẽ trium drachmarũ pōdere accipito, piperis scrupulos viii. simul cum æreo pistillo in puluerem redigito, & uini ueteris sexun-

cem, tanfundemq̄ gari affundito, ac simul unia omnia in tres partes diuidito, & per tres horas exhibeto. Oribasius autem siccochlearū unā cum testis exustarū unc. i. alij tridentem habēt, gallē sextantem, piperis unc. i. in puluillū redige, ac obsonijs insperge, aut cum aqua, aut uino albo tenui præbe. Præclare auxiliatur hoc dysentericis, quibus ulcus nōdum est putrefactum. Aliud Marciāni, quod Phemus appellatur. Myrrhæ, opij, balauſtij, rhois rubri, culusque unciā unā, anisi sesquunciam, spinæ Aegyptiæ quadrantem, lentisci quadrantem. Cum decocto corticis lotini ligni subigito, & nudis pōticē magnitudine præbeto, cū lotini corticis decocto: quod si lotinus non adsit, mespilino pro eo utaris. Catapotium dysentericum ualdē pulchrum, Asclepiadæ.

Radiciſ symphyti, seminis ericæ, malicorij, gallarum æquales partes subige, & in catapouia digere, ex quibus obolos tres cum uino, aut aquā deuorādos præbe. Aliud eiusdem. Gallarum drachmas quatuor, opij asiani drachmas duas, petroselinī drachmam unā, aqua subigito, & catapouia formato, exq̄ eis ad ciceris magnitudinē præbeto, aut quācum uires tolerare possunt. Aliud. Thuris, acaciæ, opij, gallæ, æquale pōdus singulatim cum succo intyborum subige: indeq̄ ad ciceris magnitudinē aut pro uirium tolerantia præbe. Aliud. Florum rosarū, opij, acaciæ, gummi, succi hypocisthidis, culusq̄ tridentem, seminis & succi plantaginis, culusque sextantē, succi rosarū unc. i. In catapouia redigito, ex quibus obolos tres dato. Pastillus ex seminibus, qui in Alexandria præparatur. Anisi unc. i. foeniculi unc. i. seminis hyoscyami quadrantem, seminis apij quadrantem, alij tantum drach. iiii. habent, opij unc. i. dauci unc. i. aqua subigito. Oribasius autem hoc modo: Anisi, ammi, foeniculi seminis, apij seminis culusque drachmas tres, petroselinī drach. ii. opij drachmas duas. Valet coeliacis, dysentericis, cholericis, & tussilentibus. Pastillus trigonus, hoc est, triangularis appellatus. Seminis apij sextantem, seminis hyoscyami unc. i. opij unciā unā, anisi unciā i. aqua subigito. Aliud Andromachi, ad coeliacos & dysentericos. Rhois culinarij drach. iiii. piperis drach. iiii. myrrhæ, croci, acaciæ, scobis corticis loti, ammi, culusq̄ drach. ii. spinæ nardi, lycij, gallarum, succi hypocisthidis, opij, aloës, anisi, culusque drach. i. cum rubi succo subigito, & ante somnū iiii. obolorū pondus ex aqua præbeto: non febrilentibus ex uino frigido. Pastillus Philippi, ad diuturnas dysentericorum affectiones leuās dolorem, & bibitur & infunditur, & forinsecus quoq̄ imponitur, melle cocto aut palmis pāsis subactus. Acaciæ, balauſtorum, hypocisthidis, rhois rubri, opij, thuris, myrrhæ, croci, gallarū, lycij, aloës, rhei pōtici, baccharū myrti nigrarū, malicorij, singulorum drach. iiii. uino ueteri adstringente subacta in pastillos digere, & nō febricitantibus obolos iiii. ex uino præbe, febricitantibus uerō ex hydromelite. Ego autem hoc pastillo utor, & feliciter mihi succedit, omnibus quidem prædictis ad eius compositionem adiectis, præter thus & rhoēm. Ad hæc autem omphacij, floris mali punici, calsiæ, castorij, aluminis scissilis, rosarum repurgatarum & siccarum, singulorum æquale pondus addo. Catapotium bonum. Abrotoni sextantem, sarcocollæ unc. i. gummi parum, ut ex eo cogit-

ac formari possint. Catapouia ciceris magnitudine formato, & ieiunis unum deuorādam præbeto, similiter unum ante somnum. Aliud Oribasij, ad dysentericos & hæmoptoicos, fluxumq̄ muliebrem. Succo hypocisthidis, terræ samiacæ, gallē omphacine, acaciæ ruffæ, cuiusq̄ drach. viii. cum aqua pluuiali subige, & pastillos forma, ac utere. Ad dysentericos quidem in potu exhibitis, ac per clysterem cum succo oryzae, aut lentis, aut aliquo cōsimili, infusis. Ad hæmoptoicos uerō, cum aquæ frigidae sesquicyathos eius drach. i. Ad fluxum autem muliebrem, cum succo solani, aut sanguinariæ, aut plantaginis lana exceptos subde. Aliud parabile. Alumē liquidum tritum cum ouo absorbendum præbe, & rurſus aqua calida dilutum bibendum exhibe, & admiraberis. Sedat diuturnas dysenterias, & in quibus cruenta excernuntur. Aliud. Pumicem in tenuissimum puluerem redactum, cum ouis sorbilibus, cochlearij mensura præbe, & miraberis. Aliud exquisitum. Fici folia arida contusa cochlearij mensura cum uino austero dato. Aliud. Macer, mali punici florem, æquali pondere contunde, & ex eis scrupulos duos cum uino adstringente præbe. Valdē commodum hoc est in his qui cruenta egerunt. Pastillus ad dysentericos & coeliacos. Anisi, seminis apij, ammi, balauſtorum, succi hypocisthidis, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. viii. opij drach. iiii. Exhibe his qui integræ sunt ætatis drachm. i. cum aquæ calidæ cyathis tribus. Polyidæ Sphragis, coeliacis, dysentericis, quartanarijs, & oculorum fluxionibus conducens: dolorem enim adimit & resiccat. Hyoscyami albi seminis drach. iiii. seminis apij drach. quatuor, anisi drach. ii. opij drach. i. contere cum aqua, & informa pastillos obolares: ex quibus unum cum aqua frigida præbeto.

Quæ infernè dysentericis infundantur. Cap. xlix. Pastillus Nymphodori, ad dysentericos, & ulcera depascendo serpentina omnibus præstantior, quemadmodum experti sumus, inquit Archigenes: composius quidem ut Faustinus, dissonans autem in auripigmēti appōderatione: opere uerō longē efficacior eo cognitus. Cuius compositio hæc est. Chartæ uſtæ drach. xxx. auripigmēti drach. viii. calcis uiuæ drachmas x. sandarachæ drachmas vi. uini austeri sextarios iiii. Vinum ipsum per se coquitur, donec tertia pars reliqua fiat, cum qua arida in mortario teruntur, donec in compagem terēdo redigantur, ex quibus deinde pastilli drach. iiii. aut trium siue duarum etiam formantur, quorum usus iuxta ægri uires adhibetur: cum uino autem & aqua infunduntur, ita ut cum aqua lenticula, rosæ siccæ, ac cortex loti decoquantur: cum uino uerō baccae myrti, ut ex utriusq̄ heminae mensura superſit. In uniuersum autem, non solum in huius pastilli, uerum omnium qui crustas inducunt usu, stomachum hora una ante eorum exhibitionem, ex oleo myrteo ac uino ueteri irrigare oportet, itemq̄ caput ex oleo largo. Quæ enim crustas inducunt, si infundantur, & stomachum & caput offendere consueuerunt. Ante infusionem autem frustra panis duo aut tria ægro exhibenda, ex aqua frigida aut lactei teporis, si uehemens adsit febris: aut uino diluto, si parua fuerit febris & nullius pēsi, pane madefacto. Quod si ab infusione stomachus exuratur aut subuertatur, aquæ frigida cyathi tres

hi tres confidenter in potu præbeantur: exhibendus & lactucæ caulis cum pane & aceto: oliuæ item albæ ex aceto. Cæterum his qui statim ubi infunditur pharmacum, rursus reijciunt, imò penitus infusum retinere nequeunt, muriam præinfundere oportet: aliquando etiam salis ammoniaci cochleare i. aut amplius tritum, pharmaco est ammiscendum, nullo habito mordacitatis respectu. Virilitas enim omnem dolorem exuperans inde procedet. Visumur autem frequenter oliuarum albarum muria cõditarum liquamine, hemina nimirum una ex eo infusa, semihoræq; interstitio facta, aut paulo diutiore, pastillum ipsum consequenter infundentes, quo modo facile ipsum continent. Et pharmacum sanè magis efficax sit, ubi nuda ulcera contigerit. Si uerò neq; sic continuerit, iterum atq; iterum infundito: munitum est enim pharmacum ne crustas inurat. Porro ubi efficacius fuerit pharmacum, & ulceris affectionem, multa cum ipso mucosa ramenta prodibunt, & à multis molestiis, egerendiq; promptitudine, distentionibusq; liberabit. Infusum autem ipsum non ultra duas horas retinendum est, neq; infra unius horæ spatium. Atq; hic canon uniuersalis tibi in omni crustas inducente infuso proponatur, unà cum hoc quod & stomachus & caput sit præmunitum. Ante infusionem etiam anus ex oleo dulci illinatur, maxime uerò adipe quopiam ipsa fistula crassius perlinatur. Post infusionem cum spongijs aut glomis decocto quopiam adstringenti imbutis, sedes foueatur: adiuvat enim hoc ipsum infusi retentionem. Mirabiliter etiam prodest Andromonis pastillus duarum aut unius drachmæ pondere infusus. Pastillus ad dysentericos, culus multam experientiam habemus, admirabilis enim in ulceribus serpendo depascentibus existit, nō solum dysentericis, sed oris etiam gingiuarum, & ad omnem nomen serpentem. Calcis, auripigmenti, chartæ ustæ, squamæ æris, æquales omnium partes ramulorum oleæ decocto seu succo subigito, ac uitor cum oryzae succo. Exuccatur autem olea hoc modo. Ramulos oleæ coniuncto, eisq; congruentis mēsuræ aquam affundito, atque donec quater efferbuerit decoquito, expressoq; succo uitor. Faustini insignes pastilli: quorum aliter constat ex chartæ ustæ drachmis x x x. calcis drach. x v. auripigmenti dra. x ii. sandarachæ dra. vi. Infunditur duarum drachmarum pondere cum rhois & baccarum myrti decocto. Si uerò diuturna sit affectio, salis etiam drac. ii. adijciuntur. Alter uerò constat ex calcis drachmis decem, sandarachæ drach. vi. auripigmenti drachmis octo, chartæ ustæ drachmis triginta, hæc in pastillos redigito, ac uitor, quemadmodum in Nymphodoti pastillo est prædictum. Alter adhuc pastillus Faustinus, qui in Alexandria præparatur. Auripigmenti trientem, sandarachæ trientem, calcis uncias duodecim, acaciæ uncias x ii. subigē cū uino. Pastillus Philadelphus, ad dysenterias, & sanguinis eruptiones, & omnes nomas.

Sandarachæ, auripigmenti, cuiusque quadrantem, calcis sexuncem, acaciæ sexuncem. Excipe plātaginis succo, aut uino austero, & pastillos drachmarum quatuor, aut trium, aut duarum informa, atque pro ægri uiribus infunde cum uino myrrite.

Eras autē hoc modo ipsum præparat. Auripigmenti bessēm, acaciæ trientem, calcis trientem. Pastillus alius, dysentericis commodus, qui euestigiō aluum

sistit, quod multo experimento constat. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, aluminis scissilis, squamæ æris, cuiusque drachmas quatuor, chartæ ustæ drach. x. calcis drach. viii. succi hypocisthidis drach. iiii. balaustiorum drachm. iiii. opij drachm. ii. Cum uino myrrite subige, ac utere uelut in Nymphodoti pastillo prædicti. Pastillus ex subere appellatus, quo uelut præter opinionē admirando utor. Galatæ ustæ, chartæ ustæ, suberis ex uase uini ueteri accipit ac usti, panis aridi usti, singulorum drachm. x v. auripigmenti drachm. x x. sandarachæ drach. x. calcis uiuæ drachm. x. acaciæ drach. v. cerusæ drach. v. spumæ argenti drachm. iiii. omphacij drachm. iiii. fecis uini ustæ drachm. v. Cum uino adstringente subige, & informa pastillos drachmarum iiii. & iiii. & ii. In principio autem hos cum plantaginis aut sanguinaris, aut perdicij succo infundito: aut cum aqua tepida, si hæc non adsint: si uerò morbus fortis sit, & in ulgore consistat, cum foeni græci aut lini seminis decocto infundito: in declinatione autem cum myrti & rubi decocto ex uino. Et in pueris quidē cyathorum duorum mensura: in foeminis, trium: in uiris uerò qui ad perfectam ætatem accesserunt, quatuor infundatur. Pastillus Asclepiadæ, dolorem sum mouens, somnumq; inducens. Diuturnis dysentericis adfectionibus euestigiō auxiliatur, si absit febris. Chartæ ustæ drachm. iiii. auripigmenti, sandarachæ, squamæ æris, aluminis scissi, omphacij, lycij, acaciæ, succi hypocisthidis, calcis uiuæ, cuiusque drachm. v. opij drachm. ii. croci drachm. ii. Vino myrrite excipe, & in pastillos redige, quatuor & trium & duarum etiam drachmarum. Iuxta ægri uires cum passi cretici cyathis vi. his qui integræ sunt ætatis infundito. Pastillus alius dysentericus.

Auripigmenti sextantem, sandarachæ quadrantem, squamæ æris unciā i. calcis trientem, aluminis scissilis sextantem, chartæ ustæ quincuncem, omphacij sextantem, acaciæ sextantem, succi hypocisthidis sextantem, thuris unciā i. opij quadrantem. Vino myrrite aut aliquo alio austero excepta subigito. Quod si quis infusum non contineat, sed statim ipsum reiectet, omnino morti propinquum iudicatio, quemadmodum sæpe iam sum expertus. Infundito autem ex eo uelut ex præcedente drach. i. tantum. Pastillus, thronus Marcellius appellatus. Auripigmenti quadrantem, sandarachæ trientem, lentisci trientem, balaustiorum quadrantem, alij dextantem, habent, opij sextantem, calcis bessēm, omphacij sextantem, succi hypocisthidis quadrantem. Vino austero subige, & utere ut pastillo Nymphodoti. Pastillus Lycos appellatus, ad dysentericos. Sandarachæ drachmas sex, auripigmenti drach. x ii. calcis uiuæ drac. x. æris usti dra. x x. acaciæ drac. vi. cadmiæ drach. x ii. chalcitidis crudæ drach. x ii. rhois culinarij aut quo coriarij utuntur, drach. iiii. succi hypocisthidis drach. iiii. baccarum myrti nigrarum recentium drach. vi. foreos drach. i. misyos crudi drach. i. gallæ drachmas viii. omphacij drac. i. lycij drach. viii. Vino myrrite subigito, affuso etiam plātaginis succo, & pastillos drachmarum iiii. & iiii. & ii. formato: cum uino uerò adstringenti infundito, ægri habita cura, uelut in Nymphodoti pastillo est prædictum. Pastillus magnus, dysentericos præclare & feliciter luas, etiā si extremè sint affecti

ac desperati, utpote in quibus carnosæ & seculentæ prodeunt egestionēs. Infunditur autem cum succo oryzae, ita ut adeps hircinus & myrtus cū ipso decoquatur. Cæterū in his qui retinere non possunt, muria oliuarū albarum præmittenda, & post horæ interstitium pastillus infundendus, stomacho & capite præmunitis, uelut in Nymphodoti pastillo est prædictum. anus itē ab infusione fomentis integatur. Prodest etiā ad caua ac profunda crustolacæ ulcera, itēq; nomas pudendorū. Verum in dysentericis præstat, ut cū reliquis prædictis remedijs, manus ægri laetæ & longioribus fascijs constringantur, supernè ex humeris exordio facto, & in summos usq; digitos ligamento protenso; nō parū enim hoc ipsum ad fluxus repressionē facit. Porro ipsius pastilli cōpositio hoc modo habet. Balaustiorum recentium, malicorij, rhois quo coria tinguntur, phyllorum, singulorum drach. iiii, isatidis dinctoris drach. iiii, alij dra. vi, habent, spinæ Aegyptiæ drachmas iiii, seminis hyoscyami drach. iiii, farinæ lentium drach. v, suberis ex uase uini ueteri accepti ac uisti drachm. iiii, gallæ omphacinae à ceredinibus nō corrosæ drach. iiii, rosarum siccarū drach. vi, floris recentis rosarū drachmas sex, croci drach. iiii, myrrhæ drachm. v, lycij drach. viii, bituminis drachmas sex, plis siccæ drachmas sex, acaciæ drachmas octo, hypocisthidis drachmas octo, gummi drac. x x x ii, thuris masculi drac. viii, omphacij succi sicci drach. iiii, opij drachm. ii, amyli drach. ii, solcarum ueterum uistarū drachmas quatuor, cornu cerui uisti drach. iiii, osiculorū oliuarum uistorum, osiculorum palmarum uistorū, fecis uini uistæ, spongiarum nouarū liquida pice & cedria imbutarum ac uistarū, ostreorum uistorum, æris uisti, squamæ æris, sing. drac. iiii, lapidis gagatæ, coralli, rubiginis ferri, aut scoriz, culusq; dra. iiii, aluminis scissilis in testa exusti drach. ii, aluminis quo tinctorum coriorum utuntur drac. ii, auripigmenti drac. iiii, chalcididis crudæ drac. iiii, sandarachæ drac. iiii, gypsi loti drach. iiii, calcis uiuæ drach. iiii, minij sino picis sesquidrachmā, atramenti communis drach. ii, diphrygis dra. ii, & dimidiā, spumæ argenti drach. ii, & dimidiā, ochræ drach. ii, & dimidiā, atramenti Indici drac. ii, & dimidiā, plumbi drac. iiii, cerusæ sesquidrachmā, terræ samis drach. iiii, terræ clematis drac. ii, pompholygis drachmas duas, succi mandragoræ & plantaginis quantum ad hæc suffecerit. Compositio quidē igitur pastilli hæc est, in qua totus ille simplicium pharmacorū cumulus, ex quinquaginta quinque rebus constat, præter herbarū ex aqua decoctionem, quæ ad huius pastilli subactionem accommodatur. Cæterum apparandi modus huiusmodi est. In pilam thebaleam primum æs, & æris squamam, & spumam argenti, calcem, lapidem gagaten, corallium, rubiginem ferri coniecto; ostrea etiam contusa & cribrata probè & contentè teratur, donec in piluillū redigantur; deinde adiecta chalcidis, sandaracha, auripigmento, cornu ceruino, oliuarumq; ac palmarum osiculis, spongiæq; & alumine, rursus terito, affusis etiam spissamentis, quæ stymata Græci appellant. Alumen autem hoc modo uritur. Alumen in ollulam nouam coniectū super prunas posito, & ubi diffunditur ac liquefcit tollito, & frigeferi sinito, & hoc modo tritum adiecto. His deinde tritis, minium, diphryges, atramentum indi-

cum & cōmune, ochran, plumbum, terram samis, clematis, cerusam, pompholygem, reliquaq; omnia metallica addito, & contentissimè sub caniculæ æstu conterito, donec ex spissamentis quarram aut quintam addideris partem. Postquam uerò quodam modo ad collyrij formam fuerit redactum, arida contusa & arctissimo cribro excussa adiecto, ueteribus soleis simul cum aridis confusis; deinde additis spissamentis rursus similiter ut priora terito, sæpe instillas spissamentis. Vbi autem trita inauerint, in altero mortario primum crocum cum duobus succis, mandragoræ uidelicet & plantaginis, terito; atque ubi tritum fuerit, reliqua adiecto, myrrhā scilicet & thus, omphacium, acaciā, hypocisthidem, gummi, lycium, opium, picem, bitumen, & lentium farinam, quodlibet eorum prius per se aridum in tenuissimū puluerem redactum. Cæterum ubi optimè in mortario fuerint trita, duobus succis largè affusis, quo etiam ad aliorum exceptionem sufficiant; de cætero iam antè trita metallica sic arida terito ac admisceto; omnibusq; probè permixtis ac subactis, pastillos ad duarum magnarum fabarum magnitudinem formato, & utitur aliquando quidem cum oryzae succo, aliquando uerò cum uino, aut aliquo conueniente liquore. Ego uerò ob mandragoræ uiridis succi inopiam, aridi succi drachmas quatuor addo. Porro spissamenta cum quibus pastillum conteris, hoc modo apparato. Rubi, myrti, florum mali punici, radicis symphyti, radicis capparis, foliorum salicis, cornu cupressi, omnium æquales partes cum aqua coquito, & utitur. In his ipsis uerò spissamentis, aut etiam alijs, spongiam aut glomos rigato, cumq; eis sedem foueto, assidue quidem, maximè uerò à pastilli infusione. Siccum dysentericum. Terræ lemnis quæ sphragis appellatur, terræ asteris, amyli, gummi, thuris, æquales partes omnium in puluillū redactas, cochlearij mensura infundito, spissamentis etiam quibusdam adiectis. Indus autem Medicus hoc utitur. Terræ lemnis quæ sphragis, buccinorum uistorum, thuris, singulorum æquales partes commisce, indeq; cochlearia duo cum lotini corticis decocto, aut pinus, aut mespili, infundito. Quæ dysentericis subdantur. Glans quæ dysentericis subditur, Theosebii. Opij drachmas xi, myrrhæ, castorij, croci, thuris, hypocisthidis, cuiusque drachmas sex, styracis drachmas tres, uino excipito. Alia glans, siue collyrium. Opij, croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum æquale pondus cū uino ueteri subige, & collyria drachmæ unius pondere informa, ex quorum usu & subditiōe diuinam efficaciam admiraberis. Optimè facit & ad dysentericos opobalsamum tomento exceptum & subditum. Spissamenta, quæ dysentericis cataplasmatibus uice imponuntur. Florum mali punici, gallarum, malicorij, myrti siccæ, lēiscis, mannae, acaciæ siccæ, æquales omnium partes in puluerem redigito; quem siccum adseruato ac utitur, ita ut usu expetente cū uino decoctum imponas; magis uerò mitigatorium fiet, si sapa pro uino accipiat. Illudo, ad coeliacos & dysentericos.

Acaciæ quadrantiem, gallæ, ornanthes, malicorij, balaustiorum, aloës, succi hypocisthidis, mastiches, aluminis rotundi, omphacij, singulorum unciam unam, cum uino subigito, ac formato pastillos: quibus cum uino aut succo aliquo conuenienti utaris.

Epith

Epithema dysenterica. Cap. XL.

Epithema dysentericis commodum, Marciani. Mala cotonea repurgata decem, in uino decoquito, diligenter terito, ac tritis aloës unciam unam, manne sextantē, myrrhæ siccae tritæ quadrantē infarcito, de inde ceræ sexuncē, unguētū nardini librā unā addito. Ceratum ipsum liquefacito, & refrigerato, tritis adijcto, ac utitor. Epithema ex oenāthe, Philumeni, stomachicis, & coeliacis dysentericis in principis commodū. Oenāthæ siccæ drachmas xxviii. gallæ, acaciæ, rosarū siccarū, omphaci, singulorū uncia unā, aluminis rotundi sextantē, aloës sextantē, rhois syriaci trientē, olei myrtel librā unā, ceræ librā i. picis li. i. Quidā uero singulorū libras duas accipiūt. Arida uino ueteri adstringēte rigato, deinde liqueficta adijcto, ac simul emollita excipito. Efficaciter auxiliatur ad interaneorū fluxiones, & stomachi fastidia ac exolutiones, & ardores. Aliud, per multā experientia. Rosarū, oenāthes, acaciæ, gallæ, aluminis scissilis, singulorū quadrantē, aloës sexuncē, rhois culinari librā unā, ceræ, picis, olei myrtel, cuiusque librā unā, uini quantū sufficit. Epithema ex lixiuio.

Ammoniaci thymiamatis, nardi celtici, croci, cardamomi, bdeli, cyperorū, singulorū uncia i. lixiuū ex cinere lignorū uitis sesquiunciam, ceræ quadrantē, unguētū nardini sexuncē, uini quantū suffecerit. Apparatur autē & hoc modo. Croci uncia i. aloës quadrantē, styracis quadrantē, ceræ sextantē, lixiuū ex cinere lignorū uitis, unguētū nardini, cuiusque uncias xii. uini quod satis est. Illud superius appaui, & præ oenāthes inopia, folia uitis conseci, in estate quiddē uiridia, in hyeme uero eiusdem uirgulta, reliquis siccis, cōtulis & cribratis. Epithema, Clidiō appellatū: Cyrilli. Acaciæ, gallarū, thuris, aluminis scissilis, aloës, rhois culinari, hypocisthidis, myrrhæ, balaustrorū, oenanthæ, rosarū siccarū, singulorū uncia unā, ceræ dodrantem, picis, olei myrtel, cuiusque dodrantē, uini spathitæ quantū satis est. Ex libris Philumeni, epithema Mnase, clidiō appellatū, ad coeliacos & dysentericos. Gallæ omphaci, succi hypocisthidis, aluminis rotundi, acaciæ, rhois rubri, mali cori aridi, seminis api, singulorū uncia i. uiscerū querclni drachmas quatuor, ammoniaci thymiamatis drach. iiii. picis siccæ drachmas xx. ceræ drachmas viii. olei myrtel aut lentiscini drac. xx. gallas & malicoriū cōtusa ac cribrata in uini cyathis nouē decoquito, assidue agitando, donec tertia pars relinquatur: deinde in mortarium cōfecta terito, ac reliqua similiter in puluerē redacta inspergito: ammoniacum uero aceto diluito, & uiscum cū modico oleo emollito, picis uero ac ceræ liquefactis cū residuo oleo, & ab igne ablatis, uiscū adijcto, ac unito, & simul tritis affundito, fortiterque contundito, ac utitor. Andromachi epithema, ad dysentericos & coeliacos.

Seminis hyoscyami albi, seminis api, cuiusque drach. iiii. anisi, floris rosarum, succi hypocisthidis, balaustrū, rhois rubri, cuiusque drach. ii. opi drachmā unā, croci drachmam i. contere, ac uino myrtitē excipe, informaque pastillos, quos in umbra sicabis: usus uero tēpore, ex eis quantū suffecerit contundes ac cribrabis, & subiges, linteoloque infartū uentri impones. Dropaces. Dropax ex tertio libro placitorum Sorani. Resinæ librā i. picis siccæ lib. i. niri, bituminis, sulphuris uiui, cuiusque libras ii. pyretri li

bras ii. ueratril sextantē, olei heminam unam. Si uero efficacius reddere uelis, adijce & piperis tritē, adarcæ sextantē, staphidis syluestris sextantē.

Alius dropax. Picis sexuncem, resinæ pinus torrefactæ sexuncem, myrrhæ, sulphuris uiui, niri, cuiusque unciam unam, pyretri quadrantē, adarcæ unciam unam, euphorbi sextantē, aliq drachmas duas tantum habent, adipis taurini sexuncem. Vtendum autem & ad hæc rubefacientib. cutem, phoenigmis à Græcis appellatis, itemque sinapismis, in tertio Sermonē descriptis, in declinatione præsertim dysentericæ, quo totum malum penitus destruat.

De lienteria, seu intestinorum leuore. Cap. LI.

Lienteria, quemadmodū ipsum nomen indicat, leuor quispiam intestinorum est, qualis etiam forinsecus in corporis cuticula, & ex cicatrice contingere solet. Oboritur autem frequenter, dysenteria magna præcedente, & ex profunda ulceratione, cicatrice densa & leui succedente, quæ deinde ob densitatem quidem suam, ciborū per corpus digestionem fieri non permittit, quum sanè uenarum ora sint uelut obturata: uenarum inquam, quæ alimentum ex intestinis ad se auellunt. Ob leuorem uero, cibū statim prius quàm permutationem & perfectam cōcoctionem admittat, dilabi finit. Cæterū lienteria ipsa propriè ex permutantis cibos ac digerentis facultatis debilitate contingit, cuius signum est, quod cibi crudi & nihil immutati excernuntur, quæ ratio & ex hoc amplius corroboratur, quod non solum à dysenteria hæc affectio oboritur, sed & post frequentia uol uulosa tormina, & post longum profluuium uentris: aliquando etiam aqua inter cutem per uentrem euacuata, lienteria consequi solet. Ex quacūque igitur causa lienteria orta sit, ægrī cibum nō sentiūt, & malum corporis habitū acquirunt, quod utrunque malum incorrigibile existit. Succedit enim ægris assidua excretio cruda, colore subalbida, inæqualis, & aquosissima, citra sanguinis ac bilis complexum. Adest autem simul & ardor per totā præcordia se dilatans, quem cibi fastidium concomitatur. Videtur autem bonum & amicum signum in eis ructus acidus esse. Indicat enim iucundi quippiam factum esse, & uentrem ac intestina nō uelut inanimata cibum sincere pertransire. Itaque quum eiusmodi sit affectio, facile est intelligere, quod uim retentiuam, ac concoctoriam facultatem tum uentris, tum intestinorum, omni modo refocillare oportet, quod sanè per ciborum conuenientium exhibitionem fieri potest, perque diætā restituendis ac refocillandis uisibus aptam, & ut simpliciter loquar, eodem medicationis ductu utendum est, quem ad coeliacos & dysentericos habes præscriptum. Cæterū quod dignum indicatione hic uisum est nobis, acrium rerum comestiones frequentiores eis aptæ existant, & maxime quibus cicatricem factam esse coniectamus: acrium enim rerū comestio uelut refractionē quandam cicatricum operatur: quin & insitum calorem reuiuificat, & concoquendi facultatem quodāmodo refocillat. Porro uomitus à cœnā uentrē etiā in melius transmutant, & actionis suæ cōmonefaciunt: frequentes quoque dropacū admotiones ad manus ac crurā, thoracemque & uentrem, itemque rubefactia ex malagmaris & ex sinapi eis commodæ existunt.

Potiones

Potiones etiam quasdam ad dysenteriacos & coeliacos praescriptas lintericis praepotandas exhibere conuenit, quale & hoc catapotium existit. Catapotium dysentericum, maxime uero lintericis conueniens. Malicorij, myrrhae, cuiusque drachmas octo, alumi-

nis scissilis drachmas quatuor, succi hypocisthi = dis drachmas quatuor, cum aqua catapotia ad erui magnitudinem ex his formato, indeque quinq; aut septem iuxta aegri vires exhibeto.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

DECIMO SERMONE AETII
CONTINENTVR.

DE debilitate iocinoris, ex his quibus sanguis per uentrem defertur. caput I.

De oppilatione hepatis. cap. II.

De hepatis inflammatione. cap. III.

De hepatis abscessu. cap. IIII.

Cura hepatis exulcerati. cap. V.

De hepate in scirrhum indurato. ca. VI.

De lienis affectionibus cognoscendis: ex libris Philagrii. cap. VII.

Intemperiei splenis cura. cap. VIII.

De inflatione splenis. cap. IX.

De splenis inflammatione. cap. X.

Cura splenis in scirrhum indurati cap. XI.

De splenicorum uisione. cap. XII.

Splenicorum dieta. cap. XIII.

Cura eorum in quibus splen, frigida, uenter uero calida affectione laborat. cap. XIII.

Cura splenicorum quos tuſis inſeſtat. cap. XV.

Cura eorum quibus splen in magnitudinem excreuit, simulque durus est. cap. XVI.

De ictero seu morbo arquato. ca. XVII.

Cura arquati. cap. XVIII.

De malo corporis habitu. cap. XIX.

De hydropse siue aqua inter cutem. cap. XX.

Ascite ac tympanite hydropis cura. cap. XXI.

Epithemata hydropica. cap. XXII.

Malagmata quae euacuant humorem.

cap. XXIII.

Epithemata quae post euacuatos humores adhibita, pro glutino sunt.

cap. XXIII.

Aquam ducentia remedia, hydropicis ualde commoda. cap. XXV.

Quae ad ciendam urinam hydropicis bibuntur. cap. XXVI.

Cura post euacuationes. cap. XXVII.

Cura hydropis qui proprie subtercus appellatur. cap. XXVIII.

Cataplasmata ex lib. Asclep. ca. XXIX.

Chirurgia hydropis subter cutem. cap. XXX.

Reliqua praedictorum cura. ca. XXXI.

Communis dieta omnium hydropicorum. cap. XXXII.

AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-
BIBLI SIVE QUATERNIONIS
TERTII SERMO SECVNDVS ET EX
ORDINE DECIMVS.

De dispositionibus iocinoris ac lienis, eorundemque affectionibus.

De debilitate iocinoris, & his quibus sanguis per uentrem defertur: Galeni. Cap. I.



IN TEMPERIES quidē causae sunt, ex quibus iocinoris debilitas producit, dispositiones autē diuersas in ipso faciūt: quū enim citra inflammationem aut scirrhum circa hepar, propter solā debilitatem, sanguinis effluxio cōtingit: tūc sanē proprie hepaticos ipsos egros appellāt, quemadmodū coeliacos & stomachicos uocare cōsueuerūt, eos qui neque inflammationē, neque aliquē aliū preter naturā tumorem in uisceribus habēt. Calide itaque intēperies, tū eos qui prius adsunt humores, tū etiam hos qui per uenas mesenterij ad ipsum hepar deferūtur, adalsant ac cōburūt. Frigide uero intēperies, humorē, qui iā in ipso continetur, crassum & lēcū egreque mobilē reddūt: cū uero qui defertur, pituitosum ac crudū & semicoctū. Ceterū sicca intēperies, sicciore & dēsiore humores facit. Humida autē tenuiores & magis aquosos. Itaque ubi calida intēperies circa hepar cōstiterit, colliquationes fiūt, primū quidē humorū, deinde etiā carnosē ipsius hepatis substantiae, bilisque per uētrē euacuatur fortens ac crassa, abundeque colorata, uelut in pestilentibus febribus fieri solet. Vbi uero frigida intēperies affue-

rit, neque assidue excretiones, neque multae fiūt. Diuturnū autem sic malū, & per dies aliquot acruatim eis profluet uēter: ceterū egesta nō similē putorē habent his quae per calorē sunt colliquata, neque colorē etiā, neque cōpagē, sed specie prae se ferūt sanguinis putrefacti & in grumos congelati: & si quis diligēter inspiciat, uelut limus & fex sunt sanguinis crassioris: cōsimilia enim atrae bili colore apparēt, quin & plures & iudicatu difficiles colores iuxta eandē dispositionē in excrementis apparēt. In sicciore autē intēperie, recrementa adhuc sicciore uidebuntur, egrique magis sicciet. In humida uero, humidiora, & plura erūt recrementa, siusque minus inſestat. Quādoquē igitur egesta uideris loturę carnis recēs mactati animalis similia, uelut si quis cum aqua sanguinem confudisset, crassissimum signum debilitatis ipsius hepatis habebis: eodem modo, si uelut fecem sanguinis conspexeris per sedem excretam, hepaticum & hocce signum esse scito. Si igitur sanguis tenuis & serosus destillat, aegri uisceris signum iudicato: sin uero uelut fex fuerit, supercalefacti & sanguinem superassantis: incipit enim aliquando etiam citra febrem in frigida scilicet intemperie ipsa adfectione, quo tempore tenue sanguinis serum primum excernitur: temporis autem progressu, corrupto circa uiscus sanguine, leues febres accedunt, quarum

quarum quum in experti medici negligentes sint, atq; ægrum omnino febrī carere putant, quum nihil per uentrem excretum sit, ipsum ægrum lauant, conceduntq; negligentiori diætā uti, atq; ita uenter rursus corruptum sanguinem ex cernit. In huiusmodi igitur affectionibus primus curationis scopus sit, ut intemperiem ad contrarium deducamus. Calidā enim dispositionem semper refrigerare oportet, frigidā uero calefacere, similiterq; humidā resiccare, & siccam humectare. Cæterum omnibus hepaticis remedijs, tum quæ per os sumuntur, tum quæ forinsecus imponuntur, aliquid ex adstringentibus ammiscere oportet, quo firmitas uiscerū cōseruetur. Atq; in stomachicis idem facere non similiter cōducit, quum in ipsis adstrictoria qualitas aliā domine tur. Fomenta igitur in hepatis debilitate cōuenientia ex oleo fiunt, in calida quidē affectione, ex chamæmelino, rosacco, & lentiscino, absinthio, aut palmis, aut aliquo alio consimili in oleo decoctis. In frigida uero dispositione, ex ungueto nardino, cui thus & samucus sine infarta. In humida autē intemperie, n̄ idem oleis magis discutientia ac resiccantia incoquenda: uelut est iris, cuminum, ac ruta. In sicca demum intemperie, balnea sufficiunt dulciū aquarū, & humectans diætā cōmoda erit, cerata etiam atq; epithemata fomentis similia sint, ex palmis scilicet, malis cotoneis, styrace, mastiche, ac aloë: in frigidioribus etiā polyarchia conducunt, similiterq; in humidioribus. Porro in potu uti conueniet plerisq; eorum quæ in hepatis inflammatione sunt relata, si quidē calida intemperies fuerit: uelut est seridis ac intybi succus, senecionis succus aut decoctū, perdicij succus, mel rosarū, & quæ his similia existunt: quin & Philonis antidotus semel tantū exhibita, omnē aliquādo calidā hepatis intemperie mirabiliter sanauit, quod etiam Philo de ea testatum reliquit. Vbi uero frigida in hepate intemperis fuerit, calefacientibus ac firmitatem addentibus utendū est, uelut est nardi spica, capniū, quæ & chelidonia herba circa sepes enata, semen pelecini, & quæ his similia existunt. Vtilissimū & his nardiū unguentū, quotidie mane cochlearij mensura ieiunis potatū, & à coena ante somnum eodē modo. In humida autē intemperie, simpliciora ex eis quæ ab oppilatione liberāt, exhibenda, & quæ à proprietate totius substantiæ efficacia existunt, uelut est, lupi nū hepar, quod sanè diligenter tritū drachmæ unius pōdere cum uino dulci aqua calida diluto præbetur. Hoc enim multiplici experimento cognitum omnibus hepatis intemperiebus cōmodum existit: utpote proprietate totius substantiæ hanc efficaciam habens, non calefaciendo, aut refrigerando.

De oppilatione hepatis, in quibus plurima remedia.

Cap. II.

A flatibus nebulosis & cōcoctu difficilibus: aliquādo autem & à crassis humoribus uiscosisq; in finibus uenarū ex sima hepatis parte enatarum, per quas ex uentre ac intestinis alimentū digestio ad hepar cōtingit, oppilationes fiunt. Cōsequitur autē ad ipsas, grauitatis circa dextrū ilium cum dolore sensus, aliquādo quidem obtusæ, aliquando uero uehementis, & quandoq; quidem absq; febre, quandoq; cum febre. Crassa enim & uiscosa ac multa, omnino amplius reliquis oppilat, & maxime si ægri à cibo uehementiori motu utantur: si uero acria sint & multa quæ

in cibo sumuntur, dolor ex oppilatione uehementior fit, quū obturata corpora simul & tensionē perferāt, simulq; pūgātur. Cæterū quū uaporosi & crassi flatus multitudo coaceruetur, quæ exitū nō habet, non grauitatis solum, sed & distensionis sensus oboritur. Quare attenuantiū & oppilationem dissoluentium quamcelerrimus requiritur usus: oppilatio enim in ueterata nō tantū in hepate, sed in omni membro putrefactionē operatur, febrēq; accendit. Præclarè autē & citra molestiā ab oppilatione liberat, simulq; firmitatē tū hepatis, tū stomacho addit, pelecini qui in frumētis nascitur semē, tritū cochlearij mensura, cum uino aut aqua mulsa in potu acceptū. capniū item, quod & chelidoniæ nomen inuenit, succo eius expresso & desiccato: reponitur autē is in pastillos reductus, & semel quidem exhibitus dolorē omnē admittit autē præbitus, in totum ab affectione liberat, ultra hoc quod & firmitatem uisceribus addit: decoctū quoq; huius herbar potatū similē efficaciam habet, etiā si ualde febricitent ægri: aliquando autem herba ipsa exiccatur, cōtusaq; & cribrata cochlearij mensura exhibetur. Aliud. Lupi hepar siccum drachmæ pondere, cum piperis granis 1 x. ac myrrhæ magnitudine fabæ, in passo calido datum, confestim auxiliatur. Aestatis autē tempore, alternis diebus, ter potandum præbeto. Liberat ab oppilatione etiam eupatorium, simulq; firmitatem addit, similiter quoq; stœchas, tum cocta, tum sicca tritaq; data: plantaginis itē radix, & semen, foliaq; sicca trita, siue per se unum quodq; siue simul exhibeantur. Lauri cortex tritus potatus, spica nardi, fructus pistacij, amygdalæ amaræ, anthemis siue chamæmelum, anagallidis quæ ceteruleum florē habet, succus, radicis acori, eryngij, radicis dulcis decoctū urīnam det, & aluū emollit. Radix dracunculi uiscera omnia repurgat, crassosq; & instar uisci tenaces attenuat humores. Filicis succus cochlearij mensura ex aqua mulsa potatus, hepar repurgat, oraq; meatuum ac uenarū aperit, citra manifestā calefactionē. Præscriptū autem iā antè est de his quæ tum simas, tum gibbosas hepatis partes ab oppilationē uendicant, in tertio nimirum Sermonē.

Cataportum hepatis oppilationem remouens.

Radix chamæpityos drachmas 1111, radix cichorii dra. 1111, contundito, ac melle cocto excipito, nucisq; ponticæ magnitudine præbeto: aquæ etiam calidæ cyathos tres ab eius exhibitione absorbendos dato. Cæterū non modo radices horū hepaticis optulantur, sed & succus & decoctum. Pastillus hepaticus, ex amygdalis amaris. Seminis anisi, apij, asari, amygdalarum amararū decorticatarū, comæ absinthij, singulorum drach. 1111, apparato, & cū aqua pastillos formato, ex quibus drach. 1. febre carentibus cum uini diluti cyathis 111. præbeto: febricitantibus autem, cum aqua mulsa. Urīnam det, & placidè calefacit. Aliud hepaticum ualde commodum. Seminis pelecini, capni, costi, cuiusq; drac. v. cōtundito ac cribrato, & cochleare 1. ex aqua mulsa dato. Præclarè enim summouet oppilationem. Aliud hepaticum pulchrum, cuius uilitatem ne contempnas.

Lenticulam torrefactam ac probè tritā cochlearij mensura ex uino bibendam præbe. Commodum est hoc & lienī, ex posca, aut aceto mulso. Aliud, experimento constans. Comæ absinthij, piperis, costi, calsiæ, radicis gentianæ, amygdalarū amararū, singulorum

singulorum unc. i. foeni graeci sextantem, seminis pelecini sextantem. Exhibeto cochlearium quomodo-
cunque uelis. Aliud, ad hepatis oppilationem.

Cacani scrupulos duos, alij octo habet, costi scrupulos sex, spicae nardi, tridis, phylli, lupinorum siccorum, baccarum lauri, foeni graeci, rhei pontici, singulorum scrupulos sex, piperis, phu, asari, cuiusque drachmas quatuor: quod si picis siccae scrupulos tres ammiscueris, efficacius operatur. Aliud simplicius, quo assidue utimur, ualde admirandum. Cacani sextantem, foeni graeci sesquunciam, piperis unciam unam, cyperi unciam unam, costi unciam unam: contundito & cribrato, ac cochlearium unum cum condito praebeto, decumbat autem aeger super affectam partem. Aliud. Potamogetonis sicci drach. ii. comae ablinthij drachm. i. croci, costi, spicae nardi, cuiusque drachmas duas, amomi drachmam i. datur cochlearij mensura aridum. Aliud. Piperis drach. iiii. dorcadiadis herbae, quae & musci appellatorem habet unc. i. costi trientem, alij drach. iiii. contundito, cribrato, & cochlearium in potu exhibeto.

Aliud Philagrii. Rhei pontici unc. i. castorij scrupulos tres, farinae lupini scrupulos iiii. piperis grana vii. contundito, cribrato, & mane cochlearium unum praebeto ex condito.

De hepatis inflammatione, & cognoscendo utrum hepar, an musculi eius sint inflammati. Cap. iiii.

Galenus. Hepar consimiliter ut splen & inflammatur & abscessu suppuratur, uerum raro scirrhus, hoc est, abscessu duro afficitur. Inflammato itaque hepate, dextrij illij tumor consequitur, & maxime si gibbosa parte inflammata fuerit, facilius per tactum cognoscitur tumor, grauitasque coincidit illum totum distrahens, & dolor in dextram usque clauiculam ac scapulam pertingit, ut conuelli penitus aeger uideatur: linguae color in principio quidem rubicundior fit, postea uero denigrescit: appetitus defectio, fastidiumque cibi uehemens, & implacabilis sitis: uomitus quibusdam contingit bilis purae atque etiam uiscellinae, post autem & aeruginosae: aluius autem ipse est adstricta, nisi sane cum uisceris debilitate inflammatio est oborta, febris adest acuta, inaequalis, quae plerumque ad uesperam & nocte exacerbat: sequitur & spirandi difficultas, tussiculaeque parucae, ut plurimum siccae, per quas nihil omnino relectatur. Aliquando autem per uomitus biliosa pauca quaedam relectantur, quae res plerumque deceptit, qui ex pleuritide hanc educationem fieri putauerunt. Caeterum & costae nothae ut plurimum coadescunt, & color corporis subuertitur in arquati morbi specie permutatus: singultus quoque consequuntur. Accessionis autem tempore quidam delirio apprehenduntur, & acre lotium excernunt: & sane inflammationes quae iuxta simam hepatis partem contingunt, plus fastidij, & nausae, & uomitus biliosos, ac uehementem sitim inducunt: quae uero in gibbosa parte fiunt, dolores circa respirationem intendunt, tussiculaeque irritant, clauiculamque magis cum dolore conuellant. Quandoquidem autem musculis hepatis incumbens inflammatio, quidam decepti hepatis eam inflammationem esse suspicantur, necessarium fuerit distinguere inter se has affectiones. Hepate etenim inflammato, tumor secundum lineamenta rotundus, figura uidelicet ipsius hepatis, succumbit, quicquid ad corporis decubitus simul conformatur: maior enim apparet corpore ad

sinistrum latus reclinato: minor autem rursus ad dextrum deuoluto: nimirum hepate sub nothas costas cedente, neque uisui, neque tactui similiter succumbente. amplius autem in hepatis inflammatione, incumbens cuticula, naturali modo habere conspicitur, musculis autem inflammatis, cutis circumtenditur, ut si quis digitis apprehensam attrahere uelit, ea minime sequatur. Propriissime autem tactus discernet siue in alto, siue in superfice inflammatio ipsa consistat. Porro hepate inflammato, sanguinis detractionem experiri oportet a cubito, si nihil id fieri praepediat. Incidenda autem in dextro cubito uena interna, ita ut substratam arteriam obseruemus, quae si non appareat, media: si uero neque ipsa appareat, superior. Multitudinem autem extrahendi sanguinis, ex corporis reperies qualitate, aetateque & natura, horaque temporis, ac regione, ampliusque ex uiribus aegri: quae si id ferre queant, semel quantum satis est, detrahendum, si uero non, per uices partitum. Caeterum incisio ipsa oportunè in prima & secunda die contingit: si uero urgeant dolores, & adsint ulres: etiam septima uenae incisionem facimus, qua facta post modicum interval lum, simpliciter clystere euacuamus, maxime si non sponte egerat aluius. Sequenti a uenae sectione die, cucurbitae cum scarificatione affigende, rursumque post unam diem cucurbita apponenda: non pauci enim a secunda earum adhibitione opem senserunt magis quam a priore. At uero ante uenae incisionem & post eam, fomentis utendum est ex lanis succidis oleo imbutis & impositis: conuenit & ex passo cretico fomentum cum rosaceo aut lentiscino aut melino aut oxanthino. Optimum autem fomentum hocce est. Chamemeli, anethi humidi, si adest, rutae uiridis, seminis lini, cuiusque unc. i. calicium papaueris numero x. olei sextarium i. semen lini contusum in linteo colloigato, & cum alijs in cacabum coniectum ad prunas decoquito donec uires suas distribuat, deinde olla in seruati cinere collocata, ex ea multo tempore confidenter foueto, post fomentorum irrigationes cataplasmatibus uti oportet, ex semine lini & foeni graeci, farinaque hordeacea aut triticea, his uel omnibus uel uno aliquo ex eis, aut quibusdam in aqua mulla decoctis, ammiscendum etiam ablinthium & mastiche ac melilotum. Quod si uehementior sit ardor, etiam ea quae astringunt sunt ammiscenda, uelut sunt mala cotonea. Oleum uero quod additur rosaceum sit, aut melinum, aut lentiscinum. Si uero feruor adhuc perseueret, cotonea mala cum poseta imponenda. Remittente autem uehementi calore ficus optima & althaeae radice decoquito, & decocto eorum semen lini, farinaeque hordei, foeni graeci, ac lolij infarcto: quod si durior inflammatio succumbat, etiam chamaeleonem aut chamaepityn, aut posium, aut asarum, aut daucum, eryngiumque tum semine, tum radice ammiscere oportet, aliquando autem & ficus cum althaea decoctae ac tritae cataplasmati coniectuntur. Caeterum calidius & magis emolliens reddideris cataplasma, si terebinthiniae, aut resinae pinus, aut picis quadrantem addas. Brassicae autem crudae folia cum melle trita ac imposita, omnes induratas inflammationes dissoluunt. Hinc ad cerata transeundum ex oleo cyprino aut glaucino apparata, althaeae radicibus simul admixtis. Utendum etiam ex palmis cerato, hepatis inflammationibus summè accommodato, maxime si stomachus per consensum simul sit affectus, & costae coafflictae.

coafflictæ. Habet autem hoc modo. Palmas interiore medulla exempta, diligenter contundito, ac cum pari cerato rosaceo in mortario probè cōmittito, ac unito, affusoq; modico oleo rosaceo imposito. Aut myrrhā in uino ueteri adstringente maceratam, palmis ammisceto, & panniculo uestis detritæ excepta imposito. A ceratis ad epithemata ex styrace, & ex meliloto, & ea quæ polyarchia appellantur, & iam antè ad colicos & stomachicos descripta sunt, transeundū. Compositio autem epithematis ex styrace, hæc est. Styracis pinguis, carnis palmarum, costil, mastiches, calsiæ, singulorum trientem, samplici sextātem, croci semunciam, uuæ passæ semunciā, ceræ sexuncem, unguenti nardini bessem. Porro in inflammatione hepatis ubi magni circumstant dolores, etiam pharmaca dolorem leuantia in potu eis exhibere cōuenit, ita tamen ut asiduum eorum usum deuitemus: simplicibus autem portionibus frequentius urēdum: senecionis itaque decoctum tāquam maximè commodum, aut succi radicis dulcis obolos duos cum aqua calida exhibeto. Aliud. Picridis seridis, aut intybi succi cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis tribus præbeto, mellis etiā cochlearijs duobus affusis. Ad hoc enim quod refrigerat, ac firmitatem uisceri addit, etiam ora uenarum hepatis repurgat, neq; tamen frigidas intemperies magnopere lædit. Potest autem seridum ac intyborum substantia hepatis commodare, tum si sine humorum, aut serosi ac uisati sanguinis complexu, intemperies in ipso fiat, tum si humiditatis euluscunq; tandem adsit cū intemperie cōplexus: mellis uero ammixtio humiditatem per urinā excludit. Quapropter etiam exliccata ac contusa uiliter potui insperguntur, eorum quoq; decoctum potatum magnam commoditatē præbet. Quod si nō infestet calida aliqua intēperies, sed obturatione tantum uiscus ipsum uexetur, ex uino albo, tenui, ac uetusto, cum aliquo urinas clente pharmaco, potata magnificè auxiliantur. Magni etiam pretij in hepatis inflammatione capni herbae, quæ etiam chelidonia appellatur, succus habetur aut eius decoctū. Auxiliatur & præscriptus ex amygdalis amaris pastillus, nisi penitus magna caliditas adsit. Aliud. Cochlearum terrestrium carnem optime conterito, & uini nigri cyathos tres affundito, calefacto, ac bibendum præbeto. Cæterum hæc iuxta omnem suam substantiam efficacia existunt, quale est hepar lupinū, cuius rei magnum periculum fecimus, inquit Galenus, usus autem eius idem qui cochlearum existit: optime enim conteritur, & drach. i. cum uino aliquo dulci præbetur. Hæc enim pharmaca omnibus hepatis intemperiebus conuenire uidentur, quum neq; calidas neque frigidas intemperies lædant: febrientibus tamen lupi hepar melius ex aqua, aut seridis succo, aut aliquo consimili exhibetur. Epithema ex styrace. Costil unc. i. croci, thuris, aloës, ammoniaci thymiamatis, mastiches, styracis flauī, spicæ nardi, cuiusq; drach. iiii, terebinthinę unc. i. opobalsami drach. iiii, ceræ trientem. Vtere.

De hepatis abscessu: Archigenis, Cap. iiii.

Quod si inflammatio ad permutationem aptè se habeat, hoc est, principium permutationis ad suppurationē iam suscepit, omnes prædictæ de inflammatione accessiones augebuntur: dolores (inquam) & febres, & delirium, anxietas, desperatio, cibi fastidiū,

& displicentia maximè ab eius acceptione. A rigoribus autem ferè in totum febriles accessiones initiū sumunt, præsertim si ad uesperam exacerbationes fiāt. Adiuuare igitur permutationē ac puris eruptionem oportet, ut quàm celerrime fiat, ne maiora inde corpora corrūpantur, per usum uidelicet cataplasmatū ex semine lini, aut hordeacea & foeni græci farina apparatorū, admixtis etiā resina, manna, pice, althææ radice, stercore colūbino, stercore caprino, caricis, & quæ his similia existūt: fomentis autē utendū ex cruda hordeacea farina, & spongijs decocto absinthij, abrotoni, cētaureę, similibusq; imbutis ac expressis: neq; uero incōueniēter emplastra quæ puris permutationē iuuare queunt, adhibētur. Quum autē perfectā suppuratio fuerit, dolores remittēt, omnesq; accessiones mitiores apparebunt: cæterū rupturæ tēpore dolor rursus magis augefcet, quare etiā tunc rupturam adiuuare oportet, per cataplasmatum ad superficiem attrahentium ac subadstringētiū usum, & per portiones calorificas: quales sunt quæ ex pipere & zingibere ac myrrha apparantur. Porro post eruptionē, aliquando quidē per aluū, aliquando per urinas, puris transumptio contingit. Quidam etiam per os, puris educationem factam tradiderunt: uerum periculosior alijs per os transmissio existit: id uero quod excernitur nigrū est, quāquam & album reperiatur, quod sanè salutare iudicatur. Aliquando autē humor qui ex abscessu promanat, inter pelliculā uentrē ac intestina amplexentē, peritonæon Græcis dictam, atq; ipsa intestina colligitur: & facile sanè curatur, si quis diducta citissime cuticula humorem ipsum excludat, ea maxime parte qua tumor attollitur: aliquando autē rursus post factā isthæ collectiōnē, transumptio per intestina cōingit. Cæterū in his quibus tumor foras prominet, sectionem obliquam supra inguē infligere oportet, ac per eā ipsam humorem euacuare, atq; etiā ulcus ipsum eluere, & pharmaca liquefacta inñcere, donec perfecte curetur. Neq; uero negligendū, quo & hepatis post factā abscessus rupturā, remedia auxiliaria adhibeantur. Primum quidē igitur emplastra emolliētia imponantur, deinde etiam resiccantia, quale est quod Icesium appellatur, quodq; ex salicibus cōstat, & quæ his similia existūt. Si itaq; per urinas puris transumptio fiat, cōsimilibus epithematibus urēdū est circa totū ile, & iuxta pubē, & tū per cibos tū p pharmaca urinā cientia, repurgariq; eius adiuuanda. Pepones igitur in cibo eis conueniunt, & cucumeres cocti, pastinacæ & sion. Ex pharmacis uero, meon & asarum, spica, calsia, cinamomum. Sunt & composita quæ huc pertinet, quorum compositiones paulo post dicemus. Per interualla autem etiā humores ipsos dulcorare oportet, uini scybelice, theriac, ac protropi, similibusq; potu. Commoda est etiam ipsis potatio lactis. Si uero per sedem humoris transmissio contingat, epithemata quidem eiusdē materiæ approbamus: uerum prospiciendum est, ne alius cohibeatur, neq; etiam amplius humectetur: nam hoc ipsum tum per cibos, tū per pharmaca, ac epithemata fieri potest. Vtimur autem & ad hos infusus per clysteres, quo intestina illa lassa conseruemus: ad quam rem prisanæ, ac tragi, & oryzæ succi appositi existunt. Quod si tamen per os puris educiō fiat, maximam ad hoc curam adhibere oportet, ut humores prius euacuentur: deinde

D cibus

cibus præbendus adstringens & stomacho gratus.

Utendum & uino tenui & odoro. Venti uero episthemata ex palmis apparatus, atq; ex oenanthe, ac eis similia imponenda, de quibus in stomachicorum ac dysentericorum tractatu est prædictum. Ad hepaticos. Folij malabathri, careophylli, spicæ nardi, costi, piperis, lupinorum siccorum, singulorum uncia i, contundito, cribrato, ac scrupulos iiii, præbeo cū uino. Aliud Philosophi: hepatis, inquit, abscessus discutit. Radicis graminis decoctum bis in die potatū, similiter & foeniculi radicū decoctū, & dauci. Myrrhā itē & picē siccā contundito ac cribrato, pilliticoq; hepatis ex oleo cyprino inspergito & lanam puram oleo cyprino calido imbutā superposito, uehementer prodest hoc utere confidenter.

Cura hepatis exulcerati, Archigenis. Cap. v.

Si exulceratio ex abscessu circa hepar relinquatur, aut illic ex acris humoribus ac erodentibus fiat, colliquatio hæc adfectio appellata est. In his sane uenter cruenta, & putrefacta, ac saniosa excernit: atq; omnino consimilia ex hepatis ulceribus promanare solent, his quæ à mortuorum corporibus destillant: quare quidam Inexpertus deceptus, dysenteriam hanc affectionem esse putauerunt. Ructus aut foetidi consequuntur, & à ciborū acceptione grauitas præcordiorum: & pulsus eis est depressus ac densus, fiuntq; ægrī amarulenti & iracundi: dolor circa locum fit ulcerosus, usq; ad clauiculam ipsam pertingens: multis autē una cū uentris recrementis etiā lotiū excernitur saniosum sandarachæ colore: non parū uero frequenter ea quæ in urinis continentur aquæ inter cutē significationem portendunt. Cæterum omnium periculosissima est hæc affectio, & modica omnino ægris est spes salutis: & tamen nihilominus aggredienda est eorū cura, cōsimilibus remedijs, eis quæ paulo antè dicta sunt, etiam his adhibitis, episthematibusq; ex materia leniter adstringente, similibusq; fomentis. Liquoribus autē tum qui ad fomēta, tum qui in cataplasmata adsumuntur, cortex pinus, palmēq; ac cyperi similiaq; sunt incoquenda, proprie autē ulcera repurgat lac scissile sepe acceptum: cui aliquando parum mellis addere non ab re est. Post repurgationē citissime ad ea quæ carne replent festinandum, præstant autē id cibi moderati et boni succi, ac gestationes: quod si molestiæ id fieri pmittant, etiā exercitia conueniunt & uinum. Post cataplasmata uero, cerata et emplastra apta erunt, quorū sæpe in præcedentibus fecimus mentionem. Plurima præterea pharmaca quæ ulceribus cōueniunt, in potu sumuntur. Quale & hoc est, Andromachi ad hepaticos cōpositio, cyphoides appellata quæ etiā ad omnia thoracis uitia cōducit. Uuarū passarū carnis dra. xxv. croci dr. i. calami indic. dr. ii. bdelli dra. ii. et dimidiā, cinamomi dra. x. cassiæ dra. x. floris iunci odorati dra. ii. & dimidiā, myrrhæ dra. iiii. terebinthinæ dra. iiii. scobis aspalathi dra. ii. spicæ nardi drac. iiii. mellis dra. xvi. uini dulcis quātū sufficit. Adstringit mediocriter & resiccac ac discutit serosos ac uiciatos humores, inquit Galenus, corrigat malitiam humorum & putrefactioni se opponit, intemperies sanat, extergit ac mundos facit, aperitq; meatus, citat urinam, atq; ea propter internas ulcerationes curare consuevit, & eos qui hepatici appellantur. Sunt aut hepatici proprie, qui ob hepatis

debilitatem per sedem cruenta liquidiora excernunt, quales sunt loturæ carniū animalium recens maturationum, quos ipsos ignarum uulgus dysentericos esse putat. Alia cyphoides Andromachi: facit & ad tusses, & ad liquidorū per os relectiones. Croci, cinamomi, mirrhæ, cuiusq; dra. i. bdelli dra. iiii. aspalathi obolos iiii. floris iunci odorati dra. iiii. calami indic. dra. ii. cassiæ dra. i. spicæ nardi dra. i. terebinthinæ dra. xvi. mellis hemina dimidiā, uuarū passarū pinguiū numero cxx. carne earū optime mundata, uini ueteris adstringentis, quātū ad uuas passas, bdellium ac mirrhā maceranda ac conterēda satis est. Mel autē prius despumato, in eoq; resinam liquefacto: & cum reliquis committito ac uitior, aliquando quidem instar eclegmatis ad nucis ponticæ magnitudinem aut amplius exhibeto: aliquando uero aqua mulsa dilutū bibendum præbeo. Inuenies & inter arteriaca remedia ad tussientes item & phthisicos pharmaca plurima his similia, quibus ipsis & ad ulceratum hepar uti oportet: proderunt etiam ea quæ ad renum ac uesicæ ulcera sunt descripta. Alia cyphoides, qua usus est comes Andreas, & Menas chirurgus. Croci dra. iiii. calami drach. vi. bdelli drach. ii. & dimidiā, cassiæ scrupulos iiii. spicæ nardi sesquidrachmam, floris iunci odorati scrupulos ii. & dimidiū, mirrhæ dra. iiii. terebinthinæ drach. iiii. aspalathi scrupulum unum, mellis sextantem, carnis uuarum passarum quadrātem, uini quantum ad hæc satis erit.

De hepate in scirrhum indurato, Galeni. Cap. vi.

Non solum autē à prædictis affectionibus apprehenditur hepar, sed & in scirrhum induratur, inflammatione uidelicet præcedente. Manifestiorem autē cognitionem hepar induratum ex hoc habet, quod tumor circa ipsum scirrhum multo durior quā in inflammatione existit, multo etiam minore dolore uexatur. In huiusmodi quoq; dispositiōibus corpuscula hepatis insita attenuantur. Cæterum temporis progressu, maiore tumore circa scirrhum facto, difficulter eius cognitio per tactum cognoscitur, propterea quod iam aquæ inter cutem suffusio sit consequuta: unde his qui negligentius notas perscrutantur, tumor ad tactum latus succumbit: color autē uniuersi corporis in nigredinē pallore permixtam cōmutatur, uenter & pedes intumescunt, supernæ corporis partes gracilescent, & corpus ipsum tepescit: aliquando autē alius multa & tenuia excernit: urinæ uero à principio quidē multæ, uerū ubi iam ad aquam inter cutem dilapsi sunt omnino paucae. Porro incipientem hepatis scirrhum sæpe curauimus ipsi: tum uero qui temporis diuturnitate est extensus, neq; ipse curauit, neq; alium quempiam qui curare eū posset uidit: in totum enim sic affectis aqua inter cutem accedit, & in longiori tempore corrumpuntur. Itaq; ad prædicta de inflammatione cataplasmata & fomenta, fortiora quædam (inquit Archigenes) sunt annexenda. Cōstant autē ea quæ inflammatis adhibentur ex absinthij coma, nardoq; tum indica, tum celica, croco, oenanthe, unguento nardino, lentiscino, & mastichino. His igitur alihææ radicem ammiscere oportet, & sterces caprinum, ammoniacum thymiana, bdellium, medullasq; & adipēs. hæc enim incipientem in hepate scirrhum, conuenienter simul adhibita diæta, sæpe curauerunt. Post fomenta

menta autem & cataplasmata, cucurbitæ hepatis affigendæ cum scarificatione, & emplastra adhibenda: primum quidem simpliciora, uelut est Mnaseæ, & quod ex succis constat, deinde etiam fortiora, uelut est melinū Serapionis, & quæ huic similia existunt. Post emplastra malagmaris utendum, ex baccis lauri, aut eo quod polyarchiō appellatur, & similibus, quorum aliqua in colicis præscripta sunt: aliqua uero in splenicis & arthriticis referuntur. Quod si neque sic proficias, hirudines admoūdæ: plurimum enim momenti habet ad curationem, sanguis earum suctu extractus. Commodus est eis & dropax & sinapis: si uero neque hoc modo res succedat, ustio per frequentia interualla adhibeatur: ita ut aut per ferrum, aut per pharmacū crustæ infligantur, & post earum casum, ulcera multo tempore fluere sinamus. conferunt etiam portiones conuenientium pharmacorum, uelut est Zopyros ad colicos præscripta, & quæ eupatorium habet admixtum. Complectuntur & urinam cientes antidoti aliquam in se commoditatem: uelut est quæ Bestiana uocatur. Scirrhus enim indurata particula ob crassos & uiscosos humores in solidis corporibus imbibitos, necessario frigida habet dispositionem: quare & calefacientibus simul & tenuium partium pharmacis opus habent: uerum his, quemadmodum dictū est, emollientia sunt præmittenda. Si enim uehemēter calida, antequam scirrhus indurata corpora præmollescant, exhibeantur, statim quidem manifestam diminutionem fecisse apparent, uerum immedicabile fit quod relinquitur, ut potentissimū resiccatum. Quapropter facile est confectare in hepatis scirrhus necessariam esse emollientiū admixtionem. Simplicia igitur quæ ad hepar induratum bibuntur sunt: anagallidis quæ cæruleum florē habet succus exsiccat, itēque liquidus ex aqua mulsa: in moderatis autem febribus, ex aceto mulso: & scillæ assatæ medullæ oboli III. seminis uiticis torrefacti dra. i. radix eupatori, radix dracunculi, cortex radialis lauri. Aliud, quo Aegyptius curatus est, quum iam aquam inter cutem incidere promptus esset: Herbae sabinae, picis siccae, quæ in fundo doliorum uini reperitur, eorum præsertim in quibus uinum dulce uetustate est adeptum, utriusque æquales partes singulatim contundito & cribrato, atque ex ambobus pariter cochlearij mensuram cum uino diluto præbeto. Aliud. Croci, spicæ nardi, calsiæ, cuiusque drach. ii. costi, floris iunci odorati, cinamomi, myrrhæ, stactes cuiusque dra. i. mellis despumati dra. xxv. Ex hoc drach. i. cum uino mulso præbe. Optimum est hoc pharmacū in incipientibus, duris scirrhis dispositionibus, cuius rei plurimū periculū feci. Aliud, ad omnes inueteratas hepatis affectiones, atque ipsum etiam scirrhū. Picis siccae, costi, piperis, æquales partes contundito & cribrato, & ex eis cochlearium præbeto. Aliud. Myrrhā troglodyticen optimā, & piper, pari pōdere tundito: indeque scrupulū unū cum uino meraco ueteri calefacto, ad dies tres aut quinque exhibeto. Oribasij ad hepaticos. Glaucij drach. iiii. aloës dra. ii. hæc arida cōterito, & cochlearij mensura statim à balneo exhibeto: febre carētibz cum uino diluto, febrientibus autē cum aqua mulsa. Aliud Oribasij, ad diuturnas hepatis affectiones, & circa sima ipsius dispositiones, in quibus tum stomachus, tum uenter simul affecti sunt. Cornæ pinus uiridis de

coctū ad tertias redactum, cyathorū trium aut quatuor mensura præbe. Quin & siccae comæ dra. i. in potu exhibita, simili efficacia præstat. Verū ad multos hæc exhibenda sunt dies. Aliud, Oribasij. Chamæpitios, petroselinū, cuiusque dra. viii. baccarum lauri, piperis, costi, singulorum drach. iiii. cyperi, foeni græci, cuiusque drach. ii. præbe cochlearium ex aqua mulsa.

Aliud. Anisi, gentianæ, amygdalarū amararū, absinthij, æquas portiones permisce: indeque cochleariū ex calida præbe. Aliud. Thuris unciam unā, ammi, acori, cuiusque drachmas quatuor, præbe cochleariū ex aqua mulsa. Oribasij antidotus hepatica. Calsiæ drachmas octo, aloës, costi, corticis pinus, cuiusque drachmas quatuor, glycyrrhizes siccae drachmas octo, spicæ nardi, croci, anisi, hyssopi, rhel pontici, cuiusque drachmas duas, mellis sesquilibra. Mel decoque ac reliqua eo excipe, & nucis auellanae magnitudine præbe. Aliud Oribasij, ad hepaticos, ictericos, splenicos, & præcordia eleuata. Croci drachmas decem, floris iunci odorati drachmas quatuor, calsiæ drachmas duas, spicæ nardi drachmas octo, myrrhæ, cinamomi, costi, cuiusque drachmam unam, mellis cocti quantum his excipiendis sufficit. Præbe ad fabæ ægyptiæ magnitudinem cum uini mulsi cyathis tribus. Facit & ad thoracis dolores, atque eos qui plumbeum colorem habent. Aliud hepaticum pulchrum. Seminis peledni, capni herbe, costi, æquale pondus contundito ac cribrato, & drachmam unam ex aqua mulsa præbeto. Aliud. Foeni græci unciam unā, trixaginis sextantē & unciam dimidiam, costi albi quincuncē, petroselinū quincuncem, eupatori quincuncem, mellis despumati quantum satis est. Datur sesquidrachmæ pondere, Eius utilitas experimento constat. Aliud. Castorij, costi, cyperi, amomi, cuiusque drachmas octo, piperis drachmas quatuor, petroselinū drachmas quatuor. Datur cochlearij mensura. Aliud, ad diuturnā uexationē & duriciem. Costi, foeni græci, piperis, foliorū rutæ uiridis, picis siccae, æquales partes cōmisce, indeque cochlearium cum aqua mulsa aut uino præbe. Aliud. Ammoniaci thymiamatis drachmas triginta duas, croci drachmas quatuor. Crocum tundito, cribrato, & cum aqua diluto: deinde ammoniacum adjecto, simulque terito, ac in pastillos redigito, ex quibus alijs drachmam unam, alijs duas præbeto. Aliud. Ammoniaci thymiamatis, costi, polij, foeni græci, æquale pondus misceto: indeque cochlearium siccum cum aqua mulsa dato. Aliud. Ammoniaci in tenuissimum puluerem redacti cochlearium unum, mastiches grana decem, præbe ex aqua mulsa, & admiraberis. Efficax est ad hepaticos iam desperatos. Aliud, Asclepiadæ: quo utimur, inquit Philagrius: quod ad hepar scirrhus induratum, atque etiam oppilatione obturatum, prospero successu accommodatur, ad aquæ inter cutem quoque suffusiones incipientes, & ad alias internas affectiones, citra tussim contingentes, optime facit. Habet autem hoc modo. Radicis gentianæ, chamæpitios, marrubij, petroselinū, radialis scolopendriæ, radialis panacis, terræ lemnia quæ sphragis appellatur, sisonis, rubiæ, seminis brassicæ, radialis eringij, baccarum iuniperi, seminis fraxini, trixaginis, seminis dauci, dictamni, cestri siue betonicæ, singulorum drachmas octo, fellis ursi sicci, sinapis, seminis cu-

cumeris, aristolochie, piperis, spicae nardi, costi, seminis eruce, singulorum drachmas octo, hoc est omnium æquale pondus, echin, eupatorii, polii, cuiusque similiter drachmas octo. Quidam etiam lupini hepatis, ac helenii tantundem adiecerunt, quod & nos facere solemus. Oribasius autem neque fraxini semen, neque betonicam, neque trixaginem, neque dictamnium, neque daucum adscripsit. Mellis quantum his omnibus excipiendis sufficit. Datur ad nucis auellanae magnitudinem cum passis cyathis duobus. Pharmacum hoc experimento cognitum est. Semen autem fraxini, arboris est ex qua fraxinea ligna quocunque in opere apta ac operæ obediētissima caduntur. Epithema ex melilotis ad hepaticos. Meliloti sextantem, croci unclam unam, ammoniaci thymiamatis libram i. ceræ lib. i. terebinthinæ trientem, cyprini, aut nardini, aut gleucini unguenti plus minus quincuncem. Ammoniacum & crocū in aceto dissolue. Porro in diætā totum situm esse existimandum est, siquidem omnis diuturnus morbus maiorē ex diætā opem sentit. Quare cibi qui facile concoquuntur, eis exhibendi sunt, qui & incisoriā uim & repurgantem complectuntur. Neque uero ineptæ eis acris rerum comestiones sunt, si per interualla, & post exercitia ac gestationes sumuntur. Cæterum pro ratione motuum & exercitiorum, tum quantitatē, tum qualitatem ciborum augere oportet. Vinum eis conuenit tenue, odorum, moderata quantitate acceptum. Dulcia enim omnia nocentissima sunt hepatis affecto. Vitandum & uinum mulsum, fructusque ac bellaria omnia, præter amygdalas & pistacia: ex his enim moderate à reliquis cibis accipiendum. Vitanda etiam crassa & uiscosa edulia, atque ea quæ difficulter concoquuntur.

De lienis affectionibus cognoscendis, ex libris

Philagrii.

Cap. vii.

Quibuscunque sub sinistro illo dolor, aut distensio, aut tumor subiacet, & dum conuertuntur, uelut aliquid ex illis locis conuellatur, imaginatio contingit, his lien affectus est. Quemadmodum autem reliqua corporis membra iuxta octo intemperierum genera affliguntur, ita & splen afficitur: uerum frequentissime frigidam & humidam sustinet intemperiem, ex eōsimili maxime diætā, atque ex his quæ uoluptatis gratia accipiuntur, uelut sunt crassi succi placenta, itemque potiones. In his igitur omnibus calor tempore debilitatur. Substantia enim splenis laxa & rara est, promptissimaque ad suscipiendum crassiorem humorem: etenim fecem ac uelut limum sanguinis ex hepate ad sese trahit, hoc modo sanguinem repurgans, ex qua fece confecta & attenuata per maximas in ipso arterias seipsum nutrit. Signum autē certum & compendiosum intemperiei in splene, ea quæ eduntur ac bibuntur exhibent, & quæ forinsecus cuticulæ iuxta sinistram ilium accedunt. Si enim frigida intemperies iuxta ipsum fuerit oborta, omnis cibus & potus qui efficaciter refrigerare potest, facile & manifeste splenem lædit: pallium item frigidum extrinsecus ad motū, maxime si in frigida aëris constitutione amictantur, uentus etiam & aqua frigida tum in lauando, tum aliis quoque adhibita, frigida arguit splenis intemperiem. Eam uero ipsam intemperiem omnia calida consolantur. Quod si calida fuerit splenis intemperies, à nullis quæ in cibo

aut potu exhibentur, aut etiam forinsecus accedunt, dolorem perfert: & si quidem caliditas augetur, non solum nihil tumori apponitur, sed & contractionē amplius sustinet, præsertim si exurens simul adsit febris. Cæterum & cibi & potus calefacientes, & quæ extrinsecus corpori calorem addunt, calidas etiam intemperies augent & exacerbant. Solutio autem sunt eis omnia refrigerantia. Si enim hi qui calidam habent dispositionem per interualla frigide potu utantur, statim splen corroboratur, & minuitur, ægrumque melius spirantem reddit: & uenter aliquādo ex frigida potu flauam bilem profundit. Atque tristitia adfectis, aut ira concitatis splen dolet, si calidam habeant intemperiem. Similiter etiam sicca intemperiei in splene signa colligere oportet, maxime quum pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ forinsecus corpori adueniunt, atque intra ipsum deuorantur, si arefaciendi facultate prædita sunt, splenem exiccant, quemadmodum etiam reliqua animalis membra desiccare consueuerunt. Qui enim laboriosam uitam degit, assidueque circa marinas aquas uersatur, aut bituminosas, aut aluminosas, aut sulphurentas, quicunque pharmaca assumit hanc habentia naturam, facillime exiccatur. Porro ubi humida affectione splen fuerit detentus, atque ea amplius inualuerit, in tantum eius incrementum facit, ut etiam uentrem perstringat ac hepar. Consueuit autem humida dispositio circa ipsum consistere ab immodice humectantibus, diætā, & exercitio, aëreque & locis. Oboriri solet & his qui circa palustres regiones frequenter uersantur. Amplius autem & humidus morbus præcedens, hanc adfectionem producit: aquæ item largior potus, & holera humectandi ui prædita. Species quoque doloris unā cum prædictis signis instantem intemperiem demonstrabit. In calida enim & frigida intemperie dolent. Minus uero, aut nihil omnino, in humida: minimum uero in sicca. At uero ex prædictis coniecturam facere licet compositarum in ipso splene intemperierum. Ferè enim in totum ubi calida intemperies fuerit intensa, sicca eam consequitur: & ad frigidam inueteratam humida comitatur. Quandoquidem autem & humores in splenem confluentes, tumores produciunt: eorum quoque diligentem considerationem facere oportet, quales nam sint tandem, atque id non solum ex prædictis iam dispositionibus est faciendū, sed ex his quæ iam dicuntur. Bilioso enim fluore existente, uniuersum corpus calidius apparebit, etiam si non adsit febris, oculique & urinæ per bilem colorata: siccitatem semper accusabit æger, & de sid conuerteretur ac biliosus infestante, cibum fastidit, & uigiliis infestatur, & frigidam desiderat unā cum hoc quod linguam subflauā habet: exacerbationes tertianæ sient: suntque ipsi ægri moribus iracundi, & qui præcipitanter excandescant. Si uero atræ bilis sit fluor, materiæ ipsius atræ bilis scilicet, color tum in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit: & appetentia aderit ciborum: moesti ac subtristes ægri sunt, reliquaque atræ bilis signa eis adsunt: exacerbationes uero quarto quoque die affligent. At uero ubi pituitosus humor in splenem deferatur, consimilis pituitosis aderit color, ægrique minime sicient, & cibum appetent, nisi salsa fuerit pituita: tunc enim cibū fastidiunt ægri, poculorumque magis sunt appetentes: quin & coloris

cutis

cutis nitentis species demonstrabit tibi pituitosum esse humorē: & quod singulis diebus exacerbatur, urinæ quoque pituitosæ sunt: ipsi uero ægri secundū mores pigri sunt & segnes. Quidam uero ex eis qui frigidam affectionem habent, magnum & durum splenem acquirunt, atque ubi parum saltem consuetū edendi horam fuerint transgressi, & impasti manserint, dolore affliguntur, propterea quod neque plenum, neque firmantem, neque sustentantem ipsum habeant uentrem, quicquid amplius ob inēdīam refrigeratur, & concalescentia opus habet. Quod si sanguineus existat in splenem confluens humor, possibile est ipsum colorem tum iuxta linguam, tum circa cutem permurari: inter appetentiam autem ciborum & fastidium medio quodam modo habent ægri: reliquisque magis languent, etiam si non parem uisceris tumorem habeant. Venæ autem uniuersi corporis, sanguine plenæ apparent, & urinæ subsuluzæ.

Intemperierum splenis cura. Cap. VIII.

In uniuersum quidem igitur splenis intemperies ferè circa tumore siunt: eas autē tum per cibos ac potus, tum per simplicissima pharmaca ac fomentorū irrigationes quæ intemperiei contrariæ sunt corrigere oportet. Calidæ intemperiei cura. Calidam itaque intemperiem curabis per irrigationis usum ex rosaceo, aut melino, & per simplicia ex his composita cerata. Amplius autē & per uiræ acerbæ immaturæ succū & portulacam, & pampinos uitis, ac cōsimilia. Cibis uero & potibus utendum, quibus calida intemperies castigatior reddatur, lauacris etiā temperatarum aquarum. Quod si pharmacorū usu opus sit, rumicis acuti semen in potu exhibeatur, aut radicum, aut foliorum eius decoctum: aut plantaginis, similiterque limonij, quod cynoglossum appellatur decoctum. Sunt autem hæc in posca diluta coquenda. Frigidæ intemperiei cura. Frigidæ in splene intemperies sanant irrigationes, & unguenta, ac cerata, itemque epithemata, quæ moderata calefaciēdi facultate prædita existunt: uelut est unguentū nardinū & cyprinū ac gleucinum, & cerata ex eis cōflata. Poteris & epithema pentamœxon appellatum, cum modica cera liquefactum adhibere. A balineis in principio abstinēdum, nisi quid obster: cibi & potus moderate calefacientes exhibendi. Quod si medicamentis opus sit, conuenit eis calaminthæ, pulegij, scordij, trifolij, uiticis, ac simillū decoctū. Exhibēda etiā rumicis acuti radix, aut semen. Humidæ intemperiei medela. In humida splenis intemperie optimum pharmacum habebis salis florem, siue per se solum, siue cum aliquo simplici cerato imponere uelis. Solus enim calefactus & aliqua uesica exceptus, spleni adhibetur. In epithemata quoque ammiscetur, quemadmodū est prædictum. Quin & falgus & spuma salis, cum cerato aliquo ac modico aceto permixta, commodū pharmacum erunt ad humidæ splenis affectionem. Proderit & quinquefolij radix, & plantago sicca, & alumen scissile in testa exustum. Poteris etiā ex plantaginis folijs, radicibusque quinquefolij, & spuma ac flore salis, parī uel imparī modo permixtis, sufficienti affuso aceto, & pice sicca in posca liquefacta, exceptis, cera itē alba, ammoniacūque thymiamate, ac modico rosaceo, ammixtis, pharmacum usui referuare. Melius autem compositionem facies, si & salicis succum addas, hic enim cum

uno aut altero ex prædictis permixtus, efficacius pharmacum reddet. Eius autem collectio facile contingit, Lacrymam enim arbor incisa emitit. Conuenientissimæ autem his sunt fricationes, quæ discutiendi facultatem habent. Siccæ intemperiei remedia. Siccam splenis intemperiem balineum dulcū & calidarum aquarum curat: inunctio item ex oleo dulci. Cibi citra refrigerationem humectantes, uelut est prisanæ succus, & post eum qui ex halica est acceptus. Irrigationes forinsecus profunt ex rosaceo, & cerata itidem ex eo apparata.

De splenis inflatione. Cap. IX.

Quum inflatio circa splenem est, tumor loci consequitur, qui imposita manu ad tactum cedit, & distensio nem loci infert. Verum inflatio ipsa aut in uentre oborta ad splenem transfertur, aut in ipso adeo splene generatur. Ventosa igitur flatus generatio ex frigiditate membrorum ipsum producentium contingit. Quare tum uentrem, tum splenem concalescere oportet, præsertim his quibus utrunque membrum est affectum: atque id tum his quæ forinsecus imponuntur, tum cibis ac pharmacis quæ intra corpus deorantur, persciendū est. Vētri itaque auxiliabimur, si quidem per consensum sic affectus, distoluitur confectionem exhibēdo, atque etiā alias quæ huic similes existunt. Panis uero ac edulia, uinumque quod in potu sumit, ex petroselino, aniso, cumino, ac fislone, similibusque cōspargenda sunt. Foris autem epithema ex seminibus quod paulo post referetur, imponendum. Hæc enim pariter utrique uisceri auxiliatur. Proprie autē inflationes splenis dissoluere solent, tum ea quæ iam dicta sunt, tum uiticis semē torrefactum, & melanthium, serpillumque & thymus, pulegium, origanū, rutæ semen, Pelecini autem semen & stomacho gratissimū, & omnibus uisceribus aptissimum est: si militer & rheon ponticum, & scordium. Hæc enim unā cum hoc quod stomachum repurgant, etiam hepari profunt, neque stomacho molestiam inferunt, ceterum unumquodque horum & per se, & alijs commixtum exhiberi potest, in posca decoctum, aliquādo autem & mel eis adijciēdum. Porro quæ his fortiora sunt, ea uitare oportet in his, in quibus uenter per consensum cum splene est affectus, maxime si inflatio sola inflet: quæ enim his præstantiora sunt, spleni in scirrhum indurato conueniunt, ubi uero solus splen infletur præter uentris læsionem, epithema ex seminibus in principio est imponēdū. Postquam autem flatus crassities fuerit attenuata, ammiscenda sunt ei ea quæ noxam depellere possunt, qualia sunt epithemata ex alumine & sulphure apparata, quorum compositiones paulo post dicentur, ubi de spleni in scirrhum indurati tractabimus cura. Epithema ex seminibus: Asclepiadæ. Epithema quod Asclepiades ex seminibus composuit, hoc est, quod ad aquam inter cutem prosperè accommodatum pharmacum existit, & ad omnē inflationem conducit. Cardamomi, meliloti, herbæ sabinae, baccharum lauri, nardi celtici, farnaculi, iridis, radicis panacis, radicis cyperi, nitri, cassiæ, foeni græci, seminis apij, anisi, thuris, singulorum drachmas xxv. styracis quadrantem, myrrhæ quadrantem, terebinthinæ libras ii. ceræ libras ii. ammoniaci thymiamatis lib. i. mellis optimi lib. i. olei cyprini lib. i. uini quantum satis est. Facit & ad stomachi & splenis inflatio-

nes, itemq; hepatis: estq; omnino pharmacum magni faciendum.

De splenis inflammatione. Cap. x.

In splenis inflammatione uenae incisio adhibeatur, si nihil id fieri uideatur: uenter etiam per clysterem assidue eluatur, & maxime si uenae incidendae medela relinquatur. Quocumq; autem tempore siue per uenam inflam, siue per clysterem euacuamus, semper aliquid ad stringendi facultate praeditum spleni imponemus, in principio praesertim, quum differimus euacuationem: quo id quod influit reprimatur, & quod influxione sua praeuenit, a loco depellatur: atqui & ad splenis firmitatem conseruandam utilis adstringendum sylua existit: quae quidem robusta sint, ubi fluoris impetus foris cōtingit: moderata uero, ubi mediocris. Cognosces autē irruentis humoris magnitudinem, ex magnitudine & uelocitate generationis ipsius inflammationis. Itaq; si moderata fuerit inflammatio splenis, uinum uetus ac austerum tenuiumq; partium oleo dulci permixtum & lana succida exceptum imponemus. Si uero maior sit caliditas, rosaceum sit oleum, aut lentiscinum: quae si non adsint, oliuae folia, aut rubi, aut mali arboris in oleo decoquantur, atq; ipsa etiam mala, in decoctione etiam quaedam tenuium partium addantur, uelut est absinthium & pulegium. Quod si forti impetu fluxus feratur, acetum pro uino affundendum est. Post irrigationes ad cataplasmata transeundum. In quorum compositione hordeacea & loliacea farina assumantur, cum posca & mellis ac olei paucissima omnino mensura, in quibus absinthium ac pulegium sint decocta: aliquando & myrobalani infarciendi. Optimum & hoc est. Hordeaceam farinam & salicis folia cum aceto imponito, adipe caprino in aceto colliquato: uerum mellus redditur cataplasma, si caricę adijciantur. Optimum autem est & ex lini semine cataplasma, maxime ubi affuerit dolor. Accipitur autē seminis lini pars una, farinae loliaceae pars una, adipis taurini in aceto & sapa liquefacti, cuiq; deinde oleum cyprinū, sit affusum, quantum his subigendis satis est. Ceterum cauēdū ne locus post irrigationes & cataplasmata denu-detur, sed ubi haec fuerint ablata, mox ceratum ex cyprino aut nardino unguento imponatur. Commodum est autem feruentibus inflammationibus Nilei aut Nilii epithema, cum cerato chamaemelino & aceto emollitum: idoneum est etiam Philagrii stomachicū epithema: sunt autem ea integra ad stomachicos descripta, utimur autem aliquando, ob cataplasmatum penuriam, ad splenem inflammatum, fursuribus in uino, aut posca & oleo decoctis: quibus etiam absinthium, & pulegium, aut thymum, aut origanum, aut lauri folia, aut artemisiā, & reliqua incidendi ac attenuandi uel praedita adijcimus: non feruente uidelicet inflammatione, & corpore praeuacuato. Si enim corpore non euacuato, quis calidioribus utatur, ipse sibi scirrhi autor fiet. Quod si ad permutationem in suppurationē ipsa splenis inflammatio repat, quod tamen raro cōtingit, adiuuare eam oportet, ne plura corpora putrescant, per cataplasmata uidelicet quae pus producant: de quibus in hepatis abscessu manifeste est praedictum: hepar enim frequentissime abscessum perfert ac exulceratur. Quare ex his quae de hepate diximus, ad splenis curationem exempla transsumes.

Cura splenis in scirrhum indurati, Galeni. Cap. xi.
Iam antea praedictum est, splenē quā celerime solere in scirrhum indurari, sanguine circa splenitides in ipso uenas obturato, ut neq; excerni, neque digeri ob crassitiē facile possit. Quare attenuantiū pharmacorū usu opus habet, citra tamen manifestam caliditatem: ne uehementius inspissetur crassus humor in eo obturatus. Ammiscendum est autē eis quippiā ex adstringentibus & austeris, quo ipsius actio & robur conseruetur. Si enim praedebilitate feculentū & atrae bilis humorē, ex hepate, quemadmodum consuevit, non attraxerit, uisiosum humorem uniuerso corpori affricabit. Immedicabilia enim ulcera hoc modo affecti habebunt, & maxime circa crura, & colorem corporis uitiatum ad nigredinem uergentem. Diutius autē durante malo etiam aquam inter cutē incurrunt. Ob id igitur in ipso splene naturalem firmitatem custodire oportet, quo conueniens sibi alimētum attrahat, & sanguinem repurget, superfluaq; in ipso generata recrementa ad uentrem demittere queat, quae postea cum ciborū recrementis excernuntur. Ad hanc itaq; rem amara ipsi spleni offerimus, quibus aliquando ex austeris quippiā ammiscemus. Amara quidem ut humoris crassitiem secent ac repurgent: austeri autē ut robur & firmitatē eius conseruent. Quale uero pharmacū hepatis est absinthiū, tale existit spleni capparitis cortex. Et quale est hepatis eupatorium, tale spleni est scolopendrium. Similibus enim secundum genus pharmacis utraq; uiscera opus habent. Verum splenē tanto fortioribus indiget, quanto crassiore uisitur alimento. Caeterum a ueteribus plurima potabilia pharmaca ad induratum lienem sunt descripta. In curando autem animaduersionem habere oportet, num curandi aegri uniuersum corpus frigidius sit, an calidius, nū humidius, an siccus. Eis igitur qui corpora natura habent calidiora, citra molestiam myricae folia dantur, uirgultaq; & radix: scolopendrium item, & rumicis syluestris, maxime uero acuti semen, foliaq; & radix: optime autem facit radicis uiridis contusae succus cyathi unius mensura potatus. Probe facit & lycapso, quae & anchusa appellatur: danda autem radicis eius drachma una, aut cacumina hederæ tria, aut folia eius, uel etiā radix: item polytrichon, & capni, quod chelidoniū uocatur, decoctum ad tertias reductum, folia salicis & cortex, itemq; radix limoni, quod & cynoglossum uocatur: folia & radix, & semen quoque peledni. Haec enim neq; uehementem in se habent caliditatem, neque si calidior temperatura adsit, ei molestiam inferre solent: quapropter his tum ad praedictos, tum ad reliquos utēdum in principio adfectionis: a mioribus enim auspicari oportet. His autem efficaciora sunt, quae in ueteratis scirrhis conducūt, & corporibus agrestiorib. & qui omnē corporis habitū habent frigidiores: trixago, gentianae radix, calamintha, pulegiū, & cyclamini radix, scordiū, trifolij bitumen olētis semen, hyperici coma, acori, asari & eryngij radix, uiscis semen torrefactum, centaureae maxime minoris succus, etiā si sit exsiccatus, chamaepitys, polium, lonchitidis radix, anagallidis quae caeruleum habet florem succus, glycyfides aut paeoniae, itemq; dracunculi radix tum uiridis, tum siccā. Aliud. Carol ex terra suscepti, radicis rubie, bryoniae, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; drach-

chmam unā, horum unumquodq; aliquando tritū ex posca datur, aliquando autem decoctum eorum præbetur: quod si sicca dare uelis, sufficit drach. plus minus unam exhibere. Conducit item hoc. Ammoniā thymiamatis sextantem, castorij unciam i. contrito, & drachmā i. ex posca aut aceto mulso præbeto. Aliud. Scillæ assatæ drac. i. corticis radicis capparis drach. i. præbe ex posca, uel aceto mulso. Mouet enim crassos & uiscosos humores; inquit Archigenes: aliquando & cruenta non per urinas tantum, sed & per uentrem educit. Aliud. Thuris obolos duos, seminis foeniculi cochlearium unum, præbe ex uino. Aliud Marciani, præsens remediū: quod etiam si sit induratus, citra dolorem ipsum laxiorem reddit, ut neq; significationē, neq; etiam suspensionem suffusionis aquæ inter cutem relinquat. Seminis uiticis cōtusi & cribrati per angustissimū cribellum dra. v. his qui perfectæ sunt ætatis ex posca bibēdas præbe. Aliud eiusdem, ad splenem & hepar indurata, & principium aquæ inter cutem, & ad alui, & intestinorum, ac stomachi inflationem, simplex & periculo uacans. Bryoniæ radicem contusam & cribratam, repositam, ab aëre & uento intactam, ne quid inde transpiret, adserua; & pro uiribus ægri præbe. Perfecta mēsurā exhibitionis est cochlearium unum, hydropicis quidem & splenicis ex posca; hepaticis ex hydromelite aut uini dulcis cyathis tribus. Pastillus ad splenicos, Asclepiadæ: liquefacit splenem, ut multo experimēto cōstat. Seminis ericæ drac. viii. piperis albi drach. iiii. spicæ nardi drac. iiii. ammoniaci thymiamatis drac. iiii. scolopendrij drac. ii. costi drach. ii. cum aceto scillitico subigito, & drac. i. cum aceto mulso aut posca præbeto. Conuenientissimum autē spleni in scirrhu indurato remediū existit ferrum aqua, aut uino, aut posca extinctum. Ea ipsa enim aqua, aut uinū, aut posca in principio exhibita iucūda & utilissima existunt, & per plures ex ordine dies dantur. Itaque febrientibus aquam, aut poscam dilutā præbetor: eis uero qui teneram carnem habent ac febre carent, uinum: Sic autem ferrum quod in ipsis extinguitur stomioma. Ipsi autem stomomati ferri squama, (quam in fabrilibus officinis ferrum dum ignitur & malleo tunditur, abijcit) postea agrestioribus hominibus utiliter exhibetur. Præclare enim hæc splenem liquefacit, utpote quæ consumendi facultatem præstat, quare aliarum rerū complexu opus habet, ne inde stomachus male afficiatur. In calidioribus igitur tēperaturis, pelecini semen ei ammiscere conuenit: aut si id non adsit, scolopendrium: aut si neq; hoc haberi possit, absinthij comam, aut rumicis acuti radicem aut semen. In frigidioribus autem temperaturis, ad squamam ipsam, cassiam, aut amomum, costum, anisum, aut serpillum mōtanum, & similia addere oportet. Quanquā tum in his, tum in omnibus pelecini semen maxime cōueniat. Omnia autem nūc dicta, itemq; ea quæ paulo antè sunt relata simplicia pharmaca, in principio cum posca diluta coquantur, postea uero etiam meraciore. Progressu uero temporis etiam ipsa contusa & cribrata cum aceto aut aceto mulso exhibentur. Verum certam uniuscuiusq; horū mēsurā definire difficile & periculosum est, quū diuersæ eorū qui ea accipiunt sint naturæ: quare in principio parū quid ex uno-

quoq; exhibendum, & pro ratione deinde exhibitionis mēsurā augenda, iuxta ipsius pharmaci, atq; etiam ægri uires. Omnia igitur prædicta quomodo cūq; tandem potata, aut semel saltem deglutita permanere solent: uerum glans unguentariorū, quā myrobalanon appellant, nisi cū posca bibatur, facile uomitu reijcitur. Licet igitur singulis prædictis simplicibus pharmacis per se uti, & duo item uel tria aut quatuor, permixta æqualiter uel inæqualiter præbere. Ex compositis autem ferè pulcherrimū est, id quod ex osibus constat, ad podagricos descriptum Philagrii pharmacum. Efficax enim reperies ipsum, inquit Philagrius, & conuenientissimum ad omnia splenis uitia, præsertim cum tumore magno & duritia oborta. Sensibiliter enim huiusmodi affectionibus auxiliatur: utpote quod ui sua emollit & concoquit, ampliusq; diffundit & purgat, ultra hoc quod paulatim discutit & resiccat. Est autē tum gustui, tum odorati suauissimū, maxime si plurimō despumato melle mixtum, delingendum præbeatur. Secūdo autē loco inter ea quæ ego noui est & hoc, inquit Philagrius, ipso sanè usu probatum. Corticis radicis capparis drach. vi. foliorum myricæ drachm. vi. squamæ stomomati ferri drach. vi. myrobalani drac. x. aut vi. ammoniaci thymiamatis drachmas viii. seminis pelecini drach. v. stoechadis drach. iiii. comæ absinthij drach. iiii. scolopendrij drach. x. Excipe aceto & informa pastillos, ac exhibe drach. i. ex posca aut aceto mulso aut uino. Hoc itaq; robustū est pharmacum, ut etiā ad duriora corpora quadret. Aliud eo imbecillius tale est. Pulegij drac. xii. radicis rumicis acuti dra. vi. seminis eiusdem drac. vi. capnij iuxta sepes nascentis sicci dra. vi. pelecini drach. iiii. scolopendrij drac. iiii. spicæ nardi drac. ii. rhei pontici drac. i. corticis capparis drac. ii. Excipe aceto ac redige in pastillos, exhibeq; drach. i. quæadmodum in præcedenti dictum est. Pastillus ad splenicos, splenē liquefaciēs: Asclepiadæ. Seminis ericæ drach. iiii. piperis, ammoniaci thymiamatis, spicæ nardi, culusq; drachm. ii. Quidam etiā costi drach. ii. & scolopendrij drac. ii. Arida contundito & cribrato, ammoniacū in aceto dissoluito, ac simul in pastillos digerito: ex quibus drachmā unā cum aceti mulsi cyathis iiii. propinato. Qui huius pharmaci compositionem docuit, per tridū hoc suis catulo se exhibuisse dixit: postea ubi catulū dissēculisset, ipsum sine splene repertū. Aliud, ad spleneticos & hydropicos, quod optime urinam ciēt, & uentrē emollit: Archigenis. Scillam magnā luto oblitā assato, deinde repurgatē internæ libras ii. accipito, dauci unc. i. anisi, fœelis, radicis panacis, iridis, culusq; unc. i. seminis urticæ sextantē, cēdridum, hoc est, fructuū cedri sextantē, myrrhē dra. iiii. farinæ erui unc. xvi. cū uino informa pastillos, & præbe dra. i. cū aceti mulsi cyathis iiii. Aliud, Radicis panacis, ammoniaci thymiamatis, corticis radicis capparis, radiculę scillæ assatę internę, æquales omniū partes cōmitte, & obolos tres aut quatuor præbe: cōducit anhelosis & hydropicis. Pastillus summæ utilitatis. Cacuminū hederæ nigre drac. ix. spicæ nardi drac. v. seminis rutæ syluestris dra. iiii. castorij dra. i. iridis dra. vi. Cū succo uerbenacæ rectę pastillos iformato, & p. qnq; dies mane dra. i. ieiunio ex uino ueteri præbeto. Mouet urinas cruētas.

Atq; haftenus quidem de pharmacis potabilibus. Cæterum ad splenem in scirrhum induratum etiam sanguinis detractionem commodam esse scimus, quæ inter paruum sinistrae manus digitum, & eum qui medio proximus est, sit facta. Quidam autem uenam retro sinistram auriculam sitam diducunt, inquit Archigenes, & ex profluente inde sanguine splenem illinunt, ac magnum commodum sentiunt. Idem etiam hepate affecto faciunt, incidentes retro auriculam dextram uenam. Quare neq; absurdum fuerit etiam his auxilijs uti: animaduersione tamē habita, ne arteriam pro uena disseceamus. Nos autem in his qui multo sanguine abundāt, inferiorem in sinistro cubito uenam secare consueuimus, uerum & hic cauendum ne subiacentem arteriam simul disseceamus. A uenæ incisione, etiam cucurbitulae spleni affigendæ sæpe & cū scarificatione, extrahēdusq; per ipsas plurimus sanguis: quin & hircudines summa commoditate in ipsum splenis locum affiguntur. Locis etiam amplius per spongiam acidam muria imbutam fouendi, furfuribus quoq; in aceto decoctis, absinthij coma, ac pulegio, & lauri folijs, similibusq; adiectis. Quidam autem lapidem molarem aut gagate longitudine octo digitorum, & latitudine sex digitorum, secundum crassitudinem leuem, igniunt & aceto adspargunt, panniculoq; in aceto calido madefacto circumposito, locis imponunt, & quam diu calidus sit, incumbere sinunt, atq; huius fomento testimonium præbent, inquit Archigenes, tanquam quod insensibiliter deprimat tumorem. Post somnata ad cataplasmata transeundum, ex farina ordeï ac lolij, absinthij coma, myrobalano & althææ radice, cum aceto mulso. Aut panem aridum cum capparis cortice, & myrobalano contusum, cribratum, & cū aceto mulso decoctum imposito. Optime facit & stercus caprinum cum farina ordeacea ex posca cataplasmate impositum. Lupinorum item farina ex posca, & fabarum eodem modo. Cinis quoq; ex officina fabrili, & bryoniae radix cum caricis, aceto, & cyclamino, eodem modo. Brassica etiam syluestris cū melle imposita auxiliatur. Similiter & folia isatidis, & marrubiū cum ordeacea farina ex posca. Cardamomum cum caricis. Cyclaminus cum caricis ex aceto decocta. Cataplasma optimū. Fœni graeci trientem, farinae ordeaceæ quadrantem, cardamomi unc. i, caricarum pinguium lib. i, uerbenacæ herbæ unc. i, ficus in aceto acerrimo macerato, fortiterq; in mortario cōtundito, reliquisq; adiectis ac simul unitis utitor. Optimū cataplasma & hoc est. Seminis raphani partes ii, foliorum salicis partem i, farinae araci partes ii, seminis pastinacæ partes ii, in aceto cū pari sapæ mēsurā decoquantur. Aliud, ad inueteratum malum, & corpora dura. Corticis radicis capparis, radicis struthij, sinapis recēsis, omnium æquales partes, farinae tritici duplum ad omnium trium mensuram. Vtere uelut prædictis. Aliud præclarū ad duritias. Stercus gallinarum album, siccum, cōtusum, ac cribratum cū aceto mulso decoquito, confidenterq; imposito. Vnguentum optimū. Ammoniaci thymiamatis, thuris, foliorū rutæ ulridium, sing. æquales partes cum aceto contere, & quam crassissime illita exlicari permittite. Aliud, quod antea quam medeatur non abscedit. Ammoniaci staterem i, thuris staterem i, piperis staterem i,

Ammoniacum cum aceto contere, eodemq; etiā reliqua modo. Aliud. Ammoniaci staterem i, acaciæ staterem i, aloës staterem i, thuris stateres ii. Apparatur autē hoc modo. Ammoniacum & aloē ac thus in aceto macerato, acaciam autē contundito, cribrato ac prædicta cōtrita omnia ammisceto. Croco magma etiam utiliter cum aceto illinitur: sæpe enim nō abscedit priusquā medeatur. Ceterū epithematū medelę magis fidendū. Pleraq; enim eorū quę in medicamentarijs libris referuntur ex alumine & sulphure cōposita, prædominātem habent adstrictoriā facultatem. Quare in eis animaduersionem habere oportet, non modo simpliciter facultatis eorū pharmacorū quæ ammiscentur: uerū etiā quātitatis ipsius mixturæ. Etenim in plagis quæ flatuosum habent tumore, & maxime in quibus tumor latus est, nihil peccaris, etiā si plurimum ex aluminosis adieceris. In tumorib; uero in scirrhum induratis emollientem & diffusoriā facultatem præcellere oportet, quib; parum quiddā ex adstringēte sit admixtum. Vnū igitur ex simplicibus & naturalib; ac nulla arte apparatis, diffusoriæ & adstringentis simul est facultatis, ipse uidelicet salis flos, qui splenē in scirrhum induratum sanat, inquit Galenus, calidus in uesicā bubulam cōiectus, & forinsecus impositus. Oportet igitur medicū ad affectionē respicere, & pro eius ratione tum addere, tū adimere ex eis quæ in epithematū cōpositionē cōiiciuntur, uelut exempli grātia, si duriciem emolli re uelit, ammoniacū & bdellium pingue, ac styracē optimū equaliter uniuscuiusq; drac. iiii, ammiscere debet. Si uero crassos humores disseccare uelit, opopanax & costi tantundē addet. Quum autē humores diffunduntur, etiā diffusoria ac digerentia sunt ammiscenda: aut stercus caprinū in aceto dilutū addendū. Hoc enim & crassitudinem dissecat, & simul discutiendi uim habet. Quod si discutere tantum uelit, humoribus uidelicet antea sufficienter attenuatis, nitrū pro stercore caprino ammiscet. Capparis autē cortex ammixtus ultra hoc quod dissecat & repurgat, etiā splenē corroborat. Habito igitur ad ea quę ubiliter accidunt respectu, aut emollientia augebis, aut attenuantia, aut etiā ea quæ discutiunt & robur addunt. Optimum autē epithema emolliens & diffusoriū hocce est. Ceræ quadrantem, propolis sextantem, galbanū dra. iiii, opopanax dra. iiii, Vtere: cōtunditur hoc pharmacū, & strumas recentes, omnemq; duriciem recens obortā dissoluit. Aliud malagma Asclepiadæ, quod articulos incuruatos relaxat. Bdellij pinguis, adipis uulturni, ammoniaci thymiamatis, tritidis, cuiusq; drac. xvi, opopanax, galbanū, thuris, canchryos, styracis, cuiusq; dra. viii, piperis grana c lxx, ceræ dra. xlviii, fecis olei irini sextantē ac unciæ dimidiū, uini quantū satis est. Arida cōtundito, & cribrato. Ammoniacum, opopanax, thus, bdelliū in uino dissoluit, liquecibilibus autē liquefactis, adfusus, ac simul emolliis utitor. Extreme emolliēdi facultate præstat hoc, inquit Galenus, neq; enim aliud magis eō emolliēs repereris: quod si irini olei inopia sit, cyprino aut sicyonio eius loco utor. Aliud malagma Amythaonis, ad præcordiorū distensiones: cōducit & articulis qui difficulter mouentur, omnemq; duritiē dissoluit, & priore quidem minus emolliit, magis autem digerit ac discutit. Cōpositio sic habet. Ammoniaci thymiamatis drac.

drach. x x x vi. ceræ dra. x x x vi. terebinthinæ drach. viii. bdellij dra. viii. myrrhæ dra. iiii. thuris drac. iiii. galbani drach. viii. olei cyprini sexuncem, Myrrham, bdellium, thus, uino præmacerata conterito: ammoniacum in aceto dissoluto: liquecibilia autem liquefacito, affundito, ac utitor. Aliud prædicto longe efficacius, & fortius, inquit Philagrius: discindit enim & attenuat inspissatos humores, & uiscosos repurgat. Habet autem hoc modo. Malagma Asclepiadæ. Ammoniaci thymiamatis sexuncem, galbani, myrrhæ, cuiusq; sextantem, ceræ sesqui libram, thuris quadrantem, opopanax quadrantem, radicis panacis sexuncem, propolis quadrantem, acetii sextarios ii. stercoris capræ quadrantem, Ammoniacum cum aceto terito, deinde etiam thus, galbanum, opopanax, & myrrhā. Propolin autem cum modica cera in mortario tundito: ceram uero cum olei triete liquefacito paulatim donec cogatur decoquendo, & deinde propoli adiecta, ab igne tollito, percolato, ac frigesieri sinito, perpolitacq; tritis adiecto, unito, ac utitor. Cæterum epithema quod ego composui, inquit Philagrius, optimū ad diuturnas & frigidiore affectiones existit. Myrobalani drac. xlviii. ammoniaci thymiamatis dra. xlviii. bdellij drac. xlviii. scythicum uero bdellium maxime probo, corticis radicis capparis dra. xlviii. mannae dra. x x iiii. opopanax dra. viii. styracis drac. iiii. uisci drach. xii. ceræ drach. x x iiii. floris salis drach. xlviii. Ammoniacum cū salis flore dissoluet: capparin uero, myrobalanum ac mannā cum aceto: reliqua autem iuxta ignē emollito & in mortario cūditto, & trita eis adiecto, unito, ac utitor. Hoc pharma cum splenem consumit. Aliud. Verbenacam uisridem cum manna terito, atq; axungia suilla ueteri excepta imposito. Dura enim corpora & diuturno malo affecta quam maxime inde iuuantur: reliqua uero integre sanat. Prodest etiam uerbenaca per se imposita, itemq; trixago. Aliud epithema Asclepiadæ, ad splenicos, consumit tumores. Foliorum sambuci tenerorum lib. iiii. aloës pinguis lib. i. cum aceto terito ac lenito, linteoloq; excepta imposito. Verum si malum recens est, uiscusculusq; par pondus coniuncto. Aliud. Seminis ericæ libram i. galbani lib. i. Semen contusum & cribro excussum galbano excipito, rursumq; tundito olei irini fece addita, quo malaginatū formam acquirat, & linteolo inditū imposito. Vniuerso autē uiscere, recrementisq; eius, atq; meatib. oportunis, per emollientia, repurgantia, dissecantia, attenuantiaq; & diffundentia humores, ampliusq; etiā per ea quæ uias dilatant, tum in potu accepta, tum foris imposita preparatis, efficacius euacuare potētib. est utendū, ac primū quidē simplicioribus, postea uero etiam fortioribus, ueluti exempli gratia: primum quidem epithymi drachmas iiii, cū seri lactis heminis v. præbeto. Dato autem eis epithymi drachmas iiii. tenuissimè tritas cū modico sero, atq; ubi uenter operari inceperit, serū per se paulatim absorbendū exhibeto. Cæterū post aliquot dierū interstitiū, ubi uires recollegerint, hieram Archigenis ex colocynthide præbeto, aut quæ Iusci appellatur. Post horum autem omnium usum, farinæ tenuissimæ radicis cyclamini siccae drac. iiii. aut iiii. ex aqua mulla dato, atque quo sudorum exclusionē iuues, egrū uelamentis cōtegito, & in lecto

cōcalefacito. Epithemata discussoria & resiccantia. Postquam corpus fuerit repurgatum, epithematis quæ digerere siue discutere & resiccare possunt, utē dum, qualia sunt quæ ex auripigmento & alumine componuntur: ex quorum numero est etiam id quo ego, inquit Philagrius, utor. Ceræ tyrrhenicæ drach. x c iiii. resinæ pinus siccae drach. x c vi. resinæ pinus liquidæ drachmas x c vi. auripigmenti drac. xvi. aluminis scissilis drach. xii. Metallica terito, & liquecibilia cum modico oleo liquefacito, ac refrigeratis sicca adiecto, unito, & utitor. Aliud aurei coloris. Asclepiadæ, ualde pulchrum. Ceræ libras duas, resinæ pinus siccae libras duas, auripigmenti sextantem, aluminis scissilis sextantem, calcis uiuæ undam unā, olei cyprini undas sedecim, acetii uncias sedecim. Aliud, ad splenicos & hepaticos. Aluminis liquidū, sulphuris uiui, nitri, ammoniaci thymiamatis, mannae, radicis capparis corticis, singulorum sexuncem, picis libram unam, resinæ pinus siccae libram unam, olei cyprini sexuncem, acetii quantum sufficit. Aliud epithema hepaticum, Ipoeritū appellatum. Resinæ pinus siccae libram unam, ceræ libras duas, picis libras duas, aluminis liquidū, nitri, sulphuris uiui, mannae, cuiusq; libram unā, aloës sexuncē, pyretri, aristolochiæ longæ, bdellij, ammoniaci thymiamatis, amomi, uisci, cardamomi, olei, cuiusque quadrantem, acetii sesquisextarium. Ammoniacum, alumē, sulphur, nitrum, cum aceto diluta terito: reliqua uero arida quidem contundito, ac tritis admisceto: liquecibilia autē liquefacito, atq; reliqua cum eis excipito. Optime faciunt & ex caprino stercore apparatus: item plurima eorum quæ ad hydropicos sunt descripta: & Machæritonis emplastrū, & emplastrum ex rumice, quæ in decimo quinto Sermone referuntur. Phoenigmi, cutem rubefacientes. Efficaciter autem in ipsis phoenigmi auxiliantur: tū qui ex sinapi apparantur, tum qui eis cōsimiles existunt. Cæterum corpore prius à superfluis humoribus euacuato, eos adhibere oportet. Pulcherrimus autē phoenigmus talis est. Phoenigmus Asclepiadæ authemeros, quasi eodē die auxilians inscriptus: qui sanē ab uniuerſa affectione liberat. Pyretri dra. octo, myrobalani, cardamomi, seminis urticæ, pipēris, cuiusq; drac. octo, sinapis trientem. Omnia conterito, & aceto subigito, & tepēfacta ex intervallo per horas tres imposito, si saltem tamdiu sustinere possit: deinde ablato pharmaco lauari præcipito, in feruentioris solij defessu. A balineo autem cerato ex rosaceo apparato utēdum. Alius. Lepidij folia trita cataplasmatū modo imposito, atque ubi morsum sentiūt, in balneum inducito, & ablato pharmaco, in feruentem aquā immittito & perfundito. Difficulus enim ferunt nimīā mordacitatem. Sanī autem exeunt, inquit Archigenes. Idem remedium & ad cōxendicum dolores efficacissimum reperitur. Summe etiā auxiliantur myrobalani cortices & nitrum. Nitrum per se terito, & parum acetii ammisceto, deinde resinam ac ceram cum pauco oleo liquefacito, affundito, emollito, ac utitor. Cæterum quod operæpreclū est cognosse, fortia pharmaca non nisi corpore prius à superfluis humoribus repurgato, & probe cōcoquēte, adhibere oportet. Smegmata, siue repurgatoria. Oportet autem locum ipsum sensim ad phoenigmorum rubefacientium toleran

tolerantiam irritare: quod per repurgatoria smegmata commodè fieri potest. Componantur autem smegmata ex staphide sylvestri, picro, pipere, ac alcyonio, pari uel impari modo prout uidebitur coniectis. Quod si teneram carnem habeat æger, iridis, & cypersi, & herbae sabinae aliquid his ammisceris: aut farinam aliquam, ueluti erui, aut fabarum, aut cicerum. Quod si etiam odoratum reddere uelis pharmacum, calisae quippiam & philli ac amomi adde. Si uero durius contingat curandum corpus, ex pumice addes, atque adarce. Postremum autem phoenigmis ex sinapi cõsimilibusque uteris: corpore prius uniuerso à superfluis humoribus repurgato: ne uide licet uehementia caloris alia adtrahat recrementa, duriores reddat ipsum locum.

De splenicorum uisione.

Cap. XII.

Quod si prædicta auxilia irrita sint, inefficaciterque adhibeantur, ad uisionis patrociniũ cõfugere oportet: ita ut uel per cauteria, uel pharmaca crustas inuramus, & multo tempore saniem effluere sinamus: corpore tamen prius per uenarum incisionem, & purgationem euacuato. Etenim quum ferè in totum uitiatum humoribus splenicis sint referti, & non præeuacuetur uniuersum corpus, maligna ulcera ex crustis fieri cõsueverunt.

Dietæ splenicorum.

Cap. XIII.

Porrò dietæ ipsorum splenicorum tempore inflammationis simplex sit, & quæ facile concoquatur: uelut est halica lora, & ptisanæ succus, panis madefactus. Si uero inflammatio diutius remoretur, etiam auicularum carnes eis concedendæ, & pisces petrosi aquis degentes. Vbi uero schirrhus sit perfectus, dietæ attenuatoria exhibeatur, & acrum rerum comestiones per interualla. Proprie autem splenicis cõuenit caparis comesta ex aceto mulso. Vinum sit non ualde uetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum sæpe ignitum sit extinctum. Plurimum autem fiducia in exercitamentis ponendum, quibus ante cibum uti cõuenit, corpore superfluitatibus non abundante. Ex eorum autem genere ex superabundanti faciunt deambulationes et cursus: & noui sanè aliquos, qui ex his solis ab omni affectione sint liberati: gestationes etiã omnes conueniunt, proprie autem quæ sit in equo. Manifestum autem est quod uociferationes quoque oportune & in tempore assumptæ eis summe opitulantur.

Cura eorum in quibus splen frigida, uenter uero calida affectione laborat.

Cap. XIII.

Cognitu uero necessarium est, quod in aliquibus splen frigidam intemperiem habet, & ob id calefacientibus opus habet: uenter autem bile agitur, et cõtrariam spleni sustinet intemperiem: aut etiam citra priuatam affectionem, ex meatu qui bilem susceperat, flauam bilem assumit: & absque hoc etiã, sæpe ob ægram concoctionem & ciborum in uentre corruptionem splen afficitur: etenim aliquando quum frigiditatis sensus cum grauitate circa splenem percipitur, uenter biliosum uomitum reiecit: tunc equidem difficilis cura nobis instat, & quæ difficulter procedit: nimirum splene caloris forum expectet: uentre autem atque etiam uniuerso corpore refrigeratione indigente, atque id uno & eodẽ tempore. Quo igitur quantum possibile est utriusque membri affecti effugiat lesionem, pro utribus conabimur ut eos à tristitia & cura, itaque & uehementibus motibus, multa item inedia ac cibi auersione

auocemus, simulque per ea quæ citra molestiam purgant pharmaca, biliosum humorem euacuemus. Os uero uentris firmemus ac corroboremus, ne quid eorum quæ ex reliquo corpore ad ipsum influunt, susceperit. Ceterum corroboratio ipsius per ea quæ difficulter corrumpuntur, contingit, de quibus in secundo mentionem fecimus. Sermone. Suffecerit autem ipsis exhibitio modici panis cum oliuis albis aut colymbadibus appellatis, citra potum, si balneum & prandium differant, ne bilis efferatur. Melius autem est si prius quam bilis efferatur, ieiuni lauent. In prædio cibi eis præbeantur tum quantitatis tum qualitatis moderatè: uerum ut splen illæsus permaneat, conuenit primum boni succi & actu calidos præbere, ac deinde postremum tum actu tum potentia frigida porrigere, ueluti lactucam & frigidum potum, ac similia: non frigida enim frigidis præsubstrata splenem illesum ab his quæ postea ingeruntur frigidis, conseruant, ex quibus os uentris corroboratur, & calida ipsius intemperies corrigitur. Optimum igitur fuerit postremum omnium mala punica, aut etiam alia, aut pira, aut quædã quæ stomacho grata sunt acceptare: atque eodem omnino modo etiam coenam instituere. Conuenit etiam per ea quæ forinsecus imponuntur hoc modo affectis opitulari. Refrigerant autem uentrem citra nocumentum forinsecus imposita, oleum melinum & rosaceum: cerata item ex ipsidem apparatus, modica mastiche ammixta, aliquando etiã oleo addito omphacino. Calidus itaque uenter per prædicta lenitur. Ad splenem autem calefacientia adhibenda sunt, qualia sunt epithemata poliarchia appellata.

Cura Splenicorum quos tussis infestat.

Cap. XV.

Quod si tussicula splenicum infestat, similis eiusdem generis affectiones circa utraque uiscera, ueluti si contingat & splenem & pulmonem eodẽ tempore crassius ac uiscosis humoribus aut aliquo alio frigido morbo deuineri, tunc sanè podagricum pharmacum ex ossibus cõstans, uehementer utile tum spleni, tum eodem modo tussientibus existit, & antidoti quæ eis similes habentur. Si quidem igitur similes contigerint affectiones, similia remedia adhibere oportet: ubi uero diuersæ erunt affectiones, diuersis pharmacis utendum est: utpote si splen à crassis & uiscosis humoribus, & frigidis liquoribus afficiatur: tussis autem à tenui & acri destillatione contingat, si modo possibile fuerit, & destillatio non urgeat uehementè, à pharmacis fluxum cõdensantibus abstinere cõducit, ueluti est quod ex papaueris calicibus constat, itemque ex seminibus pastillus, & quæ his similia existunt. Vehementiore autem & acriore existente destillatione, & quæ periculum exulcerationis pulmonis minetur, utendum quidem ex papaueris calicibus confectio, uerum spleni epithemata attenuatoria imponantur, atque nisi magna impendat necessitas, ea quæ stupefaciunt uitanda, capiti autem aliquis ex seminibus pastillus cum aceto rosaceo ad strigmentitiam crassitudinem reductus imponatur: præstat autem ex ipsis in hoc præsertim usu, hi qui croci appellantur. Cum aceto enim & rosaceo oleo triti, & ad strigmenti spissitudinem reducti, lanaque conuoluta excepti, ac simplici impositi, tenuitatem destillationis inspissant, simulque exurentem & acrem in capite qualitatem refrigerant, tussis sedant, & somnum suum inducunt. Post hæc autem theriace per opium recens apparatus

apparata in potu accepta, tussientibus quibus simul splen affectus est, auxiliatur.

Cura eorum quibus splen in magnitudinem excreuit, simulq; durus existit. Cap. xvi.

Quidam ex splenicis immodice auctū splentem habēt, ut non solum hepar & inguina contingat, sed & ob soliditatem attollatur, vitalesq; cordis vires maximopere lædat, ac imbecillitatem inducat, utq; ex eo uniuersum refrigeretur corpus, ipsūmq; adeo hepar tenuissimum & aquosissimū in ipsis fiat, & eiusmodi quoq; sanguis. Horum sanē qui hoc modo sunt affecti curā recusare oportet: quod si cogamur tamē, à dubijs & hebetibus remedijs auspicabimur, periculo eis incumbente prædicto. Verū neq; intra corpus sumendum, neq; forinsecus adhibendum, ullum aliud quod uehemēs pharmacum offeremus: neq; euacuationem etiā coaceruatim faciemus, sed paulatim & per simpliciorum medicaminum usum. Cæterum tum per os exhibitis, tum foris admotis, & quantū possibile fuerit conuenienti diætā, uirium imbecillitate refocillata, si in melius proficere ipsos uideamus, fortioribus omnino remedijs utemur, ita tamē ut sensim aucta ipsa apponamus.

De ictero seu morbo arquato: ex libris Ruffi

et Galeni. Cap. xvii.

Icterus à similitudine ad animalculum, quod ictis, id est, uiuerra appellatur, nominatus est: est autem mustela syluestris, quæ auricolores oculos habet. Verum icterus morbus biliosi humoris circū corpus effusio est, ob secermentis eum facultatis debilitatē, quæ eum segregare & ad proprios excretionis locos demittere nō ualet. Errare autem eos credendum est qui hepatis affectionem in omnibus ictericis adesse putauerunt. Conspicitur enim sæpe, quum hepar nihil male est affectum, flauæ bilis ad cutem effusio facta in iudicationibus morborum. Cōspicitur etiā circa febrem aliquando sanguis in bilem exagritatus per corruptionem uidelicet aliquam peregrinā: qualis quoq; à uenenatarū bestiarum moribus contingere consueuit: etenim quū quispiam à uipera morsus esset, uniuersum corpus prasini siue porracei coloris habuit, & quū assidue theriacē bibisset, celerissime sanatus est: quare nihil mirum est, talem aliquando contingere humorū in corpore permutationē, ut uniuersum corpus ictericum colorem assumat. Quin & fieri potest ut propter naturalis temperiei ipsius hepatis mutationem, eiusmodi humorū corruptio contingat, ut aliquando herbis pallore albicantibus totum corpus manifeste assimiletur, aliquando etiam plumbi colorem induat. Quemadmodum etiam eiusmodi colores nigricantiores sunt, si ob splenē quā si ob hepar affectum contingāt. Splene scilicet ad attrahendum ad se ex hepate aeræ bilis humorem, & ad repurgandum sanguinem pro more suo debilitato. Fit autem aliquando icterus ob imbecillitatē uesicæ bilis susceptricis, quæ biliosum humorem, ueluti cōsueuit, in sese ex hepate non attrahit, & ob id impurum sanguinem relinquit. Possibile est etiam eam nimis repleti, aut repletam propter repletionis multitudinem non posse euacuari: Aliquādo autem & propter obturationem aut debilitatem uenarum, quarum ora ex ipsa ad hepar deferuntur, biliosum humorem non adtrahit. Quare in ictericis affectionibus recrementorum figura necessario con-

sideratur, quum in aliquibus multum colorata per flauam bilē appareant recrementa, quemadmodum etiam in alijs urinæ. In quibus enim ratione iudicationis bonæ in febribus, biliosus humor ad cutem prorumpit, his & recremēta & urinæ naturali modo se habere uidebuntur. Quibuscunq; uero citra febrem, unā cū grauitatis alicuius aut doloris sensu circa dextrum iliū, arquatus cōtingit, in his uesicæ bilis susceptricis obturationem factam esse putandum est. Quibus autem neq; grauitatis neq; doloris sensus circa iliū adest, in his splenem uiciatū humoris causam esse iudicabimus. Si autē neq; dolor neq; grauitas circa ilia infestet, neq; febris præcessit, & tamen sanguis in uniuerso corpore in bilem mutetur, atq; ita arquatus contingat, his pruriginosior cutis fiet, & magis etiam arefcet. In quibus uero atq; bilis humor unā cum sanguine ad cutē est delatus, hi omnino grauius afficiuntur. Consequitur enim ipsos tristitia præter rationem, & mordacitas eorum, quæ circa uentrē sunt, difficultasq; spirandi, & cibos auersantur, & nigra lotia excernunt. Aliquando autē & per interualla quædam corpora ipsorum tepescunt: stercora uero chalcanthi colorem referunt, & aluus magis his resiccatur. Cæterum eos qui ex pallida bile arquatum contrahunt: nulla mordacitas eorum quæ circa uentrē sunt cōsequitur, neq; etiam in tantū auersantur cibos: sed obtusior tamen aliquando fit in eis ciborum appetitus. & stercora quidem albida egeruntur, urinæ autē crocei coloris, turbatae tamen & tenebras referentes permanent. Communiter autē omnibus ictericis pigrities & tumor grauians ad motum corporis contingit, & ad dulces cibos animum habent alienatum: amaros uero non admodū auersantur, & uarijs imaginationibus uexantur. Pruritus etiam uniuersi corporis comitatur, & difficulter exudant. Porro alba oculorum & partes faciei tēporib; propinquæ, itemq; malæ pallorem ostendūt: uenæ etiam sub lingua repletæ reperiuntur, & abundantem humorem significant.

Cura arquati.

Cap. xviii.

Arquati igitur qui ratione bonæ iudicationis febribus perfecte soluti fiunt, facillime sedantur: si ægri laua cris aquarū ductum utantur, ac olei discussorij per frictione, omnibusq; quæ rarefaciunt cutem: qualia sunt oleum chamæmelinum, anethinum, trinum, gleucinum, amaracinum & rosmarinus herba oleo incocta ipsum plurimum discussorium facit. Diætā quoq; uniuersam humectiorem in his constituere oportet, & ut mediocriter humorum crassitudinem attenuare possit. In reliquis autē ictericis duo maxima remedia principatū obtinent, sectio uenæ, & purgatio. In quib; igitur multitudo sanguinis unā cū bile in toto corpore abundat, & quos circa hepar aut splenē dolor aut distensio infestat, nihil uenæ incisione cōmodius fieri potest, si nulla alia re id facere præpediaris: particulatim autē & per uices sanguis est detrahendus, ne per coaceruatam euacuationē vires ægri prosteruantur: neq; uero inepte clyster adhibetur, si uenæ sectio impediatur. A uenæ autē incisione etiam commodè clyster assumitur, qui propter stercorum euacuationem spirandi facilitatem inducit, in testināq; iritando ac mordendo, humores ad cutis superficiem delatos, ad ipsa retrahit & reuellit. Purgatiōes aut magis propriæ & familiares huic morbo existunt,

Angusti nigrities

existant, inquit Rufus. Cæterum edulj̄s ac potioni-
bus itemq; pharmacis, humores prius attenuare o-
portet, obturationesq; deoppilare, atq; deinde phar-
macum exhibere quod flauam aut nigrā bilem du-
cit. Sint aut purgatiōes ictericis exhibendę fortiores;
ob uentris enim siccitatē, imbecilliores, inefficaces in
ipsis cognoscuntur; quare in principio purgare non
oportet, priusquā per deoppilantiā bilis attenuetur,
& quodam modo ad intestina reducatur, maxi-
mī namq; malī causam, purgationes in principio
datę præbuerunt. Itaque conuenit primum deop-
pilantibus mox dicendis uti, atque ubi attenuatio
humorum ac deoppilatio fuerit facta, tum demū
conueniens, & forte (ut dixi) pharmacum purga-
tuum est exhibendum. Quod si primo purgatio
pharmaco nihil proficiat, rursus forte aliquod de-
oppilatorum pharmacum bibendū prebē, & post
triduum rursus uolentius pro secunda uice purga-
to, inquit Rufus, ut etiam ad finem purgatiōis unā
cum uehementissima mordacitate bilis excernatur,
quæ cærulea magis sit quā flaua. Ego itaque eu-
phorbium epithimum, aloē, petroselinum, & dau-
ci semen misceo, ac ictericos purgo. Optime etiam
ip̄os purgat hoc. Piperis longi scrupulos nouem,
piperis nigri scrupulos quinque, scammonię scrupu-
los sex, ammię scrupulos quatuor, seminis foenicu-
li sesquiscrupulū, seminis ap̄ij scrup. ii. & dimidiū,
caroli scrup. iiii. anisi scrup. iiii. mellis quantum
satis est, quo ad strigmentitiā crassitudinem re-
digatur. Datur, nucis ponticę magnitudine cum co-
chleari aceti albi & aquę calidę tantundem. In me-
lancholicis autem ad prædictum dimensum farinę
epithymi scrup. iiii. addere oportet. Vehementer
commodum & hoc est. Colocynthidem magnam
superne perforato, electoq; semine id quod instar
tamenti in ea est finito, ac uinum uetus dulce infun-
dito, & pernoctare in ea permittito: mane uero per
panniculum detritę uestis diligenter percolato, &
uinum calefactum his qui flaua bile abundant bibē-
dum præbeto. Ad melancholicos autem epithymi
scrupuli sex in uino dulci præcoquātur, id ip̄sumq;
uinum colocynthidi infundatur, ac ut dictum est,
bibendum præbeatur. Cyclamini quoq; radix tri-
ta potata, post deoppilantiā remedia, aptissima est
ad uiscera repurganda, & ad bilem in uniuersa cute
excludendā per sudorem: quare post eius potione,
sudorem exclusionem per uelamenta ac concales-
centiam in lecto iuuare oportet. Dantur autem ad
summum ex ea drachmę quatuor ex aqua mulsā.
Quod si inflammatio circa partem aliquā uiscerū
subiaceat, primum irrigationibus & cataplasmatibus
utendum est, & post ea ceratis & epithematibus ad uis-
cerum inflammationem præscriptis. Præstat autem
farinę ammiscere rosmarinum herbam, florem iū-
ci odorati, absinthium, artemisiā, abrotonum, ru-
tam, cardamomum, chamæpityn, scordium, poliū,
ac chamædryn. Hæc enim singula ammixta urinam
ciēt, quod morbo maxime cōducit, & uisceribus
inflammatis prodest. Cucurbitulis etiam utendum,
hepate quidem affecto inanibus, & aliquando cum
scarificatione: splene autem adfecto omnino cū sca-
rificatione: inanes enim splenē nihil iuuāt. Pharmaca
autē quę in potu accepta ab obturatione ictericos li-
berāt, maxima ex parte urinā ciēt, uelut est ap̄ij der-

coctum, & adiantū, ac similia: Vtilis est & absinthij
cremor per se, & cum nardo indica, ac iunci rotundi
odorati flore. Item pulegi decoctum, & calamin-
thes et uerbenacę rectę ac oxallidis. Est autem oxal-
lis rumex acris sapore, fuluis ramulis & folijs, caule
quadrangulārī coq; semine referto, pallida radice:
hæc sane per se comesta, & radice decoctum ad ter-
tias redactum ac potatum celerrime auxiliatur. Pro-
dest etiam rumex satiuus, & anchusę radix, rubiæ
radix, chamæpityos, rosmarini, & aristolochię. Miri-
fice etiā prodest, serpillum, hypericō & eius generis
plurima alia. Singula hæc in aqua ad tertias decocta
cū uino dulci bibenda præbeto, aut cōtundito & cri-
brato, ac singulorum drach. i. dato. Præclare quoq;
facit corticis raphani succus, uino meraco dulci per-
mixtus aut uino mulso: ita ut succi cyathi duo, uni
uini cyatho contemperentur. Datur item ualde com-
mode echorij & seridis succus, febricitantibus quidem
per se, febre carentibus cum uino, brassicę item suc-
cus eodē modo, & cornu ceruini rametā cochlearij
mensura, petroselinum, anisum, asarum, rheon; cō-
modissimum autem est chamæmelon, quæ & leucā
themōs adpellatur, itemq; bupthalmum. Aliud
multū experimentū. Spumę nitrī albę drachm. du-
as, in uino ueteri dulci macerato trium cyathorum
mensura, & per totam noctem sub diuoposito, &
ad triduum aut quatrīduum bibendum præbeto.

Aliud præter opinionem. Vermes terrenos co-
ctos ac cum myrrha troglodytica tritos, in fabæ
magnitudine ex passo aut uino mulso dato, & po-
stera die icterum per lotium eiicient. Idem faciūt &
absq; myrrha dati. Exhibeto hoc ad triduum, ac utere
cōfidenter. Pastillus ictericus, qui ictericis, & hepa-
ticis mirabiliter cōducit. Amygdalarū amararū re-
purgatarum drac. iiii. anisi, comæ absinthij, cuiusq;
dra. ii. spicę nardi dra. i. asari dra. i. cōtundito & cri-
brato reliqua, amygdalas autē cū aqua terito, & pa-
stillos informato: ex quibus dra. i. febre carentibus
ex uini mulsi cyathis iiii. præbeto. Cæterū pharmaca
quę in potu accipiuntur, omnia si fieri potest, in bal-
neo exhibeātur, ubi ægri in calidū lauacrum cōscen-
dere parant. Plurimum autem diætę uisum refocil-
latrici intētum esse oportet, per quam uis discretiua
reparatur, & si quod membrum læsum sit corrobo-
ratur, ac præsens coloris corruptio repurgatur: qua-
propter conueniunt exercitiāmēta, & gestationes, &
inunctiones ac exudationes, ita ut ad pyriateria, hoc
est, uaporatoria sicca, & ad solē, & in balneis quoq;
corpus nitrī puluere uesti, ac uini fece arida uestaq; ac
tenuissime trita defricemus. Optimū autē & serpyllū
lū & thus parī modo cū oleo illitā. Rosmarinus itē
herba in oleo decocta, si oleum illinatur, prodest. Ci-
bi autem omnes incisorij sint & attenuatorij, & qui
cūq; inter attenuatoria edulia prædicti sunt in secun-
do Sermone: ex uolucrum quidem genere, mōtanę:
ex piscibus uero, q petrosi aquis degūt: ex ostreis,
herinacel recētes. Olera uero sint quę magis urinam
ciēt, præsertim seris, Intyba, asparagi palustres, smyr-
nium, carduus, eryngium: ex satuiis autem conuenit
brassica & asparagus eius, raphani, allia cruda & co-
cta. Carnes autē ferinę mansuetis magis sunt aptę:
pro liquamine seu embāmāte, ualet acetum in quo,
scilla & aristolochia sint macerata. A fructibus absti-
nendum. Bellaria sint amygdalę, sed modice suman-
tur, &

rum, & cicer modicū torrefactum. Ex leguminibus cicer assiatum, & maxime decoctum ipsorum assidue potatum. Ieiunū autem citrū comedāt repurgatum. Vinum conuenit album & subadstringens, neq; ualde uetustum: ubiq; autem mediocritas optima censetur. Quod si quippiā ex scitro circa faciem & oculos relinquatur, urinæ autem appareant puræ, aliusq; cōsuetō more egerat, & appetitus in nulla re obstat, neq; infestet sitis: & ut compendio dicā, quum omnes prædictæ accessiones fuerint sedatæ, & tamen circa oculos uiciatus color relinquatur, narium infusis utendum: fortissimū autem omnium est elaterium cum lacte muliebri infusum, facit & cyclamini succus, & melanthium cum aceto: debiliior his est anagallidis succus, & succus radicis betæ. Depurgat autem cyclaminus crassissimū mucum: elaterium autem pituitam & bilem. Omnium autem efficacissimum ad eos reperi atramentum sutorium lacte muliebri dissolutū ac naribus infusum: inde enim bilem large ex naribus destillantem uidebis. Oportet autē poscam probe dilutam in ore detinere, dum infunditur hocce pharmacum. Præstat tamen primū cyclaminū infundī, quo crassa per eam euacuetur, & postea ipsum sutoriū atramentū.

De malo corporis habitu, Archigenis. Cap. xix.

Quum corporis habitus in aquositate diffunditur, cachexia, id est, malus habitus à Græcis appellatur, in quo uniuersa corporis miscella laxior fit ac emollescit, quod maxime ex somno inæqualiter contingente fit manifestum: corpusq; ipsum totum cum uirore albicans redditur ac inualidum, ita ut crura inter eundem uacillent, & in principio quidē concoctiones impediuntur manente etiā dum appetitu: postea uero & fastidium accedit, & respiratio ipsis fit rara ac debilis, quæ moribus & actionibus condensatur. Alius etiam inæqualia recrementa excernit. Hæc affectio ut plurimū ex longo morbo congregatur: iam uero & ex uiscere quopiam in scirrhu indurato cōsequitur, maxime hepate & splene: neque raro in dysenteria diuturna & affectionibus coeliacis contingit, ob consuetam item aliquam cohibitam excretionem. Capiuntur autem hac adfectione maxime senes, qui etiā maxime liberantur: imo & pueri, qui facile pereunt, propter uitalis firmitatis debilitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis facile transpirant. At uero qui in uigore sunt, raro incidunt, & facile se inde extricant. Quod si diutius adsit malum, in aquam inter cutem transsit. Quod uero ad curam attinet, si quidem ex consuetæ excretionis cohibitione affectio cōingat, admonere ac irritare eam ipsam excretionem oportet: aut uenā incidere in cubito, si nihil sit quod id fieri præpediat, paulatim ac partitis uicibus per tridū sanguinem detrahendo. Si uero uenæ incisio impediat, conuenienti medicina depurgante ipsos purgare oportet, & maxime ex hiera Archigenis ex colocynthide apparata. Quod si hepar sit adfectū aut aliquod aliud ex uisceribus, medelam adhibere his ipsis conuenit, per auxilia ad singula ipsorum supra præscripta. A localibus autem remedijs, ad diætā uiribus reparandis aptam transeundum, per quam spes est eos qui huic malo sunt impliciti ad restitutionem in integrum peruenturos. Diætā autem qua uires refocillantur in moderatis deambulationi-

bus consistit, gestationibus, uociferationibus, & defricationibus siccis per lintheola ex lino crudo, deinde per inunctionē ex oleo, cui quædam quæ humorem resiccant sint infarta, uelut sunt nitrum & sales. Postea uero & exercitamenta moderata conducunt. Ad lassitudinis autē curationem balneum per interualla quædam adhibeatur: quod si quis ad frigidæ lauacrū adsuefieri possit, compedio ad omnē malī curationē peruenerit. Aquæ item quædā naturales calidæ robori ac uiribus reparandis conducunt, quales sunt aluminosæ, sulphurulentæ, ac nitrosæ. Mirabiliter autem ipsos iuuat assidua absinthij præparatio, & adhibiti dropaces. Cibi eorū sint simplices, & qui facile cōcoqui possint, parum conditi olerū uidelicet gratia: si quidē opus sit per ipsa urinam clere, & aluū submollire. Vinū conuenit eis album, tenue, odorum. Bellaria omnia uitent, omnia item nidorosa, & graueolentia: humoris crassi, & uiscosa, & quæ difficulter concoquuntur, à cibis eorum sint aliena.

De hydropē, siue aqua inter cutem. Cap. xx.

Hydropis differentiæ tres sunt: alius enim ascites, ab utre appellatur: alius tympanites, à tympano: & tertius sarcites, aut iuxta carnē, hoc est, subtercus, à Græcis etiā leucophlegmatias nominatus. Ascites igitur fit, quū inter pelliculam peritonæū appellatam, & intestina plurima aquosi humoris collectio cōtingit, ut uere utris modo pellicula ipsa repleta esse uideatur: aliquādo uero ubi peius habet ægrī usq; ad foemora tumor productur, quando sanè ascitæ & sarcitæ hydropis cōplexus factus appareret: unde aliquando quidem pedes inflantur, aliquādo naturalimodo habent. Tympanites uero flatus aëre repleti ac superflui plurimā collectionē in hisdem uetri incumbentibus locis facit, ut in principio sola inflatio esse uideatur: postea tamen flatus inspissatur, & uelut nubilus redditur, atq; ita unā cū flatu, quasi nebulosus humor consistit ac congregatur. Infert autē tympanites multā circumtensionē, atq; in ipso etiā usque ad foemora & pedes tumor procedit. Porro sarcites per omnē corporis coagmētationem ac miscellam humorē disseminat, ut instar spongiarū aut papyri uniuersa caro permadefacta appareat: atque ob id totum corpus similiter ut ilia intumescit, ac mortuo simile euadit. Cōmuniter autē omnis hydrops spirandi difficulratē, & tumorem, & grauitatem, & uiciatū colorem inducit, ex uirore nimirum albicantibus ægris: fastidiunt etiā cibum, potum autē largiorē plurimū appetūt, maxime qui ex ascite laborāt. Etenim humor qui in locis detinetur, falsus est, & putrefactus, quare & sitis & febris auge-scit: serē enim in totū plurimū ex hydropicis febrīūt. Cōsequitur autē aqua intercus omnes morbos qui habitū corrumpūt: una est enim ad hydropē aptitudo, coagmentatæ corporis miscellæ demollitio & ruina. Contingit autē hæc aut ob superexcellētē hepatis frigiditatē, aut ob aliqua alia mēbra uehementer refrigerata, quæ hepar in eandē dispositionē deducere ualent: citra enim hepatis refrigerationē impossibile est aquā congelari, et aliquem in hydropē incidere. Coafficitur autē hepar spleni refrigerato, aluoq; & intestinis, maxime his quæ iuxta ieiunū intestinū sunt, pulmoniq; & renibus, ac septo transuerso. Cōgregatur etiā ex immodica hemorrhoidū

E euacua

euacuatione, aut ex fluxu muliebri, aut ob menstruum retentionem, aut ob aliam quādam magnam uuluae affectionē. In his enim omnibus nulum praeter naturā tumorem hepar habere conspicitur, & tamē aquae inter cutem morbo corpus apprehenditur, ex sola refrigeratione hepate in his in principio affecto: post uero aliquādo & durum fit, quod palām in illis uidere est, qui ex intempestiua frigidae aquae potione hepar acerrimam refrigeratū habent, ut statim aquae suffusionem operetur, priusquā ipsum in scirrhum tumore eleuetur. His autē qui ex frigidae potu aquā inter cutem incurrerunt, uehementes ciborum appetitiones fiunt, propter oris ipsius uētris frigiditatē. Multi autē & apodagra & coxēdicum dolore uexati, aquā inter cutem inciderūt. Frequentissime autem eos qui cibum nō sentiunt, & malo corporis habitu praediti sunt, itemq; ab arquo infestatos, hydrops consequitur, coeliacā item affectionē & dysenteria. Nouimus etiā quosdam qui ex recta spiratione quā orthopnoeam uocāt, in aquā inter cutem sunt deducti. Ceterū huius affectioni nō minus foeminae quā uiri fiūt obnoxii: pueri uero ut plurimū ab hydrope sarcite apprehenduntur. Est autem tympanites omnino periculosus, minus eo ascites: adhibetur enim in eo pertusio siue punctio, quam paracetesin Graeci appellāt, & reliquis quoq; remedijs promptius quā ille obedit. Sarcites quoq; aliquādo curabilis fit per ea quae cuti adhibentur humore detrahentia ac resiccantia pharmaca. Omnes autē inueterati hydropes & qui iam habitū corrumpunt, sunt periculosi. Fiunt etiā aliquando bullae inter peritoneum pelliculam & intestina, figura uesicae similes, & serosum humorem continentes; hae ipsae sanē per fluctuationes quasdam inaequales depræhenduntur: nimirum proprium locum secundum lineamenta quaedam distributum ac uelut circumscriptum, in ipso humore tenente.

Ascite ac tympanite hydropis cura. Cap. x x i. Quum itaq; difficilis sit, quēadmodum praedictū est, aquosae affectionis cura, plurimo artis auxilio opus habet; in his igitur qui febricitant hydropicis febre intermittente curā faciemus: itaq; cataplasmata ex farina ordeacea, altheaque ac caricis ipsis adhibebimus, ita ut in tympanite quidē magis ex seminibus flatus discutiētibz cōmiscemus; in ascite uero magis ea quae euacuāt humore. Caeterum post principium efficaciora sunt cataplasmata quae pro ordeacea, fabacea farina suscipiūt, itemq; eruinā, cuiusq; parē mensurā, coquantur autē cū muria, aut aceto mulso. Praestat etiā liliacea farina cū caricis, & absinthio, hyssopoq; & origano ex aceto mulso: itē bulbi cū melle: aut armentariae bouis stercus ex posca siue aceto mulso: habeat autē quartā partē sulphuris uulsi inspersam, admirandum hoc est, ac minime praetereundū. Valet & caprinū stercus in pueri incorrupti, & uenerē nondum experti urina impositum: humore enim per uentrem euacuat. Valet & lupini farina, aut hederę folia trita & uino decocta; aut ficuū partes duae cū cupressi coma, & nitro: aut lens palustris in figulino uase desiccata, trita & imposita, aut cochleae crudae cū carne sua tritae impositae: non enim priusquā humor desiccetur discendū: aut alumen plurimū sēuo caprino exceptū im-

ponere: aut caricas, nitrū, castorium, marrubium, aut filicem in pila contundito, & raphanos donēc colliquefiant coquito, deinde simul terito, & farina ordeacea adiecta, cataplasmatibus modo imposito. Cataplasma optimū ad ascitem. Lathyridū partes iiii, squamę aeris partē i, radicis chamaeleonis partes iiii, coquantur in aceto mulso in quo adeps taurinus sit praeliquatus. Aliud optimū ad ascitem. Stercoris columbini partē i, stercoris caprini tantundem, buphthalmi herbae tantundē aut leucanthemi, hęc tusa in acerrimo aceto ac melle coquatur. Aliud. Salis fossilis partē i, salis cappadocici partem unā, lathyridum contusarū partes tres, coquantur simul aqua marina aut sulphurulenta. Optimū est hoc pharmacum. Sensibiliter enim uidebis materiā euacuatam, & tumore discussum. Aliud. Rhois quo tinctores coriorū utuntur sextariū i, pollinis frumentacei aut liliacei aut farinae fabaceae sextariū i, thuris quadrantē, aluminis scissi quadrantē, imposito cū aceto mulso hydropicis, splenicis, dysentericis, ac coeliacis. Aliud. Radicis cucumeris agrestis unc. xvi, ficuū pinguium unc. xvi, radicis altheae unc. xvi. Radicem unāquamq; per se tundito ac cribrato: ficus uero cū uino coquito, ac probe terito, siccatq; trita inspergito. Vitor, per aluum enim humorem educit. Aliud. Elaterij, staphidis syluestris, succi hyssopi, fellis taurini, ficuū. Omnia in mortario tundito, subigito, ac uitor. Poteris & praedicta in secundo Sermone cura uti, de diuersis uidelicet terrae differētijs. Cataplasmata, quae magis ad tympaniten faciūt. Farinae foenigræci, farinae ordeaceae, uirgultorū rubi, comae absinthij, foliorum rutae, seminis apij, cumini, sisonis aut ligustici, mellis, & uini, & olei. Aliud, ad hydropicos inflatos. Panis cotusi sextariū unum, cumini sextarij quartam partem, samscud quadratē, pyretri sextantiē, euphorbij unciā unā. Cū uino mulso uniuersam spinā & aluum usq; ad mamillas & pudēda cōtegito, alternisq; diebus soluto, atq; id quinquies aut sexies facito. Ego pro euphorbio struthion conieci. Vnguētū Apollonij. Stercus accipitris cū syluestris brassicae succo assidue illinito, mirifice facit: uerum melius fuerit si aquilę stercus ammiscueris. Aliud. Laterem diligētissime instar uasis figulini assatum cū hyoscyami aut plantaginis succo terito, & quā crassissime ad solem frequenter illinito. Vnguentum ad hydropicos. Radicis cucumeris syluestris, radicis bryoniae, utriusq; libras duas, staphidis syluestris sexuncē, nitri sexuncem, olei libram unā, aquae marinae sextarium unum. Quod si non adsit aqua marina, pro ea muriam conieci, resinae a nauibus unā cum cera derae, apochyma Graeci appellant, libras tres, Radices tenuiter cotundito, nitrū & staphidem terito, & per triduū madefacito, deinde usq; ad aquae consumptionem coquito, percolato, & apochyma adieci, quo liquefacto uitor, ex eo saepe illinens tumorem.

Epithemata hydropica. Cap. x x ii. Asclepiade. Epithema hydropicis ualde commodum, quod adiacētē humore absorbet; quo etiā priuatim, inquit Archigenes, uitor. Farris clusini appellati mola triti sextarios duos, floris lapidis alij sextarium unū, alij autē duos habet, mannae sextariū unum, diligenter terito, & adipe suillo ueteri probe subacto, & per

& per noctem in uino macerato excipito. Eius autem quantitas tanta sit, quanta ad hoc ut ad tactum molle reddatur, pharmacū suffecerit. Aliud. Seminis rutæ syluestris, quod besafa & harmala quidam appellat, contusi & cribrati sextariū unum, mannæ sextarij dimidiū, adipis suilli ueteris quantū sufficit, ut prædictū est apparato. Aliud, cui testimonium præbet Orisbasius. Foeni græci trientē, farinæ ordae quadrātem, stercoris columbini trientē, resinæ pinus siccae lib. i. picis librā unā, ceræ lib. i. axungie ueteris libras duas: quæ eliquari possunt eliquato, & ad alia in mortario cōfusa & cū aceto trita adfundito. Aliud ex farinis epithema. Picis siccae libras duas, resinæ pinus libras quatuor, ceræ libras tres, olei ueteris librā i. farinæ tritici, ordeli, foeni græci, baccarum lauri, anisi, salis, farinæ radicis chamæleonis nigræ, singulorū bessem, uini austeri sextarium unum, apparato ut prædictum est, ac utitor. Facit & ad hepaticas dispositiones. Ego autē, inquit Asclepiades, & chamelææ quadrantem adieci, & pro triticea farina, irinam admiscui. Pharmacū, quod omnem tumorem generose resiccat. Cimoliæ quadrantem, ceræ quadrantē, olei quadrantem, salis unciam i. resinæ à nauibus cū cera derafæ drach. centū & sexaginta, farinæ foeni græci drachmas uiginti, foliorū brassicæ uiridium quincuncem. Liquefacta reliquis tritis in mortario adfunde. Aliud epithema ualde pulchrum. Stercoris caprini sextantē, stercoris bubuli sextātem, stercoris columbini sextantē, farinæ fabaceæ sexuncem, calaminthæ, salis nitri, seminis apij, seminis daucis, seminis foeniculi, cumini, cuiusq; unc. i. panis aridi quadrantē, mellis sexuncē, terebinthinæ quadrantē. Vltor. Epithema ex stercore caprino ad hydropicos, qui hepar indurātū habent apparatū. Olei cyprini, aut si hoc non adsit uetustissimi lib. i. i. ceræ lib. ii. & dimidiam, stercoris caprini bessem, baccarū lauri decorticatarū bessem, iridis besse, terebinthinæ lib. i. sinapis, nitri, cyperi, pyretri, seminis raphani, corticis radicis capparis, cuiusq; quadrantem, medullæ colocynthidis uncia unā, foeni græci uncia unā. Aliquādo quidē arida liquefactis insperguntur: aliquādo uero aceto prius subiūntur. Ego autem, inquit Asclepiades, colocynthidis sextantem adijcio. Quod si alius fluat, omnino colocynthidem amoueto: stercus autē caprinum si quidem aridū sit, tunditur & cribratur: molle autē & recens aceto dilutum teritur. Malagma, quo Eras usus est; quod imponendum est: neq; prius amouendum, quā sua sponte decidat. Visci lib. i. lapidis asij sexuncem, calcis uiuæ quadrantem, olei cedrini lib. i. Viscum & oleum ad calidum ac feruentem cinerem coquito, inspersisq; aridis tritis, remollito ac utitor. Aliud. Caricarum pinguiū lib. vi. aut. iiii. spumæ nitri lib. i. origani lib. i. sulphuris uiui quadrantem, cochlearū aphricanarum libram unam. Arida contundito & cribrato, ac fisis cū carne cochlearum contulis excipito, & melle cocto sufficienti adfecto utitor in linteolum infartis. Aliud. Radicum brassicæ tenuissime tritarū libram unam, calcis uiuæ lotæ librā i. elaterij quadrātem, axungie ueteris libras tres. Ad formam malagmatis reducto, & in linteolum infartito, ac per omnem alium imponito, alternisq; diebus soluito. Vrinam prolicit. Malagma ipoterium inscriptum: pharmacum accom-

modatum, ac prosperi successus, cuius periculū fecit, inquit Philagrius, in hydropicis, splenicis, & affectionibus inueteratis; deprimat enim tumorem. Resinæ pinus torrefactæ lib. i. i. i. ceræ lib. ii. picis lib. i. i. aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris uiui, mannæ, cuiusq; librā unam, aloës sexuncem, pyretri, aristolochiæ, ammoniaci, bdellij, amomi, cardamomi, uisci, probe subacti, myrrhæ, radicis cucumeris syluestris, succi sycomororū, cuiusq; quadrantē, olei libras tres, aceti sexquiseptariū. Quēadmodū moris est apparato. Arida aceto diluuntur. Malagma ex bacis lauri aridis, ad hydropicos & splenicos, omnem duritiā dissoluit, abscessus in profundo sitos absorbet. Ceræ, resinæ pinus, picis brutæ siccae, nitri rubri, baccarum lauri aridarū, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini probe subacti, singulorū lib. unā. Arida cōtundito, ac per tenuissimū cribrū excutito: quæ uero eliquari possunt liquefacto, eisq; arida inspergito ac unito, deindeq; ammoniaco cū aceto dissoluto affūdito. Ego etiā nitrū cū aceto dissoluo. Emplastrum Tonforis appellatū, ad splenicos & hydropicos. Hoc tonfor ex Bythinia usus, multos à coxendicū dolore in totū liberauit. Picis siccae lib. i. i. i. ceræ lib. ii. resinæ pinus lib. i. farinæ foeni græci, poliolis radicis herbæ chamæleonis nigræ, cuiusq; bessem, cumini tenuissime triti trientē. Apparato, & ut dictū est, utitor. Emplastrū pardalis appellatū: Andree. Pharmacū inueteratis hydropicis prospere accommodatum. Grani cnidij depurati, rhois rubri, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ tenuis maxime corticis, radicis cucumeris syluestris, terebinthinæ, cuiusq; drac. i. i. i. piperis cōmunis, piperis longi, ammoniaci thymiamatis, iridis, bdellij, thuris, cardamomi, xylobalsami, calsiæ, myrrhæ, amomi, adipis taurini, adipis caprini, resinæ pinus siccae, cuiusq; drac. x. ceræ sesquilibrā. Visci probe subacti sextantē, unguēdi irini aut potius fecis sexuncē, succi sycomororū sextātem, si haberi possit. Cerā, resinā, adipem caprinum, liquefacto, refrigerato, & cerati modo leuigata ac cōfecta asseruato. Bdelliū autem & ammoniacū & succi sycomororū sextātem, præcedenti die in uini quincunce macerato, sequentiq; in sole terito, & cōiecto in mortariū cerato bdelliū & reliqua cū eo adijcto, & diligēter tundito, deinde arida trita paulatim addito, & per biduum tusa in densam pellē recōdito, ne quid inde transpiret. Quidam autē hyssopi drac. i. i. i. addunt, & irinū largius affundunt, quo modo usus est Eras Cappadox & Asclepiades. Facit ad multas & uarias affectiones, facit ad hepaticos, splenicos, suppuratos, & arthriticos, podagricos qui à calefactorijs luuantur, & coxendicum dolore laborātes, pleuriticos, præcordiorum affectiones, & omnia quæ concalefactione opus habent. Vtere & ad strumosos, emplastro ad strumæ magnitudinem facto & imposito: suppurat enim, perforat, rumpit, eademq; attrahit, & cicatricē inducit. Cōducit & ad ossa contrita, educit spinas, & omnia in profundo fixa: facit & ad suppuratos præclare, & ad omnes duritiās internas. Inflammationes autē internas eadē die soluit. Vltor & ad tubercula, dissoluit & cancerata & panos. prodest cōuulsis & à scorpio percussis: summe autē hydropicis confert. Quod si & ad lassitudinē neruorū adq; dolorē leniendū uel uelis, ad unā emplastri partē, irinum, nardinum,

num, cyprinū, susinum, butyrum, lentiscinū, adipē, cespum, mel, singulorum æquales partes misceto, & ad solidi strigmenti crassitudinem redigito, ac utitor. Epithema hydropicis, splenicis: abscessus & furunculos sanat: humores in profundo & in articulis resiccat: hydrocephalis, hoc est quibus aquosus humor in capite consistit, itemq; herniæ quæ hydrocele appellatur, pro glutino existit. prodest & hemicraniae tubercula quoq; atheromata ac steatomata Græcis à spicarū, siue ut alij uolunt, pulciculæ, itemq; pinguitudinis in se complexu appellata, curat. Nitri, chalcanti, salis, spumæ nitri, cuiusq; quadrantē, cerusæ septuncem, ceræ septuncē, olei lib. i. inestate autem dextantem. Oleum cum cerusa donec non inquinet, amplius coquito, ceramq; eis adiuncto: quæ liquefacta, reliquæ in mortario terito, ac ad mellis copagem redigito: eisq; cocta infundito, ac utitor. Est enim experimento cognitum.

Malagmata quæ euacuant humorem: ex libris

Asclepiade.

Cap. xxiii.

Grani enidi repurgati drac. x. medullæ colocynthidis drac. viii. succi cyclamini sicci dra. xvi. scammoniae, elaterij, piperis albi, myrrhæ, cuiusq; drac. iiii. polypodij drach. viii. absinthij drach. xvi. amurcæ drach. xvi. fellis taurini drach. xvi. sagapeni drach. viii. cerati cyprini quantū his excipiendis satis est. Sufficiunt autē ceræ dextās, olei cyprini uncia xvi. hæc linteolo infarta pectini ac lumbis imposito, ita ut os utrūq; custodias illæsum. Summe prodest, inquit Archigenes, adeo ut quidā hoc solo se hydropicos sanatos cōfidant. Aliud, quod largè cit urinā, totiq; affectioni opitulatur. Radicis cucumeris sylvestris, radicis chamæleonis, aristolochiæ lōgæ, coratidis radicis rubi sicci, singulorum librā unam, æruginis uermiculatæ, recrementi plūbi, aluminis scissi, seminis apij, sulphuris, acori, asari, petroselinij, nardi celticæ, cardamomi, singulorum trientē, ceræ libras duas, terebinthinæ liquidæ, picis brutiæ, adipis taurini, cuiusq; librā unam apparato, & imposito, ut prædictum est. Aliud. Veratri nigri, nitri, piperis, fellis taurini, singulorum æquale pondus melle cocto excipe, & utere ut dictum est.

Epithemata, quæ post euacuatos humores adhi-

bent pro glutino sunt.

Cap. xxiiii.

Mellis libras duas, myrrhæ sextantē, thuris uncia unā. Mel usq; quod uiscosum fiat decoquito: eisq; myrrhā ac thus tenuissime trita adiuncto, simulq; subigito, & spongiæ nouæ infarta per omnē aluum imposito, colligatoq; eute quodammodo constricta, & tercio die soluto. Aliud. Thuris drac. viii. gummi dra. octo, rosmarini herbæ exiccatae drac. decē, mellis libras duas, apparato, ut dictum est: similiterq; utitor post euacuatos humores. Aliud epithema, quod post humorum euacuationem, toti affectioni se opponit. Lapidis asij sextantē, farris mola triti uncia unam, thuris trientē, chamæleæ contusæ & cribrate drach. iiii. adipis suilli ueteris quantū sufficit. Vtere ut dictū est. Emplastrū Magus appellatū: quod quidam etiā Hephæstiadis nomine insigniūt: facit ad sinus, & fistulas cōglutinat ac resiccat præter opinionem. Egregiū censetur & ad hydropicos & ad herniā hydrocelen appellatā. Spumæ argenti sexuncē, lateris furno assati sesquilibrā, scorizæ argenti, quæ helcysma Græcis appellatur librā unā, olei libras tres,

ceræ sesquilibrā, succi coriandri sesquixextarium, alij sextarij dimidiū accipiunt. Oleum, spumā argenti, helcysma & laterē tenuissime tritū, itemq; succum, donec amplius non inquinet decoquito, deinde cerā liquefacito, & percolatam adiuncto, ac unitis utitor. Quæ difficulter aliā sanantur ad cicatricē perducit. Præstat autē arida prius cōtundi, & cū succo in mortario teri, ac deinde decoqui. Quidā autem pro cera, pentatheton pharmacū coniecerunt, & ad hydropicos usi humorē resiccarunt. Epithematis igitur perseueratius & propius utimur, si absit febris: quod si febres sint cōiunctæ, per interualla quædā assumuntur. Cæterū ad tumores crurij hydropicorum, panem madefacere oportet, terereq; ac sale tenuissime trito ammixto, illinire, ac quatuor horis sinere. Quod si aquosus humor defluat, spongia mundare, ac panniculo uestis detritæ extergere, oleoq; myrteo, aut mellino, aut lentiscino inungere.

Aquam ducentia remedia, hydropicis ualde com-

moda.

Cap. xxv.

Smilacis quæ iuxta aquas in sepibus reperitur, ac filiquas producit quæadmodum hortensis smilax, quæ lobia appellatur; huius foliorū succū sextarij unius mēsurā accipe, & ad tertias decoque, indeq; cyathū unum bibendum præbe. Aliud. Smilacem accipe & donec flaccescat in aqua decoque, deinde unā cū decocto folia ipsa tere usquequo succus inde exprimatur: & ex eo cyathum quotidie bibendum præbe donec sanetur: in his autem qui perfectæ sunt ætatis plus omnino exhibendum est. Aliud, quod aquam ducit. Seminis enici drachm. iiii. aloës unciam unam, grani enidi scrupulos v. i. scammoniae scrup. tres, cum succo scorpiuri cæreleū colorē habentis catapotia informato, & ex eis his qui iam primū inciderunt scrupulos iiii. exhibeto: quibus autē in tumorem malum processit, scrupulos vi. ieiunis.

Quæ ad ciendam urinam hydropicis hi-

buntur.

Cap. xxvi.

Porrò toto curationis tempore, aliquo istorum potuum utendū erit. Cancrī fluuiialis decorticati interioris exliccati, manibus ac pedibus, auulsis libr. i. asari lib. i. In aqua permisce ex ipso flumine unde cæcri sunt extracti, ac bibendum præbe: aliquādo pro asaro, opobalsami par pondus coniicitur. Aliud. Corallij drachmā unam, aluminis scissi drachmam unam, cum calaminthæ succo aut decocto in pastillos digerito, & ex ipsis obolū unum, cum calaminthæ decocto bibendum præbeto. Summe (inquit Archigenes) & nephriticis cōducit. Laueris item decoctum exhibeto, idemq; lauer edendum dato, aut trifolij bitumen olentis drachmam unam, ex uino, aut funci odorati, aut nardi, aut asari, aut phu, aut mei dococtum, aut corticis radicis ari, aut ipsius radicis drachmam unam, ex uino, aut seminis uiticis drachmam unam, ex uino, aut radicis bryoniæ concise decoctum, aut anagallidis cæruleæ succum per se, aut arnoglossum ab aridorum ciborum comestione quotidie paucum comedendum præbe, ita ut inde reliquo cibo utatur: aut seminis hyperici drachmam unam, ex uino, aut cicerum decoctum, aut scillinum acetum assidue sorbeant. Etenim ex eorū numero quæ citra grauitatem urinam ciunt, est scilla assata delincta ex melle: aut scillam assatā terito, eisq; farinæ erui albi par pondus ammisceto, siccato, ac drac

ac drachm. i. ex uino dato: aut posium, aut samsum-
chum ex uino decocta bibenda præbe. Egregie etiam
commodam myurum herbam perhibent, quæ folia
alimo similia habet, uerum per terrâ strata est, ac ue-
lut corymbos in summo oblongos habet: hanc itaq;
decoctam assidue bibendam præbeto, experimento
cõstat. Aut herinacium terrestrem excoctato, eiusq;
carnem in sole exsiccatam, ac drachmam unam ex ui-
no tritam præbeto. Præter opinionem etiam faciunt
vermes terreni cocti triti ex uino potari. Est & com-
positum pharmacum quod urinam ciet ipsis conue-
nientissimum, hocce: Carpobalsami, spicæ nardi, cas-
siæ, cumini, radicis dulcis, hyperici, floris iunci odo-
rati, asari, amomi, dauci, smyrnii, petroselinii, calami
aromatici, piperis, seselis, spondylii, omnium æqua-
le pondus. Conducit etiam unumquodque per se.
Orybasi pharmacum aquam ducens. Salis ammo-
niaci drachmam unam, mastiches drachmas duas,
euphorbii drachmam unam. Hæc pro una uice dan-
tur: est autem ex fortissimis remedijs. Potiones æ-
quam ducentes, ex Asclepiade. Cæterum per in-
terualla longiora uti cõuenit pharmacis aquam du-
centibus, nam incõmodus est assiduus eorum usus,
utpote qui uires ipsas dissoluit. Similiter autem &
his quæ urinam ciet per modica interstitia utendū
est. Ducunt autem aquam, quæadmodum conuenit
inter Eran, Dioscoridem, Asclepiadem, & Archige-
nem hæc. Radicis struthii decoctum, polypodii de-
coctum, corticem radicis tithymalli charactæ appel-
lati contusum & cribratum scrupulorum quatuor
pondere in uino per integram noctem macerato, ac
mane uinum ipsum bibendum præbeto: euestigio
enim aquam educit. Aliud. Radicis cucumeris
syluestris contusæ & cribratæ obolos duos in uino
adstringente per triduum macerato, ac per dies tres
ex ordine præbeto, factoque interstitio rursus eodem
modo, dato quousq; tumor demittatur. Inde enim
aquositas leniter secedit: neque stomachum hoc læ-
dit, & uires conseruat. Aliud, quod multam aquam
per aluum ducit. Ex solano hortensi succum ex-
primito, & quotidie donec perfecte curètur, cyathū
unum bibendum præbeto. Aliud. Salis fossilis
melle subacti & assati drachmas duas, piperis longi
drachmas ii. conterito, & cum succo ptisanæ totum
præbeto. Hæc enim est perfectum dimensum. Ali-
ud. Radicis umbilici ueneris drachmam unam,
scillæ repurgatæ drachmam unam, contere, & cum
uini mulsi cyathis duobus per horam pro una uice
ieiunis bibendum præbe. Aliud. Euphorbii dra-
chmam unam, salis communis drachmas tres, casto-
rii drachmas quatuor, alij drachmam unam habent,
contundito & cribrato, dimidiumq; ex aqua calida
exhibeto. Aliud. Chamelææ, petroselinii, pipe-
ris, æquales partes omnium contundito, & cochlea-
rium ex aqua calida dato. Eclegma ad hydropicos.
Seminis ricini ex herba quæ cici appellatur depura-
ti numero grana triginta quinque, spumæ nitri co-
chlearia duo, probe contrita melle excipito, atque
id totum delingendū præbeto, & aquæ mulsæ ca-
lidæ cyathos tres, ab eius sumptione bibendos por-
rigito. Euacuat adhærentem humorem, citra læsio-
nem: & purgat aliquando usq; ad dies aliquot. Opor-
tet autē ante eius sumptionem commoda diæta uti.

Aliud inexuperabile. Granii cnidii repurgati dra-
chm. quatuor, lathyridū mundatarū drac. quatuor,
euphorbii drac. duas, aloës drach. ii. gummi drac. tres,
aqua subligito, & catapotia erui magnitudine for-
mato, ac perfectis ætate septē præbeto, & uini meri
immixti cyathos quatuor inde bibendos dato. Reli-
quis autē iuxta uirium tolerantiam exhibendum.
Aliud Xistidi, siue Spiculatoris, ex cuius solius usu
sanabatur. Granii cnidii repurgati drachmas octo,
probe conterito, squamæ æris drachmas sex, lapidis
magnetis drachmas sex, seminis ricini drach. qua-
tuor, succi scillæ mundatæ cyathos duos, mellis cy-
athos duos. Succum & mel usquequo cogatur coqui-
to, ac reliquis adiectis catapotia ciceris magnitudi-
ne formato, eaq; pro uiribus exhibeto: ita ut aqua
malsa ab eorum sumptione bibatur. Pueris autē u-
nicum tantum præbitum sufficit. Aliud. Aeris
usti drachmā unam, foliorum rutæ drachmā unam,
stercoris columbini drachmam unam, salis commu-
nis parum. Hoc totū cum dimidia hemina uini te-
nuis præbeto. Aliud potabile, lagenium appella-
tum, cōmodum his quibus uenter plurimū tumet,
& reliquum corpus molle est & laxum. Radicis
bryoniæ repurgatæ drac. x. myrrhæ drach. octo,
cumini æthiopici drac. vi. anisi drac. vi. seminis cap-
paris drachmas sex, uini adstringentis sextarios ii.
passi cretici sextarios iiii. Radicem bryoniæ cū re-
liquis in mortarium cōjcto, atq; citra myrrhæ ad-
mixtionem tundito, omniaq; in uas uitreum recon-
dita affusis liquoribus macerato, & post septimum
diē percolato, ac myrrhā simul dissoluito: indeq; cy-
athos quatuor ante cibū exhibeto, & rursū interiecta
diē cyathos quinque præbeto: ac rursus interposita
diē, cyathos sex offerito, atq; deinde rursus carnē fe-
rinā assatam edēdam dato, & uinum austerū mera-
cius in potu. Aliud pharmacum, quod prospere accō-
modatur, & aquā multam per sedem educit, optime
etiā cit urinam: Granii cnidii depurati drac. iiii. ra-
dicis bryoniæ drac. iiii. scillæ crudæ mundatæ dra-
x. cumini æthiopici drac. iiii. lathyridū drac. ii. myr-
rhæ drac. iiii. uini adstringentis sextarios iiii. Arida
tusa per dies septē macerato, ita ut quotidie bene cir-
cumagites: deinde percolato, ac dissoluta myrrha,
prima diē cyathos tres præbeto, secunda duos, ter-
tia unū. Facta autem purgatione, uirium refocilla-
trice diæta utitor. Aliud, urinā ciens, aromaticum,
Crunlon à torrentis similitudine appellatum, quo
usus est Eras & Asclepiades. Oportet autē purgati-
uo quod ei præscriptum est præpurgare, atque ita
ipsum quod urinā ciet pharmacum exhibere. Purga-
tium autē quod præexhibetur hoc est. Succu tithy-
malli recentis cyathos ii. aloës drachm. iiii. Aloēm
in succo dissoluito, & in catapotia magnitudine ci-
ceris redigito, indeq; duo, aut pro uiribus dato. Por-
rò ubi probe purgaris, ipsam urinā ciens pharmacum
propinabis, cibo bis aut ter per diem exhibito. Cū
animaduersione autē utaris, & ubi urinā profluam
uideris, ne amplius dederis: quod si nō feceris, urinā
cohibere nequibis. Cōpositio ipsa hæc est. Semin-
is apii drach. x. myrrhæ dra. vii. dauci drac. vii. croci
dra. vii. mei dra. vii. phu drac. vii. acori drac. iiii.
floris iunci odorati drac. iiii. seminis foeniculi drac.
iiii. aut vi. asari dra. vi. spicæ nardi, cassiæ, cinamo-

mi, fuscis, fabina, singulorū sesquidrachmam. Excipe uino odorato, & pastillos, quosdā triobolares, quosdā diobolares, alios etiā unus oboli pōdere formato, eosq; pro uiribus præbeto. Facit & ad calculo laborantes cū uini diluti cyathis tribus. Aliud, urinam ciēs. Seminis foeniculi, cardamomi, radicis eryngij, corticis radicis capparis, cuiusq; drachmam unā, stercoris colubini cochlearia duo, contere, & cū aqua catapotia cicēris magnitudine informa, & v. ex eis quotidie præbe. Potus hydropicis cōmodus experimēto constans, qui cū per urinas, iūm per uētre m euacuat. Caroi scrupulos uiginti septē, foeniculi uncias tredecim & dimidiā, anisi scrupulos xiii. & dimidiū, cumini lati scrupulos v. mel sesquiscrupulum, iridis silliquas tres, mellis sesquilibrā, uini libras sex, exhibe mensurā mediocrem ieiunis in infessu solij balnei præcalesctam: est & suaue gustui.

Alius potus ciens urinā, ex cuius usu insignem uirum tympanite detentum, seruātū uidimus, etiā si à multis medicis iam esset detritus. Ammoniaci thymiamatis sextātem, radicis herbæ lonchitidis sextātem, petroselinī sesquiunciā, calami indicī, costi, cinaomī, spicæ nardi, piperis lōgi, myrrhē, stactes singulorum unciā unam, seminis rutę quadrātem, phudrachmas quatuor, styracis drachm. quatuor, phylli quadrātem, mellis despumati quātum sufficit. Excipe melle, & fabæ ægyptiæ magnitudine præbe, cū calidæ aquę cyathis tribus. Aliud ualde cōmodum, ducit urinam multam, & ad lumborum dolores facit, itemq; eos quibus pituita in uniuerso corpore abūdat, ad pleuriticos, peripneumonicos, quartanarios, articulorū morbum, ac tetanicos, quibusdā cum uino, aliquibus cū aceto mulso, alijs uero cum aqua mulsa. Habet autem hoc modo. Aristolochiæ, myrrhē, absinthij, abrotoni maxime seminis, iridis, canchryos, singulorū drach. iiii. anisi, cedridum, radicis panacis, pyretri, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, singulorum drac. i. cumini drach. ii. & obolum i. Digerito in pastillos, quorum aliqui tres, aliqui duos, aliqui unum obolū habeāt: eosq; pro uiribus exhibeto. Oribasij ad hydropicos. Amara ex aceto mulso cōfectio, paulatim euacuat, nihil ex uiribus subuertens: est autem in stomachicis relata. Aliud urinam ciens, Oribasij. Aluminis liquidi ad fabæ magnitudinem in aqua dissolue, & per lineum excolatum bibendum præbe. Aliud. Opobalsami, spicæ nardi, carpobalsami, cassiæ, cumini, radicis dulcis, hyperici, floris iunci odorati, asari, amomi, dauci, seminis smyrnij, petroselinī, calami aromatici, piperis, seselis, spodylij aut umbilici ueneris, omnium æquale pondus, præbe cochleariū cum uino mulso. Conducit etiā unumquodq; per se. Pessus siue talus ad hydropicas mulieres. Anisi, cumini, cardamomi, nitri, aristolochiæ, pulegij, foenigræci, medullæ ficus, omnium æquales partes cum uino subige, ac utere.

Cura post euacuationes. Cap. xxvii.

Post auxilia quę humores euacuant, ligamentis ægrū amplecti & constringere oportet, ab extremis autem partibus incipiamus, ac ligamentorum distributionem ad supernas partes faciamus: ita ut sæpe super ipsa ligamenta spongiās posca imbutas imponamus iuxta tumefactas maxime partes. Ventrī uero uniuerso quædā ex præscriptis epithematis im-

ponantur, quæ post euacuatū humorem adhibētur. Reliquum diætæ concedendum: quæ sanè in moderatis deambulationibus sita est, exercitationibusq; ac fricationibus. Adhibeantur autē & inunctiones & exercitamenta: si sol adsit, in sole, capite tamen uelato: si frigus sit, in domibus per subiectū ignem cōcalesctis; aut iuxta ignem: obuoluendi etiā ægrī in pellibus sole ustitis, aut in arenā, defodiēdi. Post exercitia extergantur, aliquando etiā lauentur propter fatigationē: in balneo autē siue in dispersione, siue confectione huiusmodi utantur. Samsuci, nitri, cumini, melanthij, seminis rutę syluestris, singulorū unciam i. foliorū rhododaphnes siccorum, sextantem. Utendum quoq; in sole luti obliuione, quemadmodum prædictum est in secundo De terrarum differentijs Sermone. Porro quum res feliciter processerit, & tumor fuerit imminutus, & uires aliquantulum in integrū restitutæ, præ omnibus ex frigida lauatio fiat. Neq; uero balneæ sponte naturæ calidæ inapte hoc tempore ipsis exhibentur: ab extersione autem cibi offerēdi: qui sanè cōmunes sint cum his qui post hydropis subter cutem curam describentur.

Cura hydropis qui proprie subtercus appellatur. Cap. xxviii.

Hydrops subtercus, qui aliquibus etiā leucophlegmatias appellatur, maximā curadi rationem in insolationibus habet: itaq; tumefactæ partes ad solem exponantur, capite saltem uelato, cauendo etiā ne tumor uehementius supercalescat. Si enim corpus supercalescat, febres accedunt, unaq; cum ipsarū febriū generatione tumores duplicantur, atq; id multo magis quum febres remittant, ac tumor refrigerationē capiat. Utendum igitur fricatione prima quidē die per modicum oleum moderate ac molliter facta: in progressu autem & sicca & multa & cum intensione magis appressa: deinde etiā per lineæ asperiora. Oleum autem quod ad inunctionem apparatus, scillam mediocri magnitudine ad tres olei sextarios habeat incoctam, aut canchryos unciā una ad heminam olei addatur, & facta percolatione uitior. Ab inunctione autem exercitijs utantur, ac pro uiribus currant: indeq; sudorem per lineæ asperiora extergant, & post hoc oleo dulci ungantur. Cæterum post dies aliquot nitro tenuissime trito per uniuersum corpus largē cōspargantur, sustineātq; ex eius morsu exudationem, deinde rursum sudorem extergāt, ac oleo dulci ungantur. Optime autem facit & fricatio ex sale in aqua aut oleo trito donec uiscosum reddatur, si cum eo in sole aut iuxta ignē fricentur. Valde enim celeriter & sudores elicit plurimos, & carnē cogit, siue in sole, siue iuxta ignem defricetur, modo caput habeāt probe contectū. Utendum & in puluere uolutionibus, si aut cimolia tenuissime trita substernatur, aut super asium lapidē deuoluatur. Aliquādo autē & arena probe à sole ignita, aut pellibus similiter à sole feruefactis ægrum occulere oportet, capite tantum uelato, & facie cum spongia assidue extersa. Post hæc autem aqua marina, aut etiā aluminosa aut sulphurulenta lauetur. Aliquibus enim qui ad huiusmodi lauacra adsueuerunt, ea ipsa tum ad deterendum morbum, tum ad habitum ualentiores reddendum suffecerūt. Adhibenda etiā his obliuio ex luto, ueluti prædictum est in secundo De terrarum differentijs Sermone.

Cura

Cataplasmatum ex libris Asclepiade. Cap. xxi.
Optime conuenit & his cataplasmatum ad molitio, eo-
rum præsertim quæ resiccare simul & uisceribus fir-
mitatem addere possunt, pueris maxime ac alijs qui
mollem carnem habent: qualia sunt ex malis coro-
neis, myrti baccis, pampinis uitis, malicorio, ac lentis
cula decocta, aliquando quidem per se, aliquando in-
uicem permixtis. Efficacissima sunt etiam corna ex a-
cinata tenuiter trita: item rhus culinaris cum polen-
tæ flore, & quæ eis similia existunt, & alumen sanè
cum duabus adipis caprinis partibus subactum. Neque
uero incoueniens ruta ipsa censetur, si per interualla
adhibeatur, neque bulbi cum melle triti. Plurimum etiã co-
hibent ac adstringunt tumore organus, aut thyma,
aut absinthium, aut hyssopum, aut nitrum cum caridis dili-
genter trita: aliquando hæc ipsa liliaceæ farina in po-
sca decoctæ permixta adhibentur. Stercus item bubu-
lum conuenienter resiccatum, non inepte cum posca
aut aceto mulso imponitur, infarsa sulphuris quar-
ta parte. Cæcus quoque recens multum coaguli habens,
optime ad omnes tumentes partes impositus facit.
Similiter & co-hleæ crudæ tritæ & impositæ: adglu-
tinatur enim neque discedit priusquam uniuersus hu-
mor resiccet: fermentum etiam sale multo permixtum
comode locis adhibetur, aut panis cum puluere hyss-
opi: aut fabacea farina aqua marina & melle cocta,
pari absinthij modo adiecto: aut farinam halicæ fer-
mentato, & cum raphani emolliato cortice imponi-
to: aut lentem palustrem in figulino uase siccato, ac
terito, & cum prædictis cataplasmatibus uice imponi-
to. Porro ex eorum quæ tumores cohibent numero,
est & id quod byne appellatur: est autem ordeum mado-
factum, quod germen emisit, & deinde unum cum ena-
cis ligulis tostum est: si tritum pro cataplasmate im-
ponatur. In principio igitur adstringentibus cata-
plasmatis utendum est, deinde paulatim ad resiccantia
transcundum, postremum etiam ea quæ firmitatem
addunt adijcienda. Cæterum omnia impinguantia &
resinosa, cerata, ac malagmata, similiaque uitanda
sunt, uelut quæ inflent & tumores distendant. Assi-
due autem & crura, & manus, aliaque tumefactæ
partes in sole aut iuxta ignem, ex his inungantur.
Sulphuris usus, thuris, aluminis scissi, æquales sin-
gulorum partes aceto conterere, ac utere. Experiri etiã
Herodoti remedium conuenit, neque enim minus
quam ipsa fricatio auxiliari potest: uelut itaque bu-
bulis aut etiam alijs magnis omnino, ac probe infla-
tis, & uacuis, tumentes locos pulsato, atque id auto-
ritate tum Archigenis, tum Herodoti facito: inde enim
extra molestiam caro condensatur, neque dolore,
neque percussione duriore resultant.

Chirurgia hydropis subter cutem. Cap. xx.
Omnibus prædictis efficacius auxilium in hac hydro-
pis specie chirurgia præstat, Asclepiade autore. Fissu-
ra autem circa internum talum infligere oportet in loco
quatuor digitorum spatio supra talum eminente, ea pro-
funditate, qua quis in uenæ sectione utatur. Pauco
enim sanguine in principio euacuato, per reliquum tem-
pus indefinenter aquosius excretio procedit, citra
omnem inflammationem, ut neque claudat fissura possit,
nisi humore omni ante expenso, & homine gracili
relieto, atque id citò contingit, nulla inflammatione fissu-
râ occupata, sed ipsa in quadam congruenti temperie
permanente, quo omne alienum per ipsam excoletur,

& ut nullo opus sit extrinseco pharmaco. Præterea
periculum hic nullum uerendum est, uelut in hydropis
ascitæ pertusione: non enim coaceruatim quædam mo-
dum illi euacuatur: at uero si quis uelit, excretionem plu-
rima facta, eam cohibere, nihil ueretur ipsas in talis
fissuras linamentis obstruere, ligamentis quoque cōstringe-
re, atque ubi rursus prodire quid uelimus, laxatis li-
gamentis, & ablatis linamentis, gestatoque ac moto
ægro, excretionem irritare. Leonides autem inquit,
Quod si excretio fissuræ supra talos tardius prodeat
necesse est etiam alias corporis partes findendo diduce-
re: uelut scrotum tumefactum, scemora, pudenda,
locus supra manuum iuncturas. Quidam enim uulnuso-
culis pluribus ac altioribus inculsis, plurimam aquo-
sam substantiam exhauserunt. Et Hippocrates sanè non
supra talos adhibet chirurgiam, sed iuxta scrotum &
scemora uulnuscula infligere iubet, eaque sale maxi-
mè cōfricare: hic enim modus paulatim & incessan-
ter humorem educit, & ualde celerem compressionem tur-
mores ipsos recipere, ipse tradit. Porro si aliquibus
excretionem amplius mouere uelimus, post impacta
uulnuscula, & talorum laniationes, eos ipsos pro-
deambulatione, serculo gestamus, aut lectica sub-
limes circumuectamus. Cæterum Archigenes ita pro-
dit, Non sunt audiendi, inquit, qui per huiusmodi lani-
ationes nihil externi dicunt, quin potius cum fidu-
cia hæc ipsæ incutiendæ: nam & nos, inquit, his cutis
fissuris sumus usi, & per ipsas quam plurimum ex-
clusimus humorem, ut & scemora, & suræ, & supe-
rior uenter euidenter sint demissa ac compressa.

Reliqua prædictorum cura. Cap. xxxi.
Maximum hydropis subter cutem auxilium uomitus
præstat, quod ipsum difficile est in ætate puerili adhi-
bere, propterea quod non facile, ut id admittant per-
suaderi possunt: quare uarias excogitauimus artes,
quibus uomitum condecimus: consillas uidelicet pin-
nulis aut digitis oleo illitis iritando: aut ficus assata
oleo imbuta & pipæris puluere cōspersa, post deambu-
lationes à somno exhibeatur. Butyrum etiam cum melle
gustandum præbeat: aut raphanus coctus adipse
codicis detur, aut balsamum pingue cum oleo mul-
to offeratur, aliquando etiam aceto ammixto. Sunt &
alia plurima quæ uomitum mouent, relata in tertio
Sermonem. Amplius autem tum uentrem, tum intestina
ligamentis adstringant, itidemque omnem cutis coër-
ceant tumorem. Fiant autem ligationes ab extremis partibus
incipiendo, & ad supernas procedendo. Vincenda
etiam partes, manus uidelicet & pedes, oleo cyprino
prius illinantur: spongiæ licet imponatur late ab acida
muria optime expressæ: potest & funis odoratus,
aut rosmarinus, aut pulegiū, aut calamintum, & ma-
xime omnium absinthium in ipso aceto decoqui. Post
uero ligationes ipsis spongiis circumdantur. A uomitu
prospiciendum ut inferior alui inclinationem ad-
uocandum permute: ueteri balsamento crudo ante ci-
bum reliquum accepto. Mercurialis licet cocta sale quoque
oleo codita in uino cincta sumatur: aut decoctum
ipsius sesquicyathum cum sale dato: quod etiam in ascite
dicta his exhibeto. Præbenda & quæ urinam dant, uelut
est daucus, scelis, cardamomum, radicem asparagi deco-
ctum, trixaginis, radicis trifolij decoctum, aut ipsius ra-
dicis dra. i. ex uini cyathis iiii. radix eryngij sicca cum
uino, licet decoctum eius in potu acceptum, seminis uiscis
drachma una. Comode etiam seminis hyacinthi bulbi

*cap. 3. talos scarificat in tumore
cap. 3. inuident in gangrena*

drachma una cum vini cyathis tribus potatur: urinā enim ducit. Quidam autem hyacinthi flore coria tingunt. Inter omnia autem pharmaca quæ omnibus hydropicis, maxime tamen eis qui subtercutaneo dicto laborant, exhibentur: præstantissimi sales theriaci censentur tum cibus ammixti, tum in liquamenta additi eorum qui ad perfectā ætatem peruenerunt. Eorum autem apparatus in XIII. reperies Sermone.

Communis diæta omnium hydropicorum: Archigenis. Cap. XXXII.

Post quotidiana exercitia communis omnibus hydropicis diæta hæc sit. Ab aridarum rerum comestione initium faciemus: quod si tamen intensa sitis instet, parum quid delibandum dabimus solati tantum gratia, & leniendę sitis. Sit autem uniuersus cibus facilis concoctu & sufficienter coactus: exolutus enim aptus est ut in aquositate commutetur: sit itaq; panis optimus clibanites, qui salem, ammiū, & fœniculum habeat admixtum, conueniunt etiā cochleę assatę, oua assata, & auleulę sicciore, uelut perdices, coturnices, turtures. Ex terrestribus, lepus, capra syluestris, dorcadēs. Ex mansuetis extremæ suum partes: ex aquatilibus, cancri, locustę, herinacci recētes, squillę. Olerum rarus sit usus: quæ uero ex eis exhibentur acriora sint, & magis syluestria, uelut est co-

ronopus, eryngium, pastinaca, porri capitati, allia cocta. A leguminibus uero abstineant in totum. Pro liquamine urantur aceto cum pipere & lasere, aut quibusdam ex oxyporis cito penetrantibus ad colicos descriptis. Sales sint ex rosmarino, fœniculo, hyssopo, silphio, ligustico, & apri semine compositi. In potu tantū præbendum quantū ad infringendā aliquo modo sitim sufficit: incōmodus est enim eis plurimus potus. Porro maximā ciborum partem in cœna accipiant: omnes autem placentas ex simagine & passo apparatus uident, plurimos iudem fructus & secundas mensas. Concedendę tamē palmulę, nuces, amygdalę, uua pensilis, mala punica, plera cocta, ac caricę, omnia moderate, neq; omnia quotidie. Vinū autē sit tenue, & quod ciet urinā. Dulcia uero uina & uinum mulsum uitanda. Lectus nō ualde mollis sit, præsertim his qui hydrope subtercutē laborant: substernantur autem arundinum folia, & herbę resiccantes, uelut est uitex, pulegium, calaminthe, & similia. Mirum est enim quātum huiusmodi per somnum resiccant, ut constet iam quosdā frumēti acerbis obuolutos & absconditos a somno surrexisse firmos ac resiccatos. Opercula etiā ipsa quibus teguntur, apparentur duriora. Moderata autem sit & probe temperata ipsa domus secundum anni tēpus.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

VNDECIMO SERMONE AETII
CONTINENTVR.

DE diabete, hoc est profluuiū urinae. cap. I.
De renū cruentam urinam excernentium debilitate. cap. II.
De his qui per circuitum quendam sanguinem mingunt. cap. III.
De calculosis renibus. cap. IIII.
Cura renū calculosorum. cap. V.
Diæta præseruans ne lapides renascantur. cap. VI.
Vnguentū renale, Oribasij. cap. VII.
Diæta eorum quibus renes a lapide laborant, reliqui uero totius corporis habitus gracilis est. cap. VIII.
De calculosa uesica. cap. IX.
Pharmaca lapides uesicę atterētia & urinam ducentia. cap. X.
Communia remedia uesicę & renū calculosorum. cap. XI.
De hircino sanguine. cap. XII.
Antidoti uarię ad calculosos. caput XIII.

Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neq; item per lotium excerni. cap. XIII.
Diæta post exactos lapides, adseruans ne alij renascantur: & de affligētis humoris cognitione ex lapidis colore. cap. XV.
De renū inflammatione. cap. XVI.
De duritie renū. cap. XVII.
De suppuratis renibus. cap. XVIII.
De disuria, id est, emittendi urinā difficultate: & stranguria, id est, stillicidio urinæ. cap. XIX.
De difficultate emittendi urinam in febribus. cap. XX.
De ischuria, id est, urinæ suppressione. cap. XXI.
De scabiosa uesica. cap. XXII.
Simplicia remedia ad suppressam ac egre prodeuntem urinam, si aut eius multitudo, aut crassities in causa sit. caput XXIII.

De resoluta per paralysim uesica. caput XXIIII.
Ad eos qui se in somno permingunt. cap. XXV.
De inflammatione uesicę. cap. XXVI.
De sanguinis ex uesica eruptione, & de grumis eiusdem. cap. XXVII.
Quę tubercula in uesica concoctione indigent. cap. XXVIII.
De uesicę ulceribus. cap. XXIX.
Diæta ex libris Archigenis. ca. XXX.
De uesicę fluxione, & his quę capillorum formā exeunt cum urina caput XXXI.
De priapismo & satyriasi: Galeni. caput XXXII.
De seminis profluuiū: Galeni. caput XXXIII.
De seminis in somnis profluuiū. caput XXXIIII.
De his qui re uenerea uti non possunt. caput XXXV.

CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QVATERNIONIS

TERII SERMO TERTIVS ET XX

ORDINE VNDECIMVS.

De Renum & uesicae affectionibus: Et de priapismo, ac seminis profluvio, rebusq; uenericis.

De diabete, hoc est profluvio urinae. Cap. I.



DIABETES diuturna est affectio circa renes consistens, multum potum inducens una cum hoc quod quicquid bibitur, simul ut acceptum est per urinam rejicitur. Quod autem affectionem hanc hydro-

pse, siue hyderum, & siphonem a fonsi instrumenti similitudine appellant, alij urinam leuitatem uocant, alij dyspnoeam ab inexplibili siti appellare. Comomitur aegros pertinax sitis, neque ulla satietas ex alicuius liquoris exhibitione contingit. Aliquando & sitis supra sitim inexplibiliter aegros urget, hoc est, ut assidue potum assumere cogantur, neque tamen satiantur, propterea quod citissime per lotium expellitur potum. Ceterum proprius renum affectus diabetes existit, qui uidelicet immoderate humorem appetit, ipsumque propter debilitatem retentum in eis facultatis continere non possunt. Quodadmodum enim in appetitionibus caninis, & in quibusdam lienterijs uehementissime quidam appetitum oboriuntur, quae multos cibos, eosque assatim accipere cogunt, uerum nihil ferè ex acceptis retinetur: sed in caninis quidam appetitionibus ob grauitatem reuomuntur: in lienterijs uero tum ob grauitatem, tum ob praesentem retentum facultatis infirmitatem, inferne cruda excernuntur. Eodem modo etiam in renibus uehementissima serosi humoris appetitio contingit, propter debilitatem autem retentum in eis potum, cum ipsum humorem acuatim in uesicam excernunt. Aretaeus etiam haec addit, Viscera ipsis uris uidentur, anxij sunt ac animo dubij, & non longe post moriuntur: igne amplius ardere se putant, acceditque sitis & mictio festina: sed quauis aliquando parumper urinam retineant, intumescunt lumbi, testes, & coxae: quod si adhuc amplius mordens caliditas in uisceribus augeatur, superior uenter corrugatur, & uenae in ipso eleuantur, uniuersum habitum gracile habet, & tabes totius corporis grauis accedit. Porro alij sunt qui non mingant, neque ex eis alias potatum traspirat. Quare ob potus insatietatem, & humoris inundationem, & uesicae circumtensionem, acuatim uentre rupuntur. Ceterum humores uisiosi in ipso renum corpore imbibiti, affectionem ipsam inducunt. Scopos igitur in curationibus nobis sit, ut humorum acredinem deleamus, sanguinemque ac cum eo permixtum serosum humorem ad motum tardiores reddamus, & renum intemperiem reuocemus. Archigenis. Itaque mox ubi acceperit malum, nondum ad perfectionem progressum, optimum est cubiti secare uenam, & moderate sanguinem auferre. Utendum etiam medio critico urinam cietibus, quae uisatim in renes imbibitum humorem repurgare possunt. Quod si uero inueteratum sit malum, neque uenae sectio assumatur, neque quicquam quod urinam ciet exhibeatur. Coccidit enim in inueteratis uires, & ex uenae incisione totum corpus acrius redditur, & urinam cietia in ipsis multiplicat malum. Maximum autem remedium huic affectioni, ut statim potum reuomatur. Sit autem perquam frigidus ipse potus,

reliqua ite dicta conuenit uti frigidiores: quare olera refrigerantia minimeque urinam cietia in cibo profunt, pro sorbitione autem pilasque succus frigidus probatur. Materia etiam ipsa ad exudationem diuertenda. Optima uero, inquit Aretaeus, est in dolio facta euaporatio, ad exudandum, eo modo ut caput extra dolum promineat: frigidumque aerem attrahat, reliquum uero corpus omne cale fiat. De cetero uelut est uat febre, causon Graeci appellant, curare oportet, quo celerrime sitis extinguatur: polenta itaque flore aceto & rosaceo subactum cataplasma matris modo praecordijs imposito, uitis item folia tenera trita, aut umbilici ueneris, aut portulacae, aut seridis, & quaecumque alia consimilia: praebibendum etiam sanguinariae succum ex uino nigro assidue praebito. Symphytum item & palmarum cremorem, baccarumque myrti & pirorum. Vermes quoque terrenos coctos ex aliquo praedictorum succorum. Cibi exhibeantur boni succi, mordacitate carentes, & qui acredinem obtundere possunt, uelut sunt oua sorbilia, & similago, & halicaca ad sorbitionis formam apparata, carnes porcinae macrae probe coctae. Vinum sit rufum, crassius, frigida amplius dilutum, ad falluginosorum humorum proluitionem, qui sitim inducunt. Vinum enim corporis miscellam ad dulcorem permutat: neque uero incommodè exhibetur eis caseus reces compactus citra sale, & lac persilices aut ferrum ignitum scissum, seroso humore adempto. Porro si praedicta auxilia frustra adhibeantur, affectioque ipsa augeat, non absurdum fuerit etiam stuporem inducentibus uti, ita ut soporiferum antidotum ex papauerum capitibus apparatum exhibeamus, aut aliquem ex dolores leuantibus pastillis, infuso etiam soporifero utendum, uelut est opium erui magnitudine cum pari modo castorei, aut etiam maiore: haec in passo cretico dissoluantur: non ut in colicis fieri solet, cum oleo rutaceo: refrigerare enim in his praesumimus. Infunditur etiam utiliter oleum in quo uermes terreni sunt decocti. Forinsecus autem retro ad lumbos & ad pectinem illitiones & cataplasmata refrigerantia adhibenda, qualia sunt quae ex lactuca, umbilico ueneris, lenticula palustris, perdicio, & similibus apparantur. Cerata etiam his locis ex rosaceo adornata imponenda, aut ex chamaemelino quibusdam ex praedictis succis ammixtis. In quibus autem uehementer stupefacere sensum intendimus, etiam mandragorae succum in cerata ammiscemus, foliorum ite papaueris succum, & similia. Per interualla autem quaedam, etiam antidoti ad lethalia uenena destinata exhibeantur, & maxime theriace ex uiperis coctas, Andromachi inueto, reces apparata, & ea quae Esdrae inscribitur.

De renum cruentam urinam excernentium debilitate: ex libris Rufi.

Cap. II.

Renum porro & alia affectio est, in qua tenue sanguinis serum mingitur, quod ipsum ite propter renum debilitatem contingit, quemadmodum in hepate fieri solere diximus, atque propter amplitudinem osculorum ex uena caua urinam ad renes excolantium. Quum enim ampliores meatus sint, quiddam etiam ex sanguine uenae laxatum emittit: aliaque itidem crassa: adeo

fatadeo ut postquam ea quæ micta sunt cōstiterint, subsidentiā quēdā in uase reperiātur, & superne quēdam concreta, marinum maxime pulmonē similitudine referentia. Concocto igitur cibo & in uenas distributo, qualia dicta sunt minguntur: recens autē ingesto & crudo adhuc cibo, pura & aquosa, quæ nihil subsidens habent, per lotium efficiuntur. Nihil uero dolitant, aut omnino parū, & eiecto lotio leuati melius habent. Extenuantur autē & emaciantur tēporis progressu omnes, & magis adhuc hi qui plus sanguinis mictu excernunt. A principio itaq; cōuenit his quies, & cibi adstringentes, & uinum nigrū in potu. Ab his quæ urinā cient, & à coitu omnino abstinendum. In potu autem hæmoptoica pharmaca exhibenda, maxime uero sanguinariæ succus, & radicis symphyti decoctum: & tragacanthus in uino nigro macerata. Sistit uero sanguinis ex renibus eruptiones stratiotæ aquis innatātis succus potatus, & radicis magnæ crocodiliadis iuxta aquas nascentis, quam Syri orophen appellāt, decoctum, pēoniar siue glycyfides grana fulua xii, ex uino. Cornu ceruini usti drachma una ex uino, folia salicis trita cum uino, lysimachij succus, lapidis hæmatitæ drachma una, ramentorum loti arboris cremor, radicis spinæ albæ decoctū, & similia, quæ in sermone de hæmoptoicis sunt prædicta. Forinsecus autē renibus & lūbis imponuntur ea quæ ad muliebre fluxū describentur epithemata, item ea quæ ad sanguinis per sputum refectiones sunt descripta: & quæcunque unā cum eo, quod adstringunt & resiccant, etiam robur addere possunt: qualia sunt rubi folia, & glandes, & myrti ac quercus folia, itemq; myrti bacca, malicorij & balauſtia, & perdicij folia, & similia palmis palsis excepta, & imposita. Post hæc habitus cibarij, lacte ac aulcularū carnibus, suillis etiā ac macris reficiendus est, quo uniuersum corpus ad pristinas uires reducat, & renes corroborati propriū obeant munus. Est autem proprium renum munus, serosum humorem à sanguine secernere & excolare.

De his qui per circuitum quendam sanguinē mingunt: Archigenis. Cap. III.

Quidam per circuitus quosdam sanguinem ex renibus excernunt, simili modo ut ex hæmorrhoidibus in se de fieri consuevit: & in principio quidem propterea quod citra ullum aliquem dolorē excernitur, nihil in totum mali formidant ægri: ubi uero diuturnior fuerit affectio, & aliquando cohibeatur quod pro more excerni consuevit, grauitatē inducit, aliorūq; pessimorum morborum causa existit, sanguine nimirū ad alias particulas dilabente. articulares enim affectiones in aliquibus ex cohibitione accidunt, aut uertigines, aut deliria ex atra bile, & insanias, aut oculorum cæcitates, qualia etiam mala hæmorrhoidibus cohibitis contingunt: ut plurimum uero in malum habitum corporis & hydropem delabendi apertudo inde oboritur. Manifestum autem fit sanguinem ex renibus excerni, quod ipsi ægri excreti sanguinis transitum iuxta renum locum sæpe sensu percipiunt, & maxime quum urinæ ammixtus sanguis reperitur. Contingit affectio hæc magis in ætate uigoris, præsertim iuuenibus qui licētius rebus ueneris utuntur. Quidam autem sanguinem ex renibus excernunt, propter uenæ rupturam in renibus factā. Quemadmodum contingit his qui graue onus leua-

runt, aut ualde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale uiolentum perulerunt. Aliquando autem & ob acres ex supernis defluentes humores erosio uenarum contingit. Conandum igitur statim in principio, ut sanguinis impetus cohibeatur, præsertim in his qui eum secundum circuitum excernunt. Si enim ab exercitatione, ut dictum est, excretio contingit, non tuto cohibetur, itaq; uenæ sectio in cubito commoda fuerit his qui per circuitum sanguinem excernunt, paulo ante circuitum adhibita, eis uero quibus ob ruptam uenam promanat, statim in principio. Cæterum sanguinis detractio nem partiri melius erit, ut paulatim eius reuulsio ac diuersio fiat. Locis autem circa renes spongij posca imbutis cooperiantur, aut lanis succidis cum rosaceo & aceto. Post hæc & emplastra imponenda cruentis uulneribus glutinandis apta. Commode etiam cucurbita adhibetur, præsertim si suspicio sit inflammationem adesse in his, qui ob uenæ rupturam sanguinem mingunt. Cōueniunt item potiones hæmoptoicis aptæ. Porro ubi sanguinis excretio cessauerit, diæta utendum est, unde non mulius sanguis gignatur, maxime in his qui per circuitum excreuerunt, & supernæ corporis partes assidue exercendæ. In his uero qui ob uenam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionem curabimus per ea quæ in loco de exulceratione dicuntur. Emplastrum renale. Cere sesquifunciam, croci staterem unum, uiscellorum ouorum numero duo, palmarum numero decem, aceti & rosacei quantum satis est.

De calculosis renibus: Archigenis & Philagrii. Cap. III.

Renū calculis homines propectæ ætatis magis quam pueri apprehenduntur: quemadmodum uesicæ calculis pueri frequentius quam ætate propecti. Causæ autem generationis horum calculorum assidue existunt cruditates, unde materię incoctæ ac crudæ multitudo congregatur, & ardor circa renes & uescam exoritur, qui humores adassans eos cogit, & in lapidem indurat, ad modum toforum qui in aquis reperiuntur, quæ in æreis præsertim balnearum uasis coquuntur. Consistunt autem lapides in renibus iuxta uentriculos ipsorum aut parui, aut maiores: & aliquando quidem pauciores, aliquando autem plures: & magnitudine, & forma, & colore, & asperitate, & multitudine inter se differentes: nigri enim & subalbidij & pallidij reperiuntur. Ex eorū numero rotundi & leues facile excernuntur, nō itē qui alia quacūq; forma præditi sunt, maxime tamē oblongi & asperi difficulter excernuntur. Accedit ægris loci dolor, tumore nusquā foris apparente, nisi inflammatio per lapillos producat: spina egre flecti potest, & totū corpus ad motū pigrū est: crura torpēt, & maxime crus reni affecto propinquū. Urinæ circa obturationis principij pauca, aquosæ minguntur: postea uero perfecta earum suppressio cōtingit, aliusq; nihil excernit, uerū propriiudines multas ad egerendū facit. Excernitur autē aliquādo sanguis propter uiolentiā calculorū, præsertim asperiorū. Cæterū ubi lapis ex renibus fuerit emotus, & ad uescam delatus, urinæ multæ prodeunt arenosam subsidentiā habentes, & aluus similiter large egerit. Sensum autem æger percipit, ueluti calculo à renibus ad uescam transeunte. Cura

Cura renum calculosorum.

Cap. v.

Quum lapis in renibus fuerit obturatus, & uehementissimos intulerit dolores, sanguinis etiam multitudo periculum minitantis materias ad tensionem affectam partem aduocat, ob acutos uidelicet dolores. Vena igitur cubiti propinqua manus in corpore ex repletione affecto secanda est: uerum multo minus euacuandum est quam ipsa repletionis copia expostulat: neque enim futurum speramus, ut omnino cito e renibus excidat lapis, praesertim si magnus existat: quare seruire oportet sanguini in eam quae cum tempore futura est in corpore expensam. Itaque qui sanguinis multitudinem congregarunt, eis uenae sectio commoda existit: qui uero uicioso humore abundant, eis purgatio apta est, quae abundanti humori conueniens erit, neque omittenda haec est, nisi aliud quidpiam id fieri prohibeat. Post sanguinem euacuatum aut expurgatum humorem, communis ad omnes calculosos curatio quam infra subiecimus adhibenda. Doloribus igitur repente aut paulatim irruentibus, & per arenularum cum urinis excretionem aut etis: deindeque aquosis urinis excretis, & praedictis signis consequentibus aegri aluo per clysterem infundere oportet fursurum decoctum, caricarumque ac foeni graeci & aristolochiae: & si quidem decenter euacuentur, sinere: si uero non, etiam bis aut tertium infundere, atque id maxime si uenae sectae aut purgationis auxilium sit relictum. Caeterum ubi sufficienter excreuerit uenter, quaedam infundere oportet, quae corpusculorum circum lapidem sitorum inflammationes lenire & laxare possunt: id ipsum uero oleum anethinum facere poterit, adipe gallinaceo recenti in eo eliquato, & maxime anserino, & phasiani, aut etiam butyro: quae si non adsint, etiam foenum graecum & althaeae radicem oleo decocta infundemus. Infectiones item in balneis assumendae, ex decocto foeni graeci, althaeae, anethi, artemisiae, caricarum, & oleo. Maxime uero assumendae sunt infectiones in balneis, & post hoc statim aegri in solium tepidius demittendi, atque id assidue facere non ab re est. Fomenta quoque locis admota commodant ex fursuribus, praesertim in praedictis decoctionibus incoctis. Post fomenta conueniunt cataplasmata ex farina tritici, cum semine lini & foeni graeci, melleque & oleo anethino aut gleucino, ita ut in decoquendo etiam althaeae radicem costusam & cribratam cataplasmati inserciamus: in fine autem cocturae terebinthina quoque inijciatur. Optimum etiam cataplasma sit ex lupinorum farina in passo cocta, peucedani radice quam tenuissime trita, & chamaemelo in puluerem redacto ad farinam lupinorum ammixtis. Bonum est & panem passo decoctum circa lumbos & uentrem imponere, neque tamen absurdum foret eadem cataplasmata uesicae ac peccini adhibere. Oportet autem coaceruatim alia super alia cataplasmata adferre, priusquam primum frigescat: aut si id non libeat, calefactorio alio extrate tegere ne refrigerentur: id quod commodè fieri potest per saccellos, aut alia uaporatoria cataplasmati imposita. Multis enim ad lapidis per urinam excretionem haec sola suffecerunt: uerum tu etiam ea quae urinam cient praebibenda dato. Urinam autem multam ducit, mei athamantici, phu pontici, acori, graminis, & nardi decoctum, calami aromatici, ammi, dauci, oreoselini, hyperici, rosamarin, asari, radi-

cis asphodeli, radice bryoniae decoctum, coccus iunctiorius. Ex his singula eisque similia tum per se, tum inuicem permixta data, urinam manifeste mouent. Crassa autem lotia ducit, radice cardui decoctum, radice rubiae farina potata, radice capparis cortex, & similia. Exuscitat autem facultates ad excretionem irritando, allium, chamaedaphne, asparagi uitis albae, asparagus, tertium scillae decoctum, primo ac secundo diffuso. Deducunt autem ad renes ea quae calculos confringunt, peucedani radix, bryonia, apium, radícula. Caeterum lapides ipsos in renibus confringunt, ac atterunt, si o, aditahum, bdellium, uitis semen, oxymyrsines radix, radice lauri cortex, paluri semen, tribuli decoctum, sarxiphagi, betonicae, radice graminis, damasonii radice, ciceris iusculum, radix cyperi, lithospermum, te colitho a liquefaciendo lapide dictum, lappae, quae philanthropos & xanthium dicitur, semen quod in spinosis pilulis reperitur, & lithospermum alsimilatur: asparagi palustris radices, uitrum combustum tritum, althaeae semen & radix, rumicis domestici radix, pruni arboris gummi, ex spogis marinis lapilli, uermes terreni cocti: horum singula partim decocta, partim tenuissime trita, praebeto bibenda. Sunt & composita plurima lapidem frangentia, ex quorum numero utiliora in cura calculosae uesicae subiungam. Porro ea quae urinam cient ac lapide frangunt, tunc exhibere conuenit, quum uehementes dolores remittunt. Transmoto enim lapide & ex sede agitato dolores quiescunt. Quod si obfirmati sint lapides, plurimus potus uitandus, itemque ea quae urinam ducunt. fomentis autem & cataplasmatibus ac infectionibus membra relaxanda, & uenter per infusa ac infectiones euacuandus, ne ureteres meatus urinam ex renibus ad uesicam transmittentes comprimantur. Post haec autem doloribus aliquantulum lenitis, etiam cucurbitae utiliter ipsis adhibentur & praesertim pressius affixae, inflammatione uidelicet id non impediēte. Adeo enim coaceruatim transmouent saepe cucurbitae ipsos lapides, ut repente dolores suppriment, lapide nimirum in uesicae amplitudinem transueto: quapropter in principio superne a rene cucurbitae sunt affigendae, & ad inguina adtrahendae oblique secundum meatuum qui ureteres appellantur situm. Caeterum si calidius sit aegri corpus, sitisque uehementer infestet: sit autem uniuersum corpus iam per uenae sectionem, aut purgationem, & efficacissimos clysteres praevacuatum, ac nulla superfluitate abundet, si quidem consueti fuerint ad frigida potum, & nullum ex uisceribus debile existat, frigidam aquam frequenter & aceruatim aegro bibendam exhibuimus, & confestim corroboratis renibus, obturatum in ipsis lapidem expulerunt. In repletis autem corporibus & abundantibus superfluitatibus, & in his qui uiscera debilia habent, uitare oportet frigida potum. Saepē autem delati ex renibus in uesicam lapides, & praemagnitudine circa collam uesicae decenti, in extremum periculum aegrum deducunt, tum propter dolorum acumen, tum quod urinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita ut supini siuentur, & longe altiores coxarum uertebras habeant: deinde multiformiter eos commouere, quo omnibus machinamentis adhibitis lapidem ex ipso uesicae meatu excidere faciamus: post uero aegros iubere

subere ut alacriter urinam efficiant, & electo lotio si-
neretatur ubi lapis non fuerit euacuatus, rursus
mouere, atque hoc ipsum saepe repetere. Quod si non
euacuetur, catheter instrumentum prolectandae uri-
nae aptum immittatur, quod pro aegri aetate con-
gruenter sit moderatum: eoque humor educatur:
post uero per portiones lapidem in amplitudine uesi-
cae existentem confringere ualentes, lapis ipse attera-
tur. Si uero ex uesica quidem excidat calculus, iuxta
medium autem meatuum ipsius pudendi obfirme-
tur, & uulnerando exulcerationis periculum indu-
cat, decoctum quoddam ex praedictis urinam ducenti-
bus plurimum exhibendum est, iubendusque aeger ut
multam urinam congreget, eamque postea emingat
ac diligentius expellat: ita enim detractus lapis cele-
riter excidere consuevit. Noui autem, inquit Phila-
grius, quendam in quo quidem alias lapis fuit pro-
gressus, non penitus autem quam in summo puden-
do fortiter obturatus, & parum absuit quin homo
periret, propter urinae suppressionem, & maximam do-
lorem. Angusta igitur uollesella ipsum lapidem ex-
trahere non potuimus, quare sensim & quiete agita-
uimus perquam tenui auriculario specillo. quum ue-
ro neque hoc modo eum extrahere possemus, secare
statuimus, uulnuscule superne iuxta glandis magni-
tudinem incusso. Inferne enim secare non expedit,
quandoquidem ferè semper in fistulam proficit, ac po-
stea per ipsam fissuram urina excernitur. Porro ubi
per urinam prodierit lapis, lac asininum melle mo-
dico mixtum praebetur, & reliqua etiam diæta com-
modior, ueluti ad ulcera fieri consuevit, constituitur,
ob uexationem uidelicet in locis ex lapide factam.
Inde uero praeseruare hominem oportet, ne rursus
renes lapide infestentur. Smegma Archigenis, ad
uesicam & renes affectos, ut arenam per lotium excer-
nant, quo in balneis sudans utaris. Piperis, calcis
uiuae, sinapis, fecis uini uistae, staphidis syluestris, ni-
tri, adarces, pumicis, aluminis scissi, sulphuris uiui,
aequalibus partibus utere. Ex oleo praellitis locis.

Diæta praeseruans ne lapides renascantur. Cap. vi.
Maximi ad lapidis generationem praecauendam mo-
menti, moderatus cibus & bonae concoctiones exi-
stunt: satietates enim & cruditates non solum exasper-
rant morbum, sed etiam quum non sit, generant. qua-
re aegros admonere oportet, ut à coena saepe uomant,
& absinthium assidue bibant, & per tempus certum
conuenientis temperaturae ipsorum purgatio pharmaco
se per uentrem purgent. Cibos autem deligant è
quibus neque satietates neque cruditates contingant: uri-
nam etiam cientibus utantur: pastinacam in dies eden-
tes ualde percoctam, & foeniculum, sion, carduum, pule-
gium, calamintum. Et ex marinis herinacios recen-
tes, strombos, locustas, gammaros, & cæcos fluuiati-
les; atque haec quidem quotidiana sint, per plures au-
tem dies radicis eryngii decoctum bibant, similiterque
trixaginis, & dictamni, ac radicis tribuli, reliquaque
pharmaca lapidem atterentia partim iam praedicta,
partim dicenda. Oportet autem ipsam etiam aquam
per omnem uictum purissimam esse & percolatam:
uinum item tenue, album, urinam ciens: exercitum
ris uero utendum est mediocribus, & frictionibus
in balneis ex nitro affato, & fece uini uista, ac pumi-
ce: philothris item assidue utantur, ac reliqua adseruā-
te diæta, quae in calculosae uesicae loco dicitur.

Vnguentum renale, Oribasij. Cap. vii.
Cyprini lib. iiii. ceræ lib. ii. terebinthinae lib. i. unguen-
ti amaracini & laurini cuiusque lib. i. centaureae, casto-
rii, sairyrii, myrrhae, piperis, euphorbii, culusque qua-
drante: cyperi, pyretri, pulegii, culusque unciam i. sub-
ige, & in fine etiam opobalsami trientem ammi-
sce. Quidam euphorbii sesquunciam tantum adijciunt.
Aliud malagma: hoc exquisitum est ad eos quibus
renes aut uesica lapide laborant, inquit Archigenes:
neque reperias aliud his affectionibus conuenientius.
Pisces liquide, italicas heminas duas & dimidiam,
ceræ, resine pinus, sulphuris uiui, cuiusque sesquili-
bram, nitri sesquilibram, pyretri sexuncem, fecis uini
uistae lib. ii. nasturii, italicum sextarium i. staphidis
syluestris sextarium unum, galbani sexuncem. Lique-
scibilibus liquefactis arida trita infarcito. Empla-
strum renale: facti ad colicos & coxendices: est autem
Asclepiade. Ceræ trientem, styracis sesquunciam, aloës
sesquunciam, croci, pyretri, opopanacis, galbani, thu-
ris, cuiusque unc. i. ammoniaci thymiamatis sextantem,
olei ueteris trientem. Apparatum ac pro more subactum
confidenter usurpato, & miraberis, inquit Asclepia-
des. Aliquando uero olei tantum sextantem coniicimus.

*Diæta eorum quibus renes è lapide laborant, reliqui
uero totius corporis habitus gracilis est: Philagrij.*
Cap. viii.
Maligna corporis constitutio est in qua renes quidem
lapidem generant, uniuersi uero corporis natura gra-
cilis existit. Etenim quum lapide laborantes phar-
macis & uictu indigeant attenuatoribus, haec ipsa gra-
cilibus corporibus maxime contraria existunt. No-
ui enim quendam qui ob renum ex lapide affectio-
nem huiusmodi diæta usus, proprios digitos aegre
mobiles, obtusi sensus, & ueluti strepentes ac exa-
refactos sensit: Medici autem ipsi familiares refrige-
ratos digitos ipsius rati, & resolutionem, quam paraly-
sin Graeci uocant, medicati, pharmaca ex euphorbio
& adarce adhibuerunt: quorum usu affectio multo pe-
ior reddita est, & accessiones semper ad superiores
partes progressae sunt: unaque uehementissimos dolo-
res intulerunt. Post uero ubi eger me accessisset, inquit
Philagrij, & quae contigerant circa ipsum decla-
rasset, auxilium meum implorabat. quare dictam ei in-
ueni, per quam citra omnem renum laesionem uniuersam
corporis siccitatem sanauit. Pisanam igitur succum,
excogitauit, & ex piscibus in petrosis aquis degentes,
itemque mariscos, & quaecumque alia nihil uiscosum
habentia. Simili modo & ex uolucrum genere quae-
cumque consimilem habet carnem, ueluti sunt perdices
montanae, attagenes, sturni, turdi, & merulae, & de-
inceps colubae in turribus habitantes, & passeruli ite-
dem in turribus nidos struentes ac habitantes, deinde
etiam gallinae in altioribus locis connutritae. A
lacte autem reliquorum quidem animalium abstinere
iussimus, solo uero asinino uel indulsimus, & ut
compendio dicam, media inter ea quae impinguant
& attenuant esse oportet, quae his ciborum loco ex-
hibentur.

De calculosa uesica. Cap. ix.
Generantur etiam in uesica lapides, pueris frequentius
quam aetate prouectis. uoraces enim pueri sunt, &
perpetui morus, & cibis utcumque oblaris & nociuis
utuntur, & neque horam cibum capiendi seruant ordina-
tam: quinetiam prius quam prior assumptus cibus
concoqua

concoquatur, alium ingerunt: & quum uehementius à cibo moueatur, crudus & incoctus in uenas cibis distribuitur. Mollia autem sunt ipsorum corpora, & quæ facile cedant, eiusque rei gratia obturationem circa renes non perferunt. quum uero crassissima lotia in uesicæ amplitudinem perferantur, ibidem ueluti uini sex, & limus aquæ subsistunt, ac postea ex loci caliditate desiccata lapidescunt. Cæterum aquæ impuræ, & multo limo refertæ, itemque duriores & uehementer frigida, lapidum generatione adiuuât. Lapidem igitur in uesica obortos in principio subleuatis pharmacis subducere conabimur.

Pharmaca, lapides uesicæ attrérentia, itemque urinam ducentia. Cap. x.

Sunt & pharmaca quæ lapides in uesica atterunt: porri semē, fœniculi syluestris radix, artemisia, chamæmelum, amaracus, althææ radix & semē, carpobalsamū, sion quod circa aquas nascitur, graminis radix, adianthū, philetærii radix, smyrnii semen, oxymyrsinis radix & semē, rumicis radix, pæoniæ grana fulua comesta, umbilici ueneris radix, leucanthemū, lapides spongii, amomū, ticolithon, lithospermon, scolopendra herba, lapis qui ab ægris per lotiū electus est tritus ac potatus, lappæ herbe, quæ xanthiū & philanthropos dicitur, semē; uermes terreni recentes cocti triti cū uino, aut cōdito, aut alio quopiam potu, ex uino & melle, propomatis nomine Græcis appellato, paliuri semen, amomum, quod ipsum & aquas lapidē gignētes depurgat, si cū ipso amygdalæ amaræ gummi coquatur: uelut lacryma, pruni arboris lacryma, hoc est gūmi, radiculae radix cum panacis radice & capparidis cortice similiter lapidē per urinā eicere facit: thuris granū cum uino mulso, abrotini semē cum piperis pari modo ex uino. Horū unū quodque cum uino albo datur decoctum, aut siccū in spersum, aut cum melle, aut cum quopiam ex uino & melle potu. Danda etiam in potu ea quæ urinā eicere eis quidē qui calidiore habitu præditi sunt, cucumeris semen, apii, petroselinū, hyacinthi bulbi semē, uioleæ albæ semē, croci radix, & similia quæ ad calculos renes sunt prædicta. eis uero qui temperiē corporis frigidiorē habent, his calidiora præbeto: quale est meon, phu, acorus, carpobalsamum, iris, & similia in renū affectionibus prædicta. Oribasij, ad calculos renes & uesicā. Herbae prosopidis quæ scordiam appellat, & Romana lingua personatā, est autem folio lato, similis symphyto, huius unc. i. piperis dr. i. iridis unc. i. trita in uitro reponito. Datur inde cochlearij pleni mensura cū hydromelice: datur autem quarto quoque die. Aliud Oribasij. Corticis radicis uerbasci decoctum large per dies quinque bibendum ex ordine præbe, & interiectis decem diebus, rursus per quinque præbe.

Communia remedia uesicæ & renum calculosorum. Cap. xi.

Acetum mulsum aqua temperatum omnibus è calculo siue renū siue uesicæ laborantibus exhibendum est, qualicunque tandem temperiē præditi sunt, & qualicunque sanguinē gignant: acetum itē scillinum. Carduus etiā frequenter exhibendus est. Oportet autem radices eius recēs è terra exiractas, si tempus ita ferat, aut aridas iuxta aliud anni tēpus, in uino albo substantia tenui decoquere, & largius eā portionē offerre. Crassum enim urinæ copiosam multitudinē ducit, tum ex

omnibus uenis, tum ex calculosis partibus detractā. Carduus igitur secundum totius substantiæ suæ proprietatem, & pro priuati temperamenti facultate, uim crassos humores detrahendi habet. Oribasij. Comodæ sunt etiam calculosis, cicadæ aridæ trita, potu inspersæ tum per se, tum cum nardi spica. congruenter autem miscetur ad cicadas duas & dimidiam, nardi drac. i. Dato ex eis per dies nouem: primum, cochlearium unum, deinde ii. postea iii. deinde rursum ii. & post i. hoc modo progrediendo, donec nouem ex ordine portiones fiant, i. ii. iii. ii. i. ii. iii. ii. i. De passerulo. Sunt & alia quæ aliam naturam habent, & per hanc ipsam prædicta efficacia prædita sunt: quali sanè præstat passer troglodytes appellatus: est autem passerulus minimus iuxta sepes & muros uictum quæritans, estque hoc animalculum omnium auicularum minimum, ea excepta quæ regulus appellatur: similis est autem regulus in multis, præterquam quod in fronte auricolares pennas non habet. est etiam troglodytes passer regulus paulo maior & nigrior, caudamque semper subrectam & albo colore retro interpunctam habet: magis itē garrulus quam regulus est, & sanè iuxta summum alæ lineamētum cinerel amplius coloris. breues itē uolatus facit: naturalem autem uim omnino admiratione dignam habet. Itaque sale conditus & crudus in cibo acceptus, morbum perfecte sanat: & noui adeo quosdam ob eius usum nunquā amplius ab affectione uexatos. Conditur autem optime peniis euulsis, atque inde largo sale adobrutus, & postquam fuerit arefactus comeditur, & affectionē perfecte sedat. Melius autem est etiam aliter ipsos edere si plures contigerint, coctos nimirum, eius præsertim generis quod per hyemem ubique apparet. Exhibetur autē & alio modo. Passerulus non deplumis in ollulam conijcitur, ac deinde operculo addito uritur, animaduersione assidua habita, ne fallaris quum in cinerem sit reductus, & in aërē exhalans per exustionem totus consumatur: consueuit enim hoc contingere tum ipsi, tum alijs quæ uruntur: quapropter præstat ollæ operculum non oblinire, ut per interualla quædā operculo adempto uisionis modum intueamur. Exhibendus est autem semel omnis unus passeruli usti cinis per se, aut modico phyllo & pipere ammixto, quo saporis iucunditate ori commendetur. Vtutus itaque passerulus peregre proficiscentibus commodus est, licetque melle cocto exceptum in promptu habere. Mellior autē mihi uidetur condendi modus, atque adhuc dictis præstantior, si quis præeuulsis peniis uiuum passerulum sale adobruat, quod & ego facio, inquit Philagrius. Arbitror enim & sanguinis naturam quiddam in se complecti, quod minime uulgariter prodest: cui amplius stercoreis efficacis accedit, quam exustione debiliorem reddi planè credo. Proderit etiam eis qui abundant assatos edere integros, ita ut nihil ex eis præter penas abijciant. Atque hæc quidem sunt quæ secundum proprietatem totius substantiæ efficacis existunt. Cæterum non minus generose etiam compositæ facultates calculi affectionem in renibus & uesica deterunt: prius autem quam ad eas progrediar, unius simplicis pharmaci mentionē faciam ualde celeberrimam, quod perfectam affectionis destructionem promittit, & quodam modo ad ea quæ ex proprietate totius sub-

stantiæ operationem faciunt accedere uidetur. Habet autem hoc modo. Pharmacum simplex ad calculosos, cui Marcianus testimonium præbet, medicus Apher. Leporis pellem in ollulam conijce, & in furnum demitte, atq; ubi uista fuerit, ut probe conterî possit, acceptam tere, & ex ipsa cochlearium unum cum uino ieiunis in solij calidæ aquæ incensu præbe. Si uero uelis ex perimentū pharmaci ipsius accipere, ex eo in uinum conijce, & in uinū item lapidem ex flumine acceptum inijce, & cōtectū per paucas horas sine, & in grumos lapis dissoluetur. Presbyteri Indi pharmacum ad calculosos, quod itidem externum lapidem in grumos resoluerè posse quidam aiunt, quemadmodum id quod præcedit.

Acori, phu, hyperici, cuiusq; drachmas sex, seminis porri drachmas xii. spicæ nardi drachmas decē, cassiæ, lithospermi, cypri, cuiusq; drachmas xxv. excipe melle. Datur magnitudine fabæ. Aliud, quod lapidem celerrime per urinam expellit. Alliorum unguiculus siue nucleos septem, piperis grana nouem, contere simul quàm tenuissime, & cum uino albo ueteri adstringente, pro una uice in balneo bibendum præbe, ubi ad calidum eius locum fuerit ingressus. A dolore quidem hoc ægrum liberat: aliquando autē & lapidē post unicā portionem exigit.

Oribasij nephriticis. Acori, mei, phu, asari, sarxiphagi, piperis nigri, seminis rutæ, betonicæ, spicæ, nardi, piperis albi, singulorum æquales partes accipe: & ex eis siccis cochlearium cum uino adstringente aut aqua præbe. Aliud, Oribasij ad affectionē renū, quod & somnū inducit. Anisi, apij, petroselinij, spicæ nardi, piperis albi, nigri, & longi, singulorum drachmas decem, cinamomi drachmas octo, myrrhæ drachmas quatuor, opij drachmas quatuor, castorij, sisonis, dauci, cuiusq; drachmas duas, seminis hyoscyami sesquidrachmam, sarxiphagi, rhei, betonicæ, cassiæ, cumini, seminis cucumeris decorticati, cuiusque drachmam i. excipe melle, & nucis ponticæ magnitudine præbe ex aqua calida. Facit & ad ulcera. Aliud eiusdem celebre. Piperis nigri, albi, longi, sarxiphagi, betonicæ, petroselinij, asari, nardi celicæ, spicæ nardi, omnium æquales partes misce. Dato drach. i. cum condito calido temperatam.

De hircino sanguine. Cap. xxi.

Sanguis hircinus tum ad nephriticos, tum ad calculosos præsens remediū: nam & præexistentes lapides soluit, atq; ita per lotium excerni eos facit, ut etiam alij amplius non gignantur: præterea & dolorem sedat. Colligitur autem hircinus sanguis hoc modo. Quum uua maturefcere cœperit, ollam nouam accipito, & infusa in ipsam aqua, donec terreum deposuerit olla coquito: & accepto è grege hirco ætate matura, plus minus quatuor annorum, eū mactato, eiusq; sanguinē medium olla excipito, ita ut eū qui primū effluxit, itemq; postremū penitus relinquas: medium autem inspissari finito, & in olla situm per acutam arundinem in multa frustra dissecto: indeq; reticulo denso, aut linteolo raro, aut cribro arctiore cōtectū sub dio exponito ut insoleatur & rosçidus fiat, cauendo ne hymbre cōmadescat: porro ubi exiccatus fuerit, eum diligenter terito, & in pyxide adseruato, & remittente malo cochlearium plenum cum passo cretico exhibeto. Cognominatur autem pharmacum hoc Theu chir, hoc est manus dei. Huius &

nos, inquit Philagrius, in breui tempore non aspernandum periculum fecimus. Aliquādo autem odoris commendandi gratia parum solij, aut amomi, aut similiū ammiscemus. Ego, inquit, hoc pharmacum cum troglodyte passerulo permixtum, cuiusdam penitus nihil lotij efficiēti post magnos dolores exhibui, & permagnum lapidē attritum ab eo expulsi. Antidotus Iuliani diaconi, cuius frequens periculum meo tempore fecit: calculos enim & in renibus & in uesica confringit, & paulatim per lotiū expellit: facit ad comitiales probe ducit menses ob densitatem aut frigiditatem restrictos. Olsium ceruinorum ustorum quadrantem, castorij, piperis albi, agarici, acori, ammi, cassiæ, amomi, sarxiphagi, corticis capparis, radicis panacis, calaminthæ, coaguli leporini, serpilli, petroselinij, singulorum unc. i. mellis quātum sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine: ad renum affectionem & menstrua purgamenta, cum uino mulso: ad comitiales, cum frigida aqua: ad bestias uirus eiectantes, cum uino. Antidotus ex hircino sanguine. Componitur ex hircino sanguine antidotus huiusmodi. Sisonis scrupulos xii. spicæ nardi scrupul. xii. piperis communis scrup. xii. piperis longi scrupulos xii. cumini ethiopici scrupulos vi. petroselinij, dauci, rhei pontici, croci, caroi, ligustici, myrrhæ, acori, cuiusque scrup. xii. sanguinis hircini exiccati, ueluti prædictum est, scrupulos xxxvi. mellis despumati quātum satis est. Datur auellanae nucis magnitudine condito calido temperata: datur autem in balneo in calidi solij incensu. Alia, Archigenis: celebre & clarum est, inquit, ad calculosos & hoc quo uor: hac antidoto inquit, usus est etiam Philotimus & Iustinus. Spicæ nardi drachmas decem, croci drachmas octo, myrrhæ drachmas quinque, castorij drachmas quatuor & obolos totidem, cassiæ, floris iunci odorati, cinamomi, cuiusque drachmas quatuor, alij drachmā unā tantum habent, costi drachmas duas, scordi, polij, cuiusque drachmas tres, asari drachmam unā & obolos quatuor, mei drachmam unam, piperis albi & longi, dauci, petroselinij, opobalsami, rosarum siccarum, singulorum drachmam unam, carpobalsami obolos quatuor, quidam etiam sanguinis anatis feminae drachmas duas, & succi radicis dulcis drachmas duas addunt. Excipe melle despumato, & fabæ magnitudine præbe cum uini mulsi diluti cyathis duobus, aut aqua calida, hanc etiam Oribasius commendat.

Antidoti uariae ad calculosos. Cap. xiii.

Archigenis. Spicæ nardi, seminis apij, dauci, cuiusque drachm. quatuor, aluminis scissi drachmam unam, cinamomi, cassiæ, floris iunci odorati, cuiusque drachmam unam, croci obolos tres, myrrhæ tantundē. Trita cum uino oenanthe subige, & cum uino mulso obolum unum præbe. Præclarum, inquit, huius pharmaci experimentum feci, neque præstantius aliud reperias, neque ad huiusmodi affectionem destruendam, neque ad lapidis coactionem prohibendam, neque ad iam compacti attritionem, neque ad defecationem, neque ad educationem & repurgationem limosæ in urinis secis: coadiuuante præsertim diæta, quæ potissima præseruatiuæ facultatis pars est existimanda. Philagrii pharmacum ex damasonio constans, quod secūdi ordinis esse dicit.

Dama

Damaſoniꝝ drachmas decem, ſeminis dauci drach. ſex, radicis dauci drachm. ſex, radicis herbæ lanarię, corticis radicis capparis, cinamomi, cuiusque drachmas ſex, caſſiæ drachmas octo, betonice, piperis, cuiusque drachmas octo, nardi celticę, iridis, acori, aſari, ſeminis foeniculi, petroſelini, cardamomi, ſpicæ nardi, cyperi, coſti, ſarxiſphagi, ſeminis apiꝝ, myrrhę, ſeſelis, radicis panacis, zingiberis, piperis albi, cuiusque drachmas quatuor, lapidis ſyriaci maſculi drachmas ſedecim, lapidis ſceminæ drachmas ſedecim, ſeminis ſmyrniꝝ, lincuriꝝ quod ſuccinum itemqꝫ electrum appellant, cuiusque drachm. xvi. ſeminis erucae drachm. xvi. mellis quantum ſufficit. datur nucis ponticę magnitudine cum radicis aſparagi paluſtris decocto, aut floris ſunci odorati, aut radicis dulcis. Datur à balneo. Aliud Philagriꝝ, ex damaſonio pharmacum, quod tertij ordinis eſſe ait in lapide atterendo. Facit & ad renum affectiones. Damaſoniꝝ drachm. x. ſeminis dauci, radicis herbæ lanarię, corticis radicis capparis, caſſiæ, nardi celticę, cuiusque drachm. vi. aliꝝ drachmas xvi. habent, iridis, mei, aſari, foeniculi, cardamomi, cyperi, petroſelini, coſti, ſeminis apiꝝ, myrrhę, croci, cuiusque drachmas xi. ſeſelis drachmas iiii. radicis panacis drach. iiii. quidam & zingiberis drach. iiii. & piperis ſic drachm. iiii. addunt, mellis atticꝝ quantum ſatis eſt, excipe, & utere quemadmodum prædictum eſt.

Oribafiꝝ, ex libris ad Euſtathium, antidotus Xenophili. Facit ad ueſicæ & renes calculoſos & exulceratos. Atterit enim lapillos, & ulcera ſanat. Caſſiæ unciam unam, ſarxiſphagi trientem, betonice, cyperi, petroſelini, coſti, tribuli, ſeminis uſticis, lithoſpermi torrefacti, cuiusque ſextantem, ſeminis apiꝝ ſeſquiunciam, phylli, ſpicæ nardi, aſari, dictamni, baccarum lauri, ſeminis ocymi, ſingulorum unciam unam, zingiberis drachm. iiii. nucum pinearum quas ſtrobilos Græci uocant ſex uncem, mellis lib. ii. in balneo exhibeto, aut ante balneum ex uino mulſo aut paſſo chryſatice magnitudine fabæ.

Andromachi antidotus ad calculoſos, quæ paulatim confringit & extrudit lapides, donec ueſicam perpurget, & pellucidum lotum procedat: & quod maximum eſt, ita perſanat, ut nec in poſterum gignatur. Habet autem hoc modo. Seminis dauci, anifi, ſeminis cucumeris decorticati, ſeminis apiꝝ, petroſelini, myrrhę, cuiusque ſeſqui drachmam, caſſiæ, cinamomi, nardi celticę, cuiusque drachm. i. trita aqua ſubigito, & ad paruorū lupinorū formā redigito, ieiunis aut quotidie per dies triginta cū aquę cyathis tribus exhibeto. Ceterū ad huius pharmaci apparatus religioſe, inquit, accedendū eſt: in lignea enim piſa, & piſtillo ſic ligneo hæc cōtundēda ſunt: oportetqꝫ amplius eum qui hæc contundat neqꝫ annulum ferreum geſtare, neqꝫ calciamenta clauis ferreis tranſfixa, atqꝫ id ut myſterium habe. Aſclepiadæ ad calculoſos compositio. Carpobalaſmi, lapidis qui in ſpōgīs reperitur, pulegiꝝ ſicci, ſeminis maluæ ſylueſtris ſicci, ſingulorum æquales partes contuſas & cribratas reponito, indeqꝫ cochlearium unū cum uini diluti cyathis tribus præbeto. Alia compositio ceſlebris. Electri ſiue ſuccini unc. i. lapidum qui in ſpōgīs reperiuntur unciam unam, ſarxiſphagi unc. i. Dantur ex ea ſcrupuli duo quomodocunqꝫ uelis. Pharmacū ex cardamino ligno ualde celebre.

Spicæ nardi, piperis, hyſſopi, tecolithi, cuiusque unc. i. piperis albi ſcrupulos xviii. caſſiæ ſcrupul. ix. heleniꝝ ſiue inulæ ſcrupulos v. ſcobis eboris ſcrupulos xii. ligni cardamini ſcrupulos xii. mellis quantum ſufficit. datur ex eo oboli tres cum condito, aut aqua mulſa. Aliud laudatum. Seminis braſſicę drachmas vi. cyperorum, petroſelini, electri, piperis ſingulorū unciam unam, mellis quantum ſatis eſt. datur nucis ponticę magnitudine cum condito febre carentibus, aut cum aqua mulſa. Aliud. Cucurbitam aridā exure, & cineris cochlearium unū, ut uelis bibēdum præbe: aut catapotia ex cinere formato ac exhibeto, & celerrime per lotium calculum extrudet. Aliud, quod calidioribus præcipue conducit. Ex portulaca ſuccum exprimito, eumqꝫ reſiccatum in catapotia redigito, & drachmam i. exhibeto, ad miraculum uſqꝫ lapidem per urinam expellit. Aliud. Cancros iiii. aut v. aut vii. impari ſolum numero ſub teſta uiuos exure, & contriti eorum cineris cochlearium i. cum condito præbe: eoqꝫ calculoſos renes ſanabis. Aliud. Phu aqua ſerue factum bibendum præbe, omneſqꝫ lapides educet: quod ſi Miſthridatis compositio abūdes, eam quæ ſcincos admixtos habet, unā cū decocto præbe. Experimento cōſtat: utere. Conditum Oribafiꝝ. Vini ſextarios duodecim, mellis ſextarios duos, piperis ſeſquiunciam, ſarxiſphagi, betonice, mei, phu, ſpicæ nardi, petroſelini, caſſiæ, cuiusque ſextantiē. Aliud conditum, ad ueſicæ lapides accommodatū. Sarxiſphagi, ſpicæ nardi, cuiusque drach. iiii. piperis unciam i. carpeſiæ, zingiberis, mei, aſari, caſſiæ, ſiſonidis, petroſelini, acori, dauci, ſingulorum drach. iiii. mellis ſextarium unum, uini ſextarios iiii. aut v.

Aliud renale. Spicæ nardi, phu, ſarxiſphagi, betonice, aſari, lithoſpermi, petroſelini, cuiusque unciam unam, coſti undæ dimidium. Ex hoc arido cochlearium unum in conditum mitte, idqꝫ æger hora ante prædictum bibat. lapides atterit, & per urinam expellit, neque amplius cogi lapidem permittit. Aliud Oribafiꝝ conditum renale: facit enim ad inueteratos renū dolores, & ad difficultatem emittēdi urinā ex ueſica, ad ſtrangulationem item ac urinę ſuppreſſionem, ad eorundem etiam membrorum frigidiſſimæ: calloſas durities extrudit, lapides confringit, & ad alias affectiones eodem modo probè facit. Sarxiſphagi drachmas duas, betonice drachmam unam, petroſelini ſcrupul. vi. ſpicæ nardi ſcrup. iiii. phylli ſcrupul. iiii. rhei ſcrupulos iiii. irionis ſcrupul. vi. piperis ſcrupulos xii. mellis ſextarium unum, uini boni ſextar. iiii. Aliud pharmacum renale. Zador, id eſt, zeduarie, galangle, liguſtici, ſeſelis, cardamomi, piperis longi, piperis albi, cinamomi, zingiberis, ſeminis ſmyrniꝝ, careophylli, phylli, ſtachyos, myrobalani, phu, coſti, ſcordiꝝ, ſilphiꝝ ſiue laſerpiꝝ, rhei barbarici, præoniæ: aliꝝ etiam arboris nucis uiſcum & paliuri ſemen, itemqꝫ ſarxiſphagum ac caſſiam addunt. Ex his ſingulis ſtateres duos cōmiſceito. Datur cū cōdito aut uino uetere ad balneū ituriſ, & ſine balneo, ueſperi ſimiliterqꝫ mane. Abſinthia non renale, ualde bonum. Petroſelini unc. i. ſarxiſphagi ſcrupul. xii. betonice ſcrupulos xii. ſeminis irionis ſeſquiunciam, ſpicæ uardi ſcrupul. vi. phylli ſcrup. vi. rhei pontici ſcrupulos vi. calami aromatici ſcrupulos quinqꝫ, dictamni ſcrupulos iiii. mellis

sextarium unū, uini sextarios quinque, præbe medio cris proculi mensura ieiunis. Pharmacum lapides in renibus atterens, adeo ut in una die commoditatē suam ostendat. Abrotoni drachm. viii, croci dra. viii, herbæ anthyllidis drachm. xvi, foliorum rutæ uiridum drachmas x x x ii. Probe contrita in pastillos digerito, & ex eis drach. i. cum aceto mulso præbeto. Vtere ipso, inquit, assidue: mirum enim quantā utilitate præstet.

Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neq; itē per lotium excerni. Cap. xiiii.

Quod si uesicæ lapides per lotium excerni nō queant, sed in meatu sint obturati, & urinæ suppressionem inducant: ægrum supinum decumbere, ueluti dictū est, oportet, ita ut coxarum partes magis sursum uergant: indeq; huc atq; illuc multiformiter cōmouere, quo ex meatu excidat, post uero ita adhuc supinum & positu sursum uergentem mingere iubere. si uero neq; sic excernere possit, per catheterem instrumentum urinam prolectare. Quod si ob lapidis asperitatem uesica incidatur, & ex hoc subcruenta mingant, aliquādo uero purulenta, & submucida, illis ipsis siue mingant, siue non mingant, plus quā alijs dolorum adest. cæterum in potu exhibenda sunt his pharmaca quæ lapidem atterere prædicantur, & ulcera ipsa sanāt, quibus uero ulcera nondum sunt oborta, lapides autem in uesica detinentur, hi pellucida & tenuia ac aquosa mingunt: quin & arenā subsidentē urinæ habent, & in lotij electione dolores augescunt. Quod si neq; per hæc adhibita pharmaca lapis in uesica atteri possit, ad sectionem trāseundum, quæ pro more infernè fiat, atq; ita lapis subtrahatur & fissura quā diligentissime carne repleatur, cicatrixq; inducatur, ne fistula per successum oboriatur.

Dieta post exactos lapides, adseruans ne alij renascentur: & de affligentis humoris cognitione ex lapidis colore. Cap. xv.

Post exactum lapidem, & cicatricem ulceri obductam dieta constituenda est, ne eos renasci cōtingat. Confectura etiam faciendā tum ex alijs, tum ex exacti lapidis colore, cuius humoris materia in corpore abūdet, ex qua adeo lapides cogantur. alij namq; subalbidij apparent, atq; hi pituitosiores humorem ostēdunt: alij uero pallidi sunt, & bilem abundare demōstrant: alij autem coloris testacei sunt, ob superassatam uidelicet à plurimo calore bilem: alij nigri, qui atq; bilis humorem exuperantem declarant. Omnes igitur quomodocunque calculosi à coena assidue uomant, neq; quicquam feruens in cibo sumant, quod renes & uesicam excalfacere possit. Cauere autem conuenit cibaria substantiæ duræ, & quæ ægre manducatione atteruntur: itemq; ea quæ multam substantiam habent, plurimumq; similiter nutriunt, & quæ acuatim digeruntur antequā perfectè concoquantur: grauis item qualitatis, & quæ difficulter cōmutantur, ac supernatant, & egrè per aluum subeunt, ac inflant: item quæ meatus obstruunt, aut alias diutius in corporibus insident: ex huiusmodi enim cibis uenter labore fatigatus, ipsos aut crudos aut semicoctos ad hepar & renes digerit, atq; ita quod crudum cumulatim allatum est, ineptè præterq; naturam excolatur, & cum tumultu ad renes progressum, statim coactum inspissatur ac restitat. Quare omne lac præter asininum eis incommodum existit: hoc enim in-

quit Archigenes, & substantia tenuissimum est, & facultatis facilimè dissoluetis. igitur mirabiliter articularum tumores & nodos (quos & callosæ durici modum ex uisidoli lactis usu pueri sustinere cōguntur) leuigat & delet, unde admonendum duxi, ut ipsum calculosis assidue heminae mēsurā exhibeatur, post matutinas deambulationes, atque id adseruandi à lapidis generatione gratia præ omnibus alijs fiat. Potus alias sit aqua calida, fontana, pura, defecata, leuis. Vinum autē tenue, urinam ciens, nō ualde uetus. Dulcia enim uina calculosis sunt nociua. Porro ut compendiō dicam, omnis dicta in frigidiore temperatura præditis, exquisitè attenuatoria sit: in calidioribus uero, inter attenuatoria & impinguentia mediā, satietatem uero præ omnibus alijs uitare oportet, dulcium præsertim & ex caseo cōflatorum ciborum: unde & cruditatem infestissimam eis censere oportet: in quam si quando incidant, impastos & absq; cibo manere decet. Frigora quidē magis quā æstus cauenda. In temperatis uero locis degant in quibus anni tempora & horæ nimio seruore non infestent. Assumantur etiā ociosæ deambulationes, & exercitia moderata, segnities enim & ocii eis nocēt. Cæterū uentrem semper probè laxū habere oportet: hic enim si bene subierit, puriora lotia prodibunt. Vnguentis utantur quæ locos defendere queant, ne facillè grauius oblædantur: epithemata etiā cutem rubefacientia, itemq; lancinantia, dropacesq; & sinapismi adhibeantur. Malagma autem exquisitum hoc est, neq; facillè reperias aliud, inquit Archigenes, ad huiusmodi affectiones magis accommodatū. Picis liquidæ heminas ii. & dimidiā, ceræ sesquilibram, resinæ pinus sesquilibram, sulphuris uului sesquilibram, staphidis agrestis bessem, galbani sexuncē. Liquefiscibilia eliquantur, & inspersis ariditritis, simul optimè subacta & unita imponuntur. Varosa asperitas ex hoc inducta mucū plurimū ducit, & pruritus non malum facit, adeo etiam ut uolupte sit, si per resolutionem refrigeretur. Quod si aliquādo leuis molestia inde oboriatur, cerato eam lenire oportet per unā diē, ac deinde rursus eadem imponere. Cōuenientissimū etiam renibus est, si super uētris locum idem malagma imponatur. Sinapismi item calculosis apti sunt, & naturalium aquarū usus: lauent autem non sæpe, ungantur autē frequenter. Curiose etiā temporis oportunitas dispicienda est, ut uenam secemus, si quidem sanguis abundare uideatur, aut ut purgationibus conuenientibus utamur in eis quibus uisidoli humores coaceruantur. Bibant autem & ea quæ urinam ciunt per interualla quædam tum simplicia, tum composita præscripta: in huiusmodi enim omnibus quicquid modicè restitum est, facillè ad debitam commutationem deuenit. Aliunt autem quidam terram ex latere ueteri tritam cum uermibus terrenis, & pectini crassius illitam, præparare ut lapis in uesica aut renibus per lotium eiciatur.

De renum inflammatione Ruffi. Cap. xvi. Ob plurimas causas renes inflammantur, nā & humores corrupti, & plagæ, & attritiones, & pharmacorum portiones inflammationē generant, & præsertim equitationes continuæ & uehementes. Accedit ægris dolor pulsabilis retro iuxta primum dorsi uerticulum, paululum supra spurias costas, distendit autem dolor

rem dolor sursum usque ad hepar, præsertim dextro rene affecto, deorsum uero usque ad uesicam & pudendum, lumbosque & coxendices, pectinem item ac femora, consequitur etiam stupor propinquus cruris, & neque recta erigi possunt, neque pedibus ingredi, & siue sternuratio, siue aliqua alia conuulsio irruat, uehementi dolore lancinantur. frigent eorum extrema, & magis suræ ac pedes: adest urinæ emittendæ difficultas, minguntque assidue ac laboriose, in principio quidem tenuia & aquosa, in quibus nihil subsidet, inflammatione uero in peius proficiente, rubicundiora, deinde etiam crassa & mucosa, adfuntque febres uehementes. Quod si adhuc amplius inflammatio augetur, hæc omnia iidem fiunt uehementiora. His accedit nausea, & stomachi morsus, & uomitus bilis. Quidam autem ipsorum usque ad animi deliquium anguntur & exudant. Sistitur ipsis uenter adeo ut inflentur, & assidue ructus emittant. Sequitur fastidium uehementis, & quibusdam continuè fiunt exacerbationes: quibusdam uero per interualla, in uniuersum autem uentris egestio, & urinæ multa excretio dolores ipsos præcedunt. Noui autem ego quædam, qui post uehementem uexationem animo linquebatur multumque exudabat: ubi autem restitutus sibi animum receperat, simul ab omnibus molestiis liber euasit. Renes igitur inflammatos hoc modo curare oportet. Aegrum in lecto mollissimo decumbere oportet, ac primo die a cibo abstinere, non tamen in multos dies inediam extendere. Urinæ enim puriores & aciores per inediam redditæ, uehementissimos morsus infligunt: itaque in principio forbitonibus tenuibus morsus lenitibus connutrire oportet, & aquæ calidæ potu. Aquam uero mulsam in principio non laudo, priusquam concoctæ & consumptæ fuerint inflammationes: neque item eorum quæ urinam cient usum: obledunt enim mordaces humores inflammatis partibus inducendo. neque etiam purgatiuum pharmacum exhibendum, ueluti quidam cõsueuerunt. Per clysterem autem maluæ decoctum, aut seminis lini, & foeni græci, cum oleo infundendum, ammixto etiam melle, aut prisanæ succus cum oleo & melle. Cæterum copia non multa infundatur, ne repleta intestina comprimant renes: ubi uero stercora prodierint, & intestinum fuerit euacuatum, oleum injiciatur anethinum aut gleucinum cum butyro, eliquatis in his adipibus quibusdam, anserino uide licet aut gallinaceo, aut medulla ceruina. Subeunte autem uentre, incumbente lanam ex oleo calido assidue irrigare oportet: melius tamen fuerit si anethum, ruta, althea, & artemisia, oleo sint incocta. Porro si adhuc maiori acumine renes affligantur, & uehementior exurgat dolor, uenam cubiti secare conuenit, sanguinis detractione repetita, & si post id auxilium aliquid ex inflammatione relinquatur, ad cataplasmata procedendum, primum quidem ex farina in aqua mulla cocta, aut ex semine lini, postea etiam ex chamæpity, polio, abrotano, trixagine, asaro, si uero odorati flore ammiscendum, atque tum non amplius in aqua mulla cataplasmata coquenda sunt, sed in passio. Mixturæ autem modus sit, ut ad farinæ partes IIII. quorundam ex prædictis pharmacis partes II. cõmiscantur. Bonum est & hoc cataplasma. Galbani, terebinthinæ, farinæ erui, cuiusque drachmas quinquaginta, Iris drachmas IIII. cerati ex gleucino, aut amaraci-

no, aut irino, aut cyprino, aut aliquo consimili oleo apparati libram unam, farinæ triticeæ sextantem passim cretici quantum satis est. Apparato, ac supra ilia ac lumbos imposito. Facit idem ad uesicam inflammata, si pectini imponatur. Quod si per cataplasmata dolor non leniretur, cucurbita lumbis ac ilijis est adhibenda, & fissuris impactis plurimus sanguis attrahendus, deinde spongiarum fotu utendum, & in calidam aquam desidendum, in qua calamus aromaticus, chamæmelum, flos lynci odorati, semen lini, anethum, maluæ syluestris radices sint incocta. Prius autem & uesica ingens aqua & oleo semiplena ipsis locis imponatur, fomentis etiam pinguioribus admotis, postque etiam ceratis: quin & malagmata amplius imponenda. cerata quidem conueniunt ex cyprino aut irino apparata: malagmata autem odoratissima sint, qualia sunt hepatica ex styrace conflata. Cæterum dolore affligente bibenda sunt pharmaca quæ dolorem leuant: eiusmodi sanè. Calicis papaueris tostii oboli dimidium, styracis tantundem, thuris obolum unum, seminis cucumeris grana uiginti, seminis apij quantum tribus digitis comprehendere potest, opij ad erui magnitudinem. Hæc omnia quam tenuissime terito, ac cum aqua dulci permixta pro uice una exhibeto. Statim enim quiescet dolor, & obdormiet æger. Conferunt item consimiles pastilli dolorem leuantes. At uero ubi perfecte concoctæ fuerint inflammationes, & quiescerint dolores, tunc etiam per urinam scientia purgandum: ueluti sunt acorum, meon, phu, petroselinum, gramen, calisia, chamæpitys, polium. Horum unumquodque ex aqua coquendum est, & cum uino & melle bibendum. Cibi autem post concoctas & consumptas inflammationes exhibendi, sunt panis optimus, maxime clibanites: ex uolucris, montanæ: ex marinis, herina ceti recentes: ex oleribus, feniculum, apium, daucus, & syluestria omnia, & cucumis coctus. Hæc enim optimè urinam prolestant: maxime uero id præstant pastinacæ probe percoctæ, & crithma, & scandix, & gingidia. A concoctis inflammationibus urinæ his prodeunt multæ & crassæ, & in quibus bonum est quod subsidet, atque hæ ipsæ maxime iudicant ac secernunt morbum: aquosæ autem mictiones & puræ ac pelluentes, ægrè morbum secerni indicant.

De duritie renum. Cap. XVII.

Quæcumque durities circa renes oboriantur, dolores quidem non amplius inferunt: egris autem ex uacuo uentris loco ueluti quippiam pedere uidetur, & stupor adest coxendicium, & impotentia crurium, minguntque pauca, & reliquo corporis habitu æqua inter ceterum laborantibus maxime similes existunt. Quidam etiam temporis progressu manifeste hydropem incurrunt, ueluti etiam ab alijs uisceribus induratis contingit. Hos itaque ceratis & malagmatis, itemque frictionibus ac pinguius fomentis remollire oportet, & urinam ducentia eis exhibere. Ventrem item ex altheæ, foeni græci, & caricarum decocto subluere, melle & nitro ac oleo ipsidem adiectis. Ad noctem item infusa per clysterem conueniunt, oleum anethinum cum butyro & adipe anserino.

De suppuratis renibus. Ruffi. Cap. XVIII.

Quibuscumque renum inflammationes ad puris permutationem uertuntur, his omnes in renibus inflammationis prædictæ accessiones extenduntur, & febres cum

horrore irruent, atque id maxime circa uesperam. Iam uero & tumor quodammodo circa ista apparet, & uehementis caloris sensus ipsos circa renes affligit: minguntque ruffa & pura. Vbi uero suppuratio fuerit perfecta, tunc & febrium & dolorum accessiones minores contingunt, & grauitatis sensus magis circa affectum renem infestat: tempore rupturæ magis exacerbatur, ad quam etiam humorum excretio cum ipsis urinis consequitur, inuehuntur & sordes quædam ex substantia renium eloræ: ut plurimum enim ad uesicam ex renibus erumpens pus defertur, quod sanè conductibile putandū est. Aliquando autem & ad intestina eruptio deuoluitur, & per sedem pus euacuatur. Quibusdā uero neque in totū suppuratione erumpunt, sed circa renes per multū tempus consistunt, donec cautere adhibito aut alio modo forinsecus apertione & educatione moliantur. Igitur postquā abscessus signa apparuerint, quā celerissime adiuuare oportet tū suppurationē, tum puris eruptionē. Quæ in re spongiæ aqua & oleo, itemque fursuribus imbutæ assidue proderūt foci gratia admotæ. eundem usum etiā cataplasmata præbent, ex farina ordeacea cum ficuum & altheæ ex aqua mulla decocto, aut ex cretico passo. Bonū est & ipsas ficus ammiscere triticas, & ablinthij contusam, aut chamelæam, aut trīn, & bryoniam: addatur & terebinthina, pix, māna thuris, thus ipsum, columbæ stercus, polium, & quæ similia his existunt, & simpliciter omnia adhibeantur quæ in hepatis abscessu supra approbauimus. In malignis & putrescentibus humoribus, quos ex febrium acrimonia cognoscas, etiā rosæ in cataplasmata cōmiscendæ, & myrti baccae, erulicæ ac lentis farinæ. Hæc enim eisque similia humorū putrefactionē sistunt. Post hæc emplastris utendū quæ pus permutare possunt, quemadmodū in hepaticis est prædictū. Quod si rupturā moretur, acriori infuso alius est subluenda, ueluti ueratri nigri cremore, raphani sicci & alliorū ac cucumeris syluestris radicis cremore. Macerare autē hæc in aqua maris aut falfugine uel muria oportet, parumque olei ammiscere, quo infusa lubrica reddantur. Hæc sanè per clysterem infundenda. Iubendūque ægri quo plurimo tēpore apud se delectent: consueuerunt enim sæpe ipsam suppurationē dirumpere, unā eū hoc quod uentrē emollire solent. Si uero uehementiores sunt dolores, pitisanæ succus infundatur & lac recens multum: infusus quoque in aquam & oleum appareatur. In potu leniora urinam ducentia exhibeantur, ueluti cucumeris semen decoctum ex aqua mulla, palmulis in ipsa incoctis. Dāda etiā iris cum melle despumato delingenda, aut ipsum mel in decoquendo in pastillum redactū. Remorātem item rupturam luuat cuminum cū passo, ruta cum uino mulso. Si uero ex habitu corporis & doloribus languidioribus coniecturam facias, ob crassitatem pus ipsum non excerni, foeniculi decoctū in potu dato, & chamæptiyos, pulegiæque & origani. Post rupturam autem carunculæ paruæ oblongæ cū urina excernuntur: & si quidē maligna fuerint ulcera, humores foetidi, liuidi & mucosi: si uero benigna fuerint, etiam pus ipsum album, & æquale, & leue, absque odore graui, & paucū reperietur. Lac itaque cum melle post puris eruptionem eis præbendum: & primum quidem asininum aut equinum, ad ulcera enim repurganda conducit. quum uero re

purgatione amplius opus non habent, & morsus fiunt obtusiores, indigetque æger nutrimento, tunc etiam bubulum lac eis exhibendum II. & III. heminarum mensura. Amplius autem omne lac recens multum calidum præbendum est animali in domum ubi æger decumbit deducto: hoc & aliorum internorum ulcerum optimū est pharmacum, & graui puri maxime amicum, & corpus probè nutrit. Porro ad uires refocillandas ac restituendas, ægrum decumbentem molliter fricare singulis diebus mane conuenit, & primū bubulo lacte nutrire: postquam uero concoxerit lac, sorbitionem ex pitisanæ apparatus præbere, aut amyrum, aut similaginem lotam cum lacte coctam. dandum & lac ouis permixtum, & fuscum gallinæ pingue. Ex oleribus conueniunt, malua, seris, rumex, portulaca, asparagus palustris, cucumis, lactuca, omnia cocta, neque quicquam crudum uorent. Hæc sanè morsus obtundunt. Ceterum succedentes repletiones uomitu euacuare oportet. Vt uero facile uomant, cucumeris semen tritum ex passo eis præbeatur: aut pitisanæ succus cum passo. Oleo autem cyprino præsertim illinantur pennæ, quibus item ad uomitum iritentur. Non solum autem ad repletiones uomitus laudo, uerum si quis omni mense audenter uomat, forte & renum ulcus, & quicquid inde mali accedere possit, dissoluat. Reliqua diæta eadē sit cum ea quæ postea ad uesicæ ulcera dicitur. Ex his uero quæ urinam ducunt simpliciora iam sæpe dicta itemque dicenda, ad repurganda renum ulcera bibantur. Quum uero munda fuerint ulcera (quod inde tibi palam fiet, si neque tectoriū etiā ulcers obductum cum urinis excretū appareat, neque etiam pus excretum. sit seculum, sed subalbū, & leue, & æquale, & paucum) tunc sanè pro emplastris malagmata assumenda sunt: id quod ex semini bus constat: item quod ex baccis lauri: & quod Apollonianum inscribitur: & omnia quæ cutem rubescere possunt, quale est id quod ad calculi affectionē est præscriptum. Pro his uero quæ urinam ducunt resiccantia adhibeantur: quare cibus ipse adstringens sit, & pharmaca quæ corpora eogant. Conferunt etiā dropaces, & sinapismi, & naturalium aquarum calidarum & frigidarum usus. Porro ad inueterata renum ulcera, pharmaca sunt assumenda, quæ ad exulceratam uesicam describentur. Atqui nosse oportet omnem exulcerationem, & uesicæ, & renum, ægre curabilem esse, præsertim quæ ex erosione sit oborta, adeoque paucos nouimus qui ab ea perfecte sint liberati: si uero extra suppuratione uertatur, inflammatio magis tumescit, & ad manum & ad oculum magis euidenter exposita est. His merito medici manū admoliuntur ubi maxime tumor attollitur, curamque adhibent quæ ad communia & caua ulcera requiritur: non ignorandum tamen ea in fistulam abire solere, quare diligentiori omnino indiget tractatione.

De disuria, id est, emittendi urinā difficultate: et

stranguria, hoc est, stillicidio urinæ. Cap. XIX.

Disuria dicitur, quum meiere æger cupit, & cum uel urinæ excernuntur. Stranguria autem appellatur, quum paulatim & guttatim urinæ destillant, & assiduam ad mingendum iritationem faciunt. Hæc autem contingunt aut ob acrimoniam urinæ, aut ob exulcerationem uesicæ, aut ob uesicæ debilitatē: aliquando autem & affectis renibus aut hepate, quum

quū abscessus rūptur, & pus per uesicā excernitur, assiduam iritationem ad minctionem propter acedinem suam inducit. ex intemperie etiā quadam ægra uesica in propria læditur actione; necessarium igitur est scire causas quæ stranguriam & diſuriam præcesserunt, atq; ad ipsas remedia adornare. Si igitur frigiditas has affectiones præcessit, oleo rutaceo calido pectinem fovere oportet, ægrumq; in famſuci aut rutæ decoctū delidere, ac imum uentrem contegere ac calfacere: aliquando & per sedem oleum rutaceū calidum infundere; & cibis urinam cientibus uti quæ concalfacere possint: aromatum etiā decoctiones in potu exhibere. potest etiā præberi in potu theriace cum passo aut uino mulso. Sin uero biliosiores sint urinæ, & mordacitas circa uesicam contingat, ac urinæ stillicidium inducat, tum sanè exuperantem uisiosum humorem quàm celerime purgare oportet, & cibis temperamentum inducētib; uti, ita ut ab omnibus acris ac falsis abstineamus: in potu autem plurima aqua calida dulcis exhibenda, ægerq; assidue ad mictionem cogens: si enim acris recrementum diutius in uesica moretur, partes ipsas corrodit & exulcerat. Conueniet igitur continuis fomentis uti, & amyllum cum lacte decoctum, itemq; cum palmarū decocto absorbendum præbere. Vinum autem dulcius præbeatur. Optimū est & ipsum lac calidum potatum. Quod si acrimonia adhuc augeatur, etiā per eolem lac ipsum cum amylo in uesicā inſidatur, & pastillus ex physalide cōstans in potu sumatur. Porro si aliud membrum sic affectum, & id ipsum per uesicā expurgetur, manifestum est illi priorem curam deberi, ita tamen, ut neque uesicam negligamus.

De difficultate emittendi urinam in febribus. Cap. xx.
Philumeni: Fit & in febrium malignarum principio urinæ emittendæ difficultas, ut & inde uesica affligatur, & paulatim cum dolore urinam emittat: neq; uero sola molestia hæc est, sed & signum totius neruosa partis affectæ. Ad imum uentrem igitur & pectinem, inguināq; & coxendices, lana pura oleo dulci imbuta, in quo ruta, anethum, aut oleum sicyonium sint decocta, imponatur, lanæq; amplius cum minium quàm tenuissimè tritum infarciatur, & si aliis eis sit adstricta foeni græci & maluæ decoctiones infundantur. Inſersiones etiā assumantur usq; ad umbilicum & lumbos totos, ex artemisia, foeni græci, rutæ, pulegij, & maxime famſuci decocto, oleo iidem ammixto. Quod si accessiones urgeant, etiā uenæ sectio adhibenda est, & diæta exquisita, quæ maxima parte ex sorbitionibus cōstet. Veimur itaq; halica lota cum anetho in aqua mulla despumata cocta, aut pane loto, aut sorbilibus ouis. Post hæc & malua cōuenit, friabilis cocta, & porrum capitatum in tribus aquis decoctum, & tenerrimi pisces. Post fomenta uero, cataplasinata adhibeantur ex eadem materia apparata. Vrgentibus autē doloribus, cucurbitæ cum scarificatione ad imum uentrem affigantur. Ceratum uero ad has affectiones conuenientissimum hoc est: Maluæ syluestris radices in oleo sicyonio cum modica aqua coquuntur, donec aridæ fiant, & ipsæ quidem abſciuntur, oleū autem cum rutæ succo permiscetur, ut quarta olei pars de succo rutæ addatur: hisq; amplius cera sufficiens & parum castorij adiicitur. Cæterum potus ita affe-

ctis cōmodus est cucumeris satiui semen, quod præmaceratum decorticatur, deinde tritū cochlearium II. mensura ex aquæ cyathis III. præbetur. Lotium enim citra molestiam ducit, & dolores circum locos infestantes euestigio dissoluit. A reliquis autem quæ urinā cient, quamdiu febres perſiterint, in totū abstinendum est. Mort enim ex febrili calore totius corporis humores, per ea quæ efficacius urinā cient, ad uesicam prius afflicta deducuntur.

De ischuria, hoc est, urinæ suppressione. Cap. xxi.
Ischuria, hoc est, urinæ suppressæ affectionem, etiā ipsum nomen declarat: ægris enim in totum urinā supprimitur ac cohibetur. Atq; id aliquando ob imbecillitatem cōtingit, uesica ea quæ in ipsa continentur arctè cōplecti ac exprimere nō potente, aliquando autem & inferiore meatu à crassis humoribus obturato, aut lapide obſtructo, quandoque autem ob inflammationem aut talem quempiam tumorem meatum angustum reddentem, & perfectè obturantem. Sanguis etiā in grumos concretus in uesica, suppressæ urinæ causa existit: pus item crassum per ipsam uesicam à renibus, aut hepate, aut alio quopiā inferiore membro excretum, urinæ suppressionem operatur. Accidit & sanis sæpe urinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum importunitatem, aut in condonibus, aut foro iudiciali, aut somnis, si diutius continuerint mictionem. Afficitur enim in his comprehensua & urinam obuoluens uesicæ uis, ex immodica uidelicet repletionē & tēſione: imò quantum amplitudo ipsius uesicæ expleta circumtenditur, tātò angustior seipſo fit meatus. Urinam igitur ob inflammationem suppressam uenæ sectione curabimus, fomentis item ac cataplasmatibus alijsq; remedijs adhibitis, quæ iam sæpe ad inflāmata sunt prædicta, & in sequentibus describentur. Si uero sanguinis eruptio præcesserit, coniectare oportet sanguinis grumos suppressæ urinæ causam esse: hi itaq; dissoluendi sunt eo modo, qui de eruptione sanguinis ex uesica dicitur. Quod si lapis sit qui urinā supprimit, & hunc ex loco excutere ac dimouere oportet, quemadmodum de calculosis est prædictum. Si uero crassi humores in causa sint, fomentis & inſersionibus ac cataplasmatibus cura concedenda est: ab his uero quæ urinam cient in totum abstinendum, uelut in loco de difficultate emittendi urinam in febribus est relatum. Quibus uero citra inflammationem & eruptionem sanguinis, aut aliam quandam ex prædictis causam, urinæ excretio supprimitur, propter ægrum uesicæ sensum cōtingit id scilicet, quapropter iritando submonere, ac excitare eius actionem oportet, & per inſessus auxiliari; nitroq; ad meatū admoto, aut nitri spuma, aut cimicibus cōtritīs. Quod si ita nō procedat, ad catheterum usum confugiendū, perq; hoc ipsum instrumentū immissum urinæ proleſtandæ. Urinā ducentia nequaquā bibant, ne multitudine eius uesica distendatur. In sanis autem, quū ut dictum est ob negotiorum importunitatem lotiū diutius retentū uesicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsi, ambabus manibus supra imum uentrē admotis, ac urinā lentè expressa. Ad urinam ægrè prodeuntē, Cucurbitæ semē præmūdatum aqua macerato, quū uero emollitum fuerit, sufficienter aqua affusa terito, percolato, ac succum bibendum præbeto. Vtere, experimento constat.

De scabiosa uesica. Cap. xxii.
 Quibus uesica scabit, his pruritus tum imi uentris, tum
 pectinis succedit, inq; urinis asperæ & furfuraceæ
 subsidentiae deferuntur: progrediente uero morbo,
 uesica exulceratur, accessionesq; ad ulcera præscri-
 ptæ inducuntur. Nosse igitur operepretiū est, quod
 non penitus curabile sit malum, conādum tamen ut
 pro uiribus leniatur. A mordacibus igitur & quæ
 humores aciores ac falsiores reddunt abstinēdum.
 Exhibenda autē uina dulcia & lac & gallinæ aut hoc
 dorū aut agnellorum carnū iuscula, palmarumq;
 cremor, similago item & amyllum, ac sorbitiones
 ex his apparatus, pisces molles carne & omnes co-
 ctos: & ex oleribus quæcunq; urinam quidem sub-
 ducunt, nihil uero mordax in se habent, uelut est pa-
 stinaca probe cocta, crithma, foeniculū, apium, hip-
 poselinum, asparagus, cucumis, & quæcunque eius
 generis existūt: nam & urinā agentibus minoribus
 tamē, uesicam subpurgare oportet: periculum enim
 est ne fortioribus exulceretur, quod omnino pelus
 extat. Urinam itaque commodē cū cancri, & pi-
 næ, conchæ, & herinacel marini recentes, & herina-
 cel terrestriis caro exiccata, & drachmæ pondere po-
 tu accepta. Neq; minus cōmodæ cicadæ censendæ, &
 uermes terreni tres ex passo potati. Non inconue-
 niens item foeni græci succum cum melle sorbere: id
 ipsum enim & intestini morsus obtundit, & si ad uē-
 sicam procedat, scabiem eius mitigat. Idem etiam tra-
 gacanthus facit. fucundus est item baccarum myrti
 cremor cum uino potatus, aut mali cotonei cremor,
 aut culuscunq; alterius adstringentis fructus. Hæc
 autem adstringentia, inquam, pruritus quidem mi-
 tigant, affectionem uero nō sanant. Dieta porro o-
 ptimi succi sit, & per aliquot dies uomant. Sero au-
 tem lactis aluus subducatur. Mediocribus etiam ex-
 ercijs moderatē utantur. Aliud, quod confestim
 auxiliatur. Serpillum cum cicere satis diu coquito,
 percolatumq; decoctū bibendum præbero. Oriba-
 sij, ad ægrē meiētes. Amomi, cardamomi, floris iun-
 ci odorati, cuiusq; drach, vi. costi, castorij, myrrhæ,
 cuiusq; drach. iiii. cassiæ drach. i. mellis quantum sa-
 tis est, datur fabæ Aegyptiæ magnitudine cum ui-
 no tēperatum. Aliud eiusdē. Petroselini, baccarum
 myrti nigrarū, singulorū drac. xvi. seminis apij dra-
 xxii. ammij drac. viii. nardi celtici dra. iiii. myr-
 rhæ drac. ii. mellis quantū sufficit, datur drac. i. ex a-
 qua mulsa, aut uino diluto cyathorū iii. mensura.

*Simplicia remedia ad suppressam ac egre prodeū-
 tem urinam, si aut eius multitudo, aut crassities
 in causa sit.* Cap. xxiii.

Urinam difficulter prodeūtem & suppressam, uiscera
 herinacel terrestriis sanāt exiccata ac suffita ægro un-
 diquaq; probē cōfecto. Oportet autem ipsa sale con-
 dire ac exiccare. Quin & in potu accepta sicca trita
 quantū tribus digitis apprehēdi potest ex uino mul-
 tas urinas cū carnis item herinacel in sole exiccata
 drac. i. ex uino datur, & urinā multā citra molestiā
 educit. Aliud. Aselli qui & millepedæ sub aquario
 stabulātes uase, egregiē difficultatē emittēdi urinam
 soluunt, si duo aut tres in modico garo coquantur,
 ipsumq; garum cum æquæ cyathis duobus bibatur.

Aliud. Vermes terrenos tres aut quinq; tritos ex
 uino mulso aut aqua mulsa præbero: citō enim uri-
 nam ducūt. Forinsecus autē artemisiæ folia cū myr-

rha trita pectini illini, itemq; imo uentri, & lotium
 prodibit. Aliud. Perdicium herbā terito, & affu-
 so oleo feruefacto, atq; ita uesicæ imposito. Eandē
 item herbā cum oleo coquito, ipsaq; proiecta lanam
 oleo imbuta ac imposito. Aut peponis pulcherri-
 mi pelliculā cum modica ipsius carne imo uentri im-
 posito & colligato, & prodibit urina. Si uero ari-
 da sit pellicula, ipsam in aqua macerato, & imponi-
 to, ac colligato. Infeſsus etiam eis ex samſuci maxi-
 mē decocto apparentur, aut si id non ad sit, ex deco-
 cto rutæ artemisiæ & althææ.

De dissoluta per paralyſin uesica. Cap. xxiiii.

Ex his qui paralyſi exoluta uesicam habent, alij quidē
 præter uoluntatē urinam emittunt, & quanto plus
 id eis cōtingit, eo minus periculo sunt obnoxij: alij
 autem lotiū non excernunt, sed eo suppresso uesica
 & lumbi eis distenduntur similiterq; pecten: femora
 autem tumefacta habēt, & quum nō enſiant lotium
 subiecta mēbra mortificātur, neq; ita longē poſt mo-
 riuntur. Quum igitur lædi cōtigerit nervos qui ex
 spinali medulla ad musculum uesicæ collū clauden-
 tem deferuntur, exoluto musculo, inuolūtaria uri-
 næ excretio cōtingit. Si uero proprij uesicæ nerui
 fuerint affecti, nerui aut musculi qui ceruicem uesicæ
 cōplectūtur, uires suas conseruātes in actione sua ua-
 lidi sunt, urina ipsa cohibetur. Cæterū quum cuidā
 ob casum spina in anteriore partem esset luxata, &
 inflāmatio successisset, tertia die urinæ suppressio ei
 accessit: curauimus autē ipsum, inquit Galenus, ue-
 luti contra inflammationem renitētes. Alius autem
 quū cecidisset, uertebriis retro inuersis & luxatis, præ-
 ter uoluntatē urina ab eo prodijt, citra tamen uesicæ
 dolorē, ex quo coniecturam fecimus neruū esse læ-
 sum musculi eius qui uesicam claudit, & propterea
 medelā spinali medullæ adhibuimus, affectis inquā,
 uertebriis. His igitur quibus citra casum urina sup-
 primitur, hoc modo auxiliari oportet. Incessus assi-
 dui in foeni græci, seminis lini, althææ, rutæ, ac arte-
 misiæ decoctū cū oleo eis apparētur, & loci ex oleo
 calido rutaceo, aut sicyonio aut gleucino sæpe per
 diē & noctē, & maximē post infeſsus irriſgeniur &
 perfundantur: cucurbitæ etiā locis affigēdæ, & cata-
 plasmata imponēda ex eruda ordeacea farina, ex ui-
 noq; dulci & uino mulso. In aluū autē per clysterē
 infundatur centaureæ, & radicis cucumeris agreſtis
 decoctū, addito oleo rutaceo & melle. Post sublūtā
 uero aluum oleum rutaceum sicyonio ammixto in-
 fundendum, adiecto aliquando etiam modico casto-
 rio. Vnguenta item & medicamēta illitu lassos ner-
 uos reficientia, acopa Græci uocant, & supra resolu-
 tiones sunt descriptæ, tum spinæ, tum imo uentri ad-
 hibenda. Castorium itemq; theriace in potu propi-
 nanda. Modicus autem eis cōuenit potus & uomē-
 tus qui pituitam educunt. Post euacuationes sinapi-
 smi, tum pectini, tum lumbis cōmodi sunt. A quib-
 us cerata quæ partes mitigent, & malagmata odo-
 ra imponantur. Porro urinæ suppressionem quæ
 ob sauciātam spinam, aut casum, aut uertebriæ luxa-
 tionem, aut ob lethales accessionum concursus, sub-
 orta est, impossibile est curare, quare cautē remedia
 adhibere oportet. Cæterū eos qui præter uoluntatē
 urinā emittunt, curare conuenit roborādo per mor-
 dacia cataplasmata, & malagmata, & per rubefaciē-
 tia ex sinapi apparatus, & arenæ à sole feruefactæ
 infectione,

infectione, aquisque naturalibus, primum quidem calidis, postea etiam frigidis & maxime sulphurelens & bituminosis. Exercendae etiam ac perfricandae partes, ueluti in loco de resolutione est praedictum. Urinam autem ducentia nequaquam exhibeantur. Dieta uero calidior & siccior sit, nisi acriores ac mordaciores appareant urinae.

Ad eos qui se in somno permingunt. Cap. xxv. Affectio haec pueris maxime contingit: ad eam Archigenes haec descripsit. Pulmo hœdi moderate affatus, & citra panem largè ad triduum in cibo acceptus, eos qui lectos commingunt, corrigit. Aliud. Leporis cerebellum siccum potatum ex uino lectos permingentes sanat. Aliud. Testiculum leporis siccum in uinum radito, & bibendum dato. Quidam autem leporis cerebrum in uesicam porcina coniectum & assatum, unà cum uesica edendum praebent. Etenim ipsa porcina uesica per se uisita, & in potu exhibitæ, iuuat. Simili modo & ouilla uesica facit: cinerem itaque eius ex posca praebeto. Aliud. Adipem anserinum drachmæ pondere, cum coagulo leporino oboli pondere, & cum polenta subigit, & reclinatis in lectum praebeto. Aliud. Linguae anserinae coctæ per triduum exhibitæ affectionem sanant. Quidam assatas praebent. Aliud item Archigenis. Myrrhæ, calaminthæ, culusque obolum iterito, & cum uino odore ante coenam bibenda praebeto. Aliud eiusdem. Raphanidem marinam cotusam urito, eiusque cinerem totum bibendum praebeto. Aliud. Rutæ praesertim syluestris semen correfactum duarum drachmarum pondere bibendum praebet. Aliud. Castorij drachm. i. in potu praebet. Quod si acriores & mordaciores sint urinae, lactucæ seminis drachm. i. bibendam dato. Aliud. Galli guttur uisum ac tritum cum aqua tepida ieiunis bibendum porrige. Aliud. Gnaphallum aut anthyllin herbas quibus pro tomēto & strato usus est eger, easque perminxit, siccato, urito, & cum potu exhibeto. Cæterum in somno pudendum illinant ex cimolia cum perdicis succo. Circumligent etiam femora infra inguina, quatuor digitorum distantia, atque hoc per uiscis uirgas. Porro ubi suserint, omnino amplius dormiant: multus enim potus affectioni incommodus existit. Atqui si diuturnum & inueteratum sit malum, uelut eos qui præter uoluntatem ob resolutionem uesicæ urinam emittunt, curato. Differunt autem hi ab illis, in eo, quod his per somnum saltem hæc accessio contingit: illi uero quibus ob musculi colli uesicæ resolutionem hoc accidit, etiam dum uigilant, eodem modo afficiuntur.

De inflammatione uesicæ: Ruffi. Cap. xxvi. Morborum qui circa uesicam oboriuntur, grauissimus & maxime mortalis inflammatio existit. Consequuntur autem ægros communia inflammationis signa. Febris acuta infestatur, & uigilant, & delirantes aliena loquuntur, & uomunt biliosa pura, & lotium eicere non possunt: durus fit pecten & pubes cum uehementi dolore, & egerendi appetentiæ uelut in tenesmo fieri solent: quod uero egeritur tenue est, & subsidentiā non habet. aliquando & inflammationes sequuntur, & alius adstricta est, intestino recto ab inflammatione uesicæ compresso. His itaque si nihil aliud prohibeat, uenam citra cunctationem in principio morbi secato, & pauco cibo adseruato,

& aquæ potu, locos uero oleo in quo anethum, semen lini, aliquando etiam ruta & althea incocta sint irrigato. In decoctum item seminis lini & foeni graeci insidere facito, odorato aliquo semine, ueluti petroselino, dauco, aniso, simul incocto. Admoneturque æger quo in aqua decocti desidens mingat: uesica enim non satis robusta est ad amplectendam & expellendam urinam, igitur ipsum ægrum aut aliquem ex adstantibus scite ac placide pectinē premere oportet, neque id ultra modum ne dolor inde intendatur. Est autem inuentum hoc Philumeni, qui hominem hoc modo a se tractatum urinam eiecisse testatur. Cæterum primum omnium alius leni infuso subluatur, & post stercoreum educationem, oleum quo supra ad irrigationem usus es, in intestinum solatij & leniendi doloris gratia inijciatur. Praestat autem & papaueris calicem simul cum oleo incoquere, & adipem anserinum aut gallinaceum. recetem in ipso oleo eliquatum simul infundere. Ego uero, inquit Rufus, uehementioribus existentibus doloribus optimum magnitudinis erui cum modica myrrha & croco lanæ illitum, in podicem indidit, & statim dolores quiesuerunt, confestimque æger obdormiit. Post clysterem & infusa, infususque & irrigationes, etiam cataplasmatibus utendum ex cruda ordeacea farina, capitibus papaueris, & hyoscyami folijs, ac modico mandragoræ succo adiectis. Fomenta autem fiant per aquam & oleum in uesicis bubulis semiplenis admota, aut polentam calidam in sacculis aut detritæ uestis paniculis ligato, & pro fotu admovento. Post cataplasmata, etiam cerata imponantur, ex oesypo, & cera, & sicyonia aut gleucino oleo cum castorio apparatus. Quod si neque sic mali tumultus cesset, cucurbitam affigemus locis unà cum scarificatione. Ceterum ubi euidentis declinatio apparuerit, ad emplastra & malagmata transeundum est. Porro catheteris immisionem ad inflammata uesicam in uiro quidem non probo: etenim quum laboriose immitti queat, dolores exacuit, & inflammationem auget, uerum mulieri ipsum adhibere nihil absurdum: brevis enim in ipsis urinae meatus existit, & recta situs, ut citra dolorem hoc molimen admittat. Si uero urinae suppressæ periculum urgeat, necessario ad catheteris usum confugimus, non quod affectionis molestiam tollat, sed ut urgentem urinae suppressionem corrigat, & a præcipiti periculo liberet. Post urinae profectionem rursus ad eadem mitigatiua auxilia accedendum, usquequo inflammatio soluitur, aut suppuretur. Solent autem sæpe repente inflammatio solui, erysipelate iuxta cutis superficiem oborto, & permanente, neque rursus intro recurrente: imò & lotio multo eiecto, sæpe id eadem iudicatione liberum hominem reliquit. nihilo minus tamen etiam si hæc appareant, hisdem remedijs insistere oportet, quandoquidem ut plurimum tensione aliqua facta ac oborta, continuæ exacerbationes fiunt, & mali constitutio diuturna. At uero ubi periculosa accessiones cessarint, & morbi constitutio iam fuerit inueterata, ad unguenta quæ humores ex profundo euocant ac transferunt, metasyncrifica Graeci appellant, & ad malagmata transeundum est, quæ cutem rubefacere possunt.

De sanguinis ex uesica eruptione, & de grumis eiusdem. Cap. xxvii. Est

Est alius acutus vesicae morbus, rumpitur autem uena in ipsa, & partim quidem sanguinem foras mittit, partim uero intus condensatur. Sanguine autem condensato, & grumis coactis, eger animo linquitur & pallefcit, pulsusque paruos, obscuros, & desolos habet, moerore angitur, refrigeratur, ac uiribus destituitur. quum uero grumus aliquando in urinarum meatum inciderit, is etiam lotij excretionem supprimit. uerum omnino difficilioris curae celsenda est eruptio ex erosione facta. Quare quam celerrime uelut etiam in alijs sanguinis eruptionibus auxiliu ferre oportet, extremas partes constringendo, & pectine ex spongijs posca imbutis irrigando. Quod si inflammatione suspectam habes, lanas succidas uino & rosaceo madidas imposito. Caeterum ob praedictum periculum, compendiariam curam facere conuenit, & nequaquam rem differre: & siquidem nihil prohibeat, uenam secare partita sanguinis detractio, ut eo modo sepe & paulatim sanguis detractus reuellatur: acri uero in decumbendo sursum uersus collocetur, & coxendicibus ipsorum leuandis & simul refrigerandis spongiae posca imbutae subdantur, aut pelles substernantur: summum autem prosunt urgente malo cucurbitulae illis ac lumbis affixae. Post irrigationes autem cataplasmatibus utendum sanguinariis, rubo, plantagine, perdicio, mali punici floribus, lentis & myrti folijs: horum unumquodque cum polentae flore pro cataplasmate imponendum est, & frequenter priusquam tepescat, altero imposito, auferendum. Optimè etiam faciunt ex palmis acacia & hypocisthidae ac alumine apparatus cataplasmata, & quae his similia existunt. Summè autem cinis linteoli usti auxiliatur, si palmis ammisceatur, aut alicui ex epithematis infarclatur. Spongia item pice liquida imbuta, usta & epithematis ammixta mirificè sanguinis eruptiones sistit. Caeterum detritae uestis panniculus ustus, & spongia usta, non solum forinsecus locis apposita, sed & cum plantaginis, aut sanguinariis, aut herbae sidericidis succo uesicae infusa, maxime opere auxiliantur. Oportet autem infusi fistulam alias catheteri similem esse, uerum ex summo utriculu aut uesicam adaptatam habere. Quandoque & sedi haec infusa prosunt. Inseffus autem conueniunt ex confusis materia constructi: nam & posca & lentis decoctum, itemque rubi & similitum eis conuenit. Danda autem & in potu pharmaca educationi sanguinis apta cum simplicia, tum composita, uelut sunt rheon poticum tenuissimè tritum, & loti arboris scobes & ramenta, praesertim corticis eiusdem, & glycyfides aut paeoniae grana rubra xii. terra samia, & lemnia, sphragis appellata, hippuris, centaureae magnae radix, thuris cortex, & similia. Optimum uero & hoc est, quo Archigenes usus est. Ad sanguinem mingentes, Archigeni. Aluminis scissilis drachm. i. gummi obolum. i. tragacanthae drach. ii. in passo diluito, & in pastillos redigito, & ex eis obol. ii. cum passo praebeto. Ad sanguinis uesicae eruptionem Asclepiadae. Balaustrij, acaciae, succi hypocisthidis, cuiusque drac. iiii. aluminis scissi drac. ii. in pastillos cum aqua digerito, & obolos iii. cum uini myrtinae cyathis iii. exhibeto. Porro quibus sanguis in uesica in grumos cogitur, primum tentandum est ut pharmacis diffundatur: artemisia igitur in potu praebenda est, & elichrysum, & cyrenaeus succus, aut laser purum, aut conyza praesertim parua, absinthium, rapha-

ni semen, rubi succus, betae succus, leporis coagulum, aut hœdi, unumquodque cum aceto mulso. Ego autem, inquit Galenus, pharmacum eis praebui bibendum quod lapide confringit ex aceto mulso: imò ipsum per se acetum mulsum exhibui, & quibusdam ipsorum grumi dissoluti paulatim per lorium prodierunt. Quod si hoc modo nihil proficias, sed urina supprimitur, necessitate inducet catheteris adhibendi, per quem ubi urinas eduxerimus, rursus praedicta in potu exhibemus praestantia ad grumorum coactorum dissolutionem, si uero neque sic grumi dissoluatur, intercapdinem inter anum & pudendum perinaeon Graecis dictam inferne dissecare oportet, quemadmodum in calculosa uesica est praedictum, & eductis grumis de caetero uelut ad sanguinis eruptionem uesicae opitulabimur. ubi uero sanguinis eruptio cessarit, uelut alia ulcera curato. At uero sanguinis ex cole eruptiones, epithemata colem refrigerantia, & quoddam ex praedictis infusum sanant.

Quae tubercula in uesica maturescere oportet. Cap. xxviii.

Optimum quidem est in principio conari quo tubercula dissoluantur, ut ne in pus permutetur: si uero id citò fieri non possit, auxiliorum usu ea matura facere oportet, quae supra renibus cataplasmatibus modo dixi imponenda, atque amplius adhuc nasturtio cum erui farina & melle, & colubino stercore cum caricis imposito. Fomentis autem & alijs remedijs utendum, quemadmodum istuc est praedictum. Vt plurimum uero circa uesicae collum suppurantur, quapropter etiam urinae stiliticidium amplius inducit. suppuratur & in uicinis sedi locis, & magis recrementi egestionem impediunt. Suppuratur etiam circa pectinem utrinque: uerum non difficile est ea coniectare, tum loci dolore, tum grauitate, atque ipso adeo tactu: duriora enim & calidiora sunt corpora quae suppurationem incurrent. Ex tuberculis etiam quaedam foras uertuntur ad sedem, quaedam quocumque contigerit defluxus. Periculosa igitur & haec sunt ac omnino letalia, periculosiora autem sunt quae intus rumpuntur.

De uesicae ulceribus, Rufi. Cap. xxix.

Si uesica sit exulcerata, aut propter abscessum, aut ob tuberculum quod praecessit, aut ex ruptura, aut ob fluxionis erosionem, aut ob aliam quamcunque causam: aegros dolor acutus uesicae omni quidem tempore committatur, maxime uero tempore mictionis & excretionis puris, & si quidem sordida fuerint ulcera, feculenta simul excernuntur, & mucosa, & quae crassam subsidentiam ad modum farinae habent: aliquando autem & pelliculae tenues ad modum foliorum & lamiarum cum urina excernuntur. Si uero serpendo depascant ulcera, subcruenta excernuntur & saniosa ac foetida. Ad haec accedunt urinae emittendae difficultas, & pudendi arrectio ac petulantia, & dolor non solum quum urinae meatus fuerit affectus, sed & quum tale quippiam in profundo existit. Cognoscetur autem num in profundo, siue iuxta urinae meatum sit affectio, ex eo quod si in amplitudine sua uesica sit affecta, dolor circa pubem consequatur: Si uero iuxta collum uesicae ulcera consistant, tempore mictionis tantum & maxime ubi mingere inceperint ac cessauerint, dolor sentitur, atque id amplius contingit, si urinae sint aciores. Omnes quidem igitur assidue decubunt & neque erecti stare possunt, neque reclinati quiescunt. ab indefinente dolore, febribus, uigilijs

uigilijs, & colliquatione perimuntur: alij quidē citius, alij tardius. Dolores enim acuti sunt & ulcera iniucunda, partim quod urina assidue ea contingat, partim quod urina natura acris existat, neque quauis plurima excernatur, uniuersa uelica euacuari possit: sed semper ex urina quippiam in ipsa relinquitur, quod continue ulcera contingit: semperque uelica lortio plena existit. etenim quā multitudo eius euacuatur, uelica contrahitur, & quod in ea relictū est quātumuis modicū, id ipsum omnes eius partes contingit, & quantū rursus repletur, paulatim simul extenditur. Propter hoc ipsum itaque, & quod neruosa est, insanabilia ut plurimū eius ulcera existūt: periculosa siue autē sunt quæ ex erosione orta sunt, & modica spes est ea restaurādi. Attamen quum sæpe etiam præter expectationem quædā eueniant, cura est agrediēda, per quam si nihil aliud, certe accessorij dolores minuentur. Primum igitur persuadendus est æger ut decumbat, & in lecto quietem toleret, idque maxime si febres simul adsint: deinde remedia febribus intermittentibus adhibēda, maximum uero hic fuerit lactis potus, neque scio an post ullum aliud remedium secundo saltem loco id sit habendum: nam & asperitates lenit, & ulcerationes eluit, aliasque affectiones extergit: reliqua uero diæta frugi sit & comoda, ut ne urina acris fies, mordeat ac iritet ulcera. Per pharmaca etiā consolari ægrū oportet, quæ supernè pectinem amplectantur, & si quidem cū inflammatione ex ulceratio cōsistat, cataplasmata ex lini semine, & foeno græco apta erūt, & reliqua quæ inflammationē soluere possunt: infusiones itē & fomenta ex oleo & per spōgias. quin & cerata imponēda ex œlypo, butyro, adipe anserino, & styrace apparatus, & ceratum myrteum, quod pro cerusa, samiam terram, aut lemmiam, sphragidem appellatam, aut minium sinopicum, aut diphryges habet ammixtū. Quod si loci uolētius coarctentur, nardinum quidem sit ceratum. maluæ autē radices probè in aqua multa coctæ, deinde tritæ, in ceratum infarciuntur, aut cerata ex meliloto & foeno græco similiter adhibeantur, aut quod tetrapharmacum, itemque quod enneapharmacum inscribitur, laxationem enim mali faciunt, uerum his omnibus aliquid satis amplum de styrace addendum. Porro si exulceratio pascendo serpat, epithematis subadstringentibus utendum est, atque his quidem calidis, ut ob calorem quidem partes circumdolitantes leniendo iuuent, ob potestatem autem ipsorum nomen uicinos locos apprehendere prohibeant. Sylua horum sæpe iam relata est, utpote in palmis, uuis pasis, gallis, malicorio, alumine, acacia, hypodisthide, & similibus sita. ex his singula aut palmis excipiūtur, aut cataplasmatibus ex loliacea farina. decoctio autem sit in posca. Utendum etiam pharmaci per catheterem infusione, ita ut in inflammatis & exasperatis lac recēs multum infundatur, aut rosaceū optimum recēs tepefactum. Si uero nihil horum adsit, aqua dulcissima tepida assidue infundenda, mordacitatis tempore instante: in intestinum quoque per sedem pitisanæ succus infundendus est, & seminis lini succus, & cucumeris semē decorticaum tritum cum lacte, rosaceo oleo ad singula instillato. Cæterum ubi clysterem adhibere uelis ei qui uelicam habeat affectam, non supinum ipsum decumbere oportet: non enim permittunt ue-

licæ infusum intrā transire, utpote induratae & graues factæ, & intestino incumbētes, uerum in genua pronum reclinare hominem oportet, atque ita infusum adhibere. In hac enim situs figura uelicæ secēdunt & intestinum laxant, quo infusum assumere possit. Frequenter autem & in aquam calidam desideant ægri, & in decoctiones relaxantes: nam hæc mitigant dolores. At uero ubi ulcera iam pascendo proserpant, per catheterem injicienda sunt quæ depautionem sistere possunt. Multa autem eius generis sunt, sed plurimis itemque nobis familiare est, ex charta siccum pharmacum, quod cum rosaceo infundere oportet. Facit & Musæ pastillus, cum passo credico tepidus infusus. Quod si uero sordida sint ulcera, pharmaca infundenda sunt, quæ repurgandi uisum habent: uelut est Epigoni chlora, siue uiridis compositio: item quæ Ixis appellatur, multo rosaceo diluta, aut ea quæ ex herbis constat, aut huiusmodi quæpiam alia. Si uero acrimonia consequatur & mordacitas, lac recens multum cum optimo amylo infundatur, aut pompholyx pluribus aquis elota & exiccata, atque deinde cum lacte diluta, aut collyrium Aster inscriptū, aut quod Cynariū appellatur: aut pastillus ex phyllalide, aut panchrestus, à comoditate dictus, qui somnū inducit. Quum uero repurgata fuerint ulcera, adiuuare oportet quo ad cicatricem perducatur, atque id per infusus adstringētes & eiusdem facultatis epithemata. Emplastrū igitur ex ouis cōmodè superponitur, & ex hordeo usto, & ex cadmiā, tripla eorum parte cum cerato myrteo, aut rosaceo cōtemperata. Si uero magis fluxione affectio infestetur, post repurgationē ulcerum, emplastro ex salicibus, aut icessij, aut ex lolio utendū est, donec in totum ad cicatricem perducantur. Atqui nosse oportet repretum est, quod in quibusdam ob solidam cicatricem inductam, seminis meatus excæcantur, & uis generandi perditur: ita ut appetentiam quidem habeant ad cōeundum, nihil autem in totum seminis emittant, atque hæc affectio penitus incurabilis existit. Cæterum si ad multum tempus exulceratio dureret, quēadmodum in plerisque fieri consueuit, tunc sanè & exacerbationes & interualla siue remissiones ægros apprehendunt: quare in exacerbationibus quidem cataplasmata, & fomenta & irrigamenta leniendi uisum habentia adhibeantur. remissionis uero tempore ductu ad destruendum malum apto utendum est. Pecten igitur iuxta membranæ peritonæi appellatæ, locum per malagmatum ad hanc rem destinatorum impositionem rubefiat: sunt autem huius facultatis, id quod ex lauri baccis constat, & epithema uiride appellatum, & similia, maxime uero quæ ad calculosos renes sunt præscripta, quin & sinapisimo utēdum, & diæta uiribus reparandis apta est constituēda. Quod si non mansuescant, & diutius durent affectionis dispositiones, crustas circa pectinem & peritonæum membranam infligere oportet, aut per pharmaca, aut per ferrū, sinereque ut per multum tempus ulcera se per effluxionem repurgent. Neque uero ineptè pharmaca dolorem leuantia in potu exhibueris, si uehementes insistent dolores. Et sanè quidam iam papaueris succum erui magnitudine cum croco & myrrha lacte dissolutis in podicem indiderūt, aut cerato ex adipe anserino apparatus permixtum & lana exceptum eodem modo intru-

intruserunt, scimusque eos non uulgarem commoditatem inde consequutos. Assumantur etiam quae per os exhibentur, si quidem urgeat urinae emittendae difficultas: ueluti est papaueris albi tosti semen, quod drachmae pondere tritum in tres cyathos decocti floris iunci odorati, aut calami indicii, aut radicis dulcis inspergitur & exhibetur: his fortiora sunt meon, phu, acorum, daucus. Plurimum autem exulcerationis dolorē mitigat hoc semen cucumeris granorum triginta, nuces pineas duodecim, amygdalas amaras decorticas quinque, croci quantum ad colorandum satis est, quotidie ieiunus accipiat cum lacte recens mulcto, aut passo protropo, aut uino, aut sapa, quod si lenius reddere uelis, pro nucibus pineis maluae semen pari modo recte confeceris. minore item molestia ab egro procedet urina, si tragacanthus praedictis commisceatur. Probe autem exulcerationē iuuat uerbenacae rectae folia cum passo potata, in duobus cyathis dissoluta, quo facile potu accipi possint. Ad urinae difficultatē quidem & ad ipsam exulcerationem pariter conueniunt, papaueris albi semen, amyllum, myrti baccae nigrae, singulorum drachmae quatuor, croci oui assati dimidium, uncto, & drach. i. ex passo dato. Quod si multum pus efferatur, ferulae uisae drach. i. ex passo diluto exhibita, ipsum repurgat. Deinde autem singulis diebus cucumeris semē decortatum, & crocum, obolorum ii. pōdere, & nuces pineas pityidas appellatas desquamatas v. & anisi obolos iii. simul trita cum uino mulso ex calida aqua temperato, exhibeto. Cyphi item & cyphoides ad hepatis ulcerationes praescripta, in paucis ad eō diebus uesicę ulcera per sanare possunt. Ego autem, inquit Archigenes, ad uetera ulcera hoc usus sum, neque opus fuit mihi pharmaco magis uariiegato. Trixaginis, chamæpityos, cuiusque drach. xxi. asari dra. vii. piperis albi drach. vii. cinamomi drach. i. quam tenuissimē terito, & unita simul reposito. Ego, inquit, ex eo cochlearia ii. cum passo diluto praebeto. Quum uero morsus contingit ulcerosus, amyli cochlearijs duobus, & seminis cucumeris granis xv. adiectis, quod uolui sum assequutus. Suffecerint quidem igitur uolentibus bona methodo remedijs uti, hæc à Rufo & Archigene praescripta pharmaca. Apponā tamen & alia cōsimilia itidem à ueteribus tradita. Sint autem praescripta eorum quae describentur quod ad usum pertinet exēpla. Andromachi, ad ulcera renum & uesicae. Seminis lini, seminis papaueris albi, seminis cucumeris repurgati, tragacanthi, singulorum drach. ii. amyli drach. iii. cum aqua conterito, & in pastillos nucis ponticae magnitudine redigito: ex eisq; drach. i. cū passo diluto dato. Asclepiades autem & Eras hoc modo apparant ad assiduos morsus, & sanguinis ex uesica eruptiones. Seminis lini torrefacti, seminis cucumeris repurgati, seminis papaueris albi, tragacanthi, cuiusq; drach. vi. passī quantū satis est, apparato, & ponticę nucis magnitudine cum passī diluti cyathis ii. praebeto. Ad sanguinis eruptiones, cum aqua dato. Oribasij, ad uesicae ulcera. Profunt & his quidē quae ad renes affectos sunt descripta, proprie autem in potu accepta, portulacae succus cum passo, graminis decoctū, lac, uinum dulce, cupressi coma cum myrrha, erui magnitudine. Ad uesicae dolores, Seminis lini cochlearium i. ex passo, sesamum, seminis hormini drach. i.

oxychoeni semen, loti arboris bacca, seminis papaueris drach. i. cum aqua mulsa, floris cotoneorum decoctum. Eiusdem, ad renū & uesicae exulcerationem. Nucum pinearum heminā italicam, physalidas numero x, nuces iuglandes octo, alij x. habent, croci drachmas viii. seminis rumicis drachm. viii. opij drach. iii. seminis cucumeris decorticati drach. iii. seminis apij drach. iii. mellis cocti quantum satis est. Datur obolorum iii. pondere. Aliud, Andromachi, ad uesicam exulceratam & urinae emittendae difficultatem. Nuces pineas xxx. amygdalas premundatas uistas viii. carnes palmarū xxxv. tragacanthi drachmas quatuor, succi radicis dulcis drachm. ii. croci obolum i. myrrhae tantundem. Excipe passo, ac utere ut dictum est. Aliud, ad uesicae ulcera & inflammationes. Nuces pineas xx. seminis cucumeris grana xx. amyli obolos iii. spicae nardi drach. i. seminis apij drach. ii. Spica & apij in sextario aque uno coquuntur, deinde ad decoctū praedicta miscetur. dantur cyathi ii. ad uehementes morsus calesfacti. Aliud. Amyli drach. viii. baccarū myrti nigrarū maturarū carunculæ dra. viii. seminis papaueris dra. xvi. passī protropi quantū satis est, apparato, & nucis ponticae magnitudine ex passo dato. Pastillus ex physalidibus, ut tradit Eras. ualet ad renū & uesicae affectiones, etiā si pus aut sanguis, aut corpuscula mucosa, aut fibris similia, aut crassa, per urinā exeāt. Facit & ad scabiosas affectiones, & stilitidii urinae, & ulcerationes ægre cicatricē recipiētes: idem & bibitur, & in uesicā inijcitur. Granorū herbe physalidis numero xxv. sunt autem halicacabo similia, paulo tamē maiora: amygdalarum thasiarū decorticarum, croci, nucum pinearum tostarum, seminis rumicis hortensis desquamati, singulorum drachm. iii. seminis cicutæ, opij, seminis foeniculi cuiusq; drach. iii. seminis hyoscyami albi, seminis apij, cuiusq; drach. vi. seminis cucumeris satui desquamati drach. x. Excipe passo, & drach. i. praebe febre carentibus, cum passī diluti cyathis iii. febricitantibus cum aqua. Cæterum si uehementes fuerint dolores, etiam ante somnum praebe. Per catheterē item inijce. Utere autem ut efficacissimo. Quidam etiā nucis ponticae tostae drach. iii. addunt. Aliud, ad omnem renum & uesicae exulcerationem, omnemq; emittendi urinā difficultatē, & calculi affectionem. Portulacam exuecato, succumq; resiccato, & in pastillos redigito, drachmamq; i. cum aqua calida potandam praebeto. Pastillus ex tragematis siue bellarijs, ad renum & uesicae exulcerationes. Vuarum passarum albarū mundatarum bessem, nucū pinearum sextantem, seminis cucumeris decorticati, baccarū myrti exacinarū, amygdalarum amaram delibratarū, aut dulcium, amyli, palmarū pinguiū, seminis apij, singulorum sextantem, seminis papaueris albi drach. iii. tragacanthi, croci, radicis dulcis, cuiusq; drach. iii. myrrhae drach. ii. Redige in pastillos cū cretico passo. Exhibe drach. i. cum passī cyathis ii. Aliud, experimento constans, Olympij sophistae, ad exulceratam uesicam. Rhei pontici drachm. iii. seminis cucumeris decorticati drachm. iii. seminis hyoscyami drachm. ii. seminis maluae drachmas quinque, nucum pinearum tostarum drach. vi. seminis apij drachm. i. amygdalas amaras delibratas lxx. cum sapa subige, & ponticae nucis magnitudine

gnitudine præbe, cum passî diluti cyathis tribus.

Asclepiadæ pharmacum accommodatum, ex cuius usu multos renum affectione apprehensos in totum liberatos scimus. Oportet autem ad multos dies pharmaco hoc uti. Sanat etiam vesicæ affectiones: datur & calculosis, remedio est & colicis. Habet autem hoc modo. Nucum ponticarum repurgatarum, amygdalarum amararum mundatarum, seminis cucumeris depurati, seminis caroi, singulorû drach. III. seminis papaveris albi, aut si non adsit, cicutæ drachm. VI. croci, seminis maluæ, opi, cuiusq; drachm. VI. seminis hyoscyami albi drach. XII. seminis apij drachm. XII. excipe melle cocto & informa pastillos, datoq; obolos III. cum aquæ mulsæ cyathis tribus. Aliud, ad exulcerationes renum & vesicæ. Damasonij drachmas duas, palmarum drach. X. nucum pinearum drach. VIII. seminis cucumeris drach. III. anisi drach. II. amygdalarum amararum drachmas II. croci drachmā unam, dato obolos VII. ieiunis cum passo diluto. Quod si damasonium nō adsit, eryngium coniice. Vtere etiam Xenophili antidoto ad calculosos capite XIII. præscripta, & similibus quæ ad exulceratam vesicam itemq; renes valent, unā cum hoc quod arenulæ minguntur.

Dieta ex libris Archigenis.

Cap. XXX.

Vitet æger omnem delassationem, & longiorem ac efferventem gestationem, maximè vero quæ fit in equo, utgiliisq; & omnem vehementem concitationem, & everso perpetuum ocium, & balneorum assiduitatem: amplius autem & cruditates, & supra quàm convenit repletiones, & ne quid crudum in cibo accipiat, & neque quod ægrè concoquitur, aut facile corrumpitur, aut inflationes parit, sumat: maximè tamen vitet quæ facile acescunt, & quæ crassi humoris sunt, quæ urinam cient, quæ ægrè secernuntur, quæ difficulter infernè excernuntur, & quæ amplius ventrem perturbant. item omnia acris & feruentia, & quæ accepta amplius adstringunt, & magis resiccant, & non nutriunt, & quæ stomacho inimica sunt, & quæcunq; bilem aut pituitam præcipuè gignere possunt, quare & multus potus, & meracior potus, ac ieiunus potus, omnes incommodi existunt, & vice versa longa sitis, & inedia, & eduliorum varietates, & superflua condimenta. omne item nidorosum & graueolens & putridum & crudum præsertim olus incommodum. Hæc enim omnia tum renū, tum vesicæ ulceribus inimica sunt, atqui si quando appetitui gratificari velimus, lactucae cauliculos, aut serin, cruda & cocta minore offensione sumere possunt. A placentis vero & alijs pinguibus abstinere oportet, & à plerisq; bellarijs. Vva passa enim non incommoda est, & nuces pineæ recentes duabus aquis maceratæ, & amygdalæ virides quidem, maturæ tamen & probè mundatæ, siccae vero non vetustæ, sed præmaceratæ & decorticatæ, licet & pistacium sumere, melius quidem viride, aut si id nō adsit, madefactum, minimè vero vetustum. Thebaïca autem palma caryotus qui os non habet, siue id à natura, siue arte ei contigit, acerbior est, & stomachi & renū & vesicæ debilitati convenit. Cæterū genera quidem reliquorū tandem describātur: speciatim autem panis sit recens clibanites decenter apparatus. Ex volucribus montanæ & teneræ carnē habentes & nō antiquæ, Ex pedestribus convenien-

tiores sunt hœdorū extremitates. Ex aquatilibus ad renum & vesicæ ulcera magis congruunt, apua marina minima assidue comesta, non inepti sunt etiam aselli parvi, & qui gobi appellatur: extergunt item ulcera gamarus, locusta, & aliquantulū etiam squilla, cancer autē fluviatilis velut remediū præbeatur, & herinacius recens familiariter permittatur: ex cōchis vero & peloridibus parū quiddā varietatis gratia detur. Pro liquamine autē intinctus ac voluptatis gratia acetū modicum, & quàm minimū gari albi & boni concedendū. Parcè autem utendū est pipere & laseris succo, nasturidoq; & sinapi, ab eruca vero in totum abstinendū, nam & uenerè excitat: coitus autē omnibus renum & vesicæ affectionibus infensissimus est, & maximè senibus ac natura imbecillioribus. Omnia porro quæ in cibo sumuntur, mediocris multitudinis sint, etiam si utilia esse ferantur. Aqua pluuiā nō corrupta omnino melior est: ex alijs vero quæ nullam omnino gustanti qualitatem exhibet, exquiratur. A frigida potu in totū abstinendum: frigidum enim ulceribus inimicū. Balinei vero rarus sit usus: quo vero aliquādo appetentiæ gratificemur, & lassitudinē resoueamus, permittatur. Cæterū naturales aquas experiri non inutile fuerit: aluminosas uidelicet, sulphurentas, & consimiles, quales sunt albulæ, & lactei temperamenti atq; teporis. Frigida etiā lauare ac irritare comodissimum est: supra naturam enim ulcerationes ægrè sanabiles, tum externas, tum internas destruit. De albularū aquarum potu. Conferent itaq; aquæ albulæ si adsint, & cōsimiles post matutinā deambulationem, trium heminarum mensura prima die potatæ, deinde usq; ad quinq; & sex heminas perueniendū. Ad hoc enim quod intestinum eluunt, aer etiā ipsarum fuliginosus vesicam ad doloris sensum percipiendū hebetat, & humoribus segregatis puriorem ac lucidiorē sanguinis uaporē reddit. quin & ipsæ aquæ ulcera utiliter repurgant, & cum uoluptate infra subeunt, atq; adeo nihil ægro sanando efficacius deprehendere possis: hora autem calidior ad eas accipiendas apta est. Quod si nō adsit huiusmodi aquarum qualitas, adsint autē aliæ nullam gustui qualitatem exhibentes, sed latè se ad gustum diffundentes, hæ ipsæ reliquis meliores sunt censendæ, & proximo ab eis loco bituminosæ. Nitrosarum etiā si adsint & fassarū experimentum sumere prodest: maiore enim quàm credi potest sæpe ex his succedentem uidi effectum. Intercapedine autē & distantia à balneo facta, aridarum rerum comestio primum utilis est, nisi sitis simul adsit: tūc enim aqua calida modica sitis extinguenda est, aut aliquo uino dulciore. Adsit autem & oenanthites & myrtiles uinum: nam ea post balnea & exercitia utiliter ad ulcera delabuntur.

De vesicæ fluxione, & his quæ capillorum forma

excunt cum urina, Archigenis.

Cap. XXXI.

Fit aliquando & fluxio circa vesicā, ut aliquando quiddā mucosa, & folijs ac laminis similia, itemq; crassa excernantur, & aut crebro, aut post temporis morā lotia reddantur: aliquando autem aquosa & tenuia. Nouimus autem quosdā etiam pilos per lotium eicisse, modo inuicem perplexos, modo simplices, & aliquando ualde longos, aliquando breues, atq; eos omnes à fluxione productos. Hæc sanè Archigenes. Galenus autem de hoc ita inquit: Capillis similia
G etiam

etiam Hippocrates cum urina prodisse uidit, & nos sanè uidimus quandoque palmi longitudine, quandoque etiam longiora aut breuiora: ex colore autem & compage persuasus sum, ex crasso & uiscoso humore calefacto & resiccato in uenis eos coactos esse: quare quum primum uidissem, per urinam scientia pharmaca medelam futuram speraui, atque ita serè omnibus contigit. Cæterum quibus hæc affectio accidit, nulla renalis mali accessione, neq; antea neque postea sunt uexati, postquam uidelicet per urinam ducenda pharmaca sunt curati. Archigenes autem ad hæc inquit, fluxiones ex locis remouere oportet, uniuersiq; corporis habitum, maxime uero circa renes & uesicam locos uendicare atque corroborare.

De priapismo & satyriasi: Galeni. Cap. xxxii.

Priapismus, tentigo est membri pudendi, & auctio in longum & spissum citra rei ueneræ appetentiam ex caliditate quadam acquisita cum inflammatione quadam & dolore locorum consistens. Appellationem autē accepit priapismus à Priapo uidelicet Satyro: tale enim à natura habentem pudendum homines fingunt & pingunt. Fit autem affectio aut ob dilatata uenarum ac arteriarum in pudendo ora, aut flatu uaporofo iuxta antrosum neruū, ipsum inquam pudendum, oborto. Mihi autē, inquit Galenus, propter utrumque fieri uidetur, sæpius tamen ad dilatata uenarum ora consequi. Aliquando autem propter abstinentiam à rebus ueneris: quidam hac affectione apprehenduntur, atq; hoc ipsum eis qui inulco semine abundant, simulq; præter consuetudinem se abstinent, euenit, quum non per frequens & multum exercitium sanguinis abundantiam discusserint, maxime uero hoc illis contingit, qui rebus quidem ueneris opus habent, in imaginationem autem ipsarum perueniunt per uisiones quæ ipsos in rerum uenerarum recordationem impellere possunt. Cæterum dolores eis contingunt, quales tetanici habent, & hi qui reliquis membris distenduntur: inflatum enim & distentum pudendum conuulsionis modo afficitur, & ex præcipiti hoc modo affecti pereunt, nisi confestim eis auxilium feratur, quum uero moriuntur, uentre inflantur, & frigidum exudant, id quod & eis euenit qui alijs conuulsionis modis perimuntur. Propter dolores igitur & inflammationes uenam secare statim à principio conuenit ab affectione prehensos, & in inedia adseruare usq; ad dies tres, irrigareq; pectinem & coxendices unā cum pudendo ex lanis succidis uino & oleo imbutis: sicut itē premere, & aluum obturatum euacuare non acrimium clysteri, ne inflammationes exacerbentur. Cibum autem exhibere frumentaceum paucum atque omnino nihil infantem, & in aquæ potu continere. Quod si diutius duret affectio, etiam cucurbitæ cum scarificatione affigendæ sunt: & si amplius sanguinis multitudo adiacere uideatur, hircudines adhibendæ in ipsum locum: cataplasmata uero imponenda sunt ex cruda ordeacea farina. Optimum etiā fuerit aluum submollire per betæ & maluæ decoctum pauco mercurialis succo admixto. Concharum item decoctum in potu exhibendum: ab effluuiis autem purgantibus pharmacis in totum abstinendum. Cauenda etiam quæ urinæ ciendæ facultatem habent. Vitendum autem cibis frumentacei generis, qui leniter attenuare ualent, citra mani-

festam calefactionem. Lumbis uero quæ euidenter refrigerant imponenda, uelut est solanum, portulaca, hyoscyamus, & semperuiuum. Necessario etiam coles & intercapedo inter anum & pudendum ex aliquo leniter refrigerante illinitur, uelut est argenti spuma, cimolia, & cerusa, si aceto, aut posca, aut aqua sint diluta. Optime autem facit in ipsis ceratum ex rosaceo optimo apparatus, & frigida aqua sæpe elutum, si cum pudendis, tum lumbis imponatur. Porro in latus decumbere ipsos ex re est, & substernere ea quæ ad seminis profluium dicuntur: in potu amplius præbere quæ ad illos describentur. A spectaculis uero & narrationibus, ac commemoratione eorum quæ ad uenerem excitare queant, penitus sunt arcendi.

De seminis profluuio: Galeni. Cap. xxxiii.

Profluium seminis excretio est eius præter uoluntatem, citra pudendi tentiginem. Nomen autem habet ex eo quod inuitis profluit semen. Fit autem affectio ipsa ob retentiuæ in uasis seminarijs facultatis imbecillitatem. Quemadmodum enim in his qui secundum naturam integris uiribus præstant, ea quæ in nutrimentum cedunt retinentur, & excrementa excernuntur: sic in his qui præter naturam habent, excrementa aliquando ob expulsiuæ facultatis infirmitatem retinentur, & ob retentiuæ debilitatem excernuntur, aut etiam ob aliquam aliam affectionem, quæ seminariarum uasorum partes eodem modo quo expulsiua secundum naturam facultas mouet: ueluti in comitialibus, & alijs uolentioribus conuulsionibus contingit, aliquando etiam in his qui ex conuulsione moriuntur, ut uidelicet semen eis excernatur. Profluium igitur seminis uasorum seminariarum affectio est, non pudendi, quæ dolorem quidem non ita ualde inferre solet, molestiā autem non uulgarem & pollutionem exhibet ob assiduam & inuitis contingentem seminis fluxum. Oboritur autem aliquando etiam ex seminariarum uasorum fluxione: quandoq; etiam satyriasi præcedente profluium seminis succedit. contingit autem affectio maxime pubertatem transgressis citra decimum quartum annum, imò alijs item ætatibus. Est autem semen quod profluit aquosum, tenue, citra appetentiam coeundi, & ut plurimum quidem citra sensum, quandoq; uero cum uoluntate quadam promanās. Corruptitur affectis semini uniuersum corpus ac gracilescit præsertim circa lumbos. Consequitur & debilitas multa non ob multitudinem seminis profluentis, sed ob locorum proprietatem. Non solum autem uiris, sed & mulierculis hoc accidit, & in foeminis sanè ægrè tollitur. Cæterum cura communis est cum ea quæ in omni fluxione adhibetur. Primum igitur in quiete, & pauco cibo, ac aquæ potu affectos adseruare oportet: deinde etiam lumbos & pubem tegere lanis uino & rosaceo, aut oenanthino, aut melino madefactis. neque uero ineptæ sunt spongiæ posca imbutæ. Sequentibus uero diebus cataplasmatibus ex palmis, malis, acacia, hypocisthidae, oenanthæ, rhoë rubro, & similibus, insensibus item adstringentibus utendum est, ex lentisel, rubi, myrti, & similibus in uino austero siue mero siue diluto decocto. Cibis autem utendum qui ægrè corrumpuntur, & difficulter permutantur, & resiccandi uim habent. Dandum etiā cum potu ac cibis uiscis ac cannabis semine præsertim costū,

rutæ item semen ac folia, lactucæ semen, & cauliculus, ac nymphææ radix. In potu uero quotidie pro communi aqua, aqua in qua ferrum sæpe extinctum est, præbeatur. Quidam uero corticem radicis haliacabæ ex aqua eis bibendum præbuerunt, neque ineptum fuerit huius aliquando periculum facere. Anaxidorus etiam hæc magnæ celebritatis, tum ad hoc modo semen profundentes, tum ad assidua in somnis profluvia, commodè exhibetur. Seminis salicis drach. vii. calaminthæ drach. vi. seminis uiscis albæ drach. v. rutæ drachm. iiii. seminis cicutæ drachm. ii. cum aqua in pastillos digerito, & ex eis ad ponticæ nucis magnitudinem cum poscæ cyathis tribus præbeato. Omnem uero acrum rerum esum, & multum uini potum, & olerum exhibitionem uitare oportet: diætam uero uniuersam resiccatoriā & adstringentem constituere. Post prima autem mox tempora ad uentiliones & exercitatricem diætam transeundum, per quam totum corpus & præsertim affecta ad sanitatem perducantur, & plurimo quidem tempore circa unctiones immorandum: paucies uero lauandū, si aut lassitudini aut cruditati mederi uelimus. Bonum fuerit etiam, si nihil prohibuerit, ad frigida lauactionem defugere, quæ omnem morbum ex fluxione abortum depellere consueuit, maxime si medicamentaria qualitate aqua prædicta sit, uelut sunt in albulis aquæ, quæ etiam in potu acceptæ eis summe profunt. sunt autem sapore subsalfo, & tactu lactei teporis. Conuenit item per interualla quædam, illitionibus & epithematis & malagmatis uel, quæ rubefacere & emollire possint, atque ea quæ in profundo hærent ad superficiem transferre. Decubitus porro frequenter in latus fiat, calaminthæ folijs, & rutæ ac uiscis substratis. Epithema autem in eis usu uenit hocce: Capillum ueneris multum, contundito & terito cum aceto, aut apij succo, aut seridis, aut psyllij, eoque cochlearum carnes coctas excipito, & simul in linteolum infarta coxendicibus imponito. Videndum uero & præscripto ad priapismum cerato, & his quæ paulo mox ad seminis in somno profluvia dicuntur. Omnem autem de rebus uenericis cogitationem excludere oportet.

De seminis in somnis profluuio, Philagrii.

Cap. xxxiiii.

Semen in somnis profundere dicuntur, quicumque dum dormiunt naturæ genitale semen emittunt: quod ipsum eis ut plurimum ob uisitati humoris materiam, aut materiæ multitudinē, aut ob partium seminaliū robur contingit. Iam uero quidam & ob animi molestiam, aut inedia, per somnos præter consuetudinem semen excreuerunt: atque id materiæ acrimonia irritati, non ob partium seminaliū robur pertulerunt. Huiusmodi sanè, qui uidelicet animo molesti fuerunt, aut inedia diutius pertulerunt, in totum ferè nulla imaginatione præcedente, citra sensum etiam, in somnis profluit semen. Reliquis autem non solum cum pudendi intentione, sed etiam cum quadam proposito imaginatione, quæ in somnis occurrit, inordinate semen profunditur. Cæterum pessimus corporis habitus hic est, quum semen multum & calidum aliqui generant, quod eos ad excretionem urget, atque postquam per coitum elegerint, exolutionem oris uentris patiuntur, & toto corpore exoluuntur, debilesque fiunt & sicci, & tenues, & pallidi, oculos etiam riuos

habent hoc modo affecti. Quod si à coitu uenero abstineant, propterea quod ita afficiantur, capite discruciantur itemque stomacho, & æstu fastidioque anguntur, nihilque magnopere ex continentia iuuantur: contingit enim eis per somnum semen profundentibus consimilia perpeti offendicula, qualia coeundo perpessi fuissent. Quidam uero ipsorum mordax, & calidum semen percipiunt in excernendo, uelut ipsi confitentur. His igitur, inquit Galenus, consulere oportet, quo à cibis semen gignentibus abstineant: accipiant autem non solum cibos, sed & pharmaca quæ semen extinguant: uelut est uiscis semen tostum & perfrictum: folia item & flores uenerem cohibere creduntur, non comesta tantum, sed & in potu sumpta & substrata. Lentium uero decoctum etiam membræ tentiginem remittere ac sedare aiunt. Portulaca comesta, & lactucæ semen potatum, & nymphææ radix & semen in cibo accepta, semen refrigerando extinguunt. Ruta uero comesta calore suo semen coagulat & corrumpit. Calaminthem autem assidue edentes generandi potentia priuari dicuntur, id quod similiter & uiolæ albæ semine, & hederæ cacumina nigra tria faciunt. Cæterum aqua fabrorum ferrariorum in qua ferrum sæpe extinctum est, assidue potata, citra molestiam imminuit semen. Horum autem omnium sylua uniuersa in secundo huius tractationis præscripta est Sermone. Compositis porro ad ipsos utor, tum his quæ ad seminis profluium sunt præscripta, tum hoc ipso. Ammij grana vi. foeniculi tantundem, foliorum rutæ parum quiddam cum caricis pinguibus tribus, per mensem semel edito, aut quotiescunque uelis. Atque assiduum eorum quæ uehementer refrigerant usum, tum in his quæ per os exhibentur, tum in eis quæ forinsecus apponuntur, uitare oportet: uelut sunt ea quæ ex papauere & mandragora apparentur unguenta. Illitiones autem à balneo adhibeantur ex mediocriter refrigerantibus. Sunt autem hæc: oleum ex crudis oliuis expressum quod omphacinum appellatur: rosaceum maxime quod ex omphacino est apparatus, & melinum. Componenda autem sunt aliquando unguenta compage crassiora, ne uidelicet facile defluant. Compositio uero ipsorum est ex cera, & succo aliquo adstringente aut refrigerante commixtis, hoc modo: Cerae partem unam cum quadruplici oleo liquefacto, deinde in mortario cum manibus sufficienter emollito, & paulatim ex succo refrigerante quantum expedit instillato, unito, ac utor. Succus uero ad hanc rem apti sunt, succus semperuiui, solani, umbilici ueneris, psyllij & sanguinariæ, tribuli, perdicij, nymphææ & portulacæ: uerum hæc succum non emittit, nisi ad eam contusam in pilam, aliquis alius tenuis succus affundatur, uuae præsertim immaturæ, & rosarum, qui sanè in æstate facile parabiles sunt. Alij uero multi etiam alijs temporibus haberi possunt, uelut lactucæ, seridis, stratiotæque & lentium quæ in aquis nascuntur: semen lini etiam in aqua coctum, succum moderate refrigerantem reddit: rhamni item foliorum succus, & quæ his similes existunt. Optimum etiam censetur laminam plumbeam lumbis supponere, tum eorum qui in somno, tum qui alias semen profundunt: multum enim refrigerare consuevit. In his uero qui plumbi duriciem ferre non possunt, consulere oportet, ut ex prædictis herbis quædam arefactæ subternantur, quibus etiam

G 2 uiscis

hanc ex aceto uirat quæ
celsius lib. 4. cap. 7.

uitidis folia & modica ruta ac calaminthe commisceantur, maximè uero ipsæ rosæ. Profunt enim hæc citra renum læsionem. Vehementes namque refrigerationes eorum quæ lumbis subduntur, renes iniuria afficiunt. Ipsum etiam stratum pelliceum sit, & non ualde molle. Decubitus porro ut plurimum in latus fiat, uitata forma decubitus supina, ne lumborum arteriæ inde supercalfiant. Atque hæc quidem communis est omnium quibus semen in somnis profuit cura. Cæterum eos qui prædictum uitiosum corporis habitum & constitutionem habent, de illis dico, quibus ex coitus usu stomachus iniuria afficitur; illos, inquam, obseruare oportet, quando maximè seminis multitudo, quæ excretionem expetat, cōgregata appareat: & tunc sanè in die quadam moderato ac boni succi cibo usi, à cœna quum ad somnum uertuntur, coitu utantur: sequenti uero die quum sufficienter dormierint, & à somno surrexerint, lintheolo corpus perfricent, donec cutis quendā attrahat ruborem: deindeq; olei cōfricatione, & inritu moderatè utantur, & aliquātulo temporis spatio interiecto, panem bene fermētatum, clibanitem, purum, modicum ex uino diluto accipiant, atq; hoc modo ad consueta munia obeunda perueniant. Eo uero tempore quod inter olei inritum & panis exhibitionē intercedit, si locus adsit in uicinia aptus, in eo paulisper deambulent: si uero hyemis tempus instet, melius fuerit tamdiu intus deambulare. Abstineant autem à spectaculis & lectionibus quæ ueneræ rei usum in memoriā reuocare possunt. Et quotidie sanè hoc modo affecti exerceantur his exercitorum generibus, quæ per supernas partes fiunt. At uero corroboratiōe stomachi ex esu panis cōmunem designamus in omni homine, cui bilis effertur, & qui stomachū exolutum habet. Quare & hi circa horam tertiam diei modicū panem ex uino cum calida aqua diluto madefactum accipiant, atq; ita ad consuetas operas prōdeant.

De his qui re ueneræ uti non possunt. Cap. xxxv.
Qui re ueneræ uti cupiunt, ignaua autem & impotentia mēbra habent, infernas coporis partes exerceant, inguināq; & femora his confricent, pipere uidelicet, nitro, & euphorbio cum oleo, unguentisq; ex huiusmodi rerum ammixture apparatis: exempla autem componendi paulo post dicemus. Dormiant in mollibus lectis, legantq; quæ ad coitum cohortantur, lectionibus itē ac spectaculis eiusmodi asideant. Cæterum edulia & pharmaca ipsis conueniunt calefacientia & instantia, ueluti sunt, ciccor, fabæ, halica, porri, bulbi, pastinacæ radix & semen moderatè, nux pīnæ, ari radix cocta, colocasi radix cocta, itēq; dracunculi, urticæ semen, rapī semen, erucæ tum folia, tum semē, maximè agrestis, costus & piper cum uino mulso, satyrium, sesamum, horminū, amygdalæ moderatè, anisum, polypodes & concharum genera omnia: perdicis item oua ad coitum excitant, & testiculus galli. Seminis uero multitudinem augent omnia bono succo prædita: testes uulpis sicci triti cochlearij mensura potati innocuam & minimè uanam membri tentiginem faciunt: partes etiam renes scinci amplectentes ad tentiginē pudendorum excitandam bibuntur. Orchis, herba est quæ testiculi appellationem habet, eius maior bulbus cū lacte potatus tentiginē ciet: minor uero cū aqua potatus,

tentiginem remittit. Compositū tentiginem ciēs, & faciēs ad languorem membrorū, ac resolutionē. Sinapis, radicis panacis, seminis erucæ cuiusq; drach. viii. seminis cardamomi drach. iiii. piperis grana xx. redigito in pastillos cū erucæ succo, & dato dra. i. ieiunis cum uino ueteri adstringente. Aliud. Seminis hederæ nigræ, floris chamemelli, seminis oxy-schoeni, cuiusq; drach. iiii. seminis erucæ, piperis albi, sinapis, cuiusq; drach. i. pyretri drach. iiii. excipe melle, & ad strigmentorū spissitudinem redige, præbe à balneo nucis pōticæ magnitudine. Aliud. Pudendum cerui aridum urito, & drachmā unam cum uino meraciore præbe. Experimento constat. Aliud, quo & ego utor. Seminis hormini, sesami, piperis, seminis erucæ, sinapis, nucum pinearum, caudæ scinci, satyrii, floris iunci odorati, styracis, seminis porri, uux passæ, singulorū æquales partes, mellis quantum satis est: præbe drachm. i. Aliud, quo etiam ipse utor. Salis cōmunis torrefacti sesquifextarium Italicū, hoc est, uncias xxxvi. seminis hormini scrupulos duodecim, spicæ nardi unciam unam, salis scinci unciam i. caudæ scinci drachmas quatuor, ammi scrupulos duodecim, satyrii sextantē, piperis unciam unam, seminis cardamomi unciam unam, seminis foeniculi unciam unam, myrrhæ unciam i. seminis erucæ drachmas sex, seminis uerbenacæ supinæ aridi drachm. tres, seminis sanguinaræ sicci dra. ii. nucum pinearum unciam unam, physalidum drachmas iiii. seminis hyperici drach. iiii. contundito, cribrato, & ad uesperam cochleariū quomodocūq; uelis exhibeto. Aliud uehementèr efficac. Myrrhæ, piperis, spicæ nardi, tragacanthi, cuiusq; drachmā i. thuris sesquidrachmā, croci drach. i. styracis, galbani, dauci, seminis hormini, cuiusq; dra. ii. cāchryos, seminis foeniculi, seminis lini, seminis urticæ, seselis, cumini Aethiopici, anisi, seminis erucæ, cuiusq; drachmas vi. erui albi tosti drach. vi. seminis apri drach. iiii. sesami, non loti drach. x. amygdalas amaras delibratas quindecim, amygdalas dulces triginta, nuxes pīnæ centum, bulbos erudos magnos sex, mellis quantum sufficit, ut ad cerati crassitiem redigatur, præbe drachmā i. ante cœnam, cum uino mulso maximè, aut uino austero. Facit ad tēiginē, & superabundantem rei ueneræ usum ciendum, in senibus præsertim & debilitatis. Facit & ad liberorum procreationem. Unguentū efficacissimū. Olei uetustissimi librā i. erucas in tithymallis repertas nonaginta sex: erucas in æstate, dum in uigore est herba, accipe, & in oleū coniectas ad solem per dies septem expone, & postea oleo utere: ani & pudendi interea pedine, itemq; lumbis ex eo confricatis. Idem etiam pinus erucæ faciunt, & tentiginē uehementer ciunt.

Oribasij satyrica. Zingiberis, radicis satyrii superioris, cuiusq; drach. viii. caudæ scinci, mei, asari, petroselini, cardamomi, seselis, cuiusq; drach. iiii. seminis erucæ drach. iiii. cardamomi drach. iiii. hormini, piperis, seminis urticæ, cuiusq; drachm. ii. floris iunci odorati drach. i. spicæ nardi drach. i. sanguinis hircini sicci cochleariū plenum, datur drachma i. cum uino, imbecillioribus uero cum lacte. Oribasij, ad pudendi lāguorem ac resolutionem, præsertim senum. Seminis erucæ drachm. ii. cumini unc. i. portulacæ unc. i. excipe melle, & mane ac uesperis cochlearium præbe. Porro ad coitum concitat passer troglodytes

dytes appellatus, in cibo acceptus. Verum his, qui frequentius & supra quam conuenit inde coeunt, uirinam caprae bibendam praebe. Oribasij, tenciginem ciens. Piperis, petroselini, nucum pinearum, scobis pudendi ceruini aridi, terebinthinæ, æquales omnium partes melle excipe, & cum uino bibedas praebe. Aliud, Oribasij. Stellionem uustum quam tenuissimè conterito, deinde oleum affundito, atque ex eo magnum dextri pedis digitum inungito, & cocto: ubi uero à coctu cessare uelis digitum ipsum abluito. Aliud eiusdem. Leporis coagulum, aut leonis adipem pudendo illinito: deinde tria piperis genera cum tragacanthi succo testiculis intercapedini inter anum & pudendū, ac lumbis oblinito. Ex Rufi libris unguentū efficax tenciginē ciens. Myrrhae drachmam unam, sulphuris uiui drachmā unā, cnicī interioris drachmā unā, pyretri obolos duos, melanthij drach. ii. piperis grana xxx. grana cnidia depurata uiginti, cotundito, & cū drachmā una succi scillæ terito, ceræ ꝑ unciā unā, cum olei cicini besse colliquato: mellis item quadrantem adijcito. Vritor. Post coitū uero cum linteolo loci diligenter extergantur. quidam uero hoc unguento sedem illi-

nunt. Porro Rufus etiam hæc addit. Facile est, inquit, & hic remediū reperire, his qui uenere uri non possunt. Adolescens enim quispiam nos accessit, & se uehementer coitū appetere confessus est, uerum ubi commisceretur, semen emittere non posse, sed flatus plurimos sibi per sedem erumpere. In hoc itaq; cōiecturam feci, uasorum seminariorum siccitatem adesse: quod ipsum etiam adepta sanitas demonstra-uit. nam postquam humida & boni succi diæta esset usus, semen emisit. Alius item adolescens domesticus minister, confessus est se, quando cum muliere rem haberet, semen effundere non posse: quum uero dormiret: plurimum ei semen prodire. Visum itaque mihi est, uasa eius seminaria propter multam unā cum frigidityte humiditatem, calferi non posse: propterea quod caliditas in coeundo ad corporis superficiem diffunderetur. In somnis uero amplius calefieret, propterea quod somni interna calescunt, & refrigerant exteriora. Quare hunc ipsum infernas partes exercere iussi, atque id maxime per equitationem. Castorium etiam bibendum praeui, & diætā omnem calidam & siccam constitui.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

DVODECIMO SERMONE AETII
CONTINENTVR.

DE ischiadicis siue coxendicū dolore. cap. i.
De herba iberide, quæ & cardamine appellatur, eiusq; sinapismo. cap. ii.
De uestione. cap. iii.
Cura affectionis exacerbata. cap. iiii.
Epithemata & malagmata ad ischiadicos. cap. v.
De podagra & arthritide siue articularum morbo. cap. vi.
Cause uniuersales. cap. vii.
Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus. cap. viii.
Quare multo tempore aut pauco morbus duret. cap. ix.
Quæ sit incuruatorum articularū causa. cap. x.
Quæ causa generationis toforum in artubus. cap. xi.
Quæ causa sit cur inflammationes in podagricis non facile suppurētur. cap. xii.
Quomodo ex inflammationibus & consequentibus accessionibus siue symptomatis, adfligens humor cognoscatur. cap. xiii.
Sanguinei humoris influentis signa. cap. xiiii.
Biliosi humoris signa. cap. xv.
Pituitose fluxionis signa. cap. xvi.
Bilis atræ influentis signa. cap. xvii.
Serosarum fluxionū signa. cap. xviii.
De his qui ex humorū complexu fluo-

re infestantur. cap. xix.
Diæta & cura podagricos præseruās. cap. xx.
De olei & salis affricu in podagricis. cap. xxi.
Vniuersalis methodus curationis podagricorum. cap. xxii.
Cura eorum qui ex sanguinis copia egrotant. cap. xxiii.
Quod eleuatas & incuruas uenas ex membrīs fluxione infestatis, uelut in uaricibus, auferre oporteat. caput x xiiii.
De perustione in morbo articulari. caput x xv.
Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatum. cap. x xvi.
Cura eorū qui neq; uenæ sectione, neq; purgationem sustinere possunt. caput x xvii.
De his qui ob bilis influxum egrotat. cap. x xviii.
Parabilia remedia ad inflammationes nō ualde feruentes. cap. x xix.
De stupefacientibus medicamentis caput x xx.
Vnguenta recalsfactoria quæ post stupefactiuorum usum adhibentur. caput x xxi.
Pharmaca & edulia eorū qui flauæ bilis influxu infestantur. cap. x xxi.
Cura eorum qui ob pituitæ influxum egrotant. cap. x xxi.

Cura eorum qui ex atræ bilis influxu egrotant. cap. x xxi.
De his qui ob tenuem & serosum influxum egrotant. cap. x xxi.
De fluxionū inter se complexu. caput x xxi.
Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu. cap. x xxi.
Cura bilis ad pituitā permixta. caput x xxi.
Cura humorum atræ bilis alijs permixtorum. cap. x xxi.
Cura durorum humorum qui post inflammationes relinquuntur. caput x l.
De tumorum crudorum & incoctilium cura. cap. x li.
Malagmata diuersa, in quibus etiā Lucij malagma est, ad articularum distortionem destinatum. cap. x lii.
Cerata podagrica. cap. x liii.
Vnguenta & acopa diuersa ad podagricos, articularum dolores, ischiadicos, membrīs exolutos, & trementes. cap. x liiii.
Ad durities in artubus instar toforum. caput x lv.
De medicamentis purgatiuis articulari morbo accommodatis. caput x lvi.
Antidoti podagrice. cap. x lvii.
Qui podagrici lauandi sint, & quomodo. cap. x lviii.

AETII MEDICI GRAE CI CONTRACTAE EXVE-

TBRIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLISIVE QUATERNIONIS

TRATIBVS QVARTVS ET

ORDINE DVODECIMVS.

De ischiadicis siue coxendicum dolore, deq; podagra & articulari morbo, quem Graeci arthritidem appellant.

De Ischiadis siue coxendicum dolore. Cap. I.



ARCHIGENIS, Ischiadici, hoc est ex coxendicum dolore affecti, proprie dicuntur quibus dolor circa iuncturam quandam uertebrarum innititur. Antecedit autem & quasi auspicatur hoc malum aliquando quidem uicinarum musculorum dolor, & maxime lumborum: aliquando uero ab ipsa iunctura initium fit affectionis. Iam uero quandoque etiam contingit ut uertebri dolore fere sublato, circa popliteum solum afflictio haereat: alius autem iuxta talum: quibusdam uero totum crus equaliter dolore affligitur. multis ite circa inguina dolor figitur, & tunc sane uesica ipsa molestiam transsumens, urinae difficultatem inducit: & tunc maxime totum crus a coxendicibus usque ad calcaneum dolore perfert, & non solum si ipsum crus moueatur conuulsiones infert, uerum si etiam aliqua alia corporis pars agitetur. Generant autem hanc affectionem assidue cruditates, & immodicus rei ueneris usus: aliquando etiam deambulationes concitatiores, & haemorrhoides suppressae, & uomendi consuetudo intermissa, & purgationes menstruae, aut etiam aliae familiares excretiones impeditae, & exercitiorum contemptus. Communis quidem igitur ischiadicis, podagrae, & articulari morbo existit ualida alicuius humoris ubertas, quae affectum articularum nexum occupat: quo impleto ex porrecta neruosa corpuscula tensione affliguntur, atque ex his oboritur dolor. Caeterum ad affligentis humoris cognitionem conferet dieta quae praecessit, & anni tempus, & aeris nos ambientis status, aetasque & habitus, itemque color corporis: amplius autem & doloris specimen, siue serpens & pungens, siue stupidum. Initium igitur curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione, & si quidem humoribus ex aequo redundarit corpus, praeter omnibus uenae sectio adsumatur: deinde etiam purgatio: postea uero ea quae dicuntur pharmaca opportune & ordinate adhibeantur: ita ut in manibus quidem & pedibus pharmacis fluxum repellentibus utamur, circa coxendicum uero iuncturam id facere uitemus: quum enim hic connexus in alto situs sit, sanguis ex uicinis & ambientibus uenis ac musculis ad ipsum impellitur: quare lenitius in principio opus est pharmacis ad coxendicum dolorem, atque ea neque omnino refrigerent, neque fortiter calfaciant. Etenim quae refrigerant, ad connexum materias impellunt: quae uero uehementer calefaciunt, aliam amplius materiam ex adiacentibus partibus adtrahunt. A multitudine itaque sanguinis coxendicum dolorem obortum uenae sectio curat, si primum cubiti uenam secemus: deinde etiam eam quae iuxta talos est, aut popliteum. In principio enim omnium inflammationum diuulsoriam uenae sec-

tionem facere oportet, ueluti si pes sit inflammatus, ex uena e directo loci affecti sita sanguinem extrahemus. In affectionibus uero iam inueteratis, maxime quidem ex ipsis locis affectis extrahemus: aut si id fieri non possit, ex uicinis. Post sanguinis uero e cubito detractionem, a talo repedita sectione auferre oportet, secunda est autem interna uena iuxta talos sita: uiriliter enim imbecillis auxiliatur. Et scdo, inquit Galenus, coxendicum dolores in una die curatos per hanc ex cruribus euacuationem, maxime si non a frigida e sint oborti, sed ex uasorum sanguinis circa coxendicem repletionem. In omni equidem coxendicum affectione, praecipue tamen ea quae humoribus ex aequo redundantibus oboritur, si quis prius quam corpus euacuet, acris pharmacis ad affectam particulam utatur, egerrime sanabilem affectionem reddit, utpote multitudine ibidem insolubiliter condensata: supra reliqua enim inspissatur & uiscosa redditur, & ob acrum pharmacorum caliditatem & siccitatem non dissimile quippiam assationi perpetitur. Ab euacuatione igitur totius corporis, ut quae maxima facultate ad huius affectionis curam praestet, curandi initium faciemus: & non solum a cruribus, sed & a cubito primum sanguinem extrahemus. Sunc & uomitus ischiadicis commodi, atque adhuc amplius quam per uentre euacuationes, nimirum retrahentes humores infra repentes. Eos igitur in principio affectionis facere a cibo expedit. Inueterato uero malo etiam a pharmacorum uomitu clementi acceptione, ita ut a mediocribus incipiamus. Porro quibus iam indissolubilis humorum coactio in ipso articulo a medicis per immodicum acrum pharmacorum usum facta est, his cucurbita quam maxima cum scarificatione locis affixa auxiliatur, & purgatio per infusa efficaciora. Qui igitur iam dicta praeculis habuerint, etiam praescriptis a ueteribus medicis pharmacis iuxta methodum poterint uti. Itaque post uenae in cubito sectionem, & a talo ite sanguinis detractionem, aut per purgatiuum euacuationem, ubi uidelicet aluus leniori clysteri injecto excreuerit obturata, irrigare locos oportet, primum quidem ex oleo rutaceo, postea uero etiam efficacior irrigatio adhibenda quae sensim calfacet, & materias ex alto ad superficiem attrahere possit, qualis est quae ex cyprino, aceto, nitro, & eacchry constat: ita ut octo quidem cyathi olei cyprini, quatuor uero acris aceti, duo autem nitri, & unus eacchryos conciantur, & donec ter aut quater efferueant, coquantur: post uero expressus & in lanis succidis exceptus succus super affectos locos imponatur, uerum quotidie renouare hanc irrigationem oportet, & tribus uicibus hoc solum admoto perfectus animaduersionem habeto. Multos enim, inquit Archigenes, uidi qui nullo alio praesidio operari habuerunt. ego uero, inquit, post praedicta etiam simpliciore

simpliciore clysterē infundo, & sequenti die acrimoniam, atq; haud scio an ullus tam degener coxendicum dolor reperitur, qui huic praesidio non cedat: aut si aliquando ad primam adhibitionem non cessat, post alterum eius usum penitus excisus est. Apparatur autem acris clyster hoc modo. Mellis. sesquicyathū, olei tantūdem, aquae cyathos II. nitrī drach. viii. cerebinthinæ drach. iiii. hæc unita & calefacta infundito, & podici fomentum apponito, quo diutius infusum cōtineatur. nam sic magis operatur, ut plurimū uero mucosam humiditatem extrahere cōsuevit, aliquando autem & sanguinem, quando etiā maior commoditas resultat. Quod si adhuc affectio ipsa persistat, paucis diebus interpositis, non tamen ut prioris praesidij utilitatem demollamur, rursus clysteri utemur pro simplici aqua, cētaureę decocto ad praedicta affuso, quo robustius pharmacum reddatur. Supra opinionem autē ipsis commodat cucumeris syluestris radix in tenues partes concisa, dein de paulū cocta, atq; decocto eius cum solo melle infuso, citra omnem mordacitatem euacuat assilgentē humorē. Optime etiā facit lupinorum amarorum decoctū cum pari oleo infusum. Sæpe enim, inquit Archigenes, hæc praedicta cura ad omnes ischiadicōs mihi sufficit. Quod si tamē affectio adhuc remoretur, cucurbita quam maxima cum plurima flamma locis affigatur, uulnuscūlis etiā altioribus per scarificationem impactis. Cæterum & reliquam curam referre operæ pretiū existimo, ut nota sit, si quādo usus eius necessario exspectatur. In omni enim tempore plurima curationis principia cōstituenda: hoc enim modo facilius affectio destruetur, si assiduæ praesidiorū permutationes fiant. Itaq; ubi rursus mederi cōperis, uomitib. uteris siue à cœna, siue à raphani acceptione cōstitis: deinde loci affectū & totū corpus in balneo per nitrū extergatur, post balneū autē loci ex unguento per adarcē & euphorbiū cōpositū illinantur. Deinde rursus aliud medendi initiū à purgatiōe facies. Solitus autē fui, inquit, purgatiuū ad ischiadicōs assumere huiusmodi. Colocynthidas quotquot uelis accipito, & derafa ac proiecta medulla ipsas oleo optimo expleto, & totam noctem sinisto, deinde oleo per se effuso, cum uacuo colocynthidis calice aquā una & dimidia olei mensura commēsurato, ac in ollam fundito, atque cum ea ipsa communi aqua colocynthidas ipsas donec flaccescant, coquito: & expressas ipsas quidem abiecto, liquorem autem excolato, & affuso ad ipsum oleo feruēfacto, ac panis siliginel contusi & cribrati quantū satis erit inspergito, manibusq; satis diu emollicto, ac pilulas ad nucis ponticæ magnitudinē formato, ex eisq; xxiiii. pilulas à balneo exhibeto. Si uero fortius reddere pharmacū uelis, ad hāc dosim ueratī nigri corticis tenuissimē triti obolos tres, & scammoniae scrupulū unum adiuncto. Possum autem idem de hoc praesidio quod supra de clysteri dixi referre, quod uidelicet solū aliquando sufficit etiā eam quæ per multū tempus indurata est coxendicum affectio nem extirpare: licet itaq; eo sæpe uti, multitudinē tamē eius imminuta, & sanē moderatam eius multitudinē obseruauimus numerū xviii. pilularū. Eis uero qui pilulas deuorare non possunt, colocynthidis cremorē exhibeto hoc modo. Colocynthidē quam maximā perforato, & electo semine, relictō autē eo

quod instar comēti inest in totū, colocynthidē ex uino dulci ueteri expleto, & per totā noctē sinisto, & cū defecto ex ea operculo cooperito. Mane uero excolato per panniculū uinū, & reperfactum bibēdū præbeto. Si uero parua fuerit colocynthis, duas pro una uino expleto & exhibeto. Quod si efficaciorē reddere uelis hūc cremorē, ueratī nigri obolos tres adiuncto, & scammoniae sesquibolum. Cæterū per intervalia quædam praedictō clysteri ex cucumeris uidelicet syluestris radice apparato, etiam ad ipsos utaris.

De herba iberide, quæ & cardamine appellatur.

eiusq; sinapismo. Cap. ii.

Quod si uestigium quoddā affectionis relinquatur, herbae iberidis quæ & cardamine appellatur, radix assumenda est: etenim odorem & saporem ac figurā cardami, hoc est, nasturtij, habet. Multa autē ubiq; nascitur, maxime tamen circa uetera monumenta murosq; & circa uitas in incultis locis. Folia autem habet nasturtij uere quidē uirētia, & nasturtio multo maiora: lōgicudo uero caulis cubiti parū est aut paulo amplior: æstate florē lacteū promit, & tūc sanē efficacissima cēsetur: semē fert quāminimū, atq; id ipsum per totū caulē enascitur. Radix uero acerrimū habet odorē, & maxime omnī nasturtio similem. Hāc æstate maxime recentē effodito (arida enim uires amittit) & diligenter tundito: tunditur autē difficulter, & axūgia ueteri modica excipito, ac iuncturæ coxę & uniuerso cruri imposito, adalligato, ac incubere sinisto, mulieribus quidem non infra duas horas, uiris autē per quatuor horarū spatiū, si possibile sit id perferre, excitat tumores cū ardore & rubore, uelut sinapismus facere solet: post uero in balneū inducito, nullo unguento aut sinēgnate eis illito. ubi uero modicū exudauerint, in solū obferuorē mordacius desidere iubeto, idq; fortiter perferre cogito. morsum enim cū ardore in principio inferre cōsuevit: deinde educito. Ferme enim semper, quamuis ab alijs fuerint importati, sua sponte pedibus ingrediētes, exhibūt. Verū à balneo ad oleū multū paucū admodum uinum ammisceto, & conuassata illinito, ac humore cum aspero panno deterfo, crus ipsum cū leuissimis lanis cooperito. Et sanē cōsuevit hoc ipsum praesidiū nullo alio inde auxilio opus habere, quod si tamē aliquando uestigiū affectionis relinquatur, uicenis horis siue diebus interpositis, rursus eodē praesidio utaris. Atq; hic quidē sinapismi est modus. Cæterū pharmacum ipsum plures quāminimū rare possis in se cōplectitur comoditates, & cū minor acrimonia eius usus perficitur. Hoc autē utendū modo etiā ad inueteratos capitis dolores, omnesq; alios diuturnos dolores, quacūq; tādē corporis parte cōstituerint: ad affectiones itē ægre solubiles, & resolutiones persanādas uti licebit. Ceratū ad ischiadicōs: Archigenis. Porro interiectis diebus quibus ab exhibitione remediorū quiescis, ceratū locis imponatur huiusmodi. Opopanacis drach. viii. in aceti cyathis ii. dissoluito, deinde cere trientē, cū bese olei cyprini liquefacto, refrigeratoq; ac leuigato, & ad dissolutū opopanaca cōiuncto, unito, ac utitor.

De uestione. Cap. iiii.

Veteres, inquit Archigenes, etiam uestione in ischiadicis usi sunt, tū per cauterēs ferreos igni candefactos, tum per struthij & aristolochiæ radices coxę fun-

stura in altum perusta; itemq; crure per intervalla quædã, circa dolentes maxime locos cautere admo- to. Quidam uero alij ad propinquæ cruri affecto ma- nus locum inter magnum digitum & indicem me- dium, circa infernum magni digiti siue pollicis arti- culum, caprinum sterces ferues per forcipem impo- nunt, stercoreaq; variant ac permutant, donec sensus ustionis ad locum affectum perferatur: tunc enim suffi- cientem ustionem esse dicunt. Dioscorides autẽ hanc rem ita tradit, Caprinum, inquit, sterces feruefacto, & extenso magno manus digito, cauum locum cir- ca inferni articuli eiusdem digiti finem notato: dein de locum ipsum ex oleo prælinito, & lana conuoluta oleo imbuta ad cauum locum substrata, sigillatim ca- prinum feruefactum imposito, quousq; sensus per brachium ad affectam coxam procedat. Antylus autẽ, rios, inquit, etiã huiusmodi urẽdi modo utimur: ster- cus caprinum siccum feruefacimus, eoq; uetrem ma- gni digiti affecti pedis perurimus paulo infra un- guẽ usque ad os ipsum ustione penetrante. Hæc ipsa ustio extremas coxendicium affectiones, & quæ nul- li alij præsidio cedunt, dissoluit. Ceterum post ustio- nes porri folia cū sale trita, aut oliuas nigras cū scla- mo illoto tritas, aut nucum interiora trita, ad locum crustosum imposito. Eis uero qui molles carnes ha- bent, lac cū melle adhibeto. Tertio autẽ die ab ustio- ne, lentulam coctam cū melle donec cruste penitus excidant, cataplasmatibus modo imposito: atq; dein- de suppuratorio ductu utitor, ulceribus ad plures dies adseruatis, ne cicatrix eis obducatur. Nouimus, inquit Archigenes, plurimos qui ex prædictis ustio- nibus opem senserunt: uerum nobis, inquit, ad coxa- rum affectionis demolitionẽ prædicta remedia suffe- cerunt, itemq; malagmata quæ paulo post dicentur: apposulimus autẽ De ustione, ne uidelicet eius usus ignoraretur.

Cura affectionis exacerbata. Cap. IIII.

Archigenis. Tempore porrò exacerbationis reliquæ partes fasciis circumligandæ sunt, & diligenti frica- tione contrectandæ: irrigationes item locos impin- guantes, & per uices mutatae, ex oleo sicyonio cali- do adhibeantur, & cum lana conuoluta contegan- tur. Cataplasmata autem ex semine lini ac foenigræci affectis partibus imponantur. Maxime uero quæ ex loliaacea farina apparantur, ac quædam calefacientia assumunt, & altheæ radicem. Mitigant etiã uehe- mentes dolores ex oleo fomenta, & ex milio frictio, itemq; sale in sacculis calfacto. Potiones ad ischia- dicos. Succus cyrenæicus exacerbationes diffundit, erui magnitudine potatus, aut deuoratus. Sume fa- ct & castorei dra. i. cum opopanacis obolis tribus. Alia potio ad ischiadicos. Farinæ erui, anisi, foenicu- li, singulorum parem mensuram coniicito, tundito & cribrato, obolosq; nouẽ in dimidia uini hemina da- to. Multa crassa per urinam ducti. Vbi uero purum prodire uideris lotiũ, ne amplius præbeto. Alia.

Centaureæ minoris ramulos cõtundito & cribra- to, ac leiunis cochleariũ ex aqua calida ad horas tres aut plures dato. Alia. Radicem rubiæ contundi- to, & cribrato, similiterq; præbeto, sanguinem per urinam educit, quotidie autẽ bibetẽ lauato. Auxi- liatur item irionis semen cum uino, & smyrnii semẽ eodẽ modo. Seminis nasturtii dra. i. cū uino: radicis capparis cortidis drac. i. cum uino: radicis iridis tri- g

drach. i. cū passo: ruta syluestris, & domestica, cum anisi decocto: symphyton in petris nascens, cum ui- no mulso decoctũ: radicis altheæ decoctum, aut cen- taureæ minoris: ammoniaci thymiamatis dra. i. ex aqua mulsa: seminis hyperici drac. i. quod ipsum & stercorea educit, itemq; pituita: Baccæ iuniperi ex ui- no: Bitumen pro catapodio deuoratur: carpobalsamũ ex aqua mulsa. Ceterũ & potiones dolorẽ lenientes, itemq; soporiferæ, ubi dolores restiterint, cõmode assumi possunt: maxime tamẽ omniũ antidotus quæ pæonia appellatur, in tertio decimo Sermonẽ descri- pra. Ego autẽ, inquit Archigenes, etiã in exacerbatio- nibus prædicto clysteri usus sum, eo uidelicet qui ex cerebînthina & nitro constat, & euidentem permuta- tionem fecit. Poteris autem & cucumeris syluestris decocto in exacerbationibus uti. De reliqua diætã, Archigenis. Subiungemus autẽ ex ordine & paucis reliquã curam. Præ omnibus igitur adhortor ut con- tentiones, & exquisitæ negotiorũ incommoditates eis exhibeantur, nõ solum à cibo accepto, sed etiã su- mendi cibi tẽpore, diætã unctoria & impinguatẽ cõ- stituta, quo similiter carnis incremento sit consultiũ. Nam si hanc ueluti neruorũ operculũ, acquisierint, tutum simul ad omnẽ externam causam inuentũ ha- bebimus, simulq; commodã exercitationem omni unctoria diætã potiorẽ apponemus. Vngantur au- tem ab expertis & gymnasiis exerceantur. Minime enim molesti labores fient cū perito præexercitato- re: & manus sanè exercitijs trita cõmodiores sunt mollibus ad curationem. At uero significandum est etiã quod ischiadici ab assiduis flexibus & deambu- lationibus, & moderato cursu quàm cõmodissime opẽ ferre possint. Præcedat itaq; gestatio in equo, deinde naturalium aquarum usus, primum quidem calidarũ, deinde etiã frigidarũ, si enim ad frigida la- uationem adsuescant, sola suffecerit ad incolumitatẽ acquirendam. Ceterũ diætã tempore quidẽ exacer- bationis sorbillis sit & modica, per intervalla uero solidior & reparandis uiribus magis accommoda- ta, habeatq; acriũ eduliorũ comestiones quasdã per aliquot dies adiunctas. Eorum autẽ syluam sæpe ita apposulimus, utpote quæ nihil uiscosum, aut crassũ succũ, aut ægre concoctile, aut quod difficulter dige- ritur, cõplectitur. Bonæ uero concoctioni in primis consulant, non solum damni quod ex cruditatibus prouenit ratione habita, sed & incremẽti carnis, qua præ omnibus ischiadici opus habent. Quin & quali- tates eorum quæ ægre concoquuntur fugiendæ sunt, præsertim eorũ quæ urinã ducunt. Alium autẽ pro- be solutã habere expedit: premuntur enim & aggra- uantur articuli, ubi ipsa sit adstricta. Neque uero assi- due profluat uenter. Nam id imbecilles reddit, & quod cum purgationis impetu à toto corpore attra- ctũ est, id ipsum uicinas partes replet. Contingit ta- men etiã aliquando à periculosa dysenteria oborta omnem coxarum mollidẽ ac apitudinẽ ad affe- ctionem corrigi & emendari. Præstat etiã uomitus per intervalla siue à cibo accepto, siue à raphanis. Neque latet nos quosdã ueratro ad ischiadicos usos esse. Scimus item ueratrum efficaciter auxiliari: Ver- um non suspicamur eius usu opus esse ad hanc affe- ctionẽ, utpote quæ ab antè tradita cura extirpabi- tur. Cataplasma ischiadicum. Farinam lupino- rum amarorum in aceto mulso aut posca deco- ctam

etiam imposito. Aliud. Calaminthen præfer-
tim uiridem, aut si haberi nequeat, cum posca locis
imposito, est enim præsidium præclarum. Aliud,
facit ad uehementes dolores. Papaueris calices in
aqua multa decoquito, ipsosque prolektis farinam or
deacea aque multæ incoquito ac imposito. Aliud.

Calices papaueris uirides terito, & adspersa po-
lentæ farina, in pastillos redigito, eosque in umbra re-
siccato. Vsu uero expetente in sufficienti aceto disso-
lutos ac calefactos imposito. Aliud Asclepiadæ,
ischiadici, podagrici, & articulorum morbis eue-
stigio auxiliatur. Fœnum græcū in fictile uas conse-
ctū & posca sufficere affusa per integrā noctem ma-
cerato: mane uero ad ignem appositum donec solua-
tur coquito: deinde in mortario tritum, & sufficere
melle affuso calefactum, & linoleo exceptū ad affe-
ctos locos apponito, & fasciola adalligatum finito,
idque per dies duos aut tres facto. Aliud. Radicis
symphyti sexuncæ rasam & in tenues partes cōcisam
in pilam testaceam cōiungito & enixe terito, atque ubi
concrita fuerit, mannæ quadrantem, & ouorum re-
centium crudorum candida tria unā cum luteis adij-
cito, rursusque enixe terito, & contritis lib. i. adipis
suilli ueteris probe subacti addito, unio, ac linoleo
excepta imposito. Euestigio dolores mitigat, & præ-
sertim cum fluxione articulorum obortos. Aliud
Asclepiadæ. Fœni græci mola triti, corticis radicis
mandragoræ, mannæ, cuiusque quadrantem, oua cru-
da recentia x. radicis maluæ lib. i. radicis symphyti
lib. i. carnis cochleæ terrestris sexuncem. Vt prædi-
ctum est apparato diligenter, & sublatum reponito.
Vsu uero tempore pharmaci partem unam, adipis
suilli ueteris partes duas accipito.

Epithemata & malagmata ad ischiadicos. Cap. v.

Malagma, inquit Archigenes, quod ualde multo ex-
perimento nobis constat, est subscriptum, uerum cu-
curbitam prius ad dolentes locos affigere oportet:
ipsum autem malagma aliquandiu inhærere consue-
uit, quare expectabis eius utilitatem. Colophonitæ
lib. i. baccarum lauri bessem, seminis raphani trien-
tem, corticis capparis libram unam, picis aridæ librā
unam, pyretri libram i. ceræ libras duas & dimidiā,
fœni græci bessem, iridis libram i. sinapis bessem, ni-
tri libras duas. Nitrum cum aceti libris duabus teri-
to: deinde reliqua arida inspergito, simulque terito,
affusisque liquefactis, emollito, ac utitor. Hoc quidē
igitur malagma eiusmodi est, quod malum penitus
extirpat, cutē rubefacit, & materias ex alto ad super-
ficiem educit, quo sanē in principio nō oportet uti.
Verū quod sequitur leuissimum est & multæ com-
moditatis, quoque citra formidinē conuenit uti. Ce-
ræ trientem, styracis sesquunciam, saryrii sesquun-
ciam, aloës primariæ sesquunciam, ammoniaci thym-
miamatis sextantem, croci unciam unam, pyretri un-
ciam i. opopanax unciam unā, galbani unciam i.
thuris unciam unam, olei ueteris libras quatuor, ali-
quando autem sextantem solum in æstate: Appara-
to, & utitor. Præter opinionem etiam facit ad ischia-
dicos emplastrū pardalis appellatū, quod ad hydro-
picos inuenies descriptū. Leena emplastrum, malū
penitus extirpans. Olei ueteris libras duas, plum-
baginis, salis communis, terebinthinæ, singulorum
libram unam, squamæ æris quadrantem, æruginis,
herbæ lanariæ radicis, chamæleonis nigri radicis,

aristolochiæ, sinapis, singulorum sextantē, aliquando
etiā cæchryos unciam unam, aut pro eo pyretri tantun-
dem. Auxiliatur etiā capiti ad hemicraniam imposi-
tum. Hic, ad ischiadicos, hoc, inquit, usus sum ad
Frōtinū statim ab exacerbationibus imposito. Ce-
ræ drachmas centū, uisci drachmas sedecim, terebin-
thinæ drachmas uiginti quinque, galbani, myrrhæ,
iridis, cuiusque drachmas sex, cedriæ heminae dimi-
diū, olei cyprini heminae dimidiū. Ceram, cedriam,
cū cyprino oleo liquefacto: deinde resinā & galba-
num adijcito, & ablatis ab igne statim uiscum addi-
to: & ubi dissolutum fuerit, irim inspergito & uni-
to, & ad myrrhā in mortario cū aceto tritā affundito.
Quidam etiam nitri drachmas duas adiecerunt.
Asclepiades autē ita inquit, Malagma quod ischiadi-
cis statim post exacerbationum remissionem impo-
nitur, facit ad ossa cōtrita ac omnem neruorum per-
consensum affectionem, omnemque duritiem dissol-
uit: facit item ad alias inflammationes, comprimit
& cōmittit malignas cicatrices. Prodest luxatis &
collisis, & ad omnes malignas mamillarum disposi-
tiones. Est enim ualde generosum. Ceræ, terebin-
thinæ, uisci, galbani, myrrhæ, iridis siccæ, singulo-
rum drachmas quadraginta octo, olei cyprini quan-
tum sufficit. Galbanum cum cera in mortario con-
tusum & emollitū cum cyprino liquefacimus, dein-
de ablatis ab igne uiscū inijcimus, & ubi dissolutū
fuerit, irim inspergimus, & ad myrrham cum aceto
in mortario tritam affundimus. Commodant etiā
ipsis emplastra ex sale: quale & hoc est. Salis dra-
chmas centum, picis sexuncem, olei libras quatuor,
cerusæ libras duas. Salem per se quā tenuissimē te-
rito, similiter & cerusam, deinde oleum ad ipsa in
mortarium affundito, & postquā sufficienter tri-
ueris, excepta usquequo manus non inquinent co-
quito ad lentum ualde ignem, deinde picem liquefa-
ctam & percolatam inijceto, ac rursus ad cōpagem
que manibus nō adhæreat reducito, & utitor. Ma-
lagma ex sulphio, ischiadicis ualde præclarum. Am-
mij drachmas duodecim, sulphij, seminis rutæ sylue-
stris, baccarum lauri repurgatarum, singulorum unc.
i. medullæ colocynthidis drach. ii. nitri, abrotoni,
cardamomi, cuiusque drachmas quatuor, ceræ, adi-
pis uitulini, ammoniaci thymiamatis, cuiusque ses-
quunciam. Arida liquefactis ab igne ablatis inspergū-
tur, simulque in mortarium ad ammoniacum cū ace-
to tritū infunduntur. Quidam uero ammoniacum
cum cera liquefaciunt, & ad cōpagem manus nō in-
quinantem redigunt. Aliud malagma, quo Theo-
dorus proprium patrem curauit, quū ob dolorem
susplicere non posset. Ceræ, picis liquidæ, aluminis
liquidī, æquales partes accipe: liquefabilia liquefaci-
to, & ad alumē cum aceto tritū affundito, emollito,
ac utitor. Asclepiadæ, ad ischiadicos: facit & ad co-
licos: secureque in exacerbationibus exhibetur: scabiē
etiam quam psorā Græci appellant, citra exulcera-
tionē sanat. Ceræ, picis liquidæ, picis aridæ, cuiusque
lib. i. sulphuris uiui, aluminis scissilis, nitri rubri, cu-
iusque sexuncē. Quæ eliquari possunt, eliquato, aridaque
quā tenuissimē trita paulatim adspergito, simulque
in mortario posca madefacto cōmisceto, emollito,
ac utitor. Quidā picē aridā & resinam pinus, ac cerā,
per singulos dextantes sumunt, oleique sextantem ad-
dunt, ac reliqua, uelut prædictū est. Ischiadicum
mirabile.

mirabile. Thuris, euphorbii, ammoniaci thymiamatis, pyretri, picis, cere, singulorum quadrantem, resinæ pinus aridæ, sexuncem, olei cyprini sexuncem, fellis taurini quadrantem. Thus, euphorbium, ammoniacum, unumquodque per se quam tenuissimas in partes unâ cum felle terito: liquefabilia uero liquefacto, & pyretrum inspergito, eaque ad trita fundito, unitoque, ac utitur confidenter. Experimento constat. Melius autem apparatur, si ammoniacum quam tenuissime tritum liquefactis inspergatur, atque eo aliquato thus tritum adijciatur: euphorbium uero cum felle teratur. Unguenta & acopa, quæ nervorum lassitudinem in ischiadicis reficiunt. Ad coxendicum doloris præoniæ radicem in oleo ad triduum contusam accipito, & quarta die paululum coctam illinito. Ceterum præpurgandos eos scito, ex succi tithymalli guttis quinque tantum cum caricis acceptis, aut ex corticis tithymalli cremore. Corticem autem ipsum contusum & cribratum quatuor scrupulorum pondere in uino per integrâ noctem macerato: mane uero excolatum unum præbeo. Aliud. Nycteri dæ herbam, quam unguentum Helenes appellant, oleo decoquito, & per diem unam in oleo manere sinisto, percolatoque & illinito. Aliud, multo experimēto cōstans. Herinaceum terrestrem uiuum in oleum confectum donec flaccescat coquito: deinde eo extracto, farinæ adarces sextantem oleo inijcito, & olei cyprini unciam, i. Vltor autem illito ex eo loco. Ceterum oleum ipsum in quo herinaceus coquitur librarum duarum pondus esto. Aliud ischiadicum, quod isotheon appellatur. Facit & ad resolutiones, & ad omnem nervorum per consensum affectionem. Castorij, opopanis, euphorbii, cæsypii liquidii, ammoniaci thymiamatis, galbani, terebinthinæ, singulorum sextantem, medullæ ceruinæ tridentem, styracis unc. i. olei styracini tridentem, olei irini sexuncem, piperis unciam unam, cere libram unam, olei sicyonii lib. i. olei ueteris libram unam, Ammoniacum, galbanum, opopanaca cum uino terito: liquefabilia uero aliquato, & ab igne ablata reliquis affundito, ac probe unito: styracem uero in pila tridito, ac paulatim ex pharmacō ei addito: ubi uero dissolutus fuerit, cum reliquis unito, ac utitur. Acopō, ad ischiadicos efficacissimum est, quod inter communia acopa post articularia remedia refertur, & Orchestæ inscribitur: eo itaque confidenter utitur. Vtere, & similibus acopis ac unguentis quæ istis describuntur. Inspergimē ad ischiadicos in balneo. Inspergimen ischiadicum efficax. Farinam lupinorum in balneo inspergito, & in exudatoria tabella prostratum sudare facito. Aliud, facit & ad inueteratas affectiones. Costi, piperis albi, pyretri, cuiusque quadrantem, nitri unc. i. fecis uini ustæ lib. i. contusa in balneo inspergito. Aliud. Costi quadrantem, pyretri quadrantem, nitri unciam unam, piperis albi, adarces, euphorbii, cuiusque unciam unam, fecis uini ustæ libram unam, samfuci sexuncem, contudito, cribrato, ac in balneo utitur. Hieræ, ad ischiadicos inspergimen lenissimum doloris. Picis aridæ partes octo, sulphuris partem unam, terito ac misceto, & præloto ægro dum corpus adhuc calet inspergito, & cum charta contegito, atque donec sua sponte decidat, sinisto: nihil autem uerat ægrum lauare charta adhuc inhaerente. Alia inspersio. Adarces, staphidis agrestis, canchryos, sinapis,

cardamomi, piperis, euphorbii, sulphuris uiui, cuiusque unciam unam, contudito, & cribrato: ægro uero inducto, & in secunda balnei domo reclinato, pallio prius ad tabellam substrato, ad dolentem locum inspergito, & contente adfricato: deinde in calidam desiderare facito, & prolatum educito ac extergito, rursumque inspergimen inijcito & adfricato: postea uero dum adhuc calidum corpus habet, eiusmodi malagma imposito. Cineris caulium brassicæ ustorum quadrantem & unciam dimidium, cineris lignorum ficulnorum agrestium ustorum tantundem, picis aridæ libram unam, cineris lignorum uitis ustorum quadrantem & unciam dimidium, sulphuris uiui quadrantem, axungia libram unam. Liberabitur enim æger, atque id breui ab omni dolore, ut incantationi similis facultas uideri possit.

De podagra, & arthritide, siue articulorum morbo. Cap. VI.

Podagrica & arthritica affectio eiusdem speciei inter se existunt. Differt autem podagra ab arthritide non toto genere, sed affectus locis. In omnibus enim debilitas est articulorum diuturna cum fluxione. Quæ quidem si in pedibus perficitur, Podagra appellatur, si uero in aliquo coxarum uertebro, Ischias, hoc est coxendicum morbus nominatur. Si uero in multis corporis articulis innititur, Arthritis, siue morbus articularis uocatur. Contingit autem aliquando ut repente irruat malum æqualiter per omnes articulos dispersum: quod ipsum euenire consuevit, his qui cōsueta exercitia coaceruatim relinquunt, & licentiore diæta utuntur: ut plurimum uero clanculum & paulatim fluxus irruere solet, alteri enim cuiusdam magni digiti pedis articulum dolor inuasit, alijs uero calcanei extremum, rursusque alijs cauum pedis, aut ex calcamenti, aut ex consimilis rei affricu. Ceterum initio à pedibus sumpto, paulatim ad genua malum procedit, ad coxendicum item ac femorum iuncturas, deinde ad manus, singulis articulis particulatim affectis, quando sane proprie, uelut prædictum est, arthritis & articularis affectio appellatur. Qui uero extreme ab hac affectione apprehenduntur, his & spinæ, uerteræ & costarum iuncturæ, & genæ dolent, aliquibus autem & iris siue corona pupillam oculi ambiens, neque est aliqua oculi conexio, quæ ab hac affectione sit immunis.

Cause uniuersales. Cap. VII.

Generant autem affectionem cruditates coaceruatæ, & ebrietates, atque his adhuc amplius immoderatus rei ueneræ usus: iam uero & deambulationes concitatiores quam pro more, & stationes diutius productæ, & familiares excretiones suppressæ, & consuetorum exercitiorum intermissiones. Vt plurimum uero aptitudines à parentibus in filios ac posteros transferuntur. In uniuersum uero amplius omnium crudorum humorum multitudo affectionis causa existit, quod humorum multitudo affectionem inducit. Quando quidem igitur humorum multitudo in corpus digeritur, hiique ipsi ad pedes deferuntur, & in ipsis partes omnes distendunt, inflammationesque & dolores inferunt, manifestissimum sane id existit. Nam & tumore atolluntur affectæ partes, & uenæ sanguinis in ipsis apparent repletæ, & euacuatis ipsis in naturalē habitum æger reducitur. Verum multitudo influens non in omni

In omnibus æqualis existit. Etenim alij ex caliditate ægrotant, alij ex frigidityte, atq; exinde etiam refrigerando, aut calefaciendo, aut resiccando opem sentiunt. Quã ob causam membra fluore infestentur.

Posteaquam igitur humorum multitudo in corpore cõgesta, hominẽ molestia afficit, unumquodq; quidem membrum quod primum affectionem percepit, assilientem humorem à se repellit: cum ipsum uero suscipit aliquod ex uicinis membris ac subiectis. Itaq; quũ fordora mēbra eum depellant, & imbecilliora suscipiant, id adeo citra intermissionem cõtingit, donec id quod propellitur ad omnium debilissimum membrum peruenerit, & in ipso permãserit. Vna quidem igitur fluidarum affectionum generatio hæc est, membris uidelicet fortioribus superfluum demittentibus, suscipientibus autem imbecillioribus. Cæterum articuli ipsi ex assiduo motu debiliores redduntur.

Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus.

Cap. VIII.

Magnitudo morborum ex fluxionibus obortorũ ad humorum influentium multitudinem consequitur. Si enim plures humores fuerint, maior etiã affectio contingit: si pauciores, minor. Cæterum multorum recrementorum influxus ob multas causas accidit. Etenim & copiam humorum multam esse oportet, & uias latas per quas feruntur, & partem quæ à fluxu infestatur raram, & facultatem in ipsa debilem: & membrorũ eum delegantiũ uires fortes, quo magna affectio fiat. Verum si paruus futurus est morbus, prædictis contraria omnia cõcurrere oportet.

Quare multo tempore aut paucio morbus duret.

Cap. IX.

Porrò ut multo tempore aut paucio morbus duret, etiã prædictis sunt causæ, tenacitasq; insuper & crassitudo humorũ. Etenim sanguis multus & crassus, densa pellicula conclusus, & à uiribus debilibus segniter correctus, tempus auget & producit. Qui uero cõtrario modo habet, minuit & breuius facit. Ceterũ & in alijs corporis affectionibus, siue in superficie sint, uelut erysipelates: siue sub cuticula, ut herpes: siue in carnosiss partibus, uelut inflammationes, recrementa ut plurimum feruntur. In podagricis autem & arthriticis appellatis, usq; ad iuncturas per alũ repletio ex fluxione cõtingit, unã cum hoc quod nerui permadescunt & distenduntur, itemq; ligamenta & pelliculæ, omniaq; circum circa sita: atq; ob id sæpe usq; ad quadragesimum diem morbus extenditur. Etenim quum etiã cessauerit fluxus, neq; amplius ex supernis feratur, repletæ adhuc multo humore existētes iuncturæ, eũ ad circumscripta mēbra delegant. At uero si tenuior sit fluxus, celerrime ægri sanantur, nisi male omnino curentur. Quod si uero quis ex medicis ueram methodũ ignoratibus per resoluentia semper omnes inflammationes curet, non in quadraginta tantũ dies, sed & in quadringentos, & in omnem reliquam ægri uitam inflammationes extēdet. A mala enim curatione podagricis pleraq; mala accidunt, maxime uero calli & artuũ durities, & articularũ curuitates ac cõtractiones, propter medicorũ ignorantiam fiunt: qui neq; per uenæ sectionem, aut purgationem euacuant, neq; redundantem in uniuerso corpore humore, quiq; ad iuncturas deferretur, & proinde articularũ morbos producit, per

ea quæ moderate adstringat repellunt. Quidã enim ex ipsis inflammationes immodice resoluunt, tũ per aquæ & olei mixtionem, tum per cataplasmata ex cruda ordeacea farina apparata, attrahuntq; per cataplasmatum caliditatẽ humorũ copiam ex subiectis locis. Quin & ob hanc ipsam inductam laxitatem, affectas partes debiliores, & ad recrementorum susceptionem aptiores reddunt.

Quæ sit incuruatorum articularum causa. Cap. X.

At uero alij medici immodice refrigerant, alij autẽ uerhementer discutiunt. Ex quo sanẽ neruosas partes in spissari contingit, incuruariq; & distorqueri, ob redundantium uidelicet humorũ susceptionem. Contingit item callosas & calculosas coactiones in ipsis emergere, & neruos spontaneo motu se mouentes congelari, ligamenta item & neruos qui tendines appellantur, qui sanẽ aptissimi ad hoc perferendum censentur, propterea quod substantia ipsorum densa & solida existat.

Quæ causa generationis toforũ in artubus. Cap. XI.

Generatio quidem igitur toforum siue callorum in artubus induratorum, materiam quidem habet crassos humores, causam autem efficientem, qualitatem calidam & siccam. Quemadmodum uidere est & in tofis: qui in æreis uasis ex limosæ aquæ incoctione generantur. At uero pharmaca quæ ualde refrigerant, si assidue adhibeantur, nō solum crassos humores congelant, sed & tenues. Quemadmodum uerhemētissimum frigus cõgelat aquam. Quæ uero acerrimam & immodice discutiunt, id quidem quod tenue in ipso fluxu est, euanescere faciunt: quod uero reliquum est, inspissant & conglutinant: atq; id eo amplius, si ad hoc quod discutiūt, etiam immoderate calefactoriam habeant facultatem.

Quæ causa sit cur inflammationes in podagricis

non facile suppurentur.

Cap. XII.

Causa cur podagricæ inflammationes nō facile suppurentur, primũ quidem est affectarũ partiũ substantia, tũ natura, tũ pro more egre permutabilis existens. Ad hoc enim quod natura duræ sunt neruosæ partes, etiã tolerandi cura angũtur ea quæ molestiã inferre possunt, præsertim tamen pedum & manuũ extrema, quin & carne nudatæ magis hæc sunt partes minusq; calidæ & humectæ, & ob id etiã reliquis partibus frigidiores: imò & influentes in podagricis inflammationibus humores corruptioni minus sunt obnoxij, & pharmaca similiter adhibita inepta sunt ad putrefactionẽ ac suppurationẽ. Etenim alia ex eis refrigerant & repellunt, alia uero discutiunt, alia autem resiccant. Contingit tamen aliquando in quibusdam inflammationẽ aut suppurari, aut erodi. Quum enim crassus humor uerhemēter fuerit cõdensatus, & deinde non ita uerhemēter, sed moderate calefactus, necessesse est ipsum suppurari. Acrid uero & erosiuo humore influente, erosio contingit, quemadmodum & marcor in quibusdam succedit, irruente uidelicet in membrum humore qui putrefacere potest: quamquam raro hæc in podagricis contingant.

Quomodo ex inflammationibus & consequenti-

bus accessionibus, siue symptomatis, affligens humor cognoscatur.

Cap. XIII.

Quomodo quidem uniuersũ corporis intemperiem cognoscere & curare oporteat, iam antè in quarto Sermone est præscriptum, huius uidelicet tractationis:

donis. Quomodo uero quis inflammationes in partibus inflammatis consistentes cognoscere possit, necessarium & hic paucis referre. Apparet autem id ex eis quae accidunt & consequuntur: quae si quidem frigida fuerint, frigescent; calida uero calefaciunt; mixta autem mixtas etiam signorum species inducunt. Quo uero manifestior fiat hic sermo, quae iam dixi, reperam, singulatimque retractabo.

Sanguinei humoris influentis signa. Cap. XIII.

Humor sanguineus si multus fuerit, & circa summam caliditatem moderatus, repletionem efficit, & tumorem ingentem: non uenarum modo, sed totius membri affecti circa cutem: eumque calidum quidem moderate, uehementer autem rubentem, pulsus autem adest in alto inflammationis mediocri. Qui hoc modo sunt affecti, neque refrigerantia neque calfactoria ualde praesidia adhiberi sustinent, & assidue ac continue exacerbantur, quando quidem assidue & aequaliter sanguinis allatio contingit, quanquam & per circuitum quidam irritatione uexentur, quum non continue sanguis defertur, & exacerbationum accessiones omnino quotidie fiunt, uerum non ita durant ueluti haec quae ex pituita oboriuntur. Urinae uero eorum qui sanguine redundant, fulvae sunt, & mediocri crassitudine praeditae: aliquando etiam subdenti alba, aut nubes, aut tale quiddam in medio pendens quasi suspensum habentes. Quod si magis ad pituitam declinet sanguis, albiore & crassiores: aliquando uero & conturbatae reperientur urinae, & multum est quod in eis subsidet. Venae autem in his ampliore sanguine suscepto replentur, & in tumorem attolluntur. Aetas uero ab adolescentia usque ad aetatem uigoris apta fiet ad multitudinem sanguinis producendam. Edulia ite boni succi & quae maxime alunt, & exercitia moderata. Ex temporibus uero, uer, & regio temperata.

Biliofi fluxus signa. Cap. xv.

Quod si uero biliosus sit fluxus, color cutis inflammatus loci, aliquando quidem flauior quam secundum naturam apparebit: aliquando uero rubore cum flauo permixto, quando uidelicet flaua bilis sanguini est permixta. Caliditas autem uehementissima & feruentissima adest, quae amplius refrigerantibus pharmacis gaudet. Qui enim ita habent, uehementer a refrigerantibus iuuantur medicamentis siue actu siue potentia talia existant. Exacerbationes uero his per tertium quaque diem mouentur, & praecipites quidem irruunt, citius uero uigorem remittunt: per uentrem enim & per urinam recrementa superflua huius euacuantur: per cutem etiam transpirant, utpote quae tenuium partium existant. Lotia eorum subfulua sunt, & subflaua: quandoque etiam acris, ut in mictione urinarium arrodant meatum. Curae autem ingentes, & irae, & uigiliae, & illuuias multae, & fatigationes, & dieta omnis bilem gignens & attenuatoria, ex acris uidelicet & salis edulijs, huius humoris influxum praecedunt. Aetas uero & temperies corporis calida & sicca ad eum apta est. Hora autem siue anni tempus aestiuum: consimilis item regio,

Pituitosa fluxionis signa. Cap. xvi.

At uero si pituitosa sit fluxio, ad digitorum appressum nem cauus sit tumor sublaxus existens & moderatus, & color dolentis membri albus. Dolores uero aliquando quidem fortes, aliquando uero mediocres, & exacerbationes, quotidie paulatim irruunt & au-

gentur, & per plures horas durant, & breuem intercapedinem habent: imo neque unquam integre remittunt. Aetas autem hoc modo amplius afficitur senilis, & temperamentum humidum & frigidum, & consimilis ambientis nos aeris status, & tempus hybernum. Aliquando autem & frigoris sensum in alto locorum affectuum aegri perceptant. Vita uero odiosa & socordia ad pituitosi humoris generationem plurimum conferunt. Edulia item refrigerantis & humectantis ac inspissantis facultatis, & balnea a cibo, unde & urinae crassissimae ab eis prodeunt, & saepe conturbatae reperuntur. Atque haec quidem signa sunt pituitae naturae frigidae praedominantis. Nam & haec ipsa proprie pituita appellatur.

Salsa pituitae signa. Caeterum si salsa pituita fuerit influxus: color membri affecti & tumor eodem modo habent, ueluti de pituita est praedictum. Pruritus autem maximus & mordacitas infestat locos. Urinae uero tum his tum praedictis, aliquando quidem tenues & aquosae, aliquando uero crassum in eis est quod subsidet, suntque conturbatae.

Bilis atra influentis signa. Cap. xvii.

Quod si ex atra bile sit fluxus, qui sane potentia frigidus est & siccus, quod raro tamen contingit, frigoris sensus quandoque affectis adest, & corpora in profundo uelut atterantur aut scalpantur afficiuntur. Colores uero tumorum nigriores sunt, & circuitus exacerbationum per quartum quemque diem redeunt. Sunt autem exacerbationes tum magnitudine, tum impetu mediocres. Aetas uero quae magis hunc fluxum generat, est uigore inclinatio, & uergente temperies autem frigida & sicca, & natura quidem superfluitates pituitosas generat, non autem atrae bilis. Quae uero ex degenerante & mutata caliditate fit, flaua bile superassata & nigram generante oboritur. Praecedat porro hunc fluxum dieta ex edulijs atrae bilem gignentibus, & lassitudines immodicae. Regio autem ei apta est frigida & sicca. Tempus autumnii, & consimilis aeris status. Urinae uero ut plurimum in principio tenues eis sunt & aquosae propter obturationes: postea uero quam secundum naturam attriores, & modice crassae, & quod subsidet in eis aliquando fuscum est, aliquando uero mixtum, subtruentum uidelicet & fuscum reperitur.

Serosarum fluxionum signa. Cap. xviii.

Si uero serosa recrementa influant, dolores non ita magnos inferunt, quemadmodum etiam neque fluxu infestatas partes in tumorem ualde excitant. Secundum speciem uero consimilia perficiunt, qualia humores solent, qui cum eis eiusdem generis existunt. Pituitoso enim sanguine demanante, serosa in ipsa pituita recrementa, consimiles quidem secundum speciem dolores inferunt, secundum magnitudinem uero multo minores. Vbi uero alij humores defluerint, consimiles etiam illis serosae ipsorum superfluitates inferunt dolores.

De his qui ex humorum complexu fluore infestantur. Cap. xix.

Nosse perro operae praedum est, quod aliquando fluxus fluxui commiscetur, aut calidus frigido, aut uicissim frigidus calido, & secundum utriusque horum qualitatem exacerbationes fiunt, & continget quandoque aegrum bis in die exacerbationum accessiones sentire.

Dieta & cura podagricos præseruans. Cap. xx.
Qualis quidem igitur diæta unicuique prædictarum temperierum cõueniens sit, iam antè prædictum est in quarto huius tractationis Sermonè: superfluum uero est eadem bis scribere. Cæterū ad ea quæ istic relata sunt, uomitus in uniuersum ferè omnibus qui podagricam affectionem defugere uolunt, commo- di sunt, præterquàm eis qui thoracem & caput, quæ facile læduntur, habent. Quibuscunque igitur ex exercitijs, aut alijs quibuscunque motibus, recremen- ta in uērem cõfluunt, his uomitus ante cibum pro- dest. Qui uero sanguinis copiam aggregarunt aut humores pituitosos, post acceptum cibum uomant per aliquot dies. Venus uero omnes podagricos ex treme lædit, & præsertim si assidue aut intempesti- ue ea utantur. Etenim uoluptas per se neruorum corporum robur & firmitatem dissoluit, multo ue- ro magis si cum uehementi motu perficiatur, & ob id mēbra affecta longe imbecilliora fiunt, & prom- pte ac expedite confluentia recrementa suscipiunt. Adhibetur tamen eius usus aliquando, propter con- suetudinē uisiosam semine plurimum iritātē: quum uidelicet multi & noxi fuerit humoris. Generatur autem tale in naturis proprie muli seminis appella- tis, & oportet sanè, quo molestiā eius uitemus, pro- hibere ne eius copia in seminarijs uasis generetur. Quomodo uero seminis generationem prohibere oporteat, iam prædictum est in eo qui hunc præces- sit Sermonè.

De olei & salis affrictu in podagricis. Cap. xxi.
Operæpretium porrò est nosse, quòd omnes qui se, ne in podagricam affectionem incidant, adseruare uo- lunt, & præsertim eos, qui humecta & frigida na- tura sunt, magnifice iuuant. Tales cum oleo quàm te- nuissime triti & affricti, nō quidem tempore inflā- mationis, & doloribus instātibz, sed quum hæc re- mittunt: nisi uehementè sicca temperie ægri sint præ- dicti. Omnibus enim qui hoc modo fricantur, insitus calor augetur, & quod præter naturā est discutitur, recrementaꝑ consumuntur, & affecta membra fiunt robustiora, ac aduersus affectionem firmanantur, mi- nimèꝑ ei obnoxia redduntur, maxime si diligenter singulis diebus mane & uespere, ubi dolores, quæ- admodum dictū est, remiserint, per omnem uitā hoc præsidio utantur. De quo sanè ausim confidenter pronunciare, inquit Philagrius, quòd etiam solum sufficiat his, qui uel maxime circa diætā delinquant, aut immodice refrigerantur, aut ægrotant ex labore, aut re uenerea nimis sunt usi, aut quæcunque aliū for- tem excessum admiserunt: quare omnino postquam inflāmatōnes quiesuerint & dolores, eo utēdum est.

*Vniuersalis methodus curationis podagri-
corum. Cap. xxii.*

Itaq; prius dictis rursus in memoriā reuocatis, pronū- ciamus & membrorū debilitatem, & humorū co- piam, primas causas omniū fluidarum affectionum esse, præcipue tamen podagræ & articularis morbi. Quare duplex etiā sanationis scopus nobis præfige- tur. Euacuatio redūdātis humoris & corroboratio partiū debilitatarū. Euacuatio itaq; fiet aut per uenę sectionē, aut purgationē. Post uniuersalem autē eua- cuationē, calidi quidem fluxus refrigerationē amant, frigidi uero calefactionē: humidi resiccati, sicci hu- mectari gaudent. Et tenaces quidē ac uiscosos discin-

dentibus & extergentibus curare conuenit, crassos uero tū eisdem, tum quæ amplius attenuatoriā uim habent, acres uero per ea quæ mordacitatē obtundere possunt. Amplius autē ea quæ assidue influunt, per repellentia prohibēda sunt, itemꝑ per ea quæ resic- cant. Quæ uero per circuitum iritāt, quum quidē in- fluunt impedienda, quū uero nō deferuntur, tum sa- nē ea quæ iam illata sunt, euacuationē requirunt, ad quā iudē debilitatarū partiū corroboratio accedat.

Cura eorū qui ex sanguinis copia ægrotāt. Cap. xxiii.
Quū igitur sanguinei humoris fuerit influxus, & do- lor mediocris, qui neq; calore suo neq; frigore mani- feste infestet, locus inflammatus pharmaco quidem fortiter adstringente, modice autem resiccātē illina- tur, eiusmodi autem est id quod ex acacia & utroꝑ uerauro apparatur. Abstineat autē æger ab omni ci- bo & motu, & uini etiā potu. Et si fluxionis impe- tus non ualde magnus fuerit, & pharmacum adhi- bitum cōmoditatem suā ostenderit, rursus cū passo tenuis substantiæ aut posca large dilutū quo strigmē- tosum reddatur, illinatur. Cæterū neq; aqua neq; oleū pedibus adhibeatur, sed & si illitū abluere oporteat, quo uidelicet aliud illinatur, posca mediocriter tepe facta abluatur, aut cum plātæ alicuius austerę deco- cto, usq; quo id quod influxit sedetur. Cataplasma ob id etiam imponendum ex malis maxime coro- neis, aut mespilis, sorbis, cornis, hippuri, sangui- naria, aut folijs quercus tenerioribus, singulis pane permixtis & uino ueteri maceratis. Idē uero ipsum & per alia quædam eiusdem materiæ existentia con- fieri potest. De quibus rursus postea sermonē repe- temus. Porrò si sanguinis motus in uniuerso corpo- re uehementè inualuerit, utendū nihilominus prædi- ctis pharmacis, ne uidelicet particula repleatur, & dolores fortes ac diuturnos inducat. Euacuatur autē id quod ex sanguine redūdat, quātum sanè id uires & affectio permittunt, & maxime si qui continetur sanguis bene sit temperatus, & homo ipse ad sangui- neas euacuationes sit aduersatus. Cognosces uero sanguinis imperiū, tum ex tumore præter naturā, tū ex doloris magnitudine & uelocitate. proportiona- biliter enim tū ad copiā sanguinis, tum ad allationis eius modum, impetus ipse cōtingit. De sectione ue- næ. Eos igitur qui multo sanguine abundāt necessa- rio secta uena fortiter euacuabis, non solū semel, sed iterū atq; iterū & pluries detractione paulatim repe- titā. Si enim uenæ sectione omissa, repulsorij phar- macis fueris cōsilius, magni mali autor eris. Ex igno- bilibus enim mēbris ad principalia & uitæ necessa- ria sanguis repulsus, deinde in aliquod horū irruēs, uelut in hepar, aut septū transuersum, aut thoracem, aut pulmonem, aut in ipsum denique cor, pro mor- bo mortem inducit. Quapropter maxime necessa- ria est sanguinis ac reliquorum humorum in san- guineis influxionibus euacuatio, præsertim in his qui sanguine redundant, itemꝑ reliquis humorum recrementis, ac lautiore diætā utuntur. In his enim antequam dolores oboriantur, uenam secare oporteret, bis in anno sanguinem large detrahendo, & pur- gare quoque eisdē, si licet modo per singulos men- ses. Cæterum in omnibus diei horis uenam secare cōuenit his qui uehementibus doloribus sunt appra- hensī, adeo ut etiam si quis pransus sit, nihil ueritus tamē uenā secare possit, atq; id maxime si ex uētris

H locis

a prandio

locis cibus ad intestina fuerit dilapsus. Vbi uero in uentre adhuc cibus detineatur, euacuatione prius per uomitum facta, ita paulatim sanguinem detrahes. Secunda est autem e directo cruris fluxione infestati uena praesertim in brachio inferna, ita tamen ut obseruemus in eius sectione subiectam ipsi arteriam. Si uero haec non appareat, media, ita ut & in hac obseruemus subiacentem neruum. Quod si uero manus dextra dolore infestetur, uenā in dextro crure secamus, iuxta talos aut poplitem, aut plātam pedis: post sectam uero uenam si dolores adhuc perseuerent, & fortis tensio sit in affecto membro, saepe in ipso inflammato crure uena incisa, & multo sanguine detracto, hominem ab omni dolore liberaui. Memini itaque, inquit Philagrius, cuidam in quo humores aequaliter omnes & multus in primis sanguis redundabat, bis sanguinem ex secta uena detractum, in quo manifeste cognoui quantam uim habeat uena e directo membri affecti secta. Quā enim dexter pes ei fluxione infestaretur, uena dexterae manus incisa, confestim a molestiis est liberatus: quōque tribus interpositis diebus alterum item crus fluxus infestaret, uena sinistrae manus secta, similiter a dolore liber euasit. & quum inde pharmaco ex croco curaretur, perfectam sanitatem recepit. Verum hic quemadmodum praedictum est, multo sanguine redundabat, & uniuersum corporis habitum eiusmodi habebat, qui non facile posset exolui. In his uero qui contrariam huic corporis dispositionem habet, parcē sanguinem detrahēre oportet.

Quod eleuatas & incuruas uenas ex mēbris fluxione infestatis, ueluti in uaricibus, auferre oportet. Cap. xxi.iii.

Operæpretium est, inquit Rufus, etiam alios auxiliorum modos excogitare: Ego quidem igitur articulis pedum fluxu infestatis, laudo si quis uenas quae ex supernis in pedes deferuntur excindat, ueluti uaricosa in suris excindi solent. Etenim partes haec tempore praesertim inflammationum apparent in tumore eleuatae, & uenae circum circa rubent, & sanguine repletae cōspiciuntur, atque qui ita affecti sunt, magis a dolore uruntur, & frigidis gaudēt. Si igitur quis uenas ueluti in uaricibus excindat, multitudo sanguinis non amplius influere & inflammationem facere, quemadmodū antea consueuit, potest, atque id praesertim in sanguinea podagra conducet. In alijs uero articulis, utpote coxendicibus ac cubitibus & similibus fluxu infestatis uenae non ualde apparēt. Quod si contra contingat, etiam in his eas quae altius eleuatae sunt, excidere oportet.

De perustione in morbo articulari. Cap. xxv.

Cruetas igitur inurere oportet, aliquas quidem paulo altius loco fluore infestato, aliquas uero propius, atque id cauterijs facere praestat, aut si id aeger ferre recuset, cum medicamentis. Longe autem praestantior est cauteriorum usus: nam & citius & siccius perurunt. In uniuersum uero pedibus ex fluxu infestatis, loci circa utrumque talum forinsecus & intrinsecus inurendi sunt, cauterijs iuxta magnas ibidem sitas uenas admodis, paulo altius supra talorum locum. Inurendus item locus inter magnum pedis digitum & eum qui ei proximus est, medius, ubi sane uenae magis tumefactae cōspiciuntur, praesertim ex eis maximae. Quibusdam autē & articulos ipsos

perurere expedit, quā submucidi ualde cōspiciuntur, priusquam durities ad modum toforum in eis generetur. Sciendum tamē, inquit Rufus, quod in articulo submucidorum perustione, ulcera aegre curabilia oboriuntur, uerum ubi cicatrices coaluerint, maximum robur ipsis articulis praebent, ut nō amplius ad suscipiendum influentia recrementa sint apti. Et de his quidem haecenus. Oportunum autem & iam reliquam curam post sanguinis euacuationem aptam describere.

Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatam. Cap. xxvi.

Post sanguinem euacuatū affectam partem aceto ueteri tenuium partium cum rosaceo rigare oportet, & praesertim si in alto herere dolorum causa uideatur. Etenim acetum propria sua tenuitate usque in altum progressum, expeditam rosaceo uisā exhibet, quod natura sua dolores lenire potest. Ceterum si in superficie dolor consistat, per uini & olei usum magnopere iuueris, aestate quidem tepidorum, hyeme uero calidorū. Deinde etiā cataplasmatibus utendum quae inflammationes lenire possunt, citra hoc quod prouocent & prolecent fluxiones. Talia autem sunt, farinae foeni graeci & hordei, fabarumque & cicerum tritae uino coctae, potest etiam aqua modica affundi, ubi uinum nimis forte extet. Quin & passo ac modico rosaceo unaquaque ex praedictis farinis cocta dolorē mitigare cōsueuit. Oportet autē cataplasmata omnino semper calida esse: quod cōmode fieri potest, si assidue permulentur, & lana forinsecus contingantur. De pharmaco ex croco. Quum itaque praedictis praesidijs adhibitis uehementes compescuerimus dolores, parū quiddam de pharmaco ex croco ammiscibimus & praesertim ad cataplasma ex fabis apparatus, ne uidelicet coaceruatim transitus fiat: Deinde etiā amplius quid de pharmaco ammiscendū est. postremum uero pharmacū ipsum cum rosaceo dissolutum, & ad bonam compagem redactū imponemus: diffult enim celerrime, si liquidius fiat. Hoc itaque pharmaco sepe post euacuatū sanguinem, dolorib⁹ ualde imminutis statim usus sum, loco prius ex aceto rosaceo perluso: multam enim utilitatē & breui ostendit: quare ipso assidue ad podagricos uiuimus, utpote quod laude dignum experimētum nobis exhibuit, inquit Philagrius. In pluribus enim solum hoc suffecit ad perfectam curationem semper quidem cū rosaceo dissolutum, aliquando uero uino tenui & fuluo ammixto, quantum sanē eius conquassando & excipiēdo pharmaco satis fuit. Ceterum hoc ipsum in his faciendum est, quibus adhuc aliquid ex fluxione ad inflammatū locum deferitur. Quandoque autem pro uino acetum addimus, maxime ubi tum quod inferitur repellere uolumus, tum discutere iam in loco cōtentum. Passum etiā aliquando pro uino additū mollibus corporibus profuit. Verū enim uero & ad pastillū ex acacijs & ueratri apparatus, adiectū hoc pharmacum saepe quod influit prohibendo, & quod adest euacuādo, & membrum confortando, non parum iuuat. Solum item post sedatos dolores durius impositum robur partibus addit, ut adstricta & recrementorū influxui minime obnoxia, ac breui fortia reddantur. Hoc quidē igitur medicamento uarie & multiformiter usi sumus, multosque supimus, tum instante dolore, tum etiam

etiam eo sedato. Habet enim repulsoſam uim, pau-
cam quidem illam, propter acetum & crocum. Ha-
bet & concoctoriā & diſcuſſoriā ac moderate re-
ſiccantem, rurfus ob crocum & galbani thuriſq; &
ammoniā thymiatis ammiſtione. Diſcuſſoria au-
tem tum in hiſ iſſis ſita eſt facultas, tum in pice & a-
ceto. Merito itaq; podagricis inflammationibus con-
uenientiſſimum cenſetur. Nam & fluxū moderate
repellit, & caſfaciendo ſenſim concoquit, & conten-
tum diſcutit, & debilitatis membrīs firmitatem in-
ducit. Cōpoſitio autem hoc modo habet. Galbani
drachmas x x x i i, thuriſ drachm. x x x i i, croci dra-
chmas ſedecim, ammoniaci thymiatis drachmas
quadraginta octo, ceræ drachmas nonaginta octo,
piciſ aride drachmas c c c c l x x v. olei roſacei dra-
chmas quadraginta octo, acetī albi acerrimi hemina
unā. Ceram, picem, roſaceum lento igne liquefacta
excolato: galbanum autem & crocum, ammonia-
cum, thus, cum aceto terito, & ad liquefacta & ab i-
gne ablata in cacabum adiſcito: unitaq; in mortariū
quod modicam aquam frigidam habet, diſfundito,
& ſufficienter emolliſta extrahito, ac quēadmodum
prædictum eſt utitor. Hoc quidē modo Philagrius
apparare pharmacū iſſum præcipit. Quidam uero
poſt eum etiam opī uncīā unam, ad hanc cōpoſitio-
nem adiecerunt, eoq; ad uehementes dolores ſedan-
dos uſi ſunt. Alij autē uſus tempore iſtante parum
quiddā opī addunt ad maximos cruciatus compe-
ſcēdos. Paſtillus ex acacijs & ueratriſ. Porro ex aca-
cia & ueratriſ pharmacū hocce eſt. Paſtillus poda-
gricus admirabilis ad podagricos & morbu articu-
larē, inflammationeſq; & omnia pruriginosa: in prin-
cipio enim illitus manifeſtā utilitatē exhibet, ut ea-
dem etiā die lotus æger deambulet. Vbi uero dolor
in uigore eſt, incōmode adhibetur. Quidā enim in
uigore affectionis eo uſus, cōſeſtim quidem ſibi in-
de iuuari uiſus eſt: paulo uero poſt concalefacto &
reſiccato loco, à maximis doloribus æger apprehen-
ſus nos accerſiuit, quare quum accēſiſſemus & didi-
ciſſemus factum, cognouiſmus quod membra in ſu-
perficie poſita conuulſionis modo affecta eſſent, tum
ob inflammationem, tum ob exortam ex pharmaco
adſtrictionem & diſtentionem. Diſtentionē autē erant
& in profundo ſitæ partes ex cuticulę exterioris ad
interna impulſu. Abluto igitur prius cum aqua ca-
lida illito paſtillo, cataplaſma ei imponi iuſſi ex a-
qua mulſa dilutiore apparatus, & ex oleo modico
dulciſſimo, farinisq; ſœni græci & fabarū, atq; hoc
iſſum ſeci propter eam quæ ex iſſo pharmaco ei cō-
tigit oppilationemq; & conſtrictionem: quum ue-
ro dolores eueſtigio eſſent ſedati, à reſoluētib; diſ-
ceſſi: etenim cataplaſmata & irrigationes in fluidis
diſpoſitionibus adhibita incurabilem reddunt mor-
bum. Verum paſtilli iſſius cōpoſitio hoc modo
habet. Acaciæ nigre drachmas triginta duas, acaciæ
flauæ ſatundem, glutinis fabrilis pellucidi, aut quod
magis expedit, glutinis piſcium drachmas triginta
duas, ammoniaci thymiatis drachmas ſedecim,
glauci drachmas ſedecim, aloës drachmas ſedecim,
thuriſ maſculi drachmas octo, ueratri albi & nigri
cuſque drachm. vii i i. Aceto ſcillitico trita cogito
in paſtillos. Uſus uero tempore eoſdem in aceto eo-
dem liquefactos illinito, & exiccare permittito, æ-
grumq; in balneum demittito, & ubi inde redierit,

ſimiliter utitor. Totū paſtilli pondus drachmarum
cētum & ſexaginta octo eſt, hoc eſt unciarum x x i.
Hoc pharmacum podagricis inflammationibus in-
choantibus cōuenit, & ſolū ſufficit, ſi nō multitudo
fluxus redundet: & multo amplius, ſi per plumbi
ſuccum fuerit diſſolutum & liquefactum. Fit autem
plumbi ſuccus hoc modo. In mortarium plumbeū
ſuccum aliquem refrigerantem ſimul & adſtringen-
tem inſcico, & cum piſtillo plumbeo in ſole, donec
crasſior reddatur terito, atq; ita inſectum paſtillum
& contritum illinito. Sit autem ſuccus iſſe planta-
ginis, aut oxylapathi, aut ſanguinariæ, aut uuæ acer-
bæ immaturæ, aut ſemperuiui, aut aliquarum con-
ſimilium herbarum, quæ & iſſæ commodæ ſunt
in principijs inflammationum. Hoc iſſum itaque
pharmacum ex plumbi ſucco, non ſolum in principi-
ijs & progreſſu, ſed & in uigore malī aliquando
commodum exiſtit. Et Philagrius quidē hoc mo-
do de paſtilli uſu ſcripſit. Quidam uero paſtilli ex
croco ad dyſenteriam deſcripti, atque huius iſſius
partes partes aceto aut plumbi ſucco terunt, & dua-
bus ante balneum horis illinunt, atque ubi lauerint,
à balneo rurfus ſimiliter illinunt, & egregium teſti-
monium huic uſui præbent. Diæta eorum qui ob
ſanguineum fluxum ægrotant. Inflammationes ex
ſanguinis influxu obortas, quēadmodum dictum
eſt, curare oportet. Cæterū cibos eis exhibere oportet
qui minus nutriunt. Quales ſunt holera, & ſple-
noſæ plantæ: & ex uolucris, montanæ: ex piſci-
bus uero, qui in petroſis aquis degunt. Aluum uero
facile ſubeuntem habere oportet, & ſi quidē offi-
cio ſuo non ſua ſponte fungatur, ſimpliciori aliquo
clyſteri ſeu inſuſo eluatur.

*Cura eorum qui neq; uenæ ſectionem, neq; purga-
tionem ſuſtinere poſſunt.* Cap. x x vii.

Quandoquidem uero quidam adeo formidoli ſunt
& mollicie fracti, ut neq; nomen uenæ ſectionis aut
purgationis audire ſuſtineant, non melius tantū, ſed
& fortunatius eſt nullū talem contingere. Et tamen
ſi ad curandos eos cogamur, prædicere oportet diu-
turnos dolores eis affuturos, & uigilias, articulo-
rumq; torturas & claudicationes, præſertim ſi craſ-
ſus & multus ſit ſanguinis influxus. Abſtinentia qui-
dem igitur ciborū illis conſtituenda eſt, & clyſteres
moderate fortes inſcicendi, & pharmaca umbilica-
ria imponenda, epomphalia Græcis appellata, quæ
ſanè umbilico impoſita aluū ducunt. Utendū etiam
hiſ quæ ſedi apponuntur, glādulis uidelicet, uelut eſt
cyclamini ſuccus, & elateriū, & ſimilia, quorum in
tertio Sermone ſeci mentionē. Utendū & poſt aluū
exolutā, unguētis diſcuſſorijs, & frictionibus eiuf-
dem generis, & omnibus quę ſuperfluum euacuare
poſſunt ex locis fluxu inſeſtatis. Etenim repulſoria,
ſi nō prius uniuerſo corpore euacuato, aſſumantur,
periculū inducunt. Cataplaſmata igitur eis impone-
re oportet ex pane, fabaceaq; & ſœni græci, ac cicerū
farina, cū aqua mulſa aut adipe ſuillo non ualde ue-
teri. Scarificationibus itē iuxta affectū locum uten-
dum. Irrigare autē aſidue oportet ex aqua & oleo,
& aliquādo cataplaſmata ex lixiuio apparatus, quo
per eroſam cutē, ueluti per riuos malū euehatur. Hu-
iufmodi hominibus cōueniūt item ceratorū formā
habentiā medicamēta, ex oleo ſicyonio, nitroq; &
cera apparatus, quæ humorē ad locū delatū diſcutere
poſſunt,

possunt. Pharmacum ex lixiuo & spuma nitri dige-
rens ac exhaustis inspissatos humores, est autē phar-
macum ipsis comodissimum, & facile parabile: ex-
citat bullas, & cutē erodit. Spumae nitri albae quam
achelesiam appellant, drachmas uiginti quinque, tere-
binthinæ drachm. triginta sex, olei drac. cccc lxxx.
lixiuū ficulnei, hoc est, exustis lignis & aqua extin-
ctis, loturæ eorum percolatæ drachmas octoginta
quatuor, ceræ drachmas cccxl. Oleū, ceram, terebin-
thinam, & lixiuū, hoc est aquam ipsam, ut prædi-
xi, coquito, & quum pars maxima aquæ fuerit con-
sumpta, spumā nitri prius tenuissime tritam adijci-
to, uncto, ac utitor. Huiusmodi sanē sunt inflamma-
tionum podagricarum ex sanguine curationes.

De his qui ob bilis influxum egro-

tant. Cap. xxviii.

Quod si uero inflammationes ob biliosum influxū fiāt,
tum & in his cōmunis scopus euacuationis adfligē-
tis humoris existit. Fiant autē euacuationes in prin-
cipio, tum per uomitū, tum per uentrē. Danda itaq;
pharmaca bilem educētia, ex quorū numero aliqua
per utramq; uia bilem exigunt, uelut est thlaspi: hoc
enim acetabuli mensura potatū & superne & infer-
ne purgat, atq; tantū sanē de eo semine ad summum
datur. Constat autē quod & purgatoria medicamē-
ta ex scammonia apparata flauam exagitant & eua-
cuant bilem: horū uero compositiones iam antē re-
tulimus in tertio Sermone. Faciemus tamen & in
hoc Sermone quorundā mentionem, sed paucorum
& paulo post. Purgare igitur eos oportet confiden-
ter, & secundaria uice, si res ita postularit: confestim
enim in euacuationibus subsistunt & sedantur. Quod
si tamen neq; hi purgari uelint, neque sustineant, ob
quamcunq; tandem causam, tum sanē & his, quem-
admodū dictum est, mederi conuenit per umbilica-
riorum purgatiuorū impositionem, & per ea quæ
sedi subduntur. Per infusum item alius ipsorū elua-
tur. Et cataplasmata adhibeantur ex fabacea & hor-
deacea farina, adipe suillo recenti & insulso, tenuiq;
chamæmeli farina ac aqua. Ac uero hæc ipsa poste-
rius imponenda sunt: in principio autē usq; ad uigo-
rem ea quæ ex semperuuo apparantur, & rosas uiri-
dibus, perdicij herba, anchusa, sanguinaria, helxine,
sideritide, portulaca, rumice acuto, atriplice, solano,
plantagine, hyoscyamo, lētecula, & stratiote palustri-
bus, blicro, lactuca, feride, malua satua, ramentis cu-
cubitæ, umbilico ueneris, flore utolarū, mali puni-
ci corlo. Horum unūquodq; cum pane ex farina po-
lentæ impositura dolorē tollit, & maxime psyllij se-
men aqua feruenti maceratū, & postquam succulen-
tum factū fuerit, pro cataplasmate impositum. Un-
guentum itē ex plūbi succo ad sanguineas influxio-
nes præscriptum his cōmodissimum existit. Cōmo-
da sunt & mala cum pane trita imposita, & quæ his
sunt similia. Et cerata Hippiones & Ambrosiæ no-
mine insignita, & quæcunq; ex cera, chamæmelo, &
rosaceo apparantur: adijcitur autē succus quispiā ex
prædictis refrigerantibus, & ouorum cādidum, &
aqua cum modico aceto, quorū compositiones pau-
lo post subnectemus. Optimū autem pharmacū pro
eis est ceratum ex rosaceo bere succo quantū satis est
adiecto. Uidi etiam quendam hac affectione occupa-
tum, qui immixtis in frigidam aquā pedibus & ali-
quandiu in ea detētis præclaram opem tulit. Alium

item uidi qui ostreorum carnibus cum argenti spu-
ma & uiridibus hyoscyami folijs ac oleo ueteri di-
ligenter tritis utebatur, & tum illinēdo eas, tum im-
ponendo probe restitutus est. Licebit autem per os
ostreorum penuriam, carnibus concharū fluuiatium
uti. Atque hæc quidem conueniunt, si mediocris in-
flammatiō & ardor adsit. Nam si magna fuerit, ad
erysipelatorum modum curationē instituemus. Ci-
cutæ nimirum folijs & papaueris ac mandragoræ
& hyoscyami adhibitis, quibusdamq; medicamen-
tis compositis stuporem inducentibus, quæ ex papa-
ueris succo & similibus constant. In horum tamen
medicamentorum usu immodici caloris deletionem
pro scopo habere oportet, quæ sæpe in una contin-
git hora: post quam statim stupefactiō ablato, cata-
plasma ex fabacea farina, adipeq; & aqua impona-
tur. Etenim ubi ea quæ uehementer refrigerant, diu-
tius adhæserint, stuporem ægrumq; ac languidum
sensum corpori inducunt. Quapropter quū in fer-
uentibus doloribus fuerimus ad stupefacientium u-
sum coacti, postea refouebimus partes per ea quæ
calefacere possunt.

*Parabilia remedia ad inflammationes non ualde
feruentes. Cap. xxix.*

Reliqua ex eorum numero quæ facile parantur, quæq;
doloribus non ualde magnis profunt. Palmularum
glandulæ sunt, & mali medicæ ramuli, citrium
autem ipsam appellant & aureum malum. Quin &
fructus ipsius medulla sapore acris, panī aut pollini
ammixta in cataplasmatibus cōmodissima est. Quem-
admodum etiam si oleo coquatur & cera sufficiens
ad oleum adiecta pedibus imponatur. Cōmodum
est & symphytum per se pro cataplasmate imposi-
tum, & cum pane aut cerato permixtum. Et malico-
rium aceto incoctum, aut aridum tritum cum pane
subactum. His ergo utaris. Optimum autem cata-
plasma podagricum & hoc est. Cupressi uirgulia
teneriora & pilulas in ollam coniecta cum aqua ma-
rina, donec flaccescant, coquito. Deinde in mortariū
culinarium transsumpra, ad cerati formam terendo
redigito: & lineteolo excepta, dolentibus locis impo-
nito. Hoc cataplasmate quotidie ante somnum uti-
tor, etiam si non adsit dolor, per integrum annum.
Nam perfecte ægrum sanat. Mirifice etiam facit cu-
pressi decoctum, si ex eo æger sæpe perfundatur.

Aliud. Cypri, hoc est ligustri folia uiridia trita
in pastillos digerito, usus uero tempore aceto dilu-
tos illinito. Barbari autem Indi arida ipsa folia con-
tusa & cribrata reponunt, usu uero ex parte aqua
feruenti subigunt, modico etiam aceto adperso, aut
rhois culinarij decocto, atque hoc modo inflamma-
to loco imponunt, folijs ricini aut carpasi superstra-
tis, aut si hæc haberi nequeant, brassicæ. Reperies au-
tem mane cataplasma aqua plenum. Sensibilis enim
discussio & exhaustio contingit, adeo ut æger exu-
ctionem sensu perceperit, & maxime iuxta ungues.
Vidat tamen colorem, eum ad fuscedinem corrumpen-
s, quapropter aliqui cerato liquido ungues præ-
linunt. Aliud cataplasma, quod eadem hora
dolores sedat. Cerebrum porci cum amylo &
rosaceo tritum, & panniculo infarctum imposito,
& confestim liberabitur æger, ut deambulare possit.
Optime faciunt item maluæ aqua cocta & tri-
ta imposita, celerrime enim dolores sedant.

De stupe

De stupefacientibus medicamentis. Cap. xxx.
Composuerunt medici, quemadmodum predictum est, ob excellentes dolores, aut etiam ob ægrorum molli-
ciem quos curare cogimur, & neque minimum do-
lorem tolerare possunt, medicamenta stupefacientia
appellata. Hæc enim nequaquam affectiones ipsas in
quibus dolores fiunt, curant: uerum stuporem & sen-
sus hebetationem membri inducendo, quietem quan-
dam doloribus obducunt, quapropter si ad huiusmo-
di pharmacorum usum, aut ob excellentem dolorum
magnitudinem, aut ob immodicam caliditatem ery-
sipelatis cõsimilem, cogamur, utemur quidem mo-
dice, quo feruor immodicus refrigeretur, aut sensus
oblæsiõ deleatur. Ad hoc etiam animaduersione ha-
bita diligenti, ne quid post uehementis caloris & do-
loris extinctionem, ex stupefactiuo pharmaco in mē-
bro permaneat. Sunt autem medicamenta stupefa-
ctiua huiusmodi. Asclepiadæ epithema dolorem
leuans, podagricis & articulari morbo commodum:
usus eius est in ipsis exacerbationibus & excellenti-
bus feruoribus inflammationum. Opij drach. iiii.
croci drachm. i. panis siliginel quantum satis est: u-
numquodque per se lacte bubulo maceratũ terito, &
unita imposito. Aut hæc ipsa cū lacte trita cerato ro-
faceo excipimus & utimur. Aliud, quod confe-
ctum à doloribus liberat: oportet autem ante pharma-
ci impositionem ægrum lauare, atque ita exteris locis
statim adhibere. Succil absinthij trientem, croci trien-
tem, ceræ tantundem, opij unc. i. irini sexuncem. Opium
& crocum in passo diluito, & affuso cerato unito ac-
utitor. Asclepiadæ pastillus podagricus, dolorem
leuans. Vsus eius competit tempore exacerbationũ.
Aloës lib. i. centaureæ sextantem, thuris trientem,
myrrhæ trientem, lapidis asij, opij, succil mandrago-
ræ, styracis, aluminis scissi, cuiusque sextantem: exci-
pe, ac subige passo, & ad pastillorum formam redu-
cito. Vsu uero expetente lacte dissolutos cum pin-
nulis illinito, supra illitum locum linteolo imposi-
to passo imbuto.

*Unguenta recalfactoria quæ post stupefactiuorum
usum adhibentur.* Cap. xxxi.

Quum itaque stupefactiuus usque ad feruoris inflãmatio-
num deletionem fuerimus usi, post calefacere mem-
bra cõuenit cataplasmatibus ex castorio & thapsia cõ-
positis: si enim hoc non fecerimus, debilia & intem-
perata reddita mēbra perpetuo fluori obnoxia red-
demus, & quæ in actionibus facile offenduntur: qua-
propter unam atque alteram unguentorum recalfacto-
riorum compositionem apponam. Ex quorum nume-
ro & hæc est. Succil thapsiæ drach. viii. piperis drach.
x xiiii. adarces, cãchryos, euphorbij recetis, cuiusque
dra. x x xii. Si uero recens euphorbiũ desit, duplum
eius sume: staphidis syluestris drach. xii. pyretri dra.
xii. terebinthinæ drach. xvi. ceræ drachm. x xiiii.
olei cyprini libras vi. Altera, eiusdem usus. Pyre-
tri, castorij, helenij, adarces, piperis, euphorbij, zin-
giberis, nitri, ceræ, singulorum drachmas viii. iri-
ni quantum sufficit. Pro pauperibus autem satis fa-
ciunt, allia, thymus, origanum, saturcia, sinapi, & si-
milia.

*Pharmaca & edulia eorum qui flauæ bilis influ-
xu infestantur.* Cap. xxxii.

Exhibenda est autem & cyclaminus à flauæ bilis influ-
xu infestatis. Huius enim radix quam tenuissime

trita cum aqua mulsa aut passo pota, biliosum hu-
morem per sudores excludit. Dandæ autem ex eã dra-
chmæ quatuor corporibus magnis & robustis, reli-
quis uero pro uirili tolerantia. Adiuuare uero opor-
tet sudorum exclusionem corpus calefaciendo & fri-
cando, ita tamen ne affectos locos cõtingamus. Præ-
benda quoque in potu ea quæ urinã cient, talia enim
bilem per lotium euacuare consueuerunt: pastillus
item ex seminibus soporifer, & qui à triangulari for-
ma Trigonus appellatur, & cõsimiles, doloribus
infestantibus commode à flaua bile affectis exhiben-
tur. Nam & somnus alti soporis inde oboritur, &
fluxiones ab ipsis resiccantur, atque id maxime si post
corporis per purgatiuũ euacuationem exhibeantur.
Educia autem eis apta quæ refrigerant, non tamen hu-
meant: humiditas enim auget fluxiones. Dandum
item eis lactucæ semen ob somnum conciliandũ, &
papaueris semẽ tum in cibo, tum in potu. Mala etiã
& sorba & mespila præbenda, & quæcunque ad hoc
quod refrigerant, fluxus cohibent allationem. Cæ-
terum à uino omnino exacerbationis tempore absti-
nendũ est. Intercapedine autem pura reddita parum
ex eo cõcedendum. Porro inedia ab amara bile infe-
statos extreme lædit: nam bilem acriorem reddit.

*Cura eorum qui ob pituitæ influxum æ-
grotant.* Cap. xxxiii.

Horum item curationem à pituitæ euacuatione princı-
pium sumere oportet. Euacuatur autem humor pi-
tuitosus per uomitus quidem, nihilominus tamẽ &
inferne per uentrẽ. Vtilis est autem in hac affectione
per inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pe-
des hæreat morbus, & multo adhuc magis si iuxta
omnes corporis articulos fluxus fuerit dispersus, sa-
miliarior enim pituitæ uia & minus periculosa per
intestina existit. Si enim in superiorem uentrem uiso
lenter adtracta non euacuetur, periculum inducit.
Quapropter tutius est ut ad infernam excretionem
ducatur. Euacuata enim in una die morbi utcunque
inueterati robur contundit, quare in podagra inna-
tum ex pituitoso humore fluxum, & mediocriter af-
fligentem, & qui tum potentia tum actu calidis re-
medijs delectatur, purgare oportet. Ante purgatio-
nem uero modice adstringentibus utendum, atque id
magis adeo circa initium fluxionum. Atqui si eua-
cuatio per purgationes fieri non possit, quæ sanè uel
sola sæpe sufficit ad affectionum fluidarum curatio-
nem: tum inedia & fame utendum est ad plures dies.
natura enim pituitosi eam bene tolerare possunt. U-
tendum etiã cõfricationibus discussorijis ampliusque
efficacioribus infusis, & pharmacis cientibus urinã.
Cæterum quæ ratione nutrimenti præbentur edu-
cia, natura sicciora sint, & minus nutriant, ueluti est
oryzæ succus & bromi, qui inter frumentacea refer-
tur. Noces iuglãdes pauca, pistaciaque & nux thasia,
& uuæ passæ, & capparis ex aceto mulso. Quãdoque
etiã parui pisciculi in petrosis aquis coacti, & aui-
culæ mōtanæ assatæ præbeantur. Vinum autem præ-
beaturn quàm minimũ interualli tempore, tenue, sul-
uum & uetus. Cataplasmata autem quæ frigidis flu-
xionibus cõueniunt imponenda. In principio quĩ-
dem terebinthi folia uiridia & tenera cū adipe suil-
lo recetis, & rosaceo, modica cera adiecta. Aptia sunt
ipsis & cupressi folia & pilule uino cocta. Et cyperi
radices, & rhamni folia. Post principium uero pi-
tuitosis

cuitosis conuenit ex eruo & lolio ac foenograceo cataplasma. Quemadmodum etiam ea quae ex ciceribus constant, aristolochiae radice trita ammixta, centaurea & gentiana, & paeonia, & bryoniae radice ac fructu. Ex amaraci item coma, & artemisia, abrotanico folijs & adianto, uittice, lauro, pulegio, samfuco, menta, brassica, sisymbrio, serpillio, filice, foeniculo, eruca, & reliquis quae saporis acris, aut salis, aut amari sunt, & maxime si dolores citra ardorem ex refrigerationis sensu sint oborti. Singula uero ex his cum pane & adipe recentia pro cataplasmate imponito, quanquam nihil uetet unumquodque per se adhibere. Optimum est etiam somnium ex passomari mixto apparatus. At uero quinquemfolij radicem & malicorij aequalibus partibus decoctis perfudi ac foui, inquit Archigenes, circundolentes partes. Immo & tritis ipsis magis inflammata loca cataplasmatibus modo contexi, atque hoc ipsum multis uelut obluens & resistens remedium dolores expulit, aliquibus autem ut pharmacum nulli inferius ipsos mitigauit, rarissime uero citra commoditatem apparuit. Mansuetissimum uero & hoc est. Altheae folia cocta trita tum per se, tum cum polline, aut ordeacea farina imponantur. Ceratum item ex radice eius, quae hirsutum appellatur, cocta in aqua mulla trita, constet autem ceratum ex gleucino aut irino. Imponatur uero his qui tum uehementer calida, tum ualde frigida auersantur, mediocribus autem delectantur. Pharmacum porro conueniens noui, inquit Philagrius, podagricis qui una cum doloribus frigoris sensu percelluntur, id quod ex laurino componitur. Quum enim & alia eiusdem generis sint cum ipso, tantum tamen commoditatem a nullo exhibitam scio. Compositio autem hoc modo habet. Pharmacum ex oleo laurino. Ceræ, adipis suilli ueteris, resinae pinus siccae, terebinthinae liquidæ, cuiusque drach. xvi. cypriini, laurini, cyprii, butyri, cuiusque drach. xlviii. galbani, medullæ ceruinæ, cuiusque drach. xvi. Hoc quidem igitur medicamentum confectum a dolore liberat eos qui in dolore frigoris sensum perceptant. Admirandum etiam in his pharmacum est, quod ex croco constat & galbano, supraque ad sanguineum influxum praescriptum est, & in omni tempore adhibetur. Sunt autem & alia pharmaca his apta. Quemadmodum ea quae Myracopa appellantur, & quae ex ipsis componuntur cerata, fiunt autem haec commensurata & proportionata cera ad unguenta ipsa ammixta. Pharmacum ex metallicis. Optimum uero & ipsis pharmacum est ex metallicis ad fauciatos nervos a Galeno apparatus, cuius & nos admirabile periculum fecimus, inquit Philagrius. Quum enim partium quam tenuissimarum sit, ad profundum corpusculorum progreditur, & attenuat, & discutit. Compositio igitur existit in praedicta dispositione post sedatos dolores admotum, aut quum mediocres existant, non solum enim discutit, ut dictum est, sed & repellit. Compositio uero haec est. Chalcitidis drach. viii. misyos drachmas xvi. Squamæ aeris drac. xxxiii. thuris drac. xxi. galbani drach. xii. colophoniae drac. xvi. ceræ drach. xvi. olei drach. cxxviii. aceti acerrimi quantum satis est. Metallica cum aceto in sole aestiuo terito ad plures omnino horas. Deinde thus adjecto, rursusque diu terito, & liquecibilibus liquefactis, refrigeratis, & erasis admixtis uni-

to, ac utilior. Pharmacum ex uino & oleo, Galeni. Aliud pharmacum ex oleo & uino Galenicum, conueniens in declinationibus inflammationum, & post easdem omnibus podagricis. Spumæ argenti, drachmas xvi. olei ueteris drachmas cxxii. ad podagricos uero sufficit, si anniculum sit oleum, uini ueteris fului pellucidi atque leniter dulcis drachmas cxxii. Coquito simul ad compagem manus non inquinantem. hic enim est optimus eius apparatus. Nam qui triplum olei accipit, diutius coquitur, & magis resiccans redditur. Porro in his qui post dolores uehemens frigus percipiunt, aliud Galenicum pharmacum ex euphorbio ad fauciatos nervos descriptum conducit. At uero adhuc pharmacum podagricis commodum, tum in inflammationum remissione, tum post easdem existit, quod Aegyptium appellatur, & quod ex lanis succidis uitis apparatus. Habetur autem inter multae commoditatis emplastra in xv. Sermone huius tractationis.

Cura eorum, qui ex atra bilis influxu aegrotant.

Cap. xxxiii.

Dicatur autem ex ordine & de atrae bilis influxionibus, quae & ipsae omnino uniuersali euacuatione praecedente opus habent, hoc est uenae sectione, aut purgatione. Quando quidem igitur ad atram uerunt bile, euacuatione per ea quae ipsam repurgant: quando uero ad sanguinem atra bile infectum declinant, per uenae sectionem. Si uero ambo haec simul per totum hominem redundarint, non unum aliquod ex praedictis adhibere suffecerit, sed praefecta uena, deinde depurgare cogimur, quod ipsum & in alijs affectionibus duplici euacuatione indigentibus erit faciendum. Priusquam igitur totum corpus euacuamus, atque in ipso etiam euacuationis tempore, dico sane in principijs, repulsorij & sensim simul calefacientibus utendum est. Post euacuationem uero his quae sensim calefacere, & attenuare, & discutere possunt, utemur. Sunt autem repulsoria quidem simulque leniter calefacientia, terebinthi folia & cupressi, cyprii radices, & similia. Calefactoria autem simulque attenuatoria & discussoria, bryoniae radix & cyclamini, syluestrisque cucumeris, & raphani, lauri item folia mollia, & pastinacæ, & caucalidis, sinapis, nasturij, conyzæ, brassicae, iridisque & ocymi & aliorum innumerorum folia. Ammiscenda autem sunt haec panis aut cuiusdam ex praedictis iam saepe farinis, & adipi anserino aut gallinaceo, butyroque & cyprio, atque id maxime in humectis & mollioribus corporibus, quo leniora reddatur. Quin & post huiusmodi pharmacorum impositionem, praescripto ex croco pharmaco, & eo quod ex metallicis constat, uti conuenit, ampliusque quod Machaerioni inscribitur, & quod Isis appellatur, similibusque, quorum compositiones in xv. Sermone traditas reperies. Etenim huiusmodi pharmaca relictum in membris humore concoquunt, eundemque attenuant & discutiunt, ampliusque membra debilitata corroborant. Commodissimum autem pharmacum per interualla exacerbationum dolore non infestante, ad atrae bilis fluxiones est Corax, quemadmodum etiam pastilli, Andronius inquam, & Musæ, & qui ex centaurea, itemque qui ex lanis succidis apparatus, & consimiles in xiiii. Sermone descripti. Illinuntur autem cum uino dulci. Miscentur etiam ad praescriptum in

ex cro

ex croco pharmacum, & ad id quod ex metallicis constat, ita tamen ut parum quid ex pastillis ad multā pharmaci partem commisceamus, ut uidelicet pastilli XII. pars ad unam pharmaci partē addatur, hoc est ad pharmaci lib. i. pastilli uncia una. Aliquando autem minus. Quum enim euacuare & discutere uoluerimus, minus de pastillo adiungimus, corroborare autem & firmitatem addere, plus. Quod si neque perfecta, neque absque dolore sint exacerbationū interval- la, panem uino maceratum & sufficienter emollitū ad prædicta medicamenta per interualla ammiscere expedit. Præstans autem est & in his discussoria fricationum species uniuersi corporis, præter affectas partes, tum per interualla, tum tempore exacerbationum uehementius & diutius facta, & maxime si non fuerint præeuacuatæ.

De his qui ob tenuem fluxum ægrotant. Cap. xxxv.
Si serosi sint humores qui ad articulos influunt, non paruum signum tenuitatis ipsorum est, quod neque tumorem magnum habeant inflammationes, neque diutius durent, imò neque molestiam aliquam in motibus perpetuantur ægri, postquam quiesuerint inflammationes. Eorum igitur qui ob tenuem fluxum ægrotant, remedium quod eadem die opem eis fert, purgatio est per ea quæ serosos humores euacuare possunt facta. Fluxiones autem quæ non ita ualidum dolorem inferunt, sæpe in solo irrigationū sortu substituerunt, ex oleo uidelicet rosaceo & uino dulci suppressæ, modica cera ammixta, quædamque lassis succidis exceptis, additur etiam aliquando nitri spuma. Quin & quod ex cote naxia & ferri affricu dederitur, & in ea cōgregatur, illitum iuuat. Et selinusia terra, & cretica, & samius aster, & lemnia, sphragis appellata, uino & posca, & aceto ac passo diluta, illita eodem modo profuerunt. At uero & caseus recens coactus impositus mediocres inflammationes etiā solus iuuat, & cū polēta, aut farina præsertim ordea cea. Habet enim in se non modo quid repulsiuū, sed & discussoriū, per quod & tenues fluxiones repellit, & humores in articulis euacuat. Lentisci etiā ramuli teneri & fructus, similiterque myrti & terebinthi, & piri, ac quercus, oleæ, punicæ, mespilorum, cerasi, pruni, rubi canini, & rubi, cuius etiam fructus & uirgulta idem operantur, & ut simpliciter dicam, quæcunque res in fructibus, & folijs, & succis, & radicibus aliquid amarū, aut acris, aut salis, aut nitrosi habet, simulque cum amaritudinis, & acoris, omniumque prædictorum moderata qualitate non adeo ex cellēti, adstringēti hæc mediocres dolores ex fluxione obortos iuuant. Sufficit autem unā cū his ad perfectam sæpe curam fames ipsa: Quemadmodum etiā clyster omnibus fere podagricis conuenire uidetur, & maxime in quibus uenter assidue cohibetur. Ruta etiam uiridis & pastinaca uiridis utiliter ipsis pro cataplasmate imponuntur, maxime quibus uenter cohibetur, ampliusque quibus pungitui sunt dolores & inflates. Ammiscere autem omnibus his expedit adipem, quandoque & polentas, & farinas quasdam, quæ haberi possunt: mel item ac passum, & rosaceum, quo humecta & liquida conseruemus. At uero si & fermentum modicū hoc tēpore ammiscas, nihil peccaris. Hoc igitur modo etiam plurima ex hortensibus tibi commodā fuerint, si ipsa iuxta prædictas qualitates iudicaris, amaram nimirum & sal-

sam, acidamque & adstringentem atque acrem, quæ omnes sint mediocres. Inuenies autem aliquādo & dulcem qualitatem unā cum his permixtā in eadem etiam planta. Ea quoque quæ in mari nascuntur, plerunque talia sunt, utpote quæ Lactucæ appellantur. Sunt autem germina lata & oblonga ac uiridiora, tenusa & subrugosa, ac ueluti conduplicata ad littora maris per fluctus eiecta. præstantiores autē sunt cum posca decoctæ. Viridia item quæ in fūco siue alga tinctoria ad radices fixæ sunt. Et ad hæc quæ in petris maris reperiuntur similitudine fungorum, reliquaque germina mollia commodant eodem modo. Omnia enim huiusmodi apte commiscuntur ad ipsos ac farinis. Quin & torpedo tum marina, tū fluuiialis, iuxta alium quendam modum, non in paruis solum, sed in magnis quoque inflammationibus congruit. Naturali enim facultate quadam stuporem inducit, & dolores e corporibus tollit. Quapropter ipsam uiuentem assidue ad mouere inflammatis locis oportet. Cocta item adhuc uiua in oleo, deindeque extracta, ac modica cera cum oleo eliquata, commodissimum pharmacum omnibus dolore afflictis podagricis redditur. Consimili efficacia uermes terreni appellati præstant, si in oleo coquantur, & cera postea in oleo liquecat.

De fluxionum inter se complexu. Cap. xxxvi.
Quū itaque iam simplicium & immixtarum inter se fluxionum curatio sit relata, nulla difficultas amplius est, etiam mixtarum curam inuenire. Satis enim manifestum est, quod ad humorum complexum, consequenter etiam curationes oporteat mixtas esse. Cognitiones autem mixtarum fluxionum ex prædictis simplicibus affectionibus sunt sumendæ.

Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu. Cap. xxxvii.

Si igitur sanguineæ & biliosæ affectiones concurrant, & propterea tumor magnus & ruber, & quodam modo flauus ac feruidus, membrum fluxione infestatum apprehendat, & dolores nunquam remittentes incumbant, & exacerbatio uehementer quidem alternis & tertio quoque die fiat, benignior autem singulis diebus: omnino sanè manifestum puto, quod medicationis initium à uenæ sectione primum fiet, consequente exinde biliosi humoris purgatione. Satis constat autem quod & euacuationū tempore repulsiuū utemur, quæ uidelicet frigidæ & adstringentis sunt facultatis: Et deinde primū mitigatorijs & refrigerantibus quidem utendum, nō autem amplius adstringentibus. Adstrictio enim tumorem inspissat ac cogit, ut egre discuti & resoluti possit, si diutius ea utamur. postremum uero etiam his quæ concoquere & discutere tumorem possint, utendum est. In principio igitur iuxta euacuationum, inquam, tēpus, utile pharmacum eiusmodi affectionibus est ex acacia & ueratri pastillus in mortario plumbeo cū semperuiui, aut plantaginis, aut sanguinarie, aut sectionis, aut umbilici ueneris, aut rumidis acuti, aut solani, aut uuæ acerbæ, aut hyoscyami, aut lactucæ succo dilutus. Atqui iuxta augmenta & uigores affectionum, etiam ea quæ ad sanguineas affectiones dicta sunt, in cataplasmata ammiscere expedit, succosque item iam relatarum herbarum, & ipsas adeo herbas tritas. Postquam uero feruor inflammationis cessarit, concoquentibus cataplasmaris &

medicamentis utemur: parte etiā affecta uulnusculis impactis scarificata, præsertim si appareat tumefacta.

Cura bilis ad pituitam permixta. Cap. xxxviii.

At uero si pituitosi humores biliosis fluxionibus amisceantur, si quidem unio & permixto ipsorum eodem tempore hominem infestet, miscere etiam remedia oportet, eorumque multitudinem purgare per ea quæ bilē simul & pituitā educere possunt: forinsecus aut cataplasmata imponēda pari aut impari modo permixtis his quæ pituitosum & biliosum euacuat fluxū. Et pari quidē modo utraq; conijciemus, quū assilgentiū humorū mixtura equalis fuerit. Impari uero, si alter humorum redundarit. Neque uero obliuioni tradendum, quod aliqua ipsorum in principio recte adhibentur: aliqua uero iuxta malī progressum & uigorem. Quædam uero eo remittente & circa declinationem.

Cura humorum atræ bilis alijs permixtorum.

Cap. xxxix.

Eadē etiā methodo uteris, si atræ bilis fluxiones reliquis fuerint ammixte, tum iuxta exacerbationum circuitus, tum iuxta continuitatem. Neque enim solum ad affectionum cōplexus est respiciendum, sed & num assidue & citra remissionem, an iuxta circuitum infestet. Primum quidē igitur & in illis euacuationibus cōuenientibus utendū est: Deinde ubi quidē assidue infestant, cataplasmatibus dolores sedantibus uti expediat. Vbi uero per circuitū moueantur, instatibus quidē doloribus mitigatoria cura, per interualla uero corroboratoria membrorum utemur. Manifestum autē quod quæ magis feruēt, maiori refrigeratione opus habēt: quæ minus, minori. Omnia tamē feruentia refrigerare oportet. Quæcunque autem fluxiones pruriginosæ fuerint, obtundentibus & discussorijs curabuntur. Quæcunque uero mordaces, obtundētib; solis. Et quæ in alto sitæ sunt, per ea quæ tenuium partium existunt: quæ uero in superficie, per simpliciora. Omnium autem horum syluam in fine secūdi huius tractationis Sermonis præscriptam habes.

Cura durorum humorū qui post inflammationes relinquuntur. Cap. xl.

Duri & reluctantes aliquando tumores post inflammationes relinquuntur, qui ex crassis humoribus generationem habent, in corporibus præsertim durioribus, & quæ ægre per discussoria exoluuntur, & male curatis. Huiusmodi enim non curati statim se ipsi peiores fiunt ad uitæ actiones obeundas. Cæterum huiusmodi tumores sedant, pharmacum Machæronis, & Piscatoris, & Aegyptium, & consimilia, de quibus dicitur x v. Sermonem in pharmacorū multæ commoditatis relatione. Dicitur autem & hic, ubi ex ordine de tumoribus qui egre concoquuntur tractabimus. Sunt etiam parabilia pharmaca ad hanc affectionem si ruri uiuant, us, satiuæ fidi, & syluestris quoque grossi cocti, triti & impositi, tum soli, tum cum quadam ex prædictis farina & adipe. Cydamini item & cucumeris syluestris radix, & althea bis cocta, & caricæ pingues, adianton, auena, urtica, bryoniæ radix, bulbi anethi, abrotoni, buphtialmi, iridis folia, itemque marrubij, ita ut singula prædicta cum uisco, pice, & sulphure uiuo permisceantur.

De tumorum crudorum & inconcoctilium

cura.

Cap. xli.

Crudi tumores ex materia albidiorē ac lentiorē con-

gregantur, diuque durāt, neque concoquuntur, neque discuti possunt. Quandoque uero primis quidem discussis loci statim fluxione infestantur: & inæquali magnitudine semper permanent tumores. & in quibusdam sanē penitus absque dolore fiunt, in alijs uero dolore quodam comitante. Quandoquidem igitur diuturnos uideris tumores citra dolorē, per discussoria curato, diligenti animaduersione habita ne quid relinquatur induratum, quod incurabile aut ægre ualde curabile reddatur, & maxime ubi callosarum duriclerum generationem uideris in articulis futuram. Si igitur citra dolorē uideris crudos tumores, emollientibus ad discussoria ammixtis curato, ne quid penitus induratum relinquatur. Si uero cum dolore contingant tumores, non modo discussorijs, sed etiam quæ unā cum hoc quod discutunt, lenire possunt, expedit uti. Manifestum autem est, quod si fluxus tenuis & modicus cum doloribus quibusdā deferatur, inde tumores post inflammationum remissiones oboriantur & infestent, atque id maxime in his euenit qui delicatius uiuunt, aut frequenter lauantur, aut plus quam oporteat inambulant, uel etiā rebus uenericis utuntur. Oportet igitur in his ad tumefacta imponere pharmacum ex salicibus, ita ut adglutinari possit apparatus: aut ex aspidibus constat ad strumosos destinatum, aut aliquod consimile: præsertim quum sensus ægris adest iuxta coxendicem aut femur, tanquam aliquid ad inferiora deferatur: quumque dicunt se affici uelut formicas repentes sentiant, doletque, & iam refrigeratur, iam calescit membrum. Quin & lauantes per smegmata ex adarce, alcyonio, & pipere defricare oportet. Adstringentia igitur sunt simulque discussoria pharmaca, quibus necessario utimur ad crudos & dolētes tumores, uelut symphytum petraeum, terebinthi uirgulta, scolopendrium uiride, cyperos, & similia, de quibus sæpe dictum est, cum pane multo & rosaceo permixta, præsertim in his qui humido & albo corporis habitu sunt præditi. Ex compositis autem conuenit eis pharmacum ex succis quod cum uino flauo & subadstringente est emollitum, & Galeni phoenicium cum multo rosaceo liquefactum, & locis liquidius impositum. Cæterum in tumoribus citra dolorem conueniunt adiantum uiride, folia urticæ, altheæ, chamæmelum, uua passa pinguis, sertula campana, melissophillon, lauer, citri exterior cortex, & similia: Ad quæ singula cicerum & lupinorum farinæ, & panis, & olei ueteris ac sicyonij, & adipis suilli ueteris, tantum ammiscendum est, ut mollis ad tactū compositio reddatur, & morsum nullum ad membrum accedere permittat. Ex compositis autem pharmaci conueniunt his, id quod ex croco & galbano constat, & quod ex liquecibilibus apparatus, ac mox referetur: Et Machæronis, & Piscatoris, cū cerato ex oleo sicyonio aut aliquo consimili liquefacta. Atque hæc quidem in mollioribus corporibus adhibentur. In durioribus autem & quibus tumores non dolitant, conueniunt uiridis folia, præsertim arida, & amaracū, amarantum, ari & arisari radix, smyrnium, altheæ radix, elaphobosum, ericæ folia, foeniculi folia, filix, sisymbrium, scandix: erucæ folia & sinapis uiridis. Composita autem conueniunt tum prædicta citra cerati ammixtionem, tum Isis, & Aphrodite appellatæ, & alia infinita huiusmodi.

dem uiribus prædicta. Huiusmodi autem pharmaca una cum hoc quod tumores exoluunt, etiam fluxiones naturæ suæ aptitudine repellunt; Quod ipsum etiam probe faciunt cupressi pilulæ uirides cum uino cœctæ, prædictorum leguminum farinis & suillo adipe ammixtis, quandoq; uero & lauri ramuli, & rubi folia, & similia ammiscuntur. Efficaciora autem prædictis sunt, & agrestioribus corporibus ac tumoribus qui ægerissime cœcoquuntur conuenientissima, abrotonum, ammoniacum thymiana, anemonarum radices & hastulæ regiae, bryoniae radix, pulegiū, dracunculī radix, bdellium, bupthalmū, gentianæ radix, & myrobalanus. His autem adhuc fortiora sunt capparidis folia, glastum, betonica, cyclamini radix, brassicæ uisæ cinis, ruta, panaces uirides, peucedani radix, scilla, sici syluestris fructus, trifoliū asphaltites, trixago, sulphur, pix. Addatur autem singulis prædictis panis & adeps, aut prædictorum leguminū farinæ, quandoq; etiam caricæ. In quibus omnibus scopum tibi propositum habeas, ut citra partis affectæ combustionem & afflictionem curam facias: quapropter etiam necessaria est prædictarum farinarum, itemq; adipum admixtio. Tantum autem commiscere ex eis oportet, quantum uehementem uniuscuiusq; usum obrudere uolumus. Ammiscendus autem est non solum adeps suillus, sed & caprinus, & uitulinus, & taurinus, ceruinus & anserinus. Medullæ item omnes ammiscendæ habito naturæ curâ di corporis respectu. Et cochleæ unâ cum testis trite, & sine alterius rei admixtione, aut caprino stercore cum aceto trito ammixto impositæ, tumores laxos & molles destruunt, & adstringunt, qui sanè ex lentis & crassis humoribus oboriuntur. Porro operæ præcium duxi admonere, diligenti animaduersione opus esse, ne clām te indurata aliqua tumoris pars relinquatur, quod sanè ubi uideris factum; his quæ fortiter emollire possunt, uteris, respectu simul ad habitū corporis habito. Ex malagmatibus autem fortissimū est Lucio inscriptum ad articulos distortos.

Malagma diuersa, in quibus etiā Lucij malagma est, ad articulorū distortionem destinatū. Cap. xxi.
Malagma Lucij ad articulos distortos inscriptum, facit ad thoracis affectiones & abscessus in profundo, ad neruos contractos, & articulos stupore occupatos. Latini distortionem, & Græce ancylos appellamus. facit opisthotonicis, & ad omnem neruorum per cōsensum affectionem. Ad neruorum item lassitudinem acopon egregium est Irino aut cyprino dissolutum. Bdelliū, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; sextantem, opopanax, galbani, canchryos, thuris, styracis, cuiusq; drach. viii. piperris grana .l. x. ceræ sexuncem, terebinthinæ sexuncem, fecis unguētī Irini aut cyprini sextantem & unclæ dimidium, uini quantum sufficit. Ammoniacū, opopanax, thus, trito cum aceto, liquefabilia uero liquefacito, & ab igne ablatis sicca inspergito; deinde etiam trita ipsi adiecto, & uisita in mortarium diffundito, ac fortiter emollito, extrahitisq; utitur. Optimum est etiam eis ex pice brutia Galenicū pharmacū ad rabidi canis morsum descriptum. Habet autē hoc modo. Picis brutiæ libram. i. opopanax cis quadrantē, aceti acerrimi drach. i. apparatus quædam modū de rabidi canis morsu prædictū est, Sermone sexto. Aliud pharmacū ex liquefibilibus, Gale-

nicum, quod cœcoquit simul, & attenuat tumores. Quo sanè in mollibus corporibus uel solo utendū. In durioribus uero ammiscendum est ei id quod ex metallicis cōstat ad sauciatos neruos destinatū, ita ut mixtura ubilibet iuxta corporum & affectionū naturā fiat. Habet autē hoc modū. Opopanax unc. i. terebinthinæ chiæ unc. i. propolis teneræ quadrantem. Si uero propolis tenera non sit, admiscebis terebinthinæ tridentem; quod si neq; in totum propolis haberi possit, cōiuncto picis brutiæ sexuncem. Opopanax in aceto albo cœtere. Hoc pharmacum prædictos tumores cœcoquit, & humores in alto sitos adtrahit, dissecat, & repurgat. Cæterū quod ex metallicis constat, item Galenicum, ad sauciatos neruos destinatum, hoc modo habet. Chalcitidis, misyos, æruginis uisæ, cuiusq; drach. viii. colophonis bellem, squamæ æris drach. x. ceræ drachm. x. olei drach. o. x. viii. resinæ drach. xvi. galbani drach. xii. aceti quantum sufficit. Chalcitidis, misyos, æruginē, & cris squamā cum aceto in sole æstiuo contere ad plures horas, & liquefibilibus liquefactis, & affusis, uni, emolli, acutere. Aliud Galenicum. Ad eos qui tenerū corpus habent & neruis sauci sunt descriptū. Chalcitidis uisæ, misyos uisæ, cuiusq; drachm. viii. Squamæ æris drach. x. xii. thuris drachm. x. xii. ceræ drach. x. vi. olei drach. o. x. viii. resinæ drach. xvi. galbani drach. xii. aceti quod satis est. Apparatus ut dictum est. His itaq; pharmacis utemur per se, ubi dolores ex profundo dissoluere uelimus. Miscebimus autem pharmacū ex liquefibilibus cōstans, ubi tumores fuerint obdurati. Malagma ad podagricos & articulorū morbos ualde generosum. Liberat à tota affectione, usus eius est per exacerbationum interualla. Ceræ lib. i. terebinthinæ lib. i. spumæ nitri sexuncem, floris lapidis alij sexuncem. Thuris sexuncem, olei cyprini lib. i. lixiuū coactiliatiorum, siue pileariorum, quantum sufficit. Arida contundito, cribrato, & cum lixiuū ad liquidū cerati crassitudinē trito, & liquefabilia liquefacta tritis affundito, unito ac utitur. Aliud. Calcei uisæ, thuris, cuiusq; drach. i. terebinthinæ drach. i. ammoniaci thymiamatis drach. i. spumæ nitri drach. i. adipis taurini drach. i. floris lapidis alij drach. i. ceræ tridentē, olei tridentē. liquefabilia liquefacito, & cū siccis unito ac utitur. Valde præclarum est. Resorbet collectiones circa articulos congregatas, & à doloribus uindicat. Aliud, quod in totum ab omni affectione liberat. Seminis cicutæ, comæ cœtaureæ, iridis illyricæ, agaricī, cardamomi, foeni græci, corticis radicis mādregoræ, singulorū sextantē, terebinthinæ lib. i. olei ueteris sexuncē, unguētī syriaci, aut salca appellati, sexuncē. Terebinthinā cū oleo ueteri modice coquito, deinde unguētum addito, & ablata ab igne arida trita inspergito, & unito, emollitaq; in uas æreum aut stanneum reponito, uase tamen prius ex unguento malabathrino siue foliato illito. Hoc pharmacum crassos & mucosos humores trahit per obscuros meatus. Aliud ad eos qui à nascitæ articulare morbu cōtraxerunt. Vipere quibus genua, humeri, cubiti, & reliqui articuli dolent. Ceræ, colophonis, resinæ pinus, cuiusq; sexuncem, terebinthinæ unc. i. foeni græci sicci contusi & cribrati tridentē. Cyprini tridentem aut quantum satis est. Eliquatis liquefibilibus foenum græcū insperge, & utere.

& utere. Aliud Ceratum ad articulare morbum pulchrum. Cere, adipis porcini, colophonice, resine pinus, cuiuslibet lib. ii. butyri lib. i. terebinthine lib. i. galbani trientem, adipis taurini lib. ii. ocypti lib. i. Liquefac, percola & adserua. Vfus uero tempore unguento nardino dissolue aut etiam gleucino, & linteolo exceptum impone. Aliud ad articulorum morbum & podagricos, ut prae admiratione consterneris. Cerae drach. c. rosacei drach. c. c. foliorum sideritidis tenerorum drach. c. styracis drach. x. x. thuris drach. viii. niri drach. viii. manae drach. x. Liquefacta cum reliquis tritis unito, ac utitor. Sunt autem & alia quam plurima pharmaca quae tumores tollere possunt post inflammationes adhibita. Maxime uero omnium quod ex aspidibus constat ad strumas descriptum: facit ad eos quibus laxi tumores magnitudinem detrahare uolumus. Subuertit enim quam plurimum tumores laxos, itemque duos, eosque simul diffundit. Constringit autem & condensat articulos praeculare omnino si quod ex salicibus constat et ammisceatur. Ego autem, inquit Philagrius, penuria pharmacorum ex metallicis praescriptorum, id quod ex salicibus apparetur ammisceui & maximopere profeci articulis inde constrictis, densatisque accorroboratis, obfirmato uel delicti fluxionum humore prius euacuato. Licebit autem si quis rursus uiuat, & praedictis pharmacis careat, ex adipe qui ad manum sit, & arida pice cum resina pinus, aut etiam alia resina quae haberi possit, pharmacum in cerati formam apparare, ipsique chalcanti quantum uililiber recte habere uidebitur ammiscere: Salem item ac mysi, auripigmentum, & similia: Quin & uiscum & irin, aristolochias, praeoniam, peucedanum, gentianam, centauream, artemisiam, thymum, origanum, nitrum, niri spumam, thus, myrrham, styracem, propolin, mastichen, ac alia innumera his consimilia licebit reperire, indeque pharmaca tumores constringentia componere, quemadmodum nos fecimus non paucies communibus ad podagricos & articulorum morbos pharmacis inde apparatis. Philagrii pharmacum ex nitro & oleo. Nitrum accipito friabile & nihil calculosum in se habens, idque ipsum quam tenuissime terito, olei tantum ad ipsum in mortarium affundes quo trita simul ad mellis crassitudinem redigatur, atque ubi satis diu contriueris cacabo excepta, ad lentum ignem non summantem coquito, assidue agitando donec ad bonam compagem reducantur, animaduersione habita ne liquidius pharmacum relinquatur, quod ubi contigerit, pharmacum penitus liquidum euadit, & neque in posterum inspissatur, nisi multam aliam sustineat coctionem, quae uim eius sicciorum, & ob id affectis dolore membris inutilem reddit. Probare autem eius compagem tempore coctionis oportet, ad testam aridam ipsum destillando, testa non prius humectata, quemadmodum in alijs pharmacis facere solemus. Resoluitur enim nitrum per aquae contactum. Sic autem oleum quod nitro affunditur dulcissimum, tenuium partium aut rosaceum, aut chamamelinum, aut anethinum, aut uetus, aut cicinum, aut sicyonium. Quandoque etiam chamameli humidae siue aridae, aut iridis tenuissime tritae, aut aristolochiae, aut alicuius consimilis parte ammiscere prodest. Si quidem autem repellere simul ac discutere uelimus, aut etiam calidos dolores curare, cum rosaceo ipsum pharmacum coquemus, aceto quandoque in co-

ctione aut modico passo affuso. Si uero amplius discutere uelimus cum aliquo alio oleo coquemus, amixtis etiam quibusdam praescriptorum aridorum, iuxta habitum uidelicet curandi corporis & compagem ipsius tumoris. Hoc sane pharmacum dolores in alto obortos quam celerrime sanat, atque id eo magis si non biliosum sit, neque multum calidum quod influit. Neque uero solum podagricos dolores ex professo iuuat, uerum etiam eos qui tales non sunt, sed ex fluxionibus congregati & discussioni alias resistentes. Vtimur itaque ipso si post sedatas inflammationes dolores in alto permanent. Pharmacum ex urina Bordonis, hoc est, muli apparatus. Attrahit quidem hoc priore praestantius. Conuenit autem magis crassis & crudis fluxionibus, praesertim si cum chamamelo uiridi uel sola, uel cum adipe porcino recit, fuerint prius cataplasmati modo correctae: cum arida uero itidem eodem adipe ammixto, ampliusque farina fabacea, aqua & oleo ac modico passo adiectis. Quin & ipsa anthemis, quae & chamamelon dicitur, ualde calidos dolores & inflammationes maximopere ex natura sua iuuat, statim post uigorem adhibita. Etenim cutem rarefacit & attenuat moderate, & biliosos humores transpirare facit, adeo ut huiusmodi inflammationes etiam sola, nihil ex attenuatoribus & incisoribus, ueluti est artemisia, & aristolochia, & calaminthe, & alia infinita, admixtum habes, cures. Hoc itaque pharmacum ex argenti spuma & urina apparatus, de quo sane sermonem institui, scio quosdam circa totius affectionis uigorem, non modo iuxta particulares exacerbationes, aliquando uero & augmenti tempore, ad dolentes locos pro cataplasmate imposuisse, humoresque forinsecus extraxisse, & tumores quidem maiores reddidisse, dolores tamen omnino sedasse ac extirpasse. Ceterum odor ipsius intolerabilis est eis qui teneo olfactus sensu praediti sunt. Compositio uero talis est. Urinae muli masculi non castrati, sextarios Italicos iiii, spumae argenti lib. ii. Spumam argenti tenuissimam tritam in mortario habeto, eique urinam affundito, ad solem uidelicet aestiuum exposita paulatim urinam instillato, & postquam ad mellis spissitudinem peruenerit, urina scilicet consumpta, olei unc. x. x. iiii. addito, adipis porcini ueteris unc. x. vi. & usque quo non amplius inquinari manus, coquito. Vfus uero tempore linteolo exceptum imposito. Oribasius autem axungiae lib. i. coiecit, & medullae ceruiniae non salsae bessem, & mellis lib. iiii, reliqua uero eodem modo. Scribunt porro quidam propriam muli urinam accipiendam esse. Resistit enim & obluatur morbo ex natura sua hoc animal. Efficacius autem, aiunt, reddetur, si quis dum coquitur ipsa semel in cacabum expuat, & semel in terram. Atque haec cum quibusdam barbaris nominibus inuenire licet adscripta, quae sane curiosam penitus habent scripturam, atque ob id superfluum & indecorum mihi uisum est, inquit Philagrius, ea adscribere. Etenim citra eorum nominum intentionem ac nomenclaturam, ipsum pharmacum apparatus, eodem modo, efficax est, sicut id quod cum nominibus praeparatur. Hippione Philagrii. Hippione uero hoc modo apparatus. Anethi uiridis unc. x. vi. scille recitis sex uncem, olei omphacini septuncem ac uncie dimidium, aquae sextarios iiii. Anethum & scilla in aqua & oleo ad triduum macerato, deinde donec aqua consumatur coquito, & percolato oleo cerae nouae lib. ii. adiecto medullae ceruiniae libram i. aut si haec non adsit, adipis

adipis ceruini libram unam, adparato & utitor.

Cerata podagrica.

Cap. XLIII.

Ceratum ex succo senecionis ualde pulchrum. Ceræ libram unam, olei chamæmelini dodrantem, adipis porcini recētis sexuncem, croci drachmas quatuor. Crocum cum succo senecionis terito, liquefabilia autem liquefacto, percolato, & succi quantum expedit paulatim instillato, fortiterque agitato, atque ubi refrixerint, ad crocum tritum adiuncto, & subacta unito, ac utitor. Ceratum dolorem leuans, ad inflammationes in uigore constitutas. Appellatur autem Manus Asclepiadæ. Facit ad excellenter inflammata, eadem hora liberans citra dilationē. Succus hastulæ regię cyathos IIII. succi solani cyath. IIII. succi bupthalmi cyath. IIII. succi perdicij cyat. IIII. ceræ, butyri recentis, axungię, medullæ uitulinæ, calcis uiuæ, cuiusq; quadrantem, terræ cimoliæ drach. XII. terræ samię drach. XII. sandarachæ drach. XII. nitri bernicarij, spumę nitri, cuiusq; drach. XII. fecis uini ustæ drach. XII. glutinis chartarum, hoc est polli nis cocti, drach. XII. olei boni lib. III. appara & utere. Aliud ad præscripta item efficax. Ceræ, colophonis, adipis anserini, cerusæ, cuiusque drach. XVI. picis drach. IIII. succi brassicæ, cyathi dimidium, succi foeni græci cyathi dimidium, succi seminis lini cyathi dimidium succi stratiotæ cyathi dimidium, succi ferulæ campanæ cyathi dimidiū, lactis bubuli cyathi dimidium, oua gallinarum numero IIII. olei libras II. Ex his cerata duo facto, eaq; unā cum eis quę Aegyptia inscribuntur, in promptu habeto, quę pauci adeo homines habent, apparato confidenter, nulliq; reuelato, & plus quam hominis nomen assequeris. Podagricum aliud ceratum approbatissimum. Facit ad inflammationes & dolores, etiam in principijs impositum celerrime sanat, & nervos arefactos emollit, adeo ut quidam ei hanc facultatem inesse non credant, dissoluit & pedum nodulos tumores condylomata Græcis appellata. Olei cicini lib. II. succi mandragoræ, drach. XXXII. succi artemisiæ, drach. XXIII. succi rumicis, drach. XXIII. resinæ pinus, drachmas XLVIII. terebinthinæ, drach. XLVIII. adipis anserini, drach. XLVIII. succi rubi, drach. XVI. butyri recentis drach. XLVIII. lycij indici drach. XXIII. sanguinis hircini sicci drach. XVI. lacrymæ hederę drachmas XXXII. galbani drachmas XLVIII. opopanacis drachmas XXXII. Lycium & sanguinē hircinum & panacis succum cum modico uino terito, & affusis succis, si quidē liquidi affuerint, aut siccis, si illi haberi nequeant, unito, liquefabilia autem liquefacto, eisq; trita adiuncto, & ad lentū ignem coquito, spathula assidue agitando donec cogatur. Cæterum ligna quę ad coctionem eorum suburuntur, arida uicis sarmēta esse oportet. Ceratū podagricum ex bryonia. Egrege facit ad omnes inflammationes & dolores articulorū. Hucus & in uigore & in remissione successum & gloriam reperit. Reperies enim inflamas partes corrugatas & citra dolorem. Frequenti experimento nobis cognitum est: nam multos eo seruauimus. Radicis cucumeris syluestris drachmas cccclxvi. scillę mundæ drachmas cccclxxx. radicis hastulæ regię drachmas cxlvi. olei raphanini drachmas cccclxxvii. ceræ drachmas cxlvi. galbani drachmas XLVIII. Herbas omnes in aqua sufficienti per triduum ma-

defacito, singulis diebus bis ipsas sensim agitando. Deinde affuso oleo, coquito, donec oleum solum relinquitur ad lentum omnino ignem, percolato deinde, & ceram ac galbanum in mortario diligenter trita & emollita addito. Quibus omnibus postremū liquefactis, & ab igne ablati utitor ad omnes doloris affectiones. Hoc etiam ad uiscerū diuturnas inflammationes sum usus. Ceratum in multis approbatum, ad inflammationes pedum, discutiens citra dolorem. Vtere eo in uigoribus, & magis in declinationibus. Olei anechini quincuncem, chamæmelini quincuncē, butyri quincuncē, adipis anserini quadrantē, farinæ lupinorū sextantē & dimidiū uncias. Liquefacto & agitando refrigerato, in mortariūq; infundito, terito, & ouorum quinq; crocea singulatim inijcto. Deinde & lupinorum farinam inspergito, unito, utitor. Ceratū Iacobi Psychristę, ad feruētes pedū inflammationes. Ceræ albæ sexuncē, rosacei recētis unc. xv. ouorum quinq; candida, aquæ septuncem & uncias dimidiū. Ceratum ad prunas liquefacto, & diligenter agitando refrigerato, deinde in mortarium fundito, & adiectis singulatim ouorum candidis terito, postremū instillata sensim aqua omnia rite unito, & noua olla sufficienter prælota excipito, & infusa aqua pura finito, quotidie aquā permutando.

Vnguenta ex acopa diuersa ad podagricos, articulorum dolores, ischiadicos, membris exolutos, & trementes.

Cap. XLIII.

Vnguentum Asclepiadæ. Facit podagricis, articulorum doloribus, & ad omnem neruorum per consensum affectionem. Vini ueteris sextarios duos, lanarum succidarum ex locis sub alis libram unam, spumæ nitri libram unā. Lanas succidas in uino per triduum madefacito, deinde expresso liquore spumam nitri tenuissime tritam inijcto, dissolutoque, ac olei libras duas addito, & coquassata in uitreum uas reponito, & utitor, quotidie agitando & ex eo illi niens locos affectos a somno, & ante balneum, & post balneum, & a coena. Aliud unguentum ex sale podagricos a tota affectione liberat. Salis sordidi, hoc est ipsius terræ libram unam, aluminis scissi libram unam, fecis uini ueteris sextarium unum, floris lapidis asij trientem. Arida sigillatim unumquodque per se diligēter terito, deinde etiā fecē adiuncto, simulq; terito, & ad trita demū olei ueteris sextarios duos affundito, coquassato, reponito, ac utitor. Quidā etiā mellis librā unam addunt. Aliud idē Asclepiadę. Thuris quadratē, ammoniaci thymiamatis, zingiberis, piperis, salis sordidi, floris lapidis asij, aluminis scissi, cuiusque uncias unā, galbani unciam unā, opopanacis sesquunciam, terebinthinæ quadrantē, olei cyprini, laurini, samfucini, & ceræ, singulorū sexuncē, aceti quantum satis est ad ea quę dissoluere oportet. Vtere in frigidioribus. Aliud optimum.

Spumā nitri albā cum oleo ueteri terito, eaq; locos affricato, & miraberis. Aliud, Asclepiadę. Vini ueteris sextarios tres, olei ueteris sextarios duos, uirgultorum lauri libram unam, foliorum tenerorū aut pilularū cupressi teneriorum libram unam, ceræ libram unam, galbani unciam unam, sanguinis testudinis terrestris satis largam copiam. Herbas in aceto macerato, deinde coquito, & ad decoctum liquefacta reliqua addito ac unito, & sanguinem testu

testudinis recentis affuso coquassato, & utitur. Olei gleucini præparatio. Oleum gleucinum dolores & lassitudines nervorum quam maxime sedans. Habet enim vim calefactoriam relaxantem: facit ad affectiones uulvæ, & ad omnem nervorum per consensum affectionem. Facit ad rigores per circuitum repetentes, quotidianæ præsertim & quartanæ febris. Omni enim acopo præstantius est. Maxime autem facit ad eos qui tum retro, tum ante distenduntur, opisthotonicos & emprosthotonicos Græcis appellatos, si calidum puris lanis exceptum locis imponatur. Compositio eius hoc modo habet. Olei omphacini primarij libras ccc. vini falerni veteris odorati sextarios quinquaginta italicos; musti ex uva amineæ, hoc est adstringente alba sextarios italicos centum quinquaginta, olei libras duodecim, aspalathi libras quinque, spathæ unguentariæ quam palmam elaten appellant, libras quinque, hedyari hoc est seminis pelecini sesquilibram, artemisiæ libras duas & semissem, cyperi libras duas & semissem, piperis sesquilibram, musci qui splanchnon & hypnō & bryō Græcis appellatur, libras duas & semissem, xylobalsami libras duas & semissem, asari libras duas & semissem, cassiæ nigræ libras duas & semissem, carpobalsami, foenigræ, cuiusque lib. ii. & semissem, foliorū myrti aridorū dextantem, rosmarini sicci lib. v. calami aromatici libras quinque, iunci odorati floris libras quinque, thuris libras quinque, crocomagmatis primarij libras, quinque, nardi celebici libras quinque, zingiberis libras tres, quidam uero libram unam & quadrantem, aristolochiæ longæ libram unam & quadrantem, styracis pinguis libram unam & quadrantem, cassiæ fulvæ libram unam & quadrantem, ladanī, seminis cardamomi, amomi, radicis panacis, melilothi, samfuci, cuiusque libram unam & quadrantem, bdelli sesquilibram, croci libram i. & bessē, costi libram unam & bessē, rosarum siccarum libram unam & quadrantem, opobalsami uascula parva quinque, hoc est bessē, hoc est hemine tertias partes duas, unguenti malabathrini libram unam. Arida contundito, & rariore cribro excusito, omniaque uino ueteri macerato. Bdellium autem & ladanum præmacerata in pila terito, & ad arida prius macerata adijcito. Sit autem uas unguentarium staneum, quod diligenter opertum ad dies & noctes duas finito. Deinde uam flaccidam, ita ut nihil roris ei adhæreat accipito, ac pure exprimito, & ex acinis excolato, inque aliud uas stano illustratum ipsum mustum infundito. Sit autem magnum uas & capax: quo etiam ad ebullitionem musti locus amplius supersit. Deinde omnia in ueteri uino macerata, itemque oleum ipsum in mustum inijcito, & spatha unguentaria bis per diem agitato, uerum spatham diligenter detergere oportet, ne quod adheret ei acidū factum pharmacum corrumpat. Cæterum uas ipsum operculo & pallijs pluribus superne contegatur, & diligenter obligetur, supponaturque uasi circulus ex quacunque materia qui ipsum sustentet. Quum uero dies quindecim præterierint, amomū cotusum inijciatur, rufumque ut dictū est agitur. Trigesima autem die in diplomate coquito, atque ubi ter uel quater efferbuerint ab igne ablatis statim opobalsamū indito, agitataque & probe cōrecta tepescerit finito. Deinde totū oleū testa excipito: secem autem,

hoc est calida per sportulas primū manibus, postea etiā prelo exprimito, & abiectis rebus instar fœni exiccatis, unguentum per se curato: malabathrinum uidelicet unguenti in diplomate in aqua calida prætefactū ei adijcito, & cū spatha agitato, & probe unito, & per biduum consistere finito, ac mūdīs testulis excipito: indeque in uasa uitrea transferens reponito. Quidā etiā ammoniaci thymiamatis lib. i. & quadrantē adijciunt. Acopon ex abiete apparatus.

Abietis semē maxime maturū circa Septembrem est mensem. Verū quocunque anni tempore libuerit, ipsum semen oleo inijcere oportet: præstat tamen si prius contusum inijcias, & per dies quadraginta sinas. Nos autem, inquit Galenus, etiā ad tres & quatuor menses permisimus macerari: deinde liquore seminis expresso, ipsum quidē semen abiecimus, oleū uero per linteolum excolauimus. Sit autem oleum dulcissimū, & ad libras olei uiginti quinque, seminis modius italicus unus inijciatur. Itaque ubi oleum, ut dictū est, excolaueris, ac semen segregaueris, ceræ libras iii. terebinthinæ chiæ bessē ei adijcito, & modice quo uniatur calefacito, excipito ac utitur. Hoc pharmacum cōuenientissimum est ad omnes spontaneas lassitudines, itemque nō spontaneas, & ad nervorum per consensum affectiones. Eo uti conuenit ad eos qui iuxta carnem atque omnem corporis molem crudos humores congregant, siue concoctione, siue discussione opus habeant. Acopon ex populo nigra. Bonum est etiam acopum, quod ex populi nigræ floribus componitur. Est que huiusmodi. Ad florum populi nigræ iam iam prodeuntium modium unum, olei dulcissimi libras uiginti inijciuntur. Melius tamen fuerit, si flos moderate contusus oleo inijciatur. Exponatur autem ad solē, & singulis diebus agitur, & in domum calidā deponatur. Post menses autem tres florem exprimito, ipsumque abiectito. Oleum uero ut acrimoniam arcens, & lenissimū, & discussorium adseruato: ueluti id quod ex abietis semine est apparatus. At uero & terebinthinæ sexuncem inijcere licet, aut minus, aliquando item parum ceræ. quidam enim maxime liquidorum medicaminum usu gaudent, quidam uero crassiorum. Hæc autem pharmaca crudos iuxta carnē & cutem humores discutere possunt, præsertim non ualde crassos, neque uiscosos. Quod si quis confestim & necessitate moram omnem excludente apparare cogatur, semē ipsum in oleum conijcere oportet, & in diplomate coquere. Infundere autē ad oleū in decoquendo tantū aquæ aut uini, quātū cōsumi potest, ut tamē quadruplū aut quintuplū oleum extet. Oleū samfucinū Sāfucinū etiam oleum eodē modo apparatus. Cōuenit autē tēpore hyberno, & in regione frigida, & cōstitutione aëris frigida. Potest & ad hoc ceræ & resinæ quippiā addi, si corporibus ex eo illitis, diutius ipsum adhærere uelis. Acopon unguentum Marcaton. Unguentū Marcaton præclarū ad articulorū morbos & corporis lāguores ac resolutiones. Styracis primarij flauī trientē: medullæ ceruinæ sextantem, ceræ albiſsimæ quadrantē, mastiches puræ quadrantem, terebinthinæ chiæ unc. i. œgypti uiciam i. opobalsami unc. i. olei omphacini, unguenti nardini cuiusque sexuncem, Styracem in pila cōtunde, opobalsamo paulatim instillato. deinde liqueſcibilia liquefacito & percolato, eisque styracē inijcito: quo lique

quò liquefacto in mortarium omnia transfero, & pistillo donec quam albidissimū fiat terito, ac utitor.

Vnguentum Orchestæ, siue Saltatoris, dolores remittens ac relaxans, ischiadicis ac arthriticis commodum, multo experimento cognitum. Hoc Saltator quum gymnasiarum consuetudinem reliquisset, & in articulare morbum incidisset, usus sanatus est. Cuius item periculum in multis alijs factum est.

Habet autem hoc modo. Altheæ, seminis lini, foenigræci, rutæ, fabæ, singulorum libr. II. Hæc in aqua madefacta, & terdo die post cocta, ut quam crassissimus eorū liquor fiat, percolato: & succi quidam excolati lib. III. cōiuncto, olei uero ueteris, medullæ ceruinæ, opobalsami, adipis anserini, unguentū nardini, singulorum libras duas, ceræ colophonizæ, & resinæ pinus, singulorum libras III. euphorbii, opopanacis, terebinthinæ, singulorum libr. I. castorei sexuncem, addito, ac utitor confidenter. Penamæron, hoc est quinquimembre unguentum.

Syracis unciam unam, mastiches sextantem, ceræ albæ quadrantem, opobalsami tridentem, unguentū nardini quincuncem. Ceram cū nardino super prunas liquefacito, syracem uero cum opobalsamo terito, & ad ceratum unā cum mastiche iniuncto. Liquefacta percolato, ac in mortario diligenter terito, donec quam albidissima fiant. Utitor. Decamæron, hoc est decumanum, Oribasi. Spicæ nardi, folij, euphorbii, piperis, costi, adarces, singulorum unciam unam, mastiches sesquunciam, opobalsami quadrantem, ceræ sexuncem, unguentū nardini libram unā.

Alia uaria unguenta. Vnguentum ad morbum articulare, & omnem neruorum per consensum affectionem, approbatum. Syracis pinguis unciam unam, ladanij pinguis unciam unam, mastiches unciam unam, ceræ sextantem, olei sicyonii quadrantem, adipis anserini libram unam, utitor. Aliud mirabile. Asphodeli radicem in superficie derasam accipito, & cōtusam cum oleo sufficiente coquito, percolato, & ad oleū modicū syracis cōiuncto, quo eliquato sycomori succum addito, & unitis utitor. pedes autē si inde illeueris, confestim dolorē sedabis. Aliud, per multā experientiam cōstans, celerime dolores mitigans. Adipis hircini recentis libr. II. heliotropij tria grana habēis foliorum uiridum librā I. ouorū assatorū lutea quinque, rosacei optimi tridentem. Viere. Aliud. Olei dulcis sextarios V. foenigræci sextarios IIII, radicū altheæ, maxime uiridū, uerbenacæ foliorum, singulorū fasciculū manipularē, galbanī dra. IIII. scenū græcū mundatū & lotum cū uerbenaca & althea ad biduum in aqua madefacto. tertia uero die infusum oleū ad lentū ignē coquito, assidueq; agitato, ne scenum græcum adhærescat cacabo. postquam uero herbæ omnem liquorē emiserint, eas extrahito, ac oleum percolato, seorsim uero cū modica olei parte galbanum præmolitum liquefacito, percolato, & ad reliquum oleum adiuncto. Utitor sensim & quam plurimum inungendo. facit ad omnem neruorum per cōsensum affectionem, & dolores à frigore obortos. Aliud ad idē. Medullæ e medio scillæ quadrantem, seminis cucumeris syluestris quadrantem, foenigræci repurgati sextarium italicum I. anethi uiridis sexuncem, farnaculi sextarium italicum I. baccarum lauri sextarium I. fertulæ campanæ lib. I. ceræ lib. I. bulborum ciba-

riorum quadrantem, adipis porcini recentis libr. X. uini ueteris odorati sextarios VI. Omnia in uino ad triduum præmacerato, & deinde adipe liquefacto ad macerata infuso, omnia ad uini consumptionem coquito, exprimito, ac percolato: & reliquis abiectis, ceram ad adipem liquefacito ac ammisceto: atq; hoc ipso, ut præter opinionē præstati utitor. Smegma podagricum. Ceræ sexuncē, colophonizæ sexuncem, succi seminis lini tridentem, adipis anserini sextantem, terebinthinæ quadrantem & unciæ dimidium, olei omphacini sextantem, ammoniaci thymiamatis unciam unam, thuris quadrantem, lactis bubuli quadrantem & uncizæ dimidium, candida ouorum nouem, Ammoniacum, & thus, cum lacte & succo seminis lini terito, deinde candida ouorum adiuncto: liquefabilia autem liquefacito & refrigerato, atq; ad trita ammisceto, & pyxide lignea excipito. Utitor autē cum pro emplastro, tum pro unguento. Vnguentum Castini, ad podagricos & arthriticos, eo sanauit quendam uniuerso corpore languefactum & exolutum, unice tamen articularū morbo prodest. Adipis leonini unc. I. adipis ursini lib. I. adipis equini lib. I. adipis uulpis lib. I. castorei sextantē, medullæ taurinæ sexuncē, medullæ ceruinæ quadrantem, adipis struthocameli quadrantem, adipis phasiani saginati quadrantem, euphorbii sexuncē, opopanacis tridentē, mastiches lib. I. syracis tridentem, myrrhæ tridentem, thuris sexuncem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, heliotropij tria grana habentis unc. I. pæoniæ sextantē, artemisiæ unc. I. phylli sextantē, nardi celidicæ sextantē, radicis altheæ cōtusæ & cribratæ unc. I. rutæ uiridis dra. IIII. radicis cucumeris syluestris unciam unam, hippuris herbæ unciam unā, aristolochiæ dra. IIII. aloës lib. I. sanguinis draconculi libram unam, ceræ sexuncē, colophonizæ sexuncem, unguentū nardini libras octo, olei suffumigabilis libram unam, opobalsami septuncem. Arida quam tenuissime trita in mortarium ad syracem cū opobalsamo & ruta tritum indito, unito, ac utitor sedulo. Vnguentum ex hedera, ad arthriticos, ac omnem musculorum aut neruorum per consensum affectionem. Mirabiliter etiam ischiadicis prodest.

Fordi græci lib. I. baccarum lauri numero centū, pilularum cupressi numero XX. sabinæ lib. I. rosmarini lib. I. olei dulcis aut ueteris lib. I. ceræ lib. I. resinæ pinus lib. I. terebinthinæ sexuncem, succi hederæ tridentem, aquæ sextar. III. Herbas in crassiores partes contusas ad triduum in aqua macerato, deinde adiecto oleo sufficienter coquito, & percolato, liquefabiliaq; liquefacta adfundito. Hederæ autem succū cum aceto diluito. Refrigeratis deinde liquefactis omnia in mortarium diffundito, & quam plurimū diligenter terito, reponito, ac utitor. Acopon ad molestias ex laboribus & fatigationibus obortas, facit & ad neruorum per consensum affectiones, uehementer cōmodum est. Hoc utitor, inquit Asclepiades ad fatigatos. Samsucini sextarium I. rosmarini cōtusi sextarium I. foenigræci sextarium I. cardamomi sextarij dimidium, sabinæ sextarij dimidiū, uini dulcis sextarios VI. olei optimi sextarios IIII. ceræ lib. I. Arida in uinum coniecta per triduum macerato, deinde affuso oleo ad prunas assidue agitando coquito, & quum sæpe ebullierint percolato, ceræq; in eis eliquato, refrigerato, reponito ac utitor, quan-

doq; quidem immixtio, aliquādo uero cū quodam unguēto diluto & liquefacto. Aliud arthriticum, Asclepiadē; pharmacum prosperi successus, Basso in scribitur, quo usus quū antea multo tēpore paralyticus fuisset, ab illa affectiōe liberatus cōualuit. Olei melini, olei cyprini, olei myrtel, cuiusq; trientē, olei ueteris sesquiliāram, cerę librā i. terebinthinę sex uncē, galbani quadrantē, mannę trientē, opopanaxi sextantē, castorij sextantem, radicis bryonię trientem, æruginis sextantē, spumę nitrī albę trientē, piperis sextantē, pyretri sextantē, euphorbię sextantē, adipis hœdini sexuncem, aceti quantū satis est. Bryoniā & pyretrū cum aceto coquito & percolato, coq; de cocto arida terito, & reliqua liquefacta eis infundito, ac unito. Vtitor aliquando immixto, aliquādo liquefacto cum quopiā unguēto. Anthi uiride acopon, ad podagricos & arthriticos multo experimēto cognitū, utere & ad ischiadicos cōfidenter. Phu sesquiunciam, mannę sesquiūclā, cæsypī sesquiunciam, ammoniaci thymiamatis sextantem, aluminis scissi drachm. v. æruginis dra. v. terebinthinę quincuncē, spumę nitrī albę trientem, opopanaxi drach. v. galbani drach. ii. medullę ceruinę drach. v. olei cyprini trientem, olei melini trientē, cerę quincuncē, mellis quincuncem, olei ueteris lib. i. Aeruginē, ammoniacū, alumen, mannā, opopanaxa, cum modico aceto tere, eisq; liquefacta affunde, ac utere ad omnes cū oleo melino eliquato: In inueteratis uero affectiōnibus etiā adarces & euphorbię, cuiusq; unc. i. adde.

Aliud eiusdem. Opopanaxi quadrantem & drach. iiii. terebinthinę drach. iiii. ammoniaci thymiamatis scrupulos x. v. cæsypī scrupul. x. vii. æruginis scrup. x. vi. propolis scrup. x. v. aluminis scissi, ladanī, aristolochię rotundę, lacrymę hederę, singulorū scrup. vi. spumę argenti scrup. iiii. salis ammoniaci scrup. ii. camphorę unc. i. colophonię quadrantem, cerę quadrantem, olei quadrantem, utere cum unguēto quopiā dissoluto. Aliud acopō unguentum ad paralyticos in principio. Olei gleucini, cyprini, irini, laurini, singulorum libram unā, cerę trientem, terebinthinę sextantem, cæsypī sextantem, castorij unc. i. euphorbię drachm. iiii. ex hoc tū affectę partes, tum eę quę facili affectiōni obnoxie fiunt, illinuntur. Aliud acopon ad coxendicum morbum inueteratum, distortionē & resolutiones paralyticas. Est autem, inquit Asclepiades, ualde effi-
cax. Olei ueteris libras ii. irini sexuncem, styracini sexuncem, baccarum lauri sexuncem, terebinthinę, euphorbię, ammoniaci thymiamatis, castorij, piperis, opopanaxi, galbani, cuiusq; sextantē, medullę ceruinę trientē, & drach. iiii. Liquefabilia liquefacto, & ad arida affundito, unito, ac utitor. Aliquādo quidē immixto, quādoq; uero cum rosaceo aut alio quopiā unguēto liquefacto. Arida uero uinō teruntur. Unguentū ad opisthotonicos, & quibus canino more os distorquetur, ex melle apparatus. Olei irini, rosacel, gleucini, cyprini, cuiusq; sexuncem, cerę quadrantem, mellis unciam unam. Aliud, ad eadem. Cerę drachmas quinquaginta, terebinthinę drachmas x. v. cæsypī, medullę ceruinę, galbani, ammoniaci thymiamatis, spumę nitrī albę, baccarum lauri aridarum, singulorum drachmas vi. olei ueteris sextarios sex, uini heminam unam, Vtitor. Unguentum ad resolutiones, ualde pulchrum,

Sphæritidis, hoc est, cupressi pilulas ferentis sextantem, marrubij sextantem, herbę caucalidis quę bulborum figuram habet sextantem, stercorum camelli unciam unam, ampeloprasii unciam unam, cryngij unciam unam, cyclamini unciam unam, bituminis unciam unam, peucedani drachmas quatuor, terrę ampelitis unciam unam, seminis apij, cyperi, lapidis gagatę, dictamni, cuiusque unciam unam, sulphuris drach. iiii. lactis asinini sextantem, unguenti fusini quadrantem, medullę cameli quadrantem, adipis asinini unciam unam, pilorū ex cauda simię drach. iiii. olei ueteris sextantem, aceti dodrantem. Apparatum reponito: usus uero tempore cum unguento aliquo diluto utitor. Acopon Erę Cappadocię, ad resolutos, & in uniuersum ad omnem dolorem musculorum & neruorum. Rutę uiridis, pulegię, cyperi, scenigręci, mercurialis, marrubij, rosamarinī, aristolochię, amygdalarum amararum repurgatarum, singulorum libram unam, nitrī sextantem, iridis terebinthinę, baccarum lauri, radicis cucumeris syluestris, ammoniaci thymiamatis, sabinię cuiusque libras duas, myrti uiridis libras tres, foliorum lauri aridorū libras tres, ueratri albi sexuncē, cerę libras duas, bdellij libras quatuor, uini cōgios quatuor, olei cōgios tres. Quę contusione opus habent, crassas in partes contundito, ac modicam aquā, qua cōtusa tantum humectentur, affundito, deinde uinum & oleum adiuncto, & per diem unum finito. Sequenti uero frequenter agitando coquito ac percolato. Postremum ceram & terebinthinam addito, itemq; bdellium in modico uino prius tritū. Acopon ex rubetis quod omnem affectiōnem tollit. Radicis cucumeris agrestis uiridis libras sex, olei dulcis libras sex, medullę ceruinę, terebinthinę, cerę, cuiusq; sexuncem, ranas rubetas appellatas uiuas numero sex, rubetas traiceto per pedis plātam filo in oleū demissas donec flaccescāt, coquimus: deinde extractis per plantas filo traiectis ranis, syluestris cucumeris radicē uiridē cōcisam iniicimus, atq; donec uires suas in oleum transmittat, coquimus & excolamus: postremum liquefacta, iidem percolata, ad oleum addimus, & in vitro reponimus. Vtere mane & uespere ad podagricos, arthriticos, ischiadicos & resolutos. Per huius usum nouimus homines a podagra & chiragra toto corpore distortos post lauerum in tantum conualuisse, ut citra omnem offensionem obambulant. Quādoq; apparauimus, inquit Asclepiades, hoc pharmacum additis ad hanc descriptionem famisud libra una, unguenti crocini libra una, opobalsami quadrante, sanguine testudinū numero decem. Aliud, ad podagram & articulationem morbum mirabile. Facit & ad diuturnum capitis dolorem, materiam ad superficiem ducens, & ad frontem ac sinciput. Caniculam paruam probe saginatam uiuam, & mustelam uiuā in olei sextarios nouem, ac butyri libras tres, coniuncto, atq; donec uicta fiant animalia coquito: deinde in percolatum oleum calidum pedes aut manus per totam diem imponito. Galenus autem ait. Quidam uulpeculas & hyenas oleo incoquunt, coq; articularum morbos curant, atque alij quidē ipsas uiuas in maximum lebetem iniiciunt; alij uero mortuas, ac deinde unā cū oleo quā diutissimē coquunt. Solia deinde ac urnas ex oleo calido explent, atque deinde arthriticos

ricos inscendere, ac multo tempore in eo morari su-
bent. Porro oleum hoc maxime discussorium reddi-
tur, adeo ut etiam ad superficiem extrahat ea quæ in
profundo corporum continentur, quæ ex re magna
commoditas consequitur. Quin & herinacei terre-
stres uiui oleo incocti ipsum discussorium reddunt.
Etenim oleum hoc dolores sedat, tum affectis articu-
lis in ipsum demissis, tum etiam in eodem ex eo illitis.

Alia unguenta podagrica. Terram nigram, quæ
præsertim in lenticula reperitur, aut etiam aliam ni-
grā cū aceto terito, ac illinito. Sedat dolores & inflā-
mationes etiam in his qui multa prius experti nihil
profecerunt. Aliud, Cypri folia uiridia trita in
pastillos redigito, eosq; usu expetente cum aceto te-
rito ac illinito. Aliud. Croci unciam unam, salis
usti unciam unam, spumas nitri numero decem, oul-
luteum unius in spinæ decocto ad tertias redacto, te-
rito. Aliud. Vitrum in aceto probè tritū confidē-
ter illinito. Aliud. Alumen aceto tritum illini-
to. Aliud, quod ad genuum fluxionē solum pro-
fuit, mulis antea frustra admotis. Marmor, hoc est,
crustulam non ustam, contusam, & cum rosaceo tri-
tam illinito. Ego autem scobem & ramenta marmo-
ris lota & resiccata in promptu habui. Vsu uero ex-
petente cū rosaceo trita adhibui. Aliud, ualde bo-
num. Tecolithi, glauci, myrrhæ, cuiusque unciam
i. aloës drachm. iiii. Terito, ac siccum adseruato.
Vsu uero exigente, luteum oul & uinum austerum
ammisceto ac illinito, & si circumtendat cum so-
lo uino adhibeto. Aliud. Aëthen lapidem cum
ouo ac modico rosaceo illinito. Aliud. Vriticæ
semen & hirundinis nidum cum sapa terito ac illi-
nito. Aliud mirabile, pro diuitibus. Mameram
aqua macerato, deinde tritam illinito, & miraberis.

Aliud, multa experientia cognitum, inueteratæ
etiam affectioni accommodatum. Stercoris dco-
niæ quadrantem, cum pari axungia tritam illinito.
Vtere, inquit, neq; cuiuspiam patefacto. Multos enim
seruauit. Aliud. Caninū stercus albū cum aqua
calida tritū, atq; ita tepesactū quā crassissimè illini-
to, & folia oleris alicuius supra illidonē imponito.

Ad durities in artubus instar toforum. Cap. xlv.

Est & hoc optimum pharmacum ad durities artuum
in tofos coactas. Sunt præterea & alia quædam, ma-
ximè uero Galenicum, quod ex caseo componitur.
Ac nostrum iudē ex huiuscemodi rebus apparatus,
inquit Philagrius. Radicis peucedani drachmas ii.
ammoniaci thymiamatis drachmas ii. myrrhæ dra-
xxiii. aristolochiæ drachmas vi. pumidis drach-
mas vi. castorij drachmas iiii. lanarum succidarum
ustarum drachmas viii. floris lapidis asij drachmas
sex, si uero non adsit, salis ammoniaci usti drachmas
sex, propolis teneræ drachmas sedecim, stercoris ca-
nini sicci drachmas sex, uisci drachmas sedecim, æru-
ginis drachmas sedecim, squamæ eris drachmas xvi.
atramenti sutorij drachmas sex, misyos drachmas
sex, ceræ drachmas centum, resinæ pinus drachmas
c. l. picis drachmas c. l. olei ueteris quantum sufficit,
aceri quod satis est. Hoc quidem igitur nostrum
pharmacum spissitudine auctum, & imminutum ac
liquefactum prout probè habere uidebitur, iuxta
curandorum corporum differentias, extrahit ac eij-
cit tofos in artubus coactos. Aliud Galenicum,
quod omnibus ferè corporibus adhibitur cōgruit.

Est autem tale: Caseus bubulus uetustissimus,
adeo ut ob acrimoniā edī non possit, cū porcina car-
nis inueteratæ ac salse decocto teritur, & probè emol-
litus ad durities artuum imponitur. Est & aliud ab
eodem cōpositum. Pinguetinis pernae porcinae ue-
teris libram unā, casei caprini uetustissimi librā i. adi-
pis taurini libram unā, apochymatis, hoc est, resinæ
cū cera ex nauigijs derafæ liquefactæ libram unam,
medullæ ceruinæ bessem, hyssopi quadrantem, cypri-
ni sex uncem, uini Aegyptij hemina dimidiū. Lique-
scibilia liquefacito, & reliqua ammisceto. Aliter
apparatu emplastrum ex perna. Iusculi pernae ue-
teris porcinae libram unam, cæsypii trientem, ammo-
niaci thymiamatis librā unam, medullæ ceruinæ ses-
quuncem, adipis taurini libram unam, ceræ sex un-
cem, apochymatis è nauibus derafi sesquilibram, cy-
prini libram unam, casei caprini ueteris libram unā,
opopanacis unc. i. Aliud, ad tofos artuum. Gra-
num cnidium desquamatum internum, cū myrrha
& aceto terito ac illinito, usque ad excessum mirabi-
le est. Aliud, ad durities artuum muliebrium, &
eorum qui teneras carnes habent, experimēto cogni-
tum. Cadmiā quam tenuissimè tritam ac myr-
reo cerato exceptam imponito. Aliud. Spumā
nitri cum oleo ueteri & modico croco ac aceto tri-
tam illinito. Præstat tamen si nitri spūma cum croco
& aceto teratur, & cum cerato liquido illinatur.

Aliud, ad tofos pedum, quod contentum perrum-
pit & euacuat eadē ferme hora, sanatq; idem ut ne ci-
catix quidem relinquatur. Mala mandragoræ ac-
cipito, semēq; euacuato, ac tenuissimā squamam eis
obductam detrahito, atq; carnem ipsam probè terito.
Et ceratū ex adipe suillo & cera factū adfundito,
unito, ac utitor. Hæc tria pari pondere sumuntur, aut
adipis plus additur. Vtere, experimento constat.

Aliud. Calcem uluam, & nitrum, pari pondere
axungia excipito ac imponito. Aliud. Dioscori-
dis. Ammoniacum cum pice arida ad ignē emolli-
tum imponito. Aliud. Styracem cum seluni ho-
minis salua emollicum imponito; hoc est, mandu-
cando attritum adhibeto. Facti & sesamum non lo-
sum tritum impositum.

De medicamentis purgatiuis ad articulare mor-
bum accommodatis. Cap. xlv.

Quum plurima sint & uaria medicamenta purgantia
a nobis in tertio huius tractationis Sermonē tradi-
ta: inde sanè repetere oportet quod cuiq; sit accom-
modatum. Propriè tamen in podagricis & morbo
articulari hæc exhibetur. Vniuersale ex hermoda-
ctylis, quo assidue utor. Hermodactyli sicci recen-
tis unciam i. anisi, cumini, pipperis cōmunis, croci, pi-
pperis lōgi, seminis cnici interni cuiusq; scrup. ii. myr-
rhæ dra. i. euphorbij recentis scrup. iiii. mastiches
scrup. vi. casia scrup. i. moschi siliquam unam. Dan-
tur ex eo scrupul. iiii. cum aqua multa, confestim
minuit dolores. Quandoquidē autem huiuscemodi
medicamenta fortem euacuationem facere non pos-
sunt: & quod ex ipsis intus relinquitur, condensatū
& resiccātū tofos in artubus generare consuevit: cō-
uenit usus tēpore ad singulos exhibitionis modos
scammoniæ siliquas tres addere. In pituitosis uero la-
chyridas numero v. & agarici scrupul. i. Si uero hu-
moribus redūdet eger, post dolores sublato cū rur-
sus cū hiera aut alio forti purgatiuo, temperamneto

corporis apto, purgato. Aliud purgatiuū podagri cum, ad dōlore affectos præclarū. Calsiæ scrup. i. euphorbiæ sesquiscrupulū, iij, hoc est, chamæleonis nigri scrup. iij. radiciis alypiadis, hoc est, chamælaeæ scrup. iij. radiciis pæoniæ scrupulos iij. anisi, zingiberis, cumini, mastiches, floris enici, piperis, cuiusq; scrup. viij. hermodactyli sextāte. Datur ex eo scrup. iij. cū uino mulso. Antidotus purgatoria ex betonica finiens febrē. Facit summē ad podagricos, ter in mēse data: facit ad elephāticos & hydropicos, maxime aqua subter cutem laborantes. Est ex ualde laudatis, Comæ absinthij drach. xxiij. betonicae drachmas xxiij. seminis rutæ syluestris drac. xvi. centaureæ minoris drach. xvi. calsiæ drach. xxiij. cordicis ueratri nigri drachmas viij. contundito, cribrato, ac cochlearis unius mensura dato ex aqua calida, animaduersione habita ne pharmacum ultra modū purget: est enim inexuperabile. Apud alios etiā laudatum reperi, si gentianæ & chamæpitios, ac aristolochiæ longæ, cuiusq; drachmæ viij. addantur, chamædryos item drachmæ xxiij. Omnia, inquit, hæc melle excipio, indeq; ad summum cochlearium unū exhibeo.

Antidoti podagrica.

Cap. XLVII.

Pharmaca quæ podagricis & morbo articulari correptis per os exhibentur, plurima quidem sunt & uaria ac diuersa. Cognita itaq; à me ipsorum multitudinē, tum eo quod tetrapharmacū, à quatuor rebus ipsum constituentibus appellatur, tum quod ex hyperico cōstat, itemq; quod ex gentiana paratur, & similibus, quibus pro consuetudine Medici ad simpliciter podagricos utuntur: ipse sanē propriū pharmacū composui, inquit Philagrius, quale iudicauī sufficienter exalfacere posse, non tamen expers facultatis moderatē humectandi, & attenuandi crassos ac uiscosos humores, & quod præclare ominino potest excretionū usas dilatare, unā cū hoc quod uisū subducendę alui & mouēdę urīnę complectitur. Quin & naturales actiones excitat, & transpirationem in sensilem ac obscurā procurat. Compositio autem hæc est. Radiciis pæoniæ recentis drac. i. croci cilicij drach. iij. rhei pondici drachmas iij. calaminthæ montanæ, comæ saluię, cacuminum stœchadis, seminis thlaspeos, epithymi, centaureæ maioris radiciis, cuiusq; drac. iij. centaureæ minoris succi drac. iij. succum accipito, quū in summo uigore herba est ac floribus prægnās. iridis illyrica, seminis rutæ syluestris, piperis longi, seminis anethi, cuiusq; drac. iij. ligustici, seminis apij, petroselinī macedonici, seselis marsiliensis incorrupti, origani, cacuminum thymi, seminis trifolij bitumen olentis, seminis cardamomi medulla priuati, seminis dauci, piperis albi, cuiusq; drac. iij. mel athamaticū drac. ii. asari drach. ii. spicæ nardi, adiati, calsiæ, polypodij, thuris, galbani puri, terebinthinæ chiæ, bdellij scythici nigri, pinguis, ac resinosi, ammoniaci thymisamaris, cuiusq; drac. vi. radiciis symphyti recentis siccae, sabinae, radiciis rubiæ, helenij, agarici, herbæ scordij, seminis paliuri, sarxiphagi, betonicae, radiciis cyclamini siccae, seminis uicicis tostī, cuiusq; drachm. viij. mastiches chiæ, radiciis bryoniæ recentis siccae, terræ lemniæ quæ sphragis appellatur, opobalsami, cuiusq; drachm. xvi. succi peucedani, drach. xvi. qui si non adsit, conijciendæ sagapeni drachm. viij. & radiciis peucedan-

ni recentis siccae drachm. xvi. pastilli theriaci drach. xvi. habeant autem pastilli carniū partes duas, panis partem unam: compositio autē ipsorum in Ser-mone de theriaca dicta est: styracis siquidem adsit calamitæ, si uero non, flauī & pinguis drach. xxiij. niger enim ut uiciosus reprobandus est: aristolochiæ rotundæ non rugosæ & plenæ drach. l. osium ceruinorum aut bubulorum ex furis recentium, & ut probē conteri queant, ustorum drach. l. mellisatici despumati quātum satis est, quo ad bonam eclegmatē cōpagem pharmacum reducatur. Arida omnia contundito & cribrato: mastichem autem & thus unūquodq; per se sensim, ne in latas crustulas abeat, terito & cribrato, deinde prædictum pondus ex eis expendito, & reliquis aridis tritis ammisceto. Bdel-lium autem & ammoniacum ac galbanum & peucedani succum aut sagapeni, in mortarium coniecta tundito, deinde ad ignem emollito, & postea cum modico melle liquefacito, & in pila optimē terito. Similiter autem & terebinthinam per se cum modico melle dissolutam ad reliqua in pilam conijcito. Styracem uero in mortario constanter tundito, opobalsamo paulatim ad eum infuso ac melle calido, deinde similiter in pila terito. Expedi etiam cū modico melle styracem liquefacere ac deinde terere. Cæterum ubi hæc sufficienter fuerint unita & dissoluta, paulatim arida trita addito: melle itidem sensim affuso. Ad finem uero centaureę succum per se cum opobalsamo terito ac reliquis unito. His uero omnibus probē commisisis, mellis despumati tantum addatur, quantum suffecerit ad pharmacum delingibile futurum, & quo per dulcorem ægro commendetur. Quare si gustu pharmacū iudicaueris, nihil peccaris, etiā si piperis augeas modū. Noui namq; ego ipse quendam qui eo usus plus sibi de pipere ammiscere iussit, itaq; ammiscui sæpe tantum ex ipso post reliquorum omnium mixturam, quantum quisq; pro gustus sui modo expetiuit. Satis uero manifestum est, quod quando quidem præseruare aliquem à podagrico malo uelimus, tunc sanē plurimum piperis inijcere nō ab re est, & præsertim in hyeme, & si humores frigidi fuerint ac diuturni. Porro centaureæ succus tempore ueris, quum in uigore herba est ac florem fert, ex ea uiridi ac contusa exprimitur, deinde percolatus, usque ad mellis solidioris spissitudinem in sole resiccatur. Cæterum in compositione pharmaci, si is qui eo usus est amaris delectetur, amplius quàm drachmas quatuor ex succo centaureæ ammiscere expediat, atque id maxime si distorcionem dissoluere uelimus, si uero æger amara uerfetur, quatuor omnino succi drachmas inijcere oportet. Ex hac uero antidoto ad eclegmatē cōpagem redacta ad summum cochlearium i. exhibetur. Dupliciter insuper pharmacū hoc apparatus. Vno quidem modo pastillis theriacis, ut dictum est, ammiscis, itemq; osibus uitis. Alio autem modo citra pastillorum & osium admixtionem præparatur. Licet etiam si quis uelit post sufficientem mellis mixturam, mel ipsum in duas ex æquo partes diuidere, deinde ad unam partem, dimidium præscripti ponderis, tum pastillorum theriacorum, tum osium ustorum infarcire: est autem dimidia pars pastillorum theriacorum drachmarum viij. Osium uero ustorum dimidia pars est drach. xxv. Quandoquidem uero

de uero pastillos theriacos impossibile est per se con-
tundi, si non cum alijs aridis tundantur, oportet eos
quantum possibile est in mortario tundere, ac modico
uino ueteri dulci madefacere, deinde in pila tere-
re ac cum largo melle dissolvere, atque demum ad re-
liquam mixturam diligenter coaptare. Cæterum
quum humectare oportet & mollires, attenuare &
crassa dissecare, repurgare item ac euacuare infartos
humores, itæque uias dilatare, nihil ex pastillis theria-
cis, neque ex ossium cinere ammiscere oportet. Vipe-
rarum enim caro quam celerrimè ad cutem ac super-
ficiem digerit ac distribui solet. Quapropter ubi re-
crementorum copia adfuerit, & uiae fuerint obtura-
tae, minimè tutò uiperarum caro exhibetur: sed po-
stea quum coniectauerimus humores attenuatos esse,
& dilatatas uias. Ossium uero substantia facultatè ha-
bet consumendi ac resiccandi, adeò ut etiam sola assi-
ducè & opportunè exhibita inueteratum articulare
morbum curet. Vt uero ne quid ex humoribus resic-
cetur ac lapidescat, incurabile & aut ægrè medicabile
reddatur, tempore præseruationis eam minimè mi-
scebimus, sed postea, si ita uidebitur. Consumit enim
& resiccatur humores in ipsis articulis iuncturis re-
lictos. Forinsecus etiam quādo discutere animus est,
pharmacum hoc oleo ueteri aut sicyonio dilutū ma-
ximopere profuit, maximè si citra ossium additio-
nem est apparatus. Tunc enim non modo discussio-
riam, sed etiam coactoriam facultatè acquirit. Qua-
re eis qui non discussione solum, sed & exterarum
corporis partium corroboracione opus habent, cō-
modissimè hoc modo adhibetur. Hoc pharmaco si
& arthriticis & podagricis medebis, minimè pœ-
nitueris. Hepaticos item ex obturatione affectos,
itemque splenicis curabis, & à uipera morsos, & qui
uenenum hauserunt, & comitiali morbo apprehen-
sos, si eo opportunè utaris: quin & aliorum morbo-
rum per ipsum curationem fieri reperias sufficientē,
de quibus sermonem producere minimè operæ pre-
cium existimo. Theriaca itè ex uiperis, quæ An-
dromacho inscripta est, de qua plurima tradidit Ga-
lenus, utiliter exhibetur frigidioribus & magis hu-
meatis corporibus, forinsecus etiam cōmodè illini-
tur cum oleo ueteri aut sicyonio dissoluta, ut dictū
est. Sales quoque Theriaci, & ex gentiana pastillus, &
qui ex hyperico constat, & similia, his qui ex multo
& crasso fluxu ægrotant, utilia existunt. Verum his
qui ex biliosa fluxione afficiuntur, & ut simpliciter
dicā, omnibus calidiori temperamento præditis hæc
ipsa nocentissima sunt, & quod supra relatum est no-
strum pharmacū. Ex horū enim pharmacorū potu
non solum nihil opis ferunt hi qui calidiori tempera-
tura præditi sunt, sed & resolutionibus immedicabi-
libus apprehenduntur, sæpe nimium resiccant, & in ultio-
sos humores dilabuntur qui eos erodunt, & in quibus
aliquādo pessimè intereunt. Porro in huiusmo-
di pharmacorū usu etiam raritatem & densitatē cu-
randi corporis respicere oportet: ampliusque & æta-
tem, & anni tempus, & regionē. Ad hæc itaque respei-
ctu habito minus aut plus de eo dabis, neque uero mi-
nus & ad magnitudinem aut paruitatem corporis
respiciendum. De uiperarum esu. Viperarū esus
omnibus podagricis & arthriticis plurimum cōmo-
ditatis affert, quemadmodū etiam anhelosis, & ele-
phantiasi correptis: exigit enim per cutem omnia re-

dundantia recremēta, siue calida siue frigida fuerint,
quæ morbi ipsius sunt causa. Oportet autem crassa
& uiscosa ex ipsis prius attenuare ac euacuare: quod
ubi factū est, reliqua faciliè per uiperarum esum eua-
cuantur, nimirum ad cutem delata atque exclusa. Qua-
propter etiam in sole ipsarum ferarum comestione
facere iubet, utpote quod inde iuuentur, atque uel calo-
ris humorum delatio foras feratur: curandum tamē
ne caput probè cōtegere ab æstu negligamus. Opor-
tet autem recens captas esse uiperas, & iustæ magni-
tudinis, & non ex maritimis: tales enim sordulosæ
existunt. Cæterum ex uipera ipsa tum caput, tum
caudam amputare oportet, itemque interanea omnia
abijcere, ac ex tribus aquis lauare, deinde cum aqua
& anetho maximè uiridi, & modici cōgruentis oleo
coquere, & post sufficientem coctionem congruenti
sale condire, ac uiperam ueluti anguillam comeden-
dam exhibere. Porro quidam ex harum comestio-
ne plurimum exudant, & pediculorum copiam ge-
nerant. Omnes tamen qui eas comederunt, maximè
se alleuatos sentiunt. Quapropter his qui corpus re-
crementis exundans habent, etiam bis ac ter in anno
exhibere conducti: bis quidem ueris tempore, semel
autem in autumno. Quod si uero sint quibus cor-
pus per insensibilem & obscuram trāspirationem,
aut etiam per sudores naturales euacuetur, his omni-
no uiperarum esu interdiciemus. Periculosa enim sit
huiusmodi ipsarum comestio propter immodicam
per cutem exhalationem. Dicemus autem ex ordine
& de alijs antidotis. Antidotus ex quatuor rebus
constans. Tetrpharmacum igitur ex quatuor re-
bus apparatus, & à quibusdā Mysterium appella-
tum, ex gentiana componitur & aristolochia, baccis
lauri, & myrrha, æquali pondere coniectis. Datur
autem singulis diebus ex ea cochlearij dimidium ex
aqua calida ad præseruationem. Prodest pituitosis:
biliosos autem lædit. Antidotus ex hyperico.

Antidotus ex hyperico à quibusdam hoc modo
descripta est. Antidotus sanans podagras, coxendi-
cum morbum, & ut in uniuersum dicam, omnes sū-
cturarū & articulorum morbis implicatos per an-
num potata. Firmat stomachum, & uisum acutiorē
reddit. reliquosque item sensus clariores & illustrio-
res facit: euacuans leniter per urinam: unde etiā neque
aliud ullum membrū offensionem sensit. Neque enim
materiā ex affectis locis ad aliam corporis regionē
depellit, quemadmodum epithemata forinsecus con-
trahentia & cohibentia facere solent: sed causas mor-
borum tum per uesciæ, tum per alui locos expellit,
atque uniuersum corpus sanius reddit. Quare etiam
comitiali correptis morbo, auxiliatur in potu. Alios item à diuturnis & uehementer grauibz capi-
tis doloribus liberauit, qui etiam de sanitate sua iam
desperauerant. Splenem uero & hepar in scirrhum
indurata moderatur ac demulcet. Articulare au-
tem morbum adeò efficaciter sanat, ut etiam durici-
es instar roforum in articulis quibusdam per uim
morbi coactas dissoluat. Compositio autem hoc
modo habet: Trixaginis dodrantem, centaureæ bes-
sem, aristolochiæ rotundæ septuncem, radicis gen-
tianæ sexuncem, comæ hyperici quincuncem, petro-
selini trientem, mei athamantici quadrantem, phu-
pontici sextantem, agarici sextantem. Mellis despu-
mad lib. iiii. Hoc autem modo parato. Vnumquod-

que per se contundito & cribrato: deinde ponderata simul misceto, ac rursus cribrato, quo accurata permixtio fiat. Deinde melli despumato ammisceto, ac pastillos formato pondere drachmæ 1. atq; ex eis unum pro uice exhibeto. Vfus eius est circa tertiam horam diei, ubi uenter onus suum pro consuetudine deposuit: pharmacum uero ipsum cum aquæ calidæ sesquicyatho liquefacito. Oportet autem eum qui bibit, si nihil prohibeat, deambulare, quo ex motu euntis pharmacum inferna cōtingat. Porro pharmacum hoc aliàs quidem præclare efficax est, utpote ex fortibus simplicibus compositum: amplius autem efficacius redditur per aristolochiam, quæ natura sua articularibus morbis auxiliari solet, & duris corporibus in primis proudest. Ex cancris autem pharmacum etiam mollibus corporibus cōducit. Habet autem Antidotus ex cancris compositio hoc modo. Cancrorum magnorum uluorum ustorum in creto uase, trientem, gentianæ incorruptæ quincuncem. Thuris integri & non secti albi unc. 1. Datur inde cochlearium unum. Ad cancrorum uero exustionē ligna uitis aduruntur. Pharmacum ex fluuiatibus cæcis uitis. Describā porro & aliud pharmacū corporibus recrementis abundantibus & mollibus cōducens: est autē id quod à rabido cane morsus datur, cuius cōpositionem in Sermone de rabidi canis morfu tradidimus, huius inquit operis sexto. Adieci autem ego, inquit Philagrius, ad huius pharmaci apparatus, etiam petroselinū drachm. viii. ut plurimum uero x. quo urinae clendæ uim acquirat. & multos sanē arthriticos luuit, præsertim quibus tenerum & album corpus fuit, mediocris mystri mensura ex eo data, aliquādo ex aqua sola, aliquando ex aqua mulsa. Quin & melle despumato sæpe ipsum excepi, quo ualidum & citra transpirationem adseruarem, deinde uero uelut prædictum est, bibendū exhibui.

Antidotus ex centaureis. Antidotus podagrica ex duobus centaureæ generibus est, ex uehementer laudatis & præter opinionem auxiliantibus, quod ipsum experientia testatur. Nam multos eius usu seruos noui. Est enim adeo salutaris podagricis, ut quosdā per x. annos podagra correptos, eius usus ad iter pedibus faciendum præparauerit. Est autem stomacho grata, aluo conferens, & urinam ciens. Habet autem hoc modo. Centaureæ minoris comæ, cætaureæ maioris radicis, trixaginis, gentianæ, aristolochiæ rotundæ, singulorum æquale pondus, puta lib. 1. cōtundito & cribrato, & drach. 1. præbeto per dies x. ex aqua calida. In sequentibus autē ex ordine anni diebus ccccxxv. drachmæ dimidium eodē modo præbe. Alia antidotus podagrica usu cognita. Anisi, cumini Aethiopici, piperis communis, piperis longi, seminis enici interioris, culusq; drach. 11. euphorbi drach. 1111. mastiches drac. vi. myrrhæ drachm. 1111. moschi siliquam unam, caudæ scinci unius extremū. Mellis quantū satis est. Datur nucis auellanæ magnitudine ex aqua mulsa. Hac amiscus quispiā usus bis in hebdomade ex ipsa bibendū præbuit, & affectos locos ex uiridi unguento Anatho inscripto cū rosaceo aut melino singulis diebus illeuit, multosq; seruauit. Antidotus podagrica experimento constans, accipitur per annum, Anastasij. Agarici unc. 1. rhei un. 1. petroselinū sextantem, phu sesquunciam, gentianæ quadrantem, hyperici sextā-

tem & uncia dimidiū, cætaureæ unc. 1. Aristolochiæ longæ sesquunciam, & rotundæ quadrantē & uncia dimidiū, chamædryos trientē & uncia dimidiū, cinamomi un. 1. folij unc. 1. aloës primariæ unc. 1. mei sextantē, aut spicæ nardi duplū. Alia antidotus podagrica experimēto cognita, datur per annum. Doari Episcopi. Agarici un. 1. rhei Barbarici unc. 1. petroselinū sextantē, phu sesquunciam, gentianæ quadrantē, hyperici sextantem & uncia dimidium, centaureæ trientem, mei sextantem, aut spicæ nardi trientem.

Qui podagrici lauādi sint & quomodo. Cap. xlviii. Manifestum quidem existimo quod post inflammationem remissionē omnibus podagricis balneum cōmodissimum existit, quandoq; autem & in uigore utiliter adhibetur, si æger prurigne aut uigiliis uexetur, aut aliàs labore sit fatigatus. Lauare autem oportet tempore remissionis, ita ut spongas aceto & sale permixtis madefactas locis affectis circūponamus, ut à fluxione immunes permaneant. Amplius autē linteis siccis & plurimo nitro totū corpus pficare, & ut aëri diutius immoretur iubere, & moderate nō solum calidā, sed frigidā adhibere, & in ipsarū solijs desidere. Vtile autē est balneū natura siccioribus, & gracilibus, & colore nigrioribus, & qui à tumore in totum sunt liberati. In huiusmodi enim affecta particula nō intumescit adeo magno tumore excitato, uerū distrahī, uelut à cane apprehensas, in profundo sitas corporis partes aiunt, & inopinabili tensione distēdi. Et inhorrescunt sæpe, pellicula quæ os ambit, à fluxione salsa aut acri & tenui ualde ac erodēte uellicata. Hi à balneis opē sentiūt, quapropter nō semel tantū, sed iterū atq; iterum os lauare oportet, & in aëre per omnia moderato, citra aliquā pinguedinem adhibitam immorari, hoc enim modo magis euacuabūtur. Deinde oleo dulci cū aqua cōquassato illitos in aquā calidā demittere, & in eo aliquandiu morari præcipere. In frigidam uero minimē demittatur, nisi immodici caloris sensus infestet. Vt plurimū uero tepida aut lactei tēperamenti aqua perfundatur in prima balnei domo. Si uero cum tumore quodā nō ualde magno post euacuationes subito aliqui dolore uexentur, conueniet in aëre balnei reliquū corpus per sicca linteia usq; ad rubefactionē perfricare. Vtendū autem & exterforijs smegmatis ex adarce, nitro, pipere, euphorbio, staphide agresti, æquali pōdere cōiectis, apparatus. Atq; his quidem reliquū corpus contentē defrictū excitetur: pedes uero eorū muria moderate perfundēdi sunt, & in calida aqua nō morandū, frigida uero ne cōtingēda quiddē. Quod si balneum nō adsit, eos qui ab acrioribus fluxionibus uellicantur, aqua dulcissima calida perfusos fouere oportet, & totū corpus ex oleo chamæmelino in ieiunio illinire: alios uero temperamento non calidos, & qui tamen tumore habeant post euacuationes relictum, si balneum non adsit, cucurbitulis admotis curabimus, initio à lumbis facto, sursum usq; ad scapulas progrediendo, fricabimus etiā per sicca linteola & per exterforia smegmata iam dicta. A talibus enim hi tum in balneo, tum citra balneū opem sentiunt. quale & hoc est ex profundo humores euocās ac trāsferens, quod metasyncritico Græci uocant. Eo itaq; in balneo urantur, aut si balneū non admittat, post exercitia ex eo defricetur, deinde spongijs extergatur id quod ex hac arida inspersio-

ne corporibus adhæret. Cōpositio eius hæc est. Nitri rubri lib. i. sinapis sicci lib. ii. sabinae lib. ii. uera-
tri albi lib. i. sulphuris utui lib. i. Aliud Andreæ co-
mittis. Nitri, ueratri nigri, piperis æqualibus parti-
tibus utere. Præter opinionem autē eis cōducit. Siccum
Magnum ipsi affectis locis in balneo insper-
sum. Estq; hoc. Recremēti siue scorix ferri, spumæ
nitri albæ, culusque æquales partes misce, & odoris
gratia parum folij & costi adde. Siccum quod psi-
lothro podagricorū inspergitur. Mastiches, thuris,
lapidis asij, pumicis assati, alcyonij, staphidis agre-
stis, cimolix, ueratri albi, samfud, spumæ argenti,
amylī, careophyllī, spicæ nardi, cyperi, floris iuncti
odorati, buglosi, singul. lib. i. auripigmenti unc. x.
sandarachæ unc. x. saponis quantū satis est. Prædi-
cta omnia, excepto auripigmento, sandaracha & sa-
pone, cōtundito, cribrato, & sicca in promptu habe-
to. Vfus uero tempore calcis uiuæ unc. x. in oryzae
aut prisanæ succo dissoluito, & auripigmenti unc. i.
sandarachæ unc. i. saponis drac. iiii. & prædicti sic-
ci cochlearia ii. magna, omnia quā tenuissimē tri-
ta inspergito, ac unito, eorū pedes aut etiam alios lo-

cos fluxione infestatos illinito. Cæterū qui hoc sic-
co inspergimine utūtur, hoc modo dictam suam in-
stituant. Thoth, hoc est, septembri, lac & edant & bi-
bant. Phaophi, hoc est, octobri, allia edant. Athyr,
hoc est, nouembri, in totum nō lauent. Choiac, hoc
est, decembri, brassicam ne edāt. Tybi, id est, ianua-
rio, mane meracum bibāt. Mechir, id est, februario,
betam ne edant. Phamenoth, hoc est, martio, dulcia
tum in cibo, tum in potu sumant. Pharmuthi, id est,
aprili, raphanū ne gustent. Pachon, id est, maio, po-
lypum ne edant. Pauni, hoc est, iunio, mane frigidā
aquam sumant. Epiphi, hoc est, iulio, a ueneris absti-
neant. Mesori, id est, augusto, malū ne edant. Siccum
Maloriani. Aluminis scissi sextantem, pumicis
unc. i. terito & in ulcro reponito. Vfu uero expe-
tēte, uino adstringēte locos praelauato, & quodam-
modo extergito, ac siccū ipsum inspergito, tenerisq;
manibus affricato, & siccati finito. Rursusq; idem
per diem octies facto, & toties similiter si possibile
sit in nocte, & uidebis tumores quā celerrimē dis-
cussos & resolutos. Ego utriusq; & aluminis & pu-
micis æquale pondus cōlect, & magis sanē succelsit.

F I N I S.

I N D E X E O R V M Q V A E I N

D E C I M O T E R T I O S E R M O N E A E T I I
C O N T I N E N T V R.D E his qui ab homine morfi sunt.
cap. i.De his quos canis momordit. cap. ii.
Ad leonum, pantherarum, ac ursorum
morsus. cap. iiii.

De suum morsu. cap. iiii.

De his qui a fele morfi sunt. cap. v.

De morsis a crocodilo. cap. vi.

De bestiis uirus eiadantibus, & pri-
mum quibus artibus adhibitis ea tol-
lantur. cap. vii.

Illitiones præseruatiue. cap. viii.

Quæ apposita uenenata animalia oc-
cidant. cap. ix.Communia remedia ad omnes uene-
num iaculantium ferarum plagas. ca-
put x.

De uespis & apibus. cap. xi.

Ad stellionis morsum. cap. xii.

Ad salamandræ morsum & lacertæ chal-
cidæ. cap. xiii.

De mure aranco. cap. xiiii.

Ad scolopendræ plagam. cap. xv.

Ad araneæ ictum. cap. xvi.

De tetragnathis. cap. xvii.

De percussis a phalangio. cap. xviii.

De his quos scorpio percussit. caput
xix.

De morsis ab aspidē. cap. xx.

De uiperæ maris & scæminæ morsu. ca-
put xxi.

De dipsadē. cap. xxii.

De hamorrho & hamorrhoidē. ca-
put xxiii.Præparatio sanguinis testudinis mari-
næ & usus. cap. xxiiii.

De ammodyte aut cœchria. cap. xxv.

De sepe. cap. xxvi.

De cenchrite siue Acontio. caput
xxvii.

De ceraste. cap. xxviii.

De dryino. cap. xxix.

De amphishænæ & scytalæ. cap. xxx.

De pareæ & spathiuro. cap. xxxi.

De peliade & elape. cap. xxxii.

De basilisco. cap. xxxiii.

De draconibus. cap. xxxiiii.

De chersydro. cap. xxxv.

De rana rubetæ. cap. xxxvi.

De turturæ seu pastinacæ marinæ. ca-
put xxxvii.

De murenæ. cap. xxxviii.

De dracone marino. cap. xxxix.

De scorpio marino. cap. xl.

De culicibus. cap. xli.

De muscis. cap. xlii.

Ad pulices. cap. xliii.

Ad cimices. cap. xliiii.

De uenenis. cap. xlv.

Methodus præseruatiua ne quis a ue-
nenoso pharmaco ledatur. caput
xlvi.Quomodo cognoscantur qui uenenum
sumpserunt. cap. xlvii.Communia remedia & cura omnis ue-
neni. cap. xlviii.Ad eos qui cantharidas hauserunt. ca-
put xlix.

De buprestis. cap. l.

De eruca pinis. cap. li.

De salamandræ. cap. lii.

De lepore marino. cap. liii.

De rana rubetæ. cap. liiii.

De rana palustri. cap. lv.

De hirudinibus. cap. lvi.

De ephemero. cap. lvii.

De dorycniq; aut solano furioso. caput
lviii.

De aconito. cap. lix.

De melle quod in Heraclea ponti na-
scitur. cap. lx.

De coriandro. cap. lxi.

De psyllio. cap. lxii.

De cicuta. cap. lxiii.

De smilace. cap. lxiiii.

De succo carpasi. cap. lxv.

De herba sardonis. cap. lxvi.

De hyoscyamo. cap. lxvii.

De mandragora. cap. lxviii.

De succo papaueris. cap. lxix.

De toxica. cap. lxx.

De his qui ixian hauserunt. cap. lxxi.

De chameleone. cap. lxxii.

De fungis. cap. lxxiii.

De sanguine tauri. cap. lxxiiii.

De lacte in grumos coacto. ca. lxxv.

De gypso. cap. lxxvi.

De cerusa. cap. lxxvii.

De argenti spuma. cap. lxxviii.

De argento uiuo. cap. lxxix.

De calce, sandaracha, & auripigmen-
to. cap. lxxx.De thapsia, ueratro, elaterio, & aga-
rico. cap. lxxxxi.De ruta syluestris & melanthij. no-
cumen

cumentis. cap. LXXXII.	De Antidoti Mithridatica usu. cap. C.	ces. cap. CXIX.
De acervato frigida aqua potu. caput LXXXIII.	Antidotus Esdrae aut Prophetae doctoris. cap. CI.	De Elephantiasi, ex libris Archigenis. cap. CXX.
De strangulatis. cap. LXXXIII.	Antidotus pæonia. cap. CII.	Cura elephantiasi affectorum. caput CXXI.
De his qui ex alto ceciderunt. caput LXXXV.	Antidotus aromatica optima, Galli. cap. CIII.	De his qui castrantur. cap. CXXII.
De preservantibus & presagis animilibus. cap. LXXXVI.	Antidotus ex duobus piperis generibus. cap. CIII.	De uiperarum esu, & de pruritibus. Archigenis. cap. CXXIII.
De theriaca ex uiperis Andromachi. cap. LXXXVII.	Antidotus Athanasia. cap. CV.	Illitiones ad tumentes corporis eminentias. cap. CXXIII.
Pastillorum scilliticorum preparatio. cap. LXXXVIII.	Oribasij theriaca qua Marcus Imperator usus est. cap. CVI.	Dieta Elephantiasi correptorum. caput CXXV.
Hedychroi confectio. cap. LXXXIX.	Oribasij theriaca ex Bryonia. caput CVII.	De pruritu, Archigenis. cap. CXXVI.
Pastillorum theriacorum preparatio. cap. XC.	Antidotus Hadriani. cap. CVIII.	Ad pruriginosas papularum eruptiones. cap. CXXVII.
De reliquis quæ in antidotum coniunguntur. cap. XCI.	Antidotus Acharistus. cap. CIX.	Ad pustulas psyracæ Græcis appellatas, & ad papulas ex feruore aut sudore obortas. cap. CXXVIII.
Modus conficiendi. cap. XCII.	Philagrii Antidotus ex sulphure uiuo. caput CX.	Oribasij ad nigras cicatrices inalbandas. cap. CXXIX.
Post quantum tempus ea sit utendum. cap. XCIII.	Theriaca Democratis. cap. CXI.	Ad ulcerosas papularum eruptiones, tum in tibis, tum in toto crure obortas. cap. CXXX.
Quanto tempore efficax sit. caput XCIII.	Antidotus Theodoretus ex anacardijs. cap. CXII.	Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas. cap. CXXXI.
Modus probandi theriacen. cap. XCV.	Theodoretus aliter apparatus. caput CXIII.	De Vitilagine seu alphi. caput CXXXII.
De exhibitionis mensura, & utendi modo, & quibus conueniat morbis. caput XCVI.	Theodoretus per acetum mulsum apparatus. cap. CXIII.	De leuce vitilagine altius insidente, Galeni. cap. CXXXIII.
Sales Theriaci ex libris Martiani, cū quibus cōsentit Galenus. ca. XCVII.	Picra siue amara per acetum mulsum apparatus, Oribasij. cap. CXV.	De lepra, Archigenis. cap. CXXXIII.
Antidotus Mithridatica. cap. XCVIII.	Cyphi ex rebus XXXVI. cap. CXVI.	
Confectio Cypheas. cap. XCIX.	Cyphi ex rebus XXVIII. cap. CXVII.	
	Musuaphij confectio. cap. CXVIII.	
	Thymiana siue suffimentum Berenices.	

AETII MEDICI GRAE

CI CONTRACTAE EX VETERIBVS MEDICINAE TETRABIBLI SIVE QUATERNIONIS

QUARTI SERMO PRIMVS, ET
EX ORDINE XIII.

De noxiorum animalium morfu, & de bestiis uirus eiacularibus. Et de Elephantiasi, pruritu, scabie, alphi, lepra, leuce. Et de antidotis multa utilitatis.

De his qui ab homine morfi sunt. Cap. I.



De noxiorum animalium morfibus scribere auspices, initium ab his qui ab homine morfi sunt faciemus, ut Archigenes inquit, in his igitur quos homo momordit, loco ex oleo praelito, sceniculi radicem tritam cum melle cataplasmatem modo ulcere imponito usque quo repurgetur, deinde his quæ explere possunt utitor. Cuius generis & hocce est. Mellis, terebinthine, buryri, adipis anserini, medullæ cerui, aut si non adsit, uittuli, æqualibus partibus liquefactis utitor. Si uero sinus statim in principio fiat, cum aqua mulsa diligenter eluto, & spongiam nouam Aphricanā melle cocto imbutam imponito, & ligamento quod ad sinus referetur obligato, ac tertio die soluito. Aut myrrhā terebinthina exceptā ut malagma imponito. Aut æstrum melle cocto exceptum ueluti collyrium indito, & postquam repurgaris, coagulato: uel ossa uirulina ad albedinem uista, & pice liquida siue cocto melle, aut utrisque ex æquo simul excepta, in sinum indito, uel

mannam, aut ipsum adeo thus cum myrrha terito, & cum uino ac oleo imponito. Emplastra autem cruentis uulneribus destinata & adglutinatoria eis conueniunt. in expansis quidem & planis ulceribus, uiride ex atractylide. In sinibus uero cruentis emplastrum Piscatoris, ex aceto apparatus, & Athena, & Nigrum appellatum.

De his quos canis momordit. Cap. II.

In his uero quos canis momordit, statim acetum irrorato, & expansa palma morfum percutito. Deinde nitrum cum aceto tritum ex alto supra morfum destillato, & spongiam nouam posca aut aceto imbutam imponito, & ad tres dies obligato, ligamentoque supernè ex posca aut aceto, prout uisum fuerit, madefacto. Egregiè enim auxiliatur. Post hæc uero ut commune ulcus curato. Aut perdidum herbam cum sale tritam imponito, quotidie eam alterando donec excedat crusta. Deinde ubi ad cicatricem perducere uolueris, ipsam per se tritam imponito. Quod si magnus sit morsus, quemadmodum à magnis canibus infligi solet, prescripta in sexto Sermonemethodo curato, ueluti eos qui à rabido cane sunt sauciati.

Si uero

Si uero cauus & angustus appareat morsus, in principio cum aceto, ut dictum est, irrorato. Deinde nitrum indidem cum aceto tritum ex alto superstillato, & anetho sicco usto morsum expleto, & linceolum conuolutum ex aceto madefactum indito, & obligato. Post triduum uero soluito, & reperies morsum repurgatum. Idem facit & cuminum tritum morsui inditum. Postquam uero ulcera fuerint repurgata, praedicto pharmaco utere liquefacto ad hominis morsum relato. Si uero inflammatio succedat, lenticulam cum malicorio coctam & tritam imponito, aut rubi folia contrita. Aut panis medullam in betae succo madefactam cum modico rosaceo pro cataplasmate adhibeto. Ad uulnera uero iam suppurata erui farinam cum melle subigito & morsum expleto. Summe enim auxiliatur. Aut irim cum melle & linamentis indito, ac supernè lenticulam coctam tritam cum modico melle & rosaceo pauco imponito. Repurgatis uero iam ipsis cum praedicto liquido pharmaco expleto, ac deinde his quae cicatricem inducere possunt, utitor. Emplastra autem ad demorsos à cane uel urso aut similibus animalibus statim à principio commode adhibentur ex sale & cerusa apparatus. Etenim uenosum humorem in moribus ex dentibus relictum expurgant, & callosam ex impactis dentibus concretionem explanant.

Ad leonum, patherarum, ac urforum morsus. Cap. III.
Horum animalium consimiles sunt morsus: nam robusta sunt haec & unciungula, implicantes quicquid contigerunt unguibus penetrantia, & corpora ipsa dilaniant. Perseuerando autem in manducatione non solum carnes dilaniant, sed & ossa aliquando ad polentae similitudinem confringunt, indeque & uicini stimulis afficiuntur nerui. Satis uero manifestum est, quod corpora quae in eiusmodi ac tantas calamitates inciderunt, non effugiant periculum ab alienationis: nam etsi maneant, putrefactionem suscipiunt, & ulcera serpentina inducunt. Huiusmodi igitur uulnera cum aceto elota & circumrasa, solutis item corporibus ac ossibus extractis, emplastris integere oportet, & post suppurationem partium dilaniatarum, repurgantibus linamentis curare & cicatricem inducere, quemadmodum in communibus ulceribus solemus. Emplastra autem his convenientia sunt, id quod ex salibus constat, & similia, cuiusmodi etiam hoc est.

Asclepiadae pharmacu, ad cruenta uulnera accommodatum, & ad intercisos neruos & ad urforum ac leonum morsus. Aeruginis rasae drach. viii. aluminis rotundi drach. viii. squamae aeris drach. xii. mannae, galbani, cuiusque drach. xii. ceræ unc. xvi. resinae pinus aridae unc. xxxii. olei lib. i. Arida & galbanum aceto terito; & liquecibilia liquefacta adfundito. Aliud, emplastrum Venatorum appellatum, admirabile. Radicis symphyti, comae dictamni, iridis Illyricae, atramenti Indici, aluminis scissi, misyos, ammoniaci thymiamatis, myrrhae, cuiusque sextantem, salis cappadocici quincuncem, aeris usti trientem, aristolochiae rotundae, iridis astragalitidis, gallarum, rosarum siccarum, squamae aeris, singulorum unciam unam, aeruginis quadrantem, picis sesquilibram, resinae pinus siccae libras quatuor, olei trientem & dimidium unciae unius. Metallica in aceto terito. Habeat autem & ceræ sesquilibram. Quod si marcedo subsequatur & ulcus serpendo depascens, optime facit

subscriptum uiride emplastrum, carnem arrodens, exest usque ad os, & squamas eiecit, ac ulcus serpens compescit, & in uniuersum utile est ad omnia inueterata eiusmodi actionis, & maxime in quibus ueneni corruptio est, & corpora sunt ab alienata: quibus etiam immixtum pharmacu adhibere oportet. In alijs uero dissolutum. Habet autem hoc modo. Spumae argenti unc. i. squamae aeris unc. i. nitri, atramenti futuri, salis ammoniaci, eruginis, singulorum sextantem, cyperi quadrantem, olei sexuncem, acetum scillitici quantum sufficit. Arida aceto terito ut strigmentitiam spissitudinem acquirant, & liquefacta adfundito, & in uetro reponito, aceto acri affuso, ut pharmaco ipsi innatet. Ad confectionem autem & praeparationem si acetum scilliticum haberi non possit, scillam cum aceto coquito ac utitor.

De suum morsu.

Cap. IIII.

Quandoquidem uero & in uenationibus à syluestribus suis laeduntur quidam, operae pretium est & de his facere mentionem. Vulnera itaque ab ipsis incussa grauius sunt, propterea quod non solum profunda, sed & magna existant: adglutinatorio autem medicationis ductu ea curare impossibile est. Nam una cum concussionem labia uulnerum discindunt, imò & adurunt. Mutuo enim dentium inter se attritu, ac uelut ad cotem affricu utuntur, ad uindictam eorum qui eis obueniunt currentes. Adusta itaque corpora crustam quandam iuxta uulnerum labia inducunt. Quare suppuratorium & non adglutinatorium curationis modum in eis adhibere oportet.

De his qui à fele morfi sunt.

Cap. v.

Omnia ferè quae ad canis morsum dicta sunt, etiam à fele morfis conducunt. proprie autem eis conueniunt, mel, terebinthina, oleum rosaceum, simul eliquato ac utitor. Aut centauream tritam cum melle imponito. Aut galli sterces liquidum cum adipe gallinae co subigito & imponito.

De morfis à crocodilo.

Cap. vi.

Primum quidem eos quos crocodilus momordit, quam tutissime custodire oportet, in domo conclusos fenestras non habente: etenim ob contrariam quandam affectionem ferè in totum syluestres maxime feles ad demorsos accedere consueuerunt. Remedia autem his eadem quae ad morsos à cane ac ad reliquos relato sunt, conueniunt. proprie autem humanum sterces & misy simul trita & imposita ad eos faciunt. Aut piscium garum, aut carnum salfarum fuscum morsui infunde, aut salem & myrrham aequali pondere in acerrimo aceto quam tenuissime contere, & cerato excepta impone. Aliud. Stercoris hyaenae, drachmas iiii. aeruginis drachmas ix. adipis anserini drachmas sex, galbani drachmam unam, ceræ drachmas octo, olei drachm. xii. Aeruginem & sterces aceto terito, & liquefacta affundito. Quod si hyaenae sterces non adsint, porcino utitor. Apollonius autem inquit, demorsos locos acri muria aut piscium garo perfusus ac fotos, adipe crocodili eliquato illinito, & linamentis inditis obligato: aut carnum salfarum pinguiore partes rufas indito, aut melanthium cum acetum fece tritum imponito. Haec enim & ulcus serpens compescunt, & morsus euestigio ab inflammatione uindicant. Post haec autem lenticulam coctam cum melle tritam cataplasmatem modo adhibeto. Erui uero farina cum

melle

melle subacta, aut iride cum melle morsum expleto. De cætero uero ulcera renutrito, & per cõmunia auxilia ad cicatricem perducto.

De bestiis uirus eiaculantibus, & primum quibus artibus adhibitis uenenata animalia tollantur.

Cap. VII.

De uenenatis animalibus scripturi, primum præsidia quædã indicabimus, quibus ea tollantur & perimantur. Perimuntur itaq; ex syluarũ ac materierum exustione, in quibus uitam degunt. Verum in his quæ intra domos reperiuntur, feruentẽ aquam in eorum lustra ac latebras infundere expedit, & acidam muriam feruentem per instrumentum fusoriũ, siphona Græci uocant, immittere. Vespis uero oleum infundatur, & assiduus fumus ipsarum tentorijs ac habitaculis obfundatur. Quæ substrata ab omni uenenata bestia præseruent. Iuxta uias quidẽ igitur & in domibus ab omni uenenato animali præseruãt substrata, abrotonũ, conyza, dictamnũ, uicex, echlon, calaminthe, solanum, hastula regia, saluia, peucedanũ, hypericũ, polium, samfucus, gentiana, origanus, ruta syluestris, serpillum, laurus, pulegiũ, cupressi, aut cedri coma, aut ramenta, cardamomũ, lysimachion, melanthium, bitumen. his addatur & gagates lapis.

Sufficiones præseruãtes, quæ incensæ uapore suo uenenatas bestias abigunt. Viticis folia, bitumen, castoriũ, melanthium, cornu ceruinũ aut caprinũ, nasturdum, cardamomũ, galbanũ, propolis, peucedanum, panax, opopanax, conyza, cupressi, aut cedri ramẽra oleo imbuta, gagates lapis, sagapenum, polium, canchryos radix, filix, baccæ lauri, & similia graueolẽtia. Quum enim uenenata animalia omnia angustos habeant meatus, quàm celerrimẽ replẽtur, & ab huiusmodi odoribus obturãtur ac suffocãtur. Refertur etiã de stercore crocodili, quod per infundibulũ suffitũ, feras ipsas uenenosas ex latibulis suis exigit. Archigenes autẽ, ungulæ caprarũ & pilũ, inquit, suffitu fugant bestias uenenosas: procul enim per ipsorũ odorẽ relegantur. Stratonis suffumigiũ. Galbani, radicis cãchryos, cornu cerui, melanthij, cuscusq; unclã unam. Omnia terito, & in pastillos cum aceto redigito, atq; ubi uti uelis, oleo madefacto, ac incensa per mediam domũ suffito, aut in ipsum ferarum latibulũ per infundibulum uaporem immittito. Aliud suffimentum, scorpjos deturbans, & omne reptile ex ædibus exigens: galbani, sandarachẽ, butyri, adipis caprini, æquales omniũ partes in pilulas redigito, & ut dictũ est, suffito. Probẽ facit & pyretrum cũ sulphure suffitum. Mirificẽ item Beronices suffimentũ facit, quod in hoc ipso Sermonẽ descriptum est, ubi ipsum cyphi etiã reperitur.

Illitiones præseruatiue.

Cap. VIII.

Illita autem ferarum accessum prohibent, easque fugant: althææ semen & acetum cum oleo, baccæ lauri & galbanum oleo trita. Panacis semen & flos & succus cum oleo: uehementer efficax est oleum, in quo cædrina ligna ulridia incoquũtur. baccæ iuniperi cũ oleo, conyza, peucedanum, silphium, saluia, hastula regia, abrotonum, galbanũ. Horum unumquodq; excellenter facit aceto & oleo dilutũ, aut etiã quædam ex his, aut omnia mixta & illita. Aut castorium cum medulla ceruina & unguento narcissino illitum uehementer efficax est. Apollonius autem inquit, Qui ex syluestris rutæ succo oblinuntur,

omnibus uenenatis bestiis manus admouet, & non mordentur. Dracunculi item succo manibus illitis qui uiperam tenuerit, non mordebitur. Semen autem dracunculũ aqua tritum & latibulis ferarum injectum, ipsas in terram fugat. Probẽ facit & solani succus illitus. In uniuersum autem omnem feram cuiusque earum adeps illitus fugat.

Quæ apposita uenenata animalia occidunt, & de his quæ in edulia & potiones incidũt.

Cap. IX.

Venenatas bestias occidit galbanum cum spondyllo & oleo appositũ. Cãcri appositi scorpjo, ipsum occidunt. Lychnis syluestris scorpjos fugat: quod item facit pastinacæ semen. Cæterum & aquarum quas in potu accipimus animaduersionem habere oportet. Non pauci enim perierunt ex quibusdam bestiis in edulia & aquas dum coquuntur collapsis, atq; id maximẽ in peregrinationibus euenire solet. Quæ propter tunc culinæ procul ab arboribus extruendæ sunt, propter feras in eis latibula habentes. quĩ & salamandræ quandoq; & erucæ calefactæ obsonijs incidunt. Præcipuẽ itaq; pinus & picea arbor fugiẽda: in his enim letales sunt erucæ. In obsonia quĩdem igitur dum coquuntur, illabi cõsueuerunt serpens & salamandra, & erucæ, in usũ uero uiperæ.

Communia remedia ad omnes uenenum eiaculantium ferarum plagas.

Cap. X.

Per prædicta quidẽ igitur præcauere oportet, ne in malignas bestias incidamus. Si uero cõtingat ab animalante quopiam uenenum iacente percuti, huiusmodi remedijs cõmuniter utemur. Si quidẽ leuior sit plaga aut morsus, posca calida cum proluemus, deinde uero locum ipsum exugemus. Verum qui exurturus est, prius os oleo colluat, ne inde ledatur, atq; ira ore ad morsum admoto exugat, & expuat uenenum. Cauere etiã oportet, ne exulceratã aliquam internam oris partem habeat exurturus. Post hæc uero cinis aceto subactus pro cataplasmate imponatur. Maximẽ autem ad hanc rem conducit, ex ficulis lignis exustus, aut laurinis, aut lignis uitis, qui si non adsint, eo qui haberi potest utendum est, diligentiã ad hoc potissimum adhibita, ut inflammatio in loco excitetur, & materiæ ad morsum prouocentur. Quod si minus nobile sit membrum, & uehementior morsus, cucurbitam cum plurima flamma ad morsum adhibe, & uicinos locos circumcirca impactis uulnusculis scarificato: attrahetur enim unã cũ sanguinis & flatus attractione ipsius bestię uenenum. Deinde a tepidẽ largẽ haustu uomere iube: & sic deinceps pharmaca exhibe. Vigilans etiã æger adseruandus est, ac desidẽs per totum curationis tempus, donec euidentem remissionem acceperint molestiæ concomitantes. Venter item adstrictus cõtra dilationem per infusum eluatur, & uesicæ quoque cura habeatur, quo cõtra impedimentum lorium excernat. Optimẽ autem auxiliantur, si statim in principio post cucurbitas plagæ imponantur animalia parua discerpta, & adhuc intus calentia, uelut sunt gallinæ, hoedi, agni, porcelli, uenenum enim exugunt, & dolores leniunt. Aptæ sunt etiã his cataplasmata dilandã, uelut sunt allia cum melle, cẽpæ cum sale, ruta cum melle, silphium tritum inspersum, laser, piscis salus maximẽ uetustus, allium ustum, plantago cum sale, melissophillon, uirgultus fici cũ melle, suillum recrementũ aceto cõctum, calaminthe,

minthe, stercus caprinum cum aceto. Summe autem facit ad omnem bestiae uenenatae plagam, praeterquam aspidis; calix usua cum oleo & melle crassitudine cerati imposita. At uero & inurere morsus ipsos expedit usque ad crustae productionem. Aut sinapi largum cum rumice acuto imponere; aut sale tritum liquida pice exceptum. Praeter opinionem autem facit ex uiperis theriace Andromachi emplastrum modo imposita. Emplastra uero ad omnem ueneni animalis ictum conueniunt, ex dictamno apparatus, omniaque quae attrahendi uim habent, qualia sunt & quae ex sale, & quae ex chamaeleonis radice constant, & aphroditae appellata. Egregie autem hoc auxiliatur. Spumae argenti libram unam, cerusae libram unam, resinae pinus libra unam, olei ueteris libras tres, ceræ sexuncem, ammoniaci thymiamatis trientem, galbani trientem. Cerusam, argenti spumam, & oleum coquito, donec non inquinant manus: deinde liquefacta adijcito, unito, & uti tor reposito ad omnem morsum, & ad abscessus, & tubercula mamillarum, panos, sinus, fistulas, parotidas: ad miraculum enim usque discutit ipsas. Vti tor & ad carbunculos. Arcet uehementer inflammationem, & raro citra magnam commoditatem & efficiaciam adhibetur. Portiones communes. In potu autem citra dilationem in omni uisulenti animalis morsu, theriace Andromachi praebetur, aut Mithridatica, & consimiles compositiones. Ex simplicibus uero, uiscis semen cum uino tritum bibendum praebeto, rutae syluestris semen cum uino similiter tritum dato, platani pilulas, poliū, polemonij quod & phileterium appellatur, drachm. i. leporis coagulum aut cerui, allium, trixaginem, dictamnium, salusam, castorium, ex unoquoque drach. i. bryoniae radicem drachmae pondere: seminis trifolij bitumen olentis drach. i. Prodest & conyza & chamaepitys & scordium, cuiusque drachm. i. ex uino. Auxiliatur autem omnino cancri fluuiales cocti aut assati comesti. Ranæ item elixæ & comestæ. Verum si qui earum esum auerferentur, ranas donec uletæ reddantur coquito, & lusculum ipsum ignaris absorbendum praebeto.

De uespis & apibus. Cap. xi. Quod si quis ab apibus & uespis illesus permanere uelit, cum maluae folia cum oleo illita, & cruca siue bruchus cum oleo illitus adseruabunt. Quandoquidem uero quidam ab his elaculum percussit, ob dolorem perturbantur, putantque se à maligno aliquo animante peritos esse, necessarium existimo prius ostendere quæ signa ad horum plagas comitantur. Hos itaque qui ab apibus punguntur, dolor ictus consequitur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum: stimulus autem omnino in percusso loco reperitur. Eadem etiam hos quos uespa pupugit concomitantur, sed intensiora: uerum stimulus uespa in percusso loco non relinquit. Auxilium autem utrique ferunt, luto aut stercore bubulo eis illito cum posca, aut maluae folijs impositis cum posca, aut cimolia cum malua & posca, aut sesamo cum posca. Natura liter autem opitulatur ueneranda & uiuifica crudis imago in sigillo ferreo exsculpta, & plagæ appressa. Non enim permittit amplius inflammationem generari. In potu praeterea ipsis foliorum lauri tenerorum drach. ii. cum uino austero praebeto.

Ad stellionis morsum. Cap. xii. Qui à stellione morfi sunt, assidue & cōtente dolitant, morsusque locum liuidum habent. Iuuantur autem euestigio si caepe & allia cataplasmati modo eis imponantur. Auxiliantur amplius eadē comesta, uino meraco post eorum acceptionem absorpto. Vtiliter etiam sesamum eis imponitur, aut melachium aqua multa assatim affusa.

Ad salamandram morsum, & lacertæ chalcidis.

Cap. xiii. Quos salamandra percussit, eos dolor uehementis & crustae productio consequitur. Adhibeatur autem eis cōmunis cura iam praedicta. Qui uero à lacerta chalcide appellata percussi sunt, eos tumor pellucidus consequitur, ueluti nigrore in ambitu plagæ relucente. Consequitur autem & putrefactio. Curatio uero eadem illis accommodanda est, quæ ad muris aranei morsum referetur.

De mure araneo.

Cap. xiiii.

Mus araneus colore quidem mustelæ similis est, magnitudine autem muri, unde & mygales apud Graecos obtinuit nomen. Os autem sublongum habet & exiguum caudam. Dentes uero tenues, atque eos duplici ordine sitos in utraque maxilla, quo fit ut quatuor dentium ordines habeat. Qui igitur ab eo morfi sunt, his uulnera manifesta fiunt: quadrifido enim ordine uulnera conspiciuntur. Et sanguis quidem primum purus promanat; paulo post uero saniosus. Animal enim ipsum putrefactione occidit. Consueuerunt etiam bullæ insurgere, quas si quis dirumpat, carnem subiacentem feculentam uidebit, & fissuris disparatam. Inflatio autem sequitur demorfos. Cæterum hoc animal frequentius ad testes insilire solet, eosque uerbere impetere non hominis solum, sed cuiusque etiam bruti animantis. Auxiliū autem ferunt quum ob putrefactionem periclitantur, post praedicta cōmunia remedia adhibita, abhuiusmodi rebus. Lauri foliorum tenerorum drach. i. aut. ii. cum uino tritas bibendas praebeto. Conueniunt etiam ipsis omnia praedicta cōmunia remedia in potu accepta ex uino dulci. In pecoribus uero & iumentis illa ipsa cum aqua trita naribus infunde. Est enim ipsis praesens remediū: unde etiam hominibus similiter in potu praebeto. Morsum porro cum cumino integro & allio, putamine extrinseco non abiecto, eadem etiam cum oleo trita assidue & diligenter locis circumscriptis illito. Si uero ruptæ fuerint bullæ, & ulcera oborta, adda muria proluce, & ordeum uisum tritum impone: uerū non rumpetur, nisi pragnas fuerit mus araneus, qui morsum inflixit. Quod si exulceretur, mali punid dulcis coriū coctum tritū impone, ulceraque ex eodem decocto, aut magis myrti decocto, persusa foue. Strato uero inquit: in muris aranei morsu locum scarificato, ac ipsum murem araneum uisum cum aceto cataplasmati ulce imposito, aut sinapi tritum eidem ex aceto. In potu uero panaca exhibeto, erucam, capparis corticem, gentianæ radicem, & uerbenacam rectā tum cum uino bibendam praebeto, tum pro cataplasmate impone: maluae item folia impone: & antidotos magnas bibendas exhibe.

Ad scolopendram plagam.

Cap. xv.

His qui à scolopendra icti sunt, eadem remedia conueniunt quæ ad muris aranei morsum sunt praedicta, & sales tum liquida pice impositi: & cedria cum

cum melle: & allium cum folijs fici, & cumino, eruoq; ac uino. In potu uero etiam ea commodant, quæ à mure araneo morsis. Amplius autem & absinthium & menta cum uino.

Ad araneæ ictum. *Cap. xvi.*

Est & araneæ genus, quod ictu cōtinentes dolores inducit: rubor uero circa præcordia, & urinae emittendæ difficultas egros cōcomitatur: aliquando uero & suffocatione. Ab eo percussis rutam syluestrem, & uiscis albæ semen aut folia bibenda præbe. Allium etiam largè edendum, ac uinum insuper meracum absorbendum exhibeto.

De tetragynis. *Cap. xvii.*

Tetragynus, species est phalangij subalbida, pedes scabros habens, & iuxta caput eminentias duas, unam rectam, alteram latā, ut existimes eum ora quidem habere duo, maxillas autem quatuor, & lineam per os æqualem. His qui ab eo percussi sunt, cōmuniter quidem eadē accedunt quæ à scorpio percussis. Propriè autem in ipsis plaga cōtente dolet, & percussus locus subalbicans est: tumor uero faciē & caput occupat, & percussæ partes usque ad articulos gracilescent: cibum item ac alimentum non sentiunt membra, & post adeptam sanitatem uigiliæ intensæ succedunt. Opem autem ferunt ex calaminthæ potu, aut trifolij, rutæ, panacis, polij, & his quæ ad percussos à phalangio referuntur.

De percussis à phalangio. *Cap. xviii.*

Phalangiorum genera quidem plura sunt: quæ uero apud eos qui de noxijs bestiis scripserunt referuntur, ut plurimum sex numero existunt: unum quidē ex eis rhagium, alterū lupus, tertium formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalon, sextum scoledum appellatum. Ac primum quidē rhagium, id est, acineum, figura rotundum est, colore uero nigrum, acini uuæ nigrae similitudine, unde etiam appellationem accepit. Et os quidem iuxta mediū uentrem habet, pedes uero ex utraq; parte quā breuissimos. Alterū uero lupus appellatū muscas perdit, eisq; pascitur: ac corpus quidem habet latum ac uolubile, partes uero circa collū ipsius incisæ sunt: amplius autē & os eius eminentias tres habet. Tertium autem myrmecidū, hoc est, formicariū dictum, formicæ maximæ assimilatur: colorē est fuliginosum, corpus uero eius uelut astris quibusdam insignitū est, maximè circa dorsum. Quartum deinde cranocolaptes, sublongum est, & uiride, stimulumq; iuxta collum habet, atq; si in quē irruat, locus circa caput petat. Quintum sclerocephalum dictum, caput habet saxeum & obduratum: lineamēta uero per omne corpus similia animalibus illis, quæ circumuolitant noctu lucernas. Sextum autem scoledum, siue uermicularium appellatum, sublongū est & submaculosum, maximè circa caput. Atque hæc quidem species phalangiorum enumerantur, quas sanè obseruare oportet. Quæ uero percussos ab eis concomitantur, cōmunia sunt iuxta magnitudinem & paruitatem discreta. Morsus porro tenuis est, ut uix cōspici possit, tumor autem liuidus, quibusdam etiam rubicundus: frigiditas adest circa genua & lumbos ac scapulas, quandoque uero totum corpus aggregatur, amplius & dolor asiduus adest, tremor, pallor, uigiliæ: quibusdam uero pudendi tēgigo, & circa caput pruritus, aliquando etiā circa suras, oculi humecti & la-

crymantes ac caui, & uenter inæqualiter eleuatur. Intumescit autē uniuersum corpus, faciesq; & maximè circa linguā partes, ut impeditum habeant sermonem: quibusdam uero & urinae emittendæ difficultas adest cū pudendi tēgigine & dolore. Si uero minxerint, aquosæ ipsorū sunt urinae, quædam aranearū textis similia in se habētes: & uomitus quoq; consimilis est: aliquando uero per lotiū, & per uentrem talia excernuntur. Cæterum in calidam aquam demissi à dolore leuati sibi uidentur, post uero contentè dolent pudendū. Senioribus uero pudendum plurimum laxatur, ac minimè intenditur. Atq; hæc quidem cōmuniter ad omniū ictus sequuntur. Si uero cranocolaptes aliquē percusserit, caput magis dolet, & uertigines consequuntur, frigus cōtinens, delirium, corporis iactatio, & stomachi puncturæ. Omnes autē à phalangijs percussi asiduis balneis iuuantur: plaga etiā ipsa ex trifolij bituminosi decocto cū oleo proluatur, totū uero corpus ex cerato liquidissimo pinguefiat. Iuuantur etiā fomento spongiarum in calido aceto tinctorū, & sæpe ad plagam adhibitarum. Cataplasmata autē eis conueniūt, bulbi, sanguinaria, porrū, fursures aceto cocti, ordeacea farina folijs lauri cū ea in uino aut melle incoctis, ruta, grossi ficus, caprinum stercus cū uino, samfucus cum aceto, syluestris ruta cū aceto, itemq; cyperus. Asclepiades autem hoc inquit, utere ualde laudato. Seminis rutæ syluestris, seminis cruce, staphidis syluestris, canchryos, seminis uiticis, pilularum aut foliorum cupressi, æquales omniū partes aceto terito, & melle exceptas imposito. Idem & in potu acceptum auxiliatur. Aliud laudatum, quod similiter & potatū & impositum iuuat. Sulphuris uiui drach. iiii. galbani drach. iiii. succi cyrenaisi drach. ii. aut si non adsit, laseris drach. iiii. amygdalarū amararum repurgatarū drach. ii. in uino diluito, & melle excepta imposito. Bibendū etiam, ut dictū est, præbeto. Amplius uero & cupressi folia aut pilulas tritas cū uini & olei hemina una à phalangio percussis dato. Aut anisum, aut daucū, aut cuminū, aut melanthiū, aut piper, aut agaricum, singula drachmæ pondere præbeto. Aut ammi drach. ii. aut iridis drach. i. aut hyperici dra. i. aut trifolij bituminosi quantū tribus digitis apprehēdi potest. Conueniūt etiā lauri bacæ, scorpiuron, serpillum, sulphur, calamintha, chamæpitys per se & cum ruta ac pipere, singula uero ex uino. Aut mentæ fasciculum posca meraciore coquito, & decocti cyathos ii. præbeto. Idem & samfuci, & radicis spinæ albæ decoctū, ac trixaginis & pulegij præstat. Lixiuū item & radicis hederæ succus cum aceto. Vtere etiā ad eos remedijs à scorpio percussorum, & ex ulperis theriaca, & cōsimilibus.

Asclepiadæ, ad percussos à phalangio: hac Chariton utebatur, & per hominum conuentus oberrans à phalangijs percussis auxilia promittebat. Seminis spondylii sicci, calaminthæ, æquale pōdus simul terito, & ex uini cyathis ii. præbeto, atq; id sæpe per diem facito. Aliud eiusdem. Succi cyrenaisi, seminis dauci, mentæ sicca, spinæ nardi, singulorum æquale pondus coagmentato cum aceto, & drach. i. cum posca meraciore cyathis iiii. præbeto, & à potu ægrum in calidam aquam demittito. Quod si succus cyrenaisus non adsit, pro eo laser purū conficito. Aliud ualde præclarum. Canchryos, seminis rutæ,

rutæ, piperis, myrrhæ, staphidîs agrestis, singulorū drachmam unam, radicis cyperi drachmam unam, coagmentato, & drachmam unam, cum uini odorati cyathis iiii. ac mellis cyatho i. exhibeto. Auxiliatur item eis allij esus, balneum, & uinum.

De his quos scorpio percussit. Cap. xix.

A scorpio percussos uehementissimus plagæ dolor consequitur, frigiditasq; ac tensus, & stupor, circaq; plagam & totum corpus frigidus sudor, & his qui iuxta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur, ac intumescunt, qui uero circa supernas, locus sub alis, & hæc quidem leuiter percussis adsunt. Validius autem ictis, ardor circa plagam adest, quemadmodum in ambustis, & uerrucarū instar formicarum eruptio, circa labra & totum corpus, ut grandine se impetiri putent: facies distorquetur: sordes circa oculos adsunt glutinosæ, & lacrymæ uiscosæ: durities articularum, anusq; procidit cum egerendi cupiditate, spuma circa os est, & uomitus largus, singultus, conuulsiones opisthotonicis similes. His igitur serpillum, althææ radicem, & elaphoboscum bibendum præbeto. Præter opinionem autem facit elaphoboscus tum uiridis comesta, tum sicca potata. Pastinacæ item syluestris semen & nuces ponticæ: hæc enim in zona gestatæ non permittunt aliquem à scorpio lædi. Aliud. Cochleam hortulanam maximè accipito, eamq; unā cum testa tritam plagæ imponito, & confestim sedabis dolorem. Idem etiā uermes terreni facere dicuntur. Aliud. Cæcrum fluuialem cum uino & lasere terito, ac bibendum dato.

Aliud. Verbenacam rectam aut uiridem pro cataplasmate impone, aut siccam tritam bibendam præbe. Aliud. Cumini, melanthij, seminis uilicis, singulorum par pondus tere, ac drac. i. inde ex uino exhibe. Poteris etiam omnibus communibus auxilijs prædictis uti. Aliud, hoc & ad phalangij & scorpionis ictum facit. Styracis drachm. vi. sulphuris uiui drachmas sex, pyretri drachmas iiii. seminis rutæ syluestris drachmas iiii. castorij drachmas duas, seminis erucæ drachmas duas, cum sanguine marinæ maximè testudinis subige, aut si non adsit, terrestris, & nucis ponticæ magnitudine præbe cum posca aut ex aceto. Alia antidotus, excellenter ad scorpionis ictum conducens: qua etiā ad meipsum ægrè affectum usus sum, & seruatus. Habet autē hoc modo. Castorij, succi cyrenalci, piperis, cuiusque drach. iiii. costi, spicæ nardij, croci, succi centaureæ, cuiusque drachm. ii. mellis despumati quantum sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine. Datur autem à scorpio ictis cum uino diluto, ab aspidē morsu cum aceto diluto. Detrahendi uim habet, aded ut digestos etiam in membra uenenij succos eruat: & ob id etiam ad uulnæ stragulationem utiliter cum hydromelite exhibetur. Aliud. Aristolochiæ longæ, melanthij, radicis panacis, seminis rutæ syluestris, æquales omnium partes committe. Dantur inde drac. ii. cum uini meraci hemina una. Optimè autē ad eos facis, similiterq; ad phalangij morsum antidotus ex quatuor rebus ad podagricos descripta, ex aristolochia uidelicet, gétiana, myrrha, & bacis lauri. Dato etiā si abundes ex theriaca. Ad plagam autē scorpionē ipsum qui percussit, si inueniri queat, imponito. Aut stellionem dissectum plagæ adhibeto. Calaminthe etiam quæ iuxta aquas nascitur im-

sita, confestim dolores remittit & tollit. Allium quoque aut per se aut cum sale tritum imponatur, aut syluestris ruta, aut scorpiurus herba. Ego uero syluestris rutæ drachmam unam in aceto tero, & ceræ unciam unam, resinæ pinus quadrantem liquefacio, & parum olei affundo, unio, ac impono. Et est mirabile pharmacum. Quin & ouillum stercus uino coctum & impositum, confestim dolore liberat. Viere item præscriptis communibus emplastris, & eo quod ex dictamno apparatus, & quæ ex salibus quæq; ex chamaeleone constant.

De morsu ab aspidē.

Cap. xx.

Aspidum apud ferarū scriptores tres species reperiuntur. Quædā enim ex eis terrestres appellantur. Quædam uero Chelidoniæ, & circa fluuiorum ripas, præsertim Nili, latibula habent. Aliæ uero Pryades nominantur. Terrestres quidem igitur maiores sunt, & quandoq; usq; ad quinque cubitorum longitudinem reperiuntur. Maximè uero Pryades bicubitales sunt. Chelidoniæ autem, cubito maiores reperiuntur, & colorem hirundini similem habent. Pryades uero cinereo sunt colore uiridiq; & ad auri colorem declinatæ. Terrestres uero ut plurimū & ipsæ cinerei sunt coloris, quanquā & subuirdes reperiuntur. Cæterum accessiones & signa cōmunia sunt in his quos aspides momorderunt. Vulnere enim in demorso loco ueluti ab acu puncta inueniuntur. Bina quidē ex masculi morsu, ex foemellæ uero quatuor, citra magnum dolorem, à quibus nihil effluit, nisi uiolentum animal sit quod morsum inflixit. Consequitur autem stupor, pallor frontis, refrigeratio, assidui hiatus, palpebrarum nictationes, colli inclinatio, capitis grauitas, segnities, & collapsio in somnum profundū. Ad finē uero & conuulsio. Mors autem in tribus ad summū horis ex terrestris morsu sequitur. In chelidoniæ uero ictu præsentissima adest. Porro his qui à pryade conspuuntur, caligo oculorum succedit, & cordis dolor, faciei tumor, ac auditus corruptio. Tardius autē mors consequitur. Auxilium autem ab aspidē morsu ferunt, & præsertim quos pryas momordit, ex acerrimi aceti potu: dandum autē est quousque aceti qualitatem circa dextrā præcordiorū partem perceptent: hepar enim in morsu ab aspidē primū a sunt sensu priuari. Cæterum ad prænotionē an uicturus sit percussus, centaureā cum uino tritam bibendā præbeto: si quidē enim euomet pharmacum, morietur; si nō, uiuet. Quo uero malignitas uenenij distributi & in corpus digesti probè euomatur, allia trita cū zytho exhibeto, donec nau-seabundus reddatur. Aut opopanaca cū uino diluto dato, & cōfestim uomitionem operabitur. Numius autem inquit: Origanum uiridem aut aridā pro ægri uiribus cum uino dato. Post uomitum antidotis theriacis utendum & communibus remedijs prædictis. Utiliter autem ad plagam imponuntur, post cucurbitarū adhibitionem & scarificationē, centaurea cū myrrha & modico opio. Rumex autē si cataplasmatis modo imponatur, nihil lædetur. Præter opinionē uero auxiliatur theriace tum plagæ imposita, tū potata. Profunt autē & assiduæ excitationes cū euulsionibus & plagis, & uniuersi corporis motus, & aqua marina calida pro fomento aspersa.

De uipera maris & femine morsu. Cap. xxi.

Vipera foemina colore quidem est subflauo, multis

K instar

instar rotarum notis exornata, magnitudine cubitali, longissima uero palmos tres aequat. Caudam autem habet acruatim in tenuitatem desinentem, non paulatim imminutam, estque omnino carne nuda cauda & aspera. Oculi uero subrubri, & caput laetius, & angustius collum. Vētre autem sinuosiorē habet, & in gressu ad summum caudae nititur, sensim uero inambulat, & quatuor habet caninos dentes. Vipera uero mas eiusdem est coloris: uerum caput angustius, & collum crassius habet, & unius sum corpus tenuius, & quodammodo prolixius: gressum autem supernè circa uentrem firmat, & alacrius mouetur: dētes autem caninos solum duos habet, paulatim uero cauda ei imminuta est, quemadmodum & reliquo serpentium generi, non acruatim uelut in uipera foemina dixi, & per hoc sanè a foemina differt. Reperiuntur igitur in eis quos uipera mas momordit uulnera in plaga binati: in his uero qui a foemina demorsi sunt uulnera quatuor. Primum autem ex eis excernitur sanguis, deinde sanies sanguinolenta & oleosa: adest tumor biliosus, feruidus, bullosus, subruber, deinde liuidus & denigratus & proserpens. Os adest exiccatum, ardor, exolutio, & frigidi horroris insultus, aliquando & bilis uomitus, tormina, capitis grauitas, uertigo, pallor, singultus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plūbeus, sudor frigidus. Mors in horis septem, aut ut longissimè absit tertia die, in his qui non seruantur, & maxime his qui a uipera foemina sunt icti. Cōuenit igitur priusquam cruenta prodeant lotia, alij plurimum edere, & uinum meracum multum bibere, ac uomere. Efficacissimum enim in eis remediū est alij elus, ac meracior uini potio, inquit Archigenes: aded ut si quis multū eius sustineat usum, itemque meripotum, nullo alio auxilio habeat opus. Dato autem citra dilationem theriacen ex uiperis bibendam, eandemque plagam superponito. Quin & ipsam uiperam excoriatam & coctam, capite ac cauda & interaneis uisceribus omnibus reiectis, uelut anguillā edendam prębeto. Caput autem amputatū diligenter per uolsellam teneto, & morsui imponito ea parte adhuc calente quae contigit collum: id enim extrahet uenum. Aut quempiam qui ore plagam exugat adhibeto, qui, ut supra dictum est in communibus remedijs, os prius habeat ex oleo collutū. Aut gallinam dissecatam, & internè adhuc calentem morsui imponito, atque hoc remediū frequēter ac assidue repetito. Scarificare autē per ambitū oportet demorsum locū, & cucurbitas ad mouere. Postea uero fraxini folia tundito & exuccato, & succum quidem in potu exhibeto, quod uero ab expresso succo reliquum est ad morsum imponito. Est autem fraxinus arbor ex qua fraxinea appellata ligna caduntur: est enim ualde efficax ad uiperarum morsus haec arbor. Melisso phylli item folia & succus cum uino potatus & uulneri impositus euidentem auxilium confert, etiā si iam moriatur aeger. Alunt autem si quis melanthij drachmas IIII. edat, non moriturum. Similiter etiam melaphroditos herba efficax est. & canceri fluuiales cum lacte triti & potati & plagae adhibiti. Magnificè etiā prosunt ranæ coctae comestae, & iusculum earum bibitū. Præstat & nasturtium plurimū edere, ac tritum quoque cū uino bibendum exhibere. Facit autē mirabiliter testudinis sanguis exiccatus cū

syluestri cumino potatus. Utendum etiā omnibus cōmunibus remedijs supra relatis: superuacaneū autem fuerit eadē sæpe scribendo repetere. Maxime uero utendū est Anchusae radice, & heliotropio cum uino. Dandus & hæmatites lapis. Auxiliatur & raphani largè in cibo accepti, deindeque uomitu reiecti. Statim uero a uomitu theriace Andromachi exhibeatur. Post scarificationē & gallinarū impositionē plaga ex trifolij bituminosi decocto calido per multum tēpus proluatur ac foueatur. Nā si pauco id tēpore facias, pelus afficiuntur. Deinde porrū & panē cū sale imponito, aut alliu cū aceto, aut cinerē ipsius exustū, aut fraxini cinerē, aut aliumquēuis cū aceto, aut hastulæ regiae folia, aut sycomori folia cū pane, aut lauri folijs teneris coctis & cū oleo tritis locos intege prius quam claudantur, aut caprinum sterces imponito cū uino. Asclepiadæ epithema, ad uiperæ morsum. Sgapani, piperis, laseris maxime cyrenaiaci, opopanacis, cuiusque unc. I. galbani sextantem, sulphuris uul sextantē. Succos aceto dissoluito & arida trita inspergito, & ad emplastri formam redacta plagae imponito. Forinsecus autē folijs fici aut urticae contegito. Aliud. Centauræ, aristolochiæ, radicis peucedani, æquales partes contundito, cribrato, & aceto subigito, adiectoque galbano in emplastri formā reducto. Aliud. Canchryos, staphidis syluestris, aristolochiæ, radicis bryoniæ, singulorū partē unā, opopanacis partes duas, aceto subige, & utere ut dictum est. Utendum & prædictis communibus cataplasmatibus & epithematibus, maxime uero Andromachi theriaca. Aliud tale bonum. Cancrorum fluuialium carnes terito, & adiecta iride & calaminthe rursus sufficienter terito, idemque rursus modico sale addito facito, & pastillos informato, quibus in umbra exiccatis utitor, in potu quidem ex aqua mulsā, aut uino: in cataplasmata uero, cum lacte dissoluito.

De dipsade.

Cap. XXII.

Dipsas a quibusdam causus appellatur, estque uiperæ species, quæ in maritimis magis locis reperitur, magnitudine cubitali, ex crassa in tenuem desinens. Notas autem habet per omne corpus fuluas & nigras: caput uero angustius. Sequitur autem ab ea morsus, præter ea quæ de uipera dicta sunt, & sitis intolerabilis planè, aded ut etiam si multus eis potus exhibeatur, sitis non sedetur. Et tamen neque per urinas, neque per uomitum, neque per sudores quicquam excernitur. Duobus igitur pereunt modis, aut ob multam sitim exusti, si potum non sumant: aut ob multam expletionem distentus rumpitur uēter, uel internè circa inguina, uel circa imum uentrem, quæ admodum in hydropicis fieri consueuit. Cæterum & his uelut a uipera morsis auxiliamur: propriè autem in his potiones magis urinam cientes exhibeantur. Alius item per infusum eluatur, & oleo cū decoctionibus exhibito ad uomitum cogantur. Ad plagam uero locum post exustionem, & scarificationem, & cucurbitularum affixionem, & dissectas gallinas, calcem uiuam cum oleo imponito, & emplastra adtractoria, & theriacen.

De hamorho & hamorrhoidē.

Cap. XXIII.

Animalia hæc colore quidem sunt arenoso, magnitudine autem tres palmos æquant, & in tenuem ac angustā figurā caudam paulatim desinunt. Sunt autem igneo

igneo oculorū fulgore, recta & tardè proreptant. Per corpus uero multis notis albis & nigris uariata sunt, & asperioribus squamis oblitā, quapropter dum serpūt, sonus auditur. Et foemina quidem uentri incumbens per terrā reptat, & gressum infernè circa caudam firmat; mas uero circa uentrem in gressu nititur, & collū in serpendo extendit. Consecquitur horū morsum color isti loci cruentus, mali coloris & nigricans: ex quo nihil in principio effluit, præterquàm paucum quippiam aquosum. Stomachi adest dolor, & spirandi difficultas. Deinde sanguis ex naribus profluit, & ex foraminibus ipsius morsus. Et quicquid est in toto corpore cicatricum, id rumpitur & sanguinem profundit: atq; hæc quidem in maris hæmorrhoidis morfu contingunt. A foeminae uero hæmorrhoidis morfu ad hæc & anguli oculorum sanguine manant, & gingivæ dentium, & unguum radices: & ut simpliciter dicam, per omne corpus sanguinè efferri contingit. Dentes præterea excidunt, & gingivæ putrescunt. Horum porro curam facere oportet, primum quidem sanguinis eruptioni obluendo ac resistendo per ea quæ aptè sanguinem sistere possunt, deinde cataplasmata plagæ imponendo ex folijs uitis coctis tritis cum melle, & portulacæ folijs cum polenta. Antea uero quàm cruenta prodeat urina, allium multum edant, & uinum multum dilutum bibant, & ad uomitum cogatur: deinde confestim theriace exhibeatur, & postea pisces multos, alij tritis, cum oleo tinctos, edant. Sumant item in cibo panem & uiam passam dulcem, & deinde uino diluto largè hausto uomāt. Plaga uero aqua frigida proluatur. Vesica autem spongijs calidis foueatur.

Preparatio sanguinis testudinis marinae, & usus. Cap. xxiii.

Testudinem super ligneum aut fictile uas supinam reclinato, eiusq; caput statim amputato, & leuata ipsa sanguinem supposito uase excipito, & congelatum deinde per harundinem in multas partes secato, atq; operculi uice cribrum uasi superposito, & ad solem locato, siccatum uero reposito, ac uisor ad uiperæ morsum drachmis duabus exhibitis, ex poscæ cyatho uno: sequenti deinde die sicci sanguinis drachm. xiii. cum aceti cyathis duobus dato: & tertia deinceps, sanguinis drachmas octo, ex aceti cyathis tribus.

De ammodite, aut cenchrid. Cap. xxv.

Ammodites magnitudine quidem cubitalis est: maior enim non pingitur, neque scribitur, colore uero arenosus, per corpus autem maculis nigris insignitur. Caudam autem habet prædurā supernè discissam. A quibusdam uero cenchrias, hoc est, miliaris, ob caudæ instar millij duritiem appellatus est. Latiores autem maxillas quàm uipera habet, quumq; in multis alijs ei similis sit, colore magis discerni potest, uipera enim subflaua est. Cæterum ab Ammodite percussos festina ut plurimum mors sequitur. Qui uero breui non pereunt, his sanguis ex uulnere promanat, & uulnus intumescit, paulo post autē sanies effertur, sequiturque capitis grauitas, & animi deliquium. Qui uero optimè dispositi sunt, in tri-duo intereunt, quanquā aliqui usque ad septimum diem durarint. Celerius uero mors adest his: qui à foemina laudantur, Auxilium porro & hi ferunt,

primum quidem à cōmunibus remedijs, utpote à cucurbitularum appositione cū scarificatione per ambitum uulneris locorum, & superiorum partium constrictione, & ad ipsam plagam scalpelli admotione. Proprie autem eis auxiliatur mēta cum aqua multa potata, castorium, cassia, & artemisiæ succus cum aqua. Danda etiā in potu theriace, eadem quoq; plagæ imponenda. Utendum & emplastris attractorijs: postea uero cataplasmata, quæ ad nomas siue ulcera serpentina conducunt, imponenda.

De sepe. Cap. xxvi.

Serpens qui seps appellatur, lōgitudine quidem duorum cubitorum reperitur, ex crasso autē in tenuem abit, recta uero actardè proserpit; caput habet latū, os acutum: uniuersum autem corpus multis albis notis respersum. Cæterū his qui ab eo percussi sunt, ex uulneribus manifestus sanguis excernitur, paulo post uero sanies graueolens, tumor & dolor languidus est: affectæ partes putrefactæ dealbantur, ac totum corpus uisiliginē (quæ alphos appellatur) simili colore inficitur: defluunt capilli toto corpore, atque intra tres aut quatuor dies pereunt. Porro opem & hi sentiunt ex eisdem rebus quæ in uiperæ & cerasæ & ammoditæ morfu relatæ sunt. Exhibenda est præterea portulaca multa in cibo, & uinum bibendum myrtites meracius. Conueniet item spongiam calido aceto imbutā morsui imponere, & ex butyro cū melle locum illinire, aut miliū cum melle, aut paleas unā cum terra eis adhærente exustas illinire.

De cenchrite siue acontia. Cap. xxvii.

Cenchrites serpens est magnitudine duorum cubitorum, figura autem crassa in tenuem abeunte, colore uiridi maxime iuxta aluum, ut milium colore referat: unde & cenchrias, hoc est, miliaris appellatur. Alunt etiam hunc seipso fortiores fieri, quum milium floret. Cæterum ubi se ad lædendum parat, extendit seipsum, ac uelut iaculum uibratum corporibus inuolat, atque hoc modo uerberat. Ab huius morfu omnia quæ de uipera dicta sunt sequuntur, atque etiam grauiora, adeo ut etiam putrefactiones & carnum defluxus consequantur, ac grauior item mors succedat. Cæterū remedia similiter eadem quæ ad uiperæ morsum his conducunt.

De cerasæ. Cap. xxviii.

Cerasæ magnitudine cubitalis est, longissimus cubitorum est duorum, corpore uero arenosus est, & iuxta caudam desquamatus: eminentias habet in capite duas, cornuum similitudine. Partes uero circa uentrem ex ordine squamis oblitæ sunt, quapropter in serpendo sonum sibilo similem edit, per obliquum autem non recta proreptat. Cæterum percussis ab eo eleuatio ac tumor plagæ capitis clauis similitudine insurgit, & sanies profluit uini colore aut nigricans, & maxime per ambitum, uelut in cruentatis ac sugillatis alijs fieri consuevit. Reliqua item quæ in uiperæ morfu dicta sunt, etiā his succedunt, cum intentione uehementiori. Ut plurimum uero usque ad nonum diem supersunt. Remedia autem eadem quæ morsu à uipera conferunt,

De dryino. Cap. xxix.

Serpentes dryini appellati abundant magis iuxta Hellepontum, latibula autem habent in quercuum radicibus. Est autem dryinus foetidus, unde & si quis cum nō uideat, foetore loci cognoscatur. Est autem

K 2 cubitorum

cubitorum duorum longitudine, & obelus, ac asper-
rimis squamis circa uniuersum corpus munitus. In
his ipsis squamis musce pennis æreis latibula sua ha-
bere dicuntur, quæ tandem ipsos serpentes occidunt.
Adeo autem malignæ ac noceris naturæ est, ut si quis
eum calcet modo, illius pedes excoriet, & tumorem
ingērem circa crura inducat. Et quod magis mirum
uideri potest, aiunt etiā Medici curantis ægrum ma-
nus excorari. Si quis autem, inquiunt, animal ipsum
occidat, omnia quæ odorat ab eius foetore corrupta
putat. Porro qui ab eo percutiuntur, his tumor in-
surgit nigricans, dolor uehemens, nome, delirium,
corporis siccitas, singultus, uomitus biliosus, aut o-
mnino uomitus simplex, urinæ suppressio, tremor,
interceptio uocis, stupor, scissura & mortificatio per-
cussorum locorum. Plurimi etiā intereunt. Porro &
hi ipsi quoque ex his quæ in uiperæ morfu dicta sūt,
opem sentiūt, itemque ex cōmunibus remedijs iuxta
consequentium accessionū proportionē adhibitis.

De amphibæna & scytala. Cap. xxx.

Animalia hæc inter se similia sunt: non enim ex cras-
sis in caudam tenuem abeunt, sed æqualis crassitu-
dinis per totum existūt, ut neque cognoscant uidē-
tes ea, iuxta utram partem caput aut cauda sint sita.
Differunt autem amphibæna à scytala, in eo quod ex
utraq; parte progrediatur: unde & amphibæna
Græcis est appellata. Galenus autem amphibænam
animal biceps esse dicit. De hac bestia ferunt, quod
si femina uterum ferens ipsam transgrediatur, con-
ceptum malè pariat ac abortiat. Cæterū ab utroque
animante demorsis, contingit morsum obscurum
esse, ac uix apparere, ueluti sunt muscarum punctu-
ræ: quapropter etiam si mordeant, nō enecāt tamen,
uerum inflammationes inducunt, ueluti contingunt
etiam ab apum ac uespærum stimulis. Quare trans-
ferātur ad hos quoque quæ de illis sunt relata, uerum
facultate intensiore. Aiunt autem scytalam chalcidi-
cā eiusmodi accessiones sequi, quales à uiperæ mor-
fos. Unde & hīdem remedijs ad eius morsum uten-
dum, & ut compendioso dicam, ad omnem uenenatæ
serpē morsum: cuius speciei hic nō reperis nomencla-
turā, auxilia eadē quæ ad uiperæ morsum cōducūt.

De pareæ & spathiuro. Cap. xxxi.

Pareas serpens in Syriæ locis reperitur, colore autem
alij quidem æs referunt, alij uero nigricat. Morsum
autem etiam si inflixerint, nō enecant: uerum quem
admodum amphibæna & scytala, ita & hic plaga
sua tantum inflammationē inducit. Quare ex hīdem
etiam curentur, & ex his quæ de cherfydro referen-
tur. Cæterum spathiurus in locis iuxta chalcidem
magis inuenitur. Est autem animal ex crasso in cau-
dam abiens tenuem, latum habens caput, ac mures
comedens. Neque uero hic morfu enecat, sed inflam-
mationes tantum inducit. Quapropter ab eis percus-
si itidem cōsimilibus remedijs curentur.

De peliade & elape. Cap. xxxii.

Signa quidem horum animalium apud ueteres non sunt
descripta, utpote quæ omnibus sunt manifesta. Con-
tingit à peliade morsus dolor circa locum, & putre-
factio, non periculosa tamen, & uexatio ac obsu-
scatio oculorum, ex ueneni nimirum ad ipsos distri-
butione. Curantur autem succo pitisanæ eū oleo in po-
tu exhibitō, & oxylapathē decocto, & simpliciori-
bus remedijs ad ictericos descriptis. Oculi uero lo-

do pueri uenerem nondum experti proluantur tum
per se, tum muria ammixta. Caput item similiter ex
eisdem perfundatur. Post purgationem deinde cor-
poris opobalsamum cū melle illine, aut collyrium
aliquod uisum acuens quod meatus rarefacere po-
test. Simul enim cum lacrymarum profusione & ue-
nenum excernetur. Si uero dolor consequatur ocu-
lorum, cum lentibus collyrijs mitigare oportet, quæ
tamen non stupefaciunt. Elapis porro morsum tor-
men uoluulosum consequitur. Alias communibus
auxilijs curantur. Maxime uero his quæ tormina le-
niunt, & urinam cident.

De basilisco. Cap. xxxiii.

Hocce animal magnitudine est palmorum trium, sub-
flauū, & capite acuto. In capite autem eminentias tres
habet. Vm uero super alia omnia repulsa maximā
acquisiuit, ut nulla ex eis queat uel sibilum saltem
ipsius sustinere. Quin & si quod ex reliquis anima-
libus uenenum iaculantibus ad cibum aut potū ca-
piendum properet, & basiliscus iuxta locum præsen-
tiam persentiscat, retro cedit, necessarij etiā ad uitam
nutrimenti negligens. Cæterum percussos ab eo to-
tus corporis ardor comitatur, itemque liuor. defluūt
capilli e corpore confestim, & in instanti omnino
tempore mors sequitur. Neque uero corpus ipsius
mortui ullū aliquod animal carniuorum attingit: si
uero fame coactū ipsum contingat, tum & ipsi illico
eodem loci mors instat. Aiunt autem quod conspe-
ctus modo, & sibilus auditus, eos qui ipsum audie-
runt, tollat, similiterque ab ipso conspectos. Quare ua-
num & superfluum duximus auxilia cōtra eū referre.

De draconibus. Cap. xxxiiii.

Animal quidem hoc uenenum non facit, atra suorum
autem & ui sua enecat. Abundant quidem igitur
dracones in Aethiopia & Lycia: colore autem diffe-
runt: alij enim nigri sunt, alij rufi, alij cinerei coloris:
& rursus alij quidem cubitorum v. sunt, alij uero
x. sunt & qui ad xxx. cubitos se extendant: quidam
etiam maiores narrantur. Squamis autem obiti sunt
per totum corpus asperrimis: magnos oculos ha-
bent, & supra oculos præminentias quasdam si-
militudine pellium flexibilium superciliorum. In-
mento autem excrescentiam quādam habent, quam
barbam appellant: maxime hiantes sunt oris rictu,
lingua exerta, & dēribus magnis similitudine sylue-
strium suum, cum quibus etiam fracturas & colli-
siones corporum inferunt. Quare curationes ueluti
ad mordentia animalia fiunt, non ut in his quæ ue-
nenum iaciunt.

De cherfydro. Cap. xxxv.

Serpens hic cherfydri appellationem inde habet, quod
in principio quidē in aquosis degit locis, & hydrus
appellatur ab ipsis aquis, hoc est, Natrix: postea ue-
ro siccos incolit locos, & ex compositione locorū,
cherfydri, id est, natricis terrestris nomen inuenit.
In terrā itaque degens, cherfydrus appellatur, & tum
sanè seipso seuior redditur. Equidem in humidis
locis ex humido uictu exaratus, non purum uenen-
num habet quū uero terrestris fit, maxime merum
& nocentius id acquirit. Cæterum similitudine est
aspidis terrestris parua, præterquam quod ceruicem
non ita latam habet. Hoc enim insigne solum
aspides præ his habent. Qui igitur ab his morfi sunt,
eis communiter eadem accedunt, quæ in aliorum
serpen-

serpentium morfu; ueluti est tumor, continuus dolor arsius, liuidus locus & seculentus, uertigo oculorum, exolutio, uomitus biliosi foetidi. Proprie autem motus totius corporis inordinatus, ut & per uentrem quædam inordinate feratur. Mors autem intra tres dies. Porro ex communibus remedijs etiam hi opem ferunt, & ex theriacis anditotis. Præuatim uero cupressi pilularum drachm. i. & myrti bacca rum itidem i. drach. terito, & cum melle rosaceo aut uino mulso in potu exhibeto. Iuxta affectum autem locum calcem uiuam & similia cum oleo imposito.

De rana rubeta. Cap. xxxvi. Rubeta, ranae species est, quæ palustris uitæ conditionem in terrestrem mutauit, unde & rubeta appellatur: hac autem mutatione, similiter ut chersydrus, ægrè curabilem afflictionē eis qui in eam inciderunt, inducit: est enim animal magnitudine nihilo minus testudine parua: exasperat autem & uibrat terga dum spiritu expletur, atque ob id ipsum audentius euadit. Ad lædendū itaque & manifestè insurgit, & salibus interpositum spatium contrahit: raro quidē morsum infligens, uerum anhelitū consuevit uehementer uirulentum inducere, adeo ut etiam si anhelitu contingat tantū, eos qui propè sunt lædat. Plura autem de hoc animante historijs relata relinquimus, his tantum quæ cognitu utiliora iudicauimus, appositis. Cæterū qui ab eis læsi sunt, his omne corpus intumescit, & diffinditur, ac citò omnino pereunt. Porro quæ opem auxiliariē his ferre possunt, ex uniuersalibus & communibus antidotis ac epithematis huc transferantur, itemque & reliquis quæ ad curationem peruenire uidebuntur.

De turture seu pastinaca marina. Cap. xxxvii. Qui à marina pastinaca percussi sunt, his uulneris locus manifestè apparet: sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor: acutum enim & firmum habet aculeum, quo uehementissima ui in altū impulsio nerui sauciuntur. Quapropter in aliquibus mors derepente totū conuellēs corpus comitatur. Narrat quidam, si quis caudā pastinacæ quæ ictū intulit, auferat, & in arborem, maxime quercū, suspendat ac figat, ipsam quidem arborem arescere, egrum autem sanari, atque id iuxta contrariæ affectionis & remedijs rationem contingere. Cæterum auxiliū ferunt percussi ab ea, ubi stupor & refrigeratio totius corporis consequatur, ex calidis illitionibus & cōsimilibus cataplasmatis. Proprie autem surfures aceto cocti & pro cataplasmate impositi eis auxiliantur, & ipsum adeo acetū affusum pro fotu ualde prodest. Magis autem conueniunt eis attractoria, & quæ tenuiū partium sunt, ac calida, quo nimirum per attractoriā facultatem uenenum ex profundo attrahatur, & per calorem frigiditas mitigetur: & quæ tenuium sunt partium in altū proreptent. Ad hanc igitur rem in promptu habebis apta. Sulphur uiuum urina ueteri rigatum, marrubium, lauri folia, echium, radicem panacis, saluiam & similia, at uero si his careas, fermentum acidum cum liquida pice emollitum imposito: mirabiliter enim auxiliatur. Cum his concordat emplastrum Piscatoris, & ex bryonia pastillus tum impositus, tum ex uino calido diluto potatus, euestigio autem utilitatem suam demonstrat: describetur autem in fine huius Sermonis. Dato item & lauri decoctum, aut succum cyrenaicum erui quantitate

cum myrrha magnitudine fabæ, ac modico pipere terito, ac dato cum uino: aut silphium, aut laser ex uino: aut succi fici guttas quinque cum tribus serpilli granis bibendas præbe.

De murena. Cap. xxxviii. Morsis à murena eadem accidunt quæ morsis à uiperis: quapropter etiam similia remedia eis adhibenda. Dato autem & fici succū cum serpillo, ut prædictū est.

De dracone marino. Cap. xxxix. Ad marini draconis plagam, locum percussus cum plumbo fricato, ipsumque draconem dissectum plagæ imposito. Serpillum item tritum aut lenticiulam coctam pro cataplasmate imposito. In potu uero absinthium cū uino diluto præbeto, aut saluiam cum passo. Mirè etiam his conducit ex bryonia & eruo pastillus cum uino potatus.

De scorpio marino. Cap. xl. Scorpij marini plagam sanat nullus dissectus & impositus, sulphur uiuum cum aceto illitum. Lauri bacca tres tritæ in potu acceptæ.

De culicibus. Cap. xli. Quandoquidem & hi hominū corpora lædunt, etiam de ipsis pauca dicemus. Culices fugantur cedrinorum lignorum scobe cum atramento sutorio sufflato. Idem faciunt cupressi pilulæ, aut coma, aut ramenta: & uini fex sicca, & conyza, & bubulum sterus postquam contraxerit nigrorem. Aut melanthium uel absinthium oleo coctum illine, & culices non appropinquabunt. Aut melanthium cum absinthio, aut cerusam cum atramento sutorio in bubulo stercore sufflato.

De muscis. Cap. xlii. Muscas necat, ueratrum album tritum, lacti, aut aquæ mussæ inspersum. Aliud. Semen hyoscyami, & ueratrum nigrum, & argenti spuma simul trita, & cum polenta irrigata & subacta, butyroque aut adipe nidorosa facta, & in massas coacta, & muscis exposita, ipsas occidunt.

Ad pulices. Cap. xliii. Pulices necat rhododaphnes, aut cumini decoctum respersum. Idem & aqua marina facit.

Ad cimices. Cap. xliiii. Vt ne cimices gignantur, chamaeleonis nigri decoctū facit, si ex eo lectus proluatur. Deinde sutoriū atramentum cum felle tauri terito, ex eoque lectum illinito. Aut etiam oleum per se, aut cum atramento sutorio inungito.

De uenenis. Cap. xlv. Ex animalibus exitiosa & letaliter corrumpētia, sunt cantharis, buprestis, salamandra, eruca pinorum, rana rubeta, lepus marinus, rana palustris muta, hirsutines. Ex seminibus autem, hyoscyamum, coriandrum, cicuta, psyllium. Ex succis, papaueris succus, opocarpasum, succus thapsiæ, elaterium, succus mandragoræ. Ex radicibus, thapsia, aconitum, fixias, ueratrum nigrum, agaricū ephemerum. Ex oleribus autem, taxus, solanum furiosum, herba fardonis, papauer cornutum, ruta syluestris. In his etiam fungorum genera connumerantur. Ex animalibus uero, sanguis tauri, mel Heracleæ Pontis urbe natum, lac coagulatum. Ex metallicis, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, sandaracha, spuma argenti, argentum uiuum. Ex his uero quæ nobis familiaria sunt, uinum multum acere

uatim à balneo potum : similiter & aqua frigida a-
ceruatim à balneo aut cursu ingesta.

Methodus præseruatua ne quis à ueneno phar-
maco lædatur. Cap. XLVI.

Quod si quis uenenum habeat suspectum, præcauere
omnino oportet, prima cura ad hoc adhibita, ut cor-
pus ita appareat, quo læsioni ac ueneni impressio-
ni minime obnoxium reddatur : quam ad rem bo-
na concoctio uel in primis conducit. Cibi autem ea
gratia sumendi sunt boni succi & magis carnosii : an-
imaduersione habita, ne quod obsonium cōsuetum
non referat colorem, aut odorem, aut gustum, aut
qualitatem. multa enim uenena à prouidis & pro-
bè considerantibus facile cognoscuntur. Qui igitur
in potu aut cibo uenenū suspectum habet, is signis
certis quale sit id depræhendat. Ex odore namq; &
amaritudine potus & cibi, opium cognoscatur. Ex
colore autem cerusa, gypsum, calx. Ex his uero quæ
in cibo & potu innatant, lac coagulatum, & recens
mactati tauri sanguis. Ex foetore autem & qualitate
ac odore, rana rubeta, & lepus marinus. Quin & re-
liqua ex alijs quibusdam signis noscuntur, de quib-
us sigillatim amplius dicetur. Cæterum præseruan-
tia sunt, quæ si quis ieiunus præsumat, & post sume-
re uenenū contingat, minime ab ipso lædatur : suntq;
huiusmodi. Calaminthe quotidie accepta ex natura
sua omni letali pharmaco resistit : & si in ueneni sus-
pensione exhibeatur, destruit tam acceptam exitio-
sam facultatem. Theodorus autem ita inquit : An-
tidotus quæ incorrupta manens omnia uenena uin-
cit, hæc est. Nucum iugladium unc. i. caricarum pin-
gulum sextantem, sesami unc. i. unumquodq; per se
tundito, deinde etiam simul pistillo ex oleo optimo
madefacto, & pastillos nucis Ponticæ magnitudine
formato, ex eisq; unum aut tres dato, & non contin-
get ipsum in uniuersum ullum aliquod letale phar-
macum. Quidam etiam rutæ tridentem ammiscent.
Strato autem, commune est, inquit, hoc præsidium
ab omni exitioso pharmaco præseruans. Rutæ folia
xx. nuces iuglandes ii. caricæ ii. salis gruminum i.
Hæc ieiuno præsumenda dato, & à nullo letali phar-
maco lædatur. Alia antidotus Asclepiadæ, ad ex-
stingua uenena, quæ antè data adseruat : si uero ab ac-
cepto ueneno detur, ipsum cognobile facit. Baccarū
iuniperi drac. ii. terræ lemnis quæ sphragis dicitur
drachm. ii. contere, & melle aut oleo excipe. Vsu ue-
ro expetente ad nucis ponticæ magnitudinem ex a-
quæ mulsæ cyathis ii. à balneo bibendum præbe.
Hoc quidem igitur pharmacum si nulla letalis adsit
uis, sumptum manet, neque per uomitum reijcitur.
Si uero quippiam letale haustum sit, nauseam mo-
uet, & uomere cogit, ut acceptum uenenum una cū
antidoto excernatur. Quidam dimidiam tantū par-
tem lemnis terræ, ex iuniperi baccis coniungunt, &
cum oleo omphacino subactis, similiter utuntur.

Quomodo cognoscantur qui uenenum sumpse-
runt. Cap. XLVII.

Cognoscere autem & discernere oportet eos qui tale
quippiam sumpserunt ex signis quæ coincidunt &
consequuntur. Vbi enim in aliquem placidæ & be-
ne compositi prius mentis, & bonæ fidei habi-
tudinis, accedente etiam iusta ciborum concoctio-
ne, statim & derepente uariæ accessiones irruant,
præsertim ab accepto statim cibo aut potu, ueluti si

accedat tussis, aut foetida sanguinis per os relectio,
aut molesta & ægra lotij excretio, aut dolor in al-
to nitens, aut ardor iuuenilis & uehemens, aut sen-
sus erosione, aut stuporis perculsio, punctura item,
tremor, singultus, contractio, eruptio bullarum, li-
uor, tumor, coarctatio, quarundam partium pu-
trefactio, uomitus foetidus & plenus, manifesta ali-
cuius uenenosæ qualitatis apparitio & demonstra-
tio. Ex his omnibus si quid repente ab accepto ci-
bo sano homini accidat, ueneno infectum esse hunc
ipsum existimandum est.

Cōmunia remedia & cura omnis ueneni. Cap. XLVIII.
In his igitur qui ignari uenenum sumpserunt, aut qui-
bus circumtectum exhibitum est, communibus re-
medijs est utendum. Itaque ubi adhuc datum uene-
num in uentre est, & ob id morsum & nauseam in-
fert, aut etiā alias accessiones, euestigio ad uomitum
infectus cogendus est, aut mox inde à ueneno uide-
licet accepto, sua sponte, aut aqua & oleo tepidis in
potu datis, aut butyro, si oleum nō adsit, cum aqua
calida dato. Licebit & maluæ decoctum exhibere
cum oleo, aut foeni græci, aut seminis lini, aut fursu-
rum, aut prisanæ succum, aut seminis urticæ decoctū :
unumquodq; ex his oleo ammixto. A uomitu au-
tem raphanos multos edendos dato, aut cū aqua te-
pida tritos absorbendos : aut si hæc non adsint, nitrū
cum aqua præbeto, rursūq; uomere iubeto. Post
sufficiētem uero uomitum communia remedia pau-
lō mox dicēda in potu exhibeto. Dato etiā id quod
ex iuniperi baccis & terra lemnis est præscriptum.
Quod si uenenum antea ad intestina descenderit : &
tormina circa umbilicum induxerit, clysteri effica-
cissimo aluū euacuare oportet, ex maluæ uidelicet,
althææ, foeni græci, fursurum, centaureæ, aristolo-
chiæ, & similium decocto, mellēque & nitro largo,
itemq; oleo ammixto. In cibo uero exhibeatur ra-
phanus, & salsamentum, alliaq; & cepæ. At in potu,
uinum recens mari mixtum. Si uero in uescam im-
petum fecerit uenenum, in aquā & oleum utere de-
fessu, ita ut in aqua ipsa foenum græcum, ac lini se-
men, malua syluestris & satia, ammiq; semen sint
decocta. In potu etiam idem ammi semen præben-
dum, aut apium, aut foeniculum, aut spicam nardi,
& similia odorata, & simpliciora urinam cientia. Si
uero uescam rodat uenenum, cucumeris semen de-
squamatū & tritū cochlearij mensura ex passo
diluto præbeto. Similiter autem & si uentrem uehe-
menter exurat, idem semen dato, ab omni calidiorū
rerum adhibicione abstinendo : & his quæ ad
cantharidem & buprestim referentur utendo. Cæ-
terum ad cutem iam delato ueneno, irrigationem
adhibeto, & illirionē ex oleo modico calido, in oleū
item aut aquam & oleum in solio defessum. Cibus
autem facile digestibiles & sorbitiones cū melle ex-
hibeto : piscibus item recentibus teneris, & uolucris
facile concoctilibus utitor. In potu deinde ui-
num album & rufum, uetus & quā odoratissimū
præbeto. Quod si ad caput decurrat uenenū, ut gra-
uitas & sopor consequatur, primum quidem aluus
per infusum ex foeni græci, seminis lini, althææ & cu-
cumeris syluestris maximè radicis decocto subdu-
catur. Deinde sternutatorium ex strutio & pipere
adhibeatur, & cyclamini succus aut elaterij naribus
infundatur : odora menta item admoveantur casto-
rium

rium, & similia cum aceto diluta. Præterea & præferuantibus præsidij utendum est, eoq; quod ex nucibus & caricis constat, & quod ex iuniperi bacis ac lemnia sphragide apparatus, & theriaca Andromachi ex uiperis, & Mithridatis antidoto, & consimilibus. At uero si composita non adsint, parabilibus utaris, & communiter ad omnia ferme uenena destinatis. Communiter autem ad omnia letalia uenena facit trionis semen cum uino & oleo. Lemnia sphragis cum uino: egregie enim & quam celerrime uomitum procurat. Aut nuxes iuglandes cum caricis & ruta edat, aut hæc ipsa decoquito, & decocto accepto uomat, aut seminis lini, aut maluarum, aut foeni graeci decoctum cum oleo sumat. Porro ad accessiones quæ cum frigore incidunt, abrotonum in aceto mulso cum sale dato: item trionis semen, eryngii radicem, spicæ celticæ radicem, serpillum, bryoniæ radicem, castoreum, porri succum, laser, sagapenum, opopanaca, succum cyrenalcum, rutæ syluestris semen. Polij etiam ac scordij & betonicæ, cuiusque drachmam unam cum uino aut aceto mulso.

Ad eos qui cantharidas hauserunt. Cap. XLIX.

Qui cantharidas acceperunt in corpus, his statim uirus eorum in nares distribuitur odore picis. Picis item aut cedriæ qualitas linguæ inferri uidetur. Sequitur autem & stomachi morsus, uentrisq; ac renum, & maxime uesicæ. Quandoq; & sanguinis excretio per urinam & aluum fortes morsus concomitatur. Vnde sanè locus circa os uentris uementer dolet, adeo ut ipsum pectoris os, quod chondrum xiphoidæ à capitis gladii figura Græci appellat, dolore affici putetur. Inflammatum autem & dextrum illud: deinde urinæ ejcendæ difficultas, imò & supressio cõsequitur. Amplius autem & uis uisiva oculorum consumitur, delirantq; & à loco in locum iactantur. Cæterum auxilium sentiunt, si quam celerrime uinum dulce eis præbeatur, nucleis pineis recentibus aqua calida præmaceratis ac probe tritis ei ammixtis, aut cucumeris semine decorticato similiter ammixto. Lac etiam assidue cum melle modico primum exhibendum, postea & per se recens mulctum. Aliquando & adipem anserinum aut gallinaceum liquefactum potui adfundito, aut terræ samiac drachm. i. aut rosmarini drach. i. ex aqua mulsa dato. Dada etiam iura pinguis porcina, aut ouilla, aut anserina: carnes etiam agninae, gallinarum, porcellorum recens natorum pingues ac probe coctæ, & cerebella porcina: amplius autem de iure absorbendum præbeatur, donec affectus ad uomitum concitetur. Bibat insuper uinum dulce tepidum plurimum dilutum, ubi biberit autem, unumquodq; uomitu reijcet, rursusq; bibens uomat, idemq; sæpe repetitis uicibus faciat. Post uomitum uero lac recens mulctum, aut prisanæ succus, uel halicæ, aut oryzae, aut maluarum, aut seminis lini succus cum adipe anserino uel gallinaceo per clysterem infundatur. Quod si exolutiones & morsus oboriantur, lac bubulum recens mulctum assidue bibendum & citò reuomendum exhibeto. Aut uitis germina contusa cum passo diluto dato. At uero contrariæ affectionis ratione quantum nihil aliud his auxiliatur cantharidum alæ & pedes cum passo potata, & scorpij radix tria ex passo potata, quæ itidè optime ad buprestim facit. Dandum & ex uiperarum theriaca parum quid,

aut ex Mithridatis antidoto. Porro ubi accessiones fuerint sedatae, farina hordeacea cum aqua mulsa illo imponatur, & uniuerso corpore ex oleo gleucino aut cyprino illito, æger in balneum deducatur, & in solio diutius moretur. Cibis autem facile concoctilibus, & acrimoniam lenientibus multo tempore utatur. Vinis item dulcibus & lactis potu.

De bupresti.

Cap. L.

Buprestis species quidem est cantharidis, uerum uirosi tum gustus, tum odoris. Ab eius autem haustu uehemens stomachi & alui dolor consequitur. Intumesceat item os uentris, uenterq; ipse ac totum corpus attollitur, quemadmodum in hydropicis fieri consueuit, & lotium cohibetur. Cæterum eadem remedia quæ ad cantharidas dicta sunt, etiã ad buprestis summptionem exhibentur. Proprie autem post uomitum à iusculis pinguibus & passo coctatū, & post euacuationes per clysterem, ficus aridæ pingues in cibo cõueniunt, & decoctū, ipsarū in potu cum uino. Cõmodissimū autem tum his, tum qui cantharidas acceperunt, est mullebre lac ex ipsis mamillis assidue exuctum.

De eruca pini.

Cap. LII.

Eruca pinus potata, statim dolor circa os & palatum oboritur, & linguæ inflammatio fortis, & stomachi aluiq; ac intestinorum adflictio uehemens, cum pruriginoso circa interna sensu. Ardor ite per totū corpus, & stomachi fastidiū. Cæterū eadē his auxiliatur quæ ad cantharidas sunt relata. Proprie autem oleum melinum pro simplici oleo exhibitū, & uomitu reiectum.

De salamandra.

Cap. LIII.

Salamandra animal simile est stellioni, asperius & scabrum magis quam lacerta uenenata. Penetrat autem hoc animal per ignem ardentem, nihil quæ læditur dissecta & discedente ab ipso flamma. Si uero per tempus aliquod in igne immoretur, consumpto frigido in eo humore, exurit. Comitatur autem salamandrae acceptionem, inflammatio linguæ: mens impedita & turbata: tremor quæ cum stupore quodam & exolutione. Quædam etiam corporis partes per ambitum liuescunt, adeo ut etiam decidant sepius putrefactæ: primum equidem maculae albæ per corpus apparent, deinde rubræ, postea nigræ cum putrefactione & defluuio capillorum. Danda uero & his quæ in cantharide sunt relata, ut inde uomant. Proprie autem resinam pinus cum melle tritam delingendam præbeatur etiam galbanum cum melle, aut nuxes pineas tritas cum chamæpityos decocto: aut urticæ folia lilijs incocta cum oleo. Præter opinionem autem eis auxiliatur ranarum iusculum, si eryngii radices in eo coquantur.

De lepore marino.

Cap. LIV.

Lepus marinus reperitur ferme in totum inter loligiones, animal paruum, uirosum odorem habens. Comitatur autem eos qui eum in corpus ingesserunt, sapor in ore similis piscibus uirosus: paulo uero post aluum dolitant, & color corporis ad arquatū similitudinē permutatur, deinde plumbeus redditur, cum faciei tumore. Incenduntur autem pedis platae, & pudendum tumefactum cohibet urinæ effusionem: progrediente uero malo etiam cærulei coloris lotum emingunt, quandoq; etiam sanguinolentum. Deinde nauseabundi facti biliosa uomunt sanguine permixta, & piscium loturam olentia. Exudant ite graueolentia, & omne piscis genus auersantur ac

odio habent præter cancerum. His igitur lac asininum recens mulctum cum passo assidue præbeatur, aut si hoc non adsit, bubulum, aut malug decoctum. Indeque confectum uomant, deinde radicis cyclamini tritæ drach. iiii. cum uino diluto dentur. Aut uera tri nigri drachmam unam, aut scammonia scrupuli duo cum bubulo lacte aut aqua mulsa. Aut mali punici acini, uel cedrides, hoc est, cedri fructus triti ex uino. Aut picem liquidam, aut cedriam modicam cum passo deligendam dato. Anseris item sanguinem adhuc calentem cum passo bibendum præbeto. Edat & caneros assidue: piscem enim nullum admittit. Signum porro salutis iudicabile, si piscem edere possit.


De rana rubeta.

Cap. LVIII.

Ranæ rubetæ duæ sunt species: Altera quidem surda est: altera uero non. Surda autem exitiosa censetur. Pascitur autem in arundinibus roris lectu uiuens, ex ea sanè uenenum apparatur. Quod qui acceperint, sebris comitatur, extremæ partes incenduntur, frequenterque anhelatione ac difficili spiratione anguntur. Tumor autem sequitur corporis cum pallore buxco intonso, foetorque oris & singultus. Quandoque etiam seminis inuoluntarium profluuium contingit. Ceterum facile opem reperiunt, si post aquæ & olei uomitum, uinum meracum multum sumant, aut picem cum uino. Radicem etiam harundinum, in quibus ranæ rubetæ pascuntur, contusam ex uino bibendam dato, aut cyperum ibidem enatam pondere drachmarum duarum ex uino. Aut maris testudinis sanguinem cum leporis coagulo & cumino ex uino præbeto. Porro dolium insuper aut furnum igne seruofacto, ignemque extracto laterem imposito, & ægrum immitit, multumque ac diu exudare iubeto. Cogatur autem & ad continentem inambulationem, cursumque ac exercitationem, propter contentum in ipsis stuporem. Vehementer enim efficax exercitatio in ipsis existit. Quotidie etiam lauetur.

De ranapalustri.

Cap. LV.

 Qui ranam palustrem acceperunt appetitione priuantur, sequiturque oris humectatio, nausea, uomitus, & oris stomachi leuor morsus. Curantur autem uini multi potu cum omnibus que calfactoriam uim habent: uelut est cyrenacus succus, laser, silphium, cuminum, piper & similia.

De hirudinibus.

Cap. LVI.

Hirudines cum aqua deuoratae faucibus adherent, aut iuxta quemplam stomachi locum, aut ipsi ori ueneris: & primum quidem sensim exugunt sanguinem, expletæ autem his que deglutimus, uiam obstruunt. Superexpletæ uero etiam sanguinem quem exuxerunt foras profundunt, ut imaginationem inducant tanquam sanguis ex internis locis reieceretur. Ceterum qui affectis contingit exuctionis sensus, is signum sit tibi hirudinem deglutitam esse. Excutit autem ipsas muria continue & paulatim absorpta, atque id eo magis si acida muria sit, & laser ei ammiscetur. Idem facit & nix aceto dissoluta & assidue absorpta. Gargarisset insuper nitrum cum aqua, aut aquam marinam, aut atramentum futorium cum aceto, aut sinapi, aut hyssopum, aut origanum. Si uero inferne circa os uentris hirudo adhæreat, prædicta itidem omnia bibenda dato, præter futorium atramentum, utendum etiam his quæ aluum soluere possunt, aut medicamento purgatiuo. Cum excrementis enim

exire consueuerunt. Nos autem per alij multi esum has eicientes, nullo ex prædictis opus habemus. Quæ postremum gutturi affixæ sunt, hoc modo excutere oportet. Aegrum in solum calida expletum usque ad collum immitto, & frigidissimam aquam ore tenendam exhibeto, eamque frequenter permutato. Egredietur enim inde hirudo frigida appetenda prolecta.

De ephemero.

Cap. LVII.

Qui ephemero quod aliqui colchicum aut bulbum syluestrem adpellant, in corpus adsumpserunt, hos pruritus totius corporis concomitatur, non dissimilis ei qui urticæ aut scillæ irritamentis lacessitus excitatur. Circa stomachum insuper acrimoniam sentiunt & uruntur cum multa grauitate. Inualecente autem malo, per aluum cruentum quiddam ramentosa admixtionem habens effertur. His uelut Salamandra accepta auxiliari oportet, per uomitus uel delict assiduos & infusorum immisionem. Ceterum antequam inualescat uenenum, queret foliorum, aut glandium, aut malicorij decoctum cum uino præbeto, aut origanum cum lixiuo, aut uuas passas pingues tritas cum lacte exhibeto. Mirabiliter autem auxiliatur lac bubulum recens mulctum assidue potatum, & in ore detentum, ut alio auxilio non sit opus.

De dorycnio aut solano furioso.

Cap. LVIII.

Dorycnio siue solano, ut alij appellauerunt, furioso potato, in gustu uelut lactis quedam qualitas sentitur, singultus adest continuus, humectatio linguæ, & sanguis acruatim reijcitur, atque per aluum ramentosa quedam feruntur, quemadmodum in dysentericis fieri consuevit. Antequam uero quid tale consequatur, post uomitum & clysterem, aqua mulsa, aut lac asininum recens mulctum assidue potatum auxiliatur, passum item tepidum cum aniso potatum & amygdalis amaris tribus: pectuscula etiam gallinarum probe cocta, & omne cochyliorum genus crudum & assatum in cibo acceptum, & locustæ & gammari, & iusculum ipsorum in potu.

De aconito.

Cap. LIX.

Aconitum uero quod quidam irim syluestrem appellant, statim dum potatur linguam edulcorat cum quadam adstrictione, deinde paulo post in lingua amarescit, & constrictio mandibularum concomitatur, & oris stomachi morsus, & laterum dolor, pectorisque grauitas ac præcordiorum: materia enim quepiam circa umbilicum innititur, & cum multis flatibus consequentibus corruptio contingit, grauat item caput & tempora contremiscunt, oculi uero turbatores fiunt, & suberuent, ac lacrymas profundunt. Quod si diutius perseueret malum, etiam tremor ac concussio ac tumor totius corporis sequitur. Ceterum his post uomitus & infusa, organi potu succurrendum est, & ruta, marubij, absinthij, erucæ, abrotoni, chamædæac trixaginis cum uino. Aut coaguli ceruini, aut hoedi, aut leporis potu ex aceto. Aut ferri recrementum, aut ipsum ferrum, aut aurum siue argenteum, aut lapidem molarum omnia igne candefacta in uino exunguit, ipsumque uinum calidum bibendum præbeto, aut lixiolum cum uino dato. Aut pullum gallinaceum tenerum & pinguisimum coquito, & decoquendo eliquato, donec ossa sola relinquantur, & iusculum per se uel cum uino bibendum exhibeto, facit & utulinum pingue ius potatum, &

uomitus

vomitum reiectum. Maxime uero propriè facit trixago potatâ & castorium, & iris ac ruta. Quanquam aliqui à nullo horum se auxilium sensisse asserant.

De melle quod in Heraclea Ponti nascitur. Cap. LX.

Hoc mel siue in potu siue in cibo acceptum eandem ad afflictiones infert quas aconitum: in Heraclea enim Ponti urbe aconitum gignitur, ex quo colligitur ibidem istud mellis genus. Conueniunt igitur eadem auxilla in aconito iam relata, & magis usque rutæ folia ex uino mulso potata.

De coriandro. Cap. LXI.

Coriandrum potum ualidam & asperam uocem facit, & delirium furiosum, non dissimile illi quod ab ebrietate proficiscitur inducit, hoc accedente etiam quod turpia dictu infecti loquantur, & per omne corpus odor coriandri transpiret. Auxiliatur autem eis uomitus ex oleo irino, & uinum meracum cum per se, tum cum absinthio potatum. Qua item in unum uasculum euacuata conuulsata & tepescita ex muriaque absorpta, ius eidem pingue salsum tum anserinum, tum gallinaceum, passum etiam, & anisum in uino acido siue uappa sumptum.

De psyllio. Cap. LXII.

Psyllio potatum torus corporis frigiditatem inducit, & stuporè cum exolutione & moerore. Auxiliantur autem his eadem quæ coriandro hausto.

De cicuta. Cap. LXIII.

Cicuta potata uertiginem & caliginem oculorum inducit, adeo ut neque minimum cernere possint, singulum insuper ac mentis percussione & frigiditatem: sequitur deinde suffocatio, & segnities ac liuor, postremum conuulsi spiritu in respiratione supresso strangulantur. In principio igitur per uomitum ex aqua & oleo cicutam excutere oportet. quod uero ad intestinum delapsum est, per euacuationem expurgetur. Deinde tanquam ad maximum remediū ad passum meraci potum perueniendum, ita ut in intervalis meraci potus bubulum lac aut asininum recens mulctum, aut absinthium cum pipere in potu exhibeamus. Rutam item & castorium ac mentam cum uino. Aut amomi drach. i. aut styracis drach. i. cum semine urticæ ex uino. Aut lauri folia, aut silphium, aut laser, aut succum tyrenaicum, aut apij semen, aut iridis radicem, aut fœli marsilense, omnia ex uino dulci, aut nitrum cum aqua larga. Totum præterea corpus talescere conducit & præsertim præcordia. Ad uehementiorem item motum, ac cursum æger cogatur.

De smilace seu taxo. Cap. LXIII.

Smilax quæ & Thymion, atque apud Romanos taxus appellatur, potata frigus totius corporis & suffocationem inducit, & celerem omnino mortem. Cæterum remedia eadem quæ ad cicutæ haustum relata sunt, eis auxiliantur.

De succo carpasi. Cap. LXV.

Carpasi succus potatus soporè grauiorem inducit & sensus hebetat absque dolore, exudatione etiā facit, & repentinam suffocationem cum exitiosa saniei reiectione. Opè uero sentiunt ex his quibus curatur qui cicutam hauserunt, & toxicū, atque item ephemeron.

De herba sardonis. Cap. LXVI.

Herba quæ Sardonis appellatur, & ranunculi species est, potata furorem & conuulsiones inducit, malasque contrahit, ut risus imaginem de se præbeat qui eam

haustit, a qua dispositione etiam sardonius risus non admodum boni nominis adagio uulgo circumfertur. Est enim accessio grauis omnino quæ falsi risus prætextu presentem & insperatam mortem inducit. Cæterum qui eam hauserunt, post uomitum, aquæ mulsæ ac lactis potu iuuantur, fotusque ac irrigatione, & pinguefactione totius corporis, per calefactoria unguenta. Immittendi etiam sunt in aquam & oleum calidum, inungendi que ac fricandi plurima post egressum ex folio perfricatione. In uniuersum enim uelut ad conuulsionem curam moliri oportet castorio ite cum passo & per se in potu dato, & si qua ei consilia existunt.

De hyoscyamo. Cap. LXVII.

Hyoscyamus acceptus delirium quali ebrj obnoxij sunt, inducit, & iactatione corporis cum distortionibus. his succedit exolutio animi deliquio similis, & oculorum rubor, pruritus: deinde tremor, suntque omnino deliri, & putant se flagris corpore cædi. Cæterum facile curantur aquæ mulsæ largo & lactis potu, si haberi possit, asininis. Id uero si non adsit, caprinum aut bubulum exhibendum. Facit autem & ad eos uinum salsum, & urticæ semine, similiter & folia cocta ex uino salso. Sinapi præterea, & raphanus, nasturtium, cepe, & allia eis conueniunt unūquodque ex uino salso. At uero quiescere eos conuenit, ut uinum eo melius concoquatur. Auxiliatur etiam eis muliebri lactis exuatio.

De mandragora. Cap. LXVIII.

Mandragoræ radicem nemo latenter exhibere potest, etenim trita quidē liquida grauem quandam & nauseabundum odorem exhibet, & gustus etiam amarulentus est & iniucunda. Certa itidem copia & mensura ad lædendum exhibetur: de cætero uero molestias quidem facit, interitum autem serius inducit. Cæterum ex his qui radicem hanc hauserunt: alij quidem segnes & languidi tristesque ac exoluti fiunt, & refrigerati in grauem ueternosum soporem delabuntur, & si quis eos excitet uix audiunt, & excitati cito rursus recidunt. Alij uero calidi quidem minime fiunt, uerum mente perturbati tarde in obliuionem soporem incidunt. Cura itaque adhuc perturbatis adhibenda est post uomitum, coriandri semine aut pulegio tenuissime trito in potu cum aqua calida dato, aut his quæ uentrem inferne exoluere possunt. Eis uero qui graui sopore pressi sunt, post uomitum, origanum ex aqua frigida exhibendum est: ual de enim inde iuuantur. Dandū etiam absinthium in passo diluto. Caput uero ex aceto rosaceo irrigandum est ægro assidue excitato. Odoramenta etiam naribus admouenda, castorium, ruta, pulegium cum aceto. Porro mandragoræ mala perfecte maturata à quibusdam comeduntur citra noxam, semine tamen reiecto: & si plura quam oporteat edantur, plus somni quam iuxta naturam conuenit, inducunt. Immatura uero & crudiora & præsertim cum semine comesta, maximum periculum inferunt. Sequitur ab eorum acceptione ardor circa superficiem corporis. Lingua uero & os exiccantur usque eo, ut neque salua hæ partes humectentur. Hiant semper, ore citra intermissionem aërem attrahentes. Et si non statim auxilium feratur, conuulsi pereunt. At uero si remedia asserantur, facile curabiles existunt, aquā nanque cum theriaca ex uiperis Andromachi

machl potantes ab omnibus molestiis liberantur. Vehementer autem iuuatur in aqua frigida natatione, maxime si aliquandiu in ipsa immorentur.

De succo papaueris. Cap. LXXIX.

Quemadmodum de mandragoræ radice prædictum est, ita neq; papaueris succum quispiam latenter sano homini exhibere possit, propter saporis proprietatem & amaritudinem ac graueolentiam odoris, & quod certa copia ad interitum inferendum exhibeatur. Quando igitur aliqui uoluntarie hoc pharmacum biberint, siue id manifestare noluerint, siue uolentes dicere non possint, per huiusmodi accessiones cognoscuntur. Sequitur enim eos qui cum acceperunt in somnum grauem collapsio, cum frigiditate & pruritu intenso, ut aliquando ob ipsum excitetur, odorq; opii per totum corpus effertur & exhalat. Inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit singultus, distorquetur nasus, adest pallor, liuor ungulū, præcordiorū diuulsio, respiratio parua & frigida, & per interualla fissuræ ad finem etiam conuulsio. Auxiliatur autē his post uomitionem ex oleo, & acrioris clysteris infusionem, acetum mulsum potatum, & acetum calidum per se, & uinum uetus, rufum, meracum, largum cum absinthio & casia, & nitrum cum aqua. Et origani cum lixiuio, rutæ syluestris semen, piper & castorium ex aceto mulso, satureiæ & origani decoctum cum uino. Oportet autem & hos odorem excitare, & in calidum solium immittere, & fouere ob pruritum, post balneū autem pinguiuscula, & medulla ceruina exhibenda. Manifestum autem quod & his & omnibus qui etiam aliud uenenum sumpserunt, dari debeat theriace tum ante tum post uomitum.

De toxico, Cap. LXX.

Toxicum inde appellatum uidetur, quod Barbari sagittas, quas coxeumata Græci uocant, ex eo illinunt. Concomitatur autem eos qui toxicum biberunt, labiorum & linguæ inflammatio, furor adeo uehemens ut ægri uariis imaginationibus obuersantibus coerceri non possint, atq; ob id adeo etiam ægre curentur, & raro aliquem seruari contingat. Vinculis igitur eos constringere oportet, & cogere ad passum rosaceo potum, & uomitum per immisionem pinularum. Deinde iusculum pulli gallinacei pinguis absorbendum dato. Auxiliatur autem eis rapī semē potatum, magis proprie autem quinquēfolij radix, & sanguis hirē uel capræ, & cortex quercinus cum lacte tritus, & mala cotonea comesta, aut decoctum ipsorum potatum, & pulegium potatum, amomum & carpobalsamum ex uino. Quod si quis periculum effugiat, multo tamen tempore in lecto decumbet; Stupidus autem & dubitans ac uacillans rationis per reliquum uitæ tempus manebit.

De his qui ixiā hauserunt, Cap. LXXI.

Ixiā quæ & ulophonō appellatur potata saporem & odorem ocymo similem habet, linguæ autem inflammationem fortem infert & furorem; recrementorum uias omnes obstruit, murmuratq; ac rugitus intestinorum cū animi deliquio inducit, quum tamen interim nihil excernatur. Auxiliatur autem eis post largam uomitionem & uentris per clysterem subductionem, absinthij cremor cum uino multo aut aceto, aut aceto mulso potatus, aut syluestris rutæ semē, aut silphij radix, aut tragorigani decoctū cū aliquo

ex prædictis, uel cum lacte. Aut resinæ terebinthinæ & nardi & silphij culusq; obol. i. ex uino. Aut castorij & rutæ & terebinthinæ singulorum drach. i.

De chamæleone, Cap. LXXII.

A chamæleonis potu, morsus uentris & linguæ tumor cum rugitibus intestinorum sequitur, facies distorquetur, & uomitus spumosus, & tremores, & conuulsiones, & totius corporis conuulsiones, ac uocis interceptio cōcomitantur, qui uero album chamæleonem hauserunt, etiam strangulantur. Ceterum curantur ex his quæ ad fungos sunt relata. Datur eis & thlaspios & betæ succus, & triticeæ prisanæ succus ex passo, absinthij cremor, & nitrum cum aceto mulso. ubi uero uomuerint, lac recens multum sæpe exhibeto, & aluum cum lubricis infusis eluito, uelut est sceni Græci & altheæ decoctū. Præcordijs etiā somenta ac calfactoria adhibeto.

De fungis, Cap. LXXIII.

Fungorum aliqui genere, aliqui copia noxi sunt. Inferunt autem suffocationes strangulationibus non ab similes, quibus confestim prius quàm penitus uincantur, auxiliari oportet, per raphani aut rutæ foliorū largam comestionem. Dandum & nitrum bibendū ex posca tepida aut aceto mulso, ita ut his liquoribus hyssopum, origanum, thymumq; sint incocta, atq; inde ad uomitum cogantur. mirabiliter autem iuuantur lixiuij ex sarmentorum cinere excolari potu, atq; eo amplius si ex pirastrī ligno lixiuium sit factum, aceto ac nitro ad cinerem eius adiecto. syluestria uero pira, aut arboris ipsorum, pirastrī uidelicet, folia cum fungis cocta strangulandi uim ex eis solunt, insuperq; ab eorum acceptione comesta, auxiliantur. Bibitur & cōmode aristolochiæ drach. i. aut absinthij ex uino, melissophyllō cum nitro, radix panacis cum uino. Nasturdium item uiride edat aut semen bibat. Cæterum Philagrius gallinaceum steracis album inquit, tritū exhibemus ex posca aut aceto mulso, huius enim manifestum habemus experientium quod ad fungorum strangulationes auxiliatur. Oportet autem & acri infuso aluum euacuare. Quando uero quidam fungi à feris uenenum iaculantibus arrosi aut infecti, aut etiā in locis ubi eiusmodi bestię latibula sua habent, chari, non modo suffocationem inducunt, sed & intestina exulcerant, absinthij & ficuum decoctum large in potu exhibendum est, & origanum cum melle, indeq; uomendum, deinde uero theriacē bibat, & in calidam aquā demittatur.

De sanguine tauri, Cap. LXXIII.

Sanguis tauri recens mactatū potatus in aluo in grumos cogitur, ægramque spirationem inducit ac suffocationem; comprimit etiam os uentris, & cōtinuas cōuulsiones infert. Inuenitur autem horum lingua rubra & gingiuæ corrosæ, & sanguinis grumi inter dentes. In his itaq; uomitum uitamus, etenim grumi in ore uentris coadunati uomitum impediunt. Damus autem eis quæcūq; grumos dissoluere possunt, grossos igitur ex fico maxime syluestri succi plenos cū posca & nitro dato, aut fici succum eodē modo, aut lixiulū ex cinere lignorum fici, aut ramulos fici tritos cum nitro & posca præbeto. at uero syluestris fici fructus etiā siccus comestus euestigio grumos dissoluit. Datur & silphij radix utiliter ex aceto, & amarantū, & brassicæ semen, & conyzæ folia cum pi

cum pipere & lixiulo. Alius autem pinguibus & lubricis infusis eluatur.

De lacte in grumos coacto. Cap. LXXV.

Lac coagulatum aut multū & acruatim haustum, suffocationē aliquando infert in grumos coactum. Auxiliatur autē his coagulum omne, maxime uero leporinū ex aceto potatū. Etenim coagulū recētū lacti iniectū ipsum cogit & inspissat, id uero quod iā coactū est, ex natura sua dissoluit. Datur eis & calaminthæ uiridis succus, aut folia arida trita, & iuniperi baccæ. Item ea quæ ad sanguinem in grumos densatum sunt prædicta. Vomitus uero etiam in his recusamus, neq; quicquam omnino falsum exhibemus.

De Gypso. Cap. LXXVI.

Gypsum potatum in lapidem induratur, ac strangulationem inducit: quapropter eadem auxilia quæ ad fungos relata sunt, huc transferre oportet, ita tamen ut in his pro oleo, maluæ, aut foeni græci, aut ficuū decoctum exhibeamus, aut oleum cum aqua mulsa. His item eadem decocta per clysteres infundenda.

De Cerusa. Cap. LXXVII.

Cerusa ob colorē suum latere nō potest, accepta enim palatū in albat, linguāq; ac gingiuas, in quibus etiā pars aliqua cerusæ reperietur. Infert autem singultus & tusses, linguæq; ac faucium ariditatem: frigescent corporis extrema cum delirio & mentis percussione, & difficili motu siue torpore. His porro aqua mulsa exhibenda est, aut ficuum & maluæ decoctū, aut lac calidum, aut sesamum tritum ex passio, aut lixiulum ex cinere sarmentitio, aut oleum irinum. Omnibus enim oleum large ammiscere oportet, ab uno quoq; uero uomant, facti & scammonia cum aqua mulsa potata.

De argenti spuma. Cap. LXXVIII.

Argenti spuma potata grauitatem stomachi inducit, aluiq; ac intestinorum, cum torminibus uoluulosis intensis, quæ citra umbilicum maxime innituntur. Lotum supprimitur, corpus intumescit, liuescit ac plumbi colorem induit, & articuli incenduntur, ac ardent. Ad finē uero & suffocatio sequitur. Confert igitur post uomitū à decoctionibus lubricis factū, hormini semen, & myrrhæ oboli tres ex uino, aut absinthium, aut apij semen, aut hyssopum, aut piper. Et columbinum stercus cum uino & oleo, aut cum uino mulso & oleo. Si uero nimium proflua sit aluus, lauacra calida, & carnes suillæ pingues assatæ cōueniunt, & aquæ potus, & oleum similiter in potu.

De Argento uiuo. Cap. LXXIX.

Argentum uiuum hydrargyros Græcis appellatū potatum, eadem infert quæ argenti spuma. Consimilem etiam curam expostulat. Auxiliatur autem imprimis lac asininum recēs multum potatum ac uomitu reiectum.

De calce, sandaracha & auripigmento. Cap. LXXX.

Calx, sandaracha & auripigmentum potata dolorem uentris & intestinorum cum uehementi morfu inducunt. Iuuantur autem succi maluæ potu, aut seminis lini, aut oryzae, aut halicæ pinguibus iusculis potatis, aquaq; mulsa, & lacte calido, si ea assiduo uomitu reiectent.

De thapsia, ueratro, elaterio & agarico. Cap. LXXXI.

Ex his quæ homini ob cōmoditatē in usum ueniunt, aliquādo uero pericula inducūt, est thapsia, ueratrū album & nigrum, elaterium agaricum. Quando-

que enim & hæc suffocationem inferunt & purgationem ultrā quā oportet. Agaricum uero in quibusdam per aluum nō subductum, tremorem & resolutionem produxit. Suffocationibus igitur, ueluti in fungis dictum est, nos opponemus, aut uelut de albo ueratro relatum est in tertio Sermonē. Purgationes autem ultra modum factas per ea quæ cohibere possunt, sedabimus, & per ea itidem quæ firmitatem corpori addunt, de quibus similiter in tertio Sermonē est prædictum.

De ruta sylvestris & melanthij nocu-
mentis. Cap. LXXXII.

Lubricorū & acrimoniā hebetantium decoctorum potu cum largo oleo opus habent, qui ea hauserūt.

De acruato frigide aquæ potu. Cap. LXXXIII.

Frigida aqua acruatim pota, aut etiam uinum meracum, aut passum, à balneo maxime, aut cursu, aut concitatoribus exercitamentis morsus & dolores inducunt. Verum in his statim uenam secare oportet, & per clysterem euacuare.

De strangulatis. Cap. LXXXIII.

Strangulatis, adhuc tamen inspirantibus, & aërem attrahentibus sternutatorium naribus admotum auxiliatur, & uenæ in cubito sectio. Piper autem ex aceto siue posca bibendum dato, & ad uomitum cogito. coartatis deinde collis locis aquam & oleum calidum adhibeto, aut anethinum calidum, aut adipem anserinum. Iam super mollibus collum amplectendū est ac fouendum.

De his qui ex alto ceciderunt. Cap. LXXXV.

Ex alto præcipitatis euestigio auxiliantur uitis sarmentum aquæ incocta, si aqua in potu sumatur. Quod si æger potam aquam nō ferat, sed uomitu reiiciat, morietur. Si uero is qui cecidit, sanguinē expuit, & uenarum ruptura sit suspecta, sarmenta ipsa urito & aqua restinguito, ipsamq; aquam percolatam bibendam dato, quo inde sanguinis grumi dissoluantur. at uero sarmentis non præsentibus cinerem quēcunq; pelluit, & lixiulo inde utitur.

De præseruantibus & præfagis animarum.
libus. Cap. LXXXVI.

Quando uero & præseruatua quædā ac præfaga animalia descripta sunt ueteribus, quæ iuxta contrariæ affectionis rationem uenena produnt, ex his etiam magis probata eligemus atq; hic apponemus, quo uniuersus sermo huius tractationis perfectior fiat. Piso itaque in libro de animalibus ait: perdicem qui domi nostræ connutritur uociferari ac clamare circumplicareq; ac lacerare cortem in qua perdices cōnutriuntur, ubi cognouerit medicamentum quodpiam intra ædes parari aut aliud uenenum. Menelabus autem, aquila, inquit, intra ædes connutrita insit & arcet eos qui talia moluntur. Simonides uero pauonem tradit, cognito apparato medicamēto, ad locū prodire & clamare, seq; expandere & medicamētum ex uasis dispergere, aut etiam effodere, si quis dem sit sub terra defossum. Aristodemus porro ichneumonē domi nutritū medicamenta sub terram defossa præfagire scribit. Pherecydes autem narrat psittacum marem obseruare & arguere ac nominatim deferre eos qui talia faciunt, aut in domum important. Cæterum post præscripta uenena, etiam antidotos multi usus & commoditatis, experimen-
tōque cognitæ ex ordine subnectemus.

De the-

De theriaca ex uiperis Andromachi. Cap. LXXXVII.
Ordinemur autem à theriaca Andromachi ex uiperis: Cuius admiratione ductus Galenus hæc de ea scribit. Quum multa discordia sit circa theriacæ descriptiones, nos Andromachi descriptione ut lōge optima usimur, quæ etiam in regum usus apparatus. Fit autem apparatus eius hoc modo. primum quidē scilliticos pastillos apparare oportet, propterea quod resiccatione per multos dies opus habent. Apparantur autem hoc modo.

Pastillorū scilliticorū preparatio. Cap. LXXXVIII.
Scillam accipere oportet recentem, probe coactam, rufam & non ualde magnam, eamq; non, ut quidam faciunt, luto, sed fermento mundo integere, & in cacabos in quibus panes assantur inditam in furnū ut afficetur immittere. Deinde extractā per ambitū purgare, & acceptis internis partibus tenerioribus eas ipsas probe terere, & farinæ eruinæ ex eruo rufo recentis factæ, duas tertias scillæ partes inspergere, ita ut erui quidem libræ sint duæ, scillæ uero tres. Quamquam aliquando ex æquo ambo commisceantur. Hæc ipsa inquam, unire ac committere oportet, indeq; paruos orbiculos formare, rosaceo oleo in his conformandis adhibito, deinde in umbra resiccare, atq; bis per singulos dies uersare.

Hedychroi confectio. Cap. LXXXIX.
Ari, asari, amaraci, aspalathi, opobalsami, floris iunci odorati, calami aromatici, phu pontici, singulorum drach. x. xylobalsami, cinamomi, costi, cuiusque drach. xii. myrrhæ troglodyticæ, folij, spicæ nardi, croci, casia, cuiusq; drach. xxx. amomi drach. vii. mastiches drachm. v. uini ueteris odorati dulcis quantum satis est. Arida contundito & cribrato, crocum uero cum uino in pila diligenter terito, deinde myrrha & mastiche adiectis ac probe tritis, opobalsamum adijcito, ac arida inspergito, simulq; comisis omnibus pastillos tenuiores formato, uino in his conformandis adhibito: ipsos deinde pastillos in umbra refrigerato, singulisq; diebus uersato.

Pastillorum theriacorum preparatio. Cap. xc.
Cæterū pastillos theriacos hoc modo apparato. Viperas foeminas accipito, nō quocūq; tēpore captas, sed desinente uere, nondū uero inchoata æstate. si uero uer diutius hybernū sit, iuxta æstatis principium, non ita diu post uergiliarum ortum, quęcūq; enim uiperæ prægnantes fiunt, eas uitare oportet, neq; ad confectiōem pastillorum adhibere. magis enim exasperatæ seipsis redduntur prægnantes. Ipsas igitur accipito quum in latibulis suis delitescere cessant, & de cætero in locos sub diuo egrediuntur, & non adeo malignum habent uenenum. intus enim delitescētia animalia, & calentis aëris uel minime percutis meatus resoluta, nocentiorē & magis exitiosam ueneni uim in se coaceruant. Sunt autem animalia ipsa subflaua, ingentia, & agilia: oculos subrubros habent, collum angustū, & latius caput, & caudam acuatim in tenuitatem abeuntem ac carne penitus nudam, uentrem autē sinuosiorē habent, & gressum circa caudæ summum firmant, caudā ipsam non circunuoluentia, sed magis contorquentia, & lētius inambulantia. His enim signis foemina à mare dinoscitur, insuperq; quod quatuor habet caninos dentes, quum mas tantum duos habeat, & angustius caput, ac crassius collum, & totum corpus tenuius,

caudamq; paulatim in tenuem desinentem, non acuatim ut foemina, neq; omnino carne nudatam. Cauere enim oportet ne mares uiperas in antidoti confectiōem assumamus. Neq; uero minus etiam reliqua serpentium genera uiperæ similia uitanda sunt. Similis est autem uiperæ maxime quidem ammodytes, imò & hæmorrhus, & cēchrias, & seps. Quos omnes ex prædictis in eorum tractatu signis dignoscere oportet, & præcipue ex colore. flauo enim & subfuluo colore uipera est, alia uero genera arenosi sunt coloris, aut fusca, aut nigricantia. Verum non oportet etiam prædicta de unoquoque signa alia negligere. Has sanè uiperas prædicto tempore eadem die aut præcedente omnino captas accipito. ac primum quidem ipsarum capita ac caudas amputato, in tantum sanè, quantum uideris in eis carne nudatum. At uero non amputationis tantum respectum habere oportet, sed & nū statim ex angustia & immobilia ac omnino mortua animalia appareant: talia enim ut inutilia ad antidoti compositionem censenda. Si uero prædictis partibus amputatis, mori quēdam uideris in reliquo corpore superstitem, & animalia ipsa cruorem aliquandiu in se conseruent, hæc ipsa ut optima in antidoti confectiōem sunt ammiscenda. Post hoc uero ipsorum pellem totam diligenter excoriato, adipēque ac omnibus pectori insitis ut inutilibus reiectis, carnes ipsas ex duabus aut tribus aquis lauato, posteaque in ollam puram inijecto, & cōgruentem aque mensuram affundito, ac anethi uiridis fasciculū addito, subiectis que lignis uitis coquito. Quod si effuerat olla, solet enim assidue in decoquendo aqua ebullire & ex olla effundi, quodescunque hoc ipsum contigerit, frigidam aquā irrorato. Modum autem decoctionis sufficētem iudicabis, ubi carnes à spinis discessisse uidebis, penitus que separatas, ut ne quid ex ipsis spinis inhærens carnibus te fallat. Ad manum deinde peluim appositā habere oportet mūdā, & ex iusculo cocturę aliquid cōtinentem, atque in eam ipsam depuratas carnes iniicere. facile enim resiccantur, & proinde difficulter conterī possunt. At uero ubi carnes ipsas puras feceris, ac manibus diligenter expresseris, eas poterato, & in pilam culinariam asperiorē conijcito, ac fortiter aliquādū terito, paulatimq; iusculum instillato. Vbi autem quā tenuissime fuerint tritæ, panis purissimū recentis aridi non ex ueteri farina apparati contusi & cribrati, quartam carnū partem addito, aliquādo autem quintā solum: & rursus paulatim iusculi quod satis est affundito, ac in cōterendo quā diligentissime unito: atq; ita pastillos mediocres tenues formato, modico opobalsamo in his formandis adhibito. eosq; deinde in umbra siccato in domus superiore coenaculo, ad meridiem, aut omnino ad septentrionē sito. Versare autē ipsos assidue oportet quo æqualiter resiccantur, & ne aliqua pars diutius humecta permanēs, putrefactioni obnoxia fiat, & periclitetur. Postquā uero sicciores fuerint facti, eos opobalsamo optimo oblinito, & in uitreo uase adseruato: ac quicquid puluerulenti & albi ex eis per sitū productū est post dies aliquot linteo extergito. perforantur enim, si id ipsum eis diutius adhærescat.

De reliquis que in antidotū conijciuntur. Cap. xci.
Cæterum simplicia pharmaca quæ cum tribus antea præparatis pastillis in antidoti confectiōem conijciun-

conſciuntur hæc ſunt. Paſtillorum ſcilliticorum drachm. xlviii. paſtillorum theriacorum, drachm. xxiiii. maſſæ hedychroi, drachm. xxiiii. piperis nigri drachm. xxiiii. opij Thebaici recentis, drachm. xxiiii. roſarum ſiccarum repurgatarum, drac. xii. ſcordij cretici, ſeminis buniadis agreſtis, cuiuſq; drach. xii. iridis illyricæ non corroſæ, drachm. xii. agarici, pontici albi, drachm. xii. cinamomi, drach. xii. aut caſiæ duplum: ſucci glycyrrhiſæ ſicci drach. xii. opobalfami optimi, drach. xii. myrrhæ troglodyticæ drach. vi. croci cilicij drach. vi. zingiberis nõ perforati, drachm. vi. rhei pontici recentis, drach. vi. radicis quinquefolij, drach. vi. calaminthæ montanæ, drach. vi. comæ marrubij in uigore conſiſtentis, drachm. vi. cacuminum & foliorum ſtoechadis, drach. vi. petroſellini macedonici, drach. vi. coſti recentis, drach. vi. piperis albi, drac. vi. aut nigri loco eius drach. ix. piperis longi non corroſi, drach. vi. dictamni cretici, drac. vi. thuris maſculi integri & in partes non comminuti, drac. vi. floris iunci odorati, drach. vi. terebinthinæ chiæ, drachm. vi. caſiæ fiſtulæ, drac. vi. ſpicæ nardi, drach. vi. radicis gentianæ, drac. iiii. comæ polij, drach. iiii. ſtyracis calamitæ, drac. iiii. ſeſelis maſſilienſis incorrupti, drach. iiii. ſeminis thlaſpionis, drach. iiii. ſeminis ammi, drachm. iiii. comæ chamædryos drach. iiii. chamæpityos, drac. iiii. ſucci hypocithidis ſicci, drach. iiii. foliorum malabathri, drach. iiii. ſpicæ celticæ, drach. iiii. aniſi helladici, drach. iiii. mei athamantici, drach. iiii. ſeminis foeniculi, drac. iiii. lemnæ terræ quæ ſphragis appellatur, drach. iiii. chalcitidis ſemiſſatæ, drachm. iiii. amomi racemi, drach. iiii. radicis acori, drach. iiii. phu pontici, drach. iiii. carpobalfami, drachm. iiii. hyperici in uigore conſiſtentis, drach. iiii. acaciæ liquidæ, drach. iiii. gummi uermiculati, drach. iiii. cardamomi drach. iiii. dauci cretici, drach. ii. galbani puri, drach. ii. opopanacis, drach. ii. ſagapeni perſici, drach. ii. bituminis iudaici, drac. ii. comæ centauræ minoris, drach. ii. caſtori, drachm. ii. ariſtologi tenuis, dra. ii. uini ueteris dulcis quātum ſufficit, mellis atici deſpumati libras x. aut quod ſatis eſt.

Modus conſciendi.

Cap. xcii.

Apparatur autem antidotus hoc modo. Sex drachmas caſiæ, & allas etiam xxiiii. quæ cinamomi loco ſunt conſectæ, per ſe tundito ac cribrato. deinde crocum primum in pilam conſectum cum uino probe terito. atq; ubi quā tenuiſſimus factus fuerit, ei cribratam caſiam addito, ac rursus in uino terito, ubi uero caſia ſufficienter fuerit trita, lemniam terrā cum uino modico in alia parua pila per ſe terito, & asphaltum ſiue bitumen ſimiliter diſſolutum ad crocum & caſiam inſiſcito, ac rursus aliquādiu terito. Reliqua uero omnia herbacei generis cum tribus paſtillis & cum caſtoreo tundito & per tenuiſſimum cribrum excutito. ſucculenta autem omnia, acaciā inquam, myrrhā, opium, thus, hypocithidis ſuccū, & glycyrrhiſam, opopanaca, ſagapenum, galbanū & gummi contuſa, in competenti uini meſſura una die antè macerato. ſtyracem uero in pilam magnā ac amplā conſectum cum opobalfamo terito, & priuatim unito. deinde & præmacerata ſucculenta in pilam inſiſcito ac probe terito, atq; ſi opus fuerit, uinum paulatim affundito. poſtquam autē & hæc ſufficienter fuerint trita, ſtyracem antea tritum, & caſiā, &

crocum & quæ cum eis ſunt adſiſcito, & diligenter unito. Chalcitidis deinde bonæ ſexuncem aut amplius in ollulam paruam nouam ampli oris inſiſcito, et ſupra carbonẽs ardentes imponito, ac chalcitidem aſidue cum pura rudicula agitato. Quum uero liqueſceret ceperit, & lutoſam ſubſidentiam acquiſierit, ſtatim ab igne auſerto, poſitaque in terrā ollula quo uniatur diligenter agitato, coagmetatq; paulisper ſiniſto. Deinde ablato & abiecto eo quod in ſuperficie ſiccius & ruſum apparet, ex medio quod uiridius eſt & molle apparet, accipito, ac quatuor drachmas ponderato, eaſq; in mediā pilā inſiſcito, in qua reliqua prius trita habes, cum modicoq; uino in uno aliquo pilæ loco diſſolutas, cum reliquis commiſcito, ac modico addito melle deſpumato unito. Poſtquam uero chalcitidis ad reliqua trita fuerit admixta, omniaq; nigrum acceperint colorem, tunc addito etiam terebinthinā cum modico melle prius diſſolutam. Quæ deinde ammixta, arida etiam cōtuſa & cribrata adſiſcito, & reliquum item mellis paulatim ammiſceto. poſtea cum magno piſtillo omnibus quā diligentiſſime unitis, antidotū ipſam in mortariū transfundito, & piſtillis ligneis ex grauifſimo ligno & poliſſimo fabrefactis, eam ad ſolem expoſita in mortario tundito. deinde probe conſectā ſiniſto, & rursus poſt triduū aut quatrimum ad horas tres tundito, atq; id donec quadraginta tranſierint dies factio; deinde ualiſ uitreis modico melle deſpumato prius ſimbutis excipito. neq; uero uafa ualde expleto, ſed locum quendam quo tranſpirare pharmacum poſſit relinquito. probeq; conſectū ac obligatum adſeruato. Hæc quidem igitur omnia ad pharmacum uirtutem ac conſeruationem ſunt deſcripta. Vt autem nigrum fiat, nõ ſcio quomodo in conſuetudinem uenerit, & ſanè quiſquis hunc colorem eius apparatu nõ adſequitur, is irridetur. Modus uero adſequendi omnibus in promptu eſt. Noſſe tamē operæ precium eſt ex colore pharmacum, uim ipſius minime permutari. Quod uero circa colorem pharmacum offendamus & delinquamus, ob chalcitidem eſt plus iuſto uſtam. ſi enim paruum ſuperuratur rubicundiorẽ antidoti colorem reddit. Si uero amplius, non rubicundiorẽ, ſed à naturali parum immutatum facit colorem. Per meſem porro antidotū ipſam uifiſtare oportet, & rudicula munda agitare, ne id quod in ſuperficie eſt, & quod ualiſ cōtiguū adheret, exareſcat. Cæterum tempore ad concoctionem non modico opus habet, quo matura uſui antidotus fiat, & iuſte concoquatur. Vt plurimum uero per duodecim meſium tempus coadunatur, & cōcoquitur.

Poſt quantum tempus ea ſit utendum. Cap. xciii.

Qui uero ipſa magis uigente & ualidiore uti uolunt, etiam poſt unum meſem ea utuntur, præſertim ad eos qui à uenenatis beſtijs demorſi ſunt, & à uenenolis pharmacis infecti. hi enim quū grauiores malo urgeantur, potentiorẽ etiam ab antidoto auxilio opus habent.

Quanto tempore efficax ſit. Cap. xciiii.

Eſt autem pharmacum ualidum inquit Galenus, uſq; ad xxx. annum in hiſ affectionibus in quibus non tanta eſt nocentis cauſa. Quod ſi uero per tempus ſiccior fiat antidotus, eam in mortarium conſectam & piſtillo tritam, optimo melle deſpumato affuſo, rursus unire ac excipere oportet, atq; id quotieſcūq;

L aridior

ex Gal. 1.
antidot. x

aridior facta fuerit, faciendum est.

Modus probandi theriacen.

Cap. xcv.

Multa igitur ipsius potentiae probandae accognoscenda gratia, aliquod purgatiuum pharmacum prius exhibent, deinde ab eius acceptione antidotum bibendam praebent, atque hoc modo eius iudicationem per comparationem quandam faciunt. Si enim ualida & uigore efficax fuerit, purgationem fieri minime permittit, sua uel exuperans pharmaci purgatiui facultate. Si uero aequae purgetur homo, ueluti si antidotum non accepisset, manifestum sit eam inuolidam & exilem esse, ut quae retinere non potuit purgatiui medicamenti fluxum. Quidam uero papaueris succum duorum scrupulorum pondere aqua dissoluunt, eumque cani aut gallinae uel columbae bibendum praebent. Deinde etiam confestim antidotum dissoluunt, ex eaque nuctis ponticae magnitudinem oris animalis infundunt, neque quicquam mali inde comitatur.

De exhibitionis mensura, & utendi modo, & in quibus conueniat morbis.

Cap. xcvi.

Ceterum facultatis eius mensura non eadem in omnibus hominibus existit. Sicut neque liquor idem est, in quo dissolutam ipsam exhibemus. In uenenatis namque pharmacis, aut uenenum faculantis animalis plaga, nuctis ponticae magnitudine in uini cyathis tribus dissolutam bibendam praebemus. In alijs autem affectionibus tum mensura, tum liquore diuersimode utimur. Secundum affectionum enim diuersitatem, etiam pharmacorum quantitatem competenter metimur, & conuenientem similiter liquorem eligimus. Non enim solum ad bestiarum morsus & uenena a natura sua auxiliatur, sed & ad alias magnas affectiones auxiliare pharmacum per usus experientia a nobis inuentum est. Capitis igitur dolores diuturnos & uertigines sanat. Auditum grauem & uisum obtusum potu sedat, quandoque & gustus organum debilitatum emendat, & comitiali morbo auxiliari consuevit. Auxiliatur & spiritalis, & qui orthopnoici dicuntur ex aqua mulsa potata, dissecas & attenuas ac facile eductiles reddens coactos & uiscosos humores. commodat ueteri ac recenti tussi, & quibus pectoris aut laterum partes dolent, magnitudine fabae, febre carentibus ex uino mulso, febricitantibus ex aqua mulsa. Conuenit & sanguinem per spurum reicientibus siue ex pectore, siue e pulmone eductio fiat, siquidem recens sit elatio cum posca, inueterato autem malo ex aquae cyathis tribus, praestiterit autem aqua ipsam radicis symphyti decoctum esse. Datur autem fabae aegyptiae magnitudo ad noctem & mane. Sepe uero & stomachi uicia curauit, & fastidium eius, ciborumque inappetentiam in eorum desiderium & appetentiam suauiter commutauit. Quin & uentriculi difficilem concoctionem & imbecillitatem corrigit, similiterque & stomacho inflatos, & intestinis tortis, aut eorum dolentes placat. Aliquando autem & cholericae affectioni praeclare auxiliatur, corporis miscellam corroborans, & plerasque cohibens fluxiones. Maxima uero eius efficacia in his qui ex oris stomachi morsu animo linguuntur, cardiacos Graeci appellant, apparet. praemultis enim & assiduus sudoribus corpore diffluente, & uiribus exoluto, quum ex uini potu sepe nihil opis sentiant, antidotum ipsa potu sudores sistit, & uires concidentis uelut erigit ac fortiores reddit. Lumbricorum etiam omne genus mirabiliter

liter ex intestinis exigit, & hepaticas omnesque inueteratas affectiones saepe curat. Arquatum item morbum ex aliqua hepatis affectione obortum strenue sanat. Quandoque & induratos lienes liquefacit, sordibus eorum & superflua substantia paulatim consumptis, atque hoc cum aceto mulso data praestabilius facit. Deterit & lapides renum, omneque terrenum & sordidum ex illis repurgat cum decocto petroselinum, difficilem item mictionem uesicae compescit, & in ipsa ulcerationes quandoque per sanat. Laudatur & ob id, quod omnem insultum diuturni rigoris & algorem tollat, bilisque uomitum accessione exacerbatonum tempore aliquando concomitantem sedet. Maxime uero quartanis conducit, si quis ea ingeniose uratur. Ego igitur, inquit Galenus, multos quartanarios hoc ductu usus facillime liberaui. primum quidem eos per uomitum a coena euacuaui. Deinde sequenti die mane abstinentiam cremorem exhibui, atque ita duabus horis ante accessione antidotum ipsam dedi. & mirabiliter adeo sepe successisse noui, ut confestim nulla accessione qui accepisset, impeteretur. Verum utendi tempus non in principio morbi est, sed quum perfecta concoctio in urinis apparet. Etenim si in principio morborum siue ipsa, siue aliud pharmacum praebetur, congenitatur morbum. Datur & hydropicis cum sisari decocto & similibus, & eam praesertim quae aqua intercutem & Graecis leucophlegmatias appellatur, genere iuuare consuevit, per totum corpus digesta & distributa, atque undiquaque ex carnibus exprimens humorem. Quapropter etiam his qui malo corporis habitatu praediti sunt, optimum pharmacum existit, & elephantiasim saepe curare solet, corruptionem corporis fieri prohibens. Et rigore neruorum conuulsis plurimum auxiliatur. Et membrorum resolutiones in potu accepta saepe per sanauit. Credita est & foeminae menstruas purgationes clere, & immortuos foetus eicere, quos natura propter debilitatem expellere non potest. Danda itaque eis ex passo aut aqua mulsa magnitudine fabae, ruta tamen aut dictamnino in praedictis liquoribus decoctis. Podagra etiam affectis & articulorum omnium fluxione infestatis opitulatur, maxime quum augmenti tempus praeterierit, & status acuminis insisterit, doloribus enim sedatis per ea quae eos mitigare possunt, antidotum in potu praebere oportet. Illatos enim fluores consumit, & alios inferri impedit. Maxime autem profuerit si sani adhuc ipsam accipiant. Superfluos enim humores expendit & totam corporis miscellam permutat. Multa igitur in principio podagrae per assiduum eius potum perfecte ab affectione sunt liberati. Admirari porro subit antidotum, quum ipsam non modo corpori medentem uidemus, sed & ipsum animum saepe ab affectibus male dispositum iuuare potentem. Extrabile enim obortos animi affectus ipsa sedat. Etenim assidue exhibitum pharmacum ex uenis & uicinis partibus atram bilem uelut exhaurit & consumit, quemadmodum etiam ex ferarum ictu illatum uenenum. Quin & aquae formidinem pessimum morbum, quo a cane morsu laborat, saepe tollere consuevit, atque ita mirifice tantorum malorum concursum impugnat. Cognita est praeterea nobis antidotum, ut quae in pestilentibus constitutionibus peste apprehensis unice auxiliari potest. Eos uero qui eam praebuerint pestilenti affectione apprehendi prohibet. Ipsa enim uelut

uelut temperamentum quoddam & sanam constitutionem corporibus inducit, redundantes humores consumendo, & refrigeratas partes concalescendendo, insuper & innatam facultatem corroborans, ad naturales actiones probe obeundas. Cæterum in peregrinando maxime cōsulo ut ea utaris, quum frigiditate aëre per hyemem iter facis. Est enim ueluti bonum ulcerum indumentum, quod plurimam caliditatem ipsis exhibere potest. De Mithridate sane magno illo belli duce referunt, quod theriacem quidem non biberit, neque enim adhuc in usu erat: uerum ex alterius antidoti, quæ postea Mithridatica ab illo appellata est, usu, ita corpus apparauerit, ut nulla ueneni uel lædi posset, & quum etiam letale pharmacum accepisset, mori non posset. Quum enim ab hostibus uinceretur, seipsum interficere urgebatur, quando plurimo ueneni haustu morē sibi cōsciscere nequiuisset: Quapropter uocato quopiam ex amicis ei iugulum præbuit. Quare uides multæ mixturæ pharmacæ multam etiam uim habere, quo corpora ex eorum usu corroborata, nullis ueneni affectionibus uel raro & difficulter admodum obnoxia reddantur, atque hac facultate uel in primis theriacem præditam esse constat. Porro tempus exhibitionis commodum est, quum probe concoxerit, ipsam accepturus, neque ciborum copia sit oneratus. Bibat autē ieiunus, quo sufficiens tēporis interuallum super sit ad ipsius pharmaci concoctionem. Anni præterea tempus, si mulq; regionem inspicito, in quibus ipsum es exhibiturus. Aestate enim neque in totum dabis. Quapropter etiam eis qui in ætate uigoris sunt, & plurimum habent naturalem calorem, neque multum, neque sæpe pharmacum ipsum exhibere moneo: Quæ admodum contrā eis qui iam uergente & adfecta ætate sunt, tum plurimū, tum sæpe cum aqua, quam potius cōsulam ut cū uino accipiatur. In pueris uero pharmaci exhibitionē omnino uitare oportet: Maior est enim pharmaci facultas quam uires eorum tolerare possunt, & corpus sanē facile dissoluit, & insitū spiritum cito extinguit: Quemadmodum & lucernæ flammam oleum ipsum, si ignem superet, facile extinguit. Atque ego uere id narrare possum, inquit Galenus, puerum quendam ab intempestiuo antidoti usu exolutum esse. Omnē nāq; ipsius habitum pharmacum ipsum dissoluit, & uētre fluore cōmouit, atq; ita noctu puer expirauit. Quod si aliquando calidiorē regionē inhabites, uitare oportet antidoti usum, sufficiente tibi illius loci aëris calore. Vnde neq; hominibus qui sub primo solis ortu habitantes calidissimi sunt, & multum habent illius regionis calorem, antidotum theriacē cōuenire puto.

Sales Theriaci ex libris Martiani, cum quibus consentit Galenus. Cap. xcvii.

Sales ex uiperis hoc modo apparantur. faciunt autem & ipsi ad omnia prædicta moderate, per assiduum usum commoditatem exhibentes: quanquam sint qui eorum auxiliarem potentiā penitus negent, per exustionem dissipari affirmantes ferarum facultatē. Ego uero dicere ausim, eandem quidem potentiam cum theriaca sales non habere, non tamen eorum uim per ignem perire, quum multa sint quæ per ignis familiaritatem meliora reddita conspiciantur, uelut est aurum, & calx, & similia. Viperæ enim integræ uisæ intensiorem & malignam uim per exustionem

deponunt: Temperamentū autem auxiliare & symmetriam ab igne sumunt. Proprie autem in affectionibus cutis curandis sales commendantur, cuius generis sunt leuce, lepra, impetigo agrestis, elephanthis, alphas, scabies agrestis, & raritas ac defluuium capillorum. huiusmodi enim cutis uitia confestim delent, & acris recrementa subter cutem redundantia optime discutunt. Plerisq; enim ex eorum usu sudor prolicetur, atq; ita per exudationem corrupta substantia euacuatur, adeo ut quidā in principio pediculos excluderint intra xiiii. ad summum dies: post hos enim nullus in corpore pediculus apparet. Quidā uero pro pediculis sputa pituitosa reiecta à salium reiectione initium faciētes, deinde paulo post etiā sputa repurgata sistuntur. Licet autem tum in prandio, tum in cœna eis uel, cum quibuscunque edulijs eos accipere uelis, neque ultra ad eorum accptionem prouocare oportet. Tanta enim ipsis insita suauitas est, ut magis uoluptatis gratia eos cōfectos quis dicere possit, licet igitur usque ad iiii. cochlearia per diem ex eis sumere, maxime si cibus prius in uentre sit probe concoctus. Qui enim eos accipiunt, concoquunt melius & cibi appetentiores fiunt, floridius etiam corpus habent, & sensus omnes uegetiores. Suffusiones igitur incipientes & nondum congelatas egregie dissoluit, neq; plane quis suffusionem incurrat qui eos quotidie accipiat. Purgationes itē lunares propter obrurationem aliquam aut sanguinis coactionem suppressas cient. Idē etiam largum & impetuosum mensium defluxū sistunt. Quisquis autem eos præsumpserit omnes uenenorum, & uirus laculatum bestiarum insidias euincet: neq; etiā quum infectus fuerit, & postea statim sales acciperit, periculum incurret, maxime si corporis sui tēperamentum per horum salium usum multo tempore appararit ac ueluti condierit, quemadmodum Mithridatem fecisse dixi. Præstat & pestilenti constitutione instante ad auxiliare hoc & mali depulsorium pharmacum confugere, præsertim si ei myricæ herbā ammiscueris. Morborum præterea omnium medicinales sales existunt, maxime tamen eorum qui in renibus cōsistunt: lapides enim in eis atterunt, & plane marcidus renes restitunt. uertigini uero & dolori capitis inueterato, morboq; cōmittali nulla alia consimilis medela exhiberi queat, si quis eos per integrū annū ex ordine large sumat. Noui & arquatos diurnos, & splenicos, ac colicos, qui frequenter hanc affectionē inciderunt, per eos sanatos, hydropem etiā maxime subter cutem per eorum usum resiccati & ingentem famem, bulimon Græci dicunt, dissolui. Vt quis etiā per frigidum aërem iter faciens minus frigore lædatur, comesti faciunt. Rigores autem per circuitum repetentes diurnos cohibent, & tusses humectas resiccant. Tabidos uero iam mirabiliter ad bonam corporis habitudinē reducerunt paulatim edulijs adpersi: Exolutos autem à languore perfecte reuiuiscere faciunt. Scio nāq; plurimos membrum penitus resolutos per ipsos sanatos. Ad podagrā demum maxime incipientem, & omnino ad omnes articulares morbo affectos unicū hoc edulium cōstructū esse uidetur. Adhortor igitur eos qui à podagra liberati sunt, ut eis continue utantur. Quidam uero uiperas rotas extēdunt & siccant, posteaq; terunt ac eas in posu contra morbum articulorum exhibent. Cæterum

uix satis dignis uerbis assequi queas, quantum diuturnas quartanas & deliria ex atra bile oborta dilatent & remorentur, si ante accessiones, & in interuallis quoque sumantur. Enecat ite omne lumbricorum genus. optimum est etiam per ipsos maxime crassiores, dentes confricare. Non enim albiore tantum eos reddunt, sed neque dens postea laxior factus mouebitur, neque erodetur, neque stuporem incurret. Extrahunt etiam per caput recrementorum copiam, ac caput purgant, & oculos leuiore reddunt. Apparatur autem hoc modo. Viperas accipere oportet magnas, eiusmodi quale praediximus specie eodemque tempore captas, numero quatuor, non ultra biduum postquam captae sunt adseruatas: sed si fieri potest, eadem qua captae sunt die, easdem in ollam figulinam puram magnam coniungere oportet, statimque supra ipsas pro sale ammoniaco, salem communem lotum & exsiccatum iniungere, praestiterit qui dem ammoniacum salem esse, si uero haberi non possit, communis & albi italici modum dimidium, hoc est lib. x. x. iniecto, atque id non in meridie facito, sed mane. Tunc enim rigentes adhuc bestiae ad motum tardiores sunt. Quod si phagi etiam arboris ramulo uiperas caedas, ad motum ipsas tardiores reddes, & mirabile eis soporem induces. Est autem phagus species quercus. Quam igitur uelut dictum est, uiperas salibus grauatis & oppressis, pastillos insuper ad sales adijce hoc modo apparatus. Radicis gentianae, sesquilibra, aristolochiae rotundae sesquilibra, comae cetaureae minoris lib. ii. seminis cardamomi lib. ii. marrubii, scordii, apii, chamædryos, seminis rutae hortensis, singulorum lib. i. Haec omnia in crassas partes contudito, & cum attico melle subacta in v. aut vii. pastillos latiores, quo probe exuri queant, reducto. Hos equidem pastillos eo quo dixi modo preparatos habens ad sales uiperis uiuis infectos imposito. Deinde scillas electas, magnitudine sua manu explentes, recetes v. in tenues partes dissectas pastillis superindito, aliumque dimidium modum italicum, hoc est x. libras alias salis supra scillam & pastillos iniecto, & deinde ollam operculo tria foramina habente obturato, eamque forinsecus totum ro figulino, ut si rumpatur, nihil pereat, oblitito. Indeque sensim igni adhibeto, paulatimque circumlitum lutum torreto, deinde aucta flamma per ficulneorum aut uitis lignorum ollae subiectorum exustionem, uaporem inde per foramina elatum obseruato, primum enim fumus multus caliginosus & turbatus ualde exigens apparebit, significationem perhibens, quod ignis iam feras ipsas contingit. Quo tempore diligenter cauere iubeo, ne quid ex illo fumo per respirationem haurias, aere nimirum per ferarum exhalationem infecto, deinde ubi cessauerit uapor, & flammam quandam exilem per foramina conspexeris egredientem, tunc sane quam optime assatas putato, atque ita olla ab igne ablata, perque diem ac noctem refrigerata, uista per apertam ollam eximito, & cum subscriptis tundito. Sunt autem haec. Seminis rutae syluestris dodrantem, hyssopi dodrantem, nardi celticae sexuncem, stachyos sexuncem. Est autem marrubio similis, non tamen spinosa planta seu frutex, seminis foeniculi montani sexuncem, petroselinum macedonicum trientem, comae organum dodrantem, seminis hormini tosti dodrantem, racemi amomi quadrantem, cacuminum thymi dodrantem. Foliorum malabathri trientem, carniuium luniperorum baccarum lib. ii. seminis corian-

dri sexuncem, piperis longi lib. ii. radice silphii uncias xvii. zingiberis non corrosi lib. ii. seminis satyrii quadrantem. Quidam uero radice satyrii coniungunt sexuncem, pulegii montani sexuncem, seminis menthae sexuncem. Aut si haberi non possit, herbae siccae sexuncem, tordylii & casiae cuiusque quadrantem, seselis malsiliensis sexuncem, cinamomi unc. i. Maxime mopere autem conandum est, ut crassiora ueluti sunt lignosa omnia contundendo attenuentur, neque quicquam ex eis reijciatur. Tusa autem per angustissimum cribrum excutito, bis & ter per eadem cribrella excutiedo, quo quam optime uniantur, atque ita omnia in uitreis uasculis reposito, neque statim uitior, sed post quadragesimum tandem diem. Inueteratum enim pharmacum maiorem commoditatem de se praebet, maxime si extra omnem humiditatem ipsum siccum adseruaris. Ceterum colore non ualde nigrescit. Ego uero, inquit Galenus, bestias ipsas non exuro, sed pastillos ex eis, quorum confectionem in theriaca docui, reliquis quae cum bestiis uruntur ammisceo, & simul exuro, quo eam quam in se habet amaritudinem, per exustionem abijciat, tantam autem pastillorum mensuram adijcio, quantum coelestura assequi possum quatuor numero uiperas habere, & sane sales uere optimi euaserunt, utpote qui neque ex ustione cinerum retulerint saporem, neque nigrum colorem, sed & ob qualitatem usus gratissimi sint facti, & qui uim qua eos proprie praestare praedicant efficacior habent. Efficiunt autem quatuor uiperarum magnae, pastillorum siccorum sextantem & unciae dimidium. Atque hic quidem est totius confectionis salium theriacorum modus. Oportet autem medicum uarie ipsis uti: utpote si sanguinem spuentibus sales hos exhibiturus sit, radice symphyti contusae & cribratae sextam partem ad salis modum addet, ueluti si quinque cochlearijs pharmaci unam symphyti addat. In phthisicis autem siue tabe factis & pectore suppuratis, tridis tenuissime trite aut dictamni sextam partem salis ponderi adijciat. Hepaticis uero chamaepityn, splenicis cyclamini radicem, aut capparis corticem, aut piperis addet sextam partem. Quod si ad podagricos apparare uelis, dimidium praescripti ponderis satyrii auferto, ut tando ne rabioles & membra exoluentes in ipsis excites uoluptates. Ceterum in renibus lapides quam maxime atterunt sales, si carpobalsamum, aut lithosperma appellatum habuerint ammixtum. Si uero uim contra uenena intensiore facere uelis, in salium confectione scordii & marrubii duplicabis, insuperque anatum sanguinem siccum adijcies. Eis uero qui a rabido cane morfi sunt, amplius conferent, si paeoniae radicem addas aut caneros exustos. Opisthotonicis autem qui retro nervis conuelluntur, maxime profuerunt, si castorei & opopanax parum habeant admixtum, in eis sane qui id tolerare possunt. Visum porro exacuit malabathri folium duplato pondere in confectione additum. Concoctionem uero ciborum iuuant si casiae & costi eis sufficiens modus addatur. Ad inflationes autem cuminum adijcto. Urinam amplius ciet dauci semen additum. Quartanas uero amplius soluent, si uerbenacam rectam, & eupatorium, & succum cyrenaicum, aut ipsum laser adsumant. Verum ut summam dicam, Omne quod commodum & habile noueris affecto membro, id ipsum ad sales, siue in ipsorum confectione, siue exhibitionis modo ammisceo. Quin & amariores scilicet sales appa-

tos. Ex his enim quæ cum uisceris uruntur aristolochiam, & scordium, & cardamomum, & dimidium centaureæ detraho, eademque postea cum reliquis quæ tunduntur misceo, imò & stœchadis paræ scordij mēsuram addo, atque ita gustu amariore sales euaserunt, & in usu sanè ad multa mihi commodiores sunt experti. Porro cauendum est ne eos prægnantibus, & ab ubere lactantibus exhibeamus. Et ne pueris, ac tēperamento calidioribus, & præsertim tempore æstiuo, & regione calida, & qui acuta & sicca febre laborant, eos quoquo modo præbeamus.

Antidotus Mithridatica. Cap. xcviii. Hæc ut Antipater & Cleopater tradunt, ista capit, Myrrhæ drachmas vii. obolos iiii. spicæ nardi tantundem, croci drachm. vii. obolos iiii. opij drach. iiii. obolos ii. & dimidium, styracis drachm. v. castorij drachm. vi. obol. i. cinamomi drachm. xvii. polij drach. v. scordij drach. xvii. zingiberis tantundē, costi drachm. xvi. piperis albi drach. v. obol. i. piperis longi drach. xvi. felis incorrupti drachmas v. obol. ii. petroselinī drachmas xiiii. seminis dauci drachm. xvi. casia drach. xv. thuris drach. xvi. succi hypocisthidis drach. vi. & sesquibulum. nardi celtici drac. iiii. seminis fœniculi drac. iiii. folij malabathri drac. iiii. acori incorrupti, phu, sagapeni, carpo balsami, hyperici, iridis illyricæ, acaciæ, gummi, seminis cardamomi citra medullā, seminis pelecini, singulorum drach. ii. lemnis sphragidis, confectiois cypheos, partium scinci iuxta renes sitarum, singulorum drach. ii. seminis thlaspios drach. xvi. gentianæ dra. iiii. anisi drach. iiii. rosarum siccarum mundarum drac. iiii. mei drach. iiii. florum lunci odorati drach. vi. opopanax drachm. vi. galbani drach. vi. obol. ii. opobalsami drachmas vi. obol. iiii. aristolochias drachmā i. hyssopi drach. iiii. marrubij drac. i. chamæpityos drachm. iiii. rosmarini drach. v. terebinthinæ chiæ drach. vi. obol. iiii. mellis atticī despumati quantū sufficit. Vinū ne addas, sed prædissolutis mellē calido succis, indeque tritis ac adiecta terebinthina, inspergito sicca contusa & angustissimo cribro excussa. Vnitoeque & reposito omnia. Datur drachmæ pondere, aut ad summum siliquæ xxxiiii. ex ea exhibentur.

Confectio Cypheos. Cap. xcix. Cæterum Cypheos, quæ in antidotum coniicitur, descriptio hæc est. Vnæ passæ tenuis ac pinguisimæ de tracta pellicula & uinaceis, hoc est, ipsius carnis drachmas xxxiiii. terebinthinæ uisæ drachm. xxxiiii. myrrhæ drachm. xii. cinamomi drach. iiii. floris iunci odorati drachm. xiiii. croci drac. i. bdellij drach. vi. onychos, hoc est, unguis aromatici drach. i. aspalathi drach. ii. & dimidiam, spicæ nardi drachm. iiii. casia drach. iiii. cypersi drach. iiii. & dimidiam, baccarum iuniperi magnarum drac. iiii. & dimidiam, calami aromatici dra. ix. Mellis quantū satis est, uini odorati parum. Myrrham, bdelliū, & terebinthinā uisam concere cum uino ut mellis crassitudinem induant; deinde uinā passam per se probe tritam adijce, simulque tritis mellis sufficere modū infunde, ac reliqua insperge, pastillisque inde formatis utere. Vritur autem terebinthina hoc modo. Terebinthinam conijce in ollam, & triplum aut etiā amplius aquæ infunde, & ad ignem adhibe, nihilque omnino mouendo coque, ubi uero consumpta fuerit aqua & te-

rebinthina attenuata ac inualida reddita, ut digitis confringi possit, eam tolle atque in antidoti confectio nem assume. Si uero insumpta aqua adhuc mollior appareat terebinthina, aliam aquam superfunde, rursumque ad ignem adhibe, donec friabilis reddatur. Datur autem cyphi ipsum & per se commode his qui hepar aut pulmonem, aut rhenes, aut aliquod aliud uiscus exulceratum uel obturatum habent.

De antidoti Mithridaticæ usu.

Cap. c.

Datur itaque ad summum ex præscripta antidoto Mithridatica nucis pōticæ magnitudo. Eis uero qui ad integram ætatem peruenerunt Græcæ fabæ. Augetur autē & minuitur hæc magnitudo in medijs ætatibus. Atque his quidē qui febre carent ex uino danda est, aut uino mulso, aut cōdito, si quidē hepar habeant obturatum, febricitantibus uero ex aqua, aut aqua mulsa. Facit enim ad antiquas stomachi fluxiones itemque thoracis, & ad omnes inueteratas in profundo corporis exulcerationes aut abscessus: facit ad tabidos, & ad uentris inflationes. Et coeliacis medetur, & reducit obtusum appetitum, & bonum colorem corpori addit. Frangit lapides, sanat urinæ difficultatem & atram bilem congregari uetat: scetus immortuos expellit, & ad alias item affectiones conueniens est. Acuit uisum eorum qui eam accipiunt, plurimam autem præsertim præsumpta uim habet, quod non permittat quempiam à letali ueneno ledi, qua grata etiam à Mithridate composita est & appellata.

Antidotus Esdræ aut prophete Doctoris. Cap. ci.

Amomi scrup. xii. floris lunci odorati drachmas ix. pyretri drac. vi. croci scrupulos xxxvi. cinamomi scrupulos vi. aut casia duplū, myrrhæ troglodyticæ scrup. xii. styracis calamitæ scrupu. xviii. petroselinī scrup. iiii. seminis dauci scrup. iiii. tragacanthi scrup. vi. succi hypocisthidis scrup. ix. iridis illyricæ incorrosæ scrupulos xv. seminis fœniculi scrupulos vi. bdellij scrup. ix. thuris drach. i. sulphuris uiui scrup. vi. seminis hyoscyami albi scrup. xxxvii. casia scrup. ix. seminis papaueris scrup. xxx. spicæ nardi scrup. xii. seminis rutæ scrup. iiii. seminis ocymī scrup. iiii. rhois culinarij scrupulos lv. seminis anethi scrupulos vi. asari drach. i. seminis cardamomi relecta medulla scrup. vi. opij scrupulos xxxvii. euphorbij scrup. vi. piperis scrup. xxx. rosarum siccarum scrup. ix. folij scrupulos xii. opobalsami scrupulos xxxiiii. uentris mergi scrupulos vi. laccæ scrup. xii. lycij indici scrup. xii. cariophylli scrup. xii. stercoris reperci in aluo mergi scrup. vi. rhei pontici scrup. xii. mei athamantici scrup. vi. floris nerij scrup. iiii. & dimidium, terræ cimoliæ scrup. xii. succi artemisiæ scrup. uiginti, foliorum seridis scrup. ix. spicæ celticæ scrup. xii. rosarū rhododaphnes scrup. vi. alij etiam castorij scrup. xii. uerum tu castorij scrup. iiii. conijcto. costi scrup. duodecim, gentianæ scrup. xii. confectiois hedychroi scrup. ix. anisi scrup. vi. sisonis scrup. xviii. ammoniaci thymiamatis scrup. xii. Quodque & foliorum citri scrup. duodecim, uini ueteris odorati quantū satis est: mellis despumati primarij libras v. uel vi. Apparatur autem hoc modo. Arida omnia cum croco & castorio ac hedychroo tūdito & per angustissimum cribrū excutito. Opium uero, myrrham, hypocisthidem, bdellium, lycium, ammoniacum in uino macerato. Tragacanthum autē per se macerato. Sequenti deinde die rosas rhododaphnes

& serin terito ac unito, & tragacantho similiter probe trita reliqua trita adijcto, & cum succo artemisiae unito, mel quoque despumatum & tepefactum saepe instillato, ne tragacanthus exarescat. Deinde & arida tusa inspergito, sufficienterque unita probe cōtegitur: in sequentibus uero diebus septem aut nouem in sole terito, & uasis ultreis excipito. Neque tamen uasa expleto; sed locum respirationi reliquum facito.

Vsus eius est ad uenenum faculandum animalium plagas, datur autem fabae magnitudine ex uini cyathis duobus mane & ante somnum eodem modo. Illinitur & plagg, eamque a periculo ulndicat. Eis uero qui letale uenenum hauserunt post uomitus & ante, nucis ponticae magnitudine datur, mane & ad somnum cum ulno. Praesumpta etiam ueneno ulm laedē di adimit. Ad capitis porro dolorem eam in sapa diluta fronti illinito. Dato & ad somnum phasioli magnitudine modica aqua & sapa dissolutam. Furiosis uero ante somnum datur fabae magnitudine ex sapa diluta: dissoluitur etiam cum sapa, & toti fronti & inter supercilia illinitur, per omnem item foris nasum ante somnum, maxime enim somnum inducit. Ceterū ad oculorū inueteratas fluxiones sapa liquefacta ad frontem usque ad supercilia illinito. Ad molares dentes erosos, licetque ad dentium dolores cum sapa liquefacta & calefacta ore detinenda prebe, & confestim quiescet dolor. Ad tussim uero diuturnā & spirandi difficultatē ac orthopnoeā datur nucis ponticae magnitudine nō febricitantibus cum aqua frigida, febricitantibus cum aqua mulsa. Datur autē ex ordine per dies septē ante somnū. Ad tabidos uero subcruenta expuentes & eos qui abscessum internum habent, fabae magnitudine dato cum sapa modica frigida aqua diluta. Dato autem ad plures dies mane, & ante somnum, & sanabitur affectio quantumuis sit diuturna. utere igitur neque eam cōtemnitio. Porro ad diuturnos stomachi dolores ex frigidityate obortos cum sapa cyathis tribus, magnitudinē fabae dato ante somnum: si uero febricitent, cum aqua mulsa. Ad singultum uero ob repletionem aut frigidityatē datur fabae magnitudine ex aqua mulsa ante somnum. Ad hepatis obturationes fabae magnitudine cum cōdito. Ad duriciles uero cum aqua mulsa. Ad splenicos ex aceto aut aceto mulso. Arquato infectis ex uino mulso, hydropicis ex aceto mulso aut uino mulso. illinito etiam cum antidoto tumefactas partes, & tumorē resiccabit. ē lapide laborantibus datur cum sapa: ad urinae difficultatē cum apij decocto, aut petroselinū aut aliquo consimili. Ad profluuium uēris & coeliacis & dysenteriae maxime incipienti, nucis ponticae magnitudine dato, mane & ad somnum ex uino, in febrilibus ex posca diluta confidenter utitor. Ad podagrā fabae magnitudine praebeto cum aqua mulsa. Eliquatam etiam cum sapa affectis locis illinito. Et si quidem principium fuerit affectionis, liberabitur ac euadet. Si uero diuturnū fuerit malum, magnopere luuabitur. Ad coxendices affectos & reliquos articulos corporis fluxione infestatos, eam cum unguento aliquo, gleucino puta, aut Irino, aut sicyonio eliquato, ac articulis illinito. Ad Elephantiasim in principio praesertim, imo & his qui tā malo oppressi sunt, nucis ponticae magnitudine ex aqua mulsa bis per diem dato, eliquatam etiam cum uino toto corpori per nouem ex ordine dies in sole illinito; disce

dit enim paulatim a corpore cutis & ueluti squamulae decidunt, & tota concretio & corporis miscella renouatur. Ad aegre parietes mulierculas ipsam per se ad imum uentrem illinito, & facile partus prodibit. Ad ulcera postremum maligna, & diuturna. incutis superficie oborta, uestis detritae panniculo exceptam imponito.

Antidotus pæonia. Cap. cii.

Antidotus Pæonia uere pæonium pharmacum multo usu iudicatum & approbatum. Amomi scrup. x viii. croci scrupulos x i. radice pæoniae scrup. x ii. seminis pæoniae scrup. x ii. piperis albi scrup. x. piperis communis scrup. x ii. phylli scrup. i x. euphorbiae scrup. i x. spicae nardi unc. i. rhel pontici scrup. x. costi scrup. x ii. petroselinū scrupulos x ii. opij scrup. x v. seminis hyoscyami albi scrup. x ii. alij scrupulos x viii. habet, styracis primarij scrup. x. myrrhae troglodyticae scrup. x ii. casiae unc. i. pyretri scrup. x ii. thuris scrup. x viii. castorij scrup. vi. calaminthae scrup. i x. mellis despumati quod satis est, licetque uini, Opij, myrrhā, thus, cum uino terito: styracem uero cum modico melle liquefactum similiter probe terito, atque eis unito: adiectisque aridis tritis melle excipito ac utitor. Dantur ex ea siliquae ii. i. cum aqua calida ieiunis, frequenter etiam ante somnū prout res urget. Facit autem ad destillationes ē capite, & tusses, puris, repletiones, tabidos, peripneumonicos, pleuriticos, praeter opinionem enim thoracem extra periculum sistit, tum quod a destillationibus, tum quod ab ulcerationibus imminet, etiam si sanguinē relectent. Ad anginam uero ulno mulso diluta utere assidue gargillando, plinnulaque etiam cum melle illini. Ad collicos autem & ex renum lapide affectos excellenter efficax existit. In exacerbationibus enim colicorū febre carentium exhibita euestigio dolores sedat. Si uero febrilis, remissiones febriles obseruato, atque ita exhibeto. Frangit enim calculos, & ab urinae difficultate liberat ea praesertim quae ex crasis humoribus & propter obturationem est oborta. Infunditur etiam & maxime in ipsis colicis uehementissimis urgētibus doloribus cum oleo rutaceo, & statim a periculo liberat. Longas autē febres maxime quotidianā & quartanā facile soluit duabus ante accessionem horis data. Quin & aegros ad residenda corpora optime apparatus fecit. Datur autē non in principio morborū, sed quum perfecta cōcoctio apparuerit in urinis. Ceterū ad pestilentes & populariter grassantes morbos ex uisitato aere obortos in corporibus summe auxiliatur, & in principio sanē data pestilentē prohibuit sepe dispositionē. Praeseruat etiam a dysenterijs & torminibus intestinorū. Inducit & somnos dolori minime obnoxios, neque soporem ac stuporem infert, ueluti reliqua ad leuandos dolores apparatus: uerū somnū tamdiu detinet, quousque pharmacum penetrarit, & causas dolorum dissoluerit. Et sanē multum ex aegris a somno surrexerunt adeo cōcoquendi facultate praestantes, ut oblitū sint an unquam aliquid a principio doluerint. Plura autem his & ultra promissa ei confidere potes. At uero si uisceris alicuius inflammatio adsit, cauere oportet ne exhibeamus eam priusquam inflammatio laxetur. Quod si tamē periculum maximū instet, id ipsum praefatus ac praestatus dato, quo successurū curationi per ipsam aeger adseruetur, eaque itadē uictoriā obtineat morbi.

Antidotus

ade Actuarii
cuius tamē
positio est
uersa

Antidotus aromatica optima, Galli. Cap. ciii.
Facit ad omnes, maxime tamē inueteratas circa os uē-
trīs, atq; ipsum adeo uentrem affectiones, & ad hepa-
ticos. Est stomacho uehementer grata & efficax. Ci-
namomi drachmam unam, aut casie duplum, amo-
mi dextantem, spicæ nardi trientem, folij trientem,
myrrhæ troglodyticæ drachmam unam, casie bē-
sem, croci unc. i. floris iunci odorati unc. i. costi unc.
i. piperis sexuncem, mellis atticī despumati quārum
satis est. Ego autem inquit cinamomi modum con-
duplico, meliorq; antidotus redditur. Datur nucis
ponticæ magnitudinē cū uino, aut uino mulso, aut
etiam cum aqua mulsa, si adsit febris.

Antidotus ex duobus piperis generib. Cap. ciiii.
Antidotus ex duobus piperis generibus, quemadmo-
dum eam describit Archigenes, leuans dolorem, fi-
niens febrem, resiccans & concoquens. Facit ad co-
licos. Hanc etiam Criso apparauit hoc modo. Cro-
ci drachmas sex, casie drach. tres, cinamomi drach.
duas, costi drach. iiii. styracis drach. viii. piperis lō-
gi drach. iiii. piperis albi drachmas quatuor, galba-
ni drach. iiii. myrrhæ drach. quatuor, quidam uero
decem sumunt, opij drachmas tres, castorij drachm.
v. Succulenta cum uino uetere terito, reliqua uero
contundit & cribrato ac tritis adspersito, & mellis
despumati quantū sufficit adiuncto, unctōq; ac adser-
uato. Datur quibuscūq; magnitudinē fabæ, alijs ma-
gnitudinē erui. Colicis uero à cibo præbeto cum ui-
ni austeri cyatho uno. In affectionibus autē circa he-
par & uesicā ex passo dato. Tabidis & pectore sup-
puratis fluxioneq; infestatis ex aqua mulsa. Vitor
& ad quartanas & ad alios diurnos & per circula-
tū repetentes rigores, duabus ante accessionē horis.

Antidotus Athanasia. Cap. cv.
Athanasia ut nunc apparatur, est autē Aegyptiorum
inuentum. Croci, spicæ nardi, folij malabathri, co-
sti, foeni græci, glycyrrhizæ, radicis eupatorij, petro-
selini, styracis, casie, opij, singulorū æquales partes,
mellis quod satis est. Datur ad summū nucis auella-
næ magnitudinē, hepaticis quidē si nō febrilant cum
uino mulso, febrilantibus uero cū aqua mulsa, datur
ad dies ex ordine septem. In angina cū melle delin-
gendam dato, in affectionibus pulmonis & pleuri-
ticis cum aqua mulsa. Stomachicis, & qui non cōco-
quant cibum cū posca. In fluxionibus uero stoma-
chi ac alui in catapota informatā dato, quibus de-
glutitis aquam frigidam præbe bibendam. Ad ex-
ulceratam uesicam & uulnam cum tepida aqua. In
morbo arquato, hydrope, & rhenum morbo cū ui-
no mulso exhibeto. Ad febres diurnas per circula-
tū redeūtes summe auxiliatur ante accessionē ac-
cepta, his qui diurna oculorū fluxione laborāt ad
noctem dato, & frontem ex ea illinito. Hæmoptoi-
cis & dysentericis ex posca ante somnum exhibeto.

Oribasij theriaca qua Marcus Imperator usus est
quæ ante & post infectionem sumitur. Cap. cvi.
Trifolij bitumen olentis seminis, rutæ syluestris, farinæ
erui rufi, aristolochiæ rotundæ, æquales omniū
partes in pastillos redige, & ex eis drachmam unam
cum uino & oleo præbe. Alia confectio ualde bo-
na. Farinæ erui rufi, drachm. xlviii. anisi, semi-
nis sceniculi, ammi, seminis apij, singulorum dra-
chmas octo, mei drachmas quatuor, seminis trifolij,
opopanacis, serpilli, cuiuscq; drach. iiii. cum uino

redige in pastillos, & cum uino ter præbe bibēdos.

Oribasij theriaca ex Bryonia. Cap. cvii.
Theriaca ex bryonia ad uenenatorū animalium mor-
sus & ueneni haustum, ad morsos à uipera & à scor-
pio percussos. Radicis bryoniæ, opopanacis, iridis,
rosmarini, opij, myrrhæ, singulorum drach. iiii. ar-
istolochiæ. drac. v. thuris drac. vi. seminis rutæ sylue-
stris drachm. vi. cumini drach. xvi. alijs tres tantum
drac. habent, farinæ erui drach. xvi. alijs iiii. habēt,
cum uino pastillos informato, atque ter cum uino
præbeto. Philonis antidotus ad colicos præscripta
est. Isotheos antidotus ad tussim relata est.

Antidotus Hadriani. Cap. cviii.
Piperis drachm. xx. seminis hyoscyami albi drach. xx.
opij drachm. x. croci drac. v. spicæ nardi, euphorbij,
amomi, pyretri, cyperi, cardamomi, folij, rutæ siccæ,
casie, castorij, seminis dauci, myrrhæ, petroselinij, cu-
iuscq; drach. i. rosarum siccarum sesquidrach. seminis
apij sesquidrachmā, zingiberis drach. ii. opobalsa-
mi drach. ii. mellis quantum satis est. Datur ad sum-
mum nucis ponticæ magnitudinē, minimum uero
fabæ Aegyptiæ modo. Facit ad colicos ante somnū
data ex aqua calida: Stomachicis & qui reuomunt
cibum ex posca, in urinæ stillididio ex aqua calida,
hæmoptoidis ex posca, dysentericis eam in catapota
redigito, & ab eorum deglutitione modicā poscam
absorbendam præbeto. Tabidis ad noctem cum hy-
dromelite dato, aride uero tussientibus cum melle
delingendā exhibeto. Morsis à phalāgijs & uiperis
cum uino mulso. Educit & menses cum uino mulso
accepta, in quo pulegiū, aut calaminthe, aut ruta sint
incocta. Colicis cum aqua mulsa datur.

Antidotus Acharistos, cui digna gratia referri nō
potest. Cap. cix.
Casie, myrrhæ, piperis albi, piperis nigri, castorij, gal-
bani, styracis, croci, costi, opij, spicæ nardi, singulo-
rum par pondus. Mellis quantū satis est. Datur ma-
gnitudinē fabæ. facit ad omnia diurni temporis
purulenta in thorace, & ad hepaticos cum aqua mul-
sa, & ad colicos eodem modo, ad splenicos cum ace-
to mulso. Reperias autem ipsam & ad alias pluri-
mas affectiones approbatam.

Philagrii Antidotus ex sulphure uiuo. Cap. cx.
Febrem finit, hac, inquit Philagrus, omnino uitor ad
diurnos per circuitū repetentes rigores. Sulphuris
uiui, seminis hyoscyami albi, seminis cardamomi ci-
tra medullam, styracis, opij, myrrhæ, cuiuscq; drach.
viii. costi drac. x. rutæ drac. x. croci drac. iiii. casie
drac. xi. piperis drach. xii. excipe melle attico despu-
mato. Dato hora una ante impetum exacerbationis
ex posca diluore calida, & post modicū interstitiū
dormire iubeto. Somnum enim inducit, atq; omnes
diurnos febrium insultus soluit. Verum nō con-
uenit eā prius exhibere quā bona cōcoctio mani-
festissime ex urinis depræhēdatur. Bene prospicere
etiā oportet, quo is qui accepturus est, redūdantibus
excrementis nō sit onustus, & maxime si febres quo-
tidianę existāt. Datur ad summū, quum adhuc in ui-
gore est pharmacum, nucis ponticæ magnitudinē.

Theriaca Democratis. Cap. cx i.
Medetur hæc moribus animantiū ulrus saculantium,
uiperarum, cerasæ, aspidum, naticum terrestrium
plagis, & paruuarum bestiarum puncturis, itemq;
uesparum. Et marinæ turturis siue pastinacæ ac dra-
conis

conis scitibus, phalangiorū item & scorpionum. Apparatur hoc modo. Iridis illyricæ, zingiberis, oppopanacis, opij, herbæ rosmarini, myrrhæ troglodyticae, seminis trifolij bitumē olentis, cuiusq; drachm. viii. aristolochiæ drach. xi. seminis rutæ syluestris drac. xii. radicis bryoniæ aridæ albisimæ dra. xvi. serpilli, castorij, radicis eryngij, seminis apij, cumini æthiopici recētis, cuiusq; drac. vi. alij dra. xii. habēt, farinæ erui rufi, drac. xxi. Omnia hæc contundito & cribrato, oppopanaca uero cū uino dissoluta, eiq; arida inspergito & in pastillos reducto, & ex eis drac. i. cū uino ueteri meraco bibendam præbeto. Statim enim ut potatur cōmoditatem suā ostendit, facit ad colicū aut uentris inflationes ex aqua ter potatum, facit & ad eos qui intrinsecus aliqua parte dolent, citra manifestam causam.

Antidotus Theodoretus ex anacardijs. Cap. cxii.
Antidotus theodoretos, hoc est, diuinū munus, ad totum hominē utilis est, facit ad uertiginē & omnes capitis affectiones, omniaq; pectoris uicla emēdat, maxime uero suspiriosis, orthopnoicis, tabidis, pleuritidis, hepaticis, splenicis, & quibus exacerbat in uentre cibis, & omnibus diuturnis circa stomachū & uentrem affectionibus prodest. His item qui ex longis morbis se ægre reficere possunt, & qui decolores sunt, & quibus corpus inarquati colorē mutatur, & quibus aqua subter cutem effundi incipit, renum etiā affectionibus, & eis qui assiduo colicū dolore affliguntur, auxiliatur; omnemq; habitū corporis corroboret. Quin & febribus inordinate ueterascētib; atq; etiā per certum circuitū redeūtib; ante accelsionē data prodest. Mirabiliter utilis est mulierculis, quæ purgationis mēstruæ stillicidie ac strāgu latu uexatur, & quæ ab utero suffocatur. Solut etiā uentrem citra molestiā. Educit enim ea quæ iam longo tempore intestinis inhæserūt, & ut semel dicā, est diuinū donum. Huius enim usu in omnibus senties successum. Quod si quis uere & autūno præsertim, semel aut bis ea utatur, neq; circa diætā magnopere delinquat, nullis morbis obnoxius fiet, non solum enim præsentēs affectiones sedat, sed quas etiā futuras timemus impedit. Habet autē hoc modo. Croci, casia, phylli, spicæ nardi, mel, agarici, rhei pōtid, floris iunci odorati, acori, epithymi, piperis, farxiphagi, iridis illyricæ, cariophylli, carpobalsami, myrobalani interni, cuiusq; scrupulos i. x. anacardiorum scrupulos x. aloës scrupulos xxxvi. mellis despumati lib. iiii. Datur ad summū drachmarū iiii. pōdere ex aqua mulsā, aut uino, aut uino mulso, secundū quod cuiq; affectioni cōmodum fore putas. Cæterū si scammonij scrupulos i. x. adsumpserit, præter opinionem flauā bilem purgat. Si uero epithymi scrupulos i. x. acceperit & scammonia scrupulum dimidium, atram bilem expurgat. Id quod multo adhuc efficacius præstat, si pro epithymo ueratri nigri corticis drachmam unam assumat. In pituitosis porro utiliter ad eius exhibitionē colocynthidis medulla tusa & tenuissime cribrata ammiscetur.

Theodoretos aliter apparatus. Cap. cxiii.
Aloës drachmas lx. & filiquas lx. agarici drachmas xxxiii. croci drachmas vi. rhei pōtid drachmas vi. asari drachmas iiii. costi drachmas viii. acori drachmas sex. cinamomi drachmas vi. xylobalsami drachmas quatuor, spicæ nardi drachmas iiii. casia

drachmas vi. mei drachm. ii. chamædryos drachm. iiii. mastiches drachmas vi. piperis albi drachmas iiii. mellis despumati quantum sufficit. Dantur ex ea ad summū drach. iiii. ad emolliendū uentrem. Quod si quotidie ea ut antidoto uti uelis, in aliqua ex prædictis affectionibus, nudis ponticæ aut ampliori magnitudine præbebis. Quidam uero & piperis nigri, & albi, & longi, singulorum drachmas ii. addunt, item amomi, floris iunci odorati, zingiberis, cuiusque drachmas duas, gentianæ insuper drachmas duas, aliqui adiungunt.

Theodoretus per acetum mulsū apparatus.

Cap. cxiiii.

Facit hæc magis ad omnes capitis affectiones, & deliria ex atra bile oborta, itēq; infantiā, facit stomachicis & colicis, hepaticis, atq; amplius adhuc splenicis & hydropicis. Habet cōpositio hoc modo: Spicæ nardi, folij, croci, mel, casia, epithymi, floris iunci odorati, rhei pōtid, myrobalani, cariophylli, cuiusq; drac. iiii. aloës sextantē, carpobalsami scrupulos xvi. zingiberis scrupulos xvi. mastiches scrupulos iiii. iridis trientē, anacardiorū scrupulos iiii. agarici scrupulos viii. corticis radicis fœniculi lib. i. aceti acerrimi sesquiseptarium, mellis sesquiseptarium. Corticem prælotū in aceto per triduū macerato, deinde ut dimidium relinquatur coquito, percolato, & ad acetum mel adijcito, rursusq; ad mellis spissitudinem coquito, atque ubi tepuerit ad arida tenuissimè trita in mortariū addito, & diligenter unito, reponito ac utitur uelut in prioribus dictum est.

Picra siue amara per acetum mulsū apparatus.

Oribasij.

Cap. cxv.

Facit ad stomachicos, colicos, uulua strangulatus, hydropicos. Corticis radicis fœniculi lib. iiii. aceti acerrimi lib. vi. Radices in aceto ad tertias coquito, & percolato aceto mellis libras iiii. adijcito, & ad mellis spissitudinem coquendo redigito, refrigerato, & paulatim ad subscripta tenuissime trita in mortariū addito. Sunt autem hæc. Aloës bessē, iridis sextantē, mastiches unc. i. zingiberis, casia, nardi celticæ, helenij, singulorū unc. i. piperis drach. iiii. mei unc. i. aut si nō adsit, nihil impedit. Datur cochlearij mensura cum aqua mulsæ cyamis iiii. (Est id poculi genus & Aegyptio uocabulo ciboriū appellatur) Ab acceptione etiā aquæ calidæ cyamos ii. absorbeant.

Cyphi ex rebus xxxvi. Cap. cxvi.
Thuris sexuncē, styracis pinguis lib. i. myrrhæ trientē, folij quadrantē, costi trientē, amomi quadrantē, spicæ nardi quadrantē, casia quadrantē, sabine, cardamomi, ammoniaci thymiamatis, iridis, carpobalsami, singulorū sextantē, nardi celticæ, helenij, hypni, floris iunci odorati, aspalathi, cuiusq; uncia unam, mastiches quadrantē, ladani quadrantē, baccarū iuniperi magnarum & paruarū, bdellij, singulorū sextantē, seselis unc. i. cyperi unc. i. croci trientē, seminis cupressi unc. i. alij dra. i. habēt, calamī aromatici dra. iiii. rosas uirides numero quingentas, terebinthinæ depuratæ sesquunciam, caricarum pinguium sexuncem, palmarum pinguium quadrantē, carunculae uuarum passerarum quadrantē, nucum pinearum quadrantē, succi hastulæ regiae uncia unam, mellis sesquilibrā, uini odorati quantum satis est. Arida contusa & cribrata cū liquidis excipito, palmis, caricis, uuis pasis prius in mortario tulsis, deinde mastichen

chen tritam eis addito, & bdelliū ac pīneas nuces ro-
sasq; & thus unūquodq; per se tritū. postea etiā stī-
racē adijcīto, & ladanū per se mortario contusa, de-
inde terebīnthīnā & mel adfundito, & arida infarci-
to. Ego uero thus, bdellium, myrrhā, & ladanum cū
uino tero, atq; ita ad tusa in mortarium conijcio, &
pastillis inde formatis utor. Facit ad capitis dolorē
fronti illitum cū aceto, similiter & ad oculorum lip-
pitudinem cum uino. Ad hepatis & rhenū exulcera-
tiones cū passo, ad obturationes eorundē cum uino
mulso. Tussitibus, tabidis, orthopnoicis cum aqua
mulsa, stomachicis, splenicis, ischiadicis cū aceto mul-
so. Ad tormina, lunaticos & morbum comitialem
cum aqua calida. Datur drachmæ pondere.

Cyphi ex rebus xxviii.

Cap. cxvii.

Aspalathi, bdelli, heleni, ladanī, styracis, myrrhæ, cu-
iusque drach. vii. baccarum iuniperi magnarum l.
paruarum scidē l. succi hastulæ regiæ trientem. Sa-
binæ trientem, croci sextātem, costi sextantem, car-
damomi quincuncem, cyperorum quincuncem, fe-
minis cupressi quadrantē, nardi celtici dextantem.
Alij etiam casia habent sextantem, sphagni siue hy-
pni quincuncem, amomi sextantē, spice nardi sextan-
tem, rosarum siccarum quadrantē, floris iunci odo-
rati, sextantem, nucum pīnearum quadrantem, fo-
liorum malabathri quadrantem, caricarum lib. ii.
uuarum passerum pinguium sextantem, terebīnthi-
næ chīæ lib. i. palmularum pinguium carūculæ lib.
i. mellis lib. v. uini sextarios ii. Apparato & utor
ut dictum est. Etenim quæ ex huiusmodi rebus ad-
parantur, ad prædicta optime faciunt.

Masaphij confectio.

Cap. cxviii.

Croci quadrantē, styracis unc. xxx. ladanī unc. xxi. gal-
bani quadrantem, cariophylli sexuncē, rosarum
siccarum unc. xii. scutellæ campanæ unc. xviii. hy-
pni (canalicula id parua est ex arbore quæ Damasce-
nea dicitur, itemq; ea quæ Rhodacinea appellatur
exorta) bessē, malabathri sexuncem, arnabo unc.
xii. costi, unguis aromaticorum, casia, zacathij,
singulorum sexuncem, asari quadrantem carpobal-
sami unc. xxi. pilularum cupressi quadrantem,
foliorum lauri quadrantē, chachula quod cāchryon
est, unc. i. amomi unc. xii. spice nardi, gummi, cu-
iusque sexuncem. Vini lib. vi. cōtere & ad formam
quancunque uelis redige.

Thymiana siue suffumētum Berenices. Cap. cxix.

Seminis uiticis, melanthij, cornu cerui, samfuci, bacca-
rum lauri, absinthij, sulphuris uiui, bituminis Iudai-
ci, saluæ, radicis cyclamini, artemisiæ, origani, rutæ
syluestris, cumini, castorij, lapidis gagatæ, anisi, co-
nyzæ, rosmarini, buccinorum ustorum, resinæ, sin-
gulorum uncia unam, cedriæ sextātem, picis zacyn-
thiæ pinguis lib. i. Quidam etiam radicis pæoniæ
unc. i. sed nos eam nō admittimus. Omnia cōtusa &
cribrata, cedria, resina, ac pice excipito, in pastillosq;
redigito ac utor. Facit ad anginam potatum & suf-
fitum, ita ut hiantē ore æger uaporem hauriat. Ad
omnem uero uigiliarū speciem uino liquefactū frō-
ti illinito, atq; ipsi forinsecus naso: quin & intrinse-
cus nares sublinito, & super prunas proiectū suffito,
& somnū ægro cōciliabit. Facit & ad oænas sordi-
dū & foetidū nariū ulcus, ipsis naribus ex eo illitis
cū aceto. Fugat animalia uenenata, muscasq; & culi-
ces suffitu. Et ut quidā tradunt, etiam immūdos spi-

ritus arcet. Porro de pharmacis dolorem leuantibus
scriptum est in præcedentibus quaternionibus, Ser-
monis noni Cap. xxxii. & octauī Cap. lv.

De Elephantiasi. Ex libris Archigenis. Cap. cxx.

Elephantiasis à quibusdam leōtiāsis, ab alijs satyriāsis
appellatur. Elephātiāsis quidē à magnitudine & diu-
turnitate affectionis nomen accepit, imò & propter
cutis asperitatem, quæ in quibusdam succedere con-
suevit. Leōtiāsis autē appellatur, quum frons ægro-
rum cum quodā tumore laxior redditur, ad simili-
tudinem pellis flexilis superciliorū leonis. Satyriā-
sis uero dicitur propterea quod malæ faciei iisdem
cum rubore attolluntur, & musculis maxillaribus ue-
luti conuulsionē patientibus, mentum ipsum dilata-
tur, quēadmodum etiam ridentibus euenire solet, si-
militudine quadā ad picturas satyrorū: quin & ala-
critis uehemens ad cōtum ipsis adest, quēadmodū
& de satyris fertur. Est autē grauis morbus & pro-
pè ex eorū numero qui incurabiles existunt, & gra-
uis quidem est ipsi ægro, intolerabilis autē conspi-
cientibus, utpote qui ipsum omnino auersantur, ad-
eo ut & plerique ex necessarijs & domesticis ægri
ipsius cōuersationem deuēnt. Etenim suspicionem
de se præbet malum tanquam sit contagiosum. Atq;
ego sanè malum esse affirmo cum ipsis conuersari:
inquinat enim aēr quē inspirando adtrahimus ex
ulcerum foetore, & ex uiciata spiritus exhalatione.
Cæterum affectio ipsa non solum ob id grauis est,
quod indissolubilem ferè habeat structuram & ap-
paratum, sed quod principia generationis eius fer-
mè sint ignota, quū enim circa superficiem iam ue-
stigia eius apparent, tunc nō gignitur, sed perficitur,
intus à uisceribus initio facto, & progressu usque ad
cutem dilatato: quare non ab simile est, tumentes emi-
nentias etiam in internis oboriri. Apprehenduntur
autem hac affectione uiri magis quàm foeminae, atq;
inter illos magis qui crassum & uiscosum ac atra bi-
le redundantē sanguinem habent, & qui pituitā mul-
tam falsam aut acidam gignunt. Amplius uero &
qui uictu crasso & ægre cōcoctili utuntur, & qui in
otio degunt. Non minus uero his & qui multis ex-
ercitijs inordinate utuntur, & per hoc sanguinē in-
spissant. Itēq; hi qui cibos assidue in uentre corrump-
punt: quod uero ad etatem attinet, pueri & iuuenes,
maxime quo tempore pubescere incipiunt. Regio
uero huius mali inducatrix est, tum quæ ualde calida
est, tum quæ uehementē frigida est. Et altera quidem
ob id quod sanguinem adasset: altera quod frigore
suo eundem congelet, & perspirationes prohibeat,
ac insitum calorem suffocet. Consequitur eos qui
obnoxij futuri sunt malo, segnitie, spiratio tarda,
spirandi difficultas, motus difficilis, assidua cōstri-
ctio alui, urinarū, ueluti sunt lumentorū lotia, excre-
tio, respiratio grauis & foetida, ructus continui, qui
etiā ipsis ægris aliquid molestiæ addunt, appetitus
non obtusi quidē neq; inflāmati, impetus in uenerē
intensus. Iam uero ubi ad cutem progressum fuerit
malum, malæ primum crassiores fiūt & mentū, de-
inde rubescūt, non florido, sed liuido rubore. Et sub
lingua uenulæ uaricosæ fiunt ac nigrescunt: quod si-
gnum est etiam uiscera ipsa in simili cōstitutione es-
se, eiusmodi plane qualis in porcis quibusdam circa
interna uidetur, quæ Grandinis nomine insignitur.
Quandoq; uero & per omne corpus eminentiæ ap-
parent,

parent, & praesertim iuxta summam frontem ac mentum. Corpus praeterea ipsorum magnū esse uidetur, & cuiusdam intolerabilis grauitatis sensus eis adest, unde neque potu neque cibo admodum suauiter delectantur. Pusillanimes fiunt ad omnia, neque praeter uitae amore uitam relinquere & contemnere possunt, neque affectionem ipsam generoso animo perferre. Verū uelut seipsos cōdemnantes se occultant, & notos homines uitant. Quidam porro ex eis, ad modum eorum qui suffocantur aut strangulantur, maxime circa somnos afficiuntur. Quēadmodum igitur perfecte a malo eiusque diuturnitate uictis frustra manum admouemus, ita & abstinere ab his qui iam affectione corripiti & tentari uidentur, planē desperantium hominum est & malignorum. Humanum enim & plenum beneuolentiae signum est, in extremis etiam malis usque ad experimentum, procedere ad difficultatem affectionis compescendam.

Cura elephantiasis affectorum.

Cap. cxxi.

Quum igitur quaedam ex praedictis signa affectionis apparuerint, citra dilationem sanguis auferatur particulatim ex utroque cubito. Reuoluit enim inde aliquo modo insitus calor, ut sensibiliter corpus ipsum alleuetur. Habendus tamen est modus in euacuando. In multo enim inutili & uitiato sanguine parum quiddam genuini sanguinis inest. Post sanguinis autem detractionē paucis diebus interpositis aluus inferne subducatur, & primū quidem colocynthidis pulve utendum est, ex qua cataporia XVIII. nucū ponticarum magnitudine exhibeantur. Eius autem apparatus praedictus est in coxendicum morbi tractatu. Sequenti deinde die XII. cataporia praebentur. Si uero ea accipere recusarit, per hierā nostram purgato. Mirabiliter autem eis cōducit per mensem semel data. Post dies autem aliquot sero lactis scissi utendum, ex eoque nō minus tribus heminis, neque ultra quinque accipiendū. Sit autem lac asininum, si haberi potest, ex quo serū ipsum sumitur. Ammiscendum est etiā ipsi ueratrum nigrū trium obolorum pondere, & scamoniae scrupulus i. ita ut haec ipsa cū modico sero ieiunis praebemus, atque deinde ipsum serum paulatim per se exhibeamus. Hac enim purgatione frequenter utendū esse censeo. Omnino namque conandū est, ut omnē corporis miscellā ab affectione occupatā liquefaciamus, aliāque quādam uelut ex integro regeneremus. Id ipsum uero fiet, si per interualla oportune purgationes adhibeantur, & cibi apponantur qui facile concoqui, & per corpus distribui possint. Post quorum acceptionē uomitus a cibo fiant, deinde etiā a raphanis a ieiunis, postea ad ueratrum perueniendum; ac primū quidem decoctum ueratri exhibendum est, deinde & bulbos ipsius confusos, & ad finē uirgas optimas ex eo praebemus. Id uero quomodo fieri debeat, iam antea diligentissime traditū est in tertio huius tractationis Sermone. Post haec autem uirum refocillatrice diēra utendum est. Ad os uentris & utrinque ad uiscera cucurbita inanīs affigatur. Et primo quiddē circuitu auxiliōrū hoc modo perfecto, rursus ad principiū reflectendum est. Et uenae quiddē sectio utitur: ab hiera uero principium purgandi sumatur, & reliqua consequenter facienda, uelut praedictū est, ter & quater in anno eodem ductu reperito. Maligna enim & difficulter cedens affectio est, quapropter plurima cura

opus est, ne in peius euadat.

De his qui castrantur.

Cap. cxxii.

Nouimus quosdam audaciores qui sibi ipsis testes ferro resecarunt: castratis enim non in peius malum ipsum procedet. Neque enim temere reperias, inquit Archigenes, ullum aliquem castratū elephantiasis laborantem, neque item facile mulierem. Quare etiam quidam ex confidentioribus Medicis manum admoouerunt, & quotquot sanē ex eis ex sectione periculum euaserunt, per consequentis curationis usum perfecte ab hac maligna affectione liberati sunt. Noui etiam quendam qui ualde correptus esse existimabatur, a tali quopiam pharmaco curatum. Aceti optimi & cedriae, singulorū cyamum i. succi brasicae cyamum i. cōmisceto & ieiunis mane praebeto, deinde ad uesperam ordeaceū panem modicum exhibeto cum quopiam uolucriū leuiorū, & per solum hoc maximum curationis sperato successum. Vtere autem ipso per annum, semel in hebdomade ex eo praebens, quandoque tamen bis, quanquā ad usum eius adufectis etiam rigidius procedendum sit, nimirum ad duplam pharmaci mensurā. Quum uero & ad comitalem morbum praecclare faciat, eo sane & ad ipsum utor, & praeter omnibus alijs eius profectum laudo. Facit & brasicae decoctum quotidie potatum, quū ex cedria pharmacum nō datur. Multi etiam sideritū herbam laudant: datur autem foliorum eius aridorū drach. i. ex uino austero. Noui & trifolium herbā bitumen olentem probe huc facientem. Datur autē & ipsa drachmae pondere trita ex uini cyatho uno, aceti uno, mellis una. Eboris etiam & cornu ceruini ramēra cochlearij mensura saepe ad praedictā mensuram ammiscentur. nam & per se ipsum unumquodque eorū potatum utilissimū existit. In regione Indorū elephantiasis affectos assidue per sedē eluere per urinā a lininae infusionē heminae mensura calefactae consueuerunt. Crocodilum item terrestrem accipiunt, eiusque extremas partes amputant, ac interiora prosectant. deinde fermento obuolutū assant, deinde ablato fermento, & scabricie eius derafa, carnis ipsius drac. i. quotidie bibendum praebent, & magnum sanē testimoniū de hoc remedio praebent. Praecclare autē succus cyrenaeus facit, erui magnitudine deuoratus: simul enim ut acceptus est, per omne corpus diffusus uehitur. Aselli item sub aquario uase stabulantes, qui & millepedae appellantur, quinque aut sex numero cum hydromelitis cyamidis iiii. triti potati praeter opinionem tum his, tum suspiriosis, & omnibus suffocatione apprehensis auxiliantur. Multae commoditatis est & scillae semen trium obolorum pōdere in cyatho mellis semicocti delinctum. Asperam enim arteriam a pituita repurgat, & coarctationem uiarum uocis probe dilatat. Similiter autem & pastillorum scilliticorum, qui in theriaces confectionem coniiciuntur drachma una, exhibetur cum uino austero meraco trita. Ex calida autem datur. Theriaca porro ex uiperis Andromachi compendium totius medicationis existit, si post purgationes per modica interualla praebentur.

De uiperarum esu, & de pruritibus, Archigenis.

Cap. cxxiii.

Mirabile elephantiasis remedium uiperarum esus existit, eas uero hoc modo apparatus edere oportet: primum quidem amputato capite & cauda, & de-

tracta

tracta pelle, exemptisq; interioribus uisceribus omnibus caro aqua pura bis ac ter lota, in olla instar anguillarum coquitur, aqua quidem sufficite affusa, & oleo modico cum anetho & porro. post sufficite deinde coctura, iusculum moderato sale condia-
tur, atq; ita ægro in sole desidenti exhibeatur, capite tamen probe uelato. Neq; uero semel tantum aut bis uiseras edere satis est, sed sæpe id fiat, quum extra periculum sit, & insuper commoditatem afferat. Sint autem uisera recens capta, & ex humectioribus locis accipiantur. Nam quæ iuxta mare degunt, uehementer sicciosæ existunt. Vismur & ad ipsos salibus theriacis eos quotidie pro liquamentis ad intin-
ctus exhibentes unâ cum obsonijs. Suntq; tum sapor, tum odore gratissimi. Quin & ex betonica antidorus ad podagricos præscripta utiliter purgâs, etiâ his cõmode exhibetur. Et ut in uniuersum dicâ, propter incidentes ipsis suffocationes, etiâ ea quæ orthopnoicis præbentur, his utilia sunt, utpote quæ crassos humores nō modo in thorace, sed & in toto corpore contentos secant & diducunt. At uero ob id quod ferinus est humor, ea quæ lumbricos enecant, & expellunt, etiâ his danda sunt. Forinsecus porro cuti psilothrum assidue per modica interualla in balneo adhibendū est, oculis probe cõmunis, ne quid ex psilothro in ipsos dilapsus eos lædat. Commode item facies ipsa ex eo illinitur, utpote quæ maxime ab affectione sit correpta: multo etiâ tempore in eius usu perseverandum est, donec cutis ipsa rubescat, non tamen exulceretur. Quapropter ex ptisanæ succo psilothrū appareatur. Ursinus autem maxime aut uulpinus adeps, uel si hi haberi nō possint, taurinus cum sarmentido cinere emollitus, & cum lixiulo coctus probe attenuat eminetes tumores, hoc enim modo etiâ sapo præparatur, quem in usum conuertere oportet, si ursinus aut uulpinus adeps nō adsit. Bona est & portulaca cum aceto trita, & semperulu minus, quod Romani illecebram uocant, & Mercurialis decoctū tum per se, tum cum aridis quibusdam mixtum, & sici syluestris folia arida contusa & cribrata cum aceto illita, & in balneo affricata. Optime facit & decoctum ipsorum, & betæ & ocymo cum aceto tritis aut coctis dignam laudem tribues, si per eorum attritum fueris deterfus. Myrobalanus item cum aceto præstat: probe auxiliatur & alumen cum sale, & sandaracha æquis partibus in uino & oleo maxime lentiscino, aut si non adsit, rosaceo tritis. Aridum quoque inspergimen ad alphos siue uiliginem à nobis compositum liberaliter extergit & repurgat. Est autem hoc. Alcyonium, nitrum, sulphur uiuum, myrti folia, & sici agrestis folia sicca, singula pari mensura contundito & cribrato, deinde cum aceto trita oblinito, & in balneo affricato. Cõuenit & alcyonium assatū cum aceto tritum & affricatum: testæ item ostreorum omniū usq; & cum pari melle ac modico aceto trita. Et acetī fece arida usta, cum sulphure trita in exudatorio loco commode uteris. Amygdalino autē oleo inungito, atque hoc modo corpus forinsecus illinito. Oribasij smegma ad elephantiasin. Pumicis, testæ sepiæ, nitri assati, gallæ, cimoliæ, cuiusque sextantem, gummi unciam unam, arida affrica. Aliud optimum smegma. Nitri assati, pumicis usi, testæ sepiæ usæ, gallæ, cimoliæ, cuiusque sextantem, gummi unciam unam, arido

utere in balneo aut lauacro & aqua marina ablue.

Aliud efficax. Spumæ nitri albæ drachm. xx. cimoliæ drachmas xii. melanthij drach. ii. radici bryoniæ drachmas ii. alcyonij drachmas vi. sulphuris uiui drachmas iiii. radici chamæleonis albi siccæ drachmas iiii. trita in balneo inspergito, & affricato. Aliud smegma. Ad omnem corporis pruritus & humoris atræ bilis fluxionem celebre. Veratri albi unc. i. ueratri nigri unciam unam, baccarum lauri sextantem, cerusæ, pumicis usi, testarum sepiæ ustarum, pompholygis, rutæ uiridis, singulorum trientē, sulphuris uiui bessem, spumæ nitri albæ bessem, mellis bessem, aloës quæ in uentriculis afferri solet, bessem, acetī quantū satis est. Vtere in balneo. Remedium ad psoras, Archigenis. Magni nominis est & ad elephantiasin laborâtes, id quod ad psoram feram à nobis priuatim est apparatus. Id ipsum hoc modo habet: Rumicis satui, & rumicum acutorum radicum, fasciculos manipulares duos in aceto coquito, deinde in mortario tuis, ac postea etiam in pila tritis, acetū paulatim instillato id ipsum in quo decoctæ sunt radices aut etiam aliud, atq; deinde hæc ipsis infarcto. Nitri drachmas xlviii. sulphuris uiui drachmas xxv. thuris drachmas xv. Omnia ad strigmentū crassitatem reducta uncto, ac æstate quidē ad solem sæpe illinito, hyeme uero in balneo donec exudarint. Apparatur autem à nobis pharmacū ad elephantiasin summe cõgruum, huiuscemodi. Rumicis satui & rumicis acuti radicum fasciculos manipulares duos in aceto coquito, tundito, ac terito, ut prædictum est. Deinde hæc quàm tenuissime trita eis infarcto. Alcyonij lib. i. sulphuris uiui lib. i. spumæ nitri bessem, testarum cochlearum ustarum trientem, radici chamæleonis nigri sextantem. Omnia simul cõteruntur, donec ad strigmentū spissitudinē redigantur: & illinuntur æstate quidē ad solem sæpe, hyeme uero in balneo, donec exudent.

Illitiones ad tumentes corporis eminentias.

Cap. cxxiiii.

Illinantur autem tumores in cute efferati & inflammati ex glaucij succo, aut polij, aut lycij, aut hypocistidis, aut aloës, & similibus succis. Aut halicæ uel eruf farina cum plantaginis, aut poplygoni, aut perdicij, aut portulacæ, aut brassicæ succo diluta. Quod si cataplasmatibus opus habeant loci inflammati, cum halica cruda polijgoni, aut plantaginis, aut marrubij succo ammixto, contegantur. Postquam uero inflammationes mitigatæ, & laxatæ remiserint, herbæ serapiadis tritesticularis uiridis folia tenera aut semina probe terito, & ægrū ad solem calidum locatum ad horas ii. defricato, atq; ubi prodierit sudor, uinum meracum uetus odoratum bibendum præbeto, rursusq; herbam ipsam affricato. Deinde ipsum in aqua marina abluito, & hoc quotidie per dies aliquot factito, & reperies ad sanitatē consequendā successum. Optima est & hæc illitio Critonis. Ad tumētes emēntias, & ad faciei pruritus, ac principium elephantiasis. Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulphuris uiui, singulorum par pondus in aceto dissoluito, & ex probe penitus cõtritis pastillos formato, eosq; in umbra resiccato. Vtus uero tēpore postulante aceto dilutos illinito. Vbi autem exaruerint, subscripta cõfectione defricato. Est autem hæc. Saponis libram unam, ammoniaci thymiamatis libram unā, thuris, quadran

quadrantem, spumæ nitrî albæ quadrantem, masti-
ches quadrantem. Ammoniacū cum aqua prius tri-
tum, & sapone ei adiecto, in figulino uase coquito,
duobus sextarijs aquæ affusis, atque ubi dissolutus
fuerit, thus, mastichen, spumam nitrî, unumquodq;
per se tenuissime tritū & unitum adiecto. Deinde in
mortarium translata & diligenter tusa in uitreum
uas reposito ac utitor. Optime faciunt & hæc ad tu-
mores nō inflāmatos illita. Ammoniacum thymia-
ma ex aceto, aut marrubij succus & thus eodē mo-
do, & uerbenaca recta, & fel capræ aut hirci, & flos
æris cum melle, & caninum stercus cū aqua, & aloë
cū thure ex aceto mulso potata & illita. Vtiliter il-
linitur & dictāni succus melle cocto & cedria per-
mixtus, & sulphur uiuum cum liquida pice, aut ses-
samum, aut amygdalæ amaræ, aut chamaeleonis ni-
gri radix similiter cum liquida pice, & alcyonium
cum cedria. Efficacissima uero est cedria cum phocæ
adipe aut etiam ursino illita, ita ut simul aliquads
sulphur uiuum infarciatur. Valde efficax & hoc est.
Si alumen liquidum linteolo illigatum, & ustum,
deinde cum aceto acerrimo & brasiæ, aut ocymi
succo tritum, illiniri præceperis. Aliud. Thuris,
aluminis scissi, cuiusq; sextantem, sulphuris uiui, ra-
mentorum plumbi, cuiusq; quātum satis est, unito
& leuiter illinito, eminentijs ex pumice præfricatis.

Aliud. Ammoniacum thymia, & sulphur ui-
uum, & columbæ stercus, & uistrum tenuissime tri-
tum, in aqua, aut uino, aut aceto terito, & prout cō-
modum æstimaueris illinito. Aliud ualde efficax.
Cedriæ sesquilibram, aceti lib. II. foliorum cupressi
lib. I. folia tusa ad biduum in aceto macerata, deinde
excolata aceto, cyparissum probe terito, eiq; cedriā
adiecto ac unito, & cū uulturis pennis ægro in sole
locato illinito. Aliud. Efficacissima est & hæc illi-
tio. Auripigmenti drach. VI. thuris drach. VIII. costi
drach. II. calcis drac. IIII. baccarum lauri sextantem,
cedriæ drachmas IIII. Omnia teruntur, & cum fo-
liorum populi albæ arboris decocto in coquendo
inspissato illinuntur. Aliud ad faciei eminentes tu-
mores præcipue conducens. Mastiches unc. I. myr-
rhæ drach. IIII. sulphuris uiui drach. IIII. olei om-
phacini quantum sufficit, utere. Mirabiliter autem
prodest ad faciei tumentes eminentias, ex milesia her-
ba remedium. Tunduntur autem folia herbæ uiridia
cum axungia ueteri, & imponuntur. Et rubescunt sa-
nè inde plurimum partes quibus imposita sunt: con-
trahuntur autem facile pane imposito, aut cerato ex
oleo amygdalino, rursusq; in naturalem suum colo-
rem restituntur. Postquam uero exæquata fuerint
eminentiæ, illitionē talem parato. Thuris unc. I. gum-
mi albi unc. I. cismolię trientem. Vinū ueteri aut ace-
to trita illini. Emplastrum quod & ipsum ad maio-
res & liuentes eminentias facit, inquit Archigenes.
Terebinthinæ drac. X. radici aristolochiæ drachm.
IIII. radici capparis, ueratri albi, sulphuris uiui, la-
pidis pyritæ, cuiusq; drach. II. thuris drach. I. terebin-
thinam liquefacito, & ab igne ablata reliqua tenuis-
sime trita infarcito. Optime facit & Andronis pastil-
lus & Musæ pastillus similiter illitus uterq;. Maio-
res porro tumores etiam emplastro aliquo discusso-
rio cōtegatur: efficaciter eis auxiliatur emplastrū ex
asellis ad meliceridas ulcera mellei humoris & stru-
mas descriptū. Magis proprie autē hoc cōuenit. Olei

cicini lib. I. spumæ argenti drac. c. picis crudæ hemi-
nam I. ad lentū ignem assidue agitādo coquito: atq;
ubi coacta fuerint, ab igne ablatis chamaeleonis ni-
gri radicē tenuissime tritam drac. X. pondere insper-
gito, & ex tithymalli succo parū. Aliud. Ceram
& uiscum cum modico myrteo oleo liquefacito, &
diphrygis triti quod satis est inspergito, ac utitor.

Aliud. Radici panacis drac. IIII. nitrî drac. V. cal-
cis drac. I. ceræ drac. II. adipis ursini sextantē. Lique-
facta aridis affundito, & misceto. Cæterum nigras
eminēcias, aut ualde liuidas, cū scalpello leuibus uul-
nusculis impactis incidito, deinde splenio cruentis
uulneribus destinato, & quod inflāmationem arce-
re potest, integito, eius generis est emplastrū Barba-
rum appellatū, aut salem tenuissime tritū oleo sub-
actum, & lanis succidis exceptū imponito, & post-
ea radicem maluæ tenerā cataplasmatibus uice adhibe-
to, aut cerato ex diphryge cicatricē inducēte utitor.
Audendum autē in fortioribus corporibus, præfer-
tim ubi prius corpori robur addideris, etiam exco-
ratorium ad impetiginē feram descriptum illinere,
citra tamen cantharidū ammixturem apparatus,
quod ubi factum fuerit, & bullæ eruperint, eas uiri-
di Epigoni emplastro, quod Isis à quibusdā appella-
tur, integito, & per balneas curato: & tunc lac potā-
dum præbeto. Vlcerationes autē obortas, cerato ex
diphryge cicatricē obducente, aut melino cerato ex
uino apparato, sanabis. Facit idem & ex pompholi-
ge ceratū, & quod ex cadmia apparatus appellatur.
Quod si curationē difficulter accipiant, uelut chiro-
nia ulcera tractato. Si uero pascendo proserpant ul-
cera, corace pastillo ex aceto mulso apparato utitor,
aut pastillo Andronis. Aliud, ad uiriliginem quæ
leuce dicitur, & ad psoras. Calx in uino aut rosa-
ceo fermēata cū aqua illinitur, & post hoc ceratum
rosaceū adhibetur. Aliud celebre ad elephātiāsim.
Atramenti futorij partes IIII. aluminis scissi mada-
facti partes VI. luto fusco subigito, & ægro nudato
ac præfoto, corpus eius illinito, deinde lauato, ac rur-
sus eodē modo foueto, illinito, ac abluto: quod ubi
ter feceris, cutē rosaceo inungito, ægrūq; per totā no-
ctē contegito, & reperies sanū. Aliud, ad elephātiāsi
affectos, carcinomata, podagrā, articulare morbu,
strumas, cōdylomata, & cōuulsiones neruorū. Vul-
turis cerebrū unā cū capitis ossiculis & reliquis car-
nibus capitis accipito, & in uino dulci coquito, atq;
excolata quidē illa proiecto: cum fuscule uero ipso,
euphorbij, croci, atramenti indici, piperis albi, casto-
rij, myrrhæ, cuiusq; sextantē coquito, & foliorū ru-
bi, seminis satyrj, cuiusq; quadrantē, picis quadran-
tem, succi mandragoræ, cedriæ, cuiusq; unc. I. fel tau-
ri, aut capræ integrū, uermes ex lignis putrescentibus
& marcidis numero tres, addito. Hæc sanè omnia
in uini dulcis sextarijs nouem simul coquito. Hoc
iuramento adstrictus accepi, ne cuiuspiam reuelarem.
Hic apparatus ad illitionem in nouem dies sufficit,
& eminentias ipsas exterit. Cæterum cum penna
uulturis etiam illinatur. Aliud, ad elephātiāsim,
abscessus, cōdylomata, strumas, eminentias corpo-
ris, tubercula, pingue quiddam in se collectum ha-
bentia Græcis inde steatomata appellata, unguis
abscessus paronychias uocatos, & gutturis tumores
qui bronchocelæ appellantur: ad omnes item malig-
nas eminentias quacunque corporis parte, multo
experimento

experimēto cognitum. Vulturem uſuum accipito, eumq; in uini dulcis aut ſapae ſextarijs nouem aut ſex ſuffocato: aut uulturinum gallum eodem modo tractato, & à uespere uſq; ad matutinū tempus ad uſtis ligna coquito. Cæterum ægrū tenui uictu conuulſo, ſepe etiam in ediam perferre iubeto, & per ſcriptum purgatiuum medicamentū purgato, perq; dies ſeptem ex marina aqua lauato. Poſtquā uero uultur coctus fuerit ac excolatus, oſſa ipſius contrita cum ægri ſudore, præſertim qui à ſole prolectus eſt, cani edenda proſcito: maſſas uero ſeptē inde formatas cani dato. Vulturem autē ipſum per triduum à uespere uſque ad matutinum tempus, ne ab auro-
ra conſpiciatur, coquito, atq; id ſimiliter tertia die fa-
cito, probeq; cōtectum omni die manē in domo te-
nebricoſa reponito. Atq; ubi tandem ita percoctum ac excolatum habueris, ad luſculum in nocte, mini-
me uero in die, ſequentia addito. Salis ſoſſilis, algæ
ſiue ſuci marini, in petris cōdenſati trientem, aliq; un-
clam unā habent, galbani, opopanacis, cuiuſq; ſex-
tantem, colophonix, picis, cuiuſq; quadrantem, eu-
phorbi, caſtorij, ſanguinis capræ, cuiuſq; trientem,
ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, glutinis aceto
diſſoluti, picis liquidæ, ſingulorum ſex uncem, rutæ
ſylueſtris ramulos ſeptem, catanancæ herbæ ſcrupu-
loſ tres, amiaci ſcrupulum unum, polypathij herbæ,
quæ per contrariam affectionem luna deſinente au-
xiliatur, lapidis gagatæ, cedriæ, ſingulorū quadran-
tem, bituminis iudaici ſextarium unum, artemiſiæ
herbæ, chamæleonis herbæ, cuiuſq; ſextantem. Hæc
omnia cum luſculo ut dictū eſt apparato, probe tri-
ta commiſcito & unito. Cæterū uulturem primum
unā cum penniſ uſque ad pedes excoſiato, atque ita
in ſapam coniectum ſuffocato. Pellem autem ipſam
cum penniſ myrrha conditam, & in fumum ſuſpen-
ſam exſicari ſinito. Pedes uero in oleo coquito, &
cum oleo podagricos, per uulturis etiam pennam,
illinito. Neros uero ad pedes podagrici pro amule-
to appendito, & ab affectione eum liberabis. Porro
purgatiuum, cuius mentionem feci, hocce eſt. Aloës
unciæ dimidium, gari, aceti, parem meſuram uni-
to, & octauam ſextarij partem bibendam præbeto.
Ad condylomata in facie elephantiaſi affectorum.
Thuſ cum uino aſtero tritum pinnuliſ illinito.
Illitio alia optima ad elephantiaſi laborantes: facit
& ad pruritus. Gummi, gallarum, ſingulorū dra-
chmas decem, pumicis drachmas uiginti: contundi-
to & cribrato, acutitor ut optimo. Aliud, etiā ad
lepram. Veratri nigri, gūmi, cuiuſq; quadrantem,
ſpumæ piſanæ quantum ſufficit: conijce in ollam,
& coque donec ſucculenta ſiant, ac tritils utere.

Dieta elephantiaſi correptorum. Cap. cxxv.
Dieta elephāticorum talis ſit. A ſomno membra eo-
rum pluſimum & leniter manibus cōtreſcentur, de-
inde alius conſueta recrementa deponat, & poſt hæc
ipſe æger ſub diuo aut in porticu deambulet, molli-
bus caldamentis ſubligatis, conſiciatq; deambulan-
do uſq; ad ſtadia triginta. Deinde cataplaſma ei im-
ponatur primum ex pane, aut faba cocta, aut piſa-
na, aut aliquo conſimili illinatur, uerum ad unum-
quodq; prædictorum citriſ acidi ſuccus ammiſcea-
tur ſi haberi poſſit, aut ſi deſit, peponū aqua, & poſt
modicū interſitiū aqua pura large abluatur. Poſtea
cerato roſaceo liquidiore facies ſuperne leuiter illi-

natur. Deinde ubi geſtationis genere aliquo fuerit
uectus, rurfus deambulet concitatore grefſu. Poſtea
uero poſtione aliqua ex prædictis accepta, quotidia-
no alicui & conſueto munerī uacet. Circa quartam
autem horam concitatore gymnaſio exerceatur, &
deterſo ſudore, uſino aut uulpino adipe illinatur,
qui ſi nō adſint, caprinus aut taurinus, aut equinus,
aut aliquis ex uolucrum genere, aut butyrum recens
ſumatur. Deinde cum ſoeni græci aut piſanæ ſucco,
qui parū ammoniaci cum aceto liquefacti ammiſcui
habent, perfundatur, atq; ita lauacro quodam præ-
ſcripto utatur. Noctuum eſt enim affectioni, ſi quis
non lauet. Per interualla autem piſilothro, ut dictum
eſt, defricetur, & quodam ex prædictis ſmegmate
quotidie expurgetur. Commoda ſunt etiā arida fo-
menta, & poſt ſufficientem ex dictorum uſu exuda-
tionem, natationes in mari, aut in ſulphurulentis &
aluminofiſ aquis, non extreme frigidis, quales ſunt
aquæ Albulæ in Italia uocatae. Quod ſi tales nō ad-
ſint, frigidæ lauacro aſidue utatur, raroq; balneum
petat, niſi piſilothri gratia, aut altera aliqua urgente
neceſſitate cogatur. Si uero quis ad frigidæ lauacrū
cunctantior ſit, eum in balnei aëre plurima aqua fri-
gida perfundi commodius erit. Preſtat item ſolium
ex decocto aliquo eorū quæ adſtringunt apparare,
plātaginiſ præſertim, aut rumicis, aut perdicij, quan-
quā efficacius omnino cenſeatur betæ decoctū, cui ſa-
næ & ex aceto parū eſt affundendum. Extergatur etiā
uelut prædictū eſt, in balneis cum quopiā prædicto-
rum ſmegmatis, & cum myrobalano aſidue ex
aceto. Quibus deinde ablutis, ad acrimoniæ & mor-
dacitatis curationem ex oleo lētiſcino cum aceto &
uino aſtero conquaſſato, aut ex oleo myrteo & pa-
ri uino conquaſſatis illinatur. Licet etiam aliquādo
parum ammoniaci, aut alumen rotundum in uino
conterere. Optimum eſt & butyrum recens illitum.
Poſt lotionem & exteſionē per tenera linteola, ad
horæ dimidium quieſcat: deinde aqua tepida hauſta
ſponte uomat: aut ſi id facere nequeat, per immiſſio-
nem digitorū. Poſtea modico interuallo temporis
interpoſito, uinum abſinthites aut origanites bibat,
non infra heminæ meſuram, & paulo poſt cibus
ei apponatur. A uino in poſterū omnino abſtineat,
paſſoq; & uino mulſo, ab omniq; cibo diſſiculter
concoctili, & maxime à frigidæ potu. Cæterum ci-
bi tempore purgationum qui facile ſecerni queant,
ſumantur. Panis hordeaceus aut triticeus recens ca-
lidus. Ex oleribus betæ, & porrum capitatum dua-
bus aquis edulcatum: lactucaq; & cappariſ ex aceto
mulſo. Ex mari uero herinacel recētes, oſtrea, pelo-
rides, pectunculi, tellinæ cum betæ coctæ, & ſalſa-
mentum uetus ex aceto mulſo. Vbi uero poſt pur-
gationes refocillare, & uires reſtaurare uelimus, a-
cria auferenda ſunt, præter condimenta, quorum ut
urinam cientium, uſus commodus eſt. Exhibendus
eſt autem panis optime præparatus, oua ſorbilia, ha-
lica lota, & lac cum melle. Omnia tamen cum pa-
ne. Ex oleribus, malua, rumex, liſarum, lactuca, ſe-
riſ, ſoeniculum, ficus coctæ, à quorum acceptione pa-
rum aquæ calidæ bibat, in qua decocta ſint, quæ uri-
nam moderate cient. De cætero uero abſtineat, ut ne
potet uſque ad coenam. Bis enim cibum capere præ-
ſtat, quā ſemel ſe explere: nam, ut dixi, etiam pran-
dium ipſum ſimpliciſſime paretur: coenam magis

uariam concedo. In coenam etiam duae tertiae panis partes referuntur. Praebetur item in ea piscis molli carne non graecolens, coctus, simplici iusculo apparatus & ex auiculis motanis, extremas partes & uentres, ex pedestribus, hordorum carnes, & leporinae & dorcadum. Pro condimento & embammate ad instinctus, acetum scilliticum, & sales scillitici commodi sunt. Ex leguminibus, prifana utilissima censetur. Danda tamen & per interualla oryza, porro in cocturam eius addito. Ex fructibus conueniunt, ficus electae, uua arefacta, pirum coctum in aqua multa, similiter & cotonea: unumquodque certo pro consuetudine modo. A reliquis fructibus omnino abstinere. Ex dulciariis mellis, placetam dato ex amygdalis modice tostis, & paucis pineis nucleis, & cni ei semine contuso & cribrato, ac modico pipere apparatus. Ex bellariis, parum ex caricis aridis concedito, & uuas passas pingues, amygdala tosta, pistacia, & terebinthos tostos, & cetera totum, cnicum cum eis torrefacto & muria adstillata. In potu aqua calida eis omnino conuenientior est: sed uiribus restaurandis, uinum album & tenue, ac non ualde uetus in coena post cibos detur: quam minimam tamen potum, in sitis tantum expletionem. Reliquae portiones ex uino & melle coeque, propomata Graece peculiariter appellatae, uitandae. Acetum autem mulsum non incommode exhibetur tum ieiunio, tum inter cibos, si stomachus tolerare possit. Somnus porro diurnus nocuius elephantidis est: nocturnus autem apertissimus. Post longum a coena interstitium, deambulatio lenta ac sensim facta comoda est, quo cibi eo melius descendant. Matutinarum uero excitationum sint studiosi. Coccus affectioni infestissimus est. Etenim non reperias ullum aliquem temere, qui exectus ab elephantiasi apprehendatur, neque etiam facile mulierem. Fortem ob id quod ab utili ac bono humore seminis emissio prodeat, aut quod largior generatio ipsius in seminariis locis ob materiae spissitudinem contingat. Multo itaque semine elephantiasi correpti abundant. Non tamen absurdum fuerit puerorum gignendorum gratia per rariora interualla coire, neque enim in totum contagiosae successiones ipsius affectionis in omnibus fiunt. praesertim si quis optime dispositus, ad uenerem incitetur. Quod si succedat curatio, etiam ad quotidiana uitae munia obeunda demittantur, & longis peregrinationibus sanitati uberius consulant. Si uero non succedat, procul a mari & urbibus segregentur.

De pruritu, Archigenis. Cap. cxxvi.

In omnibus pruritibus uenae sectione utendum est, si iuuenes sint, & multo sanguine redundet qui ex eo laborant, & nihil aliud impediatur eam admittere: particulam autem & paulatim eum de trahere oportet, & quandoque sequenti die sectione repetita rursus auferre: deinde restauratis uiribus, per purgatiuum pharmacum alius subducatur. Lauandi sunt omnino quidem ieiunio, quandoque tamen ubi parum quiddam cibi acceperint, a concoctione autem secundo lauatur, aegre enim humectari potest malum. Radenda etiam pilis oblita, & cum maluae syluestris aut satuae, aut betae, aut foeni graeci, aut sesami, aut fursurum decocto repurganda. Totum uero corpus ex farina fabacea, aut lupinorum, aut myrobalani conspergatur. Quod si diutius durer affectio, fomenta quidem & lotiones ex salua, myrica, mercurialis, origani,

pulegii, baccarum lauri, radicum cucumeris agrestis decocto adhibeantur: ex lixiuio item & muria acida. Corpus uero nitro tenuissime trito conspergatur, uini fece uista & arida adiecta. Aut cum hac mixtura: Spumae nitri albae, sulphuris uiui, alcyonae uisti, singulorum aequales partes committe, & insperge. Si uero intensiorem uisum eius facere uelis, etiam uerratum album adde. Eaque simul citra pinguium amixtionem corpori insperge. Aliud, bonum & mirum. Spumae nitri librae unam, thuris lib. i. cimoliae sexuncem. Aliud. Atramenti sutorii, thuris, sulphuris uiui, nitri, aequales singulorum partes in uino trito, & in prima balnei domo illinito, deinde lauato, & cum uino & oleo inungito. Aliud, ad pruritus totius corporis. Plumbaginis, spumae argenti, nitri, cimoliae, iridis, chamaeleonis nigri radicis, pumicis, aluminis, sulphuris uiui, samfuci, lapidis specularis uisti, omnium aequales partes committe, ac utitor in balneo. Aliud sinagma ad pruritus. Nitri librae unam, pumicis uisti librae unam, spumae nitri sexuncem, ostrorum uistorum quadratem, baccarum lauri, costi, nardi celticae, singulorum sextantem, cyperi unc. i. folii malabathri quantum uolens odoris conciliandi gratia: contulis & cribratis utere in balneo. Aliud, faciens & ad psoras. Sulphuris, nitri, spumae argenti, pumicis uisti, cumini, omnium parem modum sume & utere. Inungendi sunt & aceto ac oleo in quibus staphis syluestris sit contrita, pulegii item ac thuris aequis partibus cum oleo & uino tritis. Frequenter uero cum cimolia in uino madefacta eos expurga, aut cochleas terrestres uistas & tritas cum melle adfrica. Optimum autem est & hoc in balneo. Mellis partes duas, aluminis liquidi partem unam. Coquito ad permutationem aliquantulam, ac utitor primum in sole, deinde in prima balnei domo: atque ubi parum humectati fuerint, thus cum sulphure uiuo, & nitro, & gummi, aequali potere trita arida corporibus eorum inspergito. Critonis, ad pruritus uehementiores. Foliorum lauri uiridium fasciculum, salis pinguis cyami unum, aceti sextarium unum, olei lib. iiii. Omnia simul coquito, atque ubi bis aut ter efferbuerint, ab igne aufero, & frigescenti sinito, deinde oleum segregatum inungito. Aliud, ad aegre tolerabiles pruritus. Fecis uini uiste, nitri assati, cimoliae, culusque lib. i. staphidis syluestris quincuncem, iridis trientem, aceti sextarios quatuor, olei lentiscini sextarios duos. Arida contusa & cribrata humidis excipito. Vtus eius est in sole, aut in balneo. Aliud, Critonis. Radicis rumicis, foeni graeci, gummi, singulorum drach. duodecim, sulphuris uiui, aluminis liquidi, cuiusque drac. iiii. myrobalani, cimoliae, fecis uini uiste, culusque drac. sedecim, aceti sextarios duos, olei sextarium unum. Committe ac utere ut dictum est. Efficax est & id quod ex rumicis radicibus ad elephantiasim est praescriptum. Probe facit etiam ad omnem pruritus, inquit, oleum in quo rhododaphne incocta sit illitum. Aliud, ad intolerabilem pruritus, & qui domari non potest. Ceterum quum neque uenae sectio, neque defricatio aliqua quicquam profuisset, quidam ex huius remedii usu malum exuperarunt. Testudo terrestris uiua in oleo coquitur, & ex oleo corpus inungitur. Sedat & pruritus ualde egregie, mori folia arida trita affricata, & portulaca trita per se, & perdicium, & apium cum sulphure

phure uiuo & sale. Quū uero caliditas multa affue-
rit cum pruritu, pīsanę succus commodissimus est,
tum per se, tū modico aceto ammixto. Quod si uehe-
mēter urgeat afflictio, quædā ex prædictis smegma-
tis ad pīsanę succū ammisceto. Vitandæ autē sunt
insolationes, præsertim in æstiuo sole. Aqua autem
marina maxime frigida conuenientissima est pruri-
tū. Quare tentandū est ut æger bis & ter in die pro-
be perfrictus in ea nate: bis quidē ante prædium, se-
mel uero circa uesperam. Diæta boni succi & uentri
commoda eligatur. Et si aluius adstricta sit, cataportia
ex aloë sex numero in erui magnitudinem formata
post coenā præbe. Abstineat æger ab omni acriū ci-
borum esu, & ab omni falso edulio, & à cunctis ole-
ribus crudis. Ad scabiosos pruritus. Cæterum ad
pruritus scabie perplexos, lac scissum assidue adhi-
bitum cōmodum est, & smegmata omnia prædicta
utiliter adhibētur. Priuatim autē hæc. Myrrhā cum
aceto & oleo tritam illinendam præbe donec exua-
dēt. Sinapi item & myrobalanū cum aceto & oleo
eodē modo. Aliud. Spumæ nitri, alcyonij usti,
sulphuris, singulorū æquales partes tritas & linte-
lo exceptas in oleo madefacito, & deinde ex arido
accipito, locosq; donec erodantur defricato, atq; ita
aqua abluito. Aliud. Ammoniaci salis, nitri assati,
sulphuris uiui, singulorū unciam unā, myrti aridæ
sextantem. Vtere sicco. Aliud celebre. Farina cicerū
cū caprini stercoreis pari modo utitor. Aliud ad pso-
ras, pruritus, uuliginēs, & imperiginēs. Bituminis,
sulphuris uiui, thuris, buccinorū ustorū, æquales par-
tes cum aceto & melle tritas adhibe. Optime facit &
pulegium cū mannæ puluisculo ex oleo & uino il-
litum. Vnguentū ad pforas. Hederæ folia tenerri-
ma & modicum salē cum uino & oleo trita illinito.

Aliud. Oleum amygdalinū uinumq; ac butyrum
conquassata illinito. Aliud. Aloës, cerusæ, spumæ
argenti, syriaci, plūbaginis, glaucij, recrementi argen-
ti, saponis constātinij, singulorū æquales partes, aceti
& rosacei, quantū satis est. Vtere in balneo. Aliud,
ualde celebre. Nuces rancidas quīdecim, sulphuris
uiui quadrātem, garl pontici quantū uui opus fue-
rit: tritis utere in balneo. Aliud. Perdiciū herbam
cum sale & sulphure affricato. Aliud, experimen-
to constans. Nuces rancidas quinquaginta, salis ma-
nus plenæ mensurā, sulphuris uiui unc. i. tritis utere
in balneo ad defricationē, oleo nō adhibito: atq; ubi
exudarit, ægrū in solium calida expletū demittito,
indeq; egressum rursus defricato, & statim rursus in
solium demittito. Aliud præsens remediū. Panis
aridi, nucū iuglandium rancidarū, æquales partes,
sulphuris uiui, paulo plus q̄ pro panis mensura, o-
ptime terito uino austero affuso, donec ad strigmen-
torū spissitudinē redigantur, & absq; oleo in balneo
affricada præbeto. Aliud. Saponis gallici, nitri, pu-
micis, sulphuris uiui, perdicij herbæ, culusq; unc. i.
adipis porcini recētis unc. xviii. carpopalsami dra-
chm. iiii. Vtere in balneo. Vnguentū optimū ad pforas.
Picis sexuncē, ceræ quadrāte, & uncæ dimidiū, spu-
mæ nitri sextantē, sulphuris uiui sextantē, olei myr-
tei quod satis est, ut ad strigmentū solidioris crassitu-
dinem redigatur, Vtere in balneo. Aliud. Pyretri
drachm. iiii. herbæ lanariæ drachm. iiii. sceni græ-
ci drac. viii. confusa & cribrata reponito. Vsu uero
expetēte quantū tribus digitis apprhēdi potest ac-

cipito, & cū aceto acerrimo conquassato: deinde ro-
saceo sufficēti addito unā cū smegmatis illinito. A-
liud. Aluminis scissilis, spumæ nitri, sulphuris uiui,
culusq; sextātem, staphidis syluestris sexuncē. Aceto
& rosaceo diluta illinito. Aliud ad inueteratas pso-
ras. Atramentū sutorium cū lacte & rosaceo tritum
illini, quidā uero cum adipe suillo utuntur. Aliud.
Chalcitidis, misyos, æquale pondus, tritis cū uino &
rosaceo utitor. Aliud. Nitru assatu, sulphur uiuum,
alumen ustu, æquis partibus cū oleo circūlinito. Fa-
cit & centaurea arida trita adfricta, similiter & cha-
mæpitys. Aliud. Raphani succū cum ouo in bal-
neo diligēter illinito, & in paucis diebus curabit æ-
grum, idē & rapī succus cū ouo probe facit. Aliud,
ad pforas. Spumę argēti trientē, oua integra quinq;
aceti lib. v. & dimidiā, olei myrtel sextariū unum:
trita illini. Aliud, ad pforas sanie fluētes & foetidas.
Mali punicæ ramulos teneriores aut folia tusa teri-
to, aqua aut posca prout melius iudicaueris affusa: il-
line assidue, & miraberis. Aliud, ad pforas ægre cu-
rabiles, & principij elephantiasis. Serapiadis trite-
sticularis manus plenæ mensurā, radicis altheæ tan-
tundē, hyoscyami uiridis tantundē, myrti uiridis tan-
tundē, scillam unā mediocris magnitudinis aut par-
uas duas, olei sextarios tres, aceti sextarios tres, spu-
mæ argenti dodrantē, cerusæ trientē, croci sesquiun-
ciam, candidū ouorum decem. Spumā argenti, ceru-
sam, & crocū cum aceto terito, herbas uero cū oleo
& reliquo aceto coquito, percolato, ac tritis affun-
dito & cadida ouorū addito, unito, utitor. Ego uero
& perdicīadem herbā adieci, & in magnis affectio-
nibus etiā chamæleonem, & rosmarinum herbam.
Aliud ad pforas, quo usus sum in elephantiasis prin-
cipio. Nitri, aluminis, sulphuris uiui, ceræ, cuiusq;
sextantē, picis trientē, olei in quo rhododaphnæ co-
ctæ sint lib. i. Cæterū ego sulphuris uiui sexuncē cō-
ieci, & pro arida picē liquidā indidi: & corpore ex
his illito usq; ad miraculum profeci. Verū ubi iam
ad cicatricē perducta essent ulcera, sulphuris sextan-
tem, & picem aridā inieci. Ceratū ad pforas, ualde
celebre. Colophonizæ unc. i. ceræ unc. i. emplastri ex
succis sesquiciā, myrti quadrantem. Vsu expetēte,
si quidē pforæ fuerint asperiores, ipsū ut habet adhi-
be. In exulceratis uero rosaceo liquefacto, ac utitor.
Aliud, quo in exulceratis pforis per omnia utimur.
Cerę sextantē, picis aridæ sextantē, emplastri ex suc-
cis quadrantem, rosacei trientē: liquefacito, ac utitor
ueluti eo quod præter opinionē auxilietur. Cæterū
si diuturna sit affectio, subscriptis uteris: Epithema
præclarū: facit & ad ulcera cicatricē difficulter recu-
pientia. Aeruginis unc. i. atramenti sutorij unc. i, ce-
ræ uncā unam, adipis porcini recentis sextātem, li-
quefacta aridis cōmittito & imposito, ac post tri-
duum soluito. Facta uero exulceratione, uelut igne
ambusta curato. Aliud epithema. Sandarachæ unc.
i. ammoniaci unc. unam: terito, & terebinthina exci-
pito, ut emplastri accipiant formā, & præfricto lo-
co, pellicula excepta imposito, ac post dies quinque
soluito. Vbi uero testoriū ulceri fuerit inductū, eo-
dem pharmaco donec testorium excidat, utitor. Ad
exulceratā autem cutē his quæ ambustis cōueniunt
utendū est: & maxime emplastro ex hordeo appa-
to. Porro ubi in callū induruerit affectio, magisq;
fuerit exacerbata, sequentibus utendum erit. Epi-
thema

thema ad psoras in callum obturatas, & ad leprosas dispositiones, pharmacum prospere accommodatum, nam & callos coercet, & ex profundo extirpat, & ulcerationes ad cicatricem perducit, solū enim ea quæ præter naturā accreuerunt corpora cōtingit. Farinæ lupinorū tenuissime tritorum, syluestrium quidem malim, si adsint, aut satiuorum, si illi haberi nō possint, uncias quatuordecim, farinæ loliaceæ septuncē, nitri rubri sexuncem, picis liquidæ italicū sextarium unum, aceti acerrimi italicū sextarium unum, terebinthinæ bessē, picem, cū aceto coquito, & ubi unita fuerint terebinthinā adijcito, & ab igne ablata aliquo modo frigesieri sinito, & inspersis ac infartis farinis, assidue agitato, deinde ad ignē lentissimum admotum coquito indefinēterq; agitato donec pharmacū à testa in qua coquitur, incipit separari. Quo factō ipsum in mortariū trāslatum & probe tritum reponito. Vsu uero exigente præfrictō ex nitro loco, lineto exceptum nouo & denso imposito, ac post tertium diē soluto, & alia noua splenia cōcinara imposito, atq; id usq; ad perfectā sanationē facito. Oporret autem nō modo hoc epithema, uerum etiam alia quæ ex aceto & pice cruda apparantur, in loco sub diuo apparare. Facile enim dehiscūt & dissipantur. Heraclides in æreo uase coquendū esse admonet, & terebinthinā postremā coniiciendam. Oribasij, ad ulceratas & feruidas in furis eruptiones. In balneis quidē myrobalanū & sulphur cum liquido cerato leuiter illinito; postquā uero frigida aqua solium inscenderit, ex oleo myrteo cū uino inungito, aut ex rosaceo aut lentiscino eodem modo. Potes & lentiscino citra uinū uti. Ad psoram, Magistriani, ualde necessariū. Rhododaphnes ramulos in oleo coquito, deinde nuces rancidas & sulphur usuum in mortario terito, infusoq; ad ea oleo simulq; trito, locos in sole illinito, & post horam lauato, & sanabis. Aliud, præter opinionē ad psoras faciens: Cerusæ, spumæ argenti, sulphuris uiui, ceræ, singulorū sextantē, oua numero duo. Oua recētia in aceto per tres dies ac noctes macerato, deinde unā cū putaminibus trita, reliquis probe tritis aridis ammisceto, & cerā cum rosacei libris duabus & dimidiā liquefactam cum eis cōmittito, ac utitor in balneo pro unguēto. Aliud ex ochra, ad psoras cōmodum. Spumæ argenti trientem, cerusæ unc. i. ochræ sextantem, cadmiæ unc. i. ceræ trientem, olei myrtei lib. ii. arida cum uino terito, & liquefacta affundito, ac utitor.

Ad pruriginosas papularū eruptiones. Cap. cxxvii. Diphryges cum aceto illinito, & mori radicem ex aceto, plumbaginē, rubiginē ferri, misy, cyclaminī radicem; omnia ex aceto; alumen omne melle coctum, rutam cum sale & oleo, cerusam & argēti spumam ex aceto, rutam cum cerato myrteo quadrupla parte. Aliud, ad psoras, humentes lichenes, pinguesq; & tumentes ac multo humore manantes, mirabile. Cadmiā uino & oleo tritam illinito. Ad omnem psoram ulceratam cum pruritu aut dolore, & ad ulcera capitis manantia, erysipelata, & herpetas. Plumbi usti, cadmiæ, plumbaginē, cuiusque unciam unā, scoriz argēti quæ & helcysma sesquunciam, spumæ argenti sesquunciam, uini & olei omphacini aut rosacei quantum sufficit. Vtere ad omne ulcus aut papulam in toto corpore. Præter opinionem enim facit, præsertim in infantibus. Aliud, ad psorā

asperiorē & tubercula, optimū. Cadmiæ, cerusæ, sulphuris uiui, mastiches, cuiusque unc. i. ceræ quincuncem, rosacei dextantem. Vtere, locos ex eo integendo. In balneo autem ex pharmaco unciam unam, & saponē sesquunciam misceto, ac illinenda dato.

Ad pustulas psyracæ Græcis appellatas, & ad papulas ex feruore aut sudore obortas.

Cap. cxxviii.

Fiunt in toto corpore pustulæ, dolorem inducentes citra saniei collectionē. Eas eezemata, ab ebulliente feruore Græci uulgo appellant. In his plumbago conuenit cum uino aut lentiscino oleo trita, aut cerusa cum uino & oleo myrteo; aut minium sinopicum cum adipe suillo recēti, aut misy assatum cū uino & rosaceo. Ad exulceratas pustulas. Vbi uero exulceratæ fuerint pustulæ, subscriptis utendum erit. Scoriam plumbi, & spumā argenti, pari pondere uino & oleo myrteo excepta illine. Aliud. Malicorij, spumæ argenti, atramenti sutorij, singulorū æquas partes, cum uino & rosaceo illine. Aliud. Baccarum myrti nigrarum, malicorij, atramenti sutorij, spumæ argenti lotæ, singulorū æquale pōdus, cum uino & oleo myrteo illinito. Smegma, ad pustularum eruptiones. Farinæ fabarum, pisanæ mola tritæ, radice polygoni contusæ & cribratæ, terræ cimoliæ tostæ, singulorum drach. ii. spumæ nitri albæ drachm. i. thuris tenuissime triti tantundem. Vfus eius in balneo est. Ex eo autem quātum sufficere putaueris accipito, ac cum oui candido subigito; deinde corpus ex eo circumlitū exudare sinito. A balneo autem ex rosaceo aut myrteo corpus illinito. Aliud smegma. Cimoliæ drach. ii. farinæ erui drach. ii. quod ex myrobalano cōtusa & expressa reliquū est tantundē, iridis tusæ drach. ii. nitri drach. ii. myrti siccæ tusæ drachmæ dimidiū; tritis utere ut dictū est. Aliud. Radicis hyoscyami contusæ drach. i. farinæ lupinorum drach. i. cimoliæ drachmæ dimidiū, iridis drachm. iii. & dimidiā; tritis utere ut dictū est.

Oribasij, ad nigras cicatrices inalbandas.

Cap. cxxix.

Spumæ argenti, mentis, thuris, æquales omnium partes, cum melle utitor. Aliud. Stercoris crocodili drachmas decem, thuris drachmā unam, cerusæ drachmas duas; aut ex aqua, aut cum cerato cyprino mixta illinuntur. Aliud. columbinum stercus ex aqua illinito, ipsumq; cito abluito, ne exulcerationē inducat. Aliud. Cimoliæ, stercoris columbini, saponis, thuris, singulorum pares partes cum aceto illinito. Aliud. Hirundinis stercus ex aqua illinito. Aliud. Saponis, stercoris canini albi, ceræ, olei inalbat, æquales omnium partes cōmitte ac utere. Aliud. Nitri, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sulphuris uiui, singulorū æquas portiones in aceto albo terito, aut uino & aqua trita modice illinito, ne exulceratio succedat. De imperigine, præscriptū est Sermone octauo. De herpete, & similibus, in Sermone quarto decimo. De uerrucis, tum quæ myrmeciz, à formicis, tū quæ thymi, à similitudine cacuminū thymi appellantur, item in decimo quarto Sermone scribetur. Ad papulas autē infantium, in quarto Sermone tractata sunt remedia.

Ad ulcerosas papularū eruptiones, tum in tibijs, tum in toto crure obortas.

Cap. cxxx.

In balneo ex myrobalano & sulphure cerato liquido exceptis

exceptis leuiter illinantur, & in aquam leniter calidam demittantur: postquam uero frigida aqua solium infecerint, loci ex myrteo oleo cum uino, aut rosaceo, aut leniscino cum uino inungantur. Leniscino etiam per se utendum. Probe faciunt ad eas & mali punici putamina uino cocta & trita, ac cerato modico liquidiore ex myrteo aut rosaceo oleo apparato excepta, & illita. Facit & myrsinatum dictum pharmacum, & emplastrum ex hordeo cum largo rosaceo aut myrteo dilutum & illitum. Aliud. Valde commodum & hoc est, quod in adolescentulo quopiam sumus experiri, qui pforam multam inueteratam iam ac asperissimam circum crura habebat, quaeque a genibus usque ad pedum digitos procedebat. Semen lini cum aqua cotusum quam crassissime illinito, & assidue tanquam uehementer approbato utitor. Aliud, ualde efficax. In quodam qui asperissimam pforam circum crura habebat cognitum, in quo adeo affectio ipsa inualuerat, ut elephantorum corporibus non absimilis esset: qui sane in paucis diebus sanatus est. Sulphur uiuum quam tenuissime tritum, amurca & oleo exceptum, in balneo ad defricationem exhibeto, & post balneum ex eodem illinatur.

Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas.

Cap. cxxxii.

Quandoquidem uero in profundorum ulcerum curationibus, cicatrices nigrae conflantur, etiam de his dicere operae pretium fuerit. Differunt autem cicatrices a uirilagine nigra, quae alphas appellatur, in hoc quod leue corpus habent. Virilago enim tum ad speciem, tum tactui aspera subiacet. Ad nigras itaque cicatrices subscriptis utendum est. Plumbi uisti, spumae argenti, aequales partes cum uino tritas, & in cerato crassitie redactas, reponito. Vbi uero usus expetit, uino & rosaceo liquefactas, & ad pinguis emplastri spissitudinem deductas, illinito. Aliud. Sulphuris uiui, & myrobalani, aequas partes cum aqua illine, aut terebinthina exceptas, & uestis detritae panniculo infartas impone. Aliud. Myrobalani unciam unam, stercoris columbini unciam unam, melanthii sextantem, tritis utere pro smegmate, poteris & cum aceto illinere. Aliud. Myrobalanum, sulphur uiuum, alcyonium, cum aqua ad strigmentorum spissitudinem redacta illinito. Aliud. Buccinorum uistorum sextantem, thuris unciam unam: illine cum aceto. Orisbasi, ad cicatrices nigras. Radicis cucumeris syluestris uiridis drachmas duodecim, adipis suilli recentis drachmas quindecim, aluminis scissi drachm. ii. sulphuris uiui, nitri, cuiusque drachmas duas. Aliud. Spumae argenti, cerusae, aequales partes lotas terito, & cum oui candido illinito. Smegma, cicatrices inalbans. Cimoliae, stercoris columbini, saponis, thuris, aequales omnium partes cum aceto adfricato, & rursus ex eodem illinito. Aliud. Veratri albi drachmas duas, thuris drachmas duas, spumae nitri drachmam unam, cimoliae drachmam unam. Vtere cum aceto. Aliud. Bryoniae radicem concisam, in oleo donec succulenta reddatur coquito, & oleum ipsum assidue illinito. Aliud. Erucae semen cum felle bubulo, aut alio quod haberi possit, illinito. Aliud. Spumae argenti sextantem, sulphuris uiui unc. i. erucae succo trita illini, ubi uero exaruerint, laua. A balneo uero ex sola argenti spuma cum erucae succo illine. Aliud. Talum ouillum uistum cum uino terito, ac illi-

nito. Pastillus ad cicatrices nigras in quacunque corporis parte. Cornu ceruini uisti, buccinorum uistorum, spumae argenti, cerusae, thuris, alcyonium uisti, singulorum unc. i. piperis sesquunciam, sulphuris uiui sesquunciam, gummi unciam i. cum uino pastillos, quoadmodum nosti, formato. Alius pastillus, per experientiam concolores cicatrices faciens. Lapidis pyritae, comae absinthii, lupinorum amarorum, pompholygis, cimoliae, stercoris columbini, myrobalani, melanthii, aequales singulorum partes in pastillos cum aceto cogito, similiterque uistor. Ad cubitorum & coxedicum nigredines ex cinctura obortas. Alcyonium uistum, si quidem tenera cute praeditus sit, cum aqua: si uero durior cutem habeat, cum aceto statim a balneo illinito. Smegma idemque illitio, ad nigras in toto corpore cicatrices. Farinae fabarum italicam choenicem unam, baccarum lauri drach. viii. ueratri albi drach. viii. myrobalani drach. iiii. spumae nitri drach. iiii. contusa reponito. Vsu uero exigente, cum aqua illinito. Vtere & pro smegmate in balneo. Aliud. Farinae erui, spumae nitri albae, radicis bryoniae, alcyonium asperi, myrobalani, singulorum aequales partes committito, ac utitor, ut dictum est.

De uirilagine, seu alphi.

Cap. cxxxiii.

Viriliginum, quae alphi Graecis dicuntur, generatio eiusdem speciei est cum leuce & lepra, non tamen omnino in profundo caro in eis affecta est, sed summa tantum cutis, & uelut squamulae quaedam uiriligines ipsae affixae inhaerent, albae quidem ex pituita, nigrae uero ex atrae bilis humore obortae. Dicitur est autem Graecis alphas, ex eo quod colorem cutis immutat: immutare enim apud ueteres, ἀλφαισιν dicebatur. Ad albas igitur uiriligines & nigras communiter faciunt, folia figi, sulphur uiuum, alumen, aequalibus partibus cum aceto illita: quare eis ut praestantissimis utaris. Aliud, ad utraque. Calcem aqua multoties lotam in aestiuo sole desiccato: usus uero tempore cum aqua liquefactam dilutiorem illinito. Ad nigras uiriligines. Ad nigras uero uiriligines priuatim subscriptis utendum est. Veratri nigri, terrae cimoliae, aequales partes aceto aut aqua dilutas, & ad strigmentitiam spissitudinem redactas in sole illinito, praefricato antea loco. Aliud. Radicis narcissi, seminis urticae, cuiusque sextantem, nitri rubri unc. i. cum aceto illine. Aliud. Veratri nigri, nitri, aequis partibus ex aceto utere. Aliud. Cochleas terrestres uistas & cum melle tritas, post modicum temporis interuallum affricato. Ad inueteratas nigras uiriligines, & superficiei iam in callum indurata, subscriptis utendum est. Radicis chamaeleonis nigri dodrantem, sulphuris uiui sextantem, spumae nitri unciam i. Vtere in aceto dissolutis illinendo ad solem. Aliud. Alcyonii sextantem, nitri sextantem, staphidis syluestris unc. i. sulphuris uiui unciam i. haec arida adseruato, primumque psilothro utitor, & interiecta una die corpus in balneo humectum ex aridis conspergito, & sudorem ab eo excludet. Aliud. Alcyonium uisti, spumae nitri, sulphuris uiui, ueratri nigri, singulorum aequas partes cum aceto illinito, & cum eodem etiam in balneo defricando repurgato. Aliud odoratum efficacissimum. Veratri nigri drachm. viii. iris, spumae nitri, costi, cuiusque drachmas quatuor, cum aceto illinito, & in balneo citra pinguitudinis ammixtionem affricato. Optimè facit &

ad hæc, id quod ad albas utiligines apparatus adia-
ptotum, ex eo quod citra opem non dilabatur, inscri-
ptum. Smegma ad nigras utiligines. Radicem
cucumeris sylvestris contusam & cribratā affrica-
dam exhibeto. Aliud. Foliorum fici in umbra
desiccatorum drach. VI. similaginis drach. IIII. nitri
drachm. VIII. alcyonij drach. VIII. contusa, cribrata,
reposito. Ante usum autem ad solem exudare affe-
ctum oportet, deinde inspergere, & sinere exsicari,
deinde citra olei ammixtionem defricare. Hoc in
quinque diebus utiligines curat. Aliud. Melan-
thij, ueratri albi, costi, singulorum drachm. IIII. nitri
drachmas XII. Vtere in balneo citra pingulum ad-
mixtionem. Manifestum est autem, etiam si nullus
dicam, quod prius ex hiera Galeni corpora purgare
oporteat, aut ex colocynthide & aloë catapotijs. De-
inde uero subscriptis uti. Bulbos cum aceto tritos il-
linito. Poteris item purgatus ex ueratro nigro &
epithymo uti. Ad utiligines albas. Hos item
prius cum Galeni hiera purgare oportet, aut per ca-
tapotia ex colocynthide & aloë formata, deinde se-
quentibus uti. Dracunculi radicem, aut ari radicem,
cum farina ordeacea ex aceto illinito. Aliud. Bul-
bos tritos cum aceto illinito. Aliud. Altheæ semen
cum aceto tritū illinito. Aliud. Bryoniæ radicem
concisam cum oleo decoquito, donec oleū inde suc-
culentū reddatur, & assidue illinito. Aliud. Bac-
carum lauri, cymollæ, nitri, æqualibus partibus ute-
re cum aceto. Illine autem ad solem, & post paruum
interstitium aqua ablue. Aliud. Foeni græci trien-
tem, spumæ nitri sextantem, alcyonij usti unc. I. cum
aceto illinito. Eodem etiam pro smegmate in bal-
neo utitor. Aliud ualde efficax. Alcyonij usti, sul-
phuris uiui, ueratri albi, spumæ nitri, æqualibus par-
tibus in balneo ad defricandū utere: cum aceto item
in sole illine. Aliud adiaptotum, quod citra opem
non dilabatur, appellatum. Radicis chamæleonis al-
bi drach. VIII. alcyonij usti, sulphuris uiui, atramen-
ti sutorij, spumæ nitri, cardamomi, pyretri, foliorū
fici sylvestris, aluminis liquidī, pulueris calcis uiuæ,
qui parietibus adhæret domus, in qua calx reposita
est, singulorū drach. IIII. tere, & in sole cum aceto il-
line, egro prius in balneo ex eo defricato. Facit & ad
utiligines nigras. Aliud ad nigras ac albas utili-
gines celeberrimum. Myrrhæ, sulphuris uiui, spu-
mæ nitri, ueratri albi, cuiusque sextantem, alcyonij
usti sexuncem. Vtere confidenter pro smegmate in
balneo: & in sole item cum aceto illinito.

De leuce utiligine altius insidente, Galeni.

Cap. CXXXII.

Pituitosus & lentus ac uiscosus sanguis, & affectorum
locorū debilitas, causæ sunt ob quas leuce generatur.
Quum enim ex pituitoso simulq; uiscoso sanguine
caro per multum tempus cōnutritur, facillimè leuce
omnis per profundū ipsius pituitosa oboritur, neq;
potest amplius delatum ad locum nutrimentum ad
propriam naturā in rubedinem transmutare. Acced-
dit his, quod & ipse qui ad locum influit sanguis pi-
tuitosus, uelut prædictū est, existit. Qualem igitur
locusta, aut cancer fluuiialis, & ferè omnia exanguia
ostrea ex natura sua carnem habent, talem habent &
ex trāsmutatione, ac in aliā speciem degeneratione,
hi qui leucis corripiuntur. Etenim hanc carnis affe-
ctionē ita appellāt ab albo colore nomine accepto,

Quum enim in pilo obstitis locis leuce oboritur, pi-
lo locos ipsos non denudat, sed canos omnino facit.
Si uero loci pilosi glabri & pilis nudi reddantur,
incurabilis leuce censetur. Ad leucas igitur subscri-
ptis remedijs utendum est. Fici sylvestris nigræ uir-
gultorum lib. I. rutæ sexuncem, misyos unc. I. calcis
uiuæ uncia I. aceti acerrimi quantum satis est. Con-
tere obnixæ & pastillos informa, eosq; in umbra re-
sicca. Vsu uero exigente illine in sole, loco prius con-
fricto: & si bullæ oboriantur, eas acicula penetrato,
& ceratum imposito. Aliud. Fici nigræ uirgulta
in aceto macerato, & quā tenuissimè terito, eisq;
spumæ nitri, sulphuris uiui, fructus myricæ, singu-
lorū æquales partes ammisceto, & locum cum nitro
prius defricato, indeq; in sole illinito, diligenter ob-
seruans ne ulceratio ex eis consequatur. Aliud. Fi-
ci nigræ folia uiridia in aceto macerato: sit autem
aceti tantū ut ea superet & penitus contegat, deinde
contusa & trita cum sufficite calce uiua misceto, &
locis prius exteris in sole illinito, usquequo lētigini
similem imaginem ipsa leuce induat, atq; deinde fici
succum recentem supra istam illitionem inducito,
ipsamq; leucen solam aliquandiu confricato, & ne
uicinas partes exulceres obseruato. Egregiè enim au-
xiliatur. Aliud, ad leucen diuinum donum: facit &
ad lepram. Sandaracham terito, etq; nucum iu-
glandium uiridem testam adijcito, ac adfuso aceto,
rursus simul probè terito, & loco prius deteriso, in
sole illinito. Quod si acre ægro appareat, paucū pa-
nem ammisceto, & assidue lauato. Aliud, ex cuius
usu sæpiculè laudem adeptus sum, citra exulceratio-
nem medetur. Vsu sum eo in mulierecula quadam
quæ in fronte leucen habebat, & ualde egregiè uires
suas declarauit. Seminis cardamomi sesquicula,
atramenti sutorij sextatē, sulphuris uiui drach. IIII.
aluminis rotundi & scissi, cuiusq; drach. IIII. cū ace-
to diligenter terito, locoq; ex nitro & aceto præfri-
cto, in sole illinito. In quibusdam sanè bullam quo-
tiescunq; illinitur producit, qua sublata leprā ipsam
item tollit. Aliud, ad leucas & lepras. Nucum iu-
glandium immaturarum & adhuc acerbarum exte-
riorem corticem uiridē detrahito, & fici nigræ syl-
vestris ramulos amputato, & ad hæc spumam argenti
conijcito, ac cum aceto coquito, terito, & ad unguen-
ti formā reducto, idq; ipsum in sole illinito. In deco-
quendo etiam hordei grana septē addito. Hinc enim
sufficientis decoctionis signum habebis, ubi uideli-
cet hordei grana cocta uideris. Aliud, Archelaf.
Veratri nigri, radicis bryoniæ, radicis chamæleo-
nis nigri, sulphuris uiui, atramenti sutorij, misyos,
alcyonij, foliorum fici nigræ sylvestris, singulorum
æquales partes contusas per angustissimū cribrum
excusito, deinde in mortarium conijcito, & aceto
adfuso diligenter terito, atque ubi ad liquidissimū ce-
rati spissitudinē fuerint redacta, in pyxidem plum-
beam recondito. Vsu autem expetente, loco prius
cum nitro perfricato, ad solem liquidius pharmacū
illinito. Summè etiā ad lepras conducit. Ad leucas
quantūuis crassæ existant. Adarces, canchryos, sul-
phuris uiui, æquales partes: unumquodque per se
priuatim contundito & cribrato, deinde simul cum
aceto ad multos dies sufficienter in sole terito, & lo-
co prius cōfricto nō acruatim illinito, sed dilutius,
obseruans etiam in principio ne cutis exulceretur.

In pro

In progressu uero temporis parū quid ex ueratro, tantundemq; ex gallis, ad tria prædicta ammisceto.

Aliud. Olus est in Syria folia habens seridis angusto folio præditæ. Vocatur autem lepidium, & cum lacte conditum, seruatur: cum radice uero eius lanæ tinguntur, & nigrum induunt colorem. Hoc ipsum olus tritum & impositum, cutem liuidā reddidit & attollit, ut excoriatae similis uideatur. Est autē radix eius alba, crassitudine digitalis: ex qua in sole siccata corticem detrahare oportet, & per diem unū in acerrimo aceto macerare, deinde mane probè & cōstanter terere, affuso que aceto sufficienti ad strigamentis crassitudinem redigere, atque ita repositum adseruare. Vbi uero usus exegerit, locum nitro defricum paulisper transpirare sinito, atq; ita pharmacum ipsum ad calentissimum solem illinito, & quodammodo adfricato, deinde acetum paulatim ad illitum instillato. Quum uero æger uellicationē ac morsum perceperit, eum ad tolerantiam inhortato. Bullæ namque succedent, quas acicula penetratas excoriare oportet. Vbi itaque excoriatae fuerint, si quidem adfectus locus excoriatus concolor appareat, ipsum ut secundum naturam habentem & restitutum sinito, si uero non, rursus ad duos & tres dies idem pharmacum illinito, donec omnino perfectè uideris locum ipsum sanatum. Aliquibus uero ex hac curatione bullæ non erumpunt, uerum locus ipse excoriatur, hos itaque uelut igne ambusta curare oportet. Aliud. Floris mali pumici drachmas viii. spumæ nitri drachm. v. alcyonij drach. iiii. sulphuris uiui drachm. ii. Vtere cum aceto. Est item Sic cū optimum ad leucas, & inspergitur postquam exciderint crustæ ex acris pharmacis obortæ. Cæterum ad cicatricem obducendam, & cicatrices reliquo corpori concolores reddendas, aceto excipe, & loco probè præfricto illine. Vbi uero bullæ emerferint, pharmacum ipsum cum melle cataplasmatismodo impone. Efficacius autem fit si pro sulphure, ueratrū nigrum coniiciatur. Smegmatis porro ad leucen itemq; lepram plurimis ex præscriptis illitionibus uti oportet. Præclarissimè autem ad ipsos Siccū magnum facit, quod Indum inscriptum est, quo etiam ad elephantiasim, & omnem cutis scabridem: ad articulare item morbum, & membrorum resolutiones, & ad hydropicos uti conuenit. Salis ammoniaci, salis communis, salis cappadocici, salis amari, nitri assati, farinæ fabaceæ, pumicis usti, spumæ nitri, singulorum trilentem, ueratri albi, ueratri nigri, radicis struthij, radicis bryoniae, cyperorum, aluminis liquidi, aluminis siccis, floris lunci odorati, gummi, iridis, lapidis specularis usti, testarum sepiæ, seminis lini, costi, baccarum lauri, farinæ lupinorū, pulegij, thuris, seminis uiticis, singulorum sextantem, ostreorum ustorum, radicis dracunculi, fecis uini ustæ, pyretri, radicis chamæleonis nigri, sulphuris uiui, staphidis syluestris, sinapis, radicis pæoniae, samfuci, spicæ nardi, comæ marrubij, foeni græci, grani cnidij, phylli, singulorū unc. i. radicis cucumeris syluestris, cimolix, gallarum, singulorum scrupulos xvi.

De lepra Archigenis.

Cap. cxxxiiii.

Ex crasso ac uiscofo, & magis atræ bilis humore lepra generatur. Differt autem lepra à leuce & alphi uitiis lignis speciebus, in eo quod lepra aspera est ad contactum, & pruritus locorum inducit. Cutis enim

sola est quæ affecta est, unde & excoriata cute, caro subiecta sana reperitur. In leuce uero, uelut dictum est, subiecta cuti caro tota per profundum transmutata est ad albidiorē colorē, & superficies affecti loci leuissima est, & confrieta citius rubescit, præsertim in his qui facillè curantur. At uero alphi in superficie hæret, & uelut squamæ cuti affixus est. Cæterum à scabie differt lepra, quod in scabie quidē furfuracea quædam cuti inhærentia apparent. In lepra uero quædam uelut magnorum piscium squamæ. Differt autē lepra ab impetigine syluestri, eā quod impetigo orbiculatius semper ad uicinos locos proserpit. Lepra uero non ita eodem modo. Ad lepram igitur faciunt plurima ex his quæ præscripta sunt ad leucē, peculiariter autē talia. Glutinis, saluig, lacrymæ oleæ syluestris, singulorū dra. viii. corticis radicis capparis, gummi, singulorū drac. xvi. Vtere cū aceto illinēs præfrictis in sole. Aliud. Cardamomi, atramenti sutorij, aluminis rotundi, radicis chamæleonis nigri, nitri assati, farinæ lolij, singulorum æquales partes, loco ex nitro præparato, medicamentū hoc in sole impone. Aliud. Atramenti sutorij drachmas duas, sulphuris uiui drac. ii, cardamomi dra. iiii, farinæ lolij, drachmas viii. foliorum fici drac. viii, carnis caricarum pinguium drach. viii. Aceto trita impone, & alternis solue, ac rursus lotis impone. Aliud. Veratri nigri, sulphuris uiui, radicis bryoniae, nitri, bituminis, foliorum fici, misyos, alcyonij usti, radicis chamæleonis nigri, atramenti sutorij, singulorum æquales partes. Vtere cum aceto ad præfrictos in sole. Aliud ad lepram experimēto cognitum, tollit eam per dies quinque. Aeruginis drach. iiii, resinæ pinus liquidæ drachm. iiii, thuris recentis drach. ii. Arida cum aceto terito, & adiecta resina liquata, præfrictis imposito, & alternis soluito, & reperies lepram splenio adhærentem. Deinde uero loco per poscam deterso ac confrieto, ut cruentus fiat, rursus impone. At si exulceratio facta fuerit, per muriā & lenticulam cum melle depurga. Et postea per ceratū ad ambusta paratū curationē perfice. Aliud, ad lepras, ipsas excoriās. Radicis chamæleonis nigri partem unam, succi thapsiæ partem unam, uentriū cantharidum, sulphuris, æquales singulorū partes pice liquida excipe, & loco illine, ubi prius ipsum probè confricueris. Postquam uero bullæ ac pustulæ excitatæ fuerint, lenticulam cum melle impone. Archigenis ad lepram, Magistriani.

Arietis nigri adipem accipito, & locum ex eo assiduè inungito, & in paucis omnino diebus citra exulcerationem, eam tollit. Aliud. Seminis raphani drachmas quatuor, sandarachæ drachmas xvi. lupinorum aridorum decorticatorum, sulphuris uiui, singulorum drachmas xvi. gallarū omphacinarum, ueratri nigri, gummi, singulorum drachmas octo. Aceto excipe, & præfricto ex fici nigre folijs loco, illine in sole. Cum eodem item in balneo citra olei ammixtionem sicco, per dies nouem defricato. Critonis, ad lepram, ueluti Oribasius tradit.

Farinæ lolij choenicem Italicam unam, cardamomi drachmas iiii, spumæ nitri drach. iiii, atramenti sutorij drachmas octo, radices hastulæ regiae medias quatuor, terito omnia & misceto. Vsu uero experēte quantū satis uidebitur accipito, acetoq; acerrimo coquito, & ubi ad cerati spissitudinem re-

degeris, crassius illinito, loco tamen prius ex nitro confrieto; supernè uero linteolum obligato, idèp tertio quoque die soluto, frigidaq; abluto, ac rursus illinito. Aliud, ut Oribasius tradit, citra exulcerationem perfanat. Radicis rumicis syluestris drachmas xxi, gummi drachmas xii, sulphuris uiui drachmas sex, myrrhae drachmas iiii, gallarum drachmas iiii. Rumicis radices in aceto ad tertias deco-

quito, eisq; tritis reliqua ammisceto, ac simul terito, ad finè uero etiam gummi addito. Vfus autem tempore loco prius ex nitro cōfrieto, illinito; sequèd uero die lauato ac similiter curato. Vtere eo & ad impetigines ac psoras asperas ac scabras. Oribasij, ad leprosos. Succis radicis hastulae regiae sexuncem, sulphuris uiui drachmas quatuor, manne drachmas decem, nitri drachmas octo, illine cum aceto.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN DECIMO QVARTO SERMONE AETII CONTINENTVR.

DE affectionibus sedis. cap. i.
De inflammationibus sedis. caput ii.
De fissuris sedis, & de tuberculis. caput iii.
De thymis in sede ac reliquo corpore nascentibus, sycosi que, ac uerrucis formicarijs appellatis, item de clauis, caput iiii.
De haemorrhoidibus sedis. cap. v.
De haemorrhoidum chirurgia. cap. vi.
Ad anum aut sedè procidētē. cap. vii.
De prolabentis sedis perustione. caput viii.
De abscessibus sedis. cap. ix.
De ulceribus sedis proserpentibus, ac depascentibus. cap. x.
De fistulis ani. cap. xi.
Ad intertrigines inter fœmora ex itinere obortas. cap. xii.
De thymis in pudendis. cap. xiii.
De rimis in pudendis. cap. xiiii.
Medicamenta ad rimas ac reliqua pudendorum ulcera. cap. xv.
Ad inflammationes pudendorum caput xvi.
Ad nomas in pudendis. cap. xvii.
Ad carbunculos pudendorum, caput xviii.
Ad interna in meatu urinae ulcera. caput xix.
Ad scabiosum ac pruriginosum scrotum. cap. xx.
De testium ac scroti inflammatione, caput xxi.
De herina aquosa. cap. xxii.
De hernia intestinorum. cap. xxiii.
De hernia inguinis. cap. xxiiii.
De emplastrorum preparatione ac coctura, & quae in ea coniunguntur. caput xxv.
De cruentorum uulnerym curatione. caput xxvi.
De fauciatis neruis. cap. xxvii.
Curatio neruorum denudatorū ac uul-

neratorū in ulceribus. cap. xxviii.
De neruorum contusione. cap. xxix.
De glandularum inguinis inflammatio ne. cap. xxx.
De quacunq; inflammatione. cap. xxxi.
De abscessibus. cap. xxxii.
De cauis ulceribus nō malignis, & ratio curandorū ulcerum. ca. xxxiii.
Medicamenta quae per linamēta induntur, & ad suppurandum, repurgandum ac incarnandum. cap. xxxiiii.
De siccis repurgantibus ac incarnantibus, cephalicis appellatis. ca. xxxv.
De ulceribus in quibus caro superexcreuit, & quae depressione opus habent, & de medicamentis siccantibus. cap. xxxvi.
De ulceribus non malignis cicatrice indigentibus. cap. xxxvii.
Sicca ulceribus non malignis cicatricē inducentia. cap. xxxviii.
Emplastra quae non maligna ulcera cicatrice includunt. cap. xxxix.
De malignis & agrè recipientibus cicatricem ulceribus. cap. xl.
Simplicia medicamenta quae citra mordacitatem resiccant ulcera maligna. cap. xli.
De usu relatorum medicamentorum. cap. xlii.
De ligamenti & curationis ratione. cap. xliii.
De emplastrorum compositione ad maligna ulcera. cap. xliiii.
De ulceribus quae post obductam cicatricem rursus rumpuntur. cap. xlv.
Ad extremitatum ulcera. cap. xlvi.
Ad callos extremarum partium caput xlvii.
Ad uermes in ulceribus. cap. xlviii.
Ad nomas & putredines ulcerum caput xlix.
Sicca crustam inducentia, inter quae etiam pastilli multi usus. cap. l.
De sanguinis eruptione, & quae crusta

inurunt. cap. li.
Excedentia & urentia medicamenta. cap. lii.
De sinibus. cap. liii.
De sinibus attritam cutem habentibus. cap. liiii.
De fistulis. cap. lv.
De gangrena & sphacelo. cap. lvi.
De canceratis tumoribus. cap. lvii.
De carbunculis. cap. lviii.
De erysipellate, hoc est, igne sacro. caput lix.
De herpete. cap. lx.
Ad epinyctidas, hoc est, pustulas noctu erumpentes. cap. lxi.
De termintho. cap. lxii.
De papulis siue pustulis. cap. lxiii.
Ad ambusta ab igne. cap. lxiiii.
Ad flagellatos. cap. lxv.
Ad desquamata. cap. lxvi.
Ad intertrigines. cap. lxvii.
Ad contusa & sugillata. cap. lxviii.
De ruptione. cap. lxix.
De uulsionē. cap. lxx.
Ad luxatos articulos. cap. lxxi.
Ad laxos articulos. cap. lxxii.
Ad perniones. cap. lxxiii.
Ad digitorum pterygia, siue reduuias. caput lxxiiii.
Ad paronychias, id est, unguium abscessus. cap. lxxv.
Ad contusos ungues. cap. lxxvi.
Ad subcruentos ungues. cap. lxxvii.
Ad motos ungues. cap. lxxviii.
Ad scabros ac leprosos ungues. caput lxxix.
Ad reparandos ungues. cap. lxxx.
De anulis digitis impactis. caput lxxxi.
Ad clauos. cap. lxxxii.
Ad plantarum rimas. cap. lxxxiii.
De crurum ac reliquarum partium uulnerybus. cap. lxxxiiii.
De brachiorum ac crurum dracunculis. cap. lxxxv.

AETII MEDICI GRAE

CI CONTRACTAE EX VET

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

QUARTI SERMO SECVNDVS, ET

EX ORDINE XIII.

*De sedis, pudendorum ac scroti affectionibus, & de simplicibus medicamentis quae in
emplastra coniunguntur. Et de cruentis vulnerebus & inflammatio-
nibus, abscessibusq; ac ulceribus veteribus.*

De affectionibus sedis, ex Galeno. Cap. I.



AFFECTIONES circa sedē ob multas causas difficulter curantur. Nā & ualde tenero sensu praedita pars est: saepe uero dictū est, tales partes facile ab acrioribus ac austerioribus medicamentis irritari. Et ipse superfluitatū alimenti transitus, tū per se mordax est, tū ob id maxime quod simul cū ipsis pertransit bilis, & aliquando quidā serosi humores. Et ad hanc accedit, quod neque praefinitum est Medicis certū tempus ad medicamenta imponenda: sed aliquando etiam tempore non conuenienti, egrī ad recrementorum excretionē progrediuntur. Quin & humiditas ac caliditas locorū, siccantibus simulque frigefacientibus opus habens, non parum efficit ut ulcera egrē curabilia fiant. Mordent enim adstringentia, locus autē ferre non potest morsum, quū subtili sensu praeditus existat. Quapropter conueniunt ipsis medicamenta, quae adstringūt citra asperitatem: qualia maxime sunt ex metallicis, ea quae neque acra, neque acerba ualde sunt. Hec enim lota, citra mordacitatem faciūt id quo opus est. Horum igitur in summa memores, materiā experimento cognitam consequenter scriptam habete.

De inflammationibus sedis. Cap. II.

Ad inflammationes ani, siue ex fissuris, siue ex tuberculis, siue ex ulcere fuerint. Palmarum passerum sextātem, panis siliginis unciā unā, croci drachm. ii. Palmas & micas panis sapa praemaceratas terito ac illinito. Quum autem inflammatio cessauerit, immixto pane, palmulas & crocum auge, donec curetur. Curata uero inflammatione, utere sicco hoc ad ulcus. Cerussae & syriaci partes portiones siccas tritas insperge. Facit hoc etiā ad tubercula condylomata appellata. Medicamentū optimū ad sedē, curat fissuras, & tubercula consumit, & dolorē confestim extimit. Sanat etiā ulcera depascētia, ac maligna, & egrē cicatricem accipientia. Deprimūt praeminentia, & replet caua. Facit etiā ad tibiāriū ulcera, & ea quae dulcia appellantur sanat. Mastiches, cerussae, spumae argenti, succi hyoscyami, singulorū unciā i. olei myrti aut lentiscini, quo strigmentosum pharmacum fiat. Quod si etiā amplius quid de hyoscyami succo cōieceris, prodest. Reponitur in plumbea pyxide. Medicamentum ad sedem, Oribasij. Olei myrti, libram unā, cerussae trientem, thuris sextantem. Cerussam cum oleo myrteo ad mellis compagem coctā, ad thus in mortario tritū affunde, & unitis utere. Phicotype Oribasij emplastrū probatū. Thuris drachmas decem, myrrhē drachmas vii. opij dra-

iiii. butyri drach. iiii. aluminis scissi drac. i. cadmię ustae ac lotae, pōpholygis, utriusq; drac. vi. ceræ Tyrrenicę drachmas iiii. uitellorum ouorum assatorum, numero quatuor, adipis anserini drac. xvi. rosacei drachmas xvi. medullae ceruinę drac. xiiii. cerussae drachmas xiiii. plumbi usti & loti drachmas octo, lapidis haematitae drachmam unā, œsypi drach. iiii. & dimidiā. Arida teruntur cum uino. Ambrosia emplastrum Oribasij. Ceræ, mellis, rosacei, spumae argenti, cerussae, adipis caprini, butyri recentis, singulorum quadrantem, thuris unciā unā.

Aliud emplastrum sedis dolorem mitigans ac adimens. Spumae argenti, cerussae, ceræ, singulorum unciā i. rosacei sexuncem, croci dra. iiii. medullae ceruinę dra. iiii. amyli dra. iiii. meliloti unc. i. terebinthine drachmas duas. Aliquando & ouorū assatorū uitellos duos aut tres. Spuma argenti & cerussa lotae ac siccatae miscentur, deinde teruntur passo cum meliloto, croco & amylo. Emplastrum sedis ex cerebellis Andreæ. Adipis Anserini curati, ceræ, thuris, medullae cerui, floris rosarum, pōpholygis lotae, cadmię tenerae lotae, plumbi usti loti, singulorum drac. iiii. cerussae drach. viii. cerebellorum gruum drach. ii. opij sesquidrachmam, œsypi drach. v. succi intybi cochlearum i. rosacei sexuncem, praepara & utere uelut dictum est. Ad inflammationem ignis sacri in sede. Emplastri ex succis lib. i. panis siliginis lib. i. croci unc. i. opij drachm. iiii. rosacei lib. ii. Crocus & opium passo macerantur, panis uero in aqua, & ad ipsa trita affunduntur liquida. Facit etiā ad podagras, in calida intemperie ac fluxione biliosa. Ad eminentias protuberantes. De rumicis agrestis radice humida adhuc corticem detrahe, & ipsam radicem parum cōtusam ut ex proprio succo madescat, statim eminentiae ipsi affrica post factam alui exoperationem, nimirum ubi aqua ablueris, & linteo deterferis humiditatem. Hoc decrescēte luna fiat. Aliud optimum ad omnem sedis inflammationem. Malicorij sesquidrachmā, meliloti unc. i. foeni graeci cyathos ii. Vini dulcis ueteris heminas quinque. Coquito ad tertias, & abiectis herbis, terito in uino cerussae lotae sextantem, pōpholygis lotae unc. i. thuris trientem, plumbi usti unciā i. Et liquefacito ceræ Tyrrenicę sextantem, olei myrti quadrantē, rosacei quadrantē, butyri recentis insulsi sextantē, œsypi unciā i. medullae ceruinę unciā unā, adipis anserini trientem: haec liquefacta, frigefacta ac erasa, ad trita adiuncto, & intybi succum paulatim adstillato, & probē unitis utitor. Aliud Andromachi, quo uxor inquit, Rosarum uiridum, drachmas vii. capitum papaueris drachmas iiii. oua

oua cruda integra duo, butyri recentis, œsypi, mali corij leuissimè triti, singul. drach. xvi. mellis dodrā tē, rosacei aut myrtel sexuncē, ceræ bellem. Aliud, quo utor ait. Cerusæ drac. v. spumæ argenti lotæ drach. v. thuris drach. vi. aluminis drach. iiii. croci obolos tres, uini & rosacei quantum satis est.

De fissuris sedis & de tuberculis. Cap. III.

Tuberculum quod condyloma appellatur, in sede fit, ruga aliqua corporum in ano reduplicatorum insurgente, ac præter naturam intumescente. Quum enim sinuosus sit anus, rugas coagmētatas habet. Vbi uero amplius intumuerit ruga, tunc sanè fit condyloma. Et aliquando quidem citra inflammationem fit, & molle est. Quandoque uero cum inflammatione, & durum est ac dolorosum. At uero fissuræ ac rimæ in sede fiunt, quandoque in adstrictiori parte, siue musculo adstringente, quandoque uero in ano. Et aliquando ex influentium acrimonia consistunt. Aliquando autem propter condylomatum inflammationem ac distentionem, partes circumsitæ rupturam sustinent. Curationes autem primum quidem fiunt per medicamenta. Dilata uero curatione, dum & indurantur & callosæ fiunt affectiones, chirurgiā adhibere oportet, ita ut in condylomatis quidem æger cōmodè locetur, & ipsum condyloma uolsella distentum funditus excidatur. In fissuris autem, ut callosa rimæ labia derādantur; quo supina ac recens ulceratio fiat ad facilem curationem. Post chirurgiā consequens curatio primum est suppuratoria, deinde repurgatoria, postea ad cicatricē perducens. Quæ uero in principio adhibētur ipsis auxilia, talia sunt.

Ad condylomata pharmacum, quod contrahit ac consumit ipsa. Misy assatum terebinthina liquida excipe, ut emplastri compagem habeat, & adhibito prius per aquam fomento impone. Vtere uelut admirando. Aliud. Testas ouorum uistas ac tritas lauato, & siccitas inspergito. Aliud Lucij. Ad inflammationes sedis, & rimas, ac condylomata. Facit etiam ad rimas pudendorum inflammatas. Cerusæ quincuncem, spumæ argenti lotæ sextantem & uncia dimidium, recrementi plumbi loti, aluminis scissi, thuris, singulorum sextantem. Hæc cum uino albo ueteri trita, ad ceratum myrteum ac rosaceū ammisceto ac utitor. Facit ad sordida ulcera sedis, maxime uero circa coronam glandis & præputium consistentia, quæ neq; linamentis repurgantur, & à medicamentis ad depascentia ulcera destinatis exacerbantur. In summa uero perfusiones in condylomatis adstringentes esse oportet, & medicamenta ipsorum adstrictione quadam participare debent.

Aliud ad rimas in sede inflammatas, & ad condylomata. Cadmiæ teneræ ter uistæ ac lotæ, cerusæ lotæ, spumæ argenti lotæ, singulorum sextantem, ceræ quadrantem, ouorum duorū assatorum uitellos, sapa cyathū i. rosacei cyathū i. Vtere. Est ualde commodū etiā ad antiquata. Ad rimas inflammatas, morsusq; ac feruores, quo ego semper usus, nullo alio opus habui. Collyria asteris aut thuris, aut aliud quod consimile, succo hyoscyami & sapa diluito, & rosaceo sufficienti addito, quo strigmentosum pharmacum fiat, ex hoc anum assidue illinere iubeto. Et primum quidem dolores sedat. Celerrimè uero etiā ulcera sanat. Potes & species collyrii accipere, & cū hyoscyami succo terere, ac pastillos efformare. Et

usus tempore cum sapa ac rosaceo diluere. Aliud Andromachi, quo utor, inquit, ad rimas sedis, & condylomata inflammata. Lapidis hæmatitæ, ammoniaci thymiamatis, thuris, aluminis rotundi, singulorum drach. xii. In alio exemplari, sextantem, gallarum, croci, singulorum drach. i. terebinthinae drach. iiii. ceræ tyrrhenicæ drachm. xii. rosacei drach. x. Vtere ad sedem quidem cum rosaceo, ad uterum uero cum unguento Salca appellato. Aliud ad condylomata & rimas, quo melius non est. Aluminis scissi drach. iiii. croci drach. iiii. cerusæ drach. ii. opobalsami drachm. i. thuris drach. iiii. aloës drach. i. œsypi drachm. viii. ceræ drachm. viii. liquabilia liquefacito, & ad arida trita affundito, ac unitis utitor.

Ad rimas in ano ac pudendis. Resinam pinus siccam cum rosaceo terito, donec strigmentosa fiat, & oui assati uitellū ammisceto ac illinito. Ad rimas sedis, inflammationesq; ac condylomata, puluis siccus mitigans ac eximens dolorem. Rhodarij, Syriaci, cerussæ, spumæ argenti, æquales portiones siccas insperge. Aliud. Foliorum hederæ siccorum cinerem cum uino & rosaceo in pila plumbea tere, ac utere. Aliud. Cineris rasuræ linteorum uistæ, & amyli, æquales partes tere, & foliorum oleæ uiridum succum misce, ac illine. Aliud Maij siue obstetricis ad fissuras & condylomata. Gallæ dra. viii. plumbaginis drac. viii. myrrhæ drac. iiii. cerusæ drach. iiii. tritis utere. Prodest ad omnia. Pastillus Aretæ Andromachi, pharmacum accommodatum ad rimas & condylomata, in maximis doloribus, citò liberat. Stibij, acaciæ, plumbi uisti & loti, singulorum drachmas xvi. cineris siue spodij pompholygis lotæ, drachm. viii. Fructus ericæ, aluminis scissi, thuris, atramenti sutorij, myrrhæ, opij, singulorum drachmas viii. Vno terito uelut collyrium, & excipe ac forma in pastillos, quos usus tempore passo diluito. Pastillus ad sedem & omnia ani ulcera, rimas ac condylomata. Pompholygis lotæ, terræ samia, amyli, terræ lemnia, aloës uistæ & lotæ, thuris, sandicis, plumbi uisti & loti, radicis symphyti, cætauræ, singulorum sextantem, croci, squamæ aris, opij, tragacanthæ, singulorum sesquunciam. Excipe uino, & utere ut uoles. Pastillus ex solano halicababo, uelut Hieras prodit, qui ad rimas parari solet in sede ac pudendo, & ad ulcera, condylomata, ad uerrucas, thymos ac formicarias appellatas, & ad omnem eminentiam. Facit & ad pustulas nocturnas, papulas, reduulas circa ungues & ignem sacrū. Et ad aures purulentas, & labiorum ac plantarum fissuras. Spumæ argenti drachmas xxiii. cerussæ drachmas duodecim, corticis radicis halicacabi sicci drachmas viii. atramenti sutorij drachmas quatuor. Terito uelut collyrium cum aqua, & forma pastillos ac utere, ad ualde inflammata cum lacte muliebri, ad ea quæ cicatrice opus habent cum uino. Andromachus autem hūc pastillum sic præparat. Cerussæ libram unā, spumæ argenti, corticis halicacabi, atramenti sutorij, rubricæ sinopidis, singulorum sextantem; in alio exemplari sexuncē: terito cum aceto, ac formato pastillos. Medicamentum cicatricē inducēs ulceribus in sede. Cadmiæ uistæ & uino extinctæ sextantem, cerusæ lotæ unc. i. plumbi uisti ac loti unc. i. ceræ unc. i. olei myrtei lib. i. Sicca cum uino terito ad dies sufficientes, & ceratum liquefactum ac resfri

ac refrigeratum adiecto ac utitur unitis. Aliud sic cum, ad rimas præputij ac sedis, inducit cicatricem.

Cadmia, cerusæ, thuris, æquales partes. Facit & ad alia ulcera mirabiliter. Aliud cicatricem inducens. Cadmiæ ter ustæ ac lotæ, plumbi usti ac loti, diphrygis, singulorum unc. i. Vino trita excipe cerato habete ceræ quincuncem, terebinthinæ drach. xiiii. olei myrti quincuncem. Et unita ac in massam coacta serua. Vfus uero tempore, de pharmaco sextantem, ceræ trientem, olei myrti quantum satis est accipe. Aliud siccum rimas ac ulcera ad cicatricem perducens. Seminis spinæ Aegyptiæ sextantem, mastiches unc. i. Singula seorsim trita miscentur, & post sedatas inflammationes inspersa cicatricem inducunt. Aliud. Lapidis phrygiæ ter usti ac uino extincti, cadmiæ ustæ lotæ, cerusæ lotæ, aloës, thuris, singulorum drachm. iiii. squamæ æris lotæ drach. ii. diphrygis drachm. ii. diligenter tere ac utere. Aliud. Fructus ericæ, gallarum, thuris, acaciæ, pares portiones siccas insperge.

De thymis in sede ac reliquo corpore nascētibz, sycofig; ac uerrucis formicarijs, itēq; clauis. Cap. iiii. Thymi appellationis originatione transumpta est à cacuminibus eiusdem nominis herbæ in montibus nascētis. Thymi enim in corpore tuberculosa sunt eminentiæ, asperæ, subrubræ, oblongæ, præter naturam auctæ, sanguinem effundentes dum auferuntur amplius quam pro apparente magnitudine. Abundat autem hæc affectio circa sedem & pudenda ac media femora. Quandoq; etiam in facie consistit. Et quidam sanè parui sunt, & uocantur thymi: aliquid uero magnitudine excedunt, & appellatur ficus: & aliquid mansueti sunt, aliquid uero maligni. Mansueti igitur thymi, carunculæ sunt parvæ quidem, uerum inæquales, obscuris eminentijs exasperatæ, albicantis coloris, aut subrubræ, & doloris expertes. Maligni uero thymi, duriores sunt & asperiores ac maiores, fæculenti, ac lufidi coloris, dolorosiq; ac punctorium dolorem inducentes, & exacerbantur maxime ad manuum contactum & medicamentorum adhibitionem. Sunt autem omnes mansueti facile curabiles, maligni uero incurabiles. Curantur autem aliquando hi, non locali excisione, sed cum ablatione totius partis in quo sunt. Ad thymos. Saluam herbam siccam tusam cum pinguibz caricis præbe edendam, & disparebunt. Verum in pecoribus ordeum rori exponito, & eandem herbam inspergito, & edere sinito, ac miraberis. Ad eminentias. Soles ueteramentarias humidas urito ac terito, & uino præimbutas imponito. Aliud. Serpētis exuium tritū carne caricarū reiectis granis excipito, & emplastri modo imponito. Si uero intra sedem fuerint, glādulam inde facito, subdito, ac miraberis.

Aliud. Caninum sterus album ustum ac tritum & uino madefactum imponito. Cæterum uerruca acrochordon Græcis dicta, tuberculosa est eminentia. Nomen uero inde habet, quod similis est uertice suo resectæ chordæ iuxta extremitatem. At uerruca formicaria, tuberculosa ac callosa est eminentia, nigricantis coloris fundamentum latum habens, & ad cutem residens, ad contactum dolorem exhibens eiusmodi, qualis à morfu formicæ animalis contingit. Vnde etiam nomen habet. Verum in ablatione sanguinē fundis, non pro apparentis magnitudinis ra-

done. Clauus autem callosa est eminentia, capiti clauis asinilis, frequens autem est circa manuum extremitates, & circa calcaneum. Appellant porro etiam in facie orientes magnas eminentias, ficus: à magnitudine imposita appellatione. Proinde conandum est ut per pharmaca tum mansuetos, tum malignos thymos curemus, ita ut mansuetis quidem, ea quæ consumere ac contrahere possunt adhibeamus. Malignis autem, ea quæ ad cancerata ulcera describuntur, præsertim in mammis ac utero. At ubi uicta fuerint pharmaca & curatio protrahatur, Thymos quidem qui sunt in musculo ani adstrictorio, uolsella attractos radicitus excindere oportet, & siccum medicamentum sanguinem sistens inspergere, quale est quod flauum appellatur. Et post chirurgiam, pharmaca resiccantia adhibere, donec perfecte curentur. Nam unctiua curatio affectionem relinquit. Si uero in partibus magis expositis fuerint thymi, post excisionem quum magni fuerint ac multi, uisionē adhibere expedit ad sanguinē sistendum, & regenerationē in posterum prohibendam. Adhibita igitur uisione, curatio decernatur communis ad perusta, primum uidelicet ea quæ crustas amouere potest, deinde repurgatoria, postea resiccatoria. Crustas autem remouere possunt in talibus, lac & mel per linamenta adhibita. Quod si scalpello solum excisi fuerint thymi, post excisionem siccum sanguinem sistens adhibeatur, & reliquus curationis ductus resiccans, uelut dictū est.

Pharmaca consumentia ac resiccantia thymos, & uerrucas formicarias atq; acrochordonas. Medicamenta quæ consumunt ac resiccant thymos, sunt ea quæ cōmuniter curant etiam reliquas uerrucas: Quale est hoc quod facit ad thymos in sede ac pudendo, aut in alio corporis loco obortos. Aluminis scissi, atramenti sutorij usti, glutinis, singulorum unc. i. squamæ æris sextantē. Trita glutine excipito cū aceto prædissoluto, illinito. Ad thymos in sede, & dura ac non inflammata condylomata, & ficus. Squamæ æris drach. i. sandarachæ drach. i. auripigmenti drach. i. aluminis scissi drach. ii. Terito per se singula & cum rosaceo, & ad strigmentidam crassitudinem redacta largē illinito, & rasuram lintecoli imponito, atq; bis singulis diebus curato. At uero in alijs corporis partibus aceto diluta illinito. Mirabiliter autē contrahit ac deprimit thymos in sede ac condylomata, & inflammata lenit, pastillus superiore capite descriptus, Arete appellatus. Heraclidæ Tarētini ad uerrucas formicarias inueteratas. Sulphuris uiui, sandarachæ, atramenti sutorij, singulorum æquales partes, terito cū aceto, & pastillos formato. Et usus tempore aceto dilutos illine. Nos autem apposui-mus his etiam elaterium pari portione, & ad formicarias atq; acutas uerrucas mirabiliter profuit. Verum in formicarijs primum scalpello circumscalpere oportet, atque sic pharmacum illinere. Oribasij ad formicarias uerrucas & acrochordones. Chalcididis drac. vi. sandarachæ drach. iiii. cadmiæ dra. x. cum aceto assidue illine, donec exciderint. Aliud melinum siccum, geminæ mixturæ, heliocaës, hoc est, sole ustum appellatum: calcis uiuæ partes duas, auripigmenti partem unam. Auripigmentum aqua prius terito, & calcem adiecto, & in uas aqua repleto siccari sinito. Hoc ubi tertio feceris, in uas fictile procul ab omni humiditate deponito. Facit ad uerrucas

rucas formicarias & instar chordæ apicis acutas, pterygia, callos, nomas, & epulidas. Aliud. Auripigmenti drachmas viii. sandarachæ drachmas sex, elaterij drachm. viii. sulphuris uiui drachmas vi. radicis chamæleonis nigri drachmas iiii. Aceto diluta cogito in pastillos, & utere cū aceto. Verū in formicaria uerruca basim prius circūscalpe, uelut dictū est. Aliud pharmacum accommodatum. Hoc usus sanauit thymos malignos. Elaterij drachm. viii. auripigmenti tantundem, sulphuris uiui drach. vi. glutinis piscium drachm. iiii. trita excipe glutino aceto prædissoluto. Et utere in alijs quidem locis cū aceto dissolutis, ad sedem uero cum rosaceo. Quomodo uero gluten piscium dissoluere oporteat, dictum est in capite. De sanguinem spuētibus, in pastillo qui gluten piscium recipit. Sermone octauo. Ad Thymos ualde malignos, post excisionem & uisionem exorientes, uerrucas item formicarias, & instar apicis chordæ acutas. Pastillus Passionis. Squamæ æris drachmas xii. æris uisti drachmas viii. salis ammoniaci drachmas viii. aluminis rotundi drach. viii. thuris drach. xvi. Omnia terito excepto thure, ad multos dies aceto affuso in sole. Deinde thus adijce, ac rursus probe tere, & pastillos efforma, eosq; assidue cū aceto illine, donec penitus exciderint. Ad eos uero qui in sede sunt, um passo diluito. Cæterum ficus ablatis, & thymos ac condylomata curat, & rursus generari non sinūt, & iam extantes præclare tollit. Cinis lignorum uitis cum aceto illitus, & cinis ex umacels uitis, cum aceto.

De Hæmorrhoidibus sedis. Cap. v. Hæmorrhoids appellationis originationem habet a sanguinis fluxu. Est autem uelut dilatio localis in sede facta, uasis quibusdam istic apertis, & progressu temporis callosioribus factis. Hæmorrhoidum uero alia sunt cæcæ, alia apertæ. Cæcæ sunt quæ omni tempore inflatæ sunt, & nihil excernunt. Apertæ uero sunt, quæ per tempora sanguinem effundunt. Hæc affectio malorum plurimorum causa hominibus existit. Nam & deformitatem, & miseram uitam hæmorrhoides inducunt. Multos uero etiam uita priuant. Et deformitatem quidem, propter coloris totius corporis uitiationem, ex euacuatione succedentem. Miseram uero uitam, propter corporis debilitatem. Quandoq; autem & de uita periclitantur sic affecti, quum ob excedentem euacuationem perfrigeratum hepar, aqua inter cutem operatur. Conuenit igitur recta diæta ac uenæ sectione præmissa, hæmorrhoidum extirpationem moliri, & nullam penitus relinquere, quemadmodum quibusdam uisum fuit: possibile enim incolumes euadere, optimumq; curationis finem assequi, post hæmorrhoidum extirpationem, eos qui opportuno tempore uenæ sectione & conuenienti diæta semper utantur, quemadmodum Hippocrati placet. Inquit enim: Hæmorrhoidas sanari in ueteratas, si non adseruetur, periculum est hydropem aut tabem succedere. Non enim uelut quidam opinantur, dixit, si non una fuerit seruata hæmorrhoids ad sanguinis excretionem: Sed dixit, si non adseruetur, hoc est, si non conuenienti diæta utatur. Quod autem sic uelit Hippocrates, ipsa aphorismi distinctio ostendit. Aut enim hic uir, Hæmorrhoidas in ueteratas sanari. Est autem Sanatio perfecta liberatio, & legitima curationis. Quare iuxta Hippocratem non oportet aliquam

hæmorrhoidem relinquere, sed omnes excidere, & post perfectam ipsarum curationem, per conuenientem, uelut dictum est, diætam, ad naturalem statum corpus curatum reducere, incidereq; cubi uenam tempore opportuno, quo uidelicet coaceruatus in corpore sanguis euacuetur.

De Hæmorrhoidum chirurgia. Cap. vi. Aegrum itaq; præparare oportet per modici cibi usum, & aque potum, & ut plurimum etiam per clysteris infusum, tum prolestandi stercoris gratia, tum ut sedes irritata promptior ad eersionem fiat. Deinde adhibeatur Chirurgia, quemadmodum in tractatu De chirurgia ostensum est, ita ut singula hæmorrhoides uncino distendantur, & basis prius circūscalpatur, & per uncinū obtorqueantur. Deinde paruo interstitio facto obligentur, & rescentur. Ipsa enim obtortio adstrictioni correspondens, uasa contrahit ut consistant, quo post excisionem sedes minus sanguinis effundat. Quapropter oportet unamquamq; hæmorrhoidem hamulo distendere, deinde fundamentum circūscalpere, postea per hamulum obtorquere, & porrigere hamum tenendum ministro. Postea uero etiam in alijs idem faciendum est. Postquam uero omnes hamulis distendimus, circūscalptas funiculis obligabimus, & ministro tenendas dabimus. Et tunc primum distentam primam excidimus, & reliquas consequenter ex ordine tollimus. Post excisionem uero, siccum sanguinem sistens apponimus, & spongiam lino obligatam adhibemus, & si li principium foris relinquimus. Postea decernimus consequentem curationem, per linamentorum immersionem, spongiarum appositionem, obligationem sedi conuenientem. Curatio uero postea communis est. Securius itaq; & compendiarie curatio hæmorrhoidum est ipsa chirurgia. Quandoquidem uero quidam melius esse putant assidue purgari per hæmorrhoidas, uelut mulieres. Quidam uero ob timiditatem, per medicamenta potius aliquas ex his aut omnes tolli cupiunt: consequenter subiugemus auxilia ad has conuenientia. Extractoria hæmorrhoidum.

Quandoquidem pleraque hæmorrhoides opus habent extractione, ad faciliorem medicamentorum impositionem, necessarium est & talia pharmaca describere. Cyclamini succus illitus, & hæmorrhoidas irritat, & non sinit ipsas contrahi in chirurgia, & sedem extrahit ac euerit. Magni pharmacum accommodatum, ad hæmorrhoidas extrahendas. Piperis ac nitri utriusq; pares partes terito, & sedi adhibeto. Aliud. Succum cyclamini cum pari mellis misura ad copagē mellis coquito. Probe facit. Aliud. Hoc uix prolabentes hæmorrhoidas extrahit. Succu centaurij drach. ii. aluminis liquidæ drachm. ii. misyos drach. i. staphidis agrestis drach. i. Excipe melle & illine sedem. Aut lanam pharmaco imbutam in sedem inde. Quum autem promptitudinem induxerit, & sedes prolapsa fuerit, & hæmorrhoides apparuerint, imponito ea quæ ad hæmorrhoidum curationem describentur. Quæ aperiant hæmorrhoidas. Aperiant autem has, in his quibus sanguinem per ipsas excerni uolumus, amaracnū unguentū illitū, perdicij herbae folia uiridia assidue affricata, mercurialis trita & uelut glans immissa, fel bubulū per lanæ tomentū inditū. Sistētia sanguinis hæmorrhoidum fluxum. Sanguinem qui ex hæmorrhoidibus

nimum

nimum euacuatur, sistunt aloë imposita, squama ferri, plumbumustum cum posca. Aliud, sanguinem sistens confestim, Acaciae fulvae drach. iiii. plumbaginis drach. iiii. tragacanthi drachm. ii. Singula scotim terito, & misceto, & aqua subacta crassius imposito. Si uero penitiores fuerint, in massam coacta indito. Aliud delens hæmorrhoidas & omnem sanguinis eruptionem. Mororum crudissimorum siccorum sesquulundam, chalcididis sesquulundam, lapidis molaris trientem, pennarum corui scrupulos xxi. Extremitates pennarum torreto ac terito, deinde omnia uino subacta ad strigmentidam spissitudinem redigito. Et in hæmorrhoidibus quidem indito: In extrinsecis uero sanguinis eruptionibus illinito, ac obligato. Asclepiadae prolutio hæmorrhoidum. Spinae Aegyptiae quincuncem, foliorum salicis, artemisiae, sideritidis herbae, singulorum trientem, in quatuor aquae sextantis coquito ad dimidias, & herbas quidem abijcto, ad aquam uero decocti siccum hoc ammiscero. Melanteriae clausi drach. x. aluminis rotundi drach. viii. spumae argenti dra. iiii. gallarum dra. iiii. misyos dra. ii. foreos drach. ii. Siccum in decocto diluito, & cum eo septies in die perfundito, atq; hoc per triduum facto. Si uero reliquiae quaedam hæmorrhoidum restiterint, eas quarta die acucopungito. Et si quidem senserint, aut cruentatae fuerint, decoctum illud similiter prodest, de sicco uero dimidiam partem misce. Prolutione uero facta, ipsum siccum pharmacum adhibe, ut exacte urantur, propter inflammationem aut forinsecus panem impone. Hoc clito urit. Ex cataplasmate uero intra septimum diem excidunt crustae. Mirabiliter quoque hæmorrhoidas hoc tollit. Cicuta sicca dra. i. succi hyoscyami dra. iiii. aluminis dra. ii. gris usti dra. ii. rubricae dra. i. cerato rosaceo excipe & impone, faciunt & mali punici ad cordices siccis cum aceto impositi. Si uero penitiores fuerint, uelut gladii suppositum indito. Aliud ualde praeclarum. Sandarachae dra. viii. auripigmenti dra. viii. cum lixiuio diluta impone, aegro antea probe collocato. Mortificatur enim hæmorrhoidis, & dedit in semihora resiccata, & a fundamento deuoluta. Verum circū hæmorrhoidas ceratum illinitur, & fit hoc in sole, aut apud ignem. Debet enim homo in eodem situ permanere, donec pharmacum abluiatur. Aliud, ad hæmorrhoidas, quod sedat etiam inflammationes ani. Et illae mortificate resiccantur uelut uuae passae, & decidunt in septē diebus citra exulcerationem. Cæterum ad condylomata ac fistulas confert eaq; curat hoc, secis uini siccae ustae quadrantem, misyos sextantem, aut pro misy, foreos sextantem. Utere uelut optimo, sex autē occultetur in prunas, & uritur, donec albescat. Aliud. Stercus asini siccum accipito, & ex eo ollulam paruam impleto, & mannae thuris dra. viii. & tithymalli siccis manipulum unum addito, & accenso stercore bubulo, ad carbonum speciem exurito, eaq; trita imposito, donec excidant. septima enim die citra inflammationem mortificate decidunt. Aliud mirabiliter excindens hæmorrhoidas. Chalcididis ustae, misyos usti, atramenti sutorij usti, diphrygis, foreos, singulorum drachmas iiii. squamæ aeris ustae drachmas duas. Utere ipso sicco, & instar testæ induratae excident. Est hoc praeclarum, & omnem carnis eminentiam contrahit. Aliud Hippocratis ad hæmorrhoidas ad-

mirandum. Gallarum sextantem, myrrhae sextantem, aluminis scissi quadrantem, melanteriae quadrantem. Contundito, cribrato, terito, ac utere sicco. Ego uero in penuria melanteriae, sorbi adieci, & fecit mirabiliter. Nam intra paucos dies citra mordacitatem ac ulcerationem, hæmorrhoidas dissipat. Verum uino praeclue oportet, atq; sic inspergere.

Ad anum aut sedem procidentem.

Cap. vii.

Nos per murlam, aut marlinam aquam, prius anū fouere solemus prolapsum, & saepe nullo alio auxilio opus habuimus. Aliquando uero salem tritum inspergimus, egro commode ad hoc collocato, & sufficiens tempus expectamus, donec destillantes humiditates extra processerint. Deinde abluta prolapsa recti intestini parte, illidionibus adstringentibus utimur, nimirum acacia, aut hypocisthidae cum uino. Deinde anum retrudimus, & sequenti die infestationem paramus, aut infusum adstrictoria uim habens, quale est uinum nigrum austerum, in quo decocta est myrtus, aut oleae folia, aut malicorium. Cæterum in pueris adstringentium usum remittere oportet, & miora adhibere. Si uero res urgeat, etiam lumbis adstringentia imponemus cataplasmata ex palmulis ac malis cotoneis & similibus. Item sedi similia adhibebimus. Victus autem sit boni succi, & lactis potus decernatur. Et pulces ex lacte parantur, qualis est oryza cum lacte cocta, & similia. Vinum deur aquosius. pharmaca uero huic affectioni commoda sunt eiusmodi. Gallam coquito, & cum leuigata anum integito, & siquidē fordore auxilio opus habes, in uino cocturam facto, sin leniore, in aqua. Aliud. Corticis pinus drach. viii. pilularum eupresii, drach. ii. plumbaginis drach. ii. praelauato cum uino adstringente & acerbato, & sicca trita inspergito. Aliud. Recrementi plumbi drach. viii. thuris drach. ii. praelue, & trita insperge. Aliud. Balaustrorum drach. i. malicorii drach. ii. seminis hyoscyami drach. viii. cerusae drachm. viii. myrrhae drachm. ii. plumbi loti drach. ii. praelue & insperge. Aliud nostrum ad procidentem anum. Fructus ericae, gallarum, acaciae, cerussae, succi hypocisthidis, corticis pini, myrrhae, thuris, equales partes siccas insperge, ubi uino austero sedem prius laueris. Aliud. Lentis uste, panis usti, farinae erul, equales partes imposito cum aceto & sapia. Aliud. Sedem uino praelauato, & picem arida tritam inspergito, aut ollulas uistas tritas. Aliud. Cupressi decocto perfundito, & sterco caninum sicco inspergito, picem uero sicca, bitumen, & cyperum suffito. Aliud. Corticis pini semē, & laser, trita cum uino illinito. Et torpedinem usua assidue apponito, & contrahet. Aliud. Bitumen & galla equis portionibus tritis siccis sedi inspergito. Valde praeclarum hoc est.

De prolapsis sedis perustione Leonide, Cap. viii.

Quum fluxus egre curabilis apparuerit, & dicta nihil profecerit, neq; medicamenta contulerint, structura mali iam inueterata, ad uisionem peruenire oportet. Quum enim alia intestina inter partes principales connumerentur, externa extremitas intestini recti principalis non est; Sed & dum uritur & secatur, nullum periculum inducit, uelut ipsa experientia testatur. Inurere autem conuenit per cauteria nucleosomia externam sedis partem extremam, ex moderatis intervallis. Sufficiens est enim uisio ad fluxionem superandam. Cicatrix autem solida succedens, anum

In ambitu constringit, post unctionem uero, lac cum melle unito, & linamenta ex eo imbuta indito, ac obligato. Postquam nero elapsae fuerint crustae, lentem cum melle imposito, Repurgatis autem ulceribus, utere emplastro ex ordeo, aut alijs cicatricem inducentibus, supra ad sedis affectiones praescriptis.

De abscessibus sedis, Leonide.

Cap. IX. Inflammatione praegressa aliquando circa anum abscessus oritur. Quod ubi contingit, plura corpuscula putrescunt, propter locorum humiditatem, ac largam caliditatem. Vnde necessarium est in chirurgia ablatione uti, & propterea facile in fistulam transire. Proinde in simplicioribus quidem abscessibus facilis est curatio. Verum in magnis affectionibus, ano orbiculatim amputato, plerumque dum cicatrix inducitur, podicis meatus constringitur, & obturatio contingit. Quapropter conducit inter curandum, primis curationis temporibus linamentum parare, idque in tetrapharmaco, aut alio quodam ad curationem commodo, dissoluto intinctum indere in sedem. Tempore uero inducendae cicatricis, canalem stanneum rotundum sedis meatui convenientem immittere. Qui foris quidem sit amplius, uerum apposita parte in profundo sita rotundus ac levis, habeatque in medio foramen, per quod flatus reddi possunt. Illinatur autem canalis ex medicamento cicatricem inducente, aut samia terra cum uino, aut cerusa, forissecus autem splenium aut lana incumbat, & commoda obligatio fiat. At uero canalis ipse usque ad perfectam curationem inditus linatur.

De ulceribus sedis proserpentibus, ac depascentibus.

Cap. X. Fiunt aliquando in sede ulcera proserpenta & depascentia. Si quidem igitur nome depascentia in adstrictorio musculo fiat, conari oportet, ut per sedulam medicationem ad nomas pertinentem affectio curetur. Nam interiores ani partes, ipse inquam adstrictorius musculus, nervosus quum sit, neque unctionem neque sectionem sustinet: exciso enim musculo illo, conuulsio sequitur, & nimirum etiam carunculae imminutio ac decrementum. Id quod inde nobis cognoscere datur, quod saepe etiam non adhibita chirurgia, ab ipso depascente ulcere musculus ille consumitur, & carunculae decrementum, Rhoada Graeci uocant, consequitur. Videndum igitur est auxilijs ad nomas descriptis, ita ut myrtorum ac malicorij & rubi decocto, ac similibus, assidue irrigemus, & primum quidem corporibus a natura alienis crustam inuramus, per faustinum appellatum pastillum aut consimiles. Deinde uramur eo qui ex usta charta constat, postea Isidem emplastrum cum multo rosaceo dissolutum per linamenta indamus, & sic reliqua deinceps consequentia faciamus. Caeterum phagedaenico ulcere proserpento exedente in ano existere, audere aliquid oportet, & aliena a sanis excindere. Deinde unctione adhibere. Quum enim carnosus sit podex, tales chirurgias facile sustinet, post chirurgiam autem, consequenter curatio, uelut aliorum ulcerum facienda. Si uero uestio adhibita fuerit, curare conuenit, uelut in prolabente sede praedictum est.

De fistulis ani, Leonide.

Cap. XI. Quando quidem ex mala ulcerum curatione, & praecipue circa sedem, saepe fistula succedit, consequenter etiam de his dicendum est. Proinde aegro in sella, aut

alio quodam plano loco collocato, artifex a dextris magis ipsius aegri delidens chirurgiam perficiat. Conuenit autem specillum accipere, & caput eius in medium fistulae immittere, ipsumque propellere, quousque per inanem meatum progreditur. Deinde medium sinistrae manus digitum in sedem immittens, per ipsum specilli caput arripiat, postea reflectens specillum, & ambas fistulae extremitates inter se ad quas sinistra manu distendat, atque sic omnia corpuscula callosa per ambitum excindat, unico contentu, si id fieri potest. Si uero post sectionem apparuerit callus adhuc insidens circumscilpatur. Manifestus autem est callus, quum sit subalbidus ac renitens. Si uero etiam rugae propinqua apparuerint, uolscella extenae rescentur ad ulcerum explanationem, & facilem deinceps curationem, post chirurgiam mananthuris sectionem implebimus, & linamentis inditis conuenienter deligabimus. Et consequenter communi aliorum ulcerum curatione utemur. Caeterum in his qui ob molliciem aut imiditatem rogaenos, ut per medicamenta curentur, primum conari oportet ut per pharmaca resiccantia ac fistulas claudentia curemus. Quae si nihil effecerint, ad ea quae callosa corpuscula erodere ac consumere possunt, transiendum est, quae fistularia collyria appellantur: quarum praeparationes in uniuersali de fistulis tractatu paulo post in hoc sermone dicemus. At uero medicamenta quae fistularum resiccationem promittunt, sunt emplastrum ex spuma argenti & aceto ac uleo paratum, & emplastrum sine cera, & suluum Galeeni, & harmonia, & ex salicibus, & ex lolio constans, & consimilia: facit & hoc ad fistulas incipientes in sede, rimasque ac condylomata, praeonae radice usitae quadrantem, bituminis Iudaici sextantem, sulphuris uului unc. i. cerae sextantem, olei myrtici quantum satis est. Aliud. Mala cotonea ad cinerem exurito, ac trita superne ad osculum fistulae imposito, & linamento indito, emplastrum ex uino & oleo, aut simile quoddam adhibeto ac deligato, & alternis diebus soluto. Pastillus ad fistulas sedis. Chalcididis usitae drach. viii. aeris usti drachm. iiii. cadmia drachm. iiii. ceretæ terrae drachm. iiii. pompholygis drach. iiii. Lynci drach. iiii. aloes drach. ii. croci drach. gummi drach. xvi. terito cum succo senecionis, aut serapidis tres testiculos habentis, & formato pastillos, & uisitor siccis, & cum aceto & cum cerato. Utere etiam ad uniuersales fistulas describendis.

Ad intertrigines inter femora ex itinere obortas.

Cap. XII.

Chalcidis cum aqua trita ac illita prodest. Et plumbago cum aceto aut uino. Et spuma argenti per se, & cum myrto sicca trita. Aut alumen in testa uisum tritum insperge. Aut fici folia usta ac trita cum oleo illine. Aut rosarum capita una cum flore trita insperge. Aliud quo uitor ualde efficax, plumbaginis drac. viii. gallicarum dra. iiii. aluminis drac. i. myrrhae dra. ii. sic cum hoc insperge. Aliquando uero cum oleo myrteo illine. Ego uero uino semper prius lauo, & siccu inspergo. Aliud, facit & ad papulas feruidas in femoribus ac sub alis, ex sudoribus obortas, praesertim in corpulentis hominibus. Syrici unc. i. fuci tinctorij unc. i. testae ex clibano antiquo sextantem, prelauiato & inspergito, probe quidem facit, uerum linthea inficit, facit & ad ambusta cum cerato.

De

De thymis in pudendis, Leonide. Cap. XIII.
 Huius affectionis proprietatem in loco de thymis in se de diximus, fiunt autē & hic thymi, aut in sola glande, aut in cole, aut in præputio. Aliquando uero in omnibus relatis locis. Antea uero dictum est, quod māsueti facile curatur. Maligni difficulter, & per affectus partis ablationem sanantur. Quomodo autem cognoscere oporteat & māsuetos, & malignos, etiā relatū est. Si quidē igitur māsueti fuerint thymi ac parui, per uolsellā distēti excindantur, & aliquo sanguine sistente ac crustā inducente illinātur, quale est sic cū flauum appellatum, quo per crustā, simile quiddā ustioni efficiamus. Quū uero multi fuerint & magni, tūc post excisionem ustio adhibeatur ad sanguinem sistendū, & affectos locos ad aliū statū transmutādos, & thymorū regenerationē prohibendā. Quum autē totum præputiū thymis fuerit refertū, tū iuxta internā, tū circa externā partē, difficile erit ipsum cōseruare. Itaq; necessariū erit, quātum eius fieri potest, ad eius præputij sectionem progredi. Quum igitur ustio post excisionem adhibetur, curatio decernatur ad perustā, relata in tractatu de prolabēte sede. Excisus autē thymis, & post excisionē sicco crustā inurente adhibito, post crustæ discessum reliqua curatio resiccatoria fiat. Vnctuosā enim pharmaca affectionē refricant. Cæterū in his qui chirurgiam reijciunt, utendum est talibus medicamentis. Medicamentum resiccans thymos xeraphium appellatū. Chalcididis crudæ sesquiunciam, misyos crudi sesquiunciam, squamæ æris sextantē, aluminis scissi unc. i. Locū cū uino prius lauato, & siccū inspergito. Aliud. Gallā & alumen trita inspergito, & exarescent. Vtere etiā si in alio corporis loco thymi fiunt. Aliud, egregie tollens thymos & carnē excrecentem in pudendis. Origanum & rutę radicem, paribus partibus urito, terito ac inspergito. Vtere hoc uelut optimo.

De rimis in pudendis, Leonide. Cap. XIII.
 Rimæ ac fissuræ in præputij summitate fiunt, quādo angusta ea existens uiolēter reducitur. Ruptis autē corporibus, inflammationes succedūt & dolores intēti. In principijs igitur, omnis rima dū recēs est cruetatur, antiqua uero callosa fit, & rursus quū uiolenter dissipatur, rupta rursus cruetatur, proinde ad curam festinare oportet. Vbi uero antiquatæ fuerint, & callosæ factæ curationem distulerint, nihil proficiētibz medicamentis, cōfert cutem abducere, & callosa rimarum labia, supino scalpro quantum eius fieri potest, superficialia sectione diducere. Resupinatæ enim & recentes factæ rimæ ac fissuræ, celerrime sanantur.

Medicamenta ad rimas & reliqua pudendorum ulcera. Cap. XV.

Rimas medicamentis curare conandum est antea, citra chirurgiam, & utendum est plerisq; ad rimas sedis præscriptis, & præsertim eo quod Lucio inscribitur: facit enim & ad rimas in præputio, & ad ulcera fordidā, & præcipue quū detrahi ac reduci non potest. Inijciatur autem cum oleo & uino per clysteriolum. Mirabiliter autem facit ad rimas in præputio & recentes, & inueteratas, urina quæ inter mingendum intra præputium ac glandem obiter suscipitur, & celerrime sanat, ut ne opus quidem sit alio auxilio.

Aliud ad rimas præputij. Resinam frictam cum rosaceo terito donec strigmentitiā compagem accipiat, & ammixto oui assati uitello utere. Aliud,

ad rimas & reliqua ulcera. Colocynthidem siccam urito ac terito, & cū rosarum flore utere. Idem facit & anethum ustum. Aliud, ad præputij rimas, & glandis ulcera, repurgat, & cicatricem inducit. Lapidis phrygi ter usti & extincti, primum butyro aut rosaceo, deinde melle, postea uino, sextantem, florū rosarum unc. i. malicorij unc. i. utere. Aliud, ad rimas præputij & ani, & pudendi muliebris. Cerusæ, plumbaginis, gallarum, myrrhæ, æqualibus partibus utere siccis, aut cum uino & oleo. Aliud, rimas & ulcera ad cicatricem perducens, & acrimoniā obtundens. Cadmiæ teneræ ter ustæ sextantem, rosarum recentium detractis unguibus sexuncem, Cadmiā tundito accribrato, & cum rosis terito donec exarescat, & sicca inspergito, ubi prælauēris cum uino. Aliud ad pudenda & sedem. Lapidis phrygi ter usti ac extincti uelut dictum est, cerussæ lotæ, cadmiæ, thuris, aloës, singulorum unc. i. squamæ æris drachm. ii. diphrygis drach. iiii. utere sicco. Aliud siccum, ad pudendorum rimas & ulcera spontanea. Aloës unc. i. florū rosarum sextantem, utere confidenter. Aliud ad eadem. Aloē solam tritam inspergito. Si uero adstrinxerit, cadmiā ter ustā ammisceto. Mirabiliter efficax est. Aliud. Pastillum ex halicacabo lacte dilutum exhibeto. Habetur eius præparatio capite tertio, ubi de fissuris & tuberculis sedis tractatur. Verū in his qui præputiū reducere non possunt, lacte eundem diluito & tepidum per clysteriorum inijcto. Aliud, ad spontaneas pustulas in pudendis, & maxime in his qui præputium reducere non possunt. Glaucum cum uino terito, & ubi prælauēris, per fistulam pus attrahentem, tepidum inijcto. Aliud lene incarnans & cicatricem inducens. Amylum per se tritum inspergito. Aliud. Colophoniam tritam solam inspergito. Aliud. Colophoniam, thus, amyllum, paribus portionibus inspergito. Aliud. Aloës primariæ, cerusæ, rosarum siccarum, æqualibus partibus tritis utere. Aliud. Collyrium ex thure tritum siccum insperge, aut cum uino dilutum per linamenta indito, aut cum lacte inijcto, facit & quod Aster appellatur, & quod Cleoni inscribitur, & similia. Orisbasi ad præputij ac ani rimas. Inducit cicatricē. Cadmiæ lotæ, cerusæ, thuris, æqualibus portionibus, utere, facit & ad alia ulcera mirabiliter.

Ad inflammationes pudendorum. Cap. XVI.
 Inflammata pudenda rosarū & meliloti decocto perfundito: Aut betæ folia siue semen tritum, in aqua feruefacito, & calido perfundito, facit ad eos qui præputium retrahere nō possunt. Cataplasma uero adhibe ex pane cū palmulis sapa præmaceratis, cū modico rosaceo. Aut malicorij in uino coctū ac tritum cum pane ac modico rosaceo pro cataplasmate impone.

Ad nomas in pudendis. Cap. XVII.
 Si ulcus depascens, nomen Græci uocat, aut erosio fiat, laxa forinsecus apparet pars erodenda. Et si circumpremat, humorem tenuem subcruentum excernit, deinde seculentum. Conuenit itaq; perfusionibus adstringentibus in his uel ex decocto myrti, ruborum, oleæ syluestris, rosarum, malicorij, plantaginis, polygoni, pharmaca uero ad nomas commoda sunt, pastillus corax, id est coruus inscriptus. Habet autem sic. Gallarum sextantem, squamæ æris sesquiunciam, chalcididis crudæ unc. i. thuris unc. i. terito

In aceto ad sufficientes dies, & ad finem mellis quincuncem addito. Et ex olei myrti lib. i. ac semisse, ad pis taurini recentis besse, cææ triente, terebinthinæ unc. i. ceratum effice, & in linamentis utere, & per fistulā puris attractoriam inijce, per rosaceum dissolutū. Et superne spōgiam ex uino expressam impone, aut ceratum habens malicorium aut gallas. Aliud ex charta usta. Chartæ ustæ sesquunciam, squamæ æris sesquunciam, auripigmēdra, vi. sulphuris uiui dra. vi. plumbi usti drac. iiii. Insperge siccum, aut melle & rosaceo dilutum per linamēta inde. Si uero præputium reducere nō potest, plurimo rosaceo dilutum, & modico melle addito, inijce. Aliud siccū, quod sanauit quosdam iam secandos. Chartæ ustæ sextantem, gallarum sextantem, Vtere sicco.

Ad carbunculos pudendorum. Cap. xviii. Spumæ argenti dra. iiii. cerusæ dra. ii. thuris drach. i. Trita insperge, & rasuras linetorū impone. Aliud. Adipem caprinum cum uuis pallsis tritum impone uelut cataplasma. Hoc suppurat, & dolorem eximit, postea eundem adipem cum pice liquida unctū imponito. Aliud, pilulas stercoris caprini uistas cū melle imponito.

Ad interna in meatu urinae ulcera. Cap. xix. Lycij dra. ii. myrrhæ dra. ii. atramentū sutorij dra. ii. chalcididis drach. i. omnia simul trita cum pallsi hemina una, & uini ueteris odorati cyatho uno, coquito donec uniantur, & reponito in plumbo. Vtus uero tempore rosaceo diluta inijce: facit & ad ulcera inter anum & testes. Ego autem cygnaria collyria cum lacte diluta per clysteriolum inijcio, & bonum testimonium ipsis præbeo.

Ad scabiosum scrotum & pruriginosum. Cap. xx. Contingit etiam circa scrotum assidue scabies & pruritus, ex influxu humorum acrum ulcerantium cutem. Et ubi quidem plures fuerint & acriores allaui humores, cutem ipsam exulcerant. Si uero pauciores ac crassiores, squamas generant, & pruritum inducunt. Curatio horum fit per congruam uictus rationem, & per medicamenta. Aliquando & raro per chirurgiam. Itaque ab acrum esu abstinendum est, & præsertim ab oleribus mali succi. Quæ uero exhibentur bono succo prædita sint. Qualis est lactis potus assiduus, pilvana, halica, gallinarum oua, porcellorum extremitates & uentriculi. Vinum tenuius & album. Ex localibus auxilijs, præsertim ubi squamæ ulcers adherent, & dolor adest, conuenit cataplasma ex fabæ lomento, nam & dolorē mitigat, & ulcera repurgat. Sit autem ex faba Aegyptia lomentum. Idem facit sesamū crudum, & erufarīna melle subacta & imposita. Repurgatione uero ulcerū facta, prurituq; lenito, ad cicatricē inducendā pergemus: probe autē facit in his partibus, misy cum sulphure uiuo tritū, & cerato myrteo exceptū. Conducit & plumbi recrementū, & spuina argenti cū myrteo cerato. Et emplastrum ex cadmia, & emplastrum ex hordeo. Præclare auxiliatur etiā scroto in superfide tumefacto, terra cimolia cum aqua diluta ac illita, quam illitā exarescere sines, & aqua tepida loco abluto, myrrum siccam tritam modica myrrha addita insperges. Inducta uero cicatrice, nullaq; molestia nec pruritu uexante, curatio transacta est. At si scabie sanata, pruritus restat, aut augetur, aut scrotum humore destillat, Nitrum cū staphide agree-

sti & alumine liquido, rosaceo & aceto dilutum, in balneo illinere iubemus. Et a balneo oui candidum cum melle imponere. Si uero uehemens & intolerabilis est scroti pruritus, sex acetī sicca cum uino madefacta adhibetur, eodem modo uelut præcedens medicamentum, illito etiam postea oui albumine. Quod si adhuc amplius uim eius augere uoles, uistā fecem accipies. Idem præstat alumen cum melle probe coctum, & reliqua quæ ad pruritus retulimus.

De testium ac scroti inflammatione. Leonide. Cap. xxi. Quādoq; testes soli per se inflammantur, quādoq; testibus nihil affectis, scrotū inflammatur. Aliquando uero testes unā cum scroto inflammantur. Sicut autem in alijs corporis partibus, ita etiam in his, uel ex humorum influxu, uel scitu, uel collisione inflammatio contingit. Proinde solo testiculo inflammato, scrotum colorē naturalem habet, ipse uero testis tumidior, duriorq; ac amplior tactus occurrit. Adest dolor pulsatiuus usque ad renes pertingēs. At si scrotum inflammatur, tumor rubicundus in superficie est, renitens ad tactum ac dolens. Vtriusq; uero inflammationis, testibus uidelicet & scroto, ex signorum augmento magnitudinem inflammationis iudicabimus. Proinde cibi parsimonia, & aquæ potu per totū curationis tēpus utendum est. Et si inflammatio uehemens fuerit, præsertim in iuvene sanguinē multū habente, uena cubiti secāda est, si id fieri potest, sin minus, tali. Nā & hanc secare prodest, ubi sanguis non fuerit multus. At pro localibus auxilijs, si testes sunt inflāmati, & maxime ubi nerui a quibus pendēt simul affecti fuerint, lanā oleo cōmuni aut anethino imbutam adhibebimus ac deligabimus, probe facit et uerberata recta in oleo cocta modico uino addito, & scroto imposita, atq; lana superilligata. Cataplasmatibus uero ad inflāmationes soluēdas idoneis utemur. E quorū numero admirandū est, ad testiū præsertim inflāmatōnē, Cataplasma ex faba Aegyptia. Decoratur autē faba cocta, & cū modico melle trita illinitur, præstat etiam ad testium ac scroti inflāmationes, cataplasma ex puro pane, quo ego assidue utor, quādoq; cum oleo & aqua, quādoq; cum mulla. Egrege facit etiam id quod ex uuis pallsis cū cumino torrefacto ac trito, modico melle addito paratur, prodest & asphodeli radix cum polenta in uino cocta. Et lini semen in aqua mulla coctum. Et senecio cum polenta. Et cupressi folia per se, uel cum panis mica. Ceratum ad testium inflāmationes efficax. Cerae, resinæ pinus, olei anethini & narcissini, singulorum dextantem, cumini sex uncem, fimi asinini pilas tres, simum arefactum terito & tribrato, & cumino ammisceto, deinde cum cerato liquefacto committito ac imponito. Et lanam narcissino aut rosaceo oleo imbutam superilligato. Confert etiam emplastrum ex succis rosaceo dilutum, durante uero inflāmatione, aqua marina calida affundenda est, & cerata adhibenda inflāmationes discutiētia: qualia sunt ad mamillas inflāmatas descripta. Quod si non soluatur inflāmatio, sed transmutetur, suppuratōnem cum cataplasmatibus adiuuare oportet, perfectōq; iam abscessu chirurgia adhibenda est, & communi curatione utendum. Si uero nome depascens accesserit, eadem curatione etiam hic utendum erit, quam superius ad sedis nomas tradidimus. Oribasij ad testium tumores laxos ac in

ac inflammationes. Olei lib. i. alij habent dextatē, plumbaginē, cumini, passularum sine uinacis, farinæ fabarum, singulorū trientē, ceræ sextantē, plūbaginē cū oleo ad cōpagem coquito, deinde cerā cū colophonitē dra. vi. adiūcto & ad perfrigerata passulas ac farinā ammisceto, ac utitor. Aliquando tamen farinā ad liquefacta inijcio inquit, postquā feruor ipsorū quieuit. Aliud eiusdem. Vuarū passarū sine uinacis drac. x x v, cumini acetabulū i. resinē pinus quadratē, mellis quod satis est. Sanguinis porro euacuatio efficacissimū auxiliū est ad testes inflāmatos, inquit Oribasius. Ceterū ad testitū duritias, cucumeris syluestris radicē terito ac cribrato, & in aqua mulsa coctam cū loliacea farina imponito. Aut lilij radicem ulno coctā, & modico melle subactā imponito.

De Hernia aquosa, Leonide. Cap. xxi.

Hernia aquosa quandoq; ex occulta, quandoq; ex manifesta causa condngit: Ex occulta quidem, quum aquosus humor circa partes corpusculorum, quæ serotum cōtexunt ac implicant, sanguini ammixtus collectus fuerit. Ex manifesta uero, quum ex plaga collisis, aut fractis uasis, sanguis affluēs ad aquosam substantiam transmutatur. Vbi igitur sponte cōstiterit aquosus humor collectus, subflauus aut subpallidus is inuenitur. Vbi uero ex plaga, cruentam ac seculētam materiam reperies. Humor autem uel intra rubicundam testiculī pelliculam consistit, uel extra ipsam, inter eam & pelliculas adiacentes. Vel in propria pellicula uelut uesica quadā continetur, atq; hoc genus herniam in tunica superagnata uocamus. Aliquando uero duplex hernia oboritur, quum collectio & in rubicunda tunica, & in superagnata consistit. Si quidem igitur in pellicula rubicūda humor collectus fuerit, tumor unius coloris apparet sine dolore, in principio dum adhuc parua est collectio, ad cōtactum cedens. Postea uero aucta collectione, testiculus humore undique circundatus occultatur. At tumor in ambitu extensus ac renitens ad tactum, herniæ carnosæ suspicionē imperitis exhibet. possumus tamen tactu discerni: nam hernia carnosā omnino reniditur, sed aquosa digitis cedit. Si uero in superagnata tunica humor colligatur, tumor ipse siue magnus siue paruus fuerit, omnino circumscribetur. At si simul quoq; in rubicunda tunica collectus fuerit, duō tumores depræhendentur, alter in superagnata, alter in rubicunda pellicula. Quod si extra rubicundam pelliculā collectio fiat, testiculus tactui occurrat. Ceterū ab hernia aquosa differt hernia in testinorum. Quoniam in aquosa tumor eiusdem penitus magnitudinis semper, & in quolibet corporis situ persistit. Neque enim humores, uelut intestina transferuntur. Inguen præterea in hernia aquosa secundum naturam se habet, qua nota uel maxime aquosa, ab omenti hernia distinguitur. Nam in hernia omenti, semper in seroto omentum persistit; neque unquā transfertur, id quod etiam in aquosa contingit. Verum in omenti hernia inguen rarefactum depræhēditur. Tuisissima itaq; curatio herniarū chirurgia & uestione perficitur, si peritus artifex contingat. Potest tamen etiam medicamento serotum inuri, & consumpto humore ac cicatrice indurata firmari. Ad hunc usum efficax hoc est. Radicis brassicæ ustæ cinerem, cum adipe suillo inueterato liquefacto ad emplastri formam adigito, & imposi-

tum alligato, ægrumq; quiescere finito, & postridie soluto medicamento fomentum adhibeto, & rursus apponito, idq; tamdiu repetito, donec uestio peracta fuerit. Emplastrum autem angustum & oblongum esse oportet, neq; plus quā conuenit locus inuratur. Ita ut in magnis tumoribus quatuor digitorum longitudinem & pollicis latitudinem habeat. In paruis duorum digitorum longitudinem, & auricularis digiti latitudinē exequet. At uero ubi tunica per uestionē detecta est, scalpello eam diduces, exclusoq; humore fistulare collyrium fissuræ indes, quo uiciinæ partes erodantur. Deinde suppurante medicamento uteris, postea dilapsa crusta, repurgatoria ulcerum per linamenta immittes, postremo ad adstringentia progredieris, quale est emplastrum barbarū appellatum. Poteris etiam pro brassicæ radice, medicamenta erodentia, septica Græcis appellata, adhibere. De quibus sequenti Sermonē agetur. Post humoris exclusionem, ne rursus collectio fiat, huiusmodi malagmatis uteris. Ceræ sesquialibram, picis dodrantem, ammoniaci thymiamatis lib. i. & dodrantē, aluminis liquidi sesquialendam aut sextantem. Aliud Asclepiadæ, ad herniā aquosam accommodatū, quod peracta erosionē, & humoris exclusionē adhibitu, per sanat & omnem duriciā resoluit, picis aridæ lib. iiii. ceræ terebinthinæ, ammoniaci thymiamatis, galbani, thuris, singulorum lib. i. aceti sextarios iiii. olei cyprini quantū satis est. Picem tritā cū aceti sesquialibram coquito: Deinde ammoniacū cū modico aceto tritū adiūcto, & parū feruere finito, postea cerā inijcio, eaq; liquefacta, galbanum ac thus aceto trita ammisceto, omniaq; unita & ab igne ablata ad residuum aceti in mortarium mittito, & cyprino ad stillato probe subigito, ac utitor. Præclare facit etiā emplastrum ex lolijs, quod Sermonē decimo quinto inter Nigra habetur. Sunt etiā medicamenta quæ citra uestionem ac erosionem, humoris discusionem promittunt. Quale est hoc quod habet. Spumæ argenti drach. vi. salis fossitij, atramenti sutorij, singulorū drachm. x. cerusæ drachm. x. terebinthinæ drachm. xi. olei libram unam. Spumam argenti, cerulam, sal cum oleo donec non inquinent coquito. Deinde atramentum sutorium cum aceto tritum addito, cauendo ne efferuescat, atque ubi parum ebullierit terebinthinam addito, & ab igne ablata in mortario subigito, & repositis utitor. Aliud; ad quæcunque sine scalpro curare uolueris. Ceræ, spumæ nitri, rubricæ sinopidis, nitri, singulorum sextantem, terebinthinæ, manne, thuris, mastiches, singulorum drachmas xviii. olei heminā i. aquæ marinæ siue muriæ sexuncem. Arida cum muria diluito, & liquefacta ammisceto, ac unitis utitor. Aliud. Nasturtij drachmas xxx. nitri drachmas x. fimi columbini drachmas vi. galbani, terebinthinæ singulorum drachmas xx. liquefacta cum aridis committito, ac utitor cōfidenter. Confert & psittacium inscriptum, quod Sermonē decimo quinto inter emplastra mollientia ac discutientia habetur. Hoc ego ad hernias aquosas usus sum, & primum tumorem emolliuit & ualde compescuit, ac post paucos dies exudantibus testiculis plurimam aquam extraxit. Aliud ad herniam aquosam, ualde efficax. Carnium uuarum passarū, ammonij, terebinthinæ, singulorum drachm. viii. nitri rubri drachm. x. mellis optimi sextantem. Arida

seorsim terito ac cribrato. Inde uuas passas probe cōtusas ammisceto ac unito, deinde mel cum terebinthina modice coctum addito, & ad emplastrī formam adigito, & linteo excepta adhibeto, ac lata fasciola deligato, ægrumq̃ quiescere iubeto, & à balneo ac uehementi motu abstinere. Solues autem hoc alternis diebus, & spongia locum fouebis, ac rursus impones. Vtere etiam emplastris discussorijs ac resiccantibus ad hydropicos supra descriptis, & præcipue eo quod Vestæ nomine inscribitur.

De Hernia intestinorum, ex eodem. Cap. xxiii.

Hernia intestinorum est intestini aliquando ad inguē, aliquando ad scrotum delapsus, qui multarum molestiarum autor est. Nam & deformitatem, & miserā uitā, & mortis periculum inducit, quando intestina duris recrementis distenta, ad scrotum delata condensantur. Inde enim tormina uoluuolosa, ac sepe inflammationes succedunt, ex quibus perniciēs consequitur. Generatur hoc malū aut peritonæo membrana aluum ac intestina amplectente nimium extenta, aut eadem rupta. Si ab extensione fiat, primum quidem laxitas ad inguen procumbit, & summa uentri incumbens pars conuellitur, simulq̃ pili pubis reuulsi cōspiciuntur. Verum postea tumore aucto scrotum uiolatur ac intumescit. Si uero rupta fuerit peritonæi membrana, quæ ad inguen pertingit, intestinum per rupturam delatum rubicundæ tunice innititur, & hæc tandem temporis mora oppressa, etiam ipsa inferius prolabitur. Quod si plaga adeo uiolenta cōtigerit, ut simul & peritonæi membrana, & rubicunda tunica rumpantur, tunc intestina repente nudo testiculo occurrentia ad scrotum præcipitātur. Cæterum nosse expedit, intestinorū herniā qualiscunque fuerit, semper aquosa esse deteriore. Quæ uero propter extensionē peritonæi membranæ sit intestinorū hernia, difficilius sanatur quam quæ propter eiusdē rupturā. Et sanē intestinorū hernia extreme mala, sola chirurgia curari potest, eaq̃ graui ac periculosa.

De Hernia inguinis. Cap. xxiiii.

Inguinis hernia propter peritonæi membranæ extensionem facta, in principio adstringētibz appositis, aliquando curari potest. Tutior tamen est uisio, si peritus artifex cōtingat. Nunc autem quo pacto hoc malum medicamentis adhibitis ac ligamentis sistamus, ut ne in pelus procedat ostendemus, & simul quomodo succedentibus accidentibus sit occurrendum. Proinde delapso ad scrotum intestino, & uoluuolis torminibus diuexantibus, statim conabimur, dedui locato ægro, diductis cruribus intestina sensim ad inguen reducere, ac reducta commodis ligamentis retinere. Ac si partes scroto uicinæ uehementibus doloribus unā cū inflammatione uexentur, tormina itē ac flatu adfins, tādū differenda est reductio, donec quiesuerint. Et interim partes uicinas alternis diebus, primū lana succida oleo ac uino imbuta, deinde etiam illitionibus rigabimus. Et dolentes partes circūscarificabimus. Neglectæ enim sepe mortificantur. Declinante malo emplastra adhibebimus, quale est Mnascæ inscriptum, & alia huiusmodi. Et ne recidat æger, asseruandi gratia perpetuis ligamentis utatur. Presbyteri Emplastrum ad herniā inguinis. Thuris, myrrhæ, glaucij, opopanacis, sarcocollæ, tragacanthæ, gummi, glutinis taurini, glutinis piscij, cinnabaris quo fabri ferrarij utuntur, carnis

cochlearū terrestriū, singulorum sexuncem, fecis uini adstringētis ueteris quantū satis est. gluten utrūq̃ & quæ macerari possunt in uini fece macerato, atq̃ aridis tritis ammisceto, & ad emplastrī formā reductio, imposito, alligato, & quiescere iubeto, ac septima die soluto. Ad intestina prolapsa. Symphyti libram unam, mannæ thuris quadrantem, candidi ouorū recentium unā cū uisello, numero sex. Symphytum tritum ac cribratū in fictile uas conijcimus, eiq̃ thuris mannā siue pollinem unā cū ouis subactū addimus. Deinde suillo adipe ueteri adiecto ad emplastrī formā redigimus, atq̃ hoc intestino prius reducto adhibemus, & ligamēto alligamus. Aliud. Folia & teneras cupressi pilulas impone & alliga. Et si sicca fuerint, in uino prius coque. Hoc auxiliū inquit Galenus, omnibus corporibus nimio humore flaccidis confert, resiccet enim & corroborat. Decimo autē die id exoluere ac renouare oportet, ita ut iter repetatur, & puer interim per triginta hos dies in lecto decumbat, & cupressi decoctū bibat. Aliud celebre. Aloës, malicorij in uino nigro cocti, succi hypocisthidis, thuris, glutinis fabrilis, singulorū æquales portiones. Gluten in passo donec dissoluatur, coquito, ac probe terito, & reliqua minutissime trita ammisceto, ac utitor uelut iā sæpe dictū est. Aliud. Balauistorum sexuncē, thuris, aloës, rhois coriarij, glutinis fabrilis, corallorū, singulorum quadrantē, malicorij, gallarum, singulorū lib. i. Gallas & malicorij in uino nigro uinaceis expresso coquito, & postea in mortario terito, & ad trita reliqua cū polygoni succo dissoluta addito, & omnia melle cocto excipio, ac utitor uelut dictū est. Emplastrum dauidi ad adolescentē ob herniæ intestinalis turpitudinē summe anxio, ex quo sanatus est. Resinæ siccæ, ammoniaci thymiamatis, bituminis, sulphuris uul, æquales portiones. Liquabilia liquato, eiq̃ ab igne ablatis sulphur adijcto, & in mortario ad emplastrī formam redigito, adhibeto ac alligato. Oportet autē splenū in quo adhibetur calfactū apponere, neq̃ frequenter amouere, sed sinere donec sponte decidat. Quidam pro ammoniaco picem, quidā alcyonium iniiciunt. Aliud. Terebinthinæ sesquunciā, cere, thuris, myrrhæ, glutinis piscij, carnis cochlearū, singulorum unc. i. Glutē per triduum aceto maceratur. Deinde in mortario teritur, & ad prunas eliquatur, rursusq̃ teritur, & ad ipsum reliqua trita ammiscuntur. Vtere præterea lide inscripto emplastro, quod Sermone x v. inter emplastra multi usus habetur. Aliud Theodori, admirandum ad herniā intestinorum, quod nos experti sumus, & cum multorū admiratione sanauimus. Curat magnas & diuturnas affectiones. Chartā in aqua frigida ad tridū mafacito, & ubi humorē uelut spōgia imbiberis, ex ea pilā facito, quam reducto prius intestino, inguini adhibeto ac alligato, neq̃ ante tertium diē exsoluto. Tertio enim diē miraberis de efficacia ipsius. At uero ægro minime indicabis quid sit id medicaminis, sed chartā uel pāniculo inuolues, uel atro colore tinges. Neq̃ uero tu utilitatē rei despicias. Aliud, intestinorū hernias agglutinās. Chrysocollæ, glutinis piscij, lapidis gagatæ, rhois coriarij, acaciæ, symphyti, carnis cochlearū, singulorū sesquunciā, ammoniaci thymiamatis, lapidis pyritæ, lapidis magnetis, aluminis scissilis, thuris, sulphuris uul, alcyonij, picis brudæ

brutę, nitri, singulorum unc. i. Gluten piscium in uino nigro austero macerato, postea in pilla terito, & ad prunas cum eodem uino eliquato, & rursus terito, & ad ipsum reliqua trita ammisceto, quo solidum emplastrum fiat, quod inguini adhibebis ac deligabis, ægroq; quiescere iussu septima die solues. Verum ante adhibitionem locum alicuius ualde adstringentis decocto rigato. Sunt qui prædicta myrteo cerato excipiunt. Ego uero acaciā, thus, ammoniacum, seorsim in uino macero ac tero, atq; ad gluten piscium recte præparatum ammisceto. Deinde cochlearum carnibus tritis adiectis, itemq; reliquis tritis, ad emplastrum cōpagem redigo, quod crassissime inguini impono, & charta imposta deligo. Aliud Orisani, picis liquidę, terebinthinę siccę, singulorum lib. i. uisci sexuncem, propolis trientem. Quidam etiā colophonię sextantē, galbani sextantem, picis & colophonię liquidę terebinthinam, deinde galbanum & propolis in mortario prius trita ammisceto, statimq; ubi ab igne sustuleris, uiscum adijcito, & rubicula agitato donec frigescat, facit ad strumas, melliceridas ulcera, & inflāmatos sub alis tumores, & ad abscessus colli. Repurgat & agglutinat. Alii porro Aesciten lapidem gestatū ut inguen cōtingat, prohibere, ne intestinū assidue delabatur. Idem etiā tritus recte medicamentis quę imponuntur ammiscetur.

De Emplastrorum preparatione ac coctura, & quę in ipsa coniunguntur, Galeni. Cap. xxv.

Emplastrorum cōpositionis multę ac uarię particulares differentię sunt. Quædā enim ipsorum ad cruentata uulnera commoda sunt, itemq; uulnera agglutinant, atq; fracturis conueniunt, aliqua maturant, aliqua discutiunt, aliqua attrahunt, aliqua sinus explēt, alia resiccant, alia cicatricem inducunt, alia leniunt, alia pinguis sunt. Quorū omnium uarietates uaria simplicium medicamentorum natura distinguit. Quapropter prius simplicium uires cognoscere oportet. Ita enim etiā compositorū facultates & causas, propter quas inter se differunt, dinoscemus, ut nō solum singulorum naturas intelligamus, sed componendi quoq; artē ediscamus: quo si forte liber in quo pharmacorum cōpositiones quibus utimur scriptas habemus, intercidat, ipsi consimilia deperditis componere possimus. Graue enim fuit id quod duobus medicis mihi notis contigit: Quorū alter ob huiusmodi scriptorum amissionem morore contabuit, alter uero medicandi artē desinuit. Adest autem exercitatus, ad hoc quod pharmaca componere possunt, etiam iudicandi facultas de his quę prius medici descripserunt, ut & his quę ab illis scripta sunt commode uti possis, & his quę ipse iuxta rectā methodum composuisti, præstat tamen his quę longo experimento probata sunt uti, quā noua usurpare. Sed uelut dixi necessitas aliquādo nos cogit in peregrinationibus, ut noua quædā & experimento non cognita usurpemus. At uero si omnibus præter naturam affectionibus simplicia medicina mederi possemus, compositis non opus haberemus. frequenter enim ad certum quendam modum corpus calfacere uolentes, nullum simplex quod id facere possit reperimus. Nam medicamentū curandę affectioni correspondere oportet. Quin & aliqua simplicia citra aliterius mixturā in usum deduci non possunt. Velut quando medicamentum meatus obducens adhibere

uolumus, nullum simplex ad hanc rem idoneum habemus. Neq; enim bitumen, neque cera, neq; resina, neq; pix, neq; propolis, nec ladanū, nec ærugo, nec cerussa, nec argenti spuma, nec alia metallica, talia sunt. Ideoq; qui primo medicamenta emplastica & meatus obducētia excogitauerunt, cū oleo metallica coxerunt, & liquabilia eliquarunt. Deinde herbas siccas tritas ammiscuerunt. Cōtrā in aliquibus affectionibus, unico quidē simplici medicamento opus habemus, sed alia quædā illi miscemus, uel ad uirium ipsius uehementiam obtundendam, uel ad saporis asperitatem mitigandam, uelut quum ad purgantia medicamēta, quicquam ammiscemus ex his quę stomacho grata sunt. Et ad dolorem sedantia, quædam uim ipsorum lenientia, uelut castoreū & cætera huiusmodi, ad opium & mēdragoram. Tunc autē maxima componendi pharmaca necessitas est, quum morbus contrarias facultates inter se requirit, uelut repellentes simul & extergentes, aut inspissantes & simul attenuantes, quale est quod ex papaueris capitibus ac melle paratur. papauer enim tenues destillationes à capite inspissat. Mel autē humores ad pectus ita delapsos, relectu faciles facit. Necessariō præterea componuntur medicamēta, ut idem medicamentum habere possimus ad plures morbos cōgruum, uelut ad uirus eiactulandum bestiarum letus, & ad uenenosas potiones. De Antidotis ergo & epithematis satis supra tractatum est. Cæterum eorum quę in emplastra inijciuntur, quædam terrea sunt, uelut metallica, & lapidum ac terrę species, fecesq; ac cineres & testæ. quædam oleosa, quædam lacrymę, quædam liquores, quædam succi, quædam liquabilia, quædam semina, quædam herbę, quædam radices. Et rursus quædam qualitatis expertia, quædam acria, quædam adstringentia, quædam calfacientia, quædam extensoria, quædam maturantia, aliqua diffundentia, aliqua mollientia, aliqua discussoria, & innumerę alię differentię reperiuntur. Spuma igitur argenti exiccat, extergit, calefacit ac refrigerat moderate, ad omnia æqualiter efficax. Hęc aliquando in oleo solo, aliquando aqua aut uino, aut aceto ammixto coquitur. Primo autē seorsim exactissime terenda est, deinde rursus cū oleo ad strigmentiam compagem redigenda, atq; ita assidue agitata ad lentū ignem coquenda. Intumescit primum ac bullas emittit, quum autem sufficiens cocturę propinqua fuerit, colorem sedis induit. Mensuram uero cocturę iustam recipit, quum tumor cōtractus fuerit, neq; amplius inquitinat. Similes spumę argenti uires plumbago habet, ad frigiditatem tantum magis progressa, nec pariter extergens. Eodem etiam modo coquitur, nisi quod in eius coctura non solum queritur ut ne inquinet, sed ut colorem quoq; ex igneo rubore, ad fuluum ac ualde floridum trāsmutet. Aesustum adstrictionis & acrimonię particeps est, cōtrahit, cicatricē inducit, & ab inflāmatione tutatur. Quum autem coquitur, nō statim in principio immittitur, sed emplastro iam semicocto. Mensurā cocturę, nisi ualde modicū inijciatur, color indicat, ut uidelicet exuberet, & fuluū emplastrū faciat. Squama æris carnē erodit, adstringit, & ualidius glutinat quā æs, sed minus discutit. Coquitur sicut æs, & eodem tempore inijcitur, eandēq; cocturę rationē habet. Nisi enim color eius exuberauerit, & fuluū emplastrū effecerit,

Nondum

nondum ad iustā cocturam peruenit. Squama uero ferri, praesertim stomomatis, ampliori adstrictione participat, quapropter ad malefica ulcera illi praefertur. Eodem autē tempore inijcitur, & rutilū colorem inducit. Diphryges mixtas vires habet, adstrictoriam cum acrimonia. Quare ad putrida ac maligna ulcera utilis est. Et hoc medio cocturae tempore inijcitur, bullitque donec color eius exuberet, neque amplius inquinetur. Chalcidis adstrictione simul ac acrimonia participat, contrahit, attenuat, discutit, aperit, & amplius superioribus adstringit, ac minus mollit. Vt uero tenuior euadit, & adstrictionem perdit. Coquitur sicut aes, citius tamen liquefit. Mensura cocturae est, ut rubicundius, ac puniceo coloris emplastrum faciat. Misy similes chalcididi vires habet, tenuiorū tamen partium est, & ideo magis attenuat, discutit & aperit. Sed minus mollit ac adstringit. Ad finē uero cocturae inijcitur, neque ullā mensurā exhibet. Sori quoque similes chalcididi vires habet, nisi quod magis terreū ac crassum est, atque ideo magis adstringit. Inijcitur & ipsum medio cocturae tempore, & tardius liquefit, & nisi quid prohibuerit, atrum colorem reddit. Flos aeris tenuior est aere usto & squama aeris, participat nonnihil absterforia ui, ideoque attenuat & agglutinat. Coquitur uelut de aere diximus. Atramentū sutoriū ex mixtis facultatibus constat. Valde enim adstringit, neque ingenerose calefacit. Prae omnibus itaque humidas carnes siccare, omnemque humiditatem consumere cogereque ac adstringere potest. Inijcitur medio cocturae tempore, & liuidiorem emplastrum colorem facit. Imo nisi alia obstiterint, atrum eius colorem facit. Auripigmentum & sandaracha ambo urendi facultatem habent. Magis igitur praedictis discutunt, & uita tenuioris essentiae sunt. Inijcuntur autē ad cocturae finem. Plumbum uustum ex his quae extra erosionem siccant, efficacissimum est ad maligna, chironiaque ac cancerosa ulcera, habetque per se, & cum alijs mixtum, facultatem inducendi cicatricem. Inijcitur medio cocturae tempore. Cerussa meatu obducit, & moderate frigida est. Cocta uero siccior seipsa euadit. Haec in emplastro alba, ad finem cocturae inijcitur. Sic enim colorem conseruat, & magis inalbatur. In nigra uero, aut melina statim in principio inditur. Aerugo aeris acrimoniae particeps est, discutendi incidendique ac consumendi omnem carnem uim habet, plurimo autem cerato ammixta extergit ac cicatricem inducit. Haec in emplastro uiridia post cocturā inijcitur. In quibusdam uero ne inijcitur quidem in ollam, sed cum aceto in mortario teritur, & reliqua ad ipsam affunduntur. In melina uero emplastro medio cocturae tempore inditur. At in ea quae geminā faciem accolorem praese ferunt, statim a principio inijcitur. Dū enim coquitur erugo primum melina, deinde bicolor, postremum fulua efficitur. Alumen omne uehementissimam habet adstringendi facultatem resicatoriam & agglutinatoriam. Omnium autem tenuissimum est scissile. Inijcitur plerumque post cocturam, neque peculiarem cocturae mensuram habet, color eius plerumque ad uiriditatem mutatur. Rubrica adstringit, resiccatur, agglutinat, inijcitur in fine cocturae. Cadmia extensoriam uim habet, caliditate & adstrictione temperata. Vt uero lora sine erosionem extergit ac resiccatur, pompholyx quoque lenissimum

pharmacum est, & malignis ac ulcerosis ulceribus congruum. Inijcuntur ambo in cocturae principio. Sal mixtam facultatem habet extergendi ac adstringendi, magis tamen adstringit, & ualde resiccatur. Nitrum autem extergendi incidendique ac exiccandi uim habet. In attractorijs emplastris sal ipsi misceri solet. Et ambo medio cocturae tempore induntur. Sulphur omne attractoriam uim habet, calidamque ac tenuis essentiae est. Inijcitur in fine cocturae. Nigrefacit enim emplastra. Atque haec quidem metallica sunt quae in emplastra inijcuntur. Terrae uero in ipsa induntur, samia, crethria, cimolia, ampelitis & lemnia. Ex lapidibus autem phrygius, asius, pyrites, haematites, magnes, achates, iaspis, gages, cos. Horum vires superius exposuimus. Inijcitur & pumex, extergendi attenuandique ac discutendi uim habens. Testae praeterea conchyliorum uistae, ac crudae, tanquam attenuantes, extergentes, ac discutientes, & resiccantes, ad sinus glutinandos ammiscuntur. Idem praestant & scistilium testae, extensoriae etiam ipsae ac resiccantis facultatis. Inijcitur item calx tanquam praecclare resiccans, & ad cicatricem perducens. Cinis uero praesertim sarmentorum sinus agglutinat, callosque extergit ac resiccatur. Haec omnia terrea in fine cocturae inijcuntur. Aëro uero in pinguis emplastra oleum recipientia. Oleum statim a principio cum metallicis inijcere oportet. Si uero cum resina quadam, aut pice liquida emplastrum parietur, & oleum statim ab initio infeceris, incohærens faciet medicamentum. Quapropter ut compages fiat, resinas liquidas primum indere oportet, deinde in fine oleum superaddere, atque ita rursus ad bonam compagem coquere. Reliquae pinguedines, & praesertim adipēs recentes, tenerrimi, medio cocturae tempore inijcuntur. Ex unguentis irinum quidem cocturam sustinet, cyprium uero & rosaceum, minus ferunt, cetera omnino non tolerant. Quapropter haec in fine cocturae inijcuntur. Cera porro calefacit & moderate mollit, minusque glutinat uulnera cruenta. Nunquam coquitur per se, ita enim uratur. Neque cum resina aut pice liquida, ita enim incomposita maneret. Sed inijcitur ad oleum purum, uel aliud cum metallicis coctum, aut ad resinam uel picem praecoctam. Resina omnis multo magis quam cera calefacit, discutit, mollit, extrahit & aperit, ac cruenta uulnera glutinat. Et arida quidem resina post ceram inijcitur, liquida uero seorsim praeceteris omnibus coquitur. Si admodum fuerit modica. Pix vires omnes resinae habet, sed ualidiores. Inijcitur praeceteris omnibus. Mensura cocturae liquida est, ut cogatur. Siccae uero, praesertim si cum aceto coquitur, ut non amplius bullas emittat, neque intumescat. Bitumen cruenta uulnera glutinat, & praecclare calefacit ac resiccatur, & sinus implet. Coquitur statim ab initio infectum. Verum non minute tritum id inijcere oportet, habet enim asperitates sicuum granis similes. Quare crassius contundendum est, & in aceto coquendum citra agitationem, donec non amplius bullas emittit. Agitatum enim in grumos cogitur. At si absque aceto coquendum est, oleo simul additum facile liquefit. Propolis calefacit, discutit, maturat, extergit & attrahit. Hanc praemollire oportet, atque ita coquere ab igne ablatis infecta. Nulla enim amplio

amplioſorem cocturam tolerat. Ammoniacum mol-
lit, diſcutit, caſcit, putredinem educit, attrahit. In-
ijcitur medio cocturae tempore. Et ſi quidem coteri
ac cribrari poteſt, leiſſimum inſperges. Sin minus,
cum liquore quopiam leiſſigatu immittes. Cum ace-
to quidē aut uino, ſi ad cruenta uulnera emplaſtrum
paratur. Si uero ad fiſtulas aut ſtrumas, penitus cū
aceto. Si uero molle fuerit emplaſtrum, qualia ſunt
quae ad ſedem parantur, cum aqua, ita ut ad reliqua
refrigerata infundas, ut ne efferueſcant, ac rursus co-
quas. Opopanax magis caſcit quam ammoniacū,
diſcutit & reſiccit. Inijcitur peracta coctura, qua
penitus modica opus habet. Et hunc aceto aut uino
prius terere oportet. Galbanum ualde caſcit, con-
coquit ac diſcutit. Cocturam autē penitus non tole-
rat. Itaque ablato ab igne medicamento probe mol-
litam inijcere oportet. Aut cum aceto uel uino ad
ſtrigmentitiam compagem diluta reliquis ammiſce-
re. Sagapenum uires habet galbano ſimiles, magis
tamen diſcutit & attenuat. Inijcitur in fine aceto aut
uino prius tritum, ita ut cum ablato ab igne empla-
ſtro emolliatur. Bdellium caſcit, diſcutit, attrahit,
molliſcit. Inijcitur tritum poſt peractam cocturam. Si
uero pingue fuerit, ac teri non poſſit, in mortario tu-
ſum cum emplaſtro emolliatur. Thus parum caſ-
cit, praecclare maturat, modice attrahit, & ſinus glu-
tinat pollen eius, ſimiles uires habet, magis tamē ad-
ſtringit. Quare medicamentis ad cruenta uulnera cō-
mode miſcetur. Inijcitur utrumque in fine cocturae.
Myrrha caſcit, concoquit, attenuat, diſcutit, & ex-
ſiccit, facit ad uulnera cruenta. Inijcitur in fine coctu-
rae cum aliquo liquore qui emplaſtris miſcetur con-
trita. Aloē ex uarijs facultatibus conſtat. Adſtrin-
git enim, caſcit, attenuat, diſcutit, ſinus glutinat ac
reſiccit. Additur poſt omnem cocturam. Sucus pa-
paueris ſtrenuē perfrigerat, dolores ac inflāmatiō-
nes mitigat, & cruenta uulnera glutinat. Hic pridie
in aqua modica maceratur, & in mortario teritur,
atque ſic emplaſtrum ad ipſum diſfunditur. Tha-
pſia caſcit & rubificat cutem. Inijcitur poſtrema
liquore quodam trita. At uero nulla herba, aut ra-
dix, aut ſemē cocturam tolerat, celerrime enim tora-
reſiunt. Teruntur igitur ac manent in mortario, &
liquefacta reliqua ad ipſa diſfunduntur. Aliquan-
do tamen herbas aut radices praemaceratas, in oleo
coquilimus, & expreſſas abijcimus, & oleum ad me-
dicamenta aſſumimus.

De cruentorū uulnerū curatione, Galeni. Cap. xxvi.

Parua & ſuperficiaria uulnera, natura ſua ſponte nul-
lius medicamenti indiga ſanare ſolet: labia ſolum a
nobis contrahantur, & ligamento circundentur, ne
piſus, aut arena, aut tale quid illabatur, & ulcus pe-
nitius coaleſcat. At ſi amplum fuerit uulnus, ut labia
contrahi non poſſint, & ſanies congregetur, aut ura-
geat dolor, tale uulnus ſola labiorum contrāctione
agglutinari non poteſt, ſed per medicamēta reſiccā-
tia collectam ſaniem conſumere, & aſſluentem pro-
hibere oportet: talia uero ſunt agglutinatoria phar-
maca inflāmationem arcētia. Si uero uulnus pro-
fundius fuerit, & in ſuperficie anguſtius, ſcalpello in-
cidatur, ut aequalis amplitudo fiat, & inſinuati hu-
mores non putreſcant, neq; uicinas partes corrup-
pant: proinde qui cruenta uulnera glutinare uolue-
rit, hāc conſideret, & prā omnibus grumos dili-

genter ex uulnere educat. Quantulacūq; enim eo-
rum pars in cauitate relicta in pus cōuertitur, & car-
nes ſubinde putrefacit. Educemus autē grumos ſpō-
giarum mollium aſſiduo ſotu, atq; hāc nō in omni-
bus ex aceto exprimantur. Sed ſi uulnera ſine eru-
ptione ſanguinis fuerint, aqua ſolum foueantur, ita
enim carnem nihil offendemus, quam adſtringens
acetum impedit ne cito coaleſcat. At uero profun-
diora uulnera penitiores & difficulter extirpabiles
grumos in ſe habētia, aceto rigabimus, quod ex ſpō-
gia uſq; ad fundum ipſorum exprimemus. Acetum
enim ad diſſoluendos grumos efficax eſt, per adſtri-
ctoriā facultatē aperta uafa occludens, allationemq;
ſanguinis cohibens, quibus omnibus a principio in-
tentum eſſe cōuenit, etiamſi aliās acetum obturan-
do corpora, tardioſorem faciat uulneris unionem. Cae-
terum ſi in capite uulnus fuerit, ſupra relata mēbra-
na caluariam ambiens conſideranda eſt, an illaeſa aut
ſimul pertuſa ſit: Si enim illaeſa permanſerit, labia ſu-
turis protinus contrahes, & agglutinatorijs uteris:
Si uero perforatam aut cōtuſam reperiſeris, ad tutio-
rem curationem membranam diſſecabis, & os dili-
genter derades, linamenta q; cōuulſa indes, & forin-
ſecus ſplenium inflāmationem arcens impones, &
ſupra id ſanam ſuccidā ſeu ſpongiā molliſſimā,
uino aut aceto imbutam ac expreſſam, ſine oleo ad-
hibebis, praecipue ſi ſanguinis eruptio praecēſſit,
poſtea ſaſcōlā lineam aceto rigatā ac expreſſam
obligabis, uinculi capite in uulneris loco ſtatuto,
quemadmodū in artuum fracturis fieri ſolet: Stu-
dio uero habendum eſt ut ligatura ſuſum uergat.
Verum conſtrictionem eius moderatā eſſe cōuenit.
Nā uehemētiore dolore excitat, laxior inutilis eſt,
poſt tertiā diem uulnus fractura carens ſpongijs fo-
ueatur, deinde linamēta medicamēto ſuppuratorio
illita indantur, & reliqua ſuppuratoria curatio ad-
hibeatur, poſtea ad repurgandum ac incarnandum
progreſſus fiat, quemadmodū paulō poſt de uuln-
eribus indicabitur. Porro quoniā rupta caluarię mem-
brana, ubi uulnus negligitur, inflāmatio cōſequi-
tur, ſi in principio inflāmationis uoceris, protinus
ſiccare uulnus conare, & membranā diducere atque
os caluae deradere. uulnere enim diducto, inflāma-
tio antequā exandefcat, ſupprimitur: facta diſſe-
ctione linamēta indes, & ad ea retinenda linetū uino
& oleo imbutum, aut ſplenium inflāmationē arcēs,
forinſecus impones, & ſupra hoc ſanā uino & oleo
imbutā adhibebis. Et deinde ad ſuppuratoriū ductū
te conuerſes. Si uero inflāmationem uehementē na-
ctus fueris, deradis capillis locum aqua moderate ca-
lida rigabis, & medicamēta adhibebis inflāmationē
ſedantia. Inflāmatione uero ſedata, mēbrana caluam
ambiens ſuppuratur, & uicinae partes abſceſſum pa-
tiuntur. Quapropter expedit ut diſſecetur uelut di-
ctum eſt, & pus excernatur, ac caluarię os derada-
tur, & poſtea cōmunis ulcerum curatio fiat. Si uero
fractura in capite aut alio loco unā cū uulnere fue-
rit, emplaſtrum ad fracturas accommodatum impo-
natur. De eo uero partem quadrangularem reſecare
oportet, quo loco uulnus exiſtit, aliudq; parū ſple-
nium uulneri imponere, quale diximus. Atque hoc
paruum ſplenium quotidie tollendum eſt, & ulcus
curandum, ac deligandum. Cæterum agglutinato-
ria medicamenta Sermone xv. ſcripta habentur.

De ſane

De sauciatis nervis, Galeni. Cap. XXVII.
 Nervus uulneratus aut punctus, dolorem & inflammationem uehementissimā habet, propter sensus subtilitatem. Quapropter cutis uulnus inagglutinatum seruare oportet, quo per ipsum saniosi humores effluant. Vbi uero uulneris os latius fuerit, conari ut resiccantibus medicamentis labia ipsius committantur ac uniantur. At si per acum aut paxillum, aut tale quiddam, uulnus inflictum fuerit, & in altum progressum, id saltem studio habendum est, ne inflammatio sequatur. Etsi tunc longe tutius ut cutis circa uulneris osculum dissecaretur, quo commodius in altum procederent uires medicamentorum. *At uero si uires ualidae fuerint, & nihil impederit, uniuersum corpus per uenae sectionē euacuetur.* Seruandaque est in euacuando locorum affinitas, ut dextra manu sauciata, dexter malleolus siue talus, sinistra sinister indatur: Et uulce uersa dextro crure uulnerato, subalaris uena dextrae manus, sinistro sinistrae, rectitudine seruata secetur. Si uero subalaris non apparuerit, media secabimus. Quod si corpus uiciosis humoribus repletum fuerit, purgatione per idoneum pharmacum utemur. Ceterum aqua calida quae reliquis inflammationibus commodissima est, his infestissima existit. Ab humectantibus enim & calfacientibus putrefactio inducitur: praestat igitur nervos sauciatos oleo moderate calido tenui, ac nihil adstringente rigare, tale autem est dulcissimum, quod melius longe fuerit, si annos duos aut tres habuerit. Nerui enim sauciati curatio medicamentis opus habet, quae tepidam caliditatem habent, ualde uero siccant, atque hoc citra molestiam, & quae substantia tenuissima praedita sunt. Huiusmodi enim sola sine partium distensione ac mordacitate, sanem ex alto euocare possunt. Quapropter oleo in quo anethum & ruta decocta sunt, calido perfundimus. Saepius etiam ceratum ex Euphorbio, aut emplastrum Anicetum, aut quoddam ex his quae ad uulneratos nervos describuntur, modico oleo liquatum adhibemus. Deinde emplastro aliquo ex praedictis imposito, lanam oleo calido imbutam extrinsecus illigamus, & per singulos dies bis aut ter soluimus. Et si longiores fuerint noctes, noctu quoque, praesertim ubi mordacitas uulnus iritet. Quod si neque mordacitas, neque dolor percipiatur, bis tantum in die, & circa uesperam semel soluimus. Et praeterea alas ac collum oleo calido large rigabimus. Si uero nervus in crure sauciatus fuerit, inguina ac totam spinam & collum, oleo item calido uberius perfundimus. At uero si nervorum uulnera a principio male fuerint curata, maxima inflammatio ac putrefactio sequi solet. Itaque farinam ordeaceam, aut fabarum, aut erui in lixiulo cum aceto mulso coctam imponere oportet. Est enim hoc cataplasma efficax ad ea quae iam putrescunt. Si uero uehemens inflammatio cum maximo dolore infestauerit, farinam erui aut fabarum cum optima sapa, modico aceto addito coctam imposito, calido oleo prius affuso. Ceratum uero ex euphorbio ad nervos uulneratos, cuius paulo ante mentionem fecimus, hoc modo praeparatur. Ceræ, terebinthinae, olei, singulorum trientem, euphorbij recentis sextantem, aut biennalis quadrantem, aut prorsus antiqui trientem. Et si terebinthina defuerit, colophoniam pro ea accipito. Longe uero praestantius euadet medicamentum, si propolim

pinguem ac recentem acceperit, ut sit terebinthinae quadrans, propolis triens, ceræ uncia 1, olei triens, euphorbij sextans. Deficiente uero euphorbio, sulphur, aut castorium, aut cōsimile quiddam calidum ac tenuium partium ammisceris. Quod si omnino ab exacta & media pharmacorum ad sauciatos nervos compage aberrandum sit, praestat ad molliorem compagem declinare, etsi ita paratum inquinet. Optimum praeterea ad eundem usum pharmacum est ex brutia pice & oppopanace, quod etiam ad morsus canis rabidi facit, praecipue si corpora contigerint robustiora. Nam in tenerioribus per ceratum ex oleo aliquo discussorio uires eius mitigare potes, quale est irinum, aut amaracinum, aut opobalsamum, aut oleum uetus. Egregie facit & Anicetum, quod sermone xv, inter emollientia medicamenta habetur. Quin & ex metallicis constans pharmacum, efficax est ad nervorum punctiones. Habet id hoc modo. Chalcitidis crudae drach. viii, misyos crudi drach. xvi, squamæ aeris drach. xxii, ceræ drach. xvi, olei dulcis aut ueteris, aestate quidem drach. cxi, hyeme uero centum xx, thuris drach. xxi, terebinthinae drach. xvi, galbani drach. xii, aceti acerrimi & antiqui quantum satis est. Metallica ad solem aestiuum pluribus diebus terito, indeque addito thure rursus conterito, & quae liquari possunt liquata affundito ac subigito. Hoc medicamentum uulneri appositum inflammationem arceat, uelut saepe experti sumus. Admirandum praeterea ad sauciatos nervos medicamentum est quod e sectione paratur, & habet sectionis succi uncias xxiii, olei antiqui, olei cyprini, olei dulcis, apochymatis siue picis e nauibus erasae, singul. trientem, galbani, aeruginis, singulorum drachm. ii, terebinthinae drach. vi, adipis ueteris drachm. xi, ceræ drachm. viii, resinae pinus siccae drachm. vi. Succum cum oleis coquito donec propemodum consumatur. Aeruginem uero cum modico succo terito, & quae liquari possunt liquato ac excolato, insecta terebinthina cum decoctis uncto, postremumque omnia ad aeruginem tritam affundito ac subigito: facit ad maximas musculorum in uulneribus inflammationes. Et duritias ac recetes puerorum strumas dissoluit. Porro qui sauciatos nervos habent, urgente necessitate post septimam, uel ubi dolor penitus quiescit, lauare possunt. Verum lauandis medicamenta uulneri indimus, & forinsecus multiplicia lintea oleo imbuta imponimus, & fasciam ex linteo obligamus. Deinde egro in solum descensuro, ligamenta multo oleo rigamus. Et post balneum remotis omnibus quae applicata fuerant, praescriptam curationem adhibemus. At si uulnus in manu fuerit, admoneatur aeger, ne id calidae siue frigidae lauacro humectet. Oribasij ad priuatos sauciatorum nervorum abscessus: priuatos autem uocat, quando in proximis puncturae locis abscessus parui & multi per certa interualla oriuntur. Ceræ, colophoniae, butyri, singulorum lib. i, picis siccae, mellis singulorum sexuncæ, aeruginis quadrantem, aceti quantum satis est ad aeruginem conterendam ac dissoluendam.

Curatio neruorum denudatorum ac uulneratorum in ulceribus. Cap. xxviii.

Quod si nervus non fuerit punctus, sed manifesta dissectione incisus, ita ut etiam cutis praeposita sit dissecta, & appareat nudus nervus, secundum rectitudinem & non transuersim

transuersum dissectus: relata ex euphorbio aut metallicis medicamenta, minime adhibenda sunt. Abstinentia dum est ab emplastro Aniceto, & ceteris tanta acrimonia praeditis. Nudus enim nervus uehementem ipsorum ulm non feret, proinde calcem assumes lotam plurimo rosaceo diluta. Sit autem calx in diebus canicularibus ad solem aqua dulcissima saepe elota ac resiccata. Bonum est & ex pompholyge medicamentum plurimo ac optimo rosaceo dilutum, pompholygem autem eisdem lauare uelut calcem oportet. Sed & cera in hufusinodi pharmaca recipienda lauanda est. Per omnem enim denudati nerui curationem, resiccare citra mordacitatem intendimus, quare nihil acre uulneri ad mouendum est. subtilissimo enim sensu praeditus est nervus, & temperamento frigidus, ac principalisimo principio coherens ac coniunctus. Sed nec oleo tale ulcus rigandum est. sordidum enim inde euadit. Verum lana molli specillo obuoluta sanies detergenda, & ne arida lana uulnus contingat, sapa imbuti potest, & ea expressa uulnus detergi, praeterea medicamenta quae adhibentur, tepida esse oportet. Quae enim frigida apponuntur conuulsionem inducunt. Ad nervos quoque denudatos emplastrum Aegyptium efficacissimum est, quod est succida lana paratur, & fuluum piscatoris, ambo rosaceo diluta & linamentis indurata. Omnium autem praestantissimum est & nulli comparandum emplastrum I his appellatum, optimo rosaceo dissolutum, & cum linamento tepidum ulceri inditum. Sedat enim dolores & sordida ulcera cito repurgat, incarnat, & ad cicatricem perducit. At ubi linamenta ulceri immiseris, forinsecus emplastrum est sinectione si haberi potest, sin minus, anicetum adhibebis. Ceterum si uulnus nerui transuersum fuerit, maximum conuulsionis periculum imminet, inflammatione a dissectis fibris ad integras transiente. Quod si integre fibrae conuulsae fuerint, eadem curatio & his, & ulceri adhibetur, parcius tamen hinc aegro sanguis auferendus est, & diutius tenuis constituenda, & quies impetranda, & stratum mollissimum parandum, plurimum item oleum calidum inguinibus, spinis, axillis, collo, ac capiti affundendum est. Atque haec curatio communis ad omnia neruorum uulnera est.

De neruorum contusione.

Cap. xxi.

Contuso neruo si cutis simul contusa fuerit, & ulcerato fiat, farinam fabaceam cum aceto mulso, aut erui farinam cum sapa & modico aceto impones. Ambae enim sunt efficaces. Quod si cum contusione dolor adsit, picem liquidam ad fabaceae farinae cataplasma addes, & simul cocta calida adhibebis. Si uero maior resiccatione opus habueris, parem mensuram farinae erui ammisceris, itemque iridem illyricam, si adhuc fortius resiccare uolueris. Vniuersi uero corporis curatio eadem est cum ea quam paulo antea praescripsimus. At si nervus fuerit contusus citra manifestam cutis contusionem, oleo calido discussorio, anethino aut rutaceo locus assidue perfundatur, & lana oleo imbuta adhibeatur. Reliqua uero curatio praedictis similis fiat. Porro si totus nervus fuerit dissectus, nullum quidem periculum imminet. Verum pars mutila sit, praesertim si dissectus nervus magnus fuerit. Curatio uero eadem uelut ad alia ulcera adhibetur.

De glandularum inguinis inflammatione, Galeni. Cap. xxx.

Quum glandulae inguinis universo corpore pleno, citra aliam manifestam causam, inflammatae intumuerint, hu-

mores circa glandulas constipantur. Proinde nisi quid prohibeat, cubiti uenam secabimus, tantumque sanguinis auferemus, quantum plenitudo ostenderit. Loco uero inflammato & ante sectionem uenae, & in ipso sectionis tempore, adstringentia ac repellentia medicamenta apponemus. Verum postea euacuato corpore, discutientibus ea quae affluerunt utemur. At si ulcus in crure fuerit, & per consensum glandulas inguinis affligerit, quemadmodum in digitorum pedis offensa fieri solet, glandulam inflammari incipientem statim a principio lana oleo calido imbuta mitigabimus, non adiecto sale, uelut aliqui faciunt. Sal enim tenuiores humores conferit discutiens, reliquum callosum, aegre curabile, & saepe immedicabile relinquit, postquam autem inflammationis feruor quiescit, mitigatoria relinquemus, & discussoribus utemur, quae ad cerati compagem redacta glandulis imponi debent. Nam quae duriora fuerint, eas partes distendunt, & rursus inflammationes irritant. Atque hoc quidem modo glandulae tractentur, ipsum uero crus statim a principio calfaciendum ac humectandum est, ita ut ulceri inflammationis causae cataplasma mitigatorium, aut ceratum aliquod ad sedis affectiones paratum imponas, totumque membrum lana oleo calido imbuta foueas, & aegro quietem imperes. Sedato autem ulcere plerumque etiam glandulae doloris exortes fiunt. Egrege uero glandulis confert psyllium aqua calida madefactum, & panniculo aut brassicae folio excipitum & impositum. Item ceratum ex butyro paratum, & quod ostrea usta recipit. Confert & discussorium emplastrum Dionysia appellatum, & quod est buccinis praeparatur, quorum omnium praeparationes Sermone x. habentur. Vbi etiam ceratum & psyllio est, aut emplastrum, si ita appellare malueris.

De quacunque inflammatione, eiusdem.

Cap. xxxi.

Omnis inflammatio ob sanguinis affluxum, uel a manifesta, uel ab occulta causa generatur. A manifesta, quando ab offenso pede glandulae inflammantur. Ab occulta, quando aliqua parte delegante, aut toto corpore transmittente, & affecta parte ob debilitatem recipientem, humorum copia affluerit, uelut supra de podagra ostensum est. Saepem uero etiam pars quae inflammatur ob morbosam aliquam & praeter naturam caliditatem, materiam ad se trahit. Erit itaque inflammationis principium, quum primum pars sanguinea materia repletur. Augmentum uero, quando affluxus alius de celsa, & qui in parte continetur putrescere incipit. Atque eo tempore caloris praeter naturam incrementum, & humorum diffusio, & partis distensio longe maior est quam antea fuit. Vbi uero iam pus coalescat, maximus dolor adsit, inflammatio in uigore est. Declinationem autem dicimus, quum allapsus humor discutitur, & tumor ac distensio minuitur, & dolores mitigantur. Inchoante itaque inflammatione uictus ratio moderata est, cibisque contrahendus, & aquae potus imperandus. Et si inflammationis magnitudo sanguinis detractionem postulat, & etas ac corporis habitus, & anni tempus non obstat, praesertim in hominibus sagittine abundantibus, post praestitutam uictus rationem, uenam secabimus, tantumque euacuabimus, quantum plenitudo, & inflammationis magnitudo, & aegri uires indicauerint. Verum in principio, & ante uenae sectionem, & ipso sectionis tempore, inflammatae parti cataplasmata repellentia adhibebimus. In augmento uero ex discussoribus aliqua

aliqua ad repellenda ammiscemus. At in uigore dū uehementissimi sunt dolores, mitigatoria applicabimus, uelut in declinatione ea solū quæ discussoriam uim habent. Inchoantes itaq; inflammationes repellunt glauciū, perdicū, stratiotes in aquis nascens, plantago, polygonū & similia. Mitigant autem & dolori in uigore inflammationis comoda sunt, malua per se, & cū modico pane ac rosaceo imposita, præstat & melilotū passo coctum & cum pane impositum. Idē præstant palmulæ in passo coctæ, & cum pane ac rosaceo subactæ impositæ. In declinatione uero agrestis malua pollet, & uux passæ, uinaceis exēptis, cū pane ac modico melle. Item ordet farina cum melle aut oleo adhibita. Quod si locus affectus nimia materia turgat, nō mox ad chirurgiam prorumpere oportet, uelut quidā faciunt, sed conari ut materia collecta per pharmaca discussoria digeratur. Quale est quod ē buccinis uitis cōstat Ariobarzantium appellatum, aut Oribasij fuluum, aut quod Dionysias appellatur ē misy paratū, & reliqua eius generis, quæ Sermone xv. habetur. At si residuū ex inflammatione callosum factum fuerit, uehementioribus medicamentis utendum erit, ita ut singulis diebus bis quantum ea proficiant inspectemus.

De abscessibus.

Cap. xxxii.

Si inflammationes producantur, & ad suppurationem conuertantur, adiuuare oportet ut quam celerrime transmutentur, proinde partē affectā altheæ ac ficū decocto rigabimus, & farinā ordet aut panem cum aqua & oleo imponemus. Quod si egre suppuretur inflammatio, hordeum aut panem in pinguiū carica-rum & altheæ decocto coctū imponemus. At si adhuc diutius perstiterit, simū columbinū, & nitrum, & terebinthinā adijciemus, peracta uero transmutatione in pus, locus aperiatur qua parte maxime eminet, ibi enim tenuissima est cutis. Et si pars aliqua suppurati loci, putrida uidebitur, ea necessario rescindenda est. Resectio autē ad myrrei folij formam fiat, lōga uidelicet & angusta, quod sane in axillis ac inguinum abscessibus faciendum est. In capite uero & huiusmodi locis simplici sectione utemur, qua facta thuris pollinem tenuissimum ulceris cavitati inspergemus, & linamenta cōuulsa indemus. At uero ubi duæ aut tres sectiones factæ fuerint, limniscos immittere oportet, & postea linamentis conuulsis ulcus replere. Ad tutandum uero locum simplex lintecolum uino & oleo imbutum obligabimus. Tertia deinde die ad suppuratorium curationis ductum conuertemur, per retrapharmacum & similia rosaceo diluta. Si uero post indita linamenta circumscitæ partes adhuc fuerint inflammatae, cataplasmata adhibebimus, & si nihil amplius urgeat, splenium sedandis inflammationibus aptum imponemus. Cæterum suppuratione facta repurgantibus utendum est, ex quorum numero præstat emplastrum Aegyptium, quod recipit terebinthinæ liquidæ & mellis ac rosacci portiones æquales simul liquatas. Sed in robustioribus corporibus, ac impurioribus ulceribus, terebinthinæ ac mellis par mensura absq; oleo liquatur, & mirifice repurgat. Verum ad ulcera quæ difficulter repurgantur, confert Aegyptiū quod coctum appellatur, colore fuluū, cum ærugine rasa ac melle coctum, donec fuluum colorē susceperit. Sunt & alia huic similia, quæ ad fistulas paulō post refe-

rentur. Repurgatis ulceribus ad incarnaciā transeundum est, quæ paulō inferius ad caua ulcera describemus. facta uero incarnatione, rhodio emplastro aut psaro cōmittantur, & ubi explanata fuerint ad cicatricem perducantur, per sicca medicamēta quæ referentur ad ea quæ cicatrice opus habent. Suppuratorium abscessuū, experimēto constat. Maluæ agrestis tritæ ac coctæ, farinæ tritici, stercoreis suilli, æquales partes in sapa coquito, ac imposito, & celerrime suppuratio cōtinget. Philosophi. Ad omnes inflammationes discutendas, facit priuatim ad mamillas & glandulas inflamatas. Adipis suilli sexuncem, albumina ouorū duorum, mel ad ouorū mensuram, nistri sextantē, farinæ polētæ quantum satis est. Adipi liquefacto oua ammisceto & mel, deinde nitrū, postremum etiā polentæ farinam quantum ad emplastri compagem satis erit. Sunt qui ita præparent. Accipiunt oua una cum uitellis undecim numero, farinæ polentæ libram unā, adipis suilli librā unam, mellis quantum sufficere putant. Nam discutere uolentes, uberius sedare intendētes, parcius ammiscent. Quidam etiam nitrū addunt. Sed quod nitrū habet, magis discutit, quod nō habet, magis sedat. Vterē præterea eo quod ex psyllij succo paratur. Ruptoriū abscessuum. Nitrum & ammoniacū aceto subacta impone, quam diu locū perumpi uolueris. Quidam pro ammoniaco thus adijciūt. Abscessus autē etiam permutatos discutit, Ariobarzantium ex buccinis constans, & quod Dionysias appellatur, ambo in sequenti Sermone descripta. At quod ad Oribasij refertur sic habet, lapidis pyritæ drac. xii. ammoniaci thymiamatis tantundē, farinæ fabarum drac. vi. terito ac cribrato & resina excipito. Sitq; resina, si haberi potest terebinthina, sin minus, liquida, quo emplastri forma fiat. Hoc uel discuties, uel dirumperis, euacuabit, ad cicatricem perducet, & sanabit. Nec uero diutius antea præparandū est hoc pharmacum, cito enim exarefcit. In decimo quinto Sermone etiam aliud discussorium, & aliqua ruptoria reperies. Oribasij Aegyptium repurgans. Mellis despumati libram unam, aceti libras duas, squamæ aeris uncia. i. æruginis drach. iiii. Acetum & mel ad mellis compagem coquito, deinde reliqua ammisceto. Aliud, eiusdem, ulcera sordida probe repurgans. Amurcæ coctæ, mellis despumati, aluminis Phorimi appellati, æquales portiones. Aliud ad abscessus, discutiens aut rumpens, & sine dolore euacuans. Spumæ argenti, cerusæ, ammoniaci, singulorum librā unā, olei quantum satis est, resinæ pinus, propolis, opopanax, singulorum sexuncem, castorei trientem, galbani, myrrhæ, thuris, singulorum sextantem. Aceti quantum sufficit. Spumam argenti & cerulam cum aceto coquito, & terenda cum aceto terito, & quæ liquari possunt liquefacto, & ad cocta ammisceto, & tritis adijcto, refrigerato, ac subigito.

De cauis ulceribus non malignis. Et ratio curandorum ulcerum. Galeni.

Cap. xxxiii.

Cauum ulcus humidum ac sordidū est, & ideo pharmacis moderate siccantibus ac extergentibus opus habet. Sæpe uero a nobis dictum est, non omni naturæ eadē medicamenta cōuenire, sed debiliori molliorib; molliora, ualidiori ualidiora esse adhibenda. Neque enim tolerat debilis natura potentiora, proinde quanto humidius fuerit corpus in quo est ulcus,

Ulcus, tantum minus resiccātes medicinas postulat. Quare duobus ulceribus æquali humiditate præditis, alterū quod in sicclori temperatura est, maiorem resiccationē postulat; alterū quod in humidiorē est, minore resiccatione opus habet, quanto hæc natura alia humidior existit. Carnem enim, quæ ad ulceris nutritionē distribuitur, reliquo corpori similē esse oportet. Vbi igitur pristina caro sicclor est, ibi noua quoque superueniens sicclor fieri debet. Merito ergo resiccāda est, & quanto prior sicclor fuerit, tanto ampliorē sicclandi facultatē medicamentū habere debet. Et ulce uersa, tanto minus resiccātia medicamēta conueniūt, quāto minus sicca prior fuerit caro. Thuris itaque qualitas ad humani corporis naturā comparata cū temperatis & medijs naturis cōsentit, humidiores autē paulo amplius resiccāt, quēadmodū sane etiam extreme sicclis, aliquādo humidius existit. Si igitur diligenter obseruaris, comperies thur in humidioribus quidem naturis carnē producere. In siccloribus autem minime, sed potius suppurare. Thus ergo sicut moderate calidum est, ita ex omnibus incarnantibus appellatis minime siccat. At hordeacea & fabacea farina magis siccat quā thus, & nulla caliditate participat. Aristolochia uero & panax omnibus amplius in suo genere resiccāt, & calidioris sunt naturæ. Mediū uero inter hæc obtinent, farina erui & iris. Et huiusmodi omnia in primo ordine resiccantiū ac extergentiū locantur, & minoris ac maioris discrimine tantū inter se differunt, & quod alia uires quibus excellunt simplices habent, alia cōpositas. In libro uero De simplicibus medicamentis ostendimus pompholygem uisā & lotam, & cætera huiusmodi, uelut cadmiā & ostreorum testas, ex eorū esse ordine quæ sine mordacitate sicclant & incarnant. Præterea ad ulcera caua incarnādā emplastrum uiride cōducit, quale est quod Ihs appellatur, multo rosaceo dilutum. Qui ergo recta uia medicandi procedet, ubi ægri naturā considerauit, statim dinoscit, quo medicamento ulcus indiget. Quū autem medicamentum incarnans adhibuerit, & nihil profecerit, sic quodammodo ad aliud transire oportet. Nam si ampliores sordes fuerint, & humidius ulcus, nosse debet quod medicamentum minus quā oportuit resiccauit, quapropter mellis ammixtionē uires eius intendet. Si uero purum & humiditatis exors ulcus cōpererit, plus quā debuit resiccauit, quare oleū ammiscerit, & ceratū liquidū adhibebit. Atque in his summa diligentia utendū est: contingit enim aliquādo, ut à fortiore medicamēto ulceris caro colliquetur, & sordidum ac humidū appareat ulcus, uelut ea quæ minus quā oportuit sunt resiccata. Verū hoc à peritis facile dinoscitur: ulcus enī eliquatū cautus seipso efficitur, & labia protuberantia habet, rubet itē & inflammationē habet, & æger sæpe manifestē mordacitatē percipit. Alterū autē ulcus, quod minus resiccātū est, tale nihil cōsequens habet.

Medicamenta quæ per linamēta indūtur, ad suppurandū, repurgandū ac incarnādū. Cap. xxxiii.

Sunt & alia multa ad repurgandū idonea, uelut lens, iris, marrubium, singula cum melle cocta, herinacel marini testa uisā, narcissi radix cū rosaceo & melle. Basilicum uero tetrapharmacū, & quod ad Azaniaten refertur, & Macedonicū, singula liquefacta suppurandi uim habēt, & omnia Sermone xv. descri-

bentur. Sed & hoc mirifice suppurat, omnē quoque duriciam citra dolorē emollit, & incarnat, & cauis ulceribus eximie prodest. Ceræ, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, adipis uitulini, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis attici, olei rosacei, myrrhæ, singulorū drac. viii. Myrrha cū melle trita ad prunas coquitur, & reliqua liquata affundūtur ac unīuntur. Aliud Aegyptiū, ad ulcera repurgāda mirādū. Mel cū pari terebinthinæ mēsurā, aut rosaceo, aut si nerosæ fuerint partes affectæ butyro ad prunas colliquamus. Verū in robustioribus corporibus, & sordidioribus ulceribus, terebinthinā cū melle adhibemus. Vtere etiā eo quod ex melle, aceto, & liliorum succo constat, quod Galenus ualde approbauit, cuius præparationē & utendū modum, in simplicium Sermone, capite De lilijis habes. His omnibus efficacius est quod aliqui Aegyptium uocant, sic habens. Aeruginis drac. iiii. squamæ aeris unc. i. aceti trientem, mellis dodrantē. Arida cum aceto terito, & ad lecto melle ad prunas ad fuluum colorem coquito. Aliud aureū uocatū, antiqua & recentia uulnera repurgans & incarnans. Salis cōmunis, cerusæ, atramenti sutorij, spumæ nitri albæ, singulorū quadrantem, aristolochiæ longæ & rotundæ, aluminis scissi, singulorū unc. i. Arida cū aceto trita, ceræ sextante & olei dodrante excipito: deinde usu experere cū plurimo rosaceo ad olei spissitudinē diluito, & adhiberis. Idem capitis quoque ossibus denudatis per linamenta inditur. Aliud caua ulcera replens. Adipis uitulini recentis, ceræ, terebinthinæ, singulorum drac. iiii. rosacei drac. xvi. para & utere. Aliud Archigenis Nutrix appellatū, ad cauitates explendas. Rosacei, terebinthinæ, mellis, singulorū sextantē, cerusæ, butyri, singul. unc. i. para & utere. Quidam & thuris unc. i. addunt. Aliud ad caua & pura ulcera explenda, experimento cōstans. Rosacei trientem, ceræ sextantē, terebinthinæ, butyri, mellis, singulorū unc. i. Omnibus ad calidū cinerē colliquatis ac firmul unitis ad linamenta tingēda utere. Si uero sordida fuerint ulcera, repurgatis antea uelut dictū est, adhibeto. Aliud. Cerusæ, spumæ argenti, pares portiones uino odorato & oleo excipe, & per linamēta usque ad cicatricē inducā inde. Aliud, ad sordida, cicatricē non recipientia, malignaque, ac callosa ulcera. Marrubij succū optimo melle exceptū inde. Aliud siccū, maligna & profundissima ulcera explēs. Farinæ erui drachm. xxx. iris drachm. xx. spumæ argenti drach. xv. aristolochiæ longæ tantundem, mannæ thuris, terræ samii, singulorū drac. x. squamæ aeris, cadmiæ, singul. drach. xv. Hoc in sordidis largē, in puris parcissimē linamentis illinito. Exaquatis uero ulceribus & iam cicatrice indigentibus, aridum specilli nucleo inspersum ulceri indito, & postea linamentum uino imbuto immittito.

De sicclis repurgātibus, ac incarnantibus, cephalicis appellatis, Galeni. Cap. xxxv.

Sicca medicamēta quæ cephalica, hoc est, capitalia appellantur, omnibus quidem totius corporis, maxime tamen capitis ulceribus incarnādīs conueniūt, præsertim ubi ossa in quacunque parte fuerint denudata. Nam ad ossa denudata pinguium & eorum quæ ad tingenda linamenta parantur, usum utimus, & sicclis tātum utimur. Quin & citra ossium denudationē, pinguiā non ita frequenter in ulcerum cura-

tionem adhibemus. Sunt autē sicca cephalica huiusce-
modi. Asclepiadis siccum cephalicū ad Xenocra-
tem relatum, quo fistulas sanabat. Erui farinae trien-
tem, iridis illyricae sextantem, aristolochiae tenuis,
squamae aeris, mannae thuris, singulorū unc. i. Misce
ac utere. Quidam etiam radice panaceae unc. i. adhi-
cunt. Et ex melle cocto oblongum quasi collyrium
faciunt, quod in fistulā immittunt, & postea siccum
inspergunt. Aliud siccum. Erui drach. x x. aristo-
lochia tenuis drach. x. squamae aeris, radice ultis al-
bae, singulorū drach. v. Vtere ad repurgandū cū mel-
le, ad replendum sicco insperfo. Aliud siccū opti-
mum, tuniculas ulcerum relictas consumens, callos
rescindēs, sordida ulcera purgās, caua replens. Squa-
mae aeris, resinae pinus, singulorū drach. x ii. pumidis
usti & uino extincti, iridis, aristolochiae tenuis, sil-
phii, singulorū drach. viii. thuris drach. iiii. Misce ac
utere sicco, uel cū melle. Aliud siccum, omne pro-
fundū ulcus incarnans. Farinae erui drach. x x. thuris
drach. x viii. fuci tinctorij, amyli, singul. drach. viii.
misce & utere. Aliud, ad capitis ulcera replenda.
Amyli, halicæ, thuris, lapidis specularis translucidi
usti, singulorū unc. i. Aliud. Colophonis seorsim
trita ulcus repleto, & cito sanabitur. Aliud. Co-
lophonis, amyli, thuris, cerusae, æquales portiones
para & utere siccis. Aliud admirandum Seueri, ad
ossa præcipue capitis denudata, derafo ossi insper-
sum: celerrimè enim incarnat. pollinis tritici, colo-
phonis tenuissimè tritæ, pares portiones præpara
ac utere, & linamēto indito, eius resinēdi gratia em-
plastrū quoddā molle cicatricem inducens impone.
Aliud, ad ulcera contrahenda. Misyos dra. iiii. gal-
larum, chalcididis, atramenti sutorij, aluminis scissi,
squamae aeris, singulorū unc. i. para & utere.

*De ulceribus in quibus caro superexcrefcit, &
que depressione opus habent, & de medicamen-
tis siccantibus, Galeni.* Cap. xxxvi.

Carnem in ulceribus superexcrefcēte consumūt me-
dicamenta fortiter siccantia. Qualis est flos asiae pe-
træ, & testacea omnia usta, & uterq; herinaceus cū
toto corpore exustus, & diphryges inspersum, &
aeris flos. Verū ergo omnia robore suo uincit. Siccum
Herculis. Squamae aeris, misyos, chalcididis u-
stæ, atramenti sutorij, aluminis scissi, æquas portio-
nes præpara & utere. Aliud, Rhodium appellatū,
refertur ad Hierā. Sistit itē sanguinē. Gallarū drach.
i x. squamae aeris drach. v. atramenti sutorij drach. iiii.
aluminis scissi drach. ii. Gallas ex dimidio uistas uino
austero extinguito, & reliquis tritis ammisceto.
Quidā atramentū sutorij drach. v. squamae dra. iiii. cō-
iiciūt, & gallas omnes cōburunt. Rhodiū, inquit He-
ras, ad sanguinē sistēdū efficax est. Facit & ad sacros
ignes, & ulcera proserpendo depascentia, ac nimio
humore marcescētia contrahit, ac cicatrice includit.
Quidā hoc modo Rhodiū cōficiūt, & ualde laudāt.
Chalcididis crudæ, misyos crudi, singul. dra. x. squa-
mae ferri drach. x vi. gallarū dra. viii. Siccū Pfarum
appellatū. Hoc largè inspersū contrahit ac deprimīt,
parcè adhibētū, ad cicatricē ducit. Chalcididis crudæ
lib. i. misyos crudi sexuncē, atramentū sutorij lib. i. æ-
ris usti sexūcem, squamae aeris sexuncē, præpara &
utere. Aliud utilissimū, deprimendū uim habens.
Squamae aeris drach. iiii. æruginis drach. i. Aliud.
Squamae aeris, calcis uiuæ, mannae thuris, æquales

partes præpara & utere. Facit ad ulcera maligna, &
carnes fungis similes cū melle repurgat, & cum ce-
rato replet. Aliud. Misyos drac. iiii. chalcididis dra.
ii. gallarū dra. iiii. atramenti sutorij, aluminis scissi,
squamae aeris, singulorū drach. ii. terito, & aperto ul-
cere cum specillo inspergito. Vtere etiā ad maximas
carnis superexcrefcēcias, his quæ ad sedis thymos
descripta sunt. Aliud. Lanae succidæ ustæ ac tritæ
insperse carnes marcidas ac flaccidas consumunt.
Idem faciunt balaustia ubertim insperfa.

De ulceribus nō malignis cicatrice indigentibus,

Galeni.

Cap. xxxvii.

In ulceribus quæ cicatrice opus habet, caro quidē in-
nato operimento munitur, sed cutis enasci non po-
test. Quapropter in summa carnis superficie simile
quiddā cuti efficiēdum est. Quoniā uero cutis carne
siccior est ac densior, si carnē siccabilimus & adstrin-
gemus, cuti per similem faciemus. Neq; uero satis est
hoc docere, quod resiccantia & adstringētia adhibere
oportet: nam & quæ cruenta uulnera agglutinant,
siccantia sunt & adstringentia. Verū in glutinandis
uulneribus id tantū quod influit resiccare conamur,
quod pars affecta superfluitatibus careat: in cicatrice-
bus uero inducendis, non solū influentē, uerum etiā
contentū in carnibus humorem consumere oportet.
Itaq; medicamentū, quod cicatricem inducit, longē
siccius esse oportet, eo quod glutinat, quo nō solum
superfluū consumat, sed naturalē quoq; humorem
attingat. Hanc itaq; rem præstant, galla omphacitis,
malicorium, spinæ Aegyptiæ fructus, & quæ citra
mordacitatē uehemētē adstringunt, qualis est myr-
tus. Testæ etiā & cadmia, & plumbum, singula usta
& lota, citra mordacitatē siccant, & ad cicatricē per-
ducūt. Sed his ualētiora sunt, chalcidis, misy, alumē
scissum. Et his adhuc potentius est æs ustū. Omnium
autē potētissima est squama aeris, quæ usta lene me-
dicamentū efficitur ad antiqua ulcera cicatrice inclu-
denda. Illitio Tetanica, ab extendēdo ac explanan-
do appellata, consumens ac deprimens. Adipis suilli,
cere, singulorū unc. i. terebinthinæ semunciam, nistri
unc. i. fellis taurini semunciam, resinae unc. i. Omnia
simul decocta ac excolata ubi tepuerint, manibus
subige ac utere. Quidam adhiēdunt atramenti sutorij
drach. v. Et medicamentū ab igne remoto aceti & sa-
ponis singulorū unc. i. adhiēdunt, ita ut hæc prius in
alio uase simul sint cōtrita ac dissoluta. Obseruandū
est ne pharmacū hoc in bulliēdo effuerescat, & as-
siduè agitandum, donec ad compagem perueniat.

*Sicca ulceribus non malignis cicatricem indu-
centia.* Cap. xxxviii.

Siccum quod cicatricē inducit. Ostreorū ustorū drach.
x ii. mannae thuris dra. vi. cadmiæ dra. iiii. præpa-
ra & utere. Aliud. Spumæ argenti, cerusae singul.
dra. v iii. recremēti plumbi, myrti sicce, gallarū om-
phacitidum, singulorū dra. iiii. para & utere. Aliud
siccū cicatricē inducēs. Cadmiæ, cerusae, mannae
thuris, amyli, æquales partes unito ac uitor. Aliud
admirandum. Cerusae sextantem, amyli unc. i. spumæ
argēti, thuris, rosacei, singul. sextantē, unito ac uitor.
Incarnat enim & ad cicatricē ducit. Aliud. Hoc etiā
diuturna ad cicatricē perducit. Corticis pinus drach.
vi. cornu cerui usti dra. iiii. cerusae dra. iiii. ærugi-
nis dra. ii. cadmiæ dra. viii. manne thuris dra. vi. præ-
para & utere. Aliud. Aristolochiæ dra. vi. corticis
pinus

pinus, pumicis usti & uino extincti, colophonias, singul. drac. iiii. Iridis dra. ii. unito ac utere ad incarnandū & cicatricē inducendā. Aliud. Pumicis usti & uino extincti drac. viii. mannae thuris, squamæ æris, singul. dra. iiii. præpara & utere. Aliud mirabile. Aluminis scissi dra. iiii. in aqua dissoluto, & in eo diluto linteolū tenue, uetus ac detritū, purum, ringito, & in sole siccatō, atq; hoc usus tēpore cōcisum ulceri indito. Verū ad sedis ulcera & diuturna alia, alumē in uino dissolues, & similiter facies: ad aurū uerō affectus, lanam pro linteo accipies. Aliud, plantaginē cum radicibus siccatō terito & cribrato, ac utere cōfidenter. Aliud. Cerusæ dra. viii. gallarū, myrti, recremēti plumbi, singul. dra. iiii. para & utere. Aliud. Ostrea usta, cerusam, cadmiā, mannam thuris, paribus portionibus unito ac utitor. Aliud siccū, ad caua & maligna ulcera replēda, expertus loquor. Farinae erui dra. x. Iridis dra. x. spumæ argēti dra. x. mannae thuris dra. x. terræ famicæ dra. x. squamæ æris, aristolochiæ tenuis, cadmiæ, sing. dra. v. præpara & ad sordida ulcera largē, ad pura parce adhibe, & hapsum lanæ ē uino expressum superimponē. Hoc & chironiā ulcera appellata, ad cicatricē ducit. Aliud, quod etiam callos exterit. Chalcitidis crudę, spumæ argēti, ladanī, singul. dra. x. bituminis dra. viii. ceræ dra. ii. olei myrtē lib. i. uini heminā. Vsu expectēte spleniū ex eo imposito, & linamēta eo tincta indito. Aliud Andromachi. Spumæ argēti dra. x. atramenti sutori dra. viii. aluminis scissi dra. x. ceræ dra. c. squamæ æris dra. viii. bituminis, ladanī, singul. dra. x. olei myrtē lib. i. & quadratē. Vinueteris adstringētis quātum satis est: utere uelut prædicto. Aliud. Bituminis, ladanī, singul. dra. viii. squamæ æris, myrti, spumæ argēti, singul. dra. iiii. ceræ dra. x. olei myrtē dra. xxx. Et si hyems fuerit, drachm. xxxvi. Vini quod satis est, præpara & utere uelut dictum est.

Emplastra quæ non maligna ulcera cicatrice includunt. Cap. xxxix.

Emplastrū ē Cadmia præparatū, rosaceo dilutū repurgat ulcera, incarnatq; & cicatrices cōcolores cuti efficiat: peritionibus itē ac fissuris, & anī affectionib. medetur: habet autē hoc modo: Chalcitidis ustæ lib. ii. cadmiæ ustæ & uino extinctæ lib. i. ceræ trientē, terebinthinæ lib. ii. olei myrtē lib. iii. chalcitidem & cadmiā cū uino sufficētū diluito ac conterito, & reliqua liquata ammisceto ac utitor. Aliud. Cadmiæ, chalcitidis ustę, sing. dra. xxv. ceræ dra. xlviii. terebinthinę dra. x. olei myrtē lib. i. uini quod satis est, præpara & utere. Aliud, ad cicatrices inducēdas efficacissimū. Facit & ad igne ambugta mirificē. Cerusæ, spumæ argenti, ordē usti, singul. unc. i. ceræ quadratē, rosacē aut myrtē olei bellem, cerusam & argēti spumā cum uino terito, cerā uerō cum oleo liquefacto, & ad medicamētum ab igne ablatū, hordeum ustū tritū ac cribratū inijcito atq; unito: & omnia frigefacta in mortariū coniecta subigito, ac utitor. Aliud ē ladanio, ulcera antiqua ad cicatricem perducens. Spumæ argenti dra. c. picis dra. l. ladanī dra. x. x. æruginis dra. viii. cris usti dra. viii. squamæ æris dra. ii. olei myrtē lib. vi. Argēti spumā cū oleo coquito, & medio cocturæ tēpore, æruginem, squamā, & es adijcito, & coquito donec nō amplius inquinēt. Et postea picē liquefactā ac excolatā coctis

ammisceto. His uero unitis & amplius nō inquinātib. ac ab igne amotis, deposito iam feruore, ladanum cū uino tritū addito, & perfrigerata in mortariū coniecta probē subigito, & ad maligna ulcera ac fistulas utitor. Aliud. Cadmiæ, chalcitidis, sing. trientē, ceræ, colophonias, olei myrtē, sing. un. i. uini quātum satis est. Aliud. Aeris usti & crudī, sing. sextatē, cadmiæ sexuncē, chalcitidis ustę sesquilibrā, ceræ lib. i. olei myrtē lib. ii. uini quod satis est. Aliud emplastrū candidum, ad cicatricē perducēs, experimento constans, faciens ad tenera corpora, uelut sunt mulierū, eunuchorum, ac puerorum. Conuenit etiā ulceribus spontaneis. Spumæ argēti lib. i. & trientē, cerusæ lib. i. cerę lib. i. & trientē, thuris & manne eius, singul. quincuncē, terebinthinæ unc. i. aquę lib. i. olei myrtē lib. ii. cerusam & argenti spumam in aqua coquito, & consumpta aqua, ac medicamento non amplius inquinante, ceram primum, deinde resinam addito, & ablato ab igne pharmaco, thus ac mannam siue pollinem eius ammisceto.

De malignis & agrē recipientibus cicatricē ulceribus. Cap. xl.

Quēadmodū antea diximus, duplex scopus propositus est in curatione partiū, quibus nullus deprauatus habitus inest: alter, repellendū quod influit: alter, discutiendū quod in affecta parte impactū est, atq; hæc à cōtrariis qualitatibus fiunt: nā quæcunq; adstringunt, repellere possunt quod influit: quæ uerō adtrahunt, discutiūt id quod in affecto loco cōtinetur. Adstringētia itaq; exasperāt, & ob id dolorē inducunt, attrahētia uero & discutiētia quū acra sint, loca ulcerata mordent. Quare contingit ut ex his quæ exasperāt, & mordent, superflua humiditas ad affectas partes illabatur, quam inflāmatio & erosio ulceris cōsequūtur. Cæterum eius meminisse oportet, quod sæpe à nobis dictū est, quod corpora plena sanguine, aut uiciosis humoribus repleta, & mollia ac subtili sensu prædita, ex mordacitate facili inflāmantur. Mulieres autē & pueri & eunuchi, itēq; uiri colore albidī & mulierosā uisā degentes, inter molles naturas numerātur: proinde quātū eius fieri potest, medicamētōrū materia peruestiganda est, quæ citra mordacitatē ac dolorē ulcus resiccet, quā sanē nuncq; inueniet medicus, nisi quid singula medicamēta adhibita peregerint, rectē expenderit. Itaq; cōsiderabit quātū humiditatis primū pharmacū ab ulcere desiccauit, aut si sordidū est, quātum sordium deterfit, idēq; tertiu ac quartū experietur, donec purū ac siccū ulcus apparuerit: quod ubi depræhēdet, ad aliud medicamētū, eiusdē qdē generis cū priore, sed debilius, se conuertet: fortiora enim repurgatis iā ulceribus morsum ac dolorē inferunt, & influxiones ac inflammationes pariunt: alia igitur corpora exactē euacuare, & à superfluitatibus asseruare oportet. Alijs itaq; sanguis si redundet, detrahendus est, alijs purgatio uiciosi humoris, & simul uenæ sectio cōuenit. Quibusdā uaricem excidere ex ulcere oportet, alijs quibus secur aut splenem curandā assumimus. Neq; uerō malignis crurium aut furarū ulceribus, ea curatione debetur: sed manū quoq; ac reliquarū corporis partium: nā cuidā adolescētī diuturnum ulcus ad radicē manus habētī, uenā ad ulcus supernē allatā excidi, atq; intra paucos dies hominē sanauī, qui per quinquennium ea affectione laborauerat. Sunt quibus

quibus loca ulceri ulcra scarificare oportet. Quibusdā uero labia ulceris callosa circumcidere. Si uero nihil ex his fecerimus, humiditatis ac sordium quantitate considerabimus, & inde ad congruum medicamentum transibimus, ita ut diligenter expēdamus, quæ siccandi quidem uim habent, non autē extergendi: & quæ contra extergent, nō autē fortiter siccant: suntque in hoc etiā qualitatis singulorum gradus expēdendi. Medicamentum cicatricē inducens. Plumbi usti sexuncē, cadmiæ trientiē, æris sextatiē, colophoniat, olei myrtel, sing. lib. II. Vini ueteris odorati quantum satis est. Aliud. Cadmiæ, cerusæ, singul. trientiē, ceræ, olei myrtel, singul. sexuncē. Aliud. Cadmiæ, spumæ argenti, cerusæ, singul. unc. I. ceræ trientiē, rosacel sexuncē. Aliud, è ladanō. Squamæ æris un. I. bituminis, terebinthinæ sing. dra. III. ceræ, ladanī, singulorum quadrantem, olei myrtel quadrantem, at si hyems fuerit, amplius de oleo accipies. Cerā cum oleo & bitumine liquefacto, & terebinthinam adiuncto, deinde omnia ad squamā ac ladanum prius trita ammisceto.

Simplicia medicamenta quæ citra mordacitatem resiccant ulcera maligna. Cap. XL.

Simplicia porro medicamenta sine mordacitate & manifesta exasperatione resiccantia ulcera, hæc sunt: Lemnia terra, sigillū appellata, moderate resiccant. Cadmiæ item sub canisulæ æstu cum uino trita ac siccata: ubi uero ulcera ualdē sunt maligna, ex aceto terreda est. Vitrancq̃ superat chalcidis usta, & uelut cadmiæ trita ac resiccata: nā cruda adeo efficax est, ut etiā crustas inurat. Huius similis est ærugo usta: non usta enim sicut & chalcidis nimis efficax est, nisi quod chalcidis simul adstringit. Atramētum sutorium inter omnia metalla summē resiccant. Chalcididī similia sunt misy & sorī, maioris tātum ac minoris radone differentia. Subiū magis quā sorī siccant & adstringit. Diphryges cōmodē siccant, sed aliquantulum mordax est. Omnia aluminis genera exactē siccandi uim habent, uehementerq̃ adstringunt: quapropter alumē solum per se ad huiusmodi usus adhibetur. Chrysocolia naturalis & artificialis eandē uim habent. Plūbum ustum sorī ac stiblo præstat, plumbi recrementum, & squama ferri præsertim stomomatia, plurimum siccant. Aeris squama præter resiccandi uim, etiā extergit: quare ulcera præ omnibus repurgat, omnia tamen metalla prius lauare oportet, deinde ulceribus admouere: ita enim misericōdē siccare citra mordacitatem possunt. Siccant etiā buccinorum, purpurarū, ostreorumq̃ testæ ustæ ac lotæ. Item traslucidus lapis specularis mollia corpora citra mordacitatem siccant. Idē facit nitrum ustum, & quod in æneis lebetibus balneorum adhærescens ex aquæ coctura reperitur: æquē enim siccant & adstringit. Præterea gallæ & malicorium usta ac arida trita adhibita, malignis & ægrē recipiētibz cicatricē ulceribus commodissima sunt. Quin & capparis cortex tritus & siccus inspersus maligno ac putrido ulcere cōmodus est. Polium item tenuē siccandi uim habet, & carles lignorum unā cum extensoria facultate. Item peucedanī & pastinacæ, præsertim agrestis, radix & folia, scordium quoque ac centaurea, & alia huiusmodi, uel priuatim per se, uel simul composita.

De usu relatorum medicamentorum. Cap. XLII. Necessariō uerō talia ulcera uitioso humore referta, sordidissima existunt, Quare ubi aliquod ex relatis

simplex aut compositum siccum adhibetur sumus, linteolo prius molli puro ac sicco ulcus extergemus, deinde medicamēto cavitatē explemus, & extrinsecus splenium ad ulcerum labia attenuanda imponimus. Et linteolo supra splenium imposito ac ligato, spongiā ex frigida aut uino expressā adhibemus, conamurque ut per totum tempus spongia frigida permaneat, quod facile cōtinget, si assidue illi frigida instilletur, citra uinculi, linteoli, siue fasciæ obligatæ solutionem.

De ligamenti & curationis ratione. Cap. XLIII.

Ligamentū ulcere conuenit quod ad fracturas usurpamus. Quod si unū tantum fuerit ligamentū, principio ipsius ad superiorem ulceris partē locato obligabimus, siue sura, siue genu, siue talus, siue cubitus fuerit, pars ipsa affecta. At si duobz ligamentis uti malueris, uelut in fracturis fieri solet, primū ab ulcere ad superiorē regionē ducatur. Secundum uero intum sumat ab ulcere, & prius infra obligetur, & postea sursum desinat, & ad eundē terminum cū primo ducatur: nam ad alia cōmoda etiam hoc accedit, quod ulcera ob rotunditatē coalescere nequeunt: oblonga reddētur. Solutio autē non quotidie, sed alternis fiat, & a solutione aqua ulcere ne aspergatur, sed cū molli puro ac sicco linteolo sanies detergatur. Quod si partes ulcere uicinæ inflāmatæ appareant, splenio latiore facto liquidū medicamētum illines, quale est phoenicinū emplastrū, aut aliquod simile, ita ut hoc dissoluas uino adstringēte, sitq̃ oleū quod adiunctur melinū aut myrtē. At si purities circa uicinas ulcere partes apparuerit emplastrū phoenicinū oleo antiquo aut cicino dissolues. Tutiusq̃ fuerit superiōri regionī aliquod repellēdi uel præditū adhibere, præsertim in crurū ulceribus, & his quæ eminentem uaricē habent: uena uerō quæ amplior fuerit, & atræ bilis sanguinē habuerit, excidenda est, uelut diximus. Aliquādo tamen eiusmodi uena excisa, ulcus quidē proxinus coalescit ac sanū euadit. Sed qua parte uena recisa est, nouū malignū succedit, quod cicatricē respuit. Præstat igitur in talibus uires ægrī perpēdere, & a uenæ sectione auspicari, deinde pharmacō atræ bilis ac pituitæ humorē educente purgare: nā & pituita aliquādo ad huiusmodi uarices confluit, atq̃ tunc uaricosam uenā resicare, multaq̃ sanguinis copia hinceducta, uaricis sectionē prius curare, quæ ubi exactē coaluit, tunc demū maligni ulceris curationē aggredi, eo quē retulimus modo. Alius porro lactis sero in quo enicus coctus est, accitū multū modica mēsurā addita assidue emolliēda est. Dabis autē ex eo, ab hemina una usq̃ ad quinq̃ mēsuram augens, sic tamen ut æger per multos antea dies aquā biberit. Optimum itē est & lac recens multum per se, uel cum aqua calida aut modico passo, ante cibum sumptum. Nam & humores contemperat, & uentrem eluit. Confert etiā aloēs drach. I. per interualla deuorata. Balnea uero minimē dulcia, sed sulphurea potius & bituminosa adhibenda sunt. Quod si æger illotus manere non possit citra totius corporis læsionem, lauādu est ulcere nequaquā denudato. Postremum ab omnibus edulīs ac potibus acerbis & ægrē concoctilibz, ac uisidosos humores generantibus, penitus abstinere oportet.

De emplastrorum compositione ad maligna ulcera. Cap. XLIII. Quando

Quandoquidē in malignis ulceribus quæ difficulter cicatricē recipiunt, is scopus nobis propositus est, ut medicamēto nō mordaci resicemus, & oleum ac aqua maximē omnīū humectāt, ab utrisq; penitus cauere oportet, ipsaq; neq; per se adhibere, neq; cū resicis siccis permiscere: cera igitur recēs pinguis & in sole subacta ac emollita, idonea est ad sicca medicamenta excipienda. Quod si caloris ex sole copia non detur, cerā prope ignē molliemus, uel in feruentem aquā inijcimus: neq; enim illi omnino ammiscetur aqua: at uerō proportio miscendi huiusmodi est, ut si moderatū pharmacū esse uolueris, metallicorum quartā partē ceræ mīscas: si ualidius, tertīā. Neq; uerō parua uarietas est pro corporū radone, anne molliores aut duriores habeāt carnes: quare fieri nō potest, ut omnibus idē medicamentū cōueniat: itaq; his cōsideratis, ubi simpliciū facultates cognoueris, faciliē iudicare poteris uniuscuiusq; cōpositū medicamenti facultatē, prout ab antiquis sunt descripta. Emplastrū admirandū ē fori, cicatricē inducens, deplo-
ratis ulceribus opitulās, quæ à multis frustra fuerūt tentata, cui fidendū est, uelut multo experimēto cōgnito. Soreos dra. x x i i i i. gallarū drac. x x x i i. aluminis scissi, calcis uiuæ, malicorij, sing. dra. x v i. thuris dra. x x x i i. ceræ dra. c x x. adipis uitulini drach. c l x. olei antiqui lib. i. & si uitulinus adeps non affuerit, porcinus antiquus sine sale ammiscatur: nā taurinus calidior est. arida terito & cribrato: deinde deliquata ab igne remota ammisceto: & omnibus probe unitis, alumē, thus, fori, calcē, cū uino adstringēte trita adijcto, ac uitior. Ego, inquit Galenus, dū hoc medicamētū prepararē, oleū & adipē quadraginta annorū adieci, & semper mihi præter spem successit ad maligna ac diuturna ulcera. Sunt autē talia ulcera, à quibus pars affecta in deprauatū habitum perducta adeo est, ut etiā si probē coctus sit sanguis, qui ad ipsam alimētū gratia affertur, ipsum transmutet ac corrumpat, & si utilis sit humor qui affluit, ab ipso solo erodatur, etiam si pars ipsa minimē esset affecta. Aliud spleniū optimū. Plumbi usti & loti trientē, cadmiæ sesquiunciā, æris usti unc. i. thuris sesquiunciā, aluminis scissi unc. i. æruginis sextantē, ceræ sexuncē, olei myrtel lib. i. Aliud Galeni, ad maligna & chironia. Ceræ, picis, bituminis, sing. lib. i. mannae thuris, cerussæ, æruginis, sing. sexuncē, malicorij, gallarū, spinæ Aegyptiæ fructus, iridis, aristolochiæ rotundæ, atramenti sutorij, sing. unc. i. aristolochiæ lōgæ, æris usti, sing. sextantē. Olei antiqui aut cicini lib. i. arida in aceto pluribus diebus terito, & liquabilia liquata affūdito ac uitior. Aliud, Oris balsū, ad efferata ulcera deprimēda ac cōtrahenda. Ochra attica usta, trita, sicca, utiliter adhibetur. Ego uerō inquit, etiā cypria usus sum. Idē facit & chamaeleonis nigri radix, & malicorij ustum. Et supernie hapsus lanæ uino imbutus illigatur. Aliud Galeni, fuluū, Spumæ argenti lib. i i i. olei cicini aut antiqui lib. i i i. aceti acerrimi lib. i i. squamæ æris, chalcididis, æruginis, singul. sextantē. Spumā argenti cū oleo coquito, medioq; cocturæ tēpore metallica ad æstiuū solem multis diebus cū aceto trita adijcto, tādīusq; ad ignē finito, donec non inquinari. quū autē metallica adijcis, lebes ab igne tollatur, ne efferuescant & superfundatur. Sed & spumā argenti cū aceto & oleo decoquere licet, & medio cocturæ tēpore me-

tallica addere, & simul sinere ut ebulliat, donec non amplius inquinent. Hoc pharmacū fistulas glutinat, & labia ulcerū callosa resicās unit ac cōmittit, ita ut non amplius disparentur, si quis recta diætā utatur. Diuturna insuper ulcera & cicatricē respuentia, chironia appellata per se adhibita, nullo antea puris uestigio apparente, maturat, & suppurat: at nō quotidie, sed alternis hoc soluendū est, quod si stomomachis ferri squamā addideris, lōgē præstātius pharmacum euadet. Ego dū hoc preparabā, aliquādo etiam diphrygis unc. i. adieci, aliquādo chrysocollæ sextantē. Sæpe etiā utrunq; ammiscui. Atq; ita preparatum magna uulnera glutinat. Hactenus Galenus. Nunc uerō hoc modo cōficitur. Spumæ argenti lib. i i i. olei antiqui lib. v i. aceti lib. i i. æruginis, squamæ æris, chalcididis, sing. quadrantē, coquito sicut dictū est. Quidā diphrygis unc. i. addūt, asseruntq; efficacissimē strumas discutere. Aliud Galeni, ad chironia ulcera in mollibus corporib. Ceræ lib. i. cerussæ bessem, rosacei lib. i. salis ammoniaci trientē, squamæ æris sextantē, thuris, aluminis, æruginis, malicorij, calcis uiuæ, sing. unc. i. quæ liquari possunt liquata ac frigefacta ad sicca cum uino trita misceto. Aliud ad maligna & serpēdo depascēda ulcera, præsertim tibiarū. Spumæ argenti, mastiches, adipis caprini, rosacei, singul. sexuncē, ouorū uitellos v. Argentī spumā cum rosaceo & adipe coquito, deinde mastichen adijcto, & ad frigefacta ouorū uitellos ammisceto. Aliud, ad maligna tibiarū ulcera, experimēto cōgnitum Lupinos aridos ustos tritos largē inspergito, & hapsus lanæ ex uino expressū superligato. Hoc repurgat, incarnat, & ad cicatricem perducit.

De ulceribus quæ post obductam cicatricem rursum rumpuntur.

Cap. x l v.

Quædā ulcera post receptā cicatricē non multo tēpore interpolito inflāmantur ac refringuntur. Nā quum substratū os malē sit affectū, uicina quidē caro cicatricem recipit, & exactē sana apparet. Verū postea sanie paulatim ex corrupto in alto osse affluente putrescit, & oborta inflammatione cicatrix rumpitur. Quæ igitur horū curatio instituenda est? nimirū ut hactenus excicemus, quatenus squama affecti ossis excidat: facile uerō excident ossiū squamæ, si papaueris syluestris & fici folia cum uino & polenta imposueris. Aut hyoscyami & atramenti sutorij pares porciones adhibueris: sed & peucedani radix trita cōtissimē ossiū squamas disparat. Vtere etiā siccis capitalibus suprā descriptis, præsertim eo quod silphiū recipit. Aliud siccū, ad chironia & cicatricē respuentia ulcera mirificū. Squamæ æris, thuris, singulorū sextantē, aluminis, salis ammoniaci, singul. trientē, malicorij, cerussæ, singulorum unc. i. utere sicco, uel si malueris cum cerato. Aliud, Pumidis multiforij sexuncem, sulphuris uiui unc. i. terito & cribrato, ac uitior. Facit & pumex per se aridus tritus inspersus. Aliud, ad cicatricem inducendā diuturnis tibiarū ac totius corporis ulceribus. Calcis uiuæ ac lotæ in aqua & siccatae unc. i. cōmolite tantundē, ceræ, terebinthinæ liquidæ, sing. sextantē, olei myrtel aut rosacei quadrantē: poteris & ostreorū ustorū tritorū unc. i. addere. Ad sicca in mortario cū uino trita quæ liquari possunt liquata ammisceto ac unito. Hoc, itemq; reliqua omnia relata, & præcipuē quod ē fori fit, chironijs ac malignis ulceribus medentur. Eisdē quoq;

O s priuadim

de Lupinis

privatim commodant capparidis radix trita insperfa, cētaurea minor, scordium, caries lignorum veterum, pastinacae radix, peucedani radix, malicorium, oleum in quo scillae bulbis coctus est, absq; linamentis cum penna illitum. Malicorium in vino coctum & rosaceo cerato exceptum: omnium uero efficacissima est theriaca Andromachi e uiperis, rosaceo modico diluta, & emplastri modo adposita. Aliud. Sandaracham tenuissimè tritam ursino adipe exceptam imponito: aut ammoniacum salem eodem modo præparatum, uel per se adhibeto.

Ad extremitatum ulcera. Cap. XLVI.

Myrti baccas cum uino coctas impone: uel peucedani radicem trita: uel lignorum ueterum cariem insperge: aut brassicae uel sabinae folia cum foeni graeci farina & aceto subacta impone: aut sideritidem melle exceptam adhibe: aut oleum in quo scilla cocta est absq; linamentis cum penna illine: ita enim ne musca quidem ulcers appropinquabit.

Ad callos extremarum partium. Cap. XLVII.

Brassicae folia cum melle terito, & cerato ex sinopica rubrica præparato, excipito, & adhibeto. Aliud. Clibanus antiquus testam cum uino austero terito, & cum cerato ex ouis facto, aut cum medicamento ex pōpholyge ad sedis affectiones parato, adhibeto.

Ad uermes in ulceribus. Cap. XLVIII.

Vermes in ulceribus generatos enecat, plantago sicca, ligni ficulni cinis, calamintae succus assidue instillatus. Cerasus, inquit Theodorus, & polij pares portiones cum pice liquida adhibe. Quidam pro cerusa absinthium scribunt. Aliud. Linamentum ex salua hominis ieiuni illitum adhibeto. Hoc etiam aurium uermes necat, & cicatrices concolores facit.

Ad nomas & putredines ulcerum. Cap. XLIX.

Nomas, hoc est, proserpendo depascentia ac putrida ulcera appellatur, quae uicinas partes erodunt & putrefaciunt. Et sane uehementissimis medicamentis opus habet. Et saepissime uisiones requirunt. Siccu optimum, faciens ad nomas, putredines, polypos, uerrucas, thymos & formicarum appellatas, haemorrhoidas, citra omnem mordacitatem. Misys crudus, chalcitidis crudae, sing. dra. viii. ochrae dra. iiii. sandarachae dra. iiii. calcis uiuae dra. ii. squamæ æris, aluminis, sing. dra. ii. diphrygis dra. iiii. Unito ac uictor.

Sicca crustam inducentia, inter quae etiam pastilli multi usus. Cap. L.

Melinum, crustas inducens & callos exterens, inspersum, siue cum specilli nucleo adhibitu, & leuiter saltu ulceris superficiei inductum, ut inde coloretur modo, ulcera committit ac sanat, quae aegre curantur. Chalcitidis crudae dra. viii. cadmia dra. iiii. ieiuni hominis salua excipito ac subigito, & in mortario operata, malscydonii colorem assumere finito, & cum pistillo leuiter trita in umbra assiccato. Alij tamen aliter præparant, & a colore quæ acquirunt, fuscum appellant. Sumunt enim chalcitidis dra. xii. cadmia dra. viii. & ad caniculæ æstum cum aceto terunt, atq; ita in umbra siccant. Aliud siccu, quod item ad solis feruorem paratur, & melinum colorem habet. Calcis uiuae sextantem, auripigmentum unc. i. Auripigmentum cum aqua terito, & calcem addito, ac simul probe conterito, deinde in mortariu aqua plenum coniecto, ut subsideant, & ubi subsederint priore aqua diffusa, noua affundito, ac diu uersato, & rursus sub-

fidere finito, quo facto rursus priore aqua diffusa, nouam affundito, atq; idem tercio repetito. Postremum uase aqua repleto finito, ac singulis diebus uersato donec arefiat, & consumpta aqua alia affundito. Atq; hoc per dies x. sub caniculæ æstu facito, & tandem pharmacu siccatum in fictili uase in superiore parte domus non humida seruato. Hoc citra mordacitatem crustas inducit, & ualde deprimat. Facit & ad gingiuas putridas, & epulidum eminentias deprimat, dentes in albat. Potest quoq; in mortario subactum in fictile transferri, atque insolari. Vtere Faustini quoq; pastillo, ac reliquis eiusmodi ad dysenteriam descriptis. Aliud, ad totius corporis putredines & nomas. Calcis uiuae, chalcitidis, singulorum dra. ii. auripigmenti dra. i. Hoc ad reduuias digitorum, & ad putredines adhibetur, partibus putridis ex eo inspersis. Facit & ad carbunculos splenio resinato exceptum. Confert fistulis melle exceptu cocto, & uelut collyrium inditum. Oribasii, ad pudendorum nomas praesertim meliceridas dictas. Gallarum, floris mali punici, satui, itemq; syluestris, aristolochiae rotundae, squamæ æris, chalcitidis crudae, singul. dra. viii. atramenti sutorii dra. vii. aluminis scissi dra. iiii. malicorii dra. i. Adhibetur pudendo cum melle, quemadmodum id quod ex charta præparatur. Facit ad nomas ualde profundas, sicut etiam pastillus Andronis. Cæterum medicamentum ex charta hoc est: Squamæ æris, chartæ uisae, singulorum drachmas x. auripigmenti, sulphuris uiui, singulorum dra. x. uel ut alij habent, x. plumbi uisti dra. iiii. alij dra. vi. Charta primum teritur, deinde metallica leuissimè trita ammiscentur. Facit ad oris ac totius corporis putredines, ad humidiores quidem siccum inspersum, ad sicciore rosaceo imbutum. Additur aliquando & mellis modicum. Ego uero plumbi dra. vi. adijcio. Siccum ad antiquas nomas, & ad gingiuas cruentas. Deprimat etiam carnem excrecentem. Chalcitidis uisae dra. x. misys dra. x. æris uisti dra. x. atramenti sutorii dra. viii. sandarachae dra. v. auripigmenti dra. ii. unito ac uictor. Aliud, experimento constans. Rhois culinarii dra. x. squamæ æris, aloes, foliorum oleastri siccorum, singul. dra. viii. chalcitidis dra. v. auripigmenti, sandarachae, aluminis scissi, salis rosti, singul. dra. iiii. malicorii sicci dra. vi. chrysocolle factitiae dra. iiii. rusci sicci dra. viii. trita, unito ac uictor. Aliud ad nomas & putredines, Oribasii. Salis fossilis dra. ii. aluminis in fictili usti unc. i. squamæ æris, pumicis usti, sing. unc. i. Aliud, eiusdem. Auripigmenti, squamæ æris, misys, chalcitidis, portiones aequas præpara & utere. Aliud Pasiphilum uocatum. Atrameti sutorii, sandarachae, misys, chalcitidis, pares portiones committito. Siccum aureu appellatu. Ausert ossa, reprimat influxiones, fistularum callos extert, & contrahit sinus. In fistularum autem & sinuum cōcauitates per specillum lana obuolutum inditur. Melantheriae a uetustis clauis deraffe dra. v. malicorii dra. x. x. aluminis scissi dra. iiii. atramenti sutorii, misys, chalcitidis, æris usti, sing. dra. viii. squamæ æris dra. x. vi. gallarum dra. x. v. Acci quatuor satis est. Oportet autem aceto in uas æneum coniecto clauos quotidie agitare, & deinde acetum excolare: longè uero præstat quod in fundo residet. Aliud siccum, ad nomas, defluxus, gingiuas, columnellas,

& pu

& pudēda. Ochra ſesquilibra, croci lib. i. putaminū ouorum uſtorū ſexuncē, gallarū ſexuncē, tritis utere. Gallae autē ſint omphactides. Paſtillus ad nomas commodus. Sabing, myrrhæ, ſing. dra. ii. ſoſeos, miſyos, cyprī, atramenti ſutorij, thuris, aloës, ſingu. dra. ii. terito cum uino, & formato paſtillos.

Paſtillus ad nomas & putredines, quo uitor, inquit Oribalius, appellatur Aſclepius ſiue Aſclepius, & Cyriacus, hoc eſt, dominicus. Gallarū dra. viii. florū mali punici, ariſtolochiæ rotundæ, chalcitidis crudæ, cadmiæ, ſing. dra. vi. Iridis, ſquamæ æris, ſing. dra. iiii. miſyos crudī, atramenti ſutorij, aluminis ſciſſi, thuris, nitrī, ſingul. dra. iii. Terito cū aceto ad dies ſufficientes, & paſtillos x. formato. Eoſq̃ uſus tēpore aceto mulſo diſſolutos cerato excipito, hoc modo utens: Accipe paſtillorum trientem, ceræ quadrantem, olei myrtei ſexuncem, galbanī trientē. Et paſtillis aceto diſſolutis ac tritis, liquata ammiſce to. Atq̃ hoc quidē modo præparantur ad ignem ſacrum, panos, & condylomata. Ad ozenas uerò, carbūculos, & carnis excreſcēdas, paſtilli ſicci inſperguntur, uel aceto mulſo triti ac diſſoluti. Paſtillus Corax, id eſt, Coruus appellatus. Ad putridorū ulcerū præſertim pudendorū nomas. Gallarū ſextantē, ſquamæ æris ſesquilunciā, chalcitidis crudæ, thuris, ſingulorū quadratē, ceræ trientē, terebinthinæ unc. i. adipis taurini beſſem, olei myrtei dextantē. Arida cū aceto in ſole ad ſufficientes dies terito, & mellis ſexuncem adiſcito. Deinde cerato exceptis uitor. Hic paſtillus citra animixtionē per ſe adhibitus, omnibus nominis præſertim ſiccioribus cōfert, & ubi nerui ſunt de nudari. Cū æquali uerò cerati portione, ſordida ulcera extergit, cum ubertore cerato cicatricē inducit. Ego, inquit Aſclepiades, ſic præparauit: Squamæ lib. i. gallarū, adipis taurini, ſing. dodrantē, chalcitidis, thuris, ſingulorū ſexuncē, cū aceto uelut collyria tero, & paſtillos formo. Poſtea uerò ex paſtillis dra. xxi. aceto tero, & mellis dra. x. addo, & cerato quod habet olei myrtei, adipis taurini, ſingulorū dodrantē, ceræ ſextantē, terebinthinæ trientē, excipio.

Paſtillus ē croco. Myrrhæ, malicorij, eruginis, aluminis ſciſſi, ſingulorum ſextantem, croci unc. i. aloës, ſquamæ æris, thuris, ſing. unc. i. ſulphuris uſul dra. iiii. mellis lib. i. cū uino adſtringēte terito. Facit ad nomas, putredines oris, & cuiuſcunq̃ loci, dētes motos firmat, ulcera marcida & flaccida repurgat & adſtringit, purulentas aures, ſinus, fiſtulas, & carbūculos curat, ſquamas oſſiū reſoluit, & incarnat. Eſt enim ualde cōmodus ad oſſa carne ueſtiēda. Cōfert etiā dyſentericis, & adhibetur uel aridus, uel hoc modo coctus. Mellis lib. iiii. aceti lib. i. paſtilli ſextās, ſimul ebulliant ad mellis cōpagem. Si uero partibus molli ſenſu præditis adhibendus eſt, uino tantum diluitur. Paſtillus ex plantis inſcriptus. Malicorij, ſoliorum myrū ſiccorū, reſtarum nucum iuglandium ſiccarum, fructus ſpinæ, ſingu. drachm. viii. gallarum dra. iiii. ſalis ſoſillis dra. viii. omnia tunduntur, & cribrata aceto ſubiguntur, & in uas fictile mittuntur, ac aſſantur. Deinde cū aceto teruntur, & adiſciuntur myrrhæ dra. iiii. thuris dra. ii. & formantur paſtilli. Uſus horū eſt cū aceto. Paſtillus ex lanis ſuccidis quem Leonidas ualde laudat. Lanæ ſuccidæ uſtæ, rametorū plūbi, ſquamæ æris, bituminis, ſing. dra. x. aluminis ſciſſi & rotundi, gallarū, malicorij,

miſyos, thuris, chalcitidis, ſingulorū dra. v. myrrhæ dra. ii. amurci ſesquiheminā, terito cū aceto, & formato paſtillos, ac uitor. Paſtillus Babynus, ad nomas, fiſtulas, reduuſas edigitorū, carnē excreſcentē citra mordacitatē deprimit. Cū cerato autē facit ad ignē ſacrum & alia huiuſmodi. Malicorij, gallarū, ariſtolochiæ, chalcitidis, cadmiæ, ſing. dra. vi. Iridis, ſquamæ æris, ſing. dra. iiii. miſyos, atramenti ſutorij, aluminis ſciſſi, ſing. dra. iiii. nitrī, thuris, ſing. dra. ii. Sub canis æſtu cū aceto terito, & paſtillos formato. Paſtillus Paſionis. Squamæ æris dra. xii. æris uſti, ſalis ammoniaci, aluminis, eruginis, thuris, ſing. dra. viii. Aeruginē cū ære, ſquama & alumine ſub ſole terito, & ad probē trita thus addito, ſimulq̃ terito, ac paſtillos formato. Uſus eſt ex aceto. Polyidæ ſphragis ſiue ſigillū, ut habet Aſclepiades. Aluminis ſciſſi dra. iiii. thuris dra. iiii. myrrhæ, aloës, fellis taurini, ſing. dra. viii. florū mali punici ſatui dra. xii. atramenti ſutorij dra. iiii. Excipe uino dulci & utere. Sigillū Coracini. Facit ad coſillarū inſtāmationes, luxatā columellā, & gingiuas humore flaccidas. Facit & ad nomas, & aſſtiones ſedis. Ariſtolochiæ rotundæ, florū mali punici ſatui, chalcitidis toſtæ, thuris, myrrhæ, atramenti ſutorij, crocomagmatis, aloës, fellis taurini, æquales portiones paſſo excipe, uelut dictū eſt. Paſtillus Andronius. Ad ulcera fluida, inſtāmatas columellas, coſillarū fluxiones, extrinſecus ſub mētrum illitus. Facit & ad pterygia oculorū, & glādularum circa inguina inſtāmationes incipiētes, & ad ruptos inſtāmatorū abſceſſus, calloſq̃ fiſtularum exterit. Florū mali punici ſatui dra. x. gallarum, ariſtolochiæ, ſing. dra. viii. aluminis ſciſſi, atramenti ſutorij, ſingulorum dra. iiii. aliq̃ ii. tūcum habent. myrrhæ, aloës, thuris, croci, ſingu. dra. i. ſingula ſeorſim primū, deinde ſimul terito, & in paſtillos redigito. Inſunditur per clyſterē prout uires tolerarint ad ruptos inſtāmatorum abſceſſus, ſi febris adſit, cum aquæ cyathis viii. ſi nō, cū uino. Paſtillus Antonij Muſæ. Aluminis ſciſſi, aloës, myrrhæ, florū mali punici ſatui, ſing. dra. vi. atramenti ſutorij dra. iiii. croci, crocomagmatis ſingulorū dra. iiii. Terito ē uino mulſo ex paſſo confectio, & paſtillos formato, quos in umbra exiccabis. Heras qdē & nos ita præparamus. Aſclepiades autē hunc ad Ariſtarchū Tarſenſem reſert. Et cætera quidē ſimili modo cōponit. Verū atramenti ſutorij dra. vi. accipit, & cum uino ſalerno paſtillos formare iubet. Facit ad ulcera recentia ac uetera, putrida, marcida, efferata, phagedenica, ac fiſtuloſa, & quę priuatim ceria appellātur. Ad ozenas diluitur cū uino. Ad ſuppuratas aures cum ſapa & modico aceto. Ad condylomata itē cum ſapa. Ad ulcera genarum carbunculosa ac maligna cū ſapa. Ad carnis excreſcentias in naribus, ore, extremitatibus omnibus, uulua, pudendis, omnem eminentiā compeſcit, & digitorum reduuſas tollit, ulcera caua replet, ſinus & fiſtulas melle dilutus ac cum lixiulo inſtillatus glutinat. Idē ad oris ulcia gargarifatur. Quod ſi ſemel in menſe fiat, neque dentes dolebunt, neq̃ aliquid incommodi ori accidet. Facit & ad teſtium ſacrum ignē, & articulorum inſtāmationes illitus. Et ad hæc omnia utitur eo Aſclepiades. Quod ſi mollire diſcutereq̃ uolueris, quadruplū ammoniaci miſcebis, & cū aceto ad mellis ſpiſſitudinem conteres, illinesq̃ & alligabis. Si uerò em-

plastrum formam malueris, quadruplum terebinthinæ ammisceris, adiecto etiam oleo si durius pharmacum apparebit. mollis enim & cicatricem inducit, ac glutinat. Idem pastillus splenicis, hepaticis, ac dysentericis confert, & viscerum ulcera sanat, & incipienti tabi auxiliatur. Dantur ex eo oboli tres cum familiari in singulis affectionibus portione. Per aliquot autem dies ducit urinas loturæ carnis similes. Itaque ab eius usu desistendum non est ante sanitatem restitutam. Vino quoque mulso, & mali punici dulcis succo dilutus, & cum pēna illitus, anginis medetur. Verum inter dum illinitur, nauseam excitat, & uomitum provocat. Ceterum crocomagma quod in pastillum recipitur, & quo ad capitis dolores utimur, ita preparatur: Croci drac. 6. myrrhæ troglodyticæ, rosarum recentium resectis unguibus, amyli recentis, singulorum drac. 6. Cū uino ad collyrii formam terito, & pastillo formato. Porro pastillus ex solano halsicabo, superius ad fissuras ac tubercula sedis descriptus est.

De sanguinis eruptione, & quæ crustam inurant,

Rusi.

Cap. LI.

Quadoquidē pleraque ex his, quæ ad sanguinis eruptionem adhibemus, ad nomas quoque usurpari solent, annectemus etiam de sanguinis eruptione tractationem. Ex ea enim præsens aliquando periculum incurrimus, exhibetque ea res imperitis negotium turbationemque ac formidinem, ut ne medico quidē parua sollicitudo impedeat. Primum itaque nosse oportet, arterias ad sanguinis eruptionem magis quam uenas paratas esse. Perpetuo enim pulsant, amplioresque meatus ac solidiores tunicas habent, ut non facile cedant. Sanguis quoque in ipsis contentus tenuior est, & plurimo spiritu abundat. Quin & aliquando obducta cicatrice cutis, & arteriarum fissura non obturata, sanguis sub cutem exilit, & efficitur tumor, quem aneurysma, hoc est, arteriarum dilatationem Græci appellant. Ab arteria igitur aut a uena sanguis manat, uel osculis ipsarum apertis, uel tunica diuisa, uel per transudationem, ut ita dicam. Porro tunica diuiditur, uel ex uulnere, uel ex contusione, uel ruptione, uel erosione. Oscula uero aperiuntur, aut ob multitudinem confertim ad osculum uasis prorumpentem, aut propter acrem qualitatem extrinsecus alabentem, aut propter uasis imbecillitatem. Transudatio uero aut persultatio fit, tunica quidem rarefacta, sanguine uero attenuato. Potest tamen aliquando etiam fieri paruarum uenularum osculis apertis. Si ergo ex uulnere, aut contusione, aut casu, aut clamore, ruptio conglit, causa iam præterijt. Si uero ex multitudine, fieri potest ut adhuc nunc etiam uas amplius rumpatur, quum efficiens causa adhuc maneat. In huiusmodi itaque affectione, multitudo quam citissime euacuanda est. Deinde sanguis sistendus, postremo ulcus curandum. In quibus uero iam cessauit causa efficiens, protinus sanguis sistendus est, & deinceps ulcus curandum. At quo modo sanguinem sistemus? Nimirum ut ruptum adstringamus ac obturemus, & sanguinem aliò diuertamus. Obturabuntur autem labia uel digitis nostris, si in superficie ulcus fuerit, uel per deligationem, & per refrigerantium ac adstringentium pharmacorum adhibitionem. Nonnunquam & grumis concreti sanguinis uasis oscula occluduntur. Cæterum ex his quæ imponuntur, aliqua adstringunt, aliqua meatus obducunt, aliqua crustas inurant. Quæ itaque meatus obstruunt, ad sanguinis eruptionem adhibi-

ta, citò occludunt. Quæ uero crustas inurant, crusta exedente ulcus cauum faciunt, & sæpissime excidentibus crustis, sanguinis erupcio curam difficilima sequitur. Quapropter eiusmodi medicamentis non nisi cogente necessitate utemur, ueluti si a putrida erosione sanguis erumpat. Tunc enim omni putrido exciso, tutius est uel cauterijs mali radicem exurere, uel crustas inurentia adhibere, præsertim in pudendorum ac sedis affectionibus. Nā tales partes ob redundantem humiditatem, & acrium recrementorum transitum facillime putrescunt. Proinde in eligendis medicamentis quæ crustam inducunt, non tantum caliditatem, sed etiam adstrictionem considerabimus. Talia uero sunt, misy, chalcitis, atramentum sutorium. Quæ enim ex calce uisua & auripigmento fiunt, uehementiora quidē his sunt, sed crustæ inde inductæ citò excidunt, eo quod nulla adest ipsis adstrictoria facultas. Quæ uero ab adstringentibus inducuntur crustæ, diutius in corporibus persistunt: quæ res non modicam commoditatem affert. Priusquam enim excidant, præuenit incarnatio, ut caro medijs partibus innata, itaquam operculum quoddam uasis fiat. Et hac de causa non festinandum est, uelut multi faciunt, ad crustarum ablationem, ubi eruptionis sanguinis periculum imminet. Sed in his tantum affectionibus, in quibus ob putredinem cauterium adhibere coacti fuimus. Vocatur autem huiusmodi affectio Nome, quoniam ab affectis partibus proserpens, partes secundum naturam se habentes depascitur, & semper aliquam ipsarum ulterius inuadit. Medicus itaque his consilijs instructus, ad sanguinis eruptiones curandas accedet, pro locorum natura, & uenarum magnitudine remedia adhibendo. Et statim quidē digitis osculum ulceris uasis apprehendat, leniter innitens ac citra dolorem comprimens. Simul enim & sanguinem sistet, & grumum uulnere infiget. Quod si uas, unde sanguis manat, in profundo etiam situm fuerit, exactius sanè hinc & situm ipsius, & magnitudinem didiceris, & utrū uena sit an arteria, cognosces. Postea uero immisso undeno extendat, ac moderate ipsum obtorqueat. Si uero neque sic sanguis sistatur, si quidē uena fuerit, conadum est ut circa uinculum sanguinem supprimat, per aliquod sanguinem sistens medicamentum. Optima autem ex his sunt quæ meatus obstruunt, composita ex resina, fricta, & farinæ tritici polline, ac gypso, & alijs huius generis. Si uero arteria fuerit, ex duobus alterum facies, aut uinculum circundans, aut totum uas præcidens ac disseccans, sanguinem sistes. Cogimur tamē aliquando etiam magnis uenis uinculum obligare, atque etiam aliquando rotas ipsas disseccare, trasuersas uidelicet: quæ necessitas incubet in his, quæ rectæ ex alto sursum feruntur, & præsertim per angustiam aliquam aut principales partes. Sic enim utraq; pars utrinque retrahitur, & ab incumbens corporibus uulnus tegitur & occultatur. His autem peractis, incarnandum uulnus est, priusquam uinculum uasis excidat. Nisi enim producta caro circumstitū disseccet arteriarum locum præmunierit, sed uacuum locus inuentus fuerit, affectio sequetur quam Aneurysma appellant. Quapropter in his potius suadeo, ut sanguinem sistentibus quæ meatus obstruunt, utaris, quam his quæ crustas inurant. Citius enim ac tutius post illa uulnus incarnatur. Optimum itaque omnium quæ ego noui medicamentorum est, quo etiam ad sanguinis cerebri membranis eruptionem tutius utemur, hoc est: Thuris partes 11,

aloēs

aloës partē .i. cū oul cādido ad mellis cōpagē subige, & mollissimis leporis pilis excepta, uasī ac totū ulceri ubertim impone, & forinfecus fascia ex linteo deliga, ita ut primas quatuor aut quinque eius obuolutiones super ipsum uas quod sanguinē fundit facias, & hinc ad radicē eius procedas, deinde alternis diebus soluas, & si quidē adhuc tūc adhēserit ulceri medicamētum, rursus aliud ipsi circūfundas, & linamētū prius ex pilis cōstans, uelut madefacias, ac rursus uelut antea, deliges. Si uerō prius linamentū sua spē te excideris, sensim per digitū uasis radicē cōprimas, & hoc quidē leniter adimas, aliud autē apponas. Atque eo curationis ductu uteris, donec uas carne impletū fueris, egro in multa quēte seruato. At uerō hoc medicamento uariē utimur, aliquando duplū thuris ad aloē addentes, aliquādo ambo æquali pōdere miscētes. Sed & mannā quandoque pro thure ammiscul, ut quē uehementius adstringat. Illud porrō constat, in durioribus corporibus ea quæ magis adstringūt, & plus aloës habent adhibēda esse. In mollibus, ea quæ plus thuris habent. Sed & ad sanguinis ē cerebri mēbranis eruptionē, & ad uulnera in collo, usque ad ipsas iugulares uenas, medicamento utimur, quod plurimum thuris recipit. In his enim sanguinē citra uinculum sistit. Et quāuis multa sint quæ meatus obstruunt medicamēta, nullum tamen æque incarnat. Optimē etiā obstruunt meatus pharmaca ex pice torrefacta, & colophonia, & puluere molendini parietibus adhærente, & gūmi, & tragacātha, ac similibus. Quandoque etiam ex gypso præparata. Et symphyti quoque radix ad hāc præstādisima est. Maximē cōuenit, ut Medicus pharmaca sanguini sistendo idonea apud se præparata habeat, quod singulis oportunē opē ferat. Tale est siccū Philagrii ad sanguinē sistendū ex aloē & thure paratū. Primum autē digitis dissectæ partes cōmittantur ac cōprimantur donec cohæreant: tunc enim impactū medicamentum sanguinis imperiū cohibet, qui amplius adhuc supprimitur, si leporis pilos molles sub uētre repertos ad impactū medicamentū apponemus, & ex eodē sicco superinpergemus. Atque hoc ita finēdū est, donec caro exteueris uelut operculū sectioni obducta. Cōfert ad idē rhodiū suprà inter deprimētia ac cōtrahētia relatū.

Cæterū quædā ex sanguinem sistētibz, uelut diximus, crustā inducunt. Quædā cū siccitate adstringūt, quædā explent & glutināt: quorū aliqua magis parabilia referemus, quō ad singulas causas peculiare medicamentū in promptu habeatur. Ex his igitur quæ crustam inurūt, citra mordacitatē & efficaciter sanguinē sistit hoc. Sandarachæ, auripigmētū, chalcididis, caldis, singul. drac. iiii. Hoc Ammonius chirurgus utebatur. Eo uero adhuc efficacius est quod habet chalcididis dra. viii. atramenti sutorij dra. x. caldis uluæ dra. vi. æris usti dra. vi. misyos, diphrygis singul. dra. v. Aliud celebre. Aluminis scissi, atramenti sutorij, gallarū, singul. dra. vi. misyos dra. viii. foreos dra. iiii. Hoc optimē facit & ad nomas.

Aliud ex crethria terra. Terræ crethriæ aut cimoilæ, dra. viii. squamæ æris, aluminis scissi, resinæ aridæ, thuris, myrrhæ, singul. dra. viii. Aceti quātū satis est. Terito in sole ad cōpagem, & pastillos formato. Aliud, Spongiā nouā liquida pice imbutā bitumine trito insperso, in olla exurito. Deinde eius sextātem accipito, chalcididis, misyos, singul. un. i. At

si midus facere uolueris: accipe spōgiæ ita uisæ sextātem, plūbi usti & loti unc. i. subij. unc. i. Hoc crustā nō inducit. Aliud confestim sistens sanguinis eruptionē, Chalcididis dra. viii. Thuris siue mænæ eius dra. xvi. resinæ aridæ, gypsi recēdis, singul. dra. viii. Cætera, trita ac cribrata, in pyxide ærea seruato. Gypsum uerō quo tempore medicamento miscendum est, recens terito, & ammisceto. Aliud sanguinem sistens, citra crustæ inuentionē. Misyos, succi polygoni sicci, singul. dra. x. aluminis scissi dra. xxi. Aridum aceto rigatum spongiā excipe, & ulceri appositum deliga. Aliud Oribasij, facit ad pudendorū & totius corporis nomas. Callos etiam extirpat, & strumas sanat. Minij cū oleo rosaceo subactū, sulphuris uiui, auripigmētū, sandarachæ, caldis uiuæ, æquas portiones unīto ac utitor. Aliud, optimum ad sanguinis eruptiones, Galeni. Gypsum & tritid pollinem oul candido excipe, & cum leporis pilis impone.

Aliud. Resinā pinus probē tritā uel per se, uel cum thuris polline adhibe. Qui ergo plura medicamēta expetit, multa in simplicium medicamentorū libris, & in tractatione de singularum partium morbis inueniet. Sed & quæ nunc recensui, sufficere possunt. Omnia enim alia ex hisdē præparantur, & non longē uiribus inter se differunt. quædā fortiora, quædā debiliora sunt, ut cuique cōgruū eligi possit. Etenim quū Eunuchus quidā in summitate manus ulcus haberet, idē malignum euaderet, & circū circa eroderet, & sanguis ex ipso manaret, medicamētum ex thure & aloē apposui albumine oul exceptum, & hoc magis auxit sanguinis eruptionē. Detracta itaque aloē, thurū ipsum per se cum ouo imposui, & neque sic sanguis sisti potuit. Cognoui autē quodd ex multa sensus subtilitate hoc pateretur. Quapropter linamenta posca dilutissima imbuta indidi, iustitque itadē assidue super linamēta instillare, atque ita statim sanguinis eruptionē suppressi, neque ab eodē medicamento usque ad exactā incarnationē destitui. Aliud, ad arteriā dissectā. Sal cōmune & equi aut asini simū siccū, pari portione cū lixiuio quercini cineris subactū impone. Aliud. Porrū cū aceto rufum impone. Aliud. Cochleas cum domibz suis, tū paruas tū magnas, uistas tritas impone.

Exedentia & uentia medicamenta. Cap. LII.

Erodenia & uistoria medicamenta ad columellas adhibemus assidue destillantes ac laxatas, & ad callosas carnis excrescentias, ulceraque cancerata & strumas, quas erodere uolumus. Item ad coxendicum & articulare morbum, affectiones splenis, pro cauterio. Præterea ad formicarias uerrucas, clauos, ficosos tumores, & alia huiusmodi. Præcipua uero ipsorum uis est, ad carbunculosa & maligna ulcera. Adhibita enim nomas compescunt, & crustas exterunt. Erosiuum citra mordacitatem. Squamæ æris dra. iiii. sandarachæ dra. ii. ueratri nigri, auripigmētū, singul. dra. i. præstantius hoc euadet, si pro auripigmento aluminis scissi par pondus adieceris. Aliud. Squamæ æris, sandarachæ, auripigmētū, ueratri nigri, seminis urticæ tosti, æquales portiones cum rosaceo terito ac utitor. Aliud, citra omnē mordacitatē crustas in altū inducēs. Squamæ æris, sandarachæ, singul. dra. iiii. ueratri nigri dra. i. Ad humida ulcera utere sicco: ad reliqua cū rosaceo. Oribasij erosiuū efficacissimū, quo utor: Seminis urticæ, squamæ æris rubræ, sandarachæ, par pōdus cum rosaceo terito ac utitor.

Aliud

Aliud. Sandarachæ, aluminis scissi, singul. drach. iiii. squamæ æris drach. ii. auripigmenti drach. i. Et si qui dem nome est, quæ adstringi debet, siccum adhibeto. Si uero struma, aut canceratus tumor curandus est, rosaceo excipe, & quotidie bis impone. Ceratum ustorium, quod ad lippitudines utimur, temporibus adhibito donec rubefiant, facit & ad coxendices, stigm enim sedat dolorē. Cantharidū, atramenti sutorij, succi thapsiæ, allij, singul. unc. i. ceræ tridentem, olei quincuncē. Aridis ex aceto tritis liquabilibus liquata ammiscerō. Et ubi locus rubicundus factus fuerit, illi nito ea quæ ad ambusta ab igne preparatur. Aliud cauterium e uisco. Calcis utuæ, fecis uini ustæ, sing. drach. iiii. uisci drach. ii. nitri dra. i. Mitus hoc fiet, si calcis dra. iiii. solum acceperis, & saponis quantum satis est. At si desit sapo, lixiuij lib. i. ad tertias coquit, atq; hoc modo præparato. Arida leuissime trita, uisco ad ignē liquato excipies, & rudicula agitabis. Deinde ad frigefacta lixiuiū paulatim instillabis, & emolles, ut medicamentum strigmentitia spissitudine liquidius euadat. Quod in plumbea pyxide solidiore seruabis, & si resiccet, lixiuium subinde instillabis. Hoc ad mentis imperigines ad semihoræ spatium illinito, & postea loco per spōgiam foro, albumen ouī, aut emplastrū ex plumbagine, aut hordeo, paratum imposito. Hoc aliquot etiā ad coxendices, & splenis affectiones, ac articulare morbum utuntur, hoc modo applicantes. Linteolo cuidam detricto medicamentum aliquod glutinosum illinunt, & hoc rotundis foraminibus pertusum adhibent, foramina uertentes eo ubi inuisionē facere uolunt. Atque istis medicamentū ustorij ubertim imponunt, quod uidelicet pars requisita tantū inuratur. Tum brassicæ aut betæ folia superimponunt, & decē aut pluribus horis sinunt. Et ablato postea medicamento, ad mitigatoria trāseunt, quæ ad ambusta paratur. Erosiuū incomparabile. Veratri nigri dra. iiii. squamæ æris rubræ drach. xii. sandarachæ, auripigmenti, singulorum drach. ii. atramenti sutorij drach. iiii. uentrium cantharidū dra. xii. Omnia lixiulo excipito. Cauterium ad columellas, Demosthenis. Calcis utuæ dra. iiii. fecis uini ustæ dra. ii. Sit autem fex nō uetusta, sed duorum mensium, nitri tostī drach. ii. minij drach. i. Cum lixiulo ad mellis liquidioris spissitudinem terito, & bis aut ter ebullire sinito, donec cogatur. Deinde in plumbeā pyxidem recōdito, ne exarescat, & ea gratia subinde lixiuiū instillato. Facit ad uerrucas cū alias, tū formicarias appellatas. reduuias digitorū, clauos pedū ac manuum, callos, cicatrices eminentes, & carbunculos. At uero post columellæ uisionē, oleum gargarissandū & in ore retinendū exhibeto. Tertia die transacta, ex aqua mulla, aut lacte cū melle os eluatur, donec excidat crusta. Eodē modo etiā anthero, siue florido, aut phrygio medicamentū uteris. In alijs uero corporis partibus ad locum inuistū repurgandum, aluminis liquidi, amurcæ, mellis cocti, æquales portiones misce & adhibe. Et post repurgata ulcera mitigatorijs medicamentis utere.

De sinibus, Galeni.

Cap. LIII.

Omnia sinuosa ulcera modo aqua mulla, modo uino, modo uino mulso, modo aceto mulso eluimus. Ad extergendam enim saniem aqua mulla præstat. Ad repurgandum uero & roborandum uinum mulsum confert. Ad glutinationem, uinum. Ad cruen-

tum ac graueolentem humorem, acetum mulsum. At in diuturnis affectionibus incarnatione opus habentibus, medicamenta meatus obstruētia plurimo rosaceo diluta, per fistulam in directum perforatā, cui uesica alligata est, infundemus. In quem usum probe facit Machæriōis emplastrum, & quod Iliis, & quod Harmonia appellatur, & plerq; nigra. Sed & hoc quod subijcimus, probe facit. Primum enim sinus repurgat, deinde incarnat, postea glutinat. Corticem caprisij a teneris ramulis detractum in oleo coquito, & oleo excolato, ceræ quantum satis est ammisceto, ut liquidum & infusile fiat medicamentum. De quo quantum satis esse uidebitur, tepidum in linum infundes, & parato ex eodem solidiore cerato, id ipsum impones ac deligabis. Potes & forinsecus imponere emplastrum barbarum, & quæ ex pice ac bitumine præparantur, & quod ex salicibus conficitur, & quod e uino mulso, & quod ex spuma argenti, & Harmonia, & emplastrum Pileatoris, & melinū Passionis. Ad eos tamē qui uicinas partes teneriores habet, magis cōueniunt emplastra ex sale parata. Super emplastra uero spōgia acetum mulso, aut posca, aut uino imbuta imponatur. Deligatio uero a fundo sinus incipiat, & ad osculū ulceris desinat. Et linteorū obuolutiones circa dolorem quidem fundum sinus adstringant, sed inde paulatim remittantur, ac laxius ad osculū ulceris cōnectantur: ita ut emplastrū quod forinsecus sinui adhibitū est, iuxta osculū forpice præcidatur, quo sanies excerni possit, & aliud paruum recisi loco imponatur ex eodē medicamēto, sit aut laxius propter eadē sanies excretionē, & alternis diebus auferatur, relicto illo totū sinū ambiente. Deinde ubi sinū agglutinātū cognouerimus, ad cicatricem inducentia pergemus. An aut probe glutinatus sit sinus in profundo, ex pure effluente cognoscemus, si modicū effluxerit & cōcoctū: Et si in ipso sinu neq; dolor, neq; tumor percipiatur, sed cōtractus fuerit locus siccusq; ac doloris ex pers. Illitio ad sinus antiquos. Gallas omphacitidas ad duas horas oleo macerato, & in fictile siue æneum lebetē cōiectas cum oleo coquito ad prunas, donec nigrescant & uelut torrefiant. Deinde ex oleo eximito, ac frigefactarum un. i. accipito, & aluminis scissi, aloës, singul. un. i. addito, & radicem altheæ siccarum, arthemisiæ unicaulis sicce, sampluchi, sing. sextantem adijcto, & singula seorsim terito, ac cribrato, & postea mista simul seruato, & usu expectante, ouī luteo excepta illinito. At uero in ipso ulceris osculo paruum emplastrū impones ex pastillo, quod ad Iudæum refertur. Idem medicamentum facit ad fistulas, herniam aquosam, & podagram.

De sinibus attritam cutē habentibus, eiusdē. Cap. LIIII.

Inflammationibus ad abscessum mutatis si serius incisio fiat, cōtingit aliquādo ut cutis sinui incubens tenuis, uelut detritum uestimētū reddatur, & propterea huiusmodi ulcera detrita appellantur, quæ difficulter coalescunt ac glutinantur, & præsertim si quis compage siccum medicamentum imponat. Ab his enim magis adhuc cutis deteretur, & exarescet uelut pelles attritæ. Ad ea igitur glutinanda utendum est medicamento, compage quidem liquido, facultate uero sicco. Quale est phoenicinum emplastrum Galeni, quod nos ad huiusmodi affectiones præstare cognouimus, si ita paratum fuerit, ut neq; ualde durū sit, neq;

fit, neq; adhuc inquinare desuerit, ita enim præparatum & cruenta uulnera glutinat, & omnibus ulceribus cicatricem inducit. Ad sinus autem detritos efficacissimū est, quod tenerū est & cōpagem mollē habet, & cum oleo ueteri ac uino moderate antiquo resolutum est. Nam sicut duriciam ad hos usus improbamus: ita molliorem nimis fluidā reijcimus. Liqui dū enim calido corpori incumbēs diffiuit, & linteolum siccum relinquit, quod nō solum nihil prodest, sed etiam glutinandæ cuti obest. Sed & mel moderate coctū ad hanc sinuum affectionem mirifice conducit. Cui myrrhā, uel aloē, uel thus probe trita, seorsim singula, uel simul omnia inspergere prodest, præferā si linteolo illitū mel liquidius appareat. Expertus sum & cētaurium tenue mirādum pharmacū ad hos usus: Deinde symphytū, & plantaginis folia cū radicibus sicca. Conuenit & rumicis radix, oleastrī folia: Verbenaca supina cū radicibus, uitis alba, iris, diētamnū, saluta, poliū, sabina, cupressi folia, salicis succus. Et in teneris carnibus erui farina. Quæ omnia prius tūdenda ac cribrāda sunt. Et ex eis tunc melli ammiscendum est quum coctū ab igne auferatur, ita ut probe cum eis agitatum mel donec tepidū fiat, imponatur linteo inductum.

De fistulis.

Cap. LV.

Quandoquidem sinus male curati in fistulas mutari solēt, de his quoq; ex ordine dicendum est. Appellatur autē fistulæ per translationē à fistulis harundinū, aut ex alia materia cōfectis. Nā in ipsis cauitas quædam est harundinum cauitatibus similis, & sinus callosus inest, qui citra chirurgiam aut fortius pharmacum rescindi nō potest. Fistulis itaq; obliquis sub cutem extensis specilli nucleū immittimus, & eleuata cute totā longitudinē una sectione incidimus. Deinde de callos uelut fistularum causas, si in superficie fuerint, specillo deradimus: si in profundum penetrauerint, scalpello rescindimus. Nisi enim rescindatur, neq; caro produci, neq; ulcus coalescere poterit. At si fistula non fuerit obliqua, sed decliuis & ad profundū uergens, fistulæ ambitū refecamus, tantū de carne circūscisa auferētes, quo calli cōmode refecari possint. Si uero fistula in os desinat, ab osse denudato, squamā deradimus. Cæterū fistulæ in os desinentes ampliores quidē nucleo specilli immisso ex renitentia deprehēduntur. In angustioribus uero apice specilli pertentamus, & durū ac osseū corpus occurrens cōtingimus, ac sonū quendā percipimus, uelut assis ere percussū, qua arte nō solū fistulā ossi cōtiguā esse, sed etiā an corruptū aut illesum sit, dinoscimus. Inducto enim undiquaq; specillo, si tanquam à leui corpore ipsum semper lapsare percipimus, os incorruptū est. Si uero specillū aliquibus partibus inhesterit, inæqualitates ac asperitates subesse indicium est, & ex eo os corruptū esse cōiectamus. At in fistulis quæ amplissima habent oscula, sæpe uisū os deprehendimus, ut cōiectura nō sit opus. Si uero obliquæ fuerint, flexūq; aliquem uel plures habuerint, ut specilli apex progredi nō possit, uirgulā plumbeā aut stanneā parabimus, qua iter pertentemus. Quū enim flexilis ualde sit, ad fistulæ figurā facile se accommodabit. Si uero propter nimiam obliquitatē, fistula nihil tale admiserit, ex humoris allati natura fistulæ terminū cognoscemus. Quod si fistula neruū attigerit, ex dolore indicabitur, punctiōnis enim sensum exhibe-

bit, aut stuporis. Deinde motus q̄ ab illo neruo perfici solet, deterior apparebit. Sed & in specilli cōtactu molestus sensus perceptus, indicationem faciet. Humor autem inde allatus tenuior est, similis ei qui ab ossibus defluit, nō quidē oleosus aut pinguis, sed saniosus & glutinosus. Eadē uero accidētia cōcomitantur fistulas ad musculos penetrātes. In his autē quæ carnes tantū penetrāt, crassiorē ac humectiorē sanie reperies. Quæ uero uenas occupāt, eadē accidētia habent q̄ ad neruos sunt relata, sed imbecilliora, dolores itē ac pūcturas. Verū nullus motus impeditur. Idē uero etiā de his dicēdū est q̄ ad arteriā pertingūt. At uero si fistula locū erodente uena suberit, plurimus ac crassus sanguis effunditur. Si uero arteria, tenuis & flauus cū multo spiritu ac stridore exilit. Atq; hæcenus de fistularū signis ac differētijs, deinceps autē de medicamentis ad easdē cōferentibus tractādū est. Post callosarū igitur partiū resectionē, carnositas quidē partibus suppurādī ductū adhibebimus, & desquamata ossa siccare conabimur. Basilicū itaq; emplastrū & reliqua huiusmodi inter suppurātia medicamēta habentur, sicut etiā quæ capitalia appellātur desiccādī uisū habēt. Linamenta quoq; melle illita cōmode induntur. Ad fistulas uero inchoātes, nec adeo profundas, quarū chirurgiā ægri penitus recusant, medicamēta callos exterētia adhibebimus. Deinde remoto callo, curatione reliquis ulceribus cōmuni utemur.

Collyriū fistulare, ab antiquis fistulis callos exterens. Atramenti sutorij, misyos, chalcitidis crudæ, æruginis, aluminis scissilis, rubricæ sinopicæ, gummi æquales portiones aceto excipito. Quod si pro gummithus adieceris, & duodecuplū mellis ammiscueris, callosos sinus repurgat. At si uni eiusdem parti, octuplū mellis adieceris, incarnat & ad cicatricē perducit. Aliud, faciens ad fistulas antiquas. Misyos, atramentū sutorij, aluminis scissi, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones excipe aceto. Aliud siccū, callos fistularū exterens. Cadmiæ, chalcitidis crudæ, sandarachæ, gummi, singulorū quadrantē, æris uisū, misyos crudū, singulorum sesquialundam. Aliud xyraphium, hoc est, callos deradens, ad capitis ac mēd ficosas papulas faciens. Misyos, chalcitidis crudæ, singulorum drac. ii. aluminis scissi drac. i. præpara, & eloto prius loco, medicamentū ubertim insperge, & postridie rursus eloto loco & calli ramento spōgia deterfo, nouū medicamentū adhibeto, tamdiu hoc repetēs donec totus callus fuerit derasus. Et cauēdū interim est, ne olei contactu pars curanda inquinetur. Quod si ita uisum fuerit, poteris ammoniaci thymiamatis drac. i. aceto resolutam ad septē huius medicamētū drachmas ammiscere, & collyria efformare. Aliud Collyriū fistulare. Chalcitidis crudæ, misyos crudū, æruginis, foreos, atramentū sutorij, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones aceto excipito. Aliud philosophi: Brassicæ radicē, cucurbitā siccā, os canini capitis, cerui cornu, simul exurito, & ad cinerē ipsorum organū, & sterus gallinaceū, utrūq; siccum ac tritū ammisceto, & arida seruato. Visu uero expetēte fistulæ osculū uino humectato, & siccum large inspergito, & linteolo imposito deligato. Hoc abscessus rūpit, & sanat fistulas chirurgiā nō dū attractas. Aliud eiusdē. Cōchas cū testis exustas & tritas adhibet. Vel carnes cochlearum cū myrrhā, thure & aloē, in fistulam inde, externisq; impone.

Aliud

Aliud, fistulas misticè resicicans. Facit & ad seminis fluxum, capitis destillationem, aures contusas, ac dysenterias. Consumit omnem humiditatem. Idem publi & lumbis impositum, muliebre fluxum & hæmorrhoidas sistit. Cochlearum carnes cum domibus suis, bulbum paruum, bitumen, aloën, thus, cum aceto terito ac utitur. Aliud ad fistulas optimum. Polygoni folia à ieluno commansa apponito, & uuas passas una cum uinaceis tritas superligato. Et ne cōtē pferis medicamentū uilitatem. Aliud siccum Magistriani, fistulas incarnās. Chamaeleonis nigri radicem, corticem pinus, thus masculum, aristolochiam lōgā, singula paribus portionibus terito, & fistulæ aqua multa elotæ sicca inspergito. Aliud Aloës sextantē, radicis anchusæ unclam. Replet & incarnat. Aliud. Scillam in olla ustam ac tritam indito.

Aliud presentaneū, quod Hercules appellatur. Idē etiā ægilopas radicitus tollit. Pridie uero papyrus in fistulam indatur, deinde collyrium ad fistulæ siue papyri mensuram immittatur, & per triduum sinatur, & in quarta fistulam prorsus sanatum comperies. Cadmiæ ostracidis drachmas vi. æris usti drachmas v. misyos tosti drachmas x. chalcididis crudæ drach. viii. cantharidas numero septem, libanotidis siccæ drac. ii. hermodactyli radicem integrā, gummi drachi. x. ex elpe aceto & collyria formato. Sunt qui atramenti sutorij & æruginis singul. drac. vi. adijciunt. Aliud ad fistulas usq; ad os pertinentes. Squamæ æris, æruginis, ammoniaci thymiamatis, singulorum æquas partes aceto subige, & pastillos efforma. Vsu experiente quantum satis est accipito, & ad ignem emollito, & collyria formato fistulæ æqualia, & p indito. Aliud Orisbasi, ad fistulas & uibices, a Dionysio acceptum. Foliorum lepidij herbę in umbra siccatorum, floris enici, mellis desputati, terebinthinæ, æquales portiones. Arida cum aceto terito, & adiecto modico rosaceo, omnia simul ad emplastrū formam subigito. Postea fistulæ ex aceto præfrictæ, lepidij folia sicca trita inspergito, & splenium ex medicamento illi tum superimponito. Aliud, experimento cōstans.

Radicum liliorum uistorum cinere fistulam expleto, & callus exteretur, quo sublato simlacem herbā arundinibus se implicantem, flore cādido, folijs hortensi phaselo similibus accipito, eam que siccam ustam trita fistulæ indito, & incarnabitur. Aliud. Oleastri radicem ustam terito, & siccam fistulæ uino calido austero elotæ inspergito, & callus excidet. Aliud fistulas incarnans. Lapidem translucidum specularem appellatum urito, ac tritum fistulæ inspergito. Cæterum post usum eorum quæ callos exterunt, collyrijs repurgantibus utendū est ex ærugine & melle cocto. Medicamentum sinus repurgās & incarnās. Myrrhę, eroci, aristolochię, rubricę sinoplicæ, singul. unc. i. Fel taurinum integrū, mellis quadrantē. Fel cū melle coquito, deinde reliqua tenuissimè trita ammisceto, & rursus cocto, & collyria formato. Aliud. Musci herbæ quā & doradiadē uocāt, misyos torrefacti, singul. drac. viii. salis communis, aluminis scissi, æruginis, singul. drac. ii. chalcididis dra. x. nitri, terebinthinę, sing. dra. iiii. mellis lib. iii. aceti lib. i. Quæ teri possunt terito, & omnia melle excepta coquiro, & collyria formato, quæ in sinus ac cauitates indes. Emplastrū. Orisbasi ad sinus & fistulas, c cedria præparatū. discutit enim stru-

mas: & ad elephātiā tumores prodest. Cera, picis siccę, singul. lib. i. colophonis bellem, cedriæ sexuncē, propolis trientē, uel ut aliq habent, sexuncē. Reliqua omnia donec non inquinent coquito, deinde propolim adiecto, unito ac utitur. Aliud. Picis, ceræ, singul. lib. i. colophonis, cedriæ, singulorū sexuncē, coquito simul donec non amplius inquinent, & propolis sexuncem adiecto, & sublatis ab igne thuris, aloës, & aliquādo myrrhæ, singul. unc. i. ammisceto. Emplastrū magus uel Hephæstias nuncupatum. Gluinat sinus & fistulas, & alia huiusmodi. Spumę argenti lib. i. scoriz argenti, quæ helcyfma Græcis appellatur, lib. ii. testæ clibanī antiquę, ceræ, singul. lib. iii. olei lib. vi. succi coriādri sextar. i. Simul coquito donec nō amplius inquinēt, deinde cerā adiecto, unito ac utitur. Idem hydropicis confert. Quidā ceræ nihil, quidā quadrantem saltē inijciunt. Alij uero ita præparāt. Testæ fictilię lib. ii. plūbaginis lib. ii. olei sextar. i. Sed hoc modo compagem nō acquirit. Commodū est fistulis etiā nigrū & lolio præparatum, & reliqua eius generis. Tuto etiā adhibetur quod ex argenti spuma paratur, & quod ex aceto & oleo. Vtrumq; in proximo sermone habetur. cōmodat quoq; suluum Galeni, quod ad maligna ulcera paulo antè descriptum est.

De Gangrænâ & sphacelo, Galeni. Cap. lxxviii. Gangrænā appellant, quādo ob inflammationis magnitudinē, mortificatio partis imminet, & in ea celerissime succuratur, pars ita affecta facile mortificatur, & malū ad contiguas partes proserpēs, singulis perniciē impertit. At ubi iam pars mortificata penitus sensum amisit, nō amplius Gangrænā, sed sphacelus, id est, caries, malū appellatur. Accidit autē hæc affectio etiā ossibus, quū circumstita caro uiserosos humores generans, per hos illa perrigauerit ac putrefecerit. Proinde partem mortificatā celerissime resicare oportet, quatenus contingit uitinam sanam, ita ut nihil prorsus putridi ac cariosi relinquatur. Deinde locum inurere, & postea sesamum cū melle, uel siccum capitale item cum melle adhibere, deinde panā exterius, uel farinā ordeaceam aqua & oleo subactā imponere. Sed & iris & panacis radix, & aristolochia ac eruum crustas tollunt, singula cum melle. Itē Machæionis emplastrum, & Iliis, cum rosaceo & melle diluta. Vbi uero crustæ exciderint, curationē reliquis ulceribus communem adhibeto. Cæterū priusquā pars mortificatur, & affectio adhuc gangrænā appellatur, sanguinem in loco affecto impaetum, quātum elus fieri potest, plurimum euacuabimus: propter quē sanē mortificatio contingit, quum arteriæ ob locorum angustia distendi non possint: atque sic reliquo perspirationem exhibebimus. Aug igitur si uena magna fuerit in loco affecto, hac dissecta corruptū sanguinē euacuare oportet, & sæpe uelut uaricē uolsella correptum excindere. Aut totā cutem affectæ partis profundis sectionibus diuidere, aut uulnusculis altioribus inculsis scarificare, & sanguinem effluere sinere, & postea imponere pharmacum ad putrescentia commodum. Talia uero sunt, farina erui aut lolij cum aceto mulso, uel si hæc non sunt, fabacea. Quarum uires si intendere uolumus, salē adijcimus, aut aliquē pastillum leuissimè tritū, ad normas supra descriptū, qualis est Andronis, Passionis, & Musæ, & nostet Asklepius appellatus, quibus omnibus pro ægroti corporis habitu uteris.

Rusticana

Rusticana enim & duriora natura, fortioribus medicamentis opus habent, molliora debilioribus. Pro sunt etiam gangraenis nuces ueteres, farina lolij cum raphano & sale, & aliquando aceto. Uuae passae de ptilis uinaceis cum raphani cortice, urticae folia, raphani semen cum aceto, quae etiam crustas tollunt. Item lupinorum amarorum decoctum affusum. Aliud ad Gangrenas. Sordes matulae adhaerentes illinito, & postea urina abluito. Nonnulli cedriam sordibus ammiscunt. Aliud. Plurimas lactucas exemptis fibris cum loliacea farina imposito. Aliqui tridis farinam accipiunt. Aliud, hoc & utilligines & alia huiusmodi sanat, & inflammationes mitigat. Herbam caranancen urito, eiusque drachm. viii. cum gummi drach. xvi. cum aceto terito & imposito. Aliud. Aeruginem, rubricam, alumen scissile, paribus portionibus ex aceto trita adhibeto.

De canceratis tumoribus, eiusdem. Cap. lvi.

Cancerati tumores ex atra bile crassiore efferuente generantur, quae si etiam acrior fuerit, ulceratos tumores efficit. Quapropter huiusmodi tumores inflammationibus aciores sunt, citra tantam caliditatem, habentque uenas plenas & circumcirca extensas, ad similitudinem pedum cancri animantis. Quandoquidem uero ex profundo inutilis sanguinis multitudo attrahitur, ideo uaricosae redduntur uenae, & insanabilis morbus efficitur, quum ob nimiam crassitudinem, humor neque repellitur, neque discuti, neque per totius corporis purgationem leuari possit. & leniora quidem medicamenta adhibita contemnit, ab acrioribus autem irritatur. Fieri tamen potest ut incipientes cancri, prius quam in affecta parte confirmetur, augeri prohibeamus, atrae bilis humore euacuato. Primum itaque mitioribus ad hoc utemur, quale est Epithymum cum sero lactis, deinde Hiera Rusi, quae ueratrum pro uirum robore ammixtum habet. At solani succus forissecus illitus, ulceratum caecrum mirifice mitigat. Ex eo autem linteolum molle duplicatum madefactum imponendum est, & supra ipsum quoque lana tenera imponenda eodem succo imbuta, sed & ipse succus assidue his superfundendus est, ut ne haec exarescant. Utendum est & medicamento e pompholyge ad caecos ulceratos. Sed & hoc quod sublungam, ad caecata ac maligna pudendorum, scroti, sedis, mamillarumque affectiones, & ad ani ac muliebrium locorum rimas & tubercula efficax est. Oleum rosaceum & hyoscyami, aut solani, aut semperuiuae, aut umbilici ueneris, aut psylli, aut uuae acerbae succum, in plumbeo mortario, cum plumbeo pistillo ad strigmentitiam copagem terito. Consert & cancri ulsi cinis cum cadmia lora inspersus, uel cum cerato adhibitus. Idem etiam gangraenis conducit. Aliud. Irionis semen cum melle ad emplastri formam terendo redactum adhibeto, & maligna ulcera in quacunque corporis parte tracto ad cicatricem perducet. Idem facit & malicorium ustum tritum inspersum. Aliud, ad caecata & maligna, Testudinem terrestrem donec inalbescat urito, & cinerem ad alia cum butyro, ad cancrios uero ulceratos cum oleo dulci ad emplastri formam subactum, splenio illinito ac imposito. Repurgat enim, costringit, & ad cicatricem perducit. Et prohibet ne malum reuertatur. Adhibetur idem utiliter & gangraenis. Nec incommoda est Theriaca Andromachi cum modico rosaceo diluta. Aeger porro pitisanæ succo

uberrime alatur, & lactis sero. Et ex oleribus, malua, atriplice, blito, & cucurbita. Piscibus uero petrosilis, & uolucris omnibus praeterquam palustribus.

De carbunculis, ex eodem. Cap. lviii.

Carbunculi a sanguine atrabiliario efferuente, & ad partem aliquam irruente generantur, & sunt sane ulcera crustosa, plerumque a pustula incipientia, aliquando etiam citra hanc. Pruritus certe in principio in parte affecta adest, deinde modo una pustula, modo plures tenues, uelut milij grana, insurgunt, quibus ruptis similiter crustosum ulcus succedit. Quod si citra pustulas cutis excoriatur, semper tamen crustosum apparet ulcus, uelut ea quae a cauterijs fiunt, crusta iam cinereum, iam nigrum colorem habente, & fundo adhaerente, & uelut clauo affixa, comitante etiam noma depascente. At reliqua caro circumscissa uehementer inflammatur, & nigra fit ac splendida, instar bituminis & picis. Talis autem est exquisitè atra bilis. Febris autem aegrotos longe uehemetior quam igne facro correptos inuadit. At uero carbunculi qui iuxta carnem consistunt, cito abolentur. Qui uero in membranis aut neruis fiunt, diutius permanent, & subiectos locos per consensum afficiunt. Nam qui caput occupant, ad collum aut ceruicem, aut pectus, aut brachia, aut sub alas, consensum distribuunt. Qui uero pudenda inuadunt, crura & inguina simul afficiunt. Aliquae uero partes etiam ad suppurationem ueniunt, quae uidelicet magis expositae sunt iniuriarum. Dolores insuper accedunt longe maiores quam pro paruitalis ratione. Sepe etiam in repurgando ulcere, membrana aut neruus putrefactus, medullae speciem praese ferens eximitur. Carbunculum igitur ubi primum eruperit, statim curare oportet, sanguine usque ad animi deliquum euacuato. Nisi enim uenae sectionem quid prohibeat, a nullo auxilio malus emolumentum consequitur. Post sectam uenam non incoueniens est locum scarificare, uulnusculis profundioribus impactis, ob humoris crassitudinem. Deinde aluus eluenda est, tenuissimamque uictus ratio cum quiete & tranquillitate imperanda. Ad locum uero nihil uehementer repellens aut refrigerans adhibendum est. hinc enim malus dispendium, quam compendium sequitur. Non tamen affluxus negligendus est, sed medicamenta adhibenda quae cum moderata repulsione etiam discutiunt. Tale autem est ex plastragine & lenticula cocta cataplasma, cui addita est panis clibano cocti, neque nimis puri, neque sordidi medulla. In ipso uero carbunculi ambitu emplastra imponantur ad ambusta descripta. Super ipsum uero ulcus fortiora pharmaca imponemus, quale est Andronis, aut Pasionis, aut Polyidae pastillus, & reliqui huiusmodi ad nomas parati, cum passo ad mellis copagē diluti. Carbunculo uero aut crustas mirifice eximunt, & fluxionem ad locum sistunt, uerbenacae rectae folia cum adipe trita & apposita. Idem faciunt & cupressi folia ac tenera germina, & pilulae tenerae cum polenta. Aliud. Gallinaceum sterces siccum cum axungia subactum ipsi solum carbunculo imposito, & bene sperato. Aliud. Nitri & rutae pares portiones cum aceto adhibeto. Aliud. Fimi columbini, & seminis lini, aequales portiones cum melle imposito. Aliud. Silphium, rutam & nitrum, aequis portionibus cum melle soli carbunculo imposito. Sepe etiam erodetia aliqua supra descripta ulceri imponimus, & per linamenta indimus. In ambitu uero carbunculi lenticulam coctam circumponimus.

P ad car

ad carbūculos mirabile. Lillorum radicē recentē & humidā ad emplāstri formā tritā imponito, & brasicae foliū ne exarescat superimponito, & admiraberis. Circūscarificat enim & crustas eximit, repurgat, replet, ad cicatricē perducit, ut ne uestigiū quidē elus appareat. Aliud Oribasij, minimē contemnendū. Saponis partē unā, axungiae tātundem, salis, cineris farmetorū uitis, aut lignorū fici, singulorū dimidiā partē, præpara & adhibe, & forinsecus panē illine.

Aliud siccū, ad carbūculos & nomas. Chalciudis crudę, misyos crudi, atramētū sutorij, æris usti, æqua les portiones sub sole in aceto terito donec siccantur, & utere sicco. Misy uerō nō uratur, sed tātum torreatur. Siccū Oribasij, ad carbunculos, nomas, gāgras, ulcera antiqua & chironia, & ad strumas ac podagras. Spumæ argenti librā i. olei antiqui sesqui librā, auripigmenti unc. i. Spumā argenti cū oleo coquito donec non inquinat, & ablatis ab igne, auripigmentū adjecto, ac rursus coqto, donec nigrescat. De inde manibus refrigeratū subigito, & utitor, ad strumas quidē, tali quale est, ad alia uerō cum oleo diluto, quo linamentis illini possit. Aliud Malsiliensis, quod suæ ciuitati cōposuit, quum in ipsa carbunculi sæuissent, & multos occiderent. Bouis armētarij simum siccum ac tritum seruato, usu uerō experiente aqua madefactū soli carbūculo imponito, & linteū aqua humectum, aut cataplasma ē lenticula superponito. Aliud. Chrysocollæ, nitri tosti, lapidis asij, auripigmenti, sandarachæ, misyos torrefacti, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, singul. drach. iiii. terito, & in ærē uase seruato. Vtus uerō tempore, cū specilli nucleo in ipsum carbunculi ulcus indito, & uiride subscriptū superimponito. Emplastrū uiri de. Thuris, æruginis, singul. drachm. i. squamæ æris, aluminis scissi, salis ammoniaci, singulorum obol. iiii. ceræ drac. viii. resinæ pinus siccæ dra. xvi. olei lib. i. Arida ad solē in aceto terito, & reliqua liquata adjecto, ac utitor. Aliud Asclepiadæ. Nitri torrefacti, succi cyrenensis, singul. drac. iiii. laseris drac. iiii. s. cerę, colophonis, olei, singulorum sesquifunciam, præpara & adhibe. Carbunculi humorem resiccat, & circūstas partes scarificat. His autē scarificatis, utere hoc quod mox describā; Nā post scarificationem carbunculos à uicinis partibus radictus euellit. Mali punici acidī recētis ac maturi corticē, exemptis interioribus in aceto coquito, & flaccidum factum tritū & super linteolum ad emplāstri formā extēsum adhibeto, assidueq; acetum superstillato, ne exarescat. Idē etiā in pastillos formari potest, & in umbra siccati, qui deinde usu expetite aceto diluti adhibentur. Hoc ego frequēter in principio usus sanitatem restitui. Cæterū pudendorum carbunculos eodē modo curabis, quē in oculorū carbunculis retulimus. Confert & mel ammixta sapa coctū, & cum specilli nucleo sæpe præputio impositum. Aliud Oribasij, ad carbūculos. Chalciudis, atramētū sutorij, singul. drac. viii. spumæ nitri drac. i. cū aqua tere & utere. Probe facit & ouillū stercus torrefactū cum melle. Aliud, ad carbunculos, nomas, putredines oris, suppuratas aures, & digitorum reduuias. Aluminis scissi drac. viii. chalcitidis drach. vi. sandarachæ drach. iiii. masicorij, misyos, atramētū sutorij, nitri, omphacij fici, singul. drac. ii. præpara & utere arido, uel cum melle, & lenticulam coctam cum pane superimponere.

De erysipelate, hoc est, igne sacro, Galeni. Cap. lxx. Flaua bilis tenuior & acrior facta, unā cū sanguine ad aliquam corporis partem irruens, erysipelas efficit, quod aut exulceratur, aut sine ulcere exstitit. Si itaq; sanguis dominū habuerit, inflammatio ad erysipelas naturā uergens exoritur. Si cōtrā, bilis dominatur, erysipelas ad inflammationē tendēs appellatur. Quod si neuter humor excesserit, affectio inter erysipelas & inflammationem media uocatur. At uerō erysipelatis tumor seruentior ac flauior quā inflammations percipitur, non tamen dolorem, neq; pulsum, neq; pressionem, neque tensionē inflammationi æqualem inducit. Sæpe enim per cutem tantum diffunditur, carnē nulla iniuria afficiēs, atq; hoc est quod exaet Erysipelas nominatur. Grauiora uerō sunt erysipelata circa caput, quare nisi efficacibus auxilijs opē feramus, partes consillarum per cōsensum afficiunt, inflāmantq; ac suffocant. Ea igitur uenæ sectione curabimus, si sanguis redūdari: Sin bilis, per medicamentū bilē flauā expurgās. Vtemur & infusis efficacioribus. Et quod influit repellimus, & feruorē refrigerabimus, per ea quę humectāt simulq; frigefaciūt. Sit autē terminus refrigeradi, mutatio coloris. At, uerō id quod nō exactē erysipelas est, sed quodāmodo ad inflammationis naturam uergit, liuidam cutem facit, si plus æquo refrigeretur. Et nisi medicus destiterit refrigerādo, etiā denigrabit, præsertim si senile fuerit corpus quod curatur, ita ut erysipelata sic refrigerata, ne discussorij quidē medicamentis discuti possint, sed induratum quendā tumore in parte relinquant, proinde præstat ab humectantibus ac refrigerantibus ad discussoria progredi, postquam mutatus fuerit color, antē quā niger aut liuidus appareat. Sunt autē humectantia ac refrigerantia, citra manifestā adstrictionē erysipelatis cōmoda, solanum, semperuiuum, portulaca, umbilicus ueneris, psyllium, lenticula palustris, hyoscyamus, & glaucium, et cerata ex frigida aqua præparata. Cera enim cū oleo optimo, præsertim rosaceo uel omphacino liquatur, & ceratum liquidum sit, quod frigefactum in mortario aqua frigida paulatim instillata, quātum imbibe potest, cū pistillo teritur. Sit autē oleum duplū, aut quadruplū, ceræ respectu. Si uerō tenuis & albi ac pellucidi aceti modicū affuderis, medicamentum refrigeratorium magis efficiēs: potest & succus aliquis herbarum relatarum ammisceri: pastilli quoq; ad erysipelata præparati, nō affectis modo partibus, sed sanis quoq; uicinis adhibēdi sunt, & assidue permutadi, citissime enim resiccantur ac uires amittunt, prioribus itaq; per spongas ex tepida aqua expressas elotis, recētes adhibeantur. Pastillus Andromachi. Quo utor, inquit, ad erysipelata. Spumæ argenti lib. ii. cerussæ lib. i. opij, sulphuris uiui, croci, singulorū quadrātem. Excipe passo & utere cum passo. Oribasius autē pastillus, inquit, ad erysipelata admirandus ita præparatur. Spumæ argenti, cerusę, croci, sulphuris uiui, opij, singulorum quadrantem, passo excipito. Alius. Acacię dra. viii. misyos dra. iiii. thuris dra. iiii. opij dra. ii. præpara & utere, uelut dictū est. Ad ignes autem sacros aceto dilue. Quidā etiā aloę dra. ii. adijciunt. Cæterum ad erysipelata faciei præsertim, hirundinis nidum tritum ac cribratum melle excipito, & cum penna illinito: citō enim discuit: ac sedata inflammatione, priusquam pars liuescat,

scat, discussoria adhibenda sunt, & aqua calida affundenda, itēq; marina ac muria. Cataplasmatibus etiā eadē ammiscantur, cōfert & brassica per se uel cū polenta adhibita, aut mādragoræ radix cū pane & aceto. Aut terra figularis cū coriādrī succo. Aut ceratū rosaceū paulō antē descriptum cum calce. Quod si liuor aut durities partē affectam præoccuparit, scarificatio profundior fiat, & marina aqua aut muria affundatur, deinde uerò cataplasmata adhibeantur.

De Herpete, ex eodem. Cap. LX.

Si flaua bilis citra alterius humoris mixturam secreta, iuxta partem aliquam cōstitit, Herpes appellatur affectio. Si quidem igitur crassa fuerit cōpage, & magis acris, omnem cutem usq; ad subiectam carnem exulcerat, & uocatur Herpes exedens. Si uerò testiculor fuerit, & minus acris, superficiem solum uelut inurit. Atq; hæc species generis appellationem tulit, simpliciterq; ac citra appositionē, Herpes uocatur. Est enim adhuc tertia herpetis species quæ Milliaris appellatur, eò quod pustulas paruas & multas in superficie cutis excitat, milio similes. Oritur autē etiā ipse à bile, uerū minus acris & calida quā priores. Alij uerò hunc pluitæ ad bilem flauam ammixtione fieri putant, proinde herpetem curabimus rectē, si præuacuato uniuerso corpore, localia deinde medicamenta adhibuerimus. Qui uerò cuti solidandæ statim à principio intentus est, hanc quidem sanabit, uerū humorem affluentem non prohibebit, sed semper prioribus ulceribus solidatis, contigua cutis rursus uelut prior in superficie erodetur. Itaq; in herpetibus erodentibus, sero lactis cum scammonia exhibito, totum corpus euacuabimus. In miliaribus uerò pharmacum exhibebimus, quod bilem simul ac pluitam educit. At uerò partibus affectis non eadem quæ erysipelatis adhibetur. Tamen si enim refrigeratione uelut erysipelata opus habent, nō tamen item humectatione indigent. His itaq; medicamenta refrigerantia ac simul resiccantia cū adstrictione cōueniūt, ita ut erodentibus quidē, & in superficie hærentibus, mitissima adhibeamus: miliaribus uerò magis discussoria. Quare neq; lactucā, neq; semperuiuū, neq; quicquā aliud refrigerās ac humectās adhibebimus. Sed in principio facta purgatione, pampinos uitis, rubi, aut polygoni, aut plantaginis folia imponeamus, postea uerò his etiā lenticulā, & mel, & polentā miscbimus. Illitiones uerò ad herpetas commodæ sunt, acacia cū aceto, plantaginis succus, gaudiū passo dilutū. Ad pustulosum uerò herpetē, plūbi cremētum ē uino austero tritū illinitur, & folia betæ in uino cōcta imponuntur. Aliud. Olei myrtel sexuncē, cremētū plūbi triētē, ceræ triētē. Recrementū dilue cū uino, & liquata cera excipe, & illine. Aliud, ad herpetas uehemēter erodētes. Lanæ succidæ mollis tēde obuolutæ & ustæ dra. iiii. malicorñ ē punico malo dulci, spumæ argēti, singulorū drach. vi. ceræ, adipis caprini, singulorū sesquiunciā, olei myrtel trientem aut quincuncē. Præpara & utere. Ad herpetem uerò sub cute extātem, plumbi recrementū cum succo polygoni tritum illine. Aliud ad herpetas. Lanæ mollis succidæ tēdæ obuolutæ & ustæ dra. x. s. recrementū plūbi sesquiunciā, ceræ dra. xxv. adipis caprini depurati, & frigida loti dra. xxv. olei myrtel quincuncē, præpara & utere. Aliud, ad herpetas pustulasq; superficiales insigne medicamentum. Cornu capri-

num ustum cum aceto tritum illinito. Cornu uerò urendum super flāma detineto, exurgentesq; bullas excutito, & postea in mortario terito. Idem præstat etiā cornu ouillum & præcipue arietinum. Potest idē cinis etiam cerato excipi. Pastillus ad herpetas.

Terræ cōmolæ, rubricæ sinopicæ, singulorū dra. iiii. misyos torrefacti, aluminis rotundi, corticis thuris, singulorū drach. vi. terito ex aqua, & formato pastillos: Vtere uerò cū aceto aut uino myrteo. Alius pastillus. Misyos drach. vii. salis fossilis drach. iiii. gummi drach. ii. Terito cum uino & formato pastillos, & utitor cum uino. Alius. Aluminis scissi, atramenti sutorij, salis fossitij, singulorum drach. ii. excipe aceto, & utere cū passo. Alius præclarus. Aluminis rotundi, chalcitidis, melātericæ, foreos, singulorū drachmas duas, misyos, malicorñ, acaciæ, singulorum drachm. iiii. calds uiuæ dra. xvi. aceti sextar. i. tere & forma pastillos, & utere cum aqua. Ego uerò his omnibus fortioribus, & Andronio ac Musæ pastillo, & reliquis huiusmodi, ad affectiones diuturnas utor. Quum enim fortissimi sint, ualde resiccant. quapropter in principio lenioribus utendū est. Est & hoc medicamentum ad diuturnas affectiones mirabile. Nitri, chalcitidis, atramenti sutorij, misyos, calds, acaciæ, partes æquales aceto excipe, & utere cum aqua. Ceratum ad herpetas excoriatos. Cerusæ, spumæ argēti, radicis anchusæ ustæ, singulorum drachm. ii. pollinis thuris, aluminis scissi, singulorum drach. i. ceræ drach. xvi. adipis uituli drachmas centum, olei sexuncem, ouorum candidum duorum. Arida cum uino tere, & liquatis reliquis, ammisce. Aliud ad excoriatos herpetas. Cerussæ, spumæ argēti, radicis anchusæ crematæ, singulorū dra. iiii. aluminis scissi, misyos torrefacti, singulorū dra. i. resinæ pinus dra. vi. ceræ trientē, olei myrtel lib. i. & trientē, uini heminam unā. Arida cum uino tere, donec fuerit cōsumptū, deinde cum liquatis cōmitte, & paratū medicamentum linteolo inductum adhibe. Cōuenit quoq; emplastrū ex hordeo, oleo dilutum ad eodē herpetas, foueatur itē ac rigeatur locus assidue per spōgiā ex uino, uel si id nō liceat, ex aqua expressam. Et humiditas tenui linteo extergatur, & postea relata medicamēta adhibeantur. Neq; interim squamæ ab ulceribus detrahantur, donec spōtē excidat aut discedant: neque splenium durum imponatur. Si uerò depascendo proserpenia fuerint ulcera, cataplasma ex lenticula cum melle adhibeto. At si pura & nuda fuerint, & nome sedata, spumā argenti aut plumbaginem, cum uino tritam impone.

Ad Epinyctidas, hoc est, pustulas nocturnas. Cap. LXI.

Epinyctides ulcuscula sunt sponte erumpētia, pustulosa, subrubra, quibus ruptis sanies subcruenta effluit. Hæc interdum non ualde infestant, noctu uerò maiorem dolorem excitāt, quā pro ulceris magnitudine. His itaq; medentur brassicæ, uel solani, uel hyoscyami, uel rhamni folia, cum melle imposita, & plantago trita, & centaureum uiride, & uua passa cū ruta, & cucumeris satui folia, cum aqua, & sesamū cum aceto tritum. Egregiè facit & calx cum oleo ad mellis compagem subacta, imposita, & laser cum aqua, desiccatur enim absque mordacitate. Aut sulphuris usui, & spumæ argenti pares portiones, cum aceto & oleo myrteo ad strigmentitiam formam tritas

adhibe. Ego uero, inquit Orisbafius, oleum non admitto, & pro aceto potius cum uino tero. Lenticula ite cocta, & emplastrum ex polline tritici, utiliter imponitur, postquam uero epinyctis excoriata fuerit, emplastris liquidis utere, & caue ne acris, & acida, ac falsa adhibeas. Vltima sunt ite fometa, balnea, & sol.

De termintho.

Cap. LXII.

Terminthus tuberculi species est. Incumbit autem ipsius pustula nigra supernè ac infernè, qua rupra infernè desquamato similis apparet, hoc autem dissecto, pus inuenitur. At uero curatio huius similis medellæ pustularum nocturnarum iam relatæ.

De papulis siue pustulis.

Cap. LXIII.

Papulae quibusdam exoriantur similes his quæ a feruida aqua ambustis emergunt, non tamen multum dolorem inducetes. Quibus ruptis subflauis humoris copia paulatim effluit, ad biduum aliquando ac triduum durans. Hæc foeminis quibus menstrua defecerunt, aut alias non rectè profluunt, sæpe in cruribus oriri solent. Infantibus uero aliquando in toto corpore. Verum uiridis rarissime accidunt. Quomodo uero infantum ulcera curare oporteat, iam antea sermone quarto, ostensum est. In foeminis autem menses oportune cedere oportet. Virorum uero corpora congruo medicamento purgare. Vtrisque uero alimenta aluum emollientia exhibebimus, & urinas proletemus. Acris ac falsa prohibebimus. Ipsas autem pustulas acu perforare oportet, & humorem excludere, & emplastrum ex tritici polline adhibere. Euacuato uero humore, & non amplius effluente, id quod ex hordeo præparatur, apponendum est.

Ad ambusta ab igne.

Cap. LXIII.

Corpora ab igne aut feruida aqua ambusta, moderatè extergentibus pharmacis opus habent, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem. protinus itaque ad pustularum bullas prohibendas, terra quæcunque occurrerit, modo leuis sit, in teneris carnibus cum aqua, in durioribus cum posca illinatur, præstat tamen terra cimolia, si haberi potest. Ouum item crudum molli lana exceptum, refrigerat & siccit citra mordacitatem, & thus cum aqua tritum, & betæ folia contusa & cocta ac cum uino imposita. Et alumine omne cum aqua et ouo candido. Facit & hoc mirificè. Aeruginis & spumæ argenti pares portiones cum uino & oleo tritas, cum pœna illine. A manu enim coacta prorsus abstinere oportet, & tenuè linetolum superimponere. Quod si bullæ emerferint, eas in principio ne rumpas, si uero durauerint, rumpe & ceratum impone. potest autem pastillus præparari, ac in hunc usum seruari. Aluminis drach. II. thuris drach. II. cum aqua terito, & pastillos formato, ac utitor cum posca.

Alius. Cimoliam sextantem, corticis thuris, misyos usti singulorum drach. VI. rubricæ drach. III. cum aqua formato pastillos, & utere cum posca. Ceterum cunctari non oportet, sed statim terram quæcunque ad manum fuerit cum aqua illinere, eamque postea tepida posca abluere, & quæ relata sunt adhibere, porro ad ambusta iam pustulosa, rhoem & polentam aceto trita impone, aut fel porci coctum, aut hyoscyami uiridis succum assidue illine, & bullæ marcescunt. Ex folijs quoque hyoscyami uiridibus pastillos forma, & in umbra exicca, & in hyemem referua, quos usu expetente aqua dilue. Aut calcem uiuam cerato liquido exceptam, & linetolo inductam impone. Aut

myrrham uino tritam adhibe. Excoratis uero & ulceratis, betæ folia in uino cocta ac trita illine. Aut ad ceratum rosaceum liquidum, betæ succum paulatim instilla, quantum imbibere potest. Sine autem olei partes tres, ceræ una, succi quantum satis est. Vtere, & miraberis. Aliud. Pimum columbinum panniculo linetolo illigatum exurito, cineremque cum uino tritum, aut cerato exceptum adhibeto. Aliud. Lupinorum madefactorum & coctorum, quales quotidie comeduntur, cortices in mortario tritos, unciam pondere accipito, & cum ceræ sextante, ac olei quinque colliquatis, commisceto ac utitor. Sed & hoc ambusta cito ad cicatricem perducit. Cerussæ, spumæ argenti, hordei usti ac triti, singulorum unc. I. ceræ quadrantem, rosacel aut myrtel dodrantem. Hordeum ad ceratum liquidum ammisce, & postea spumam argenti ac cerussam in mortario cum uino tritas adijce.

Ad flagellatos.

Cap. LXV.

Pellem ouillam recens detractam & adhuc calentem flagellatis circūda, omninoque intra unius diei ac noctis spatium sanabit. Cōfert & brassicæ succus affusus. Est & hæc irrigatio inflammationi arcendæ commodissima. Olei partes III. aceti partem I. furculorum anethi fasciculum I. Acetum & oleum assidue per anethi fasciculum agitata coquuntur, ad aceti consumptionem. Deinde adijcitur cera, quanta satis est ad strigmentitiam compagem. potest autem ex hac irrigatione, etiam solidius ceratum præparari. Sed & Sphærium ad irrigationem efficax est, & reliqua quæ sequenti sermone habentur emplastra, diluta uelutibi ostendimus. At uero aurigæ ad latus flagrorum utuntur calce trita cum ouis crudis soluta, adiecto rosaceo cerato. Accipiunt autem calcis quadrantem, ceræ quadrantem, rosacel sextantem, ouæ cruda tria. Hoc medicamentum illinunt, & assidue renouant. Ad uibices uero flagellorum facit hoc, ceræ, terebinthinæ, spumæ argenti, buri, thuris, mellis, æquales portiones, loco prius soto impone, & quotidie permuta. Aliud. Calcis utiæ loræ, succi solani, olei rosacel, pares portiones commisce, illine, & linetolum superimponere.

Ad desquamata.

Cap. LXVI.

Desquamata appellantur, quando ex lapsu aut utolentia aliqua offensa cutis auulsa est. Hæc ab inflammatione tutatur. Rhus ruber cum melle illitus, sideritis folia trita, stratiotes herba in aquis nascens, cum aceto. Vtere & cerato ad intertrigines subscripto, & cæteris huiusmodi.

Ad intertrigines.

Cap. LXVII.

Intertrigines ex calceamentorum attritu obortæ, dum dolorem excitant, pulmone suillo aut agnino calido appposito mitigantur, & ab inflammatione asservantur. Item calceamento ueteri usto trito insperso. Aut succida lana, aut mali punici satui flore, singulis uistis tritis inspersis. Aut acacia cum aceto illita. His uero qui teneras carnes habent, emplastrum ex hordeo ad ambusta descriptum, & alia huiusmodi adhibeto. Sed & ad popularum eruptiones, intertriginesque ac ambusta, efficacissimum est hoc. Recrementi plumbi quadrantem, ceræ tridentem, adipis suilli recentis unc. I. olei myrtel lib. I. Ad cicatricem uero inducendam absque adipe præpara. Vtere etiam emplastro ex psylli succo, quod sequenti sermone habetur, ex spu

ex spuma argenti, cerusa, & amylo paratum.

Ad contusa & sugillata. Cap. LXVIII.

Carne ab aliquo graui illapso contusa, & paruis in ea uenulis disparatis, sanguis per persultationem profunditur, qui sub cute collectus sugillationem appellatam efficit. Scopus igitur est curationis, ut sanguis sub cute cōtēus discutatur, & hoc citò antequam locus nigrescat. In principio autē aliquid ex adstringentibus ad discussoria ammiscēdū est, quēadmodū Ser-mone octauo ad faciei sugillationes docuimus. Tunc enim uenarum contusæ, opus habent ut densentur ac firmētur, ne noua materia attracta ad locū allabatur, postea uerò solis discussorijs utemur. Sed & in principio scarificamus sugillata, atq; sic reliquam curationem facimus. Optime autem facit ad contusa, citrj mali pars interna cum oleo illita: aut linteū oleo cicij imbutum imposito, & miraberis.

De ruptione. Cap. LXIX.

Ruptio non in fibrosis, sed carnosius musculorum partibus soluta cōtinuitas existit, nunquam citra sanguinis effusionem contingens. Quæ à sinu differt, eod quod nullum osculum ad humorum effluxum uelut sinus habet, proinde & in hac discussorijs utemur, ad ea quæ in rupto corpore continentur discutienda. Ad hoc autē idonea sunt medicamēta lassitudinē eximētia. Acopa Græcis appellata. Tale autē est quod ex populo nigra paratur, itemq; quod ex abiete, ac reliqua huiusmodi. Omnino uerò ubi in profundioribus partibus ruptiones fuerint, acriora ac magis incidentia pharmaca adhibere oportet. Atq; ea de causa cucurbitę quoq; adhiberi debent. Si quidem igitur statim totus sanguis effusus, fuerit discussus, facile caro diducta coalescit. Si uerò diutius perseuerauerit, & sordes subnutrita fuerit, ruptio de cætero coalescere nō potest, labia solū inter se cōponuntur, ut ex leui occasione facile disparētur, & intermedium locus humore quodā replēatur, fiatq; quodam modo assidue sanguinis effusio, similis ej quę ab initio contingit.

De uulsiōe. Cap. LXX.

Vulsiō fit fibris quibusdā distractis, quæ in mēbris ac musculis cōtinentur. Et sola mitigatione opus habet, ut doloris exors maneat. Neq; enim fieri potest ut huiusmodi fibræ glutinentur, quū è sinuū genere sint, uelut etiā ruptiones. Est & huius affectiōis similis uelut ruptionum prædictarū curatio, ex discussorijs & citra molestiā siccantibus constans. Verū ad ruptiones ac uulsiōes in profundo factas, in pectore uidelicet aut intestinis, aristolochia rotunda utiliter potatur, & si quicquam aliud, commoda existit. Similiter etiā centaureæ magnæ radix & succus. Itē rheon, costus, bdelliū, singula cū aceto mulso pota.

Ad luxatos articulos. Cap. LXXI.

Luxationes ex lubrica præsertim emolitione factas, mitigat lana succida, aut spōgia noua aceto & oleo imbuta ac imposita, ita ut quies imperetur, & deligationes fiant ad ossium fracturas fieri solitæ, facit etiā ad easdem bulbus coctus cum melle, aut cerato liquido exceptus, & folia uiridis, & sal, ac nitrum assatū cū cerato, aut symphytū cū cerato, & urticæ folia cū sale, & heliotropiū, scorpiurum appellatum, & cinis sarmentorū cum axungia ueteri. Sed nihil præstantius est quā emplastrū quoddam apponere ex his, quæ ad ossiū fracturas parantur, si eius copia detur.

Ad laxos articulos. Cap. LXXII.

Laxos articulos contrahit ac firmat acacię succus aqua dilutus ac affusus. Et spinæ Aegyptiæ fructus, rubi item ac myrti, & malicorij, ac foliorum quercus decoctū, & myrteum ac lentiscinum oleum assidue illitum. Et malicorium coctum & cerato myrteo exceptum, aut per se uino coctum tritū ac impositum.

Ad perniones. Cap. LXXIII.

A pernionibus præseruat sal cū melle tritum, manibus ac pedibus assidue inde perfriētis. Aliud, non modo præseruans, sed genitos etiā perniones curans. Citrionum magnorū internā partem addam, relectis seminibus diligēter terito, & cum adipe suillo uetusto ad cerati compagem redigito, & ad hyemis initium quotidie illinēs ex eo digitos, uictor. Aliud Oriba-sij. Sulphur uiuū cū melle cocto imposito. Aliud, facit etiā ad omnes feruidas eruptiones. Myrrhæ trientē, aluminis liquidī sextantē, acetī quantū satis est, præpara & pernionibus nō ulceratis, ac pruriginosis feruidis eruptionibus imposito. Aliud. Succū uuæ acerbæ lib. i. thuris dra. iiii. ceræ dra. xvi. coquito simul ad succi ferme cōsumptiō nē, deinde in mortario subige ac utere. Aliud, ualde insigne, ad reliquas quoq; inflammationes commodum. Cerussæ, spumæ argenti, aluminis liquidī, singulorum lib. i. myrrhæ, thuris, singulorum quadrantē, ouorū assatorum uitellos xvi. adipis suilli ueteris lib. i. Arida cum aceto terito, in quo malicoriū decoctum est, & ubi strigmentisdam compagem habuerint, adipē adijcito, ac simul probe subigito, & in plūbeo uase seruato. Vsu uerò postulante, rosaceo aut myrteo oleo diluito ac illinito. Aliud. Hyoscyami succus assidue illitus, eodē die inflātionē ac dolorem sedat. Aliud. Alliū in oleo torreto, coq; abiecto, & cera ad oleū addita, ceratum facto ac imposito, probe facit etiā amurcæ illita, & rhus coriarius. Ceterū irrigationes circū perniones cōueniunt. Radicis cyclamini decoctū, item rhos coriarij, betæ, ac lupinorū amarorū, marina aqua calida per se. Verū rapī decoctū reliquis omnibus præstat. Aliud, ad ulceratos perniones efficacissimū. Ceratū rosaceū in magno rapo ad ollæ similitudinē excuato, ad feruentē cinerē liquefacto, & adhibeto. Idē ceratū etiā in raphani radice lique fieri potest, faciūt & cæci fluuiales usti melle aut cerato excepti. Aliud. Umbilicum ueneris & malicorium in uino coquito, & cerato rosaceo excipito. Aliud. Rutę, medullæ taurinæ, rosacel, æquas portiones unito. Hoc etiā ad ulcera antiqua facit, & articularū ossa denudata. Aliud, perniones imminuentes arcens. Atramētū sutorij, florum mali puncti satul, singulorum drach. iiii, aluminis scissi drach. iiii, myrrhæ, thuris, singulorum drachm. ii. ceræ drachm. iiii, adipis suilli drachm. viii. olei myrtei quantum satis est. Aliud. Aluminis scissi drachm. x. spumæ argenti drach. iiii. myrrhæ drach. i. ouorū albumina duo. Vino & oleo myrteo excipe ac utere. Aliud. Aluminis rotundi drach. iiii. calcis uiuæ drach. ii. ceræ unc. i. rosacel aut myrtei olei trientē, præpara ac utere. Idem & ad attritus facit. Aliud. Spumæ argenti drachm. x. cerussæ drachm. iiii. ceræ drachm. xii. adipis suilli recentis drachm. xx. ouorum assatorum uitellos duos, pollinis thuris drach. i. Spumam argenti, cerussam, & oua cum aceto terito, deinde ceratum adijcito, ac præparatum seruato.

P 3 Vfus

Vfus autem tempore cum rosaceo dilutū adhibeto.

Aliud, perñiones ac cicatricem ducēs. Cōfert etiā ad papularum eruptiones, excořfatas intertrigines, & desquamata. Cerae, adipis suilli, singulorum drach. viii. spumae argenti, corticis pinus, singulorum drach. xvi. mannae thuris drach. viii. rosacei quantum satis est. Quidam plumbaginem pro argēti spuma sumūt. Oribasij Hexapharmacum. Ad perñiones ulceratos. olei omphacini, taurini adipis, succi hyoscyami, singulorum lib. i. spumae argenti sexuncem, colophoniae trientem, mellis sexuncem.

Ad digitorum pterygia siue reduuias. Cap. lxxiii.

Ferruginem cum aceto illine. Aut aluminis, sandarachae, calcis uiuae, diphrygis, aequales portiones impone, & linteolum uino imbutum ac mollem spongiam superimponere. Aliud. Squamę aeris, malicorij, caricarum leniter assatarum, aequales partes melle excipe, & loco prius ex spissamentorum astringentium decocto rigato impone. Et quod de pterygio exarscit depurga. Aliud cito resiccans ac curans. Soreos usti, thuris, singulorum drachm. ii. aeruginis rasae drach. i. cum melle tere, & super ipsum pterygium impone, facit & ad reliqua horum locorum ulcera maligna, nigredines & putredines. Oribasij zopyrios ad pterygia. Aluminis rotundi acetabulum in fictili exurito, & ad tritum acetum cyathum, hoc est, sextantem ammisceto, & mellis quadrāte, & haec simul pterygijs imponito. Aliud bonum, cimoliae tostae drach. viii. pumicis usti drach. iiii. aeris usti, gallarum, singulorum drach. ii. praepara & utere. Aliud ad pterygia putrefacta, & ulcera pudendorum. Thuris drachmas quatuor, squamę aeris drachm. ii. aeruginis rasae drachmas iiii. Mellis quadrātem, terito ad solē donec flauescant, & loco ex uino prerigato impone, & linteolum ex aqua expressum, ac spongiā superimponere. Ex huius usu magnū successum habui. Aliud. Hoc per triduum citra mordacitatem sanat. Caricarū pingulum tostatur, ut probe teri possint, drachmas duas, misyos cyprij drachmas duas, squamę aeris drachmas duas, mellis quantum satis est, praepara & utere, ac miraberis. Ego uero squamam aeris per se tritam adhibui, & linteolum ē uino expressum superimposui. Oribasij ad pterygia. Gallarum, auripigmenti, atramenti sutorij, aequales portiones unito ac utitor. Aliud. Aeruginis dra. iiii. mannae siue pollinis thuris, sulphuris uiui, sing. dra. ii. Vtere etiā pastillo Musae uelut admirando, linteū ē uino expressum superimponere. Aliud ad pterygia experimento constans. Gallam non perforatam cum carie ligni quercini tritam insperge.

Ad paronychias, id est, unguiū abscessus. Cap. lxxv.

Ad paronychias incipientes priusquā suppurētur, siue i manuū siue pedū digitis fuerint, lanā ex aqua frigida ibutā imponito, aut p linteolū ex aqua expressū assidue refrigerato. Aliud. thus & gallā cū melle trita, simul aut seorsim imponito. Aliud. folia myrti trita inspergito, aut ceratum myrti imponito. Aut sordes auriū assidue illinito, & sanabis. At si fuerint inflāmatę, panē aqua madefactū cū rosaceo adhibeto. Aliud. Oliuę folia tenera imponito. Aliud. Cadmiā tritam inspergito. Oportet autem carnem undiquaque ab ungue disparare, linamentis conuulsis, ē linteo interpositis, & probe adhibita

medicamenta alligare. potest etiam Spodium simili modo inspergi. Aliud, ad paronychias exulceratas. Aeruginis, spumae argenti, sing. drach. iiii. sarco collē drach. i. terito & large inspergito. Aut farinam erui adhibeto. Carnem item eodem modo uelut dictum est disparato, & linteum ex uino expressum, item ē spongiā uino imbutā superimponito. Hoc ego saepe uti soleo. Aliud, quo utor. Nitri, squame grise, pumicis usti, sing. unc. i. cimoliae quadrātem. Omnia cū aceto & modico melle terito, & pastillos formato. Vfus aut tempore aqua diluito, & adhibeto linteo exceptum. Vtor etiam pastillo insigni, quē Iridem uocāt, cum uino diluto, qui sic praeparatur. Aluminis liquidi drach. centū, croci, myrrhae, singulorum dra. viii. Quidā etiam aloēs drach. viii. adijciunt. Subigito ac formato pastillos, ac utitor cum uino, & linteum ex uino superliga, prodest & Musae pastillus, ac reliqui eius generis. At uero depascendo iam proserpentes fistes, auripigmento usto trito uberim insperfo, & linteo ē uino expresso superimposito. Ego uero sandaracham & auripigmentum, a quibus portionibus simul trita adhibeo. Et si cicatricem inducere oportet, eadem terebinthina liquida excipio ac adhibeo. Quod si suppuratae fuerint paronychie, primum ipsas perforabis, & humorem exprimes, & deinde lenticulam cū melle impones. Aut rosas uirides, aut siccas aqua madefactas, tritas adhibebis.

Ad contusos ungues.

Cap. lxxvi.

Myrtel & mali punicae folia tenera impone. Aut felle tauri euacuato, in ipsam fellis uesicā unguem indito, ac finito donec perfecte sanetur. Aliud. Sal fossile cū aqua & oleo tritū illinito. Est enim efficacissimū.

Ad subruentos ungues.

Cap. lxxvii.

Picem siccam liquefacto, & cum farina mixtam apponito, praestat tamen subruentatum unguem in medio perforare, ac cruorē subterlapsus exprimere. Si enim perstiterit, putrescet, & ulceris difficulter curabilis causam exhibebit.

Ad motos ungues.

Cap. lxxviii.

Ungues ex aliqua offensa motos, & pūgituo dolore affectos, caricae cū melle tritae mitigant. Quod si dimidium unguis exciderit, nitru aut salem cum pari fellis utulini mensura misce, adhibe, & sanabis.

Ad scabros ac leprosos ungues.

Cap. lxxix.

Adipem ouillum emollitum, & super linteū extesum adhibeto, ac tertia die soluto, & si mollem unguem reperiis deradito, & eundē rursus imponito, & tertia die solutū similiter deradito. Atq; hoc tandiu facito, donec integra sanitas accedat. Aliud. thus tritum adipe ouillo excipe, ac utere uelut dictum est.

Aliud ualde bonū. Alumē scissum anserino adipe excipe ac utere uelut dictū est. Aliud, ex cuius usu successum sentio. Mastichen chīam in aquam feruentem coniectam ac emollitam, ungui impone ac obliga, & tertia die solue, & derafo ungue rursus impone, atque hoc facito usque ad perfectam restitutionem. Aliud. Hordei farinam cum pice ad emplastri formam coquito ac imponito, uelut dictum est.

Aliud. Gummi drachmas sex, lacrymae oleastri drachmas quatuor, atramenti sutorij drachmas tres: Gummi & lacrymam aceto diluito, & adiecto atramento sutorio in olla ad prunas ad compagem coquito, & derafis unguibus apponito, & alligato, ac tertia die soluto, & ungue derafo rursus imponito,

ponito, idque tandiu facito donec unguis excidat. Aliud. Auripigmentū colore aureo, & sandarachā, æquis portionibus probè terito, & terebinthina ad emplastri formam excipito, & imposito, ubi prius per unū atq; alterum diē, farinam ordeaceā cum aceto & sylvestris cucumeris radice tritam adhibueris. Tertia uero die similiter soluto, ac tandiu repetito, donec unguis excidat. Cauendum est autē ne locus oleo attingatur. Aliud. Sandarachæ, auripigmenti, chalcididis, myrrhæ, thuris, singul. drach. ii. farinæ loij dra. v. terebinthina excipito & adhibeto. Aliud, auferens ungues citra exulcerationē. Bituminis dra. ii. sulphuris uiui, sandarachæ, auripigmenti, singul. dra. i. Excipe terebinthina & utere, ac per septimum diem solue, deraſoq; ungue, rursus nouum impone, atq; ubi unguis exciderit, ceratū myrteum, cui ali- quid eiusdē medicamenti admixtum est, applica. Aliud. Calcem uiuā cum oleo, aut mastichen cū opo- balsamo imposito. Postquam autē morbus occal- luit, & præscripta medicamenta nihil proficiunt, ex- coriatoria nunc referenda statim adhibeantur. Exco- riatorium leprosi unguis, callos, uerrucas & clauos auferens. Cantharidas numero x v. sulphuris uiui, chalcididis, singulorū drach. i. aliq; depurgati nucleos i x. omnia probè trita terebinthina excipito. Vſus autē tempore partes unguis uicinas miti aliquo me- dicamēto munito, & ex coriatoriū hoc pelliculæ ue- sicæ bubulæ illitū adhibeto, & postridie soluto, bul- lasq; exortas rūpito, & si subiacentibus locis sordes inhæserint, panē cum aqua mulsa, aut lentisculā cum melle illinito. Et deinde ulcera repurgata, cerato ex anserino adipe, thureq; ac cerato parato, curato. Aliud ex coriatoriū. Nasturtij, sinapis, sulphuris uiui, nigellæ, cātharidū, atramentū sutorij, æquales portio- nes ex aceto probè tritas terebinthina excipito, & ue- lut diximus utitor. Aliud, Oribasi leproſos ungues exterēs. Propolis, cere, bituminis, sing. dra. ii. sulphu- ris uiui dra. i. præpara, & oleo, ne inquinetur. Vſu autē expectere, calefactū unguibus impositur. Aliud eiusdē. Atramentū sutoriū & sulphur uiuū sufficien- te uisco excipe, & corlo inductū adhibe. Aliud. Pi- cem liquidā, ceram, colophonīā, ammoniacum thy- miama æqualiter misceto ac imposito. Aliud. Ce- ræ, colophonīæ, terebinthinae, sulphuris uiui, staphi- dis agrestis, niteri, singul. dra. ii. sandarachæ, cāthari- dum, singulorum drach. i. cedriæ quantum satis est.

Ad reparandos ungues.

Cap. lxxv.

Myrrhæ drach. viii. aluminis scissi drach. iiii. panis hordeacei sicci drach. i. excipe melle & impone. Aliud, ad ungues ægre orientes. Betæ agrestis semen cum aceto tritū imposito. Aliud, poliū cum adipe uitulino & terebinthina tritum adhibeto.

De anulis, digitis impaſtis.

Cap. lxxxi.

Anuli aliquando digitis impinguntur, quum circulus ipſorū angustior, uolenter illorū partibus craſſio- ribus fuerit adactus, atq; hoc tum maxime contin- git, quum homo cibo ac potu distētus, prona ac pen- dula manu sopitus decubuerit. Ita enim manū ex- tremitates longē magis intumescunt, quā si erigā- tur. Aqua igitur & oleo, aut maluc decocto, manus largē perfundatur. Nam parca perfusio tumore ma- gis auget. Deinde anulus leuiter uersatus detraha- tur. Quod si perfusio nihil effecerit, filum craſſius cōtortum accipito, & alterū eius caput sub anulum

ponito, & reliquum totum digito laxè circumliga- to, & postea caput filii anulo suppositum sursum tra- hito: filo enim attracto, anulus deorsum procedet. Quod si neq; sic successerit, specilli partem latiore sub anulū submitto, & anulū utrinq; propē sigil- lum per spatham incidito, & filo lineo utrinq; cir- cundato anulū attrahito. Et consequenter lanam ui- no & oleo imbutam mitigandi gratia adhibeto.

Ad clauos.

Cap. lxxxii.

Clauus rotundū est tuberculum, album, clauī capiti si- mile, plerunq; in calcaneis ac plantis pedū enascens, & in gradiendo dolore inducens, ad durioris alicu- ius rei occursum. Sed & in summis manuum digitis sæpiſſime oriri solet. Huius itaq; tollendi gratia se- ctionem & uſionē recusamus, quoniā hę partes ner- uosæ sunt ac subtili sensu præditæ. Vſimur autem uſtoriis medicamētis huiusmodi. Cantharidum pe- ctuscula x v. sulphuris uiui, chalcididis crudæ, ammōij, sing. obolos. iiii. Singula seorsim terito, & pice li- quida siue terebinthina ad emplastri formā excipi- to, atq; utitor hoc modo. Caput clauī & circūſitum ei ambitū deradito, & spleniū inflammationi arcē- dæ idoneū, glutinosum, in medio excisum, quātum clauī totius ambitus patet, adhibeto, & tūc splenium ex relato medicamēto sup ipsum clauū, ad glutinosi splenij cæsurā imposito, & forinsecus charta integri- to, ac rursus aliud linteolū custodię gratia superliga- to, atq; ita per bīduū aut trīduū, ægrū quietū dimi- tto, idēq; sæpe repetito, donec clauus a subiecta car- ne prorsus disceſſerit. Clauo uero sublato deraditur plāra, & rursus adhibetur emplastrum, donec ulcus fuerit explanatū. Aliud. Deraſo prius ac repurgato loco, sicut diximus, succū cyrenaicū, uel si is deſit, la- ſer cū nitro ficus pinguiſſimę carne, uel terebinthina excipito ac imposito. Aliud. Lupinos crudos uſtos melle excipe, & circūraſo ac depurgato clauo impo- ne. Aut gallinacū ſtercus uſtū melle exceptū, aut nigellā cū aceto tritā, eodē modo adhibe. Aliud. Cla- uum circumcirca repurgato, & succum cyrenaicum probe tritum, aut laſer uberrīm adhibeto, & deinde splenium ē melle eodemq; succo illitum apponito. Hoc etiā ad ſtrumas facit. Aliud. Rpurgato clauo fabam freſam, aut lomentum fabacū aceto coctum. apponito. Idem ad cicatricem perducit. Aliud. Cla- uo repurgato atramentum sutorium leuiſſime tri- tum inſpergito, & linteo alligato. Aliud, clauos ē manibus ac pedibus tollēs. ſimum columbinum in acerrimo aceto ad cerati compagem coquito, & cla- uo repurgato imposito. Et per bīduū aut trīduum funditus tollet, aut circumraſo ac repurgato clauo, ex erodentibus medicamentis ſuprà relatis aliquod adhibeto. Aliud, clauos digitorum citra mole- ſtiam auferens. Mastichen nigram Aegyptiam in aceto coquito, atque ita calidam adhibeto.

Ad plantarum rimas.

Cap. lxxxiii.

In plantis quoque rimæ oriuntur, gradientes magis infestantes. Planta igitur aſidue ſcalpi debet, & hæc medicamenta adhiberi, picem liquidā ammīxta ce- ra, ita ut ceræ pars una ſit, picis uero liquidæ duæ, illinito. Aliud. Scillæ medullam in oleo coquito, & cum terebinthina tritam imposito, aut etiam ab ſecta ſcilla, terebinthinam in oleo liquato, ac utitor. Aliud. Cancrorum fluuiatiliū uſtorum cinerem cum melle ſubactum impone, uel oleo diſſolutum

rimis præscalptis instilla. Aliud. Malicorium acetum coctum per dies quinque imposito, indeque purgatis calcem cum oleo adhibeto. Aliud. Cornu caprini usti cinerem liquida pice aut terebinthina excipito ac utitor. Aliud. Amurcae in æneo uase ad mellis compagem coctæ cyathum unum, acetum cyathum unum, squamæ æris, pollinis thuris, singulorum drachm. duas, lanæ succidæ teneræ manipulum unum. Lanam sædæ obuolutam urito, ac reliquis aridis ammisceto. Amurcam uero cum aceto ad mellis compagem coquito, & illis adijcito. Vt re hoc ad uulnera quidē cum uino dissoluto, ad plantarum uerō ac pudendorum affectiones cum passo. Aliud ad pedum rimas, porcini adipem sale inueteratum calidum assidue instilla. Aliud. Spumam argenti, colophoniam, mel, oleum, æquis portionibus præparato. Hoc etiam ad reliqua caua ulcera facit. Aliud, ad pedum rimas, quod labiorum quoque duriciam emollit. Cerussæ drachm. ii. spumæ argenti drachm. x. myrrhæ drachm. i. ouorum cadida ii. Vino odorato paulatim instillato terito ac utitor. Mihi uerō etiam oleum adijciendum uidetur, ut unguis compages fiat. Et ualde probò commune illud quod è melle paratur, & mellis, ceræ, olei, spumæ argenti, æquales portiones recipit. Nam hoc ad omnes pedum ac manuum exulcerationes facit, siue in uola, siue intra digitos fuerint, & præsertim si propè ungues extiterint. Ad calcaneorum præterea intertrigines ex calceamentorum attritu obortas, & ad attritus ex longo decubitu factos, quales sæpe in cubitis ac coxis uidentur eorum qui diutino morbo laborauerunt. Hoc medicamento sæpe prosperè usus sum. Neque enim simile habet, præsertim ad os sacrum & femora ex longo decubitu attrita ac ulcerata. Aliud floridum, ad rimas. Calcis uisæ drachm. x. cerussæ drachm. x. ceræ drachm. xxx. adipis suilli recentis septuncem, colophoniam dodrantem, succi seminis lini cyathum unum, olei dulcis quincuncem. Cerussam & calcem cum succo terito, & ad ceratum frigefactum ammisceto, & loco prius repurgato adhibeto. Hoc præ omnibus teneram plantam efficit. Ad reliqua uerō ulcera ob foetorem improbat. Aliud. Amurcae, mellis despumati, singulorum drac. ii. aluminis phorimi drac. i. Hoc etiam gingiuas purgat ac firmat.

De crurum ac reliquarum partium uaricibus.

Cap. LXXXIII.

Varices appellantur uenæ dilatatae, quæ aliquando circa testes, aliquando circa crura ampliatur. Sed qui in testibus fiunt, chirurgiâ difficulter admittunt. Qui uero alibi consistunt, hoc modo curari solent: primum simplex sectio fit cutis uasi adiacentis, deinde uas ab ambiētibus corpusculis separatum cæco uncino attrahitur, ac lineo funiculo supernè deligatur, & non aliter quàm in uenæ sectione fieri solet uas inciditur, & euacuato sanguine quantum opus esse uidetur, superior pars costringitur, & postea totum quod ampliatum fuerat amputatur, peracto opere sectio pol-

line thuris impletur, & splenio ac lineo imposito deligatur. Aeger autem quiescere iubetur, seruato accliuu paritè situ, ne si decliuis faciat, humores ad ipsam confluant, postea curationis ductus ad puris generationē dirigitur, & reliqua cura ulceribus communis adhibetur. Atque hæc compendiaría ac securá curatio est. Quidam uerò uisionem malunt, & per latè digiti spatium cauteria uasis adhibent. Et ubi crusta exciderit, ulcusque incarnatum ac cicatrix inducta fuerit, locum roborant. Alij uarices incipientes talibus medicamentis prohibere conantur. Emplastrum citra molestiam resiccans, etiam si ulcera manantia in ipso uarice fuerint. Bituminis iudaici sesquilibra, olei uetustissimi bessem, terebinthinæ liquidæ septuncem, sulphuris uiui trientem. Bitumen ad cicerum magnitudinem crassius contusum, in oleo donec liquecat, coquitur, deinde adiecta terebinthina simul coquito, donec non amplius inquinent, & sublato ab igne medicamento sulphur tritum inspergito, atque simul omnia in mortarij frigida aqua plenum iniijcto, & probè subactis utitor.

De brachiorum ac crurum dracunculis, Leonide.

Cap. LXXXV.

Qui appellantur dracunculi, lumbricis similes sunt, & aliquando magni, aliquando parui reperiuntur, frequentius quidem in cruribus, quandoque uerō & in musculosis brachiorum partibus consistentes. Nascuntur autē hi in Aethiopia ac India in pueris præcipue, estque ipsorum generatio non dissimilis lumbricis latissimis uentris. Sub cute enim mouentur nihil molestiæ afferentes, uerum temporis progressu circa dracunculi extremitatem locus suppuratur, & cutis aperitur, ac dracunculi caput exeritur. Quod si dracunculus attrahatur, uehementem dolorem inducit, præsertim si nimia tractus uolentia fuerit ruptus. Nam quod relinquitur, molestissimos dolores infert, proinde ut ne recurrat animal, ualido filo brachium costringere oportet, & quotidie hoc molliri, ut dracunculus paulatim progrediens constrictione quidam intercludatur, nequaquam autem abrumpatur. Locus item aqua mulsa, & oleo in quo absinthium aut abrotonum coctum est, aut alio quodam ex his quæ ad alui lumbricos descripsimus, irrigandus est. Omnia tamen acria uitanda, propter periculum inflammationis. Cataplasmata quoque laxatoria ac suppuratoria è farinis cum aqua mulsa & oleo præparata adhibeantur. Quod si dracunculus sponte progrediens facile extrahi poterit, nihil amplius faciendum est. Sin ad suppurationem uertetur, à cataplasmatibus, & aquæ mulsæ ac olei irrigatione non est discedendum. Nos uerò emplastrum è baccis lauri, post cataplasmatum ablationem, imponere solemus: facta uerò suppuratione, cutis per longitudinem dissecetur, & dracunculus denudatus auferatur, & cutis linamentis inditis disparetur, & reliqua curatio suppuratoria adhibeatur, ita ut animal suppurato & extracto, ulcus incarnetur & ad cicatricem perducatur.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

DECIMO QUINTO SERMONE AETII

CONTINENTVR

De tumoribus laxis.	cap. i.	De emplastro Aniceto.	cap. xvi.	caput xxxii.
De inflatione.	cap. ii.	Emplastra ruptoria.	cap. xvii.	Emplastrum Phycotiche appellatum. ca-
De tumoribus induratis.	cap. iii.	Emplastra discussoria & attractoria.		put xxxiii.
Tendinum ac ligamentorum induratio- rum curatio.	cap. iiii.	Emplastrum Nechepsonis e cupresso.		Emplastrum Sphaerium appellatum. ca-
De strumis.	cap. v.	caput xix.		put xxxiiii.
De bronchocela, hoc est, gutturis tu- more.	cap. vi.	Apochymatis preparatio.	cap. xx.	Emplastrum pentatheton. cap. xxxv.
De pulacei ac mellici humoris tumoribus.	cap. vii.	Cerata utilissima.	cap. xxi.	Emplastrum ex Ochra. cap. xxxvi.
De steatomatibus, hoc est, tumoribus adiposis.	cap. viii.	Heptapharmacum laxans, suppurans, incarnans.	cap. xxii.	Emplastrum Telamonium. caput xxxvii.
De ganglio.	cap. ix.	Emneapharmacum, Hori mendesij. ca-		Pilarium ex recremento argenti. caput xxxviii.
De uasorum dilatatione.	cap. x.	put xxxiii.		Emplastrum ex pompholyge. caput xxxix.
De cerijs, hoc est, fauis.	cap. xi.	Emplastrum philosophi. cap. xxiiii.		Emplastrum rutaceum. cap. xli.
Emplastra ad cruenta uulnera glutinanda, & ad multos usus commoda.	cap. xii.	Oesypi preparatio. cap. xxv.		Ceratum e perdicio. cap. xli.
Emplastra cephalica, & ad fracturas, & ad multa commoda. Et de iusto eorum usu.	cap. xiii.	Emplastrum Manus appellatum. ca-		Ceratum e succo betae. cap. xlii.
Emplastra emollientia ac discussoria, ad multa commoda.	cap. xiiii.	put xxxvi.		Ceratum ex sandyce, Homo appellatum. caput xliii.
De emplastro ex aspidibus.	cap. xv.	Emplastrum Bromii appellatum. ca-		Emplastrum ex allijs. cap. xliiii.
		put xxxvii.		Emplastrum e scilla. cap. xlv.
		Emplastrum ex ouis. cap. xxviii.		Emplastrum ex pompholyge, Hierae Cap-
		Parhygrum Galeni. cap. xxix.		padock. cap. xlii.
		Emplastrum ex ouis, Oribasij. ca-		Emplastrum nigrum, Essentia appella-
		put xxx.		tum. cap. xlvii.
		Parhygrum Oribasij. cap. xxxi.		
		Emplastrum Rosaceum inscriptum.		

AETII MEDICI GRAE
CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

QUARTI SERMO TERTIVS, ET

EX ORDINE XV.

De tumoribus laxis itemq; duris, & de strumis, & emplastrorum multi usus compositione.

De tumoribus laxis. Cap. i.



VE M A D M O D V M ab influ-
xu bilioso erysipelas, hoc est, i-
gnis sacer, ita a pituitoso tumor
laxus, quē oedema Graeci uocāt,
generatur. Est aut tumor hic ci-
tra dolorē, flatuosū spiritū con-
tinēs, uelut a uaporoso humo-
re pgnatus. Solēt etiā aliter tumores laxi fieri, circa
pedes praecipue, in hydrope, ac tabe, & malo corpo-
ris habitu, q si digitis prematur, cauus locus fit. Et hi
in quibusdā etiā facie occupāt. Verū hi tumores acces-
sio sunt aliarū affectionū, & nullā ppriā ac praecipuā
curā requirūt. Sufficit em̄ ipsis frictio, aliquādo p ace-
tū ac oleū rosaceū pmixta, aliquando p oleū & salē,
potest etiā sal ad acetū oleo rosaceo permixtū adijci.
At si ob pituitosi humoris influxū in parte aliqua
laxus tumor cōsistit, spōgia posca imbuta ac im-
posita, & leui adstrictiōe alligata, q. ex infernis partib.
iniciū sumat, & in supnas desinat, affectionē quādoq;
sedauit. Oportet autē spongiā esse nouā, si uerō talis
nō adsit, expurgāda est nitro uel spuma nitri, & li-
xiuio. Quod si neq; sic tumor deprimatur, parū alu-
minis ad poscā adijciet. Aptum est & Tarficū elly-
chniū, aut aliud mollissimū, eodē humore imbutū
ac impositū. Cōfert & glauciū, & collyriū ex eo pa-

ratum. Sordes itē lucernarum aqua mulsa dilutae uo-
tiliter adhibētur. Ceterū diuturnos tumores laxos
oleo praestillitos, & spōgia noua ex lixiuio superim-
posita uolētius cōstrictos sanabis. Discutit itē ac cō-
pescit laxos tumores terra omnis illita, & praesertim
quae in lētibz reperitur ad salē adhibita, uelut Ser-
mone secūdo retulimus. Itē isatis hortēsis ac satiuā.

De inflatione. Cap. ii.

Flatuosus spiritus aliquando sub cute, aliquando sub
pelliculis ossa aut musculos ambiētibus, colligitur,
& inflationē parit. Aliquando etiā circa uiscera uen-
tremp; ac intestina coaceruatur. Si itaq; uiscera infla-
ta fuerint, satis cōstat, ex uitioso uictu malū esse ob-
ortum. In musculis autē cōtingit praecedēte plerūq;
contusione. Suntq; huiusmodi musculorū affectio-
nes curatu difficiles, quoniā in omnes fermē muscu-
li partes flatuosus spiritus dispergitur, constringit-
urq; ac intercluditur ab ambientibus pelliculis, &
plurimis alijs corpusculis usque ad cutem p̄tensis.
Ad uentris ergo ac intestinorum & uiscerum infla-
tiones, oleum tenue efficax est, in quo ruta aut cymi-
num, aut apij semen, & alia attenuantia ac calefacien-
tia coctum est, si aut irrigetur, aut per clysterem in-
fundatur. Magna etiam cucurbita circa umbilicum
absque scarificatione apposita, tam citō hominē
a molestia liberat, ut admirabilis sit ea celeritas,
&

& incantationi similis. At uerò musculis ex contusione inflatis, ex calidorū & acriū usu partes exacerbantur, & auctis inde inflammationibus musculi magis læduntur, ac dolores intendantur. Mixtas itaq; facultates habere oportet ea, quæ inflatis musculis adhibentur, præsertim si contusio fuerit aliquatulum inflammata. Quapropter in principio mitigatoria augenda sunt. In declinatione uerò discussoria. Neq; repente ab alteris ad altera trāseundū est. Sed paulatim mitigatorijs detractis, discussoria augebimus. Mitigatoria uerò in huiusmodi affectionibus sunt, sapa, & oesypus, modico oleo adiecto. Discussoria autē acetū, nitrum, spuma nitri, & lixiuū. Et in principio quidē solā sapa cū modico oleo, & aliquādo uino adhibemus, ut ne omnino repellendū ui careat, & hæc omnia succida lana excepta. Quæ si nō adsit, oesypū reliquis quacūq; lana exceptis ammiscemus, præ omnibus uerò curandum est, ut hæc calida permaneāt, neq; sinantur donec frigeant, forinsecus itaq; calida lana adhibeatur, & ubi calorē eius æger amplius non percipit, noua statim applicetur. Mitigato autem ægroto, acetū ac nitrū ammiscemus, copia ipsorum paulatim aucta. At uerò neglectas & antiquatas inflammationes, primū lixiulo fovebimus, deinde emplastrum quoddam molliens ac discuties imponemus. Quale est hoc. Strigmēta seruēfacta excolato ut pura fiant, & rursum in ollam mitto, & calcem uiuam uelut farinam trita infarcto, ut lutosa cōpages medicamentū euadat, & utilis. Hoc uerò adhuc efficacius est pharmacum ex sycomoridis compositum.

De tumoribus induratis. Cap. III.

Indurati tumores laxis opponuntur. Laxorū enim nota est, ut appressis digitis cedant & cauus locus fiat. Durorū uerò tumor pūnax est, & ad tactū renitēs, & ad sensus difficultatē inclināt, ut tandem hi loci in quibus est, sēsus exortes fiant, & ad olis duritiā perueniant, & nullā oīno curationē admittant. Sed & pilli in ipsis oriri soliti, minimē nutriūt, & exactē glabri fiūt. Duri itaq; tumores aliquādo statim ab initio cōsistūt ac augētur. Aliquādo uerò a medicis inducuntur, q̄ inflammationes ac erysipelata uehementē p̄frigerarūt ac adstrinxerūt, quū tamen trāfacto principio discussoria adhiberi debeāt. At uerò q̄ ex erysipelatis fiunt, cutis duritiā saltē p̄ se ferūt. Qui uerò ex inflammationibus succedunt, subiectas etiā carnes inuadūt, tanto p̄fundius quāto inflammationes erysipelatis sunt p̄fundiōres. Inchoantibus ergo duritijs, & debile aliquē sensum adhuc habentibus, medicamenta emolliētia adhibebimus, quæ simul moderatē etiā discutunt, & talia sanē sunt quæ & molliēdi ac diffundendū uim habēt. Nā quæ uehementē discutunt, & sine molliēdione statim euacuant, manifestē quidē tumore imminuūt, reliquas uerò affectionis incurabiles efficiūt. Discutitis enim tenuioribus humoribus quod exactē terreū ac solidū est pūnacter resistit, quapropter in hūc usum medicamēta adhibenda sunt, quæ molliēdi simulq; discutēdi uires habēt. Primū igitur molliētibus utemur, deinde ad discussoria p̄cedem⁹, eaq; molliētibus paulatim miscemus. Cōsiderādus tamē est & curādū corporis habit⁹, & affectionis status quantū processerit. Hęc uerò si rectē cōsideraueris, cōlecturalē qdē, non tamē penitus arte carētē, peritiā acquies. prima em̄ die statim molliētia adhibebis, altera deinde aut tertia trāfacta, facile intelliges an augere aut remittere medicamentū

uim oporteat, præstat autē tum ad hos usus, tū ad reliquos, si rectā curationē peragere uelimus, opposita medicamenta, ualidissima uidelicet ac mitissima, preparata adseruare, quod pro affectionū diuersitate, diuersæ mixturę fieri possint. Ad duros itaq; tumores molliēdos caprinus bubulusq; adeps cōmodus est. At sicut taurinus ac hircinus ualidiores sunt, ita hōdinus ac uitulinus imbecilliores, & suillus debilissimus. Sed his omnibus præstat ad discutendum, non autē molliendū, leoninus, pātherinus, hyænæq; ac anseris. Gallinaceus autē inter suillū ac anserinum medius est. At inter medullas prima est ceruina, deinde uitulina. Cæterū resine odoris nō acris, his medicamentis ammixtæ uiscositatē exhibent, nec tamen molliēdi uim auferunt. Cōmodissima uerò omniū resinarū est terebinthina, quæ chia appellatur, & laticis resina, liquoris compage nihil ab illa differens. Deinceps uerò pinea & abietina. Verum sicciore, qualis est resina pinus arida, physema priuatim appellata, nimis siccant. Et propterea ad emolliētium medicamentorū cōpositionē inutiles sunt, sed terebinthina ac laticina eligendæ. Pix quoq; Brutia quum eiusdē facultatis sit, in eisdē usus recipi potest, sed ardiore reprobamus, sicut etiā bitumen. Habet & mastiche chia uim emolliendū, Aegyptia uerò mastiche nigra emollit qdē, sed magis siccant ac discutit. Thus insuper nō expers est facultatis molliēdi, itemq; foeni graeci semē, hoc enim coctū molliēre potest, quā thus quoq; in mollioribus medicamentis paululum est coquendū. Eiusdē ordinis sunt & balneorū strigmēta, butyrū, altheæ decoctū. Media uerò inter lenia & ualidissima propolis est. Validissima autē appello, ammoniacū thymiana, bdelliū, præsertim Scythicū resinofum, & colore nigricās: styracē maximē pallidū, qui calamites uocatur, flauum item ac pinguem. Galbanum enim & opopanax supra uim discussoriam, etiam molliunt. Verum galbanū molliendo, opopanax discutendo præstat. Arque huiusmodi sanē molliētium medicamentorum materia est. Tu uerò libros adepius medicamentarios, singulorum compositorum uires ex simplicibus expendes, quod uarias pro maioris ac minoris ratione ipsorum differentias cognoscas, & corporum simul ac affectionum differentias consideres, atq; ita fortia fortibus, & mitia debilibus adhibeas. Inter curandum autem affecta pars oleo calido foueatur, & glutinosa medicamenta apposita antequam sponte decidant, ne remoueantur: imò etiam si lauandus sit æger, omnino permittēda sunt. A balneis tamē medicatis abstinentiā cōsulo, præsertim quæ aluminis, aut sulphuris, aut aeris qualitātē ammixtam habēt. Hęc enim huiusmodi affectibus aduersantur. Et hęc profectō sufficere possent ingeniosis, & in artis operibus aliquatenus exercitatis uiris. Verum quum non omnes tales sint, medicamēta quoq; usu & experimentis cognita explicare oportet, initio sumpto ab his quæ summā molliēdi uim obtinent, & paruis etiā inflammationibus commoda sunt, quæ aliqua duritiā participāt. Horum autem simplicissimū est parhygrum appellatum, ex cerē, butyri, & colophonis æquis portionibus cōstans. Deinde quod Mnæscæ, inscribitur, & reliqua eiusmodi. Item helladicū mollitoriū, & quod ex perna præparatur, & quod Lucio inscribitur, ad anchilopas & reliqua quæ paulo inferius in hoc Sermone habentur.

Tendinum

Tendinū ac ligamētōrū induratorū curatio. Cap. IIII.
 Tumorū equidē induratorū emolliō ac discussio prædictis medicamentis perficitur, quæ emolliētia appellātur. Quū uerō partes quædā natura rariore, quædā densiores sint, consequens est ut singula proprijs medicamentis priuatim opus habeāt. Quapropter ad tendines ac ligamenta præstabilius esse iudico, ut molliētibz medicamentis aliquid adiungatur, quod incidendi uires habeat, inter quæ præcipuū est acetum. Affecta itaq; parte cōmodis medicamentis premollita, huiusmodi fomentū sæpe habuit successum. Acerrimo aceto ignitum lapidē pyritē, si haberi potest, aut molarem, ex quo molas faciunt, restituo. Deinde ad excipiēdum substrati lapidis calidū uaporē ab asperso aceto emergentē, ligamētum siue tendinem induratum adhibere iubeo ac cōmouere. Hinc enim mirificè opē sentit. Et postea rursus medicamētum molliōrū impono, & paucis interpositis diebus, idē fōmētum rursus repeto. Sæpe enim in hac ligamēti aut tendinis admotiōe ac cōmotiōne, ita ab eleuato uapore duritiā resoluta est, ut res incatationi similis uideretur. In principio tamen affectam partem nō aqua, sed oleo plurimo quotidie largē perfundo. accipio autē oleum dulcissimū adstrictione penitus carens, in quo interdū foenū græcum, & altheæ ac cucumeris syluestris radicē, uel aliusculus consimilis coquo. Vtor præterea aceto etiam ad alias partes, quæ iam diu medicamēta alia experitæ sunt. Scio enim esse quædā medicamēta ex aceto parata, quæ post molliētiū usum per integrū diem imponere soleo, deinde rursus molliētia adhibere, & paucis interpositis diebus, rursus ex aceto præparata imponere. uis enim aceti per interualla locis iā premollitis admota, crassos ac uiscosos humores incidit ac dissoluit, & hinc tales affectiones nō leuiter suuat. Verū si quis adeo fortiter discutientibus plus æquo usus fuerit, præsertim in principio, tenuiores quidē humores discutiet, residuū uerō ad lapideam naturā mutatum, loco impactū persistet, supra hoc quod nimius etiā eorū pharmacorū usus, neruorū essētiā lædit. Quapropter neq; frequēter, neq; ab initio, neq; duobus cōsequēter diebus, medicamētis cū aceto præparatis, ad ligamētōrū ac tendinū duritiā, utēdū est. Lienis tamen partibus induratis, tutus & cōmodus ipsorum usus est. Et multi sanē indurato lienis tumori, ammoniacū thymiana cū aceto subactum adhibēt, & hoc solū sæpe ad splenis indurati curationē sufficit. Ego uerō etiā carnosarū partium musculis induratis, inter molliētia medicamēta, ammoniacum cū aceto adhibere soleo, & summā eius cōmoditatem depræhendo. At hoc etiā hic una tantum aut altera die adhibēdum est, & deinde ad molliētia reuertendū: et pluribus diebus interiectis rursus ad medicamētū ex aceto trāseundū, siue ammoniacum id sit, siue aliud quoddā emolliens cū aceto præparatū. Molliēs autē esse oportet, quod cū aceto paratur: siccatia enim primū quidē prodesse uidentur, sed residuum postea incurabile efficiunt. Proinde inter emolliētia frequēter hoc cataplasmate uti soleo. Altheæ radicem tritā ac angustissimo cribro excretā, adipe excipio ac appono. est enim medicamētum ad huiusmodi affectiones efficax. Sit autem adeps anserinus, si haberi poterit: sin minus, gallinaceus. At si hic quoq; defuerit, suillo utemur. Sed

& maluz agrestis ubique nascentis folia aliquo relato adipe subacta utiliter apponuntur, quæ si moderate fuerint cocta, crudis erunt præstantiora. Talia enim pharmaca locis iam præmolliis adhibita, citra mordacitatem ac tutō discutiunt.

De strumis, Leonide.

Cap. V.

Strumas appellant Græci choeradas, a porcis, in quorū gutture adenosī quidam tumores reperiuntur, strumis similes. Alij a multiplici partu porcorū nomen desumptum putant. Sunt autem strumæ carnes subcandidæ, faciliē augescentes, in membrana contentæ, & in summa, glandulæ induratæ, quæ in collo, sub alis, ac inguinibus oriuntur, ubi glādulæ uasis substratæ sunt. Aliquando etiam, sed raram rarō, ex carne eorundem locorum fiunt, quæ affinitate quadam ad strumarum naturam uertitur, & materiæ accessione augetur. Differunt strumæ inter se, magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, & uasorū complicatione. Magnitudine, quia aliæ paruæ, aliæ mediæ, aliæ magnæ, aliæ ingentes sunt. Natura, quoniam aliquæ mansuetæ, aliquæ malignæ cōperiuntur. Mansuetæ citra inflammationem, citra dolorem, moderatam duritiā habent. Neq; enim molles sunt uelut tubercula adiposa, Steatomata appellata, neq; duræ, sicut tumores indurati, sed mediā quandam tactus proprietatē habēt, & tumore circumscriptum, rotundum ac æqualem. Malignæ uerō strumæ inflammationes ac dolores pulsantes inducunt, & tumorem inæqualem præ se ferunt, in quo uasa prominent, & ad manuum cōtactum ac medicamentorum impositionē efferantur. Loco autem differunt, quoniam quædam in anteriore colli parte, quædam ab altera ipsius parte, quædam ab utraq; oriuntur. Quædam item statim sub cute superficiem habent, quædam circa magna ac nobilia uasa penitus insident. Ortu, quod quædam uelut eleuatæ, quædam insertæ oriuntur. Et eleuatæ quidem faciliē huc & illuc mouentur: insertæ uerō ad cōtactum resistentur. Multitudine, quia & una, & plures generantur. Vasorum complicatione, quædam enim uenas ac arterias implicatas habent, quædam omnino non habent: paruæ igitur strumæ facilius curantur quàm magnæ, & mansuetæ citius quàm inflammatæ. At uerō malignæ incurabiles sunt. Quum enim omnes huiusmodi strumæ canceratæ ac uasis refertæ sint, si eas per chirurgiam aggrediaris, sanguinis erupcionis periculum imminet supra hoc quod penitus insidentes, rescindi nō possunt. Vasa enim nobilia, uenas, uidelicet iugulares & arterias carotidas appellatas, maligna struma uelut radices habet. Verū pro loci ratione superficialē facilius curatur quàm profundē, deinde & quæ in collo oriūtur facilius curantur quàm reliquæ. Vocales tamen neruos in his diligenter uitare oportet. Multi enī strumas circa asperā arteriam secantes, uocalibus neruis simul rectis, hominem de cætero uoce priuarunt. Nā supra nerui resectionē, uocalia instrumēta denudata, & inter curandū perfrigerata, uocis actionē amiserunt: pro multitudine uerō, certū est unā facilius quàm plures curari posse. Sicut quātū ad ortū attinet, iōgē citius curatur eleuatæ, q̄ insertæ. Optima porro ac cōpendiosissima sanabilitū strumarū curatio sit per chirurgiā. Aegrū igitur prostratū decumbere oportet. Sedens enim faciliē animi deliquium incurret. postq; igitur decubuerit,

decubuerit, cruribus inter se copulatis caput a ministro deinceatur. Deinde cutis tumori incubens, recta uel obliqua sectione incidatur. Sectio enim transversa collo incommoda est, quia uasa & nervi recta porrigantur. Neque uno impetu tota cutis crassitudo dissectetur, nihil enim uolente fieri debet. Et in parvis quidem tumoribus simplex sectio fiat, in maioribus autem ad myrti folij figuram curam rescindens, tum uasa paulatim denudata sepones, quae quia naturali carne sint cadidiora, facile discernes, postea sectionis labia hamulis distendes, & pelliculas de struma tu manu, tum scalpello detrahes. Quod si incerta fuerit, attente res peragenda est, ne per incuriam sanguinis eruptio fiat, atque ea gratia unum tantum sectionis labium hamulis distendatur, & ita sensim a connexis corporibus per scalpellum separetur. Et ubi ex una parte connexa fuerint disparata, in altera idem fiat. Deinde tota basis diligenter, propter nervos & uasa substrata rescetur. At in strumis circa alas ac lingua oris, sectio transversa fit ob cutis reduplicationem, peracto opere si sanguis erumpat, medicamenta sanguine sistentia super relata adhibeantur. Sin minus, sectio thuris poliline expleatur, & linamenta indantur, & lana uino imbuta adalligetur, postmodum permissis ligamentis, locus uino, & oleo profundatur, & hoc usque ad tertiam aut quartam diem fiat. Deinde solvatur, & suppuratio procuretur, & curatio reliquis ulceribus communis fiat. Ad repurgandum autem, & incarnandum, ac cicatricem inducendam, theriaca efficacissima est. Caeterum inchoantes strumas, tum in pueris, tum his qui chirurgiam non admittunt, medicamentis dissolvere ac discutere conabimur, & sane curatio ipsarum similis est ei, quam ad induratos tumores paulo ante retulimus. Primum enim mollire, postea discutere oportet. Emplastrum ad strumas. Strigmata a palae strae parietibus dearsa ac probe subacta, super linteolo extendito ac imposito. Aliud. Laser aut calcem uiuam cerato cyprino aut irino exceptam imposito. Aliud. Sulphuris & galbani aequales portiones resina excipito. Aut elibani testam cum aceto terito, & uelut ceratum efficit. Aut corticem radicis maderagorae cyprino aut irino cerato excipito. Hoc equidem efficacissimum est. Aliud. Strumas erodens. Sandaracham cum adipe caprino aut bubulo, aut calcem cum eodem imposito, aut nasturtium cum cerato. Aliud. Succum cyrenaicum, aut si haberi non potest, laser cum melle attico ad cerati copagem illinito. Aliud. rumpes strumas. Pumex cum aceto tritus strumas rumpit ac ressecat. Aliud. Semen nasturtii & lomentum aqua subligito, & quotidie bis imposito. Et post eruptionem eodem usque ad exactam sanitatem utitur. Aliud. Vrticis semen cum uino tritum, rumpit, repurgat, incarnat, & cicatricem inducit. Aliud. Grossos praesertim caprisici cum axungia imposito. Omne enim tumorem discutit. Aliud. Recremetum ferri cum oleo, aut bdellium cum melle, linteolo inducito, ac adhibeto. Et quinque diebus transactis soluito, & spongi locum foueto, cauens ne oleo inquinetur. Oportet autem bdellium ad prunas cum melle subactum optime distendi, atque ita applicari. Aliud. Psyllij, lomentum, seminis urticae, partes portiones, pice liquida exripe ac utere. Aliud. Ostreorum testas uistas ac minutissime tritas inspergito, loco prius usque ex ore conspuito. Atque hoc frequenter facito. Emplastra etiam adhibeantur, quae paulo inferius descri-

bentur. At quod ex achate lapide praeparatur, ad suppurandum, rumpendum, ac persanandum commodissimum est. Item quod pardalis appellatur, superius ad hydropicos relatum. Strumis insuper laborantes uiperarum esu magnopere iuuantur, quemadmodum de elephantiacis diximus. Item si laser quotidie ieiuni ciceris magnitudine uorauerint. Alium etiam facile solubilem habere oportet, & tenui uictu uti, uisumque frequenter cicare, & pituita per os detrahere, ac caput resiccare. Cataplasmata quoque simplicia adhibenda sunt, quae medicos pusulas excitare possunt, uelut est capparitis radix cum polenta, ac reliqua huiusmodi. Smegmatis item ac puluillis eiusdem facultatis utendum est.

De Bronchocele, hoc est, gutturis tumore. Cap. vi.
Bronchocele appellatur tumor in gutture oris. Omnis enim tumor apud antiquos, cele nuncupatur. Nomen igitur commune est, sed species tumorum differunt. Quidam enim meliceris a melleo humore, quidam adiposus, quidam pultaceus, quidam canceratus appellatur. Aliquando etiam propter locale uasorum dilatatione oritur, quomodo frequentissime ex partu contingit, quum in uehementissimis doloribus puerpera spiritum uolenter detinuerit, constatque uasorum huius loci dilatatione incurabilem esse, quemadmodum etiam tumorem in scirrhum induratum, malignumque ac magnitudine ingentem. Verum reliqui omnes chirurgie ac medicamentis cedentes facile sanantur. Chirurgia uero praesenti tumori conueniens sit, siue meliceris, siue adiposus, siue pultaceus tumor fuerit. At uero quae gutturis tumores discutunt, sunt bdellium cum melle tritum, calx cum axungia, laser cum sulphure, lixiuum cum melle, stercus caninum cum aceto. Aliud. Calcem uiuam, ammoniacum, bdellium, testam elibani uistam, aeruginem, sulphur uiuum, paribus portionibus cum aceto terito, & axungia aut terebinthina excipito ac imposito. Aliud. Adamanthij, Gallarum unum, lapidis pyritae drachma, pyrethri drachma, nitri drachma, sulphur sesquidrachma, sandarachae drachma, terebinthinae drachma, ceram, piceis, singulis drachmae tres, axungiae ueteris drachma, aluminis liquidi uncia. Arida e uino ac sapa terito, & liquabilia liquefacta ammisceto, ac uisitor. Aliud. Spumae argenti, aeris uisitor, singulorum drachma, olei antiqui drachma centum, resinae pinus drachma, galbani, ammoniaci thymiamatis, singulorum uncia, aluminis scissilis, mannae thuris, singulis drachmae, oleum cum spuma argenti coquito, & medio cocturae tempore aes tritum inspergito, & bullire sinito donec non amplius inquinent. Deinde liquabilia liquata adijcito, & ab igne sublatis pollinem thuris ac alumen ammisceto, ac uisitor. Aliud. Silphij, similaginis, singulorum drachma, calcis uiuae drachma, sandarachae drachma, mellis quantum sanis est, praepara ac utere. Ad laxos autem tumores qui sub mento oriuntur, iridem illyricam cum aqua tritam, adiecta modica rubrica, ter singulis diebus illinito. Est enim medicamentum insigne.

De pultacei ac mellei humoris tumoribus, Leonida. Cap. vii.
Atheroma est tumor cocolor, citra dolorem, in tunica nervosa, humorem pulticule similem, quae ex farina coacta sit, & athera Graecis appellatur, continens. Aliquando autem una cum pultaceo humore, lapidosa quaedam duraque corpuscula, & alia tanquam sulphuris rameta reperiuntur. Aliquando uelut massa gallinarum ossicula.

Inueni

Inuenimus etiā aliquādo uelut pilos crassissimo humori cōplicatos. Philoxenus autē dicit se aliquando reperisse animalia in humore, culicibus aut muscis paruis similia. Est autē atheromatis tumor specie & figura oblōgus, sublatiusque, & ad compressionem digitorū, ob humoris crassitudinē, tardē cedens, & amotis digitis tarde reuertēs. Meliceris autē est pellicula neruosa tenui humore instar mellis referta, similiter citra dolorē consistens, differens ab Atheromate figura, & humoris essentia. Nā & figura rotundior est, & humoris essentia tenuior. Et huius tumor magis extēditur, & ad digitorū cōpressionē celerius cedit, & amotis digitis pari celeritate reuertitur. Ceterū p̄ chirurgiæ ratione nihil refert, siue pultaceus, siue melleus, siue feculentus humor, aut cuiuscūq; essentia fuerit cōtētus. Vnus enim scopus propositus est, ut tunica siue pellicula humorē continens auferatur. Sed id considerandū est, quod tumores quidam sunt eleuati, & ad motum ac contactū expositi, facileque curabiles. Quidā contrā inserti, & ad motū nō expositi, & in chirurgiæ aggressione summā diligentia expetentes, propter imminentes sanguinis eruptiones ac neruorū puncturas. Pleriq; enim chirurgi ob imperitiā etiam neruos substratos cum huiusmodi tumoribus recidunt. Chirurgiam itaque aggressuri, ægrum in sella locabimus. Et si paruus fuerit tumor, simplicem sectionem faciemus, uelut in strumis diximus. Si uerō maior, ad myrtei folij figurā pro tumoris ratione, cutē incumbētē rescindemus. Sed neq; hic uno impetu tota sectio fiat, ne pellicula humorē cōtinens disseccetur, & humor euacuetur. Si enim euacuatus fuerit, & tumor cōciderit, tunica difficulter excoriari ac curari poterit. Summa itaq; diligentia pellicula paulatim excorianda est, nihilq; de ipsa circa basim relinquendū, ne malū regeneretur. Post ablata pelliculā, labia sectionis cōmittimus, & si plus æquo laxa fuerint, redundantē cutem rescamus, deinde futuris labia cōnectimus. Illud porro animaduersione dignū est, ut si in capite huiusmodi tumor fuerit, post ablata pelliculā, membranam os ambientē secernamus, & caluariam diligenter deradamus. Peracto opere in paruis tumoribus, quū paruam sectionē fecerimus, nulla difficultas imminet, & statim post futurā, splenium glutinatoriū inflammationibus arcēdis idoneum adhibemus. Qui uerō adhuc cruenti sunt, & glutinari non possunt, in his ex maioribus interuallis futuras fieri oportet, ut oblōga sectionis figura fiat; deinde linamēta indere, & puri generationi studere, quemadmodū superius de abscessibus docuimus. At uerō ad eos qui chirurgiā recusant, medicamētis tumorē discutientibus utemur. Emplastrū ad Meliceridas, passarū uuarū uinacels exēptis lib. i. cumini leuissimē triti sexūcem, nitri quadratē. Omnia simul in mortario subacta adhibeto, ac adalligato. At si cōtiones ex cōstrictione remittere oportet, cerato excipito, ex oleo sicyonio & pauca mastiche præparato. Aliud ad meliceridas, & ceria, id est, fauos appellatos tumores, commodū. Squamā æris & pollinē paribus portionib. ad malagmatis formā subigito ac adhibeto. Aliud, ad meliceridas & steatomata. Cerae, terebinthinæ, squamæ æris, sing. sextatē, sulphuris uisui, nitri, sing. unc. i. radicū siccarū cannabis syluestris dra. x. xv. Et si defuerint, Aristolochiæ tantundē, olei antiqui

lib. i. Radices per triduum aqua madefactas & conculas in oleo coquito, donec torrefiant. Deinde ipsis abiectis, cætera quæ liquari debēt liquata ammisce-to, & arida ex aceto trita adijcito, ac utitor. Aliud discussoriū ad Meliceridas. Salis ammoniaci, spumæ argēti, cerussæ, sing. lib. i. ceræ, terebinthinæ, galbani, opopanacis, sing. unc. i. rubricæ sinoplicæ sexuncem, aceti heminā, olei antiqui lib. iiii. Spumā argēti, cerussā, & sal leuissimē trita in oleo coquito, deinde rubricā aceto tritā adijcito, & liquabilia liquata affundito, omnibusq; simul subactis ac perfrigeratis opopanacē ac galbanū aceto dissoluta ammisce-to ac utitor. Aliud ex asellis paratū, ad strumas, & meliceridas, quod etiā cicatricē inducit. Asellos subhydrijs stabulātes ducētos, ostreorum ustorū drac. iiii. rubricæ sinoplicæ drac. viii. terebinthinæ lib. i. ostrea & rubricā primum seorsim, deinde simul terito, & tū asellos adhuc uiuos adijcito, ac simul terito, & postea cum terebinthina ad calidū cinerē lente coquito, donec non amplius inquinet. Sublatūq; ab igne medicamētum in mortario subigito, ac adhibeto, & quinta die exoluto, potest tamen locus subinde prolui ac rigari aceto.

De steatomatibus, hoc est, tumoribus adiposis.

Cap. viii.

Steatoma est tumor præter naturā, adipē in se cōtinens, mole cōcolor, & tactu lenis, & in principio quidem pusillus, sed tēporis progressu ampliatur, plerq; uerō steatomata basim habēt ampliorē, raroq; contingit, ut basis angustior, & apex amplior reperiat. Differt à struma, tactus mollitudine, qua nota etiā à meliceride & atheromate discernitur. Curatur & hic p̄ chirurgiā, sectione p̄ tumoris magnitudine fiēte, simplici aut ad myrtei folij similitudinē, atq; hic libere cutim incidimus. Nō enim sicut in atheromate ac meliceride tunicae sectionē formidamus. Nā pinguedo adiposa etiā si secetur, non effluet. Verū illud negligendū non est, quod in strumis quoq; prædiximus: si steatoma eleuatū fuerit, in circuitu & subter excoriari oportere. In circuitu per scalpellū, subter uerō, digitis. Insertū uerō in ambitu & subter incidendū esse, peracto opere uulneris labia futuris cōstringantur, ut melius glutinētur. Aut linamēta profunda indantur, & curatio ad puris generationē adhibeatur. At uerō si steatomata apicem amplum, & basim angustam habuerint, missis superuacuis, tota à basi rescindemus. Hic enim chirurgiæ modus expeditissimus est, & ulcus parū ac planum fiet, & curatio cōpendio transigetur. Cæterum steatomata discutuntur, floribus buphthalmi, cera & oleo antiquo exceptis. Idem facit & cyclamini radix axungia ueteri excepta, possunt & emplastra ad meliceridas præscripta adhiberi, præsertim quod ex sulphure & nitro paratur, & similia inferius referēda.

De ganglio, Philagrii.

Cap. ix.

Gangliū est nerui nodosa coactio ac tumor, ex plaga aut labore obortus, raroq; spōte proueniēs, manū iuncturas, ac talos frequētius occupans, rarius cubitū & caput. Fit & in alijs partibus. Quantū ad notas attinet, tumor est inæqualis, paruus, dū cōprimitur, stupidum sensum exhibēs. Differtq; à meliceride & atheromate tumoris inæqualitate & renisu, & quod nō orbiculatim uelut illa trāsferitur, sed dextrorsum solū ac sinistrorsum pro nerui situ flectitur. Ceterū à

Q gangliorum

gangliorum chirurgia abstinemus, præsertim si in manibus fuerint ac pedibus, & medicamentis tantum curamus. Ad hanc rem ammoniacum iuxta ignem ad emplastrum copaginem emollitum imponitur, & lamina plumbæ tumori æqualis supponitur, & ne hinc & inde labet, arctis uinculis media cōstringitur. Transactis aliquot diebus ubi ganglium fuerit emollitum, nulla rei mentione ad ægrum facta, statim dum adhuc calet locus, uincula tollimus, & pollicem dextræ manus ganglio immittimus, ac reliquos quatuor digitos ipsi parti injectos cōprimimus, & ganglium cōfestim dissoluitur. Vtere etiā mollitorijis emplastris, præsertim eo quod ex pŷllio, pice, masticha nigra, stercore columbino, & malua syluestri præparatur. Vtere & Lucij malagmatis ad cōtractos articulos descriptis. Commodum est etiā hoc. Cerussæ, olei antiqui, resinæ pinus, sing. lib. i. ceræ sextantē, ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. unc. i. Cerussam cū oleo coquito, donec non amplius inquinet: deinde ammoniacum tritum, postea resinam & cerā. Postremum galbanum præmolitum adjecto. Alij resinæ quincuncem, ceræ autem tridentem cōiungunt.

De uasorum dilatatione.

Cap. x.

Vasorum dilatatio, quàm aneurysma Græci uocant, in qualibet corporis parte fit, sed in gutture frequentius, ubi tumorem branchocelā appellatum producit. Accidit sæpissime mulieribus in partu, propter uolentiam spiritus detentionē. Sed & in capite circa arteriarum locos, & in reliquo corpore, ubi arteriæ uulnerantur. Sicut quādo imperiti medici uenā cubiti secant, simul subiectā arteriā diffecant. Oritur autē omnino uasorum dilatatio, aut dū sanguis & spiritus ex arterijs persulfant, aut dū oscula ipsarum aperiantur, aut dū rumpuntur. Sanguis autē & spiritus paulatim excreti sub cute colliguntur. Notæ aneurysmatis sunt, tumor paruus, aut magnus, concolor, citra dolorē, ad tactum mollis, spongiosam laxitatē præseferens. Et ita ad digitorum cōpressionē cedens, ut promodum euanescere uideatur, uerū amotis digitis citissime reuertens, id quod in menti aneurysmate, & reliquis quæ sine uulnere fiunt, præcipue uidere datur. At ubi arteriæ uulnus præcessit, & deinde coalescente cute uasorum dilatatio accessit, tumor non similiter mollis occurrit. Sanguis enim copiosior spiritu est, qui in grumos coit, & tumorem extēdit. Atque hæc quidē sunt notæ. Quātum uerō ad curationē attinet, sciendum deplorata esse aneurysmata apud chirurgos, quæ gutturi aut capiti accidunt. Simul enim cum aneurysmatis sectione, abundantissima sanguinis eruptio cōtingit, cū qua etiā uitalis spiritus simul erūpit, ut homo sæpe in medicorum manibus deficiat. At uerō quod in cubiti cauitate sit aneurysma, hoc modo per chirurgiā aggredimur. Primum arteriā superne, ab ala ad cubitum, per internā brachij partē delatā signamus: Deinde in eadē interna brachij parte simplicē sectionem, tribus aut quatuor digitis infra alam, per longitudinē facimus, ubi maxime ad tactum arteria occurrit, atque ea paulatim denudata, deinceps incubentia corpuscula sensim excoriamus ac separamus, & ipsam arteriā cæco uncino attractam, duobus fili uinculis probe adstringimus, mediamque inter duo uincula diffecamus, & sectionem polline thuris explemus, ac linamentis inditis cōgruas deligationes adhibemus. Postea uerō tumorem in cubiti cauitate siue flexura, securi secamus, nihil amplius ue-

rentes sanguinis eruptionē. Tunc grumis euacuantis, arteriā unde sanguis prodijt perquirimus, & reperi tam undino attractam sicut priorē cōstringimus ac diffecamus, rursusque thuris polline sectione expleta, puris generationē procuramus. Cæterū ad gutturis aneurysmata, emplastrum e cupresso inferius inter difficultoria medicamenta describendum cōmode adhibetur.

De cerijs, hoc est, fauis.

Cap. xi.

Cerium tumor est ulceratus, incumbens cuti perrodens, ita ut ex foraminibus melleus humor excernatur: quapropter tū ob foraminū figurā, tum propter excreti humoris speciem, cerium, hoc est, fauus appellatur, frequenter autē in musculosis locis, in articulis, & plantis pedum oritur. Sæpe etiā sextā colli uertebra occupat, & aliquādo etiā costas inuadit. Si uerō in capite generatur, primum reliquis partibus, deinde caluæ etiā putredinē transmittit. Proinde in principio subscripitis medicamentis curationē tentabimus. Quibus superatis partes corruptas præsertim in capite rescare oportet, deinde membrana caluæ ambiente diffecata, os caluæ deradere, tum ferreis cauterijs labia sectionis exurere, ita ut caluā ne attingamus, id quod etiā in alijs diuturnis affectionibus fieri debet. Postea medicamenta ad nomas descripta adhibenda sunt. Quale est siccū ex charta usta præparatū, & pastillus e lana succida, ac reliqua huiusmodi. Lenticulā quoque coctā, cum malicorio aut oliuæ folijs imponemus. Sedata autē noma, curatio reliquis ulceribus cōmunis fiat. At uerō incipientibus fauis cōmoda hæc sunt. Sulphur & ordeï farinā aqua mulsa coctā imponito: aut adipis suilli, terebinthine, & mellis pares portiones ad cōgruā compagē coctas adhibeto. Ac ubi aperti fuerint, sulphure uiuo cū pice liquida utitor. Aut erui farinā cū melle impone. Aut squame aeris, pollinis thuris, passerum uuarum, pares portiones simul tritas adhibe. Ad ampliores autē fauos ficus probe tritas apponito. Ego uerō lenticulā coctā, cum malicorio, ac melle subactā imponere soleo, & si inflammatio adsit, modicum panis adjecto. Sedata uerō inflammatione, malagma Helladicum, aut emplastrum melinum Serapionis, aut Pasionis, aut Venus appellatū, adhibeo. Molliora autē adhibenda medicamenta esse oportet, propter molestias ex duris oborientes. Si itaque durius fuerit, cū oleo emolliendum erit.

Emplastra ad cruenta uulnera glutinanda, et ad multos usus commoda.

Cap. xii.

Atractylis, quā aliqui Androsæmon uocant, herba est aculeata, humorē sanguineum reddens, si folia eius cōprimantur. Hæc radicitus euulsam & in umbra siccatā terito, & angustissimo cribro excernito, & de ea accipito trientē, colophonis sesquilibram, olei dulcis trientē, æruginis sextantē, ceræ bessē. Oleum, cerā, & colophoniam liquesfacto & excolato, deinde æruginem, & postea herbā tritā ac cribratā adjecto, tū omnia simul in frigida aqua cōlecta manibus subigito, & in eadē frigida per totā noctē sinistro, ac deinceps ad cruenta uulnera in quacūque corporis parte reposito, siue in infantibus, siue in adultis fuerint. Facit & ad ulcera antiqua, sectiones, ictus, sugillata, & ex frigore dolores. Exerit crustas & cætera quæ in ulceribus difficulter repurgantur. Lepras itē ac uirilgines curat. Etenim femur cuiusdā ense dissectum, ita ut uulnus usque ad inguē penitissimē progrediretur, quum per quatuor menses æger decubisset, neque glutinationis initium appareret, hoc ego medicamento agglutina-

glutinaui. Tibiam præterea alterius à poplite usque ad talum uulneratâ, inflammatione prius mitigata, cū cataplasmate ex lomento passo, uino mulso, & rosaceo, intra paucos dies perfunctus. Ego uerò inquit Philagrius, cum Iride emplastro antiquos sinus, nō inflāmatos, & repurgatos, ac uino mulso elotos, ad uires uidelicet excitandas, feliciter curauit. Illud uerò constat, fistularū sinuumq; ligamēta, à superioribus partibus ad inferiores moderata cōstrictione ducenda esse, quō humores in cauitatibus delitescētes, ad osculum ulceris exprimantur. Viride Andromachi hecatōto drachmō uocatū. Ammoniaci thymiamatis drac. viii. squamæ æris drac. xii. pollinis thuris drac. xvi. resinæ pinus drac. xii. adipis uituli drach. xiiii. terebinthinæ drach. viii. ceræ drac. xxx. olei drac. viii. aceti quātum satis est. Hoc magna uulnera glutinat, sordida ulcera extergit, crassaq; ipsorū labia deterit, sinus contrahit, discussoria ac repulso-riam uiriū habet. Et cū cerato linamentis illitū ac inditum caua ulcera incarnat. Viride quod Idis appellatur, à quibusdam Hermoni sacerdoti inscriptum. Hoc ad multos usus cōmodat, & ad omnia uulnera, præcipue capitis unā cum ossibus dissectis. Sanat enim citra destructionē ac perforationē: facit etiā ad puncturas, aculeos infixos, hominū ac canum morsus. Ad uiperæ itē ac scorpionis, draconisq; marini ac pastinacæ uenena. Et ad artuū fracturas cum uulnere, citius enim ac securius callū obducit, facit ad fistulas omnes recentes, & antiquos ipsarū recessus, sinus, tubercula, parotidas, mammarumq; ac aliarū abscessus, aut ut ne fiant, aut ut facti curesur, cōmodum sanietis effluxum nobis procurantibus. Idē strumas auferit cum tunica celerrimē suppurans: fronti uerò impositum fluxiones oculorum sistit. Liures delet, gangrænas obliterat, putredines repurgat. Et in summa efficax est medicamentū ad omnia. Ceræ drach. centū, colophonis drac. ducentas, aliq; centum, squamæ æris rubri, æruginis rase, aristolochis rotundæ, thuris, salis ammoniaci, thymiamatis, æris uisti, singul. drac. viii. aluminis uisti dra. vi. aloës, myrrhæ, galbani, singul. drach. xii. olei antiqui lib. i. uel sexuncē, aceti quātum satis est. Atq; hoc quidē em-
plastrum absolute Idis appellatur. Verūm Idis quæ Epigono inscribitur, etiā radicis dracūculi dra. viii. recipit: qua Galenus se uidet. Sola enim dracūculi radix per se tusa ac probe trita ad puluilli formam, maligna ulcera curat. Metallica igitur cum aceto in mortario terito, & deinde reliqua trita ac cribrata adiecto, & liquabilia liquata ad ipsa in mortarium affundito, subigito, ac uncto, & uictor aliquando puro, aliquando mixto ac dissoluto. Ad ulcera enim sordida adhibetur medicamenti pars una, cerati uerò rufacet liquidi partes duæ. Verūm ad ea quæ modica extersione opus habent, medicamenti pars una, cerati partibus tribus ammiscetur. Emplastrum Machæronis celebre, & ad multa cōmodum. Congruit ad relata omnia. Sed & recēta uulnera glutinat, & ab inflammatione iuuatur, & præsertim quæ cōiuncta sunt, facit & ad canis rabidi morsum spadon fore loco impositum, & alidue permutatū, facit ad omnē nomen ac ulcera depascētia, & ad aurū ac pudendorū ulcera. In ossibus autē denudatis carnē auget. Cōpetit & nariū ulceribus. Uulnuitur autē rosaceo. Aristolochiæ rotundæ, galbani, æruginis rase,

opopanacis, tridis illyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, singul. drac. viii. terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorū septuicē, & uncia dimidiū. Olei dimidium cū ærugine terito, & reliquū cū cera ac terebinthina coquito, opopanacē autē cum aceto dissoluto, & simul subigito omnia, ac uncto. Emplastrū Cephalicū ex herbis, sine perforatione: squamas disparat, & ossa corrupta educit. Verū ossibus præstis adhibere oportet. Idē ad recēta uulnera facit, & nomas linamentis indita repurgat. Cū rosaceo uerò cerato replet, una eius parte, ad duas cerati ammixta, facit & ad carcinomata ac putrida ulcera. Exterit lepras, furunculos dissoluit, strumas suppurat, & expurgat, cōuenit podagricis, & tophaceas ipsorum duritias dissoluit. Anagallidis ceruleum florē habētis, papaueris corniculati, foliorū tenerorū hyoseyami, marrubij uiridis, singulorum drachm. i. vi. squamæ æris rubri drach. x. v. mannæ thuris drac. x. resinæ pinus siccæ drach. x. vi. aloës drachm. vi. aluminis scissi, & rotundi, ammoniaci thymiamatis, salis ammoniaci, singulorum drachm. iiii. ceræ drachm. centum, olei ueteris heminas duas, siue uncias xxiiii. aceti quantum satis est. Herbarum folia in pila leuiter tundito, ut succus nō exprimatur, deinde in mortarium coniecta minutissime terito. Et in alio mortario, squamā, pollinē thuris, resinam pinus, alumen, aloën, salem, & ammoniacum thymiamata, ad solē ad strigmentitiā spissitudinē cum aceto terito, & ammixtis herbis, omnia simul terito. Liquabilia deinde liquata frigefactaq; ac crasa adiecto, subigitoq; simul ac uictor. Emplastrum Hestis, id est, Vesta appellatum, quod etiā ex Græci nominis literarum calculo, drachmarū dxvi. inscribitur, & ad Nechephonē regē refertur. Conducit ad omne uulnerū genus. Ad neruorū puncturas per se sufficit, omnē oculorum destillationē pro glutinamento appositū reprimit. Venenū uirus eiactantiū bestiarū exugit, ita ut emplastro adhærens cōperiatur. Nomas itē & fistulas ac ulcera maligna repurgat, & ad cicatricē perducit. Nariū ozænas sanat cū aceto, facit & ad strumas, & tumores induratos. Aut enim discutit ipsos, aut rūpit, ut admireris. Varies sanat, sagittas & aculeos extrahit. Spumæ argenti, ceræ, singulorū drach. lxxiiii. terebinthinæ dra. xvi. Aristolochiæ, propolis, galbani, singulorū dra. xx. æruginis dra. x. gallarū, radicis chamaeleonis nigri, singul. drac. x. olei sextar. iiii. adipis uitulini dra. xlviii. aceti dra. x. succi brasice dra. viii. serapiadis tritesticularis dra. xvi. succi medullæ arundinū dra. xii. oleū, spumā argenti, & ad ipsa simul coquito, donec probe unīatur. Deinde cerā, resinā, galbanū, propolim prius cū modica cera in mortario tusam adiecto, & ab igne ablatis, aristolochiā, gallā, radicem chamaeleonis addito. Aeruginē uerò cū succis & aceto trita reliquis, ubi ita tepuerint, postremum ammisceto, omniaq; simul in mortariū cōiecta subigito ac manibus emollito. Et utere tanq; admirando. Aliud ad cruenta uulnera glutināda, purpura inscriptū. Spumæ argenti, olei dulcis, sing. lib. ii. picis, ceræ, colophonis, sing. unc. xvi. radicis symphyti minutissime tritæ ac cribratæ sextantem, sanguinis draconis sextantem, aquæ marinæ un. xx. oleum, spumā argenti, & aquam marinā simul coquito, donec nō amplius inquinēt. Deinde liqua-

bilis liquefacta adijcto, & ab igne ablatis draconis sanguine ac symphytum addito, & perfrigerata manibus subligito, ac in massas efformato. Cæterum sanguis draconis in India ex herba dracunculo appellata colligitur. Phoenicium, Galeni. Spumæ argenti leuissimè tritæ libras tres, adipis suilli insulsi, anisiquil, libras duas, olei antiquissimi libras tres, chalcididis crudæ tritentem. Spumâ argenti tritam, ac cribratam, rursus cum chalcitide in mortario exquisitissime conteres. Deinde oleum in sole ammisceris, ut liquidum medicamentum permaneat. Tum adipem exëptis fibris in mortario tulum, quod facile liquefact, ad ignem liquefacto, & excolato, donec purissimus euadat. Atq; eius ita præparati lib. ii. in mortario diligenter cū cæteris permisceto. Deinde omnia simul in cacabum transfusa coquito, ac palmæ ligno agitato. Suffidet autem tibi ramus unus magnus, ut crassiore eius parte ad agitationem spatulæ ulce utaris. Adherentes autem crassæ eius parti ramulos utrinq; exortos resecabis, & corticem detrahes, & in tenues partes cōcisos in medicamentum cōijctes, ut ibi succus ipsorum excoquatur. Hæc uerò segmenta palmæ, tū demū inijctes, ubi medicamentum cerato simile cōpagē habuerit. Si enim à principio inieceris, succus per decoctionem cōsumetur, quæ ob uisum adstrictoriā permanere uolumus. Sed & ipsius spathæ qua pharmacum uersatur pars infima in coctura arefacta, resecanda, ac abijcienda est, ac residua utēdū, atq; hoc sæpe faciendū est, ubi fuerit resiccata. Vbi uerò pharmacum non amplius inquinari, priusquam exarescat, ab igne tollatur, & exemptis omnibus rami segmentis agitur, donec frigeat. Deinde in mortariū trāslatum, ac manibus subactū, in massam redigatur. Hoc ad cruenta uulnera, & ulcera ægre cicatricē accipientia uisumur, & oleo dilutū in sinus fundimus. Cōuenit partibus omnibus inflāmatīs, & podagris, quo tempore dolores nō uehementer urgent, & irrigationibus ac fomentis mitigantibus opus est: facti ad inguinū tumores, tubercula, ambusta, perisiones, cōtusa, fracta, & omnes fluidas affectiones. At uerò si chalcididis sexuncē inieceris, longè efficacius fiet ad ampla uulnera glutinanda, & ad cicatricem inducendam. Sed non ita inflāmatīs conueniet. In dissoluedo uerò pharmaco, hanc proportionem seruabis, ut medicamentum paululum olei quantitatem excedat, præsertim æstatis tempore, ut sit medicamentum quiddem dextans, olei uerò dodrās. Emplastrū duplicis coloris. Aeris uisū quadratē, aluminis scissi unc. i. colophonis, adipis suilli recentis, ceræ, singulorum lib. i. aceti quantum satis est. Emplastrū ex aqua & oleo. Spumæ argenti, olei sincerī, aquæ puræ, singulorum lib. ii. Argenti spumâ cum oleo, & aqua in mortario exquisitissime terito, deinde ad prunas assidue uersata, coquito, donec non amplius inquinent. Hoc moderate refrigerat, & ideo partibus ulceratis nihil influere sinis, & quod iam influxit, repellit. Desiccata ac discutit, & ulcera ad cicatricē perducit. Uisumur eo ad mulierū, infandū, eunuchorū, ac cætera corpora, quæ molles ac albas carnes habent. Efficitur autem adeo glutinosum, ut ne ablutū quiddē detergi possit. Sed ulceribus cicatrice includendis præcipue cōmodum est, ut adhibitu multis diebus adhærere. Cuius facultatis est, & parhygrum appellatum, & reliqua huiusmodi. Emplastrum ex uino & oleo.

Spumæ argenti lib. i. uulni & olei, singulorum lib. iii. Spumam argenti in mortario sub caniculæ ardore per dies quindecim cum uino antiquo dulci terito, tantum uini instillado, quantum exicari potest, & post prædictos dies oleū ac uinum affundito, & coquito simul assidue agitando, donec nō amplius inquinent, & uisitor. Hoc ego medicamentum oleo dilutum ad ulceratas affectiones adhibui, & sinus glutinatus. Et femur diu induratum perlanui, & optimum etiam ad uulnera cruenta cognoui. Ad sinus uerò & duritias solidū, prout habet, imposui. Emplastrum ex aceto & oleo. Spumæ argenti libram i. olei antiquissimi libras tres, aceti albi acerrimi libras tres. Ad lentum ignem assidue uersatu coquito, obseruas ne in grumos cōeant, & per integrum diē ebullire sinito, donec nigrescat, ac splendeat medicamentum. Entendum est autē ut reuera non inquinent, facile enim imperitis imponit. Nam in frigida aqua diffusum, durissimū statim euadit. Sed postea diglatis diutius subactum remollescit, læguetq; ac rursus inquinat: proinde nō prius ab igne remouebis, donec cōpertum habueris, nō amplius inquinaturum. Habet hoc summas exiccandi uires, & ideo cruenta uulnera glutinat. Ulcera curatu difficilia, & fistulas incipientes sanat. Ego enim cū cō fistulâ pueri à parotide exortam sanauit, quæ semestris existens, usq; ad mandibulæ articulationē progressa fuerat. Sed & mulieres & adolescentulos eodē curauit, & induratos musculos emolliuit. Tribus autem diebus trāsactis soluere hoc oportet, & nouum adhibere, idque rursus post triduum exoluere. Emplastrum Galeni fuluum, Harmonia appellatum, supra ad maligna ulcera descripsimus. Emplastrū fuluum Piscatoris, ad cruenta uulnera, sinus glutinat, inflammationes sedat, duritias ac firmas discutit, plurimo rosacco dilutum caua ulcera replet, sordida extergit, & ad cicatricē perducit. Spumæ argenti sesquilib. ceræ lib. ii. galbani, celsi, terebinthinæ, propolis, pollinis thuris, rubricæ, singul. sextante, olei lib. ii. aceti lib. iii. Spumâ argenti ad æstium solēcum aceto terito, quantum imbibere potest. Deinde oleo ac reliquo aceto affusis simul coquito, donec nō amplius inquinent, rum liquabilia liquata & excolata inijcto, & postea ab igne ablatis pollinē thuris, rubricæ, ac galbanū ex aceto tritum adijcto, omniaq; simul subligito. Et demū frige facta ac crassa manibus mollior, ac uisitor. Hoc ad sinus glutinados efficacissimū est, ita ut spōgia ex uino expressa superimponatur. Aliud fuluū piscatoris, facti ad cruenta uulnera, & concisos neruos. Itē ad antiqua ægre recipienda cicatricem ac fluida ulcera, probē euā emolli, præsertim duritias circa mamas exortat. Uisumur eo & ad hominū & canum morsus. Egregiē facit & ad pastinacarum marinarū, & draconū, & aliorum horrendorum piscium plagas. Et in summa est cōposito admiranda. Spumæ argenti, ceræ, singul. drac. ætium, terebinthinæ, mannæ thuris, galbani, rubricæ sinoplicæ, singul. drac. vii. olei lib. ii. præpara sicut diximus, absq; tamen aceto. Aliud piscatoris celebre. Spumæ argenti, ceræ, sing. drac. terebinthinæ, myrris, minij sinoplicæ, æruginis rase, squamæ æris, sing. drac. vii. aristolochiæ drac. vii. thuris drac. x. xvi. diaphrygi drac. vi. ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. drac. ii. olei lib. ii. Aliud Tyrium. Ad ampla uulnera & qua

& quadrupedū morsus, surūculos discutit aut rum-
pīt, humorē ex crustis Inductis extrahit, & ad cic-
atricē ducit, frondi impositū oculorū fluxiones repri-
mit. Hoc post cocturā purpuræ tyriæ colorē habet,
atq; hinc appellationē traxit. Spumæ argēti, libr. v.
æris usti, squamæ æris, æruginis, galbanī, sing. trien-
tē, ceræ lib. ii. resinæ pinus pinguis lib. iiii. olei lib.
vi. Spumā argēti, & oleū in mortario simul probē
trita, in ollā confecta coquito, & assidue uersato, do-
nec mellis cōpagem acquirāt. Deinde adiecta erugi-
ne, & squama ebullire finito, & postea æs ustū ad-
dito, & simul coquito, donec bonus color euadat,
& nō amplius inquinēt: tunc cerā, ac resinā excolata
adijcto, ac rursus coquito donec non inquinēt, &
postremū ab igne ablati galbanū ammisceto, ma-
nibusq; probē subigito, ac utitor. Emplastrū ex ane-
mona. Colophonizæ drac. lxxiiii. resinæ pinus li-
quidæ, ceræ singul. trientē, olei dodrantē, florū ane-
mones recētum, exēpto nigro quod in eis reperit-
tur, & recisis unguibus besselēm. Colophoniam cum
oleo ad lignorum pini ignē coquito, & tēdacea spa-
thula usq; ad solidā compagē agitato, deinde resinā
adijcto ac rursus coquito, donec nō amplius inqui-
nent, & postea cerā addito, qua liquefacta medica-
mētum ab igne tollito, & ad flores in mortario tri-
tas diffundito, manibusq; oleo illis subigito: est e-
nim glutinosum. Aquā autē uisitare oportet, facit ad
cruēta uulnera, & carnes contusas, ad maligna anti-
qua exuberantia ac ægre cicatricē admittentia ulcera.
Aduenenū ei aculātū bestiarū ictus. Ad tumidos, in-
flāmatos, dolētes ac egre mobiles articulos. Ad stru-
mas, fistulas, gāglia, steatomata, surūculos, sinus, no-
mas, abscessus tū aliarum partiū, tum maxime tho-
racis. Ad eruptionē sanguinis nariū, splenū ex eodē
stomacho imponitur, potest & ad frontē imponi. Et
in summa, mollit, discutit, contrahit, siccāt, ac dolorē
mitigat. Quodd si cū aceto præparare malueris hoc
medicamentū, ita facto, flores anemones recisis un-
guibus purgatos, & ad solē siccatos, in uitreo uase
seruato, & eorū postea besselēm sumito, & acetū albi
acerrimi heminas atticas tres affundito, ac per diē ac
noctem macerato, deinde manibus subigito, paula-
timq; omnē succū exprimito. Et colophonizæ ludi-
dissimæ drac. xlii. resinæ pinus liquidæ, ceræ, olei,
singul. trientē, succi anemones heminas Atticas duas,
& dimidiā accipito. Et colophonizā cum oleo ad tæ-
dæ lignorum ignē lētem coquito, tēdaceaq; spathu-
la assidue agitato, donec solidius pharmacum eua-
serit. Deinde resinā paulatim adijecto, ne ebulliens
extra ollā redundet, & rursus bullire finito, & ubi
tā planē solidū uideris, cerā addito, eaq; liquata me-
dicamentū ab igne ablatū spathula uersato, atq; ubi
tā deferbuit, succū paulatim instillato, diligēter ob-
seruādo ne efferuescat. Facile enim ebullit, ut pericu-
lū sit, ne superfundatur. Postq; autē ita paulatim am-
mixtus fuerit, uariū purpureū ac suauē colorē phar-
maco affricat. Omni igitur succo Insecto ac unito,
medicamentū in mortariū transferatur, atq; frige-
factū manibus subigatur, donec totus succus secedat.
Hoc ad eadē cōmodū est, ad quæ illud prius recētū
florū pharmacū cōducit, Nisi q; leuius est, ac magis
tēperatū, & ad canū morsus, ac uenenatorū ictus cō-
modū. Idē rosaceo dilutū ad anī ac pudēdorū ulce-
ra cōducit, ubi remissione medicamēto opus habet,

Emplastra Cephalica, & ad fracturas, & ad mul-
ta commoda. Et de iusto eorum usu. Cap. xiiii.
Cephalica, hoc est, capitalia, emplastra dici solent, quæ
uulneribus capitis adhibita, uim penetrādī in alium
habēt, squamasq; ac ramenta ossiū disparata, nō so-
lum in capite, sed etiā reliquo corpore educūt, ac ex-
trahūt. Itaq; acrimoniā quandā ipsis insitā esse oport-
et, per quā ex profundo extrahūt ad superficiē ex-
ternā, non solū ossa, sed multo magis crassum uisco-
sum, aut omnino uitiosum humorem. Quæ uerō ad
fracturas fiunt, extensoriā ac discussoriā uim habent.
Quidā uerō etiā adstringentia ipsis ammiscuerunt,
ut quod ad affectas partes influit repellatur, & exter-
soriorū uis usq; ad profundū deducatur. Verū hoc
nosse expedit, quodd si adstringentia nō ad lanuginē
minutissimā trita fuerint, atq; hoc cū aceto, dampnū
magis quā utilitatē afferent, si attractorijs fuerint
ammixta. Sed & hoc scire oportet, quodd inter em-
plastra ad fracturas præstantiora sunt, quæ capita-
lia inscribuntur. Et propterea cū cerato præsertim ro-
saceo, incarnare solēt, linamentis excepta, ac indita.
Eiusdē porrō generis cū cephalicis est. Iis quoq; su-
perius descriptū emplastrum, & quodd Machæroni
inscribitur, & Barbarū Hierē Cappadocijs, quodd a-
liqui Aphrū appellāt, hoc. Emplastrū nigrū, ad insi-
gniores præsertim capitis dissectiones, fistulas, sinus,
fracturas citra inflātionē glutinādas, ad neruos,
chartilagines, ac ossa cōcisa. Facit & ad ulcera profū-
da, sinusq; magnos glutinat. Adhibetur etiā cōmo-
dē abscessibus dissectis ad saniet educationē. Spleni-
cis etiā, ac hepaticis cōducit. Et est ad cruenta effica-
cissimū uulnera. Ad sanguinē reijciētes duobus co-
rijs inducitur, quorū alterū pectori, ac costis impo-
nitur, alterū dorso. Sanguinē em supra opinionē si-
sit. Facit & ad hominū, ac canū morsus. Et omnino
inflāmationes arcet. Ceræ, picis, bituminis, resinæ
pinus, sing. lib. i. mannae thuris sexūcē, cerussæ, atra-
mētī sutorij, sing. trientē, opopanacis sextācē, olei, a-
cetū, singul. lib. i. Cerā, bitumen, oleū, acetū, modico
ex eo relicto, omnia simul in ollā nouā indito, ac li-
quefacto, deinde picē, & resinā probē cōpūsa adij-
cito, & omnibus semicoctis, & ab igne remotis, ac
excolatis, atramentū sutorij modico aceto residuo
tritū inspergito, & ne efferuescat caueto, atq; iterū le-
niter coquito, ac uersato. Vbi uerō nō amplius in-
quinat pharmacū, opopanacē residuo aceto macera-
tū ac dissolutū affundito. Et postea cerussam ac mā-
nā probē trita inspergito, & paululū tepefacito, ut
uniantur, cauens ne opopanax aut manna cōbura-
tur. Atq; ita medicamētū in mortariū diffundito, ac
frigefieri finito, emollito, reponito, ac utitor. Hoc
omnia uulneraria medicamēta superat, uelut experi-
mentis cōstat. Est autē hyeme p septē dies, æstate per
quinq; aut re ita urgēte, per tres exoluēdū. Nigrum
insigne ad multa cōmodū, Panalethes appellatū. O-
lei dulcis dodrantē, bituminis, ceræ, resinæ pinus sic-
cæ, picis, singul. lib. i. spumæ argēti, cerussæ, ærugis-
nis, singul. drac. x. ammoniaci thymiamatis, thuris,
aloēs, myrrhæ, singul. drac. viii. opij, succi malorū
mādragoræ, sing. drach. vi. aluminis scissi, atramētī
sutorij, chalcididis, croci, singul. dra. iiii. acetū quātū
satis est. Omnia spuma argenti usq; ad crocū, probē
ad strigmentitiā spissitudinē terito. Deinde oleum,
& bitumē ad fabarū magnitudinem cōtusum, &
ceram

ceram simul liquefacto, eisdē liquidis picē, ac resina-
nam adijcito. Et hæc liquata, ac excolata rursus co-
quito, & trita adijcito, subigito ac utitor, facit hoc
ad uulnera recensita, ad ensium, sagittarū, ac lancearū
puncturas, ad fracturas item, ac contusiones, siue cū
uulnere, siue sine uulnere fuerint. Vtere & ad ner-
uos uulneratos, ad canum, luporum, urforū, leonū,
aprorum morsus, facit & ad uenenum elaculātum,
& præsertim ulperarum ictus, loco prius scarifica-
to, & inde medicamento imposito. Idem apponitur
ad abscessus simplici sectione diductos, & sanie ex-
clusa. Vulnere, ac ulcera repurgat. Et quosdā uerte-
bris, ac talis fauciātos per sanauit. Ego uerō manum
aliscus ense inter ulnā, & radium uulneratā, eo cu-
raui. Cōfert & ad scrotum cōcisum, & ad hepatis, ac
splenis inflāmatōnes ex febribus obortas. Duobus
item coriis illitum, ut alterum pectori, alterū dorso
imponatur, sanguinis refectionem sistit. Ad inflāma-
tiones autem irrigationis uice adhiberi potest, ita ut
accipiatur de eo quadrās, ceræ uerō, & resinæ frictæ,
ac picis, singul. sextans, & olei lib. i. Hæc liquentur,
ac colētur, & cum medicamēto, ac farinæ ordeaceæ
quadrāte, cum aceto trito imponātur. Sic etiam fla-
gellatis conducit. Aegyptiū Andromachi celebre,
ad sinus maximos glutinandos, ad ossa carne nuda-
ta, ac cōcisa, ad detortos, ac luxatos articulos, ad ab-
scessus, ad hominū, quadrupedum, ac reptilium be-
stiarum morsus, fronti impositum oculorū fluxio-
nes sistit, maximas ac profundissimas ensium cæsu-
ras triduo sanat. Eximiam discutiendī uim habet, ut
etiam pus, nisi ualdē multum fuerit, sine cutis perfo-
ratione discutiat. Membra quomodocūq; indurata
emollit, & maligna ulcera, ad cacatricem perdu-
cit. Ceræ, spumæ argenti, singulorū drach. c. xliiij.
ammoniaci thymiamatis drachm. lxxii. terebinthi-
næ drachmas xxxii. lanæ succidæ ustæ drachmas
xviii. aristolochiæ, thuris, squamæ æris, singulorū
drachmas viii. squamæ ferri stomomatis drachm.
viii. myrrhæ drachmas iii. opopanax drachm. ii.
olei cicini aut sicyonii, uel antiqui lib. iii. Spumam
argenti, cum oleo ad cōpagem coquito. Deinde ad-
dita squama rursus bullire sinito, donec non inquie-
net. Tunc cerā primū, deinde ammoniacū tritū ad-
ijcito, & his liquidis terebinthinā addito. Et ab igne
ablatīs, thus tritum, & lanæ cinerem inspergito. Et
frigefactum pharmacū manibus subigito, ac utitor
aliquando puro, aliquando diluto. Panacea empla-
strū, quod aliqui Trium fratrum uocāt; Hieras Hy-
gieam, id est, sanitatē appellat, facit ad nomas, & om-
nia ulcera maligna. Cōercet enim nomas, neq; cru-
stam inducēs, neq; circumscita corpora indurans, sed
omne corruptum rumpēs, ac tabefaciēs, ut nihil dif-
ferat ab uuis passis humectis. Sanguinis fluxū sup-
primit, tū alibi, tum ex hæmorrhoidibus erumpen-
tē, sed & ipsas hæmorrhoidas tabefacit, ac consumit,
præterea fistulas sanat, & carbunculos, & ægilopas,
& ulcera chironia appellata, & in summa totū ægre
curabiliū ac diuturnorū gen⁹, priuatim uerō ad mē-
marū duritias, earundēq; cāctos, ac nomas cōducit,
facit & ad hydropticos, splenicosq; ac articularū affe-
ctiones. Et ad uterū qdē affectiones oleo cyprino di-
lutum, ac liquidum inijcitur. Externis autem præ-
stat ita, ut est, imponere, uelut singula alia. Omni ue-
rō ulceri impositum, etiā si ferū fuerit, statim ipsum

mitius efficit, & dolores iūdem, ac uigilias mitigat.
At uerō rosaceo dilutum, sinus magnos, & fistulas
glutinat, prius elotos: recentes autē sinus aqua mul-
sa eluere oportet, deinde exterius medicamētum ad-
hibere, & debitam ligationē facere. Ad fauos etiam
inflāmatos efficacissimum est. Verum Damocrates
etiā ad canis rabiosi morsum, & uenenum elaculan-
tium bestiarum ictus, iam liquecēs ac denigratos,
& ad medicatas sagittas facere asserit. Spumæ argen-
ti, bituminis Iudaici, terræ ampelididis, singulorum
drachmas ducentas, thuris, propolis, singul. drac. l.
aloës, polij, centaurij, galbani, aluminis scissi, singu-
lorum drac. xxv. chalcitidis ustæ drac. xvi. chamæ-
pityos, symphyti, radicis chamæleonis nigri, marru-
bij, helenij, aristolochiæ, singulorū drac. xvi. galla-
rum, myrrhæ, iridis, singul. drach. xii. terebinthinæ
dra. xxv. mellis Attici unc. xxv. olei noui lib. viii.
Spumā argenti, terram ampelididem, bitumen com-
tusum, ad lentum ignē coquito, assidueq; uersato, cl-
tissimē enim exurit. Et ad strigmenti spissitudinē
redactis, chalcitidē inspergito, bullireq; sinito. De-
inde alumen adijcito, ac rursus coquito, donec non
amplius inquinet, in alio uerō uase galbanū, propo-
lim, & terebinthinā cum melle liquefacta habeto, &
medicamēto ab igne amoto, hæc ammisceto, & his
probē unctis, arida trita adijcito, omniāque simul
subigito, & in uase pelle cooperto reposito, ac uti-
tor tanquam admirādo. Poteris etiā Archigenis ni-
gro emplastro uti, quod inter orthopnoica medica-
menta sermone octauo habetur. Nigrum Icesij, ad
omne ulcus recens ac uetus, ad contusa, luxata, fra-
cta, ad inflāmatōnem, & omnem dolorem. Statim
enim à dolore liberat, facit ad canum, ac hominum
morsus, ad furunculos, & duritias, præsertim mam-
marū, ad tubercula sedis, ad hydropē, & quæ discuti
oportet. Est enim attractoriū, ac glutinatorium. Vle-
cera maligna, strumas, parotidas, perniones, panos,
clauos, nigredines, impetigines, fistulas, & hæmorr-
hoidas inflāmatas sanat, aculeos & infixos extrahit,
facit & ad uenenatorū ictus, & quadrupedū morsus.
Spumæ argenti, bituminis, terræ ampelididis,
singulorū dra. ducentas, propolis, ceræ, singul. drac.
l. terebinthinæ, galbani, aluminis scissi, singulorū
dra. xxv. chalcitidis drac. viii. myrrhæ, iridis, galla-
rum, singulorū drac. xii. Mellis lib. iii. olei ompha-
cini recentis libr. viii. coquitur uelut panacea, &
spathula tædacea assidue agitatur, ne subsideat, facie-
limē enim comburitur. Nigrum Asclepiadæ, ad
ossium fracturas optimū. Hoc usus sum ad ossium
fracturas, in quibus ossa disparata uelut innatabāt,
quæ cum cæteri auferenda iudicarent, ita præter op-
inionem detinuit, ut instar calli coaluerint. Spumæ
argenti drachm. c. c. l. bituminis drach. c. c. ceræ, pic-
is, singulorum drach. c. resinæ pinus drachm. l. alu-
minis liquidī, propolis, singulorum drachm. xxx.
ammoniaci thymiamatis drachm. xxxiii. æruginis
drach. x. olei drach. xlv. Spumam argēi cum oleo
coquito, donec non inquinet. Deinde ceram, & bi-
tumē priuatim liquidum, & picem adijcito, & omnia
colata ad spumā argenti ammisceto, postea ammo-
niacū tritū addito, & rursus ad bonā compagē co-
quito. Deinde propolim ac resinā pinus adijcito, &
ab igne ablatīs alumē & æruginē minutissimē trita
ammisceto, postremum medicamētum, in aquā ace-
to per

to permixta diffundito, manibus subigito, ac uitor. Emplastrū Athena inscriptum. Cadmiæ dra. xx. æris uisti, malicorij, gallarū aristolochiæ lōgæ ac rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, nicti, aluminis scissi, aluminis rotundi, iridis, misyos, atramenti sutorij, chalcididis, æruginis, aloës, myrrhæ, thuris, ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. dra. xxx. ceræ, picis, sing. dra. e. uelut alij habent cc. colophonidra. ccc. olei sexuncē. Hoc quidē modo apud Oribasium habetur. Asclepiades autē habet aloës drac. xii. myrrhæ drac. xii. & ammoniaci thymiamatis dra. xvi. Arida ad solē æstiuum sufficientibus diebus terito, & ad ea postea liquabilia liquefacta adijcto ac unito, facit ad sinus, & maxima capitis uulnera citra inflammationē glutinat. Cerato liqdo dilutū per linamēta inditur, ad punctos ac uulneratos nervos, ad musculos cōcisos, ad capitis ulcera, ad fistulas & ulcerū cuniculosos recessus. Ossa corrupta citra perforationē educit, facit ad nomas, putredines, cāceratas affectiones, inguinum, alarū, ac colli nigredines, & ad ulcera ægre recipiētia cicatricē. Et omnino uires siccadi habet, quas laudes Asclepiades ipsi adscripsit. Nigrū ex salicibus, celebre & ad multa commodū, facit ad eructa uulnera, ad resolutos articulos, ad fistulas, madore flaccidas carnes cōstringit, erysipelata & alias affectiones citra ossiū fracturā obortas sanat, pectori ac dorso adhibitu sanguinis refectionē, tabidosq; ac pectore suppuratos curat. Misyos, chalcididis, æruginis, cerussæ, gallarū, aluminis scissi & rotundi, meliteriæ sing. sexuncē, malicorij sexuncem, atramenti sutorij sexuncem, ceræ, resinæ pinus, picis, bituminis, foliorū salicis uiridum, olei sing. lib. ii. olei rosacei trientē, acetū sextariū dimidiū, uel quantū satis est, folia salicis cū aceto ad tertias decoquito, deinde folijs cōcitis ac humore expresso, primū æruginem, cerussam, & melanteriā leuissime trita, & deinde etiā reliqua trita ammisceto. Et postremū liquabilia liquata affundito, frige facito, subigito, eradito, ac uitor. Aliud ē salicibus, à Critone ad Herodotū relatū. Meliteriæ, gallarum, aluminis scissi & rotundi, sing. sexuncem, ceræ, bituminis, picis sicce, resinæ pinus, foliorū salicis, singul. lib. ii. olei lib. i. acetū sextariū dimidiū, præpara uelut dictū est. Aliud ē succo salicis, ex Oribasio. Hoc Magnus, inquit, inuenit ad destillationes. Salicis folia uiridia ad solem terito, postea in ollā nouā cum sufficiente uino mittito, & appposito operculo, ad lēu ignē coqto, & excolato, abiectionē folijs expressis succū adseruato, postea uerō sumito colophonidra unc. xxxiiii. olei sextariū, succi lib. i. Et colophonidra percolatā cū oleo, ad lēu ignē coquito, donec in aquam diffusa, & manibus subacta, nō amplius inquinēt. Deinde ceræ unc. xxxiiii. ammisceto, eaq; liquata, ollaq; ab igne amota succū salicis adijcto. Vinū uidelicet in quo folia cocta sunt, paulatim instillando ut ne efferuescat, & rursus ad mitissimum ignē decoquito donec medicamentū refederit. Et deinde in mortarium trāsfusum eodē succo infuso, manibus diligentissime subigito. Emplastrū Cyzicenum appellatū, facit ad recētia ac uetera uulnera & ulcera cuniculosa. Duritias præsertim māmārū diffundit, attrahit, repurgat, replet, glutinat, cicatricē inducit, facit & ad cāceratas duritias ac fistulas, & ubi scapellū admoueri non potest, uelut in collo, collyriū ex hoc medicamēto inditur. Idē minātes fieri abscessus mīd

gat, tubercula diffundit, gāgla & collectiones fastigiāt ac rumplit. Sagittas, & ossa, & aculeos, & infixā extrahit, crustas citra molestiā exterit. Verū in ulceribus cuniculosis, magnis splenīs utendum est. Discutit etiā strumas, & ad uesicæ affectiones egregie facit, pectini impositū sanguinis eruptionē, uel ut alij habent, hæmorrhoidas, supprimit, thoraci & dorso adhibitu, tabidīs cōfere. Thuris, myrrhæ, croci, iridis, bdellij, atramenti sutorij, propolis, aloës, chalcididis, misyos trudi, aluminis scissi & rotundi, radice panacis, malicorij, ammoniaci thymiamatis, uisci, opopanacis, æruginis, acaciæ, florū rosarū, sing. dra. viii. æris uisti dra. xxxiiii. Alij pro ære, squamæ æris tantundem adijciunt, aristolochiæ, gallarū, sing. dra. xvi. terebinthinæ drach. cxxiiii. ceræ unc. xxxii. adipis uitulini unc. xxxii. acetū aut uini antiqui sextariū. Si itaq; pharmacū acre & discussoriū habere malueris, acetum eligito: sin adstringēs ac repulforium, uinum accipito. Arida & quæ ad succorum naturā accedunt, cum uino aut aceto terito. Deinde ad cerā cum adipe liquatā, ac excolatā, terebinthinā adijcto, simulq; ad cōpagem coquito, postea propolim ac uiscum addito, & spathula uersato, & ad hęc dissoluta, arida antea trita paulatim adijcto, ac fortiter agitato. Et postremū in mortarium trāslata manibus subigito, ac unito. Ego uerō neq; acetū, neq; uinū adhibeo, sed arida omnia solū cōtero & adijcio. Nā si uinū aut acetū aut aqua ammixta fuerit, ad cōpagē non peruenit. Emplastrū Moschionis, ad uulnera recētia ac cōcisos nervos, & dissectiones cum cōtusione, facit & ad fracturas cum uulnere. Nā & uulnera sanat, & ossibus callum obducit, cū debita deligadone impositum, facit & ad inchoatē hydropē, & testes cōtusos. Arefacit etiā emnētiās sedis. Curat rimas butyro dilutū, & gutturis tumores sanat: dissoluit omne duritiē, facit ad articulos luxatos ac distortos. Callosas manuū ac pedū emnētiās, quas clauos appellamus, aufert citra exulcerationem. Et est omnino pharmacū ad multa commodum, præparatur sic. Spumæ argēti, picis sicce, adipis uitulini, sing. unc. xx. terebinthinæ, mānæ thuris, singulorū dextariū, ceræ quincuncē, æruginis, opopanacis, galbani, singulorum unc. i. picis liquidæ selibram, acetū, succi sycomororum, olei cicini, uel sydonij, uel antiqui, singulorum heminā unā, id est, librā i. Spumam argēti cū oleo coquito, & ubi ebullierit, adipē adijcito, & assidue agitato, & ubi cōpagē acceperint, cerā, picem, ac resinam adijcto, & coquito donec non amplius inquinēt. Deinde succum sycomororū, & picem liquidā seorsim cocta, & ad compagem redacta ammisceto, & galbanum, ac æruginem, & mānā thuris inspergito, postremum opopanacem aceto dissolutum addito. Et ad ignem admota rursus coquito, donec nō amplius inquinēt. Atq; ita præparatum medicamentum in uinum transferto, & per triduum finito, postea uerō manibus emollito, ac uitor. Oportet autē post impositum medicamentū, fasciā uino imbutā exprimere, & circundare. Ceterū quod statim subijciā, succum sycomororū nō habet. Est autē medicamentū ad ossium fracturas commodū. Ad eructa uulnera ad sinus glutinados, & præsertim capiti aptum. Spumæ argēti, adipis taurini, picis sicce, sing. unc. xx. uelut alij habent xvi. olei cicini aut sydonij, aut antiqui, dextantem, pollinis thuris,

cerebintina, sing. bessum, ceræ tridentis, opopanax, æruginis, galbani, sing. unc. i. uisci sexuncæ. Spumæ argenti cū oleo & adipe ad bonā compagem coquito. Deinde cerā, picem, ac resinā adiecto, & mox ab igne tollito, atq; ubi paululū frigefacta fuerint, reliqua cū aceto trita paulatim adiecto, ne effervescent, & rursus ad prunas admota sensim coquito, donec non amplius inquinent. Et demum manibus emollito, ac uitro. Emplastrum insigne, ingentes sinus, ac fistulas sanās, aculeos & sagittas extrahens, inflammationes ac duritias dissolvens. Coxendicum item ac renum affectionibus cōmodū est, Spumæ argenti dextantem, olei unc. xv. picis siccae, colophonice, sing. unc. xvi. adipis taurini tantundem, misyos, iridis, calcis utuæ, singul. quadrantem, atramentū sutorij sesquiundam. Spumam argenti cum oleo ad bonam compagem coquito. Deinde liquabilibus liquatis ac excolatis adiectis, rursus paulatim coquito, donec non inquinent. Et postea paululum frigefacta ad reliqua in mortario cū aceto trita ammisceto. Emplastrum theriaca appellatū, ex centauryo, quod laudat Oribasius, factū ad nervorū ac musculorum vulnēra & puncturas. Ad ferarū canis rabiosi morsus, Glutinat sinus antiquos, & ad cicatricem perducit, præcipue uerō ad reptilium ictus facit, Genuum ulcera fluida & ægre curabilia sanat. Spumæ argenti sexuncæ, olei antiqui tridentem, resinæ pinus siccae dra. xxxii, ammoniaci thymiamatis, propolis, thuris, singul. drach. xii. cerussæ drac. viii. æruginis, squamæ æris, galbani, aristolochiæ rotundæ, centauryi, singulorum drach. iiii. thuris, aloës, iridis, gallarum, chalcididis, singulorum drac. iiii. Spumæ argenti cum oleo ad moderatā compagem coquito. Deinde squamā, æruginē, cerussam, & chalcididem adiecto, & ubi non amplius inquinant, propolim, ammoniacum ac galbanum in mortario prius dissoluta, addito. Et ab igne ablatis ac aliquāulum frigefactis, reliqua arida minutissime trita ammisceto. Et iam planē frigefacta manibus emollito. Aliud ex dictamno, cuius admiranda uis est. Ad nervos, musculos ac charislagines cōcitas. Ulcera quoq; antiqua ac ægre curabilia sanat, ossa corrupta, aculeos, & infixā extrahit. Habet uim discussoriam, facit ad capitis dolores. Reprimē oculorū fluxiones. Est & malagma pleuritidis cōmodū, & hepaticis, cum emplastro ex siccis parato, facit ad omnium uenenum excuslatium reptilium plagas. Spumæ argenti drac. c. colophonice drachm. l. ceræ drachmas xxv. ammoniaci thymiamatis, aristolochiæ, singulorū drachmas xvi. mannæ thuris, galbani, singulorum drachmas xii. æris uisti, æruginis, dictamni, aloës, propolis, singulorū drachmas viii. diphrygis, squamæ æris, radicis gentianæ, singulorum drachmas vi. olei antiqui lib. ii. Hieras autē dictamni & aristolochiæ, singulorum drachmas x. coniungit, ammoniaci uerō solum drachmas xvi. In reliquis consentit. Hoc preparatur uelut emplastrum Piscatoris, aut Tyrium, quæ supra retulimus. Verum eius meminisse conuenit, herbas non nisi ablato ab igne pharmaco, minutissime tritas immittendas esse. Sed & Democritus in cæteris similis, dictamni drachmas x. diphrygis uerō viii. recipit, & ad mammarum, colli ac spinæ ulcera conuenire asserit, quantumuis fuerint diuturnæ.

Emplastrum emollientia ac discussoria, ad multa commoda.

Cap. XIII.

Emplastrum Nigrum Asclepiadis, Achillæ inscriptū. Mammarum duritias, & testium inflammationes discutit. Hoc medicamentum discussoria uel omnibus alijs præstat, & ad multa commodum est. Locus autem prius abluendus est, deinde medicamentum adhibendum. Spumæ argenti libras sex, picis brutiæ libras quatuor, bituminis, resinæ pinus siccae, singulorum libras vi. terre ampeletidis lib. ii. ceræ lib. iiii. thuris sequilibrā, aluminis scissi, aloës, myrrhæ, singul. tridentem, olei omphacini antiquissimi lib. viii. succi serapiadis lib. vi. aceti quantum satis est, præpara uelut panaceam. Nigrum ē Iollio Hieræ, facit ad fistulas, alarumq; ac inguinū abscessus, ut nihil abscondere opus sit per chirurgiam, sed tantum perforatione facta ac sanie exclusa, medicamentum imponere. Illinendum est autem duobus corijs, altero iuxta alterum locato, neque humor de splenis detergendus est. Imbibitur enim & fortius sit medicamentum, picis libras duas, resinæ pinus siccae dodrantem, ceræ tyrrhenicæ, ceræ ponticæ, singulorum quadrantem, olei antiqui quincuncem, liquabilibus liquatis ac excolatis loliaceam farinam inspergito, & bitumen in aceti tridente dilutum affundito, omniaq; simul in mortario subigito manibus frigida humectatis. Sit autem bituminis sesquiuncia, farinæ loliacæ unc. xiiii. facit ad malignas mammarū duritias, parouidas ac perniones. Emplastrū Essentia appellatū, desiccandi uim & mitigandi dolores præ omnibus habet, facit ad sanguinis refectionē, ad articulorum ac costarum duritias, ad gægrænas, sinus, strumas, ulcera chironia, fistulas, egilopas. Spicula extrahit, hydropicos intra septimum diem curat. Hepati ac spleni magnopere conducit, pluribus diebus impositum, splenē penitus consumit, facit ad podagricos, & coxendicum affectiones. Spumæ argenti drachm. xx. cerussæ, æruginis, singulorum drachm. xx. squamæ æris, thuris, singulorum unc. i. bituminis bessum, resinæ pinus dextantem, & uncie dimidium, ceræ uncias xvi. picis uncias xxxii. In alio exemplari habetur, ammoniaci thymiamatis drach. vi. galbani drach. vi. Spumam argenti & cerussam ad bonam cōpagem coquito. Aliqui etiam bitumē in principio cū his iniungunt, utiturq; eo ubi magis siccare proposuerunt; deinde reliqua ex ordine imposito, uelut sæpe diximus, at si plus iusto coxeris, duritias non mollit. Emplastrum Ebrictas uocatum, Vm habet discutendi ac rarefaciendi, duritias inflammatas diffundit, facit ad ossium fracturas, ad vulnēra cruenta, cōuulsa, rupta, uulsiōnes, coxendices, calculos. Ad omnes capitis affectiones ueliter adhibetur, aliquando fronti & temporibus, aliquando uertici derasis pilis impositum. Spumæ argenti uel dodrantem, olei antiqui sexuncæ, olei rosacei, ceræ, singulorum sextantem, adipis taurini, cerebintinæ, thuris, singulorum tridentem, picis dodrantem, galbani, opopanax, æruginis, singulorum quincuncem, aceti sextarium i. præpara, uelut sæpe dictum est.

Emplastrum ex succis. Vulnēra nervorum ab inflammatione tutatur, sectiōes glutinat, ulcera inflammata, & musculos uulneratos, citra aliud cataplasma aut fomentū sanat, facit ad podagricos quocūque tempore adhibitum. Ad uteri inflammationes ueteres ac

recentes

recentes in pelsis siue talorum formis subditur. Rosaceo, aut myrteo oleo dilutum caua ulcera replet, et totum per sanat. Et in summa, omnia reliqua cataplasmata ac medicamenta exterius adhiberi ulceribus solita, superuacua sunt, hoc praesente. Duritas quoque mollit ac discutit, ceteris ad hunc usum commodis ammixtum. Spumae argenti lib. vi. olei recetis aestate quidem libras vii. hyeme uero libras ix. succi libras iiii. oleum cum succo ad prunas coquito, & ubi feruere & bullas emittere desierint, spumam argenti inijcto, & ad lentum ignem donec non amplius inuinent coquito, & ubi flauum ac bonum colorem acceperit, nondum autem fuluum attigerit, ab igne tollito, frigefacto, manibus subigito, ac in massam cogito. Vsu uero expetente sumuntur medicamentum et partes duae, olei & cerae, singulorum pars una, aut plus, prout res postularit. Succus porro ita praeparatur. Aquae sextarii xx. accipiuntur, radicis altheae recentis lib. iiii. seminis lini foenigraci, singul. sextarii dimidiu. Radices lotas & cotulas aqua madefacto, & postridie foenum graecum purgatum & lotu adijcto, ac madefieri sinito, & tertia die semen lini similiter lotu addito. Et quarta die ad bona spissitudinem coquito, & percolatu succu ad medicamentum praeparationem accipito. Ego uero, inquit Oribasius, duodecim aquae sextarius altheae lib. iiii. foenigraci ac lini seminis, sing. sextarii inijcto. Aliud emplastrum est succis, Oribasii. Spumae argenti, olei sing. lib. i. cerae bese sem, foenigraci, seminis lini, radicis altheae, pisanae, sing. quales portiones prius madefactas coqto, donec crassissimus succus euadat. Et huius excolati lib. ii. postea coquito, uelut dictum est. Emplastrum ex pisanis, foenigraci, seminis lini, pisanis, singulorum unc. i. melilori, radicis altheae, singulorum sextantem. Hec probe mundata ac lota per biduum in aqua madefacto ac coquito, donec succu reddiderint. Et eius excolati lib. ii. sumito, & olei antiqui lib. i. ac simul coquito, donec oleum solum restiterit, & huius postea taurini adipis sexuncem ammiscero, colophoniam tantundem, galbani unc. i. cerae lib. i. Hoc unguento quopiam dissolutum, etiam laxandi uim habet. Emplastrum ex psyllio. Spumae argenti lib. i. olei dulcis lib. vi. cerae lib. i. resinae pinus lib. vii. succi psyllii lib. iii. Succum uero ita parabis, psyllii quadrantem in aquae sextarii quinq. madefacies, deinde coques, & excolatum succum rursus cum oleo & spuma argenti ad bonam compagem decoques, & liquabilia si quata adijcias. Hoc ad omnes induratas inflammationes utiliter adhibetur. Aliud est psyllio simplicius, ad inflammationes podagricas in ipsa praesentem exacerbatione commodum. psyllii trientem in duobus aquae sextariis madefacto, ac coquito, & excolato succu, et cerae sexuncem, olei lib. i. ammiscero. Emplastrum ex Serapiade, ad tubercula, papulas, & intertrigines. Spumae argenti lib. i. olei lib. i. succi serapiadis trientem, singularis lib. i. Spumae argenti cum oleo & succo ad bonam compagem decoque ac utere. Pittadum, foliorum hyoscyami uiridum, colophoniam, cerae, adipis porcini, singul. sexuncem, ad folia trita assundis

to liquefacta, ac utitor, Emplastrum ex Althea, Polleris. Corticem radicis altheae herba uigente in pila contundito, deinde in aeneum aut fictile uas translatum, uino albo ueteri odorato ac adstringente respergito, ut solum humectetur. Deinde tegito, ac per triiduum sinito. Quarta die rursus in pila tundito, & succum fortiter exprimito. Et accipito colophoniam uncias xxxiiii. cerae trientem, olei, aeruginis, singulorum sextantem, Succo heminas Atticas ii. praeparatur autem hoc modo, colophoniam oleo liquatam ac colatam, ad lentum lignorum pini ignem coquito, & tacedea spathula agitato, donec in aquam instillata solidior euadat, deinde ceram adijcto, eamque liquefacta ollam ab igne tollito, & ubi frigefacta fuerint, succum paulatim affundito, ac caueto ne efferuescat, facile enim ebullit ut super effundatur, postquam autem constiterit, rursus igni adhibeto, & ubi incaluerint, aeruginem inijcto, & ablata ab igne frigefacto, ac manibus subigito, ut probe uniantur, facit hoc ad noua & antiqua ulcera, ad ferarum ac canum morsus. Virus enim ab ulcere extrahit, panos & strumas aut discutit, aut suppurat, aut rupit, aut materiam ad superficiem euocat, uelut in sugillatis, ac in uapore diffundit. Sedat dolores, scabiem ac scabros ungues, lepramque ac utiligines exterit, nec soluendum est in his ante septimum diem. Aculeos & infixos extrahit, podagricas inflammationes in ipsa exacerbatione mitigat, tumores articularum ac ganglia dissolut, fauos ac ficus curat, hydrocephalam infantium, aquosam capitis affectionem sanat. Splenis duritiam mollit, caneros non ulceratos lenit, imminet enim erosionem coepedit, pello exceptum ac subditu menses ducit, pectini impositu calculos pellit, urinae difficultatem corrigit. Aluu suppressam laxat. Rosaceo dilutiu, plataru rimas sanat, ulcera testiu ac pudendoru repurgat & incarnat. Et si absque erugine praeparatur, serapia ulcera sistit. Osiu fracturis prodest, irrigatione ulce adhibitu. Dolores enim sedat, fit etiam ex floribus altheae rosaceis similibus efficacissimum pharmacu, hoc modo. flores illi resectis unguibus tunduntur, & ad puluillum rediguntur: & eius sumuntur partes x i. colophoniam partes xxxvi. cerae partes vi. olei partes ii. Omnia simul uelut dixi praeparata manibus probe subigito ac utitor, priore commodius est, & dolores amplius mitigat. Emplastrum ex semine lini, Polleris. facit ad pectoris affectiones. Nervosarum partium inflammationes discutit, ac dolore mitigat, facit ad exacerbationes podagricas, & contractos articulos relaxat. Seminis lini partes ii. farinae ordeae partes iiii. colophoniam partes iiii. cerae partes iiii. resinae pinus liquida, uel cupressi, si haberi potest, partes ii. seminis thlaspios parte una, florum chamemeli, pilularum cupressi clausarum, singulorum parte una, olei partes duas. Cera & colophoniam cum oleo ad prunas liquefacito, & assidue uersato, & ab igne ablatis cupressi pilulas tritas & cribratas adijcto, ac caueto ne efferuescant. Deinde farinam, semen lini, resinam liquidam addito, & rursus ad ignem adhibeto, & paulatim donec uniantur coquito, postea procul ab igne chamemelum & thlaspium inspergito. Et tandem medicamentum in mortarium frigidum semiplenum confectum diligenter manibus subigito. Emplastrum Elephantinum. De Elephantino Polles libro secundo. Id ego inquit, prius inuenieram,

neram, sed postea longo usu ductus immutauit, & quum facilius meliusq; ac fortius cognouerim, in hunc secundum librum retuli. Dorycnij siue solani uescarij dextratem, radicis mandragorae bessem, radicis panacis sexuncem, colophoniam sextantem, resine pinus liquidae trientem, opopanax sextantem, ceram, terebinthinam, singul. lib. i. bdellij unc. xx. aceti lib. i. uel amplius. Quidam etiam potamogitonis unc. xx. adijciunt. Verum descriptio non habet. Aliud Elephadinum, facit ad contractos articulos, mollit ac discutit podagricorum callosas concretiones, & in ossium fracturis inductos callos dissoluit, panos, strumas, & quamlibet duritiem emollit. Quod si expectari libuerit, eboris aut cornu segmentum ex eo illinito, & ad dies triginta aut quadraginta alligatum finito, & deinde soluto. Et non reperis eboris aut cornu naturam, sed aliud quid, quod commode flecti possit. paratur autem sic. Corticis radicis dorycnij aut solani uescarij uirentis, siue in umbra siccati, corticis radicis mandragorae, singulorum bessem, radicis panacis sexuncem, opopanax bessem, potamogitonis uiridis, bdellij, resinae pinus liquidae, singulorum uncias xx. terebinthinam lib. i. ceram sextantem, acetum albi bessem. Mandragorae ac solani corticis uirentes quidem, in pila tundito, & postea in mortario terito: siccos uero cum panacis radice terito ac cribrato, similiter etiam bdellium terito, ac potamogitonem, omniaque simul in mortario mixta terito, aceto paulatim instillato. Et liquefactis quae liquari debent, excolatisque ac ad probam compagem coctis, & ad trita ammixtis, medicamentum frige factum manibus subigito, & in fictili uase aceto affuso seruato, & ne transpiret probe cooperito. Emplastrum ex herba sacra siue uerbenaca, Polletis. Verbenacae rectae in ulgore cum radice euulsae ac exsiccaetae, tuseque ac cribratae sexuncem, colophoniam lib. i. ceram trientem, olei sextantem. Liquabilia liquefacto, colato, & ad bonam compagem coquito, & adiecta uerbenaca subigito ac uitior, facit ad omnem capitis dolorem, ad hemicraniam, ad oculorum fluxiones, ad dentium dolores extra adhibetur. Ad scorpionum ictus. Ad neruorum partium inflammationes, & omnino inpositum partes a fluxione tutatur. Emplastrum Geraniij, Polletis. facit ad laxatos ac crassos neruos resolutionis periculum expectantes. Ad omnes fluxiones, tumidosque ac inflammatos articulos, ad gaglia, steatomata, atheromata, strumas, panos, & quaecumque molliri, attenuari, rupti, ac extergi debent. Rameta statuae aere, ex assidua olei illitione sordidae ac aeruginosae lib. i. ceram lib. i. sandycis, sandarachae, terebinthinam, singulorum lib. i. Quod si statuae ramenta sicciora fuerint, terebinthinam lib. ii. accipito, & cum his omnibus gruis pennas uncto. Hoc modo. Gruis pennas omnes in ollam nouam conijcito ac operito, argillaque oblitito, & in fornace mitto. Eamque ubi tota exterius ignita uideris, extrahito, ac frige fieri finito. Ea deinde aperta pennas uistas eximito ac terito, & longo tempore antea paratos asseruato, & medicamentum postea sic preparato. Ceram ac resinae liquidatis ac excolatis, sandicem & sandaracham minutissime tritas adijcito, & uersato donec omnia fuerint probe mixta, & postea ab igne ablatis pennarum cinerem ammisceto, ac simul subigito, frige facta autem aliquatenus medicamento statuae aeruginem cum modico aceto prita adijcito, atque in mortario probe uncto, subigito,

to, ac uitior. Emplastrum ex buglossio, Polletis. Buglossum herbam cum radice euulsam, & in umbra siccata, terito ac cribrato, & sumito eius partes iiii. colophoniam, resine pinus liquidae, ceram, singulorum partes vii. olei partes v. Colophoniam cum oleo ad lentum ignem coquito, ac spatula agitato: ubi uero durior apparuerit, resinam liquidam adijcito, ac rursus coquito, donec non amplius inquinetur, & postea ceram adijcito. At ubi ab igne amoueris, cribratam herbam addito, & medicamentum in mortarium aqua semiplenum infundito, ac manibus subigito. Facit ad omnes inflammationes, strumas, parotidas, panos, plagas, collisiones. Ad antiqua & maligna ulcera, ad uulneratos neruos, sinus, nomas, fistulas. Repurgat, mollit, contrahit, attenuat, & quaedam discutit, quaedam rumpit, replet, & ad cicatricem perducit. Dolores ulcerum ueterum ac recentium statim sedat, & liuida abolet. Ego uero in buglossae defectu nycteridam herbam, ab aliquibus unguentum Helenes appellatam, ad coxendicum affectiones adhibui, & bene successit. Emplastrum ex achate lapide, Polletis. Lapidem achates appellatos, leoninae pelliculae colore similes, in fornacem fabrilis mitto, & aggestis carbonibus ualde sufflato, & ubi ignitos lapides uideris, forcipe extrahito, refrigeratosque terito ac arctissimo cribro excutito. Deinde accipito colophoniam drachmas xlviii. resinae pinus, ceram, singulorum bessem, olei trientem, achatum lapidum ustorum quincuncem. Colophoniam cum oleo liquatam coquito donec non amplius inquinetur, deinde ceram ac resinam prius liquata & excolata adijcito, & his unctis lapidum cinerem addito, ac rursus ad moderatam compagem coquito: postea medicamentum in frigidam aquam missum frige fieri finito, & manibus subactum in massam cogito. Vtere hoc ad scorpionum, uiperarum, & uenenum elaculantium bestiarum ictus, facit ad tumores aegre concoctiles ac sanabiles, ad induratos tumores, ad liuida. Velocem suppurandi uim habet. Strumas aut discutit, aut concoquit & rumpit. Erit autem efficacius ad strumas, si capparis folia uiridia, aut corticem eiusdem probe tritum, ad emplastrum calefactum ac remollium ammiscueris. Emplastrum parhygrum, facit ad inflammationes ad duritiem quadam inclinantes. Ad ipsas porcini a fibris depurati uncias xlviii. ceram uncias xxiiii. spumae argenti, cerussae, singulorum sexuncem. Liquida cum aridis permisceto. Manebit quidem hoc pharmacum aliquandiu liquidius, sed postea ad bonam compagem perueniet. Emplastrum e buccinis. Hoc Xenocrates malleoli abscissum suppuratum iam discussit. Inflammationes autem induratas, praesertim parotidas, priusquam in pus transmutentur, mirifice dissoluit. Spumae argenti dra. cc. ceram dra. i. olei antiqui lib. i. cerussae dra. vii. terebinthinam dra. i. buccinorum ustorum dra. x. thuris dra. xix. aquae sextarium. Spumam argenti & cerussam minutissime trita, rursus cum aqua terito, & iterum cum oleo, & ex mortario in ollam translata, lento igne coquito, assidueque uersato ne subsideant, deinde ceram, & mox thuris ac terebinthinam adijcito, & ad bonam compagem, non tamen multam duritiem coquito. Postremum cinerem buccinorum addito, & paululum serueri finito, & medicamentum ab igne tollito, & in mortarium aqua humectum effundito,

dito, & diu manibus subigito, ut glutinosum euadat: nam temporis progressu durius propter buccina efficitur. Emplastrū Dionysia appellatum. Inflammationes & abscessus mammarum præsertim, discutit omnē enim humorē per cæcos meatus diffundit. Sed & duritias ac parotidas dissoluit. Cera, terebinthinæ, spumæ nitrī, olei antiqui, singulorū sexuncē, misyos crudi un. i. aquæ coactiliariorū quantū sufficit. Spumā nitrī & misy cum aqua terito, & cū oleo coquito, deinde cerā, mox terebinthinā adijcito, & ebullire finito, donec nō amplius inquinēt, nō tamē nimis solidā euadāt, & sublatum ab igne medicamētū in mortariū aqua humectū diffundito, manibus subigito, ac utitor. Hęc dionysia inter attractoria emplastra rectē descripta habetur, eaq; utaris uelut istic descripta est. Emplastrū ē saponē, discussoriū præcipuū ad furunculos. Adipis porcini, picis, ceræ, saponis nigri, æquales portiones liquatas excolato ac utitor: discutit etiā hydropas. Aliud, ad furunculos, parotidas & panos. olei antiqui, ceræ, saponis, nitrī, lixiuī, æquales portiones. Cerā cū oleo liquefacto, nitrū uerō cum lixiulo in mortario terito, & deinde saponē simul cōterito, & in ollā cōiecta paulatim coquito ad moderatā compagem, & utitor. Emplastrū ex Heliotropio. Facit ad percussa, collisa, luxata, uulsa, rupta, stilorū ac similium rerū pūcturas, ad dolores in profundo. Neros ab icu aut frigore crassefactos, aut aliter affectos curat, firmat, & dolore liberat. Vlceribus antiquis, & uulneribus recentibus confert. Aduersus medicatas sagittas loco affecto imponitur. Ad digitos contusos, etiam si ossiculum collisum sit, ab inflammatione tutatur, & dolorē eximit. Maturat, suppurat, discutit, contrahit, glutinat, repurgat, incarnat, cauitates replet, & ad cicatricem perducit. Heliotropiū herbā tria grana habētē, in autumnō totā cum radice euulsam & in umbra siccatā terito, ac cribrato, & elus accipito trientē, colophonix splendidissimę unc. xlviii. resinę pinus, aut cupressi liquidæ bessēm, cerę bessēm, olei trientē. Resinā, oleum, cerā, simul liquefacto: deinde herba adiecta ad lentū ignē coqto, & tædacea spathula agitato, donec bonā cōpagē acquisierit medicamētum, & in frigidam diffusum subigito ac utitor. Strumas & duritias suppurat, rumpit, siccat, incarnat, ad cicatricē ducit, & dolorē sedat. Emplastrum Mnaseæ, secundū mollientiū ordinis. Spumæ argēti, adipis porcini, olei, æquales partes simul decoque, donec non amplius inquinant, & si fortius medicamētū efficere uolueris, adipē & oleū utrunq; uetus accipito: uetustiora enim efficacius reddūt medicamētū. Quod si magis emolliens esse uolueris, oleū minues, & adipē augebis. Si uerō magis discussoriū, adipi detrahe, & oleo adde. Quidā cū oleo & adipe radice altheæ cōtusæ sesquilibrā coquunt, donec torrefiat, eaq; abiecta, in oleo ac adipe colatis spumā argenti coquūt, sicut diximus. Atq; sic quidē Galenus. Mnaseas autē sic. Spumæ argēti, ceræ, pasci, colophonix, olei, axungię, sing. lib. i. oleū & spumā argēti coquito, donec nō inquinant, & cerā, colophonix, axungię, liquatas & excolatas adijcito, ac rursus ad bonā cōpagē coquito: deinde passum affundito, ac fortiter agitato. Et sublatum ab igne pharmacū sub canis æstu insolato, & quouidie cū spathula uersato, donec ad debitā soliditatem perueniat. Emplastrum Helladicum

mollitorium. Ammoniāci thymiamatis, spumæ argenti, cerussę, olei antiqui, resinę pinus, ceræ, sing. lib. i. thuris sexuncē, galbani sextantē, castorij lib. ii. propolis, opopanacis, sing. lib. i. aceti quantum satis est. Oleum, spumā argenti & cerussam simul coquito, & medio cocturæ tēpore ammoniacū tritū adijcito, & ebullire finito, donec nō amplius inquinēt, deinde liquabilibus additis ac probē ammixtis, thus & castoriū minutissimē trita addito. Et postremum opopanacē aceto dissolutū affundito, & perfrigeratum pharmacū manibus subigito, ac utitor. Discutit abscessus etiā in pus transmutatos. Aliud, emolliens ac discuties abscessus. Spumę argenti sexuncē, cerussę sesquicūciā, ceræ trientē, ammoniaci thymiamatis sextantē, galbani, myrrhæ, thuris, singulorū trientem, olei lib. i. oleū, spumam argenti, & cerussam coquito, donec nō amplius inquinēt, deinde ammoniacū, mox cerā & thus ac galbanum adijcito, & ab igne ablatis myrrham addito, subigito ac utitor. Aliud, discuties abscessus, & iā ruptos expurgans ac sanās. Facit & ad capitis lentes. Colophonix sexuncem, ammoniaci thymiamatis sextantē, mastiches un. i. ceræ unc. i. galbani scrup. iiii. opopanacis scrup. iiii. æruginis scrup. iiii. resinę pinus lignosę, olei, singulorum trientem. Aliud ē tritici polline. Facit ad abscessus & furunculos, ad herniā aquosam & intestinorum, post chirurgiam inflammationibus sedatis. Ceræ, pollinis tritici, resinę liquidæ, singulorū sexuncem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, olei trientem, aceti aut uini quātum satis est. Pollinē pridie in aceto aut uino subiges. Sequēti die liquatis his quæ liquari debēt, fermentatū pollinē probē subactū in mortario ammiscbis, & uteris. Aliud ē fermento. Saponis, sandarachæ, singulorū sextantē, fœni græci un. i. resinę pinus lib. i. colophonix, cerę, sing. sexuncē, fermenti sexuncem. Fermentum aqua dilutum cū liquabilibus liquefactis miscbis, & terēda trita adijcies, omniaq; simul subiges, ac uteris. Hoc discutiedū ac rumpendū uim habet. Aliud ē Masticha. Colophonix lib. i. ceræ sexuncē, ammoniaci thymiamatis trientē, mastiches, galbani, terebinthinæ, singu. sextantem, omnia liquefacto ac excolato, & in frigidā cōlecta emollito ac utitor. Aliud trimum specierum appellatū. Cerā, colophonix, terebinthinā liquidam, paribus portionibus simul liquefacto, & in frigidā mittito, subigito ac utitor. Hoc sicut etiā quod proxime præcedit, ossa capitis denudata incarnat, & squamas citra molestiā disparat, & solum absq; alterius usu ad cicatricē perducit. Quod si mastichē pari portione adijcias, ad ossiū fracturas admirandū euadet.

Emplastrū Iudæi. Colophonix lib. i. mastiches un. i. olei trientē, omnia simul liquefacta in frigidā mittito, & post ruptos abscessus utitor, ita ut nihil reseces, neq; linamentum indas, sed solum medicamento cauitatem expleas. Ex eodem etiā emplastrum adhibeto, citissimē repurgat, ac præ cæteris incarnat. Postquā autem ulcus explanatum fuerit, ad cicatricem inducendā alio medicamento opus est. Nā hoc superuacua carnem efficeret. Emplastrū reipublicę præsidis. Resinę quæ in uasculis ac lagunculis ligneis affertur, excolatę lib. i. ceræ quadrantem, mastiches tantundem, olei à Martyreo uel aliunde allati, sesquicūciā. oleum cum resina liquefacto, cetaurijq; uiridis, si haberi potest, sin minus, arido fasciculo agitato,

agitato, & his excolatis reliqua ammisceto, ac manibus subigito. Quidam centaurij sicci un. i. adijciunt: inter liquadū uerō & dū agitas, hæc uerba insusurro. Deus Abrahā, deus Isaac, deus Iacob, hunc phar-maco uires largatur. Hoc sinus & fistulas glutinat, ægilopas siccant. Et si centaurium receperit, duritias ac strumas inchoantes emollit. Emplastrum Mutum appellatum. Ammoniaci thymiamatis, galbani, opopanacis, singulorum unc. i. mastiches, ceræ, colophoniar, singulorum sexuncem, aquæ marinæ quantum satis est. Aliud. Hoc ad ossium fracturas inflammationibus sedatis facit. Optimè cicatricem inducit. Colophoniar, resinæ pinus, singulorum lib. i. ceræ sexuncē. Omnia in ollam feruidæ aquæ missa liquato ac excolato, deinde in frigidam transfusa emollito, & in massam cogito, ac utitor. Aliud, mirificè molliens. Facit ad stomachi duritiā ac frigidus affectus. Colophoniar puræ sextantem, ceræ albæ trientem, mastiches puræ unc. i. olei cyathum i. Omnia simul liquata ad probam compagem coquuto. Emplastrum Pyxis inscriptum. Confert ad omnes inflammationes, præsertim pedum, egregiè enim emollit. Ceræ, colophoniar, singul. sexuncem, succi seminis lini trientem, adipis porcini sextantem, terebinthinæ quadrantem, & unciz dimidium, olei omphacini sextantem, ammoniaci thymiamatis unc. i. thuris quadrantē, lactis bubuli trientē, & unciz dimidium, ouorū candida nouē. Ammoniacū & thus cū lacte, succo, & ouis terito, & reliquis liquefactis ammisceto. Aliud è melle, mollior ac discutit. Spumæ argenti, olei, singul. lib. ii. colophoniar, ceræ, axungiz, mellis, sing. unc. xx. spumā argenti cum oleo & axungia coquuto, donec non amplius inquinant; deinde reliqua liquata adijcto, & ab igne ablatis mel affundito, & frige factum medicamentum manibus emollito. Melinum Serapionis uulnerarium, ad multa cōmodum. Omnes duritias dissoluit, abscessus discutit, humores per occultos meatus diffundit. Sinus glutinat, spicula, ossa corrupta & aculeos extrahit. Rosaceo dilutum. caua ulcera replet, Sedat etiam inflammata. Hoc præceptor Lucius utebatur, atq; ipsum dupliciter præparabat, modò glutinosum, modò solidius efficiens: collyria enim ex solidiore formabat, & filum innectebat, & sic ad usum paratos habebat, ac in sinus fistulosos indebat, filo foras propēdente ad cōmodiorem extractionē: quæ enim sine filo induntur, quum duriora sint, sæpe frāguntur, & priuatim abscessus efficiūt. Spumæ argenti drach. c. iiii. colophoniar dra. lxxiii. ceræ drach. xlviii. ammoniaci thymiamatis dra. xxiiii. æruginis, myrrhæ, galbani, sing. dra. xx. olei æstate unc. xv. hyeme xviii. spumā argenti cū oleo ad lentum ignē coquuto, & ab igne ablatis ærugine inijcto, ac ne efferuescat caueto, & rursus coquuto donec nō inquinant, & ad cotonei mali colorē perueniant. Deinde cerā ac resinam liquefactas ac excolatas addito, & ubi parū ebullierint, ammoniacū leuissimè tritū, & aqua aut aceto dilutū ammisceto, & mox galbanū tritum addito, & tandē ab igne amotis myrrhā inspergito. Melinū Pasionis Athanasia inscriptū, ad ueteres sinus, etiā si usq; ad uacua perforati fuerint. Idem puerorū strumas recentes discutit. Facit & ad articulos distortos ac lācinatos, sicut Hieras & Galenus testantur. Spumæ argenti, resinæ pinus sicce, sin-

gulorum drach. c. ceræ drach. xii. s. olei, uini ueteris odorati adstringētis, singulorum hemina dimidiū Spumam argenti cum uino ad solem æstiuum pluribus diebus terito, donec fuerit exiccata, & postea cum oleo ad lentum ignem coquuto, donec non amplius inquinet. Postea ceram ac resinam adijcto, præparato, ac utitor. Emplastrum Venus appellatum, ad multa cōmodum. Omnem duritiā dissoluit, strumas discutit, spicula & aculeos extrahit. Ad uenenū eiaculantū bestiarū morsus mirificè cōmodum. Fistulas & sinus glutinat. Podagricis per exacerbationē interualla utiliter imponitur, & coxædici diuturnæ medetur, spumæ argenti unc. xxv. ammoniaci thymiamatis sextantē, colophoniar unc. xvi. æruginis, galbani, sing. sextantē, bdelli, opopanacis, sing. quadrantem, myrrhæ, aristolochiz, sin. un. i. olei antiqui lib. ii. Oleum cum spuma argenti coquuto, & in medio cocturæ tempore ærugine adijcto, & donec nō inquinent bullire finito, deinde colophoniar liquatā & excolatā addito, & ab igne ablatis, aristolochiam ac myrrhā aceto trita, cū galbano, bdellio, ac opopannace ammisceto, & in mortariū transfusa subigito, unito, ac utitor. Aliud emplastrum Venus appellatū. Facit ad eadē uelut præcedens, & est ad podagras per exacerbationē interualla ualde insigne. Olei antiqui lib. iiii. spumæ argenti lib. ii. ammoniaci thymiamatis lib. i. ceræ unc. xxii. colophoniar dodrantē, galbani, æruginis, singul. quadrantem, resinæ pinus unc. xv. myrrhæ trientē, præpara, uelut dictum est.

Emplastrū Panacea, emolliens ac discussoriū. Ceræ bessem, colophoniar, terebinthinæ, sing. lib. i. ammoniaci thymiamatis sexuncē, galbani, opopanacis, polinis thuris, olei, sing. un. i. uini quantū satis est. Emplastrum è rumice, ad multa cōmodum, abscessus discutit ac rūpit, strumas mollior. Ceræ, resinæ, adipis porcini, foliorū rumicis uiridum probè cōtusorū, spumæ niri, ammoniaci thymiamatis, sin. lib. i. præpara, & usus tempore cum oleo antiquo emolli, ac utere. Emplastrū è perna, omnē duritiā, strumas, gāglia, meliceridas, & reliqua huiusmodi dissoluit, sinus glutinat. Facit ad furunculos, abscessus, neruorū per cōsensum affectiones, confert pleuritidis, coxendicūq; ac articularū affectionibus. Pinguedinis suillæ è perna antiquissima, spumæ argenti, sin. lib. iiii. resinæ pinus lib. i. ammoniaci thymiamatis quadrantē, galbani, thuris, euphorbiæ, sin. un. i. pinguedo uerò de perna sic parāda est. Pernā suis antiquā in olla fictili cū aqua præsertim marina coquuto, & etus fusculi excolati ac refrigerati pinguedinē cōcretā, tū superstantē, tum subsidentē accipito, & expurgatā ad medicamentū præparationē asseruato. Cum hac itaq; liquata spumā argenti ab lentū ignē coquuto, donec nō amplius inquinet, deinde ammoniacū adijcto tritū, & postea resinā excolatā, & thus minutissimè tritū: his uerò unitis galbanū præmolliū addito, & sublato ab igne medicamēto, euphorbiū ammisceto, ac utitor. Emplastrū è perna; Galeni. Callosas instar toporum concreciones dissoluit. Pinguedinis pernae suillæ præparatæ, uelut dictū est, lib. i. ammoniaci thymiamatis, casei bubuli aut caprini uetustissimi, adipis taurini, apochymatis, hoc est, resinæ cū cera ex nauigis derasæ, sing. lib. i. medullæ ceruicis bessem, cefy pi quadrantē, opopanacis unc. i. olei cyprini sexuncē, uini quantū satis est: cætera liquato ac excolato.

Calcum

Caleū uerò cū uino terito ac liquefactis adiuncto, præparato, & in mortario manibus emollito. Emplastrum mollitorium Lucij præceptoris, ad distortos articulos inscriptum. Facit ad abscessus profundos, neruos & articulos contractos. Prodest opisthotoniciis neruorum per consensum affectionibus, eximit lassitudinē oleo cyprino aut trino, aut laurino dilutum. Item ad duritias diuturnas ac ægrè curabiles. Bdellij, adipis uisulini, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sin. dra. xvi. opopanacis dra. l. galbani, canchryos, styracis, thuris, sing. dra. viii. piperis grana clx. ceræ, terebinthinæ, singul. sexuncem, olei irini ætate quidam sextantē, hyeme uerò quadrantē, uel ni quantū satis est. Ceram cum oleo liquefacito, & ammoniacū, bdellium, ac thus trita ammisceto. Et si thus ægrè teri possit, uino madefactū conteratur: & his omnibus probè unitis, terebinthinā ac styracem addito, deinde ab igne ablatis, iridē, cāchry, & piper minutissimè trita adiuncto, & postremū opopanacē uino dissolutū affundito, & probè subigito. Hoc medicamentū supremi ordinis est emollientiū: nec facile reperias quod magis induratas partes molliat, ac duritiā discutiat. Emplastrum ē psyllio, experimento cōstans. Strumas resiccat ac discutit, furunculōs dissoluit, inguinū ac alarū abscessus etiā in pus transmutatos discutit, sinus glutinat, gangliā diffundit, clauos in manibus ac pedibus exterit, carbūculos sanat, uirilignes emēdat. Radicis althææ tritæ cribratæ un. i. psyllij triti cribrati sextantem, stercoris columbini minutissimè triti, axungie ueteris purgatæ, singulorum quadrantem. Picis siccæ lib. i. mastiches nigræ Athiopice quadrantem, aut si haberi nō potest, Chie tantundem, quæ liquari possunt liquato, & ab igne amotis arida ammisceto, & frige factū medicamentū probè manibus subigito, atq; usus tēpore, chartæ aut corio inducto. Mollitorium ex ruta. Articulos manuum contractos mirificè emollit. Ceræ trientē, terebinthinæ sextantem, galbani, opopanacis, cœlypi, castorij, singul. unc. i. euphorbij trientem, rutæ sextantem. Liquabilia liquefacto, & euphorbium, castorium, singula seorsim trita, cum opopanace ac rutæ folijs in mortario contritis simul subigito, & ad liquefacta ammisceto. Aliud emolliens. Strumas, parotidas, furunculos, panos ac meliceridas dissoluit. Ladani mollis, bdellij Scythici resinof, propolis recētis ac mollis, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, æquales portiones præpara & utere. Aliud molliēs ac discutiens. Facit ad strumas, parotidas, meliceridas, itemq; atheromata. Videtur eo etiā ad uasorum dilatationē. Spumæ argenti dra. c. colophonie, adipis caprini, singul. drach. lxx. ceræ, rubricæ, uisci, singul. drachm. xl. lapidis pyritæ drachm. xvi. picis drac. xxi. caldis uiuæ marmoracæ drach. xxii. galbani, ammoniaci thymiamatis, bdellij, singul. drach. xvi. cerussæ, aloës, myrrhæ, bituminis, mannæ thuris, dictamni, singulorum drach. xii. olei antiqui lib. i. spumā argenti, oleū, cerussam, adipem, simul ad bonam compagem coquito: deinde ammoniacum & bdellium trita adiuncto, & his liquatis primum uiscum, deinde lapidē pyritē, ac calcem, & cætera sicca trita addito, & omnia unita, frige facta, manibus subigito, ac uitior. Aliud, abscessus ac strumas discutiens. Candidum canis simum terebinthina excipe, ac utere. Aliud. Se

dat inflammata, strumas, hernias carnosas, & omnē duritiā emollit. Caricarū pinguetum, niri costi, seminis nasturtij, singulorū æquales partes cum melle emplastri forma excipito, ac emollito. Emplastrum ē buglossio. Duritias dissoluit. Buglossi bellem, spumæ argenti quadrantē, ammoniaci thymiamatis sextantem, adipis porcini sexuncem. Olei antiqui tantundem. Emplastrū Persarum ē lapidibus, Tyrrhenicū & Pampathes appellatū. Vesicæ & rhenum callos cōfringit. Impositum. Callos in manibus ac pedibus dissoluit: citra molestiā enim eos suppurat, & est post septimā tādē diem exoluendum: idem etiam in steatomatis, strumis, gutturis tumore, gāglijs, & similibus facit. Ad egilopas & fistulas antiquas, præsertim sedis, sub alis inguinum ac mammarū, uelut mysteriū diuinum habetur, in his autem quinta exoluendū est, & callus fistulæ derasus apparebit, nec desistendū est ab eius usu, donec callus penitus fuerit excisus. Facit & ad ulcera maligna, & ad ungues manuum ac pedum motos, ut à Deo missum putes. Ad herniam aquosam, hydropem, splenis tumorem, corio pro tumoris magnitudine inductū imponitur. In hydropē sanè antè ab alis usq; ad inguinā, posterius à ceruicē usq; ad lumbos: omnē enim aquā uel debis diuino quodā mysterio efferri, eoq; uteris donec res melius habere uidebitur. Ad anhelosos insuper ac erecta ceruicē spirantes, tabidos, & deploratos intus delitescētes abscessus, pilulas cum modico melle ex eius pastillis feci, easq; uiris, mulieribus, pueris, senibus, exhibui, & deploratos reuiuiscere uidi. Idem & in pestilentibus constitutionibus feci, & plures à peste liberaui. Verum desino plures alias eiusdē uires recensere, ne tantum Dei munus aliquis fabulā putet. Spumæ argenti lib. i. ceræ un. xvii. ammoniaci thymiamatis quadrantē & semunciā, propolis unc. xvi. s. galbani sesquunciā, squamæ aeris unc. i. lapidis phrygi unc. xviii. resinæ pinus siccæ lib. i. diphrygis sextantē & scrup. xviii. aeris uisti un. i. thuris sextantem, & obo. iiii. radicis aristolochiæ rotundæ un. xl. & scrup. xvi. lapidis magnetis uiuentis ac trahēdis un. i. aloës sextantē & semunciā, dictamni quadrantem. Cinnabaris cōmunis scrup. xviii. adipis struthocamelii lib. ii. lapidis pyritæ sextantem, lapidis uitæ scythici scrup. xviii. lapidis hæmatitæ unc. i. cadmiæ uitæ trientem, gentianæ, aristolochiæ longæ, lapidis pariaci, aut pro eo gagatæ, singul. unc. i. betonicæ, radicis chamæleonis nigri, singul. unc. i. in alio exemplari, scrup. xviii. æruginis un. i. olei antiqui lib. i. in alio lib. ii. floris salis, aceti scillitici, singulorū quantū satis est. Spumā argenti & lapides omnes primū seorsim, deinde simul tritos, ad salis florē ammisceto, & ad fecis compagē simul cōterito. Deinde æruginem & æs trita adiuncto, postea thus, aloē, ammoniacū, singula seorsim trita addito, & mox galbanū, & semper florē salis addendo cōterito. Postremū herbas minutissimè tritas ac cribratas immittito, & rursus flore salis addito cōterito ac subigito, & cum aceto scillitico pastillos & massas formato. Quæ uerò liquari debent, priuatim liquefacta seruato, & ubi medicamentum in usum assumere uoles, ammisceto. Cæterū locus cui adhibēdum est medicamentū, oleo ne inquinetur. Aliud, strumas discutiens. Spumæ argenti lib. i. olei antiqui sesquilibram, auripigmentū unc. i. spumā argen-

et cum oleo coquito, donec non amplius inquinet. deinde auripigmentū prius cum olei sextante tritum adijcto. Vtere cōfidenter, & ne contempseris uilitatem. Aliud ad strumas. Spumæ argenti sexuncæ, æruginis ferri sextantē, ammoniaci thymiamatis, olei antiqui, singulorū bessem. Spumā argenti, ærugine, & ammoniacū, singula seorsim trita coquito, ita ut æruginem & spumā argenti cū oleo primū coquas, & ad semicocta ammoniacū adijcias, sinasq; ebullire donec non amplius inquinent. Aliud ē sale, De mocratis, omnē duritiā discutit. Salis triuli, cerussæ, singul. lib. i. galbani, propolis, aristolochiæ, singulorum sextantem, olei ueteris libras ii. & si crassius fuerit pharmacum, aliā adhuc olei librā adijcto. Cerussam & sal cum oleo coquito, donec nō inquinet. Deinde galbanum & propolis, postremum aristolochiā, singula trita addito, ac preparato. Aliud eiusdem. Discutit strumas, omnem frigidum humorem absorbet, hepatis ac splenis aquosas affectiones sanat, urinā prolestat, coxendices ueteres curat. Cera, resinæ pinus, colophonix, sing. lib. i. calcis uiuæ, aluminis scissi, auripigmenti, sing. unc. i. liquabilia cum modico oleo liquato ac excolato, deinde ad arida cū modico aceto trita ammisceto, ac utitor. Posse hoc diuturnas uiscerum duritias dissolvere constat, ita ut multā humiditatem extrahat. Ciet quoq; mēses diu suppressos. Ego uerō ablata calce, duplum aluminis adijdo, & medicamentū longē præstātius cōperio: neq; enim pustulas excitat. Emplastrum Philagrii discussoriū. Curat gutturis tumores, & duritias discutit. Spumæ argenti dra. l. resinæ pinus dra. x l. olei antiqui dra. lxx x. æris usti, ammoniaci thymiamatis, sing. dra. viii. aluminis scissi, mānæ thuris, sing. dra. iiii. ceræ dra. l. spumā argenti cū oleo coquito, & ad semicocta æs adijcto, & bullire finito donec nō amplius inquinēt: deinde ammoniacū tritū addito, totū liquato resinā & cerā liquatas ac excolatas affundito, ac rursus ad cōpagem nō inquinārē coquito, ac mox galbanū præmollitum addito, & ab igne ablatis, thuris mannā inspergito, unito, & frige factū medicamentū manibus subigito. Emplastrū discussoriū abscessuū admirādum: nulla enim ruptione abscessus facta, pus crassissimum in emplastro inuenitur, idq; detergēdū est, ac medicamentū reparatum, rursus imponendū. Colophonix lib. i. ceræ sesquialbrā, olei hyeme cyathū i, æstate uerō dimidiū. Nitri berenkarī sului aut albi & friabilis sexuncæ. Cetera liquefacto ac excolato, nitrū uerō minutissimē tritum inspergito, & probē uersato, perfrigerataq; manibus emollito, & in massam cogito. Obseruandum est ne medicamentum in aquā transfundamus: aliās enim nitrū abolebitur. Aliud. Picis siccæ, ceræ nouæ, sing. lib. ii. olei lib. iiii. ad lentum ignē coquito, subigito, ac utitor. Facit ad abscessus, strumas, fistulas, & alia huiusmodi. Aliud Orisbanī, ad strumas, & alarū ac inguinum & colli tumores duos. Papatueris corniculati folia cum axungia & propoli pingui terito, & imposito. Aliud ad strumas & omnē duritiā. Verbenacæ rectæ foliorum uiridum dra. x l. hyoscyami uiridis dra. cx l. adipis porcini, resinæ pinus siccæ drachm. x lvi. picis drach. xx l. liquabilia liquata ac excolata cū herbis tritis committito. Aliud ē rumice. Foliorū rumicis, perdicī, senecionis, resinæ pinus, singu. dra. x lvi.

foliorum hyoscyami, axungia antiqua, singu. dra. x cvi. galbani dra. viii. liquabilia liquefacto, ac cū herbis cōmittito. Aliud ē rumice. Ad strumam & omnem duritiā, ad alarum ac inguinum abscessus, ad ulcera maligna & fistulas, ad ueri stragulus. Facit & ad splenē induratiū. Alii nucleos xv. ceræ dra. x cvi. olei dra. x cvi. nitri Alexandrini dra. x lvi. æris usti, terebinthinæ sing. dra. x xiii. thuris dra. viii. foliorum rumicis in olla uel charta sub calēd cinere resicatorū dra. x lvi. Liquida cū aridis tritis cōmittito, & in mortario subigito. Alia uerō in oleo fricta terantur. Aliud ē scolopendrio, philosophi. Discutit abscessus, surculos, & ad multa cōmodat. Colophonix lib. ii. ceræ, axungia recētis, sing. lib. i. resinæ pinus bessem, olei sexuncem, scolopendrii sextantem. Vini antiqui sextarios ii. pollinis tritici un. x l. tritici pollinem cum uino coquito, deinde liquida affundito ac unito, & postremū scolopendrium addito, ac utitor. Quod si oleū reprobas, pro eo axungia sexuncem accipito, & magis emolliet: si oleum receperit, magis discutiet.

De emplastro ex aspidibus.

Cap. xv.

Emplastrum ex aspidibus, strumas & alias duritias discutit. Facit & ad podagras per exacerbationū interualla adhibitum. Terebinthinæ, lapidis asij, bituminis, sing. dra. ccc l. x. spumæ nitri, adipis usti, ceræ, baccarum lauri, ammoniaci thymiamatis, sing. dra. ccc x l. lapidis pyritæ, calcis uiuæ, sing. dra. cxx. cl neris aspidum uiuarū ustarū dra. cx l. olei antiqui lib. ii. Oleū & cerā primā, deinde bitumen tritum liquefacto, & ad hæc adipē, mox ammoniacū, & terebinthinā adijcto. Et his ab igne ablatis, calcem, & lapidē asium ammisceto, deinde baccas lauri & nitri spumā. Postremum autē aspidum cinerē frige factio medicamēto inspergito, ut ne pereat, omniaq; simul subige ac utere. Cæterū ad aspidū exustionem, ollā rotā forinsecus argilla crassius oblinito, & ad solem siccato. Et infectis aspidibus ollā operito, & probē munito, duobus aut tribus foraminibus relictis, ex quibus cognoscas ubi uapor purus exhalat. Hoc emplastrū oleo gleucino dilutum & illitum articulorū affectiones ac coxendicum resolutiones curat, & cū laurino oleo illitum uirilignes albas exterit.

De emplastro Aniceto, Critonis.

Cap. xvi.

Emplastrum Anicetum, id est, insuperabile appellatū, in multo nobis usu est. Attrahit, rumpit, expurgat, glutinat, pus per splenium educit. Collyrium ex eo in sinus inditur. Diffundit duritias, & cōtractis nervis opitatur impositū cū irrigationē, ut ne perfrigerentur. Vngenti uicē explet dissolutū uelut ungentū ad lassitudines eximēdas paratum: sedat enim lassitudines in principis morborum, & ex obscura causa obortas. Est & extremarū partiū mollitoriū, in magnis splenīs impositum. Glutinat etiā cruenta uulnera, post futurā, aut hamulos impositos, ita ut lintheum cōplicatum solo aceto imbutū splenio superponatur, æstate frigido, hyeme calido. Facit & ad plātarū offensas, putredinesq; ac digitorum affectiones, & ad fracturas cum uulneribus, & neq; incarnāte, neq; cicatricē inducēte alio utendū est, sed ipsi soli fidendū. Facit etiā ad hominum, canum, ac ferarum morsus. Maxima uerō eius promissio est, quod nō sinat fieri abscessus oculos in colo & mēbrana alui ac intestina ambiente, si sanē non fuerint suppurati.

aut si fuerint facti, quod eos attenuet, & ad intestina eorū rptionē diuertat. Oportet autem spleniū ad lo cū imponere, & hapsū lanæ aut linteum superpo nere, aceto & oleo calido imbutū, & irrigare bis per diē. Ne solueris autē, nisi per tres aut quatuor dies. Deinde fomento ad uaporem adhibito, rursus impo ne. Appellationem accepit, ab admirandis ac multis operibus. Squamæ æris drac. lviij. pyrethri, staphi dis syluestris, grani enidi, seminis sinapis, cāchrysos, stercoris columbini, aristolochiæ tenuis, æruginis, misyos cyprij, seminis erucæ, cumini, sing. dra. xvi. nitri, salis ammoniaci, sin. dra. xxxij. mānæ thuris, baccarū lauri, iridis, singul. dra. cxx. aceti acerrimi sextarios. xvi. caricarū decocti cyathos. v. Decoctū porrō caricarū sic paratur: Caricarū pinguiū li. v. in aque sextarijs vi. coquuntur ad tertias. Omnia itaq; cōtusa ac cribrata simul cū aceto terito sub caniculæ feruore. Vbi uerō siccū & uiride euasit medicamen tū, affundito caricarū decoctū ac cōmollito, & abla tū in æris rubri pyxide seruato. Vsu autē postulatē, medicamētū partem unā cum aceto ad strigmentitiā spissitudinē dilutā, cum ceræ ac colophonis modico oleo liquefactarū partibus sex cōmittito. quod si du rius efficere uolueris, ceræ & colophonis quatuor partes sumito. Sin mollius & magis dilutū, octo am misceto. Idem & ad impetigines feras conuenire di citur, si meracius adhibeatur. Aliud, discutiens ab scessus. Ceræ, terebinthinæ, nitri, butyri, æquales portiones committito. Aliud ad abscessus. Verbe nacam rectam cum nitro, sulphure, & resina liquida committito, ac utitor.

Emplastra ruptoria. Cap. xvii.

Emplastrū scalpelli usum explens. Nitri lib. iij. propo lis, simi colubini, salis ammoniaci, æruginis, sing. sex uncem, aquæ marinæ aut murisæ sesquilib. olei anti qui lib. iij. arida seorsim primū terito, deinde ærugi nem, nitrū, & sal, simul in mortario leuissimē cōteri to, & mox affusa aqua rursus probē terito, & mox oleū quoq; ammisceto, ut strigmentitiā cōpages fiat, postea simul omnia in fictilē ollā cōfecta lento igne ad aque cōsumptionē coquito. postremū propolim præmolliā adiecto, & ablato ab igne medicamento ac tepefacto, simū columbinū inspergito, ac cōmisce to, & hoc linteo illitū, fastigiato ac molliori absces sus loco imposito: sit autē spleniū ex eo illitū minu tū, & aliud amplū ipsi superponatur, cui emplastrū ē succis, aut melle, aut melinū Serapionis, aut Mna seæ, aut aliud mollitoriū sit inductū. Aliud perforās.

Ceræ unc. xvi. salis cōmunis, cerussæ, sin. dra. xv. cineris farmetorū uitis, harundinū Græcarū ustarū, æruginis, nitri rubri, sing. dra. x. Singulis seorsim tri tis, deinde permixtis aquā affundito, & ad strigmen titiā spissitudinē cōterito. Postea cerussam cum olei quincunce aliquatenus coquito, & deinde cerā addi to, simulq; bullire sinito, donec non amplius inquī nent, & ad reliqua trita ammisceto ac utitor. Aliud, perforās arundines & aculeos, & quæcūq; infixa, ac in profundo herētia extrahēs, & ulcera glutinās. Bi tuminis, nitri, sing. dra. xxv. aristolochiæ drach. xii. baccarū lauri dra. xx. præpara & utere. Aliud. Fi mi columbini, nitri, sing. drach. iij. caricas numero v. ii. nitrū & simum simul terito, & postea cū caricis cōtulis subigito, & linteo inducto, & si durius uide bitur, mel & axungia depuratā addito. Hoc eadē die

dissipat ac rūpit. Oribasij ruptoriū. Picis liquidæ, pi cis sicce, propolis, portiones æquales unito, & adhi be to: rūpit & ad cicatricē perducit. Aliud eiusdē, ex trahit, rūpit, & glutinat. Ammoniaci thymiamatis, propolis, aluminis, sing. sextācē, thuris sesquidrach mā, galbani, auripigmenti, sing. dra. i. Emplastrū ru ptoriū. Succū ranunculi, auripigmenti, chalcitidis, la thyridis, squamæ æris rubri, uentriū cātharidū, sing. un. i. calcis uiuæ dra. ii. excipe cedria. Vsu tempore spleniū dimidiū digiti latitudine, & longitudine quā ta uidebitur, ex eo illinito ac imposito, & empla strū ex succis emollitū superimposito. Sinatur autē ad horas iij. uel v. & caueatur ne neruus, aut uena, aut arteria attingatur, neue prius adhibeatur quā m maturus fuerit abscessus: hoc etiam strumas rūmpit.

Aliud, Oxyntirū appellatum. Cerussæ un. xx. salis fossilis dra. vii. nitri quadrantē & semunciā, olei ue teris trientē, aceti heminā i. omnia simul coquito do nec nō amplius inquīnent. Aliud sine molestia rum pens. Cere, nitri, sing. dodrātem & semunciā, secle ul ni uisæ un. xiiij. auripigmenti dra. vii. olei antiqui lib. i. liquabilia liquefacto, & ad arida trita ammi sceto. Aliud ad strumas, ac omnē duritiā: aut enim discutit, aut molliat, & rūpit, purgatq; ac sanat. Succū potamogitonis, stratiotæ, ceparū acerrimarū, ceræ, propolis, pollinis tridci, sing. un. xvi. fermenti acidī, serapiadis tritesticularis, sing. sexuncē, tragacanthæ, resinæ pinus, sing. quadrātem. Aliqui etiā horū sex uncem adiungunt, galbani, opopanacis, olei antiqui, sing. dodrātem. Tragacanthā in parte aliqua succorū madefacto, similiter opopanacē, & galbanum seor sim madefacto ac terito, & his postea fermentū cum succis subactum ammisceto: postea oleo & resinæ li quatis & excolatis, propolim emollitam adiecto, & ad hæc tritici pollinē inspergito & unito: postremū omnia in mortariū trāsata manibus probē subigito. Aliud, abscessus dissipās, uel rūpens. Vitrū, specu laris præsertim lapidis minutissimē tritum, & thus, æquis partibus cū aceto probē trita, pēna illinito. Ru ptoriū efficax. Bulbū Aphricanū, nasturtiū, nitrū, si mū colubini, ficus aceto præmaceratas, axungia de purgatā, æquis portionibus oīa cū melle ad empla stri formā subigito, ac imposito pro partis ratione, quā rūpi uoles. Aliud, discutēdi ac extrahendi uires habēs. Ad strumas & gutturis tumore mirū in mo dū cōmōdū: olei ueteris lib. iij. plūbi lib. ii. coquito simul donec nō amplius inquīnēt, deinde terebinthi nē, galbani, sing. sexuncem, ammoniaci thymiamatis sextātem ammisceto, ac utitor. Aliud Oribasij. Can didum canis sterēus terebinthina excipe, & impone.

Emplastra discussoria & attractoria. Cap. xviii.

Qui cōpositorū pharmacorū facultates descripserunt, quædā emplastra attractoria appellauerūt, sicut quæ dā discussoria: aliquibus uerō testimonium præbue runt utriusq; facultatis: sunt em̄ uicinæ inter se facul tates, attractoria ex profundo, & discussoria attra ctorū. Nam quæ attrahūt, omnino etiā discutunt, & quæ discutūt, etiā attrahunt. Et prædominatur in dis cussorijs quidē medicamētis facultas discussoria. In attractorijs uerō attractoria: attractoria porrō ex simplicibus cōposita sunt, quæ uim habent humorū superfluitates ex profundo ad cutem attrahendi. Di scussoria autē ex his quæ uim habēt discutiendi atra ctæ. Quò itaque emplastri forma fiat, aliq; spuma are

gēd miscetur, alij resina, alij oleum, alij cera, alij pix: quum talia neq; discussoria memorabilē, neque attractoria usm habeāt, quemadmodum propolis, galbanū, calx, medullā, alij petre flos, spuma nitri, acetum, piper, sinapis, herba lanaria, sal cibarius & ammoniacus, & multa huiusmodi quae in superioribus Sermonibus de simplicibus commemorauimus. Ceterū aliqui adstringentia medicamentā attractoria ammiscuerunt, uerū id quod fieri solet, in his quibus superflui sunt humores: attrahūt enim aliquādo plus quā cōuenit, ut ne solū ex parte quae curatur a profundo attractionē faciāt, sed etiā ex omnibus circūsis eliciāt. Eius uerō meminisse oportet, quod supra de incarnatibus medicamentis relatum est, attractoria & discussoria, & quae magis quā oportet detergēt, omnia fieri incarnata per ceram ammixtionē, ita ut his quae sorta sunt, amplius, quae uerō debilia, minus de cerato ammiscatur. Atq; hac ratione diuturna ulcera cicatrice respuētia, putrida & serpētia, per emplastra ex sale, ac reliqua huiusmodi, cerato ammixto repurgātur, & cicatrice includuntur. At si medicamento attractorio aut discussorio ammixtū fuerit aliquod adstringens, eo pharmaco nō est utendū ad incarnandum, eo quod facultas adstringendi, ad uulnera quidem glutinanda, & sinus, & ad ulcera cicatrice includenda utilis est, uerū inutilis ad incarnandum: ceterum emplastra attractoria ac discussoria faciunt ad omnes panos, ac inflammationes induratas, ad furunculos, strumas, atheromata, hominum ferarumq; morsus glutinant etiā sinus, quibus asperi aut flaccidi ac maridi calli insunt. Podagricis itē ac arthriticis in declinatione auxiliantur. Frigidos enim & crassos humores ab articulis exugunt. Et si discussoria ac attractoria medicamenta in memoriā reuocaueris, tum supra relata, tum describēda, facile fuerit eorum utilitatem ac usum comperire. Emplastrum, ad omne panorū genus discutiendū & attrahendum, quod ab abscessu etiā in pus trāsmutato, cicera cutis celsurū, pus uelut per colum exugit. Desiccet etiā sinus forinsecus impositū efficacissimē. Radicū siccarum hyoscyami, & cucumeris syluestris, farinae ordeī, singulorū quincuncem, terito & cribrato, ac hyoscyami succo aspergit, & in pastillos cogito, eosq; in umbra quotidie uersando siccat, & usus tēpore aqua diluito, ac crassus illinito. Ego uerō inquit, etiā corticem radicis capparis dra. i. & succi scamini dra. i. si habere potui, adieci. Emplastrū attractoriū album. Ad strumas ac parotidas & particulares abscessus. Facit & ad fistulas ac ægilopas, ut cicera sectionē liberet. Facit & ad fluida ac ægrē curabilia, & ad hydropicos. Spumae argenti, cerussae, salis, singulorum drach. x. x. olei ueteris libras duas, singula seorsim trita cū oleo in mortario subigito, tum in ollā confecta, assidue agitādo coquito, donec nō amplius inquinent, & in mortariū trāslata frīgēfacta q; probe tundito, mollito, ac uitior. Aliud, occultos abscessus discutiens, rosaceo dilutum duritias dissoluens, uetera ac putrida ulcera repurgans ac incarnans. Cerussae, ceræ, singulorum lib. ii. olei ueteris libras iii. atramenti futuri, salis cōmunis, singulorum sexuncem, nitri lib. i. acci quantum satis est, cerussam cum oleo ad bonā compagē coquito, deinde ceram adiecto, & hac liquata ad arida trita in mortarium diffundito, & omnia probe subigito,

uniso, ac uitior. Aliud, attrahens, rumpens, ac cicatricem inducēs. Pidis siccae, pidis liquidæ, propolis, æquales portiones cōmixto ac uitior. Aliud attractoriū, huius Philagrius testimonium præbet. Irisidis, mānæ thuris, spumae nitri, pumidis, singul. drach. vii. ammoniaci thymiamatis drach. x. x. v. galbani drach. vi. cāchryos drach. x. ii. ceræ dra. o. olei lib. ii. æstate uerō unc. x. v. ceræ cum oleo liquata ac excolata, ammoniacū tritum adiecto, & eo liquato galbanum præmolitū addito, & ab igne ablata aridis minutissimē tritis ammisceto, ac simul commollito.

Andromachi Melinum, abscessus profundos resorbet, & habet exactam ponderum proportionē. Facit ad strumas, ganglia, meliceridas, atheromata, panos, parotidas, furunculos. Perforat abscessus, fistularum callos atterit, sinus glutinat. Cerussae, salis fossilis, olei antiqui, singul. lib. i. ceræ, colophonis, singulorum quincuncem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, opopanax, galbani singul. unciam i. Sal tritum, & cribratum, ad minutissimum puluillum redigito: deinde cum aqua marina præsertim probe subigito, & cerussam simul terito: deinde oleum affundito, & omnia probe unita ad bonā compagem coquito, & adiecto ammoniaco bullire finito, donec non amplius inquinent. Postre mum liquabilia liquata cum galbano & opopanax ce madefactis ac præmolitis ammisceto. Aliud, ad strumas, gangrænas, antiquas, & chironia ulcera.

Spumae argenti, olei antiqui, auripigmenti, singul. lib. i. Spumae argenti cum oleo coquito, donec nō inquinet, & ab igne ablatis, auripigmentum cum olei sextante tritum adiecto, & ebullire finito, donec medicamento nigrescat, & postea in mortariū trāslatum primū pistillo, deinde manibus diligēter subigito ac uitior, ad strumas quidē ac duritias sincero & meraco: ad podagras uerō & ulcera, cum oleo diluito. Facit & ad carbunculos. Aliud attractoriū, Orisbani. Spumae argenti, cerussae, nitri, ceræ colophonis, ammoniaci thymiamatis, singulorū trientē, olei ueteris lib. iii. spumae argenti, cerussam, nitrū, oleū, cum lixiuū ē cinere ficulneo libris duabus coquito, donec nō amplius inquinent, deinde ammoniacum tritū, postea cerā, mox colophoniam adiecto. Præstat tamē pro nitro, spumam nitri inijcere. Aliud, ad strumas, ganglia, parotidas, mammarum abscessus, mirissimē efficax: tumores enim dissoluit, & impactum humorem per occultos meatus educit, sinus agglutinat, fistulas & ægilopas cicera sectionem curat. Cerussae, bithynae, nitri sului, olei ueteris singul. lib. i. aquae hemina i. Andromachus pro aqua lixiuū ponit. Nitru tenuissimē terito per se, & mox cū aqua, ut penitus diluatur, & postea in fictili coquito, & coopertū per intervalla uersato, & post sedatū feruorē, liquabilia liquefacta affundito, assidue q; agitādo donec nō amplius inquinēt, & in mortariū trāslata, frīgēfacta probe emollito. Aliud, quo Menecrates utebatur. Ad strumas ac mammarū duritias, peculiare auxiliū: tumores em discutit, & ferē non rumpit, sed tenuissimas rumulas infert, per quas uelut per colum impactus humor excernitur. Sinus etiā glutinat, & ad cicatricē perducit. Ceræ, ceribithynae, spumae nitri, galbani, resine pinus, olei antiqui, singul. lib. i. cineris quercini ac ficulnei, singulorum sextarium unū. Pēdet autē cineris sextarius unc. x. Liquabilia liquata ac

ta ac excolata coquito, deinde galbanum præmolli-
tū adijcito, & ab igne ablatis cineres ammisceto, &
probe subigito, & uictor, ita ut primum quinta die,
postea tertia exoluas, donec tumor perforetur. Dein
de uerò quotidie soluas ac cures. Aliud attractoriū
ac discussoriū efficax. Abscessuū humores citra ru-
ptionē per cæcos meatus uelut excolat, ac diffundit.

Olei antiqui unc. x xii. ceræ albæ uncias x v. aphro-
niri albi quadrātem, terebinthinæ librā i. lixiuū ē ci-
nere quærneo aut ficulneo sextariū i. spumā nitri, si-
ue aphronitrum cū lixiuō per pistillum ad strigimē
titiā compagem terito. Cerā uerò cum oleo liquefa-
cito, & terebinthinā ammisceto, & ab igne ablatis,
alsidueq; uersatis ac frigefactis, spumam nitri ammi-
sceto, subigito, ac residuū lixiuū paulatim adstilla-
to. Aliud, Dionysia inscriptum. Hic Cappadocis
confert ad relatas affectiones, & ad mammarum ac
aliarum partium induratas inflammationes præci-
puum est. Ceræ, terebinthinæ, mænæ thuris, spumæ
nitri albi, sing. lib. i. olei antiqui lib. ii. aque siue lixi-
uū coactiliariū sextariū i. misyos crudi sextariē.
Misy & spumam nitri cum dimidiā lixiuū parte te-
rito. Ceræ uerò cum oleo liquatæ terebinthinā adij-
cito, ac paulatim ad compagem coquito. Et ablatis
ab igne, mannam thuris inspergito, & alsidue agitā-
do frigefacto, & ad reliqua prius trita ammisceto,
residuū lixiuū paulatim instillādo, donec totum fue-
rit absorptum. At ubi inflammatione discussa, & do-
lore sublato, durities aliqua restiterit, hoc medicamē-
tum remouebis, & pro eo melinū, aut Venus inscri-
ptum, aut aliud emolliens ac discutiens adhibebis.

Aliud attractoriū ac discussoriū, longo usu cogni-
tum. Colophonix lib. i. ceræ sesquiuncā, nitri sexun-
cem. Olei hyeme quidem cyathū i. æstate uerò dimi-
diū. Nitrum cum aqua, uel posca, uel aceto tritum,
prout res postulat, cum liquabilibus liquatis cōmi-
sceto, ac manibus subigito, obseruando ne nimia
aque copia ad nitruū affundatur, & in pastillum cogi-
to. Facit hoc ad carbunculos, furunculos, strumas,
abscessus, fistulas, & gilopas. Humore per cæcos mea-
tus citra ruptionē exugit, ut emplastro impactus ui-
deatur. Emplastrū Piscatorium inscriptū. Nitri unc.
i. salis cōmunis, cerussæ, singulorum drac. viii. pro-
polis drac. x xiiii. galbani drac. viii. medullæ cerui-
næ lib. i. olei ueteris lib. ii. aristolochiæ unc. i. Erīt au-
tē medicamentum præstātus, si pro oleo medulla su-
matur, ut sint medullæ lib. iiii. Aliud Piscatoriū, lō-
go usu constans. Nitri dra. x viii. stercoris columbi-
ni, salis cōmunis, cerussæ singulorū dra. viii. Aristo-
lochiæ rotundæ drach. x viii. propolis dra. x xiiii.
galbani dra. x xvi. medullæ taurinæ, olei antiqui,
singulorum lib. iiii. Cerussam, sal, nitrum, singula
seorsim trita, ad emplastri compagem simul coqui-
to, & postea propolim ac galbanum adijcito, & ab-
latis ab igne, stercus columbinum & aristolochiam
ammisceto. Aliud, ad strumas, & reliqua huius-
modi usu cognitum. Ceræ libr. i. colophonix dextiā-
tem, auripigmenti, galbani, opopanacis, myrrhæ,
halcyonij, sing. unc. i. adaræ sextantem, floris salis,
misyos, singul. sesquiunciam, aramenti sutorij, alu-
minis scissi, singul. sextantem, & scrup. vi. aluminis
rotundi, aluminis liquidi, singul. unc. i. & scrup. iiii.
sulphuris uiui sextantem, & scrup. vi. nitri drachm.
x viii. salis communis drachm. x lvi. terebinthinæ

quadrantem, olei lib. i. aquæ marinæ lib. i. & sextan-
tem. Colophoniam cum oleo dissoluito, deinde ce-
ram, mox terebinthinam adijcito, & simul ebullire
finito, & ab igne ablata, ad arida prius seorsim, &
postea simul cū aqua marina trita ammisceto, subi-
gito ac uictor. At uerò ubi superficiem ignitā, & lo-
cum ruptione uideris, infra scriptum emplastrum ad-
hibeto. Spumæ argenti, plumbaginis, singulorum
lib. i. picis sicæ, galbani, chalcitidis crudæ, æruginis,
squamæ æris rubri, mænæ thuris, singulorū drac.
x xii. salis assati, uisci, singulorum drachm. lxxii.
olei lib. ii. Spumam argenti, plumbaginem, chalcit-
idem, squamam, cum oleo coquito donec nō inquie-
nent, & ad compagem redacta fuerint. Deinde liqua-
bilia ammisceto, simulq; paulatim bullire finito. Po-
stea uiscum adijcito, & demum arida addito, ac frigefac-
tum medicamentum manibus subigito, ac uic-
tor, usque ad sanationem.

Emplastrum Nechepsonis, ē cupresso. Cap. xix.
Facit ad strumas, tumorem gutturis, parotidas, omnē
duritiā, & totum laxorum tumorum genus. Cu-
pressi folia ualentia in uigore minutissimè terito, uel
no insperso quod a uinacis post primi uini colle-
ctionē exprimitur, efficitq; solidi strigmenti crassitu-
dinē, ac locis affectis imposito: omnem enim tumo-
rem discutit, & si strumis imposueris, tertia die solui-
to, strumasq; cōtractas, & uicinas ac incubentes par-
tes desquamatas cōperies. eas itaq; digitis exprimito
ac dissoluito, & medicamētu rursus adhibeto, ac ter-
tia die rursus soluito, iterūq; ualidissimè exprimito,
& tertio medicamētu adhibeto, ac similiter exolui-
to. Intra septē enim aut summū nouem dies, strumæ
abolebuntur. Vtere hoc auxilio uelut admirādo, &
tanquā naturalē quandā proprietatē habente, aduer-
sus hanc affectionem. Nā si aliquid ammiscere, aut
aliquo modo ipsum permutare uolueris, magis offi-
cies quā proficies. Facit & ad gutturis tumore ex-
tra fauces prominentē, & est eodem penitus modo
adhibēdū cum digitorum pressione, uelut diximus:
contrahit enim ac discutit, siccātq; ac tumorem extir-
pat, & uasa materiā ad affectum locum afferentia cō-
stringit. Confidenter igitur eo utaris: promissioni-
bus enim nostris experientium testimoniū dabit.
Emplastrū ē Cappari, Oribasij. Plumbaginis, olei
antiqui, sing. lib. ii. salis communis lib. i. ceræ sexun-
cem, resinæ pinus tridentem, squamæ æris, corticum
radicis capparis, singulorū quadrātem. Aristolochiæ
rotundæ sextantem, propolis tantundem, galbani unc.
i. Squamam & plumbaginem tufas ac cribratas, &
sal primum seorsim, deinde simul cum his tritum, cū
oleo in mortario probe subigito, & in ollam conie-
cta coquito, donec nō amplius inquinent. Deinde ce-
rā, resinā, propolim, liquatas ac excolatas, & mox
galbanum adijcito, & ablatis ab igne aristolochiam
ac cortices capparis tritas inspergito, unito, frigefac-
to, emollito, ac uictor. Facit ad duritiās, coxendicum
affectiones, hemi-craneas, ac hydrocephalam in pue-
ris aquosam capitis affectionē: abrasis enim capillis
capiti impositum, humorem exugit. Glutinat etiam
sinus: aliqui etiam sine cera præparant. Empla-
strum ex Agarico, occultos abscessus & omnem hu-
miditatem resorbens. Ceræ, colophonix, picis, spu-
mæ nitri, thuris, agarici, singulorū lib. i. terebinthi-
næ, uisci quercini, singulorum sex uncem, medullæ

ceruinæ tridentem, œsypi quadrantem, grani cniđi, pyrethri, galbani, singulorum sextantem. Liquabilia liquato & excolato, & ab igne amotis uiscum adñcito, coq̃ liquefacto, arida ammisceto, subigito, ac utitor.

Apochymatis preparatio, Oribasij. Cap. xx.

Picis aridæ lib. i. picis liquidæ, ceræ, singulorū tridentem, resinæ pinus sexuncem. Omnia liquata & excolata in peluim aquæ marinæ siue communis plenā mitito, & manibus uelut pastillū subigito ac utitor. Emplastrum eiusdem, ad collisa, mitiganda, irrigationis uicem supplens. Spumæ argenti lib. ii. strigmentorum balnei excolatorum lib. vii. aquæ marinæ ē pelago haustæ sextarios ii. colophoniz unc. xvi. ceræ sextantem, squamæ æris quincuncem. Spumam argenti, squamam, strigmenta, aquam marinam simul coquito, & arundinibus uirentibus agitato, donec non amplius inquinent. Deinde cerā ac resinā adñcito, & rursus ad bonam compagem coquito, & irrigationis loco utitor. Ego uerò etiam olei lib. ii. adñclo. uerum inter emolliētia emplastra Oribasij, hac serie reperitur. Strigmentorū lib. iii. s. aquæ marinæ, olei antiqui, spumæ argenti, colophoniz, sing. lib. ii. ceræ lib. i. æris usti, ammoniaci thymiamatis, singulorum sextantem. Facit inquit, ad duritias, & præparatur uelut dictum est.

Cerata utilissima. Cap. xxi.

Basilicū tetrapharmacū. Ceræ, colophoniz, picis, adipis taurini, æquales portiones. Macedonicū. Ceræ, colophoniz, picis, adipis taurini, thuris, æquales portiones. Liquabilibus liquatis & ab igne amotis, thus inspergito ac infarcito. Macedonicū Azanitzæ, ad multa commodum & insigne. Picis sicæ unciam unā, ceræ quadrantem, adipis suilli antiqui & expurgati sexuncem, adipis taurini, œsypi, singulorum quadrantem, resinæ pinus siue picæ quincuncem. Liquefacto ac utitor. Facit ad omnia maligna, ad gāgrænas, fistulas, uulnera recentia, ambusta, perfrigefacta, uelut acopon lassitudinē eximendæ destinatum. Est & pessus mollitorius. Conuenit etiam ad uteri ulcera, panos, parotidas. Et ubi caua fuerint ulcera, maiori eius copia utendum est. Vbi uerò propē cicatrix inducta fuerit, pauciore. Aduersatur huic pharmaco oleum, quare hoc uitabis. Maxime autē facit in his quibus plaga circa neruos aut musculos est.

Heptapharmacum laxans, suppurans, incarnans. Cap. xxii.

Cerussæ bessæ, spumæ argenti tridentem, ceræ, picis, colophoniz, adipis taurini, thuris, singulorum sextantem. Liquabilia liquata cum aridis unio, atq̃ usus tempore medicamenti quidem ac ceræ singul. unc. i. olei uerò rosacei tridentem accipito ac utitor. Quod si laxandi uim intendere uolueris, oleum Irinū aut sicynium, aut gleucinum sit, & maiore copia sumatur.

Enneapharmacum, Hori Mendesij. Cap. xxiii.

Hoc suppurat & laxat, præcipue neruis per cōsensum affectis. Ex eodē fit & pessus, siue pessarium ad sedis affectiones cōmodum. Adipis anserini, uiculi, butyri, medullæ ceruinæ, ceræ, terebinthinæ, olei rosacei, cicini, mellis, singulorum portiones æquas liquefacto, unio ac utitor.

Emplastrum Philosophi.

Cap. xxiiii. Facit ad calcitratus, uulneraq̃ tumida. Rūpit, pus educit, cicatricem inducit. Hyoscyami perdicij, & sideri

tidis folia recentia, æquis portionibus conterito, & panem filigineum rufum ac cribratum, unius herbæ portione adñcito, omnia simul cum axungia subigito, & ad emplastri formam redigito, & utitor uelut admirando.

Œsypi preparatio.

Cap. xxv.

Huius quidem optimam præparationē in secundo libro descripsimus: ex lanis enim succidis paratur. uerum ubi illud haberi non potest, accipe hoc quod ita parari solet. Meliloti tridentem, cardamomi, hyssopi herbæ, singulorū sextantem, lanæ succidæ ex alis ouium sumptæ tridentem, colophoniz, ceræ, resinæ pinus, singulorum dextrantem. Olei dulcis lib. ii. aquæ sextarios iii. melilotū, cardamomum, lanam, & hyssopum, per triduum aqua macerato, deinde ad tertias coquito, & excolato. Postea liquabilia liquato ac excolato, & succum ac oleum ammisceto, & omnia simul ad succi consumptionem ebullire sinito.

Emplastrum Manus appellatum. Cap. xxvi.

Hoc emplastrum à quinque rerum speciebus quas recipit, Manus appellatur. Colophoniz lib. v. ceræ lib. iii. resinæ pinus lib. iii. adipis taurini lib. ii. butyri lib. i. liquefacto ac utitor.

Emplastrum Bromium appellatum. Cap. xxvii.

Fœni græci, seminis lini, succi althææ, singulo. lib. i. simul ad succi consumptionem coquito. Et colophoniz, resinæ pinus, singulorum quadrantem, ceræ sexuncem, galbani tridentem, liquefacto & ammisceto ac utitor. Aliud optimū. Seminis lini, althææ, fœni græci, singulorū tridentem, in duobus aquæ sextariis macerato, & de expresso succo sumito. lib. i. ceræ lib. i. resinæ pinus, colophoniz, singulorū sexuncem, galbani sextantem, opopanacis unc. i. præpara & utere.

Emplastrum ex ouis. Cap. xxviii.

Spumæ argenti, cerussæ, singulorum tridentem, cadmiæ sextantem, ceræ libram i. rosacei lib. ii. ouorum candida x. metallica cum aqua ac uino terito, deinde cū ouorum candidis subigito, & liquabilibus liquatis ammisceto, unio, ac utitor.

Parhygrum Galeni. Cap. xxix.

Spumæ argenti, cerussæ, singulor. lib. i. olei purissimi, aquæ, singu. lib. ii. Ego uerò, inquit, sæpe olei quidam lib. i. adipis uerò anserini sexuncem ammisceto, aut si is desit gallinacæ, aut hoc quoq̃ deficiente, suillum recentem accipio. Omnia simul ad prunas sumum non edentes citra solidam compagem coquuntur, & in cocturæ fine, aliquādo etiam amyli sexuncem adñclo. Si itaque adipem receperit hoc medicamentum, maiorem mitigandi uim acquirit, & dolores ex uulnere inflammato obortos sedat. Sed ad cicatricem inducendam inutile est. At uerò aquam addere frigiditatem satis constat.

Emplastrum ex ouis, Oribasij. Cap. xxx.

Ceræ unc. i. spumæ argenti, cerussæ, amyli, singulorū sextantem, oua numero iii. rosacei lib. i. oua in præparatione postremum addantur.

Parhygrum Oribasij. Cap. xxxi.

Facit hoc ad spontanea ulcera in corporibus delicatis. Adipis suilli recentis deuncem, ceræ sexuncem, cerussæ, spumæ argenti, singul. unc. x. liquida cum aridis committito. Facit & ad ulcera serpentina. Et cum rosaceo dilutum uuluarum ac sedis affectionibus medetur, & malignas faciei pustulas curat.

Emplastrum

Emplastrum Rosaceum inscriptum. Cap. xxxii. Hoc mammarum duritias discutit, & est ad sedis affectiones efficacissimum, si cum rosaceo, aut myrteo oleo diluatur. Spumæ argenti, cerussæ, adipis suillæ recentis, singulorum sexuncem, olei ueteris sesquialibram, myrrhæ drach. iiii. ouorum crudorum uitellos duos. Reliquis ad bonam compagem coctis, ac frigefactis, oua cum uino albo trita ammisceto, & utitor hoc medicamento aliquando sincero, aliquando diluto.

Emplastrum Phycotuche appellatū. Cap. xxxiii. Ad omnia ulcera, & præcipue in sede commodum est hoc emplastrū. Croci unc. i. cerussæ, spumæ argenti, medullæ ceruinæ, adipis anserini, ceræ, singulorum sexuncem, rosacei uncias xxxvi. ouorum candida xxx. uini quantum satis est.

Emplastrum Sphærium appellatū. Cap. xxxiiii. Hoc irrigationis uicem supplet. Facit ad desquamata, excoiata, intertrigines, ambusta, ad flagellatos, ad tibias collisas. Spumæ argenti, cerussæ, calcis uiuæ, singulorum quadrantem, ceræ sesquunciam, nitri unc. i. olei rosacei unc. i. Aridis minutissimè tritis si quida ammisceto, & sphærisa, hoc est, pilulas formato. Vsu uerò expetente olei sexuncem, rosacei quadrantem, ceræ sextantem, ad prunas liquefacito, & medicamenti sextantem adijcto, spathulæque agitato, & ubi frigefactum fuerit medicamentum, cum aquæ dodrante contundito.

Emplastrum pentatheton. Cap. xxxv. Ceræ, picis, colophonæ, adipis taurini, calcis uiuæ, æquales portiones. Liquabilia liquato, & calcem adijcto. Vsus autem tempore olei sexuncem, ceræ sextantem, olei sicyonij quadrantem, liquefacito uelut proximè dictum est, & medicamenti sextantem adijcto. Facit ad uibices flagellorum, ad eutem excoiata, & ad collisa, ac cætera huiusmodi.

Emplastrum ex Ochra. Cap. xxxvi. Easdem cum prædictis uires habet etiam hoc. Ochreæ lib. ii. cretæ, ceræ, singulorum lib. i. colophonæ, picis, resinæ pinus, singulorum lib. i. spumæ argenti, cerebintinæ, singulorum bessem, olei lib. ii. arida cū uino terito, & liquabilia liquata ammisceto, & in massas efformato. Vsu uerò postulante, ceræ lib. i. olei ueteris lib. ii. liquefacito, & excolato, & medicamenti lib. i. ammisceto, & uino adstillato contundito.

Emplastrum Telamonium. Cap. xxxvii. Hoc carbunculis medetur. Dilutū sinus siccet, & cicatricem inducit. Spumæ argenti, calcis uiuæ, ceræ, resinæ pinus, singulorum dodrantem, cerussæ unc. xxxv. olei sesquialibræ. Spumæ argenti cum oleo ad compagem coquito: deinde ceram, ac resinā adijcto. Postea calcem, & cerussam minutissimè trita ammisceto, ac utitor. Et ad carbunculos quidē linteo inductum imponitur. Ad reliqua uerò, rosaceo aut myrteo oleo, ad strigmenticiā compagem dilutum adhibetur.

Pilarium ex recremento argenti. Cap. xxxviii. Recrementi argenti sexuncem, ceræ, adipis taurini, singulorum quincuncem, colophonæ trilentem, picis, olei, singulorum sextantem. Argenti recrementū uino, aut foeni græci succo teritur. Quod si non possit haberi argenti recrementū, plumbaginem pro eo accipimus. Facit ad desquamata, ac excoiata, & his similia.

Emplastrum ex pompholyge. Cap. xxxix. Hoc longo usu constat eunuchorum, mulierum, pue-

rorum, ac aliorū mollium corporum ulceribus conuenire, ad cicatricem citra dolorē inducendam, & ad cancerata ulcera tutò adhibetur. Cerussæ, spumæ argenti, pompholygis, singulorum sextantem, cadmiæ trilentem, medullæ ceruinæ quadrantem, ceræ, olei rosacei, singul. lib. i. olei myrtei sexuncem. Metallica trita, ac cribrata, & cū uino subacta, liquabilibus liquatis ammisceto, ac utitor. Aliud Archigenis, & Oribasij. Pompholygis, cerussæ, spumæ argenti, singulorum unc. i. ladanī sextantem, acadæ trilentem, ceræ quadrantem, olei myrtei bessem, ouorū assatorum uitellos ix. uini quod satis est. Aliud Oribasij. Spumæ argenti, cerussæ, singul. sextantem, pompholygis unc. i. croci unc. i. ceræ unc. i. adipis anserini quadrantem, ouorū assatorū uitellos iiii. Rosacei, uini, quod satis est.

Emplastrum rutaceum. Cap. xl. Hoc ad fistulas scabras facit. Cadmiæ, spumæ argenti, recrementi argenti, sulphuris uiui, singulorum sextantem, aluminis scissi, rutæ uiridis, singulorum unc. i. ceræ bessem, olei myrtei lib. ii. uini quantum satis est.

Ceratum è perdicio. Cap. xli. Facit ad sinus. Foliorum perdicij lib. ii. ceræ, colophonæ, olei, singulorum lib. i. Herbā exactissimè terito, & liquida ammisceto, & in mortario unito. Hoc in aliquibus ob nimiam uim repellendi, uicinos locos inflammat, & materiam eò colligit. Quod ubi conigerit, ad locum quidem inflammatum, idem medicamentum imposito: uerū ad sinus osculum emplastrum è lolio, aut quod Venus inscribitur, aut quoddam attractorium adhibeto.

Ceratum è succo betæ. Cap. xlii. Facit ad uulnera inflāmata, ad achoras capitis ulcuscula, & ad ambusta. Ceræ libram unam, olei sesquialibræ, liquato, ac excolato, & ab igne ablatis, betæ succum quantum imbibere possunt affundito, & in mortario subigito. Præstat autem paulatim succum cerato instillare. Aliud è succo plantaginis, ad inflammationes, & sinus. Ceræ lib. i. olei lib. ii. s. succi plantaginis quantum satis est. Ceratum liquefactum & in frigidā aquam diffusum, aqua sæpe permuttera probè lauatur, & postea in mortario pistillo tunditur, ac subinde plantaginis succus paulatim instillatur, quantum eius imbibere potest. Ceratū Myrteum, ad oculorum inflammationem, & cicatricem inducendam, ad intertrigines, ac scabiosas affectiones commodum. Ceræ lib. i. olei myrtei lib. ii. plumbi usti sexuncem, cerussæ, spumæ argenti, syriaci, singulorum unc. i. uini quantum satis est ad conterendū. Melinum cicatrices inducens. Chalcitidis crudæ sexuncem, cadmiæ quadrantem, ceræ lib. i. olei myrtei lib. i. uini quod satis est.

Ceratū ex sandyce, Homo appellatū. Cap. xliii. Hoc ulcera diuturna, ac maligna, & in tibijs oborta, solum per se adhibutum ad cicatricem perducit. Sandycis lib. i. olei dulcis lib. ii. coquito, donec non amplius inquinent, & utere confidenter.

Emplastrum ex allijs. Cap. xliiii. Hoc uim attractoriā habet. Facit ad omnē duritiā, abscessus, furunculos, strumas, inguinū tumores, fistulas, impetigines humidas, mām̄as induratas. Ceræ lib. ii. colophonæ sexuncem, medullæ ceruinæ trarundem, nitri albi bessem, allia uiginti, olei lib. iiii. Allia depurgata in oleo coqto, donec torrefiāt, deinde ad oleū excolato liquabilia adijcto, & postea

nitrum tritum adijcitur, ac utitur. Nos uero ita praeparamus: Ceræ, colophonæ, olei, singulorum quincuncem, nitri sexuncem, medullæ ceruinæ sextantem, alliorum nucleos x x x. præpara & utere, præsertim ad fistulas: humorem enim attrahit, quem quotidie crebro detergere oportet. Hoc solū citra alterius opem extrahit, incarnat, & cicatricem inducit. Aliud Oribasij, ad pustulas, intertrigines, ambusta ab igne, pernioles non exulceratos, ad bullas nondum apertas, ad cutis tibiæ excoctionem, ad ulcera antiqua, & proserpentia sub cute. Recrementi plumbi trientem, aut quadrantem ad ceratum ammisce-to, quod habet ceræ bessem, aut sextantem, adipis suilli recentis, olei myrtel, singulorum sextantem, aut quadrantem. Quod si cicatrix inducenda est, absque adipe præparetur.

Emplastrum è scilla, Asclepiade. Cap. XLV.

Hoc ad fistulas, sinus, nomas, & putredines facit. Viscerum emolliens contrahit, ad fistulas angusta oscula habentes collyriū ex eo formatū inditur. Si uero lata ac ampla fuerint oscula, rosaceo dilutum adhibetur, eloto prius sinu siue fistula cum posca, aut uino mulso, iniectum, locusq; emplastro munitur, ac deligatur: hoc enim modo incarnat, ac replet fistulosa capitis ulcera. Cōuenit & nomis, si membrana non fuerit denudata. Idē sincerū ad capitis fracturas adhibetur, & ad anhelosos ac orthopnoicos amplis splenis inductum pectori imponitur: cōuenitq; omnino ubi ad superficiem materias attrahere uolumus. Scillæ repurgatæ quincuncē, squamæ æris, iridis, singulorū quadrantē, myrrhæ drach. x viii. ammoniaci thymiamatis drach. xii. galbani, picis liquidæ, styracis, æruginis, resinæ pinus sicca, aristolochiæ, singul. sexuncem, ceræ unc. x x. terebinthinæ trictē, olei ueteris lib. ii. aceti acerrimi sextarios ix. aut quod satis est. Scillā ad solem æstiuū tundito, & acetū paulatim instillato, quantū satis ad exactē renderam. In alio autē mortario squamā æris, & æruginem cū aceto diutissime terito, & arida trita, ac cribrata adijcitur. Postea ammoniacū, styracem, myrrham, galbanū addito, & instillato aceto simul probe cōterito, deinde liquabilia liquefacta, iride ac aristolochia inspersis, frigefacito, & ad reliqua ammisce-to, subigito, ac utitur. Ad fistulas quidem & ossa corrupta, collyria ex eo formata indens, uerū ad ulcera repurganda sumito medicamentū trientem, ceræ sextantē, rosacei quadrantem, & pro repurgationis

ratione aliquid de medicamēto detrahito, & cerato adijcitur, donec cicatrix inducatur, ita ut postremum quū ita absoluēda est cicatrix, medicamenti un. i. olei rosacei, aut myrtel dodrantē, & ceræ trictē cōmisceas.

Emplastrum ex pompholyge, Hieræ Cappadociæ.

Cap. XLVI.

Hoc ad sedandos dolores, ac inflammationes facit, præcipue ad ulcera maligna, ac cancerata, antiquaq; ac cicatricem non recipientia. Facit & ad ambusta ab igne. Rosaceo, aut myrteo oleo dilutū cicatricem inducit, & butyro dilutū incarnat. At cum rosaceo ad omnes sedis affectiones cōmodum est. Cadmiæ bostrygidis lotæ dra. viii. pompholygis lotæ dra. vii. plumbi usti, & lori drach. ix. thuris drach. iiii. cerussæ lotæ drach. ix. spumæ argenti lotæ drach. viii. ceræ albæ drach. c. terebinthinæ chiæ drach. vii. olei myrtel drach. c lxx. Arida trita & cribrata, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, cū uini sextarijs iiii. terito: cæterū in uino hoc, infra scripta polentæ modo contusa, per diem ac noctem præmaduisse oportet. Iridis, melilori, aristolochiæ, capitorū papaueris, seminis hyoscyami albi, singulorū drach. viii. cum hoc itaq; uino excolato, metallica sicut diximus sunt conterenda, usq; ad mellis compagem, & deinde oleum myrteum adijciendum, quo illitionis spissitudo fiat. Postea uero omnia in ollam nouam coniecta lento igne ad emplastri formam, & terebinthina adiecta medicamentum ab igne tollito, ac frigefacito, subigito, & utitur.

Emplastrū nigrū, Essentia appellatū. Cap. XLVII

Facit hoc ad duritias, ad articulos, & costas fractas, gāglia, strumas, & tumores dissoluit. Tibiarū ulcera chironia & fistulas curat. Facit ad morsus ferarum. Aquæ inter cutem molem delet. Clauos sanat, aculeos extrahit. Splenis, podagricis, hepaticis prodest. Spumæ argenti, cerussæ, æruginis rasæ, singulorum quadrantem, squamæ æris sextantem, thuris masculi sextantem, & semūciām, bituminis Iudaici bessem, terebinthinæ quadrantem, ceræ flauæ, picis aridæ, singulorum libr. iiii. olei antiqui lib. i. lapidis gagatæ, lapidis asij, aluminis scissi, magnetis uiui, myrobalanorum, singulorum quadrantem. Spumam argenti, cerussam, squamam, æruginem, bitumen, & thus, omniaq; arida tundito, & in mortario aceto paulatim instillato, ad strigmentitiā spissitudinem terito, deinde ceram, picem, oleum, ac reliqua liquabilia liquata ammisce-to, unito, ac utitur.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

DECIMO SEXTO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

D E uteri situ, magnitudine, ac forma. cap. i.	ptus tempus adueniat. cap. vi.	Cura prægnatib. adhibenda. cap. xii.
Quæ intra prægnatib. uterum nascuntur. cap. ii.	Fœcundarum mulierū dinotio, Sorani. caput vii.	Note partus secundum naturam futuri. cap. xiii.
De secunda generatione. cap. iiii.	Quomodo cognoscantur quæ cōceperunt. cap. viii.	Parientibus facienda. cap. xiiii.
Menstrua mulierum purgationis ratio. cap. iiii.	Note factus masculi ac feminae. caput ix.	Cura circa ægrè parientes adhibenda. caput xv.
Note futurae uirginum purgationis. caput v.	De pica. cap. x.	Quomodo opem ferre oportet his quæ non tuto concipiunt. cap. xvi.
Quando semen appareat, & conce-	De tumoribus pedum in prægnatibus. caput xi.	Pessi sterilitatē inducentes. cap. xvii.
		Fœtum corrumpentia. cap. xviii.

Signa

- Signa futurum abortum preceden-
tia. cap. XIX.
Quomodo abrupti foetus eiectioni opi-
tulemur. cap. XX.
De his quæ bimestres aut trimestres fo-
tus abortiunt. cap. XXI.
Pariendi difficultatis causa. cap. XXII.
De foetus extractione, ac exectione.
cap. XXIII.
De secunda educatione. cap. XXIII.
Cura post foetus exectione. cap. XXV.
Causæ sterilitatis, itemq; curatio in ui-
ro, ac muliere. Notæ item conce-
ptionis. cap. XXVI.
Frigidioris uteri signa, ac curatio. ca-
put XXVII.
Calidioris uteri signa, ac curatio. cap.
XXVIII.
Humidioris uteri curatio. cap. XXIX.
Siccioris uteri curatio. cap. XXX.
Diuersarum affectionum, ob quas mu-
lieres non concipiunt, curatio. cap.
XXXI.
Potiones, pessæ, & suffitus ad conce-
ptionem. cap. XXXII.
De lactis defectu. cap. XXXIII.
Ne lac in mammis coeat in grumos. ca-
put XXXIII.
De coagulato in mammis lacte, & iisdē
turgentibus ob lactis redundantiam.
caput XXXV.
De uitiatō lacte mammæ ledente. ca-
put XXXVI.
Ad mammæ inflāmatas. cap. XXXVII.
Ad induratas mammarum inflāmā-
tiones. cap. XXXVIII.
De mammarū abscessu. cap. XXXIX.
De mammarum fistulis. cap. XL.
De mammarum nomis. cap. XL.
De exedentibus mammarum ulceribus.
cap. XLII.
De canceris mammarum. cap. XLIII.
Qui canceri curati faciles, & qui diffi-
ciles. cap. XLIII.
Canceri chirurgia. cap. XLV.
Canceri curatio post amputationem, &
inustionem. cap. XLVI.
Cancrorum curatio citra chirurgiam.
cap. XLVII.
Cancratorum tumorum non ulcera-
torum curatio. cap. XLVIII.
Canceri ulcerati curatio. cap. XLIX.
De mammis induratis. cap. L.
De menstruis suppressis. cap. LI.
Mulieribus quæ non purgantur acci-
dentia. cap. LI.
- Curatio earum quæ ob nimiam calidita-
tem non purgantur. cap. LIII.
Frigide temperature dinotio, ac cura-
tio. cap. LIII.
Pessimenses educentes. cap. LV.
Curatio earum quæ præ pinguedine nō
concipiunt. cap. LVI.
Curatio earum quæ ob plenitudinem
non purgantur. cap. LVII.
Curatio earum quæ ob maciem nō pur-
gantur. cap. LVIII.
Curatio earum quæ ob uitiosos humo-
res non purgantur. cap. LIX.
Curatio earum quibus sanguis ad na-
res, uel sedem defertur. cap. LX.
Curatio earum quæ ob nimium ocium
non purgantur. cap. LXI.
Curatio earum quæ ob aliquam uteri
affectionem non purgantur. ca-
put LXII.
De mensium stillicidio. cap. LXIII.
De nimia mensium purgatione. caput
LXIII.
De fluxu muliebri. cap. LXV.
Curatio rubri uteri fluxus. cap. LXVI.
Albi fluxus curatio. cap. LXVII.
De uteri strangulatione. cap. LXVIII.
Pessæ ad uteri strangulationem idonei.
caput LXIX.
Vnctiones ad uteri suffocationem. ca-
put LXX.
Varia auxilia ad uteri strangulatio-
nem. cap. LXXI.
De seminis fluxu. cap. LXXII.
De uteri debilitate. cap. LXXIII.
De furore uterino. cap. LXXIII.
De uteri resolutione. cap. LXXV.
De uteri prolapsu. cap. LXXVI.
De reclamatione, auersione ac recurſu
uteri. cap. LXXVII.
De uteri inflatione. cap. LXXVIII.
De uteri hydropē. cap. LXXIX.
De mola uteri. cap. LXXX.
De tumore uteri laxo. cap. LXXXI.
De satyriasi. cap. LXXXII.
De uteri inflammatione. cap. LXXXIII.
De utero in scirrhi tumorem indurato.
caput LXXXIII.
De uteri abscessu. cap. LXXXV.
Abscessus oris uteri chirurgia. caput
LXXXVI.
Abscessus uteri inter intestina, & pe-
ritonæum membranam ruptæ cura-
tio. cap. LXXXVII.
De uteri exulceratione. caput
LXXXVIII.
- Vlcerum uteri carbunculosorum cura-
tio. cap. LXXXIX.
Ad sordida uteri ulcera. cap. XC.
Ad humorem à muliebri pudendo pro-
fluentem. cap. XCI.
Ad uteri nomas. cap. XCII.
Quæ ad cicatricem ducunt. caput
XCIII.
De canceris uteri. cap. XCIII.
De uteri obturatione. cap. XCV.
De utero non perforato. cap. XCVI.
De hæmorrhoidibus uteri. caput
XCVII.
De calculo uteri. cap. XCVIII.
De calculo uesicæ muliebri. caput
XCIX.
De hernia aquosa mulierum. cap. C.
De hernia inguinis mulierum. cap. CI.
De hernia uaricosa. cap. CII.
De nymphæ sectione. cap. CIII.
De cauda. cap. CIII.
De thymis, & uerrucis tum alijs, tum
formicarijs uteri. cap. CV.
De condylomatibus. cap. CVI.
De rimis, ac fissuris uteri. cap. CVII.
De tuberculis uteri miliaceis. caput
CVIII.
De scabris uteri pustulis. cap. CIX.
De alarum pudendi muliebri absces-
su. cap. CX.
Ad umbilicum prolapsum. cap. CXI.
Ad rugas uentris, rimasq; ac nigredi-
nes à partu exortas. cap. CXII.
Preparationes unguentorum siccorum,
moschatorum. Item conditorum, &
œnanthariorum, ac suffumigiorum
uariorum. cap. CXIII.
Olei salca preparatio preciosa. ca-
put CXIII.
Clei siue unguenti foliati, ac spicati,
preparatio. cap. CXV.
œnanthariorum preparationes. ca-
put CXVI.
Absinthati siue rodabsinthati prepa-
ratio salubris. cap. CXVII.
Conditi purgatorii preparatio. caput
CXVIII.
Rhodomeli preparatio. cap. CXIX.
Mustati preparatio. cap. CXX.
Gari preparatio pro abstemijs. ca-
put CXXI.
Suffumigij moschati preparatio. ca-
put CXXII.
Myrrhatio ad cadaueris conseruatio-
nem. cap. CXXIII.

AETII MEDICI GRAE CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE, TETRA-

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

QUARTI, PRIMO QUARTI, ET

EX ORDINE XVII.

*De conceptus, ac partus ratione, & de affectionibus muliebribus uteri praesertim & mammarum.
Item de unguentorum pretiosorum, & potionum, ac suffumigiorum preparatione.*

De uteri situ, magnitudine, ac forma.

Cap. I.



VTERVS Graecis Metra, hoc est, Matrix appellatur, quod ex ipso omnia animalia, uelut a matre oriatur. Vocatur eisdem hystera, quod posterior situ sit omnibus uisceribus. Situs est enim uterus intra peritonaeum membranā, aluum, & intestina omnia circūcirca amplectentem, inter uesicā ac rectum intestinum. Atque huic quiddē ferme toti incubit: uesicā uerō iuxta umbilicum, ubi fundū habet, ut plurimū supereminet. Iuxta partē autem ad pudendū tendentem ipsa uesica uterū excedit collo. Magnitudo eius nō in omnibus eadē est. Multo enim minor est uterus eius quē prēgnans nō est: maior autē prēgnantis. Eius uerō quā nunquam prēgnans fuit, longē adhuc minor uterus existit. Et iuxta aetate minimus est his quā ad uenērem experientā tempus nondū attigerunt. Nam & aliās semper minor est his quā uenere non utuntur. Longitudo itaque in moderatē se habētibz mulieribz, a fundo circa umbilicū, usq; ad pudēdū, est plerūq; undecim digitorū, latitudine uerō ad utrūq; latus per cornua sua extenditur. Quantū uerō ad figurā attinet, totum quiddē reliquum corpus, & maxime fundū uesicā simile est. In quantū uerō exortus papillares ad lūbos nutantes habet ab utroq; fundi latere productos, uesicā similis nō est: appellatur autē hi exortus cornua, & primum sursum uergūt, postea deorsum tendunt, & paulatim angustiores fiunt, ut postremae partes uenis similes sint. Hae itaq; angustae cornuū partes sinuosis flexibus ad testes inseruntur, qui a lateribus uteri siti sūt, singuli ab utraq; fundi parte propē cornua: & per hos sinuosos cornuū flexus, in cōgressu uiri uterus semen a testibus attrahit. Sunt autē testes mulierū parui, neq; sicut in uiris rotundi, & oblongi, ac tenera carne praediti, sed laui, ac glandulosi, & pelliculosi. Appendet porro uterus uesicā, & intestino recto, per fibrosa quaedam interstitia. Appendet & ossi sacro, per robusta quaedam ligamenta neruosa, ac musculosa. Sunt & ligamenta, ac appendices quā in ipsum uterū inseruntur, partim quiddē texentia & perplicantia ipsum uteri corpus, quorū non exigua pars sunt nerui a spinali medulla orientes. Partim uerō incrementi, ac nutrimenti ipsius uteri, itemque foetus gratia facta, uelut sunt arteriae & uenae. A uena enim caua quē per splānam a gibba hepatis parte fertur, & ab arteria magna quā illi incumbens simul deferunt, duae uenae, & duae arteriae exoriuntur, utrinque sanē uena & arteria: atq; haec quatuor uasa ad uterum delata, ansequam in ipsum inseruntur, ramulos ad testes extendūt, & postea in ipsum uteri corpus deferuntur, ipsūq; intertextūt, & per ea mēstruus sanguis in ute-

rū deriuatur. Sūt autē & aliae uenae, ac arteriae utrinque utero insertae, partim ad testes, partim ad ceruicē tendentes. At uerō ipsam uteri corpus ex duabus tunicis constat, & externa quā neruosiore est, interna uerō uenosiore. Et externa quiddē simplex & una est, interna uerō duplex, ut si excoriat uolueris, duo tibi uteri esse uidebuntur, sub una & eadē tunica siti. Ceterū collū uteri musculosum, ex dura, ac cartilaginosa carne factū est, & semper durius seipso euadit, & progressu tēporis cartilaginofum, adeo ut quā sepius pepererūt, aut iā aniculae sunt, his multū durū, ac cartilaginofum collū sit, ut gutturi sūmo simile existat. Est & in collo uteri foramen, p quod & menses deferuntur, & mulier masculi semē suscipit, exitq; per ipsum etiā foetus: incredibile enim dictū est, quātū hic meatus pro tēpore amplitudinē euariat. Nā reliquo tēpore toto specilli extremū, aut paulo crassius quiddā suscipit. Prēgnante uerō muliere ita clauditur, ut nihil suscipere possit. At ubi foetus ab utero exoluitur, dolores partus ipsum quā plurimū extendūt, & quod mirū auditū est, animal totum per ipsum trāsit. Finit autē collū, ac desinit in muliebrem sinū siue pudendū. Longitudo porro pudendi in mulieribus aetate perfectis sex sere digitorū mēsurā est. In partu tamē & cōcubitu breuius efficitur, collo nimirū uteri se extendēte. Est & in puellari aetate pudendū delicatius, ac mollius. In aniculis uerō & his quē sepius pepererūt, callosius euadit, & cartilagini simile: ex crebro enim cōgressus attritu, & partū euentū collisione callescit. Sed & mēstrui delatione indurescit, nō aliter quā ob plurimū, & acrem humorē influentē ulcera callosa, ac fistulosa sūt. At uerō imminēte mēstrui tēpore, uterus crassescit, ac intumescit, aliās tenuior, ac cōtractior existens. Crassior item est, in his quā sepius pepererunt. Tenuior autem in his quā nondū prēgnantes fuerunt. Idem etiā primis a conceptu diebus crassescit. Vbi uerō foetus adoleuit, ac iam parienti tempus adest, tenuissimus euadit. Attenuatur autem uelut uesicā flatu repletae solent, crassitudine in longitudinē abeunte. Atq; hactenus de situ, figura, ac magnitudine uteri dictū sit.

Quae intra prēgnantis uterum nascuntur. Cap. II.

Imprēgnationis tempore primū. Secūda utero adnascens, & totū foetū ambiens generatur, deinde aliae duae pelliculae, altera fardiminalis, a fardiminis similitudine appellata, eminētibz foetus partibus duplicata incumbens. Altera agnina, a teneritudine uocata, quā totum foetum ambit, ac complectitur.

De secūda generatione.

Cap. III.

Secūda hoc modo generatur. Singula uenarū, ac articularū oscula, quē intra uterū pueniūt, in extremitatibus suis nodosas quasdam eminēdas haemorrhoidibus suis similes habet, quas aliqui coryledonas, hoc est, acetabula appellāt. Atq; hē in mulieribus sunt minores, quā

res, quàm quæ in uaccis, capris, ac ceruis, atq; alijs talibus animalibus reperitur. Sed & in brutis flacidiore, ac mucosiores sunt, figura cotyledoni herbe, id est, umbilico ueneris similes. Tales igitur eminentiæ in uteri sinu ubi mulier cõceptura est aperiuntur. Contingit autem hoc tempus, incipientibus fluere menstruis purgationibus, aut desinētib; . Et quāquā etiam reliquo toto purgationis tēpore apertæ sint, tamen nō cõcipit mulier. Nō enim potest semē in utero manere, quū influentis sanguinis multitudine eluatur. Quando uerò cessant mēses, & quum incipiunt, aperta sunt uasa, & purgatio lunaris neq; multa neq; coaceruatim effunditur, ut semē ob uteri asperitatē facile adhæreat, & ab allabentis sanguinis paucitate abunde alatur: priusquam enim fluere cõperint menses, mulier non cõceperit, quod & semen careat alimento, & unde adhærere possit nō habeat: leuis enim tunc uterus est ob uasorū conclusionem, ut inde semen tanquā color à leui pariete elaboratur. Nā qui parietes illituri sunt, eos primū exasperant, deinde colores inducunt. Proinde semē uiri iniectū, & in utero detētum, acetabulis dextri uel sinistri sinus impingitur, cōtrahitq; seipsum uterus, ac semen undiq; complectitur. Secunda itaq; generatio ab osculis in uterū apertis initium sumit, ita ut ab unoquoq; osculo uas generetur, ab osculo arteriæ arteria, à uenæ osculo uena, atq; hæc uasa distinguit ac cōnectit mēbrana. Et hoc modo Secunda generatur. At uerò hæc uasa per Secūdā dispersa rursus inter se cōeunt, & in duos uelut stipites desinūt, binasq; uenas ac binas arterias perficiunt, quæ ad ipsum foetū se ingerūt circa umbilicū. Nihil enim aliud est umbilicus quàm quatuor hæc uasa, in medio sui uragum, hoc est, lotij ductorē appellatū habētia. Hic uerò est principium pelliculæ fardiminalis, perforatusq; est ad fundum uesicæ ipsius foetus, ut per ipsum lotium foetus excernatur, & in pellicula fardiminali colligatur. Tum uerò ex duabus uenis una tantū efficitur, quæ per umbilicum delata, siue parti hepatis ipsius foetus inseritur, uenæq; caua appellatur. Et per hanc ad foetus alimentū sanguis ab utero deriuatur. Postquam enim hepar ipsius foetus sanguinem allatum suscepit, in omnes corporis partes distribuit. Similiter etiam duæ arteriæ in unam coalescunt, quæ circa uesicam firmatur, & magnæ arteriæ inseritur, quæ spinæ eiusdem foetus adhæret. Et per hanc uitalis spiritus ex uteri arterijs ad foetum distribuitur. Porro partus tempore instanti, quum magnus perfectusq; infans uterum undiquaque distēderit, Secunda pro infantis mole angusta efficitur, neque iam sanguis ab utero allatus alimentum sufficiens exhibet. Quapropter concitatus infans exilit, & ambientes pelliculas dirumpit, atque ita arcana quadam ratione uteri hostium aperitur, ac foetus progreditur. Et hæc quidem de foetus generatione breuiter, & quā lucidissime id fieri potuit explicauimus. At si quis diligentius speculari hæc uoluerit, capram aut uaccam, uel ceruam disseccare poterit, ossa pubis remouendo, & cutem apte resecando. Et uteri cum uicinis partibus unionem aperte uidebit.

Menstruæ mulierum purgationis ratio. Cap. IIII.
Circa quartumdecimū annum menses in foeminis apparere incipiunt, quo tēpore, & pubescunt, & mammae ipsis intumescunt. Non tamen omnibus eodem tempore, eademq; mēsurā, & per eandem dies pro-

deunt. Sed plerisq; plus minus duarum heminarum mēsurā, quatuor dierum spatio, interpositis uisginet duobus diebus, aut summū triginta, singulis mensibus deferuntur. Nec ante trigessimū quinquē, nec serius quā quinquagesimo anno desinunt. Rarissimē enim ad sexagesimū annum mēstruæ purgationes perueniūt. Citiſsimē uerò in pinguius corporibus deficiūt. Cæterū sanguinis qui profluit copia paulatim usq; ad ætatis uigorē augetur. Deinde aliquādiu æqualitatē seruās, paululum penitus crescit, aut minuitur. At ubi ad finē tendit, paulatim rursus minuitur, donec in totum desinat. Ut autē ordinem seruent, aut excedāt, & ut multitudine uel paucitate delinquāt, in ætate situm est, ac anni tēpore, itemq; uisctus ratione, & peculiaribus mulierum studijs. Huc faciunt & ciborum qualitates, & morbi accedentes.

Nota future uirginum purgationis. Cap. V.

Virginibus futurā purgationē præſagiunt mammarū pruritus, lumborū, pectinis, & capitis dolor, bilis, aut pituitæ uomitus. Quum hæc circa decimū quartum annū apparuerint, Medicū coniectare oportet, quomodo purgationē maturet, & per leniores decoctiones sanguinis delationem adiuuet.

Quādo semē appareat, & cõceptus tēpus adueniat. VI.
Semen quoque circa decimū quartum annum, & plerisque in ipso pubertatis tempore apparet: uerum ad generationem aptum efficitur, anno plerūq; decimo octauo, aut uigesimo. Et statim sanē ubi semen comparuerit, cōeundi desiderio flagrare incipiunt.

Fœcundarum mulierū dinotio, Sorani. Cap. VII.

A decimoquinto ætatis anno serē usq; ad quadagesimum, mulieres ad cõcipiendum idoneæ sunt, quæ neq; ulragines, neq; corporis habitu denso, aut duro præditæ sunt, neque contrā humecto, ac languido, neque alui fluxione assidua laborant: sed & recta ratione, ac læta mente funguntur, & lumbos habent largos, & uentrem amplum. Et quibus menses non impediuntur, & quæ uteri affectionibus non infestantur. Cæterum conceptura sit an non mulier, hoc modo depræhendi aiunt. Internas partes uestimenti cõtectas resina suffiūt, ita ut intra pudendum uapor recipiatur. Et si quidē odor per corpus ad os, & nares transeat, fœcunditatis signum iudicant: sin minus, sterilitatis. Allia itē decorticata, & lanæ inuoluta, mulier dormiēdi tempore sibi ipsi uelut pessum, siue tali formā subdat. Et ex odore an ad os per uenerit aut non, fœcunditatem aut sterilitatē iudicet.

Quomodo cognoscantur quæ cõceperunt. Cap. VIII.

Mulierem concepisse argumento primum est, si ab obstetrice interrogata respondeat, se post concubium uiri semen non effudisse, & in ipso coitus opere horrorem quendam percepisse, & moderato dolore circa pudendum, ac umbilicum uexari. Et ad hæc si pudendi sinus & os arida sint. Et uteri osculum non durum, nec inflammatum, sed interius ac exterius oclusum fuerit, & aliquantulum sursum progressum. Et si Veneris appetentia languerit, & menses cõsuetō tēpore non apparuerint. Si uenæ pectoris uirere, & mammae intumescere inceperint, & progressu tēporis lac habuerint. Si cauitates oculorū subpallidæ fiant. Si nigræ maculæ in facie, & aliquibus lētigines oriātur. Si colli pars anterior calidior, ceruix uerò frigidior appareat. Si circa secundū mensem præter cõsuetudinē falsa, aut acida appetat. Quibusdā etiam os nimio humore madescit, & ad

& ad agendum torpor adest, & aspectus languidus ac planè effoeminatus efficitur, & color ad albedinè, ac pallorem mutatur, prægresso plerunque rubore si foeminae uiriliores fuerint. Circa consueta, item purgationis menstruae tempora aggrauantur praegnantès, & mammae intumescunt, lumbi difficulter mouentur, uesica rubens, ac ignitum lotium cum dolore excernit, & suppressorum mensium calor sinum, ac ceruicem uteri accendit.

Note foetus masculi ac foeminae. Cap. ix.
Hippocrates, & alij quidam maris notam esse dixerunt, si praegrans sit bene colorata, & ad motum facilis, & si dextra mamma amplior, & praesertim papilla sit. Contrà uerò pallidus color, sinistraq; mamma, ac papilla tumidior, foemellae indicium est. Sed & in masculi conceptu dextrae partis uasa, uenae, ac arteriae, magis intumescunt, praesertim sub lingua. At in foemellae conceptu contrarium apparet. A sunt etiam papillas in foeminae conceptu deorsum nutare, in masculi uerò sursum tendere. Sed & lac praegnantis aquae instillatum, si foetus foemella sit, diuelli, ac detrahi: si uerò masculus, in superficie persistere. Certissimum uerò minimè fallax masculi foetus signum est, si praegrans dextrae manus pulsus ualidior, uelocior, maioremq; ac duriorē habuerit: Et uice uersa in foemella.

De pica, Galeni. Cap. x.
Circa secundum mensem affectio quaedam praegnantibus accidit, quae à pica aulcula nomen accepit. Alij tamen ab hederæ similitudine, quæ cirtos Graecis uocatur, hanc affectionem citram Graecis appellatam esse sentiunt. nam sicut illa uarijs plantis prout occurrunt se implicare solet: ita mulieres ex pica laborantes, uaria edulia appetunt, atq; ea contraria, quae tum uoluptatē, tum insuauitatem gustatū exhibent. Accidit autē ferè circa quadragesimum diem à conceptu. Et est stomachi languor cum nausea, & auersione ciborum, bilis ac pituitae uomitū inducens. Consequitur assidue expulsiōes oris, uētris morsus, ac anxietates. Atq; haec omnia ob humoris sanguinei praesertim redundantiā fiunt: q enim per uteri uasa singulis mēsis excerni solebat, à foetu suppressus, sursum uergit, & stomachū praecipuè, uelut subtiliore sensu praeditū infestat: pro uarietate autē uisiosi humoris, uaria ac peregrina edulia appetūt, quaedā salia, aliquæ acida, aliquæ terrā, aut testas, aut extinctos carbonēs. Et saepe usq; ad quartū mensem haec affectio durat: in principio enim modicus sanguis ad foetus alimoniam distribuitur. Postea uerò crescente foetu, plus alimenti attrahitur. Itaq; tum demum uisioso humore partim per uomitum euacuato, partim ad uterū alendi foetus gratia delato, relata accidentia remittūt. In quibus igitur multus sanguis collectus uidetur, his modicus cibus competit, & exercitia mulieribus cōueniētia, quae redundatē discutere possunt. Profunt & fatigationes, ac peregrinationes: quae uerò citra laborem uiuere consueuerūt, haec praegnaētes ægrè ferunt repentinis aut laboriosiores motus. Quarum uerò stomachus ab acri, acido uel falso humore mordetur, haec ad excitandum uomitum tepidam aquam commodè bibent, ut humor affligēs reuomatur. Abstineant autē à dulcibus obsonijs, & uinum sulum, odoratum, antiquum, & subastringens bibāt. Sit autē potus moderatus ne

alimenta uentriculo innatent. Confert etiam ante cibum oliuas muria conditas cum pane molli exhibere. Aut quinq; uel septē amygdalas amaras. Aut polentā succo cotoneorum, aut puniceorum malorum respersam. Aut seridem siue intubum. Aut asparagū palustrem, aut lisarum. Ex auiibus deligendae sunt, quae neq; pingues, neq; uirosae sunt. Cōueniunt etiā pedes, ac rostra & uentriculi porcorum, & herinae cel marini recentes. Post cibum uerò uuae passae, mala punica, ac pira exhibeantur. Sint tamen omnia quantitate moderata. At quae cibos auersantur, obsoniorum uarietate, ac iucunditate illectentur. His autē quae terrā comedunt, nihil ita prodest, uelut amyllum recēs pro terra oblatum. Cæterum medicamenta cōtra picam cōmoda sunt, portulacae cremor, & ipsa in cibo sumpta, cucumeris semē decorticatū, & ex aqua potum. Polygoni decoctū potum, similiter etiā anethi. Et rhei potici, ac spicis nardi cremor. Itē intubi succus, uel ipsa herba cruda, aut cocta assidue comesta. At si crassius est quod euomunt, & ob uiscositatē difficulter excernitur, fassamenta & raphanos ex aceto mulso edant, omni studio adhibito, ut infestus humor citra molestiam ac conuulsionem educatur. Forinsecus autē adhibita lāguido stomacho cōferunt haec, cœnanthe, balauistiū, rosae, clyni, myrtus, smyrnē coma, foeniculi semen, cū uino cataplasmatibus modo adhibita, addita etiā galla, aut cumino, aut absinthio. Palmularū item carnes uino coctas, aut maceratas, tritas pro emplastro imponere prodest. Aut mala cotonea cum posca trita, rosaceo uel nardino cerato excepta, addito croco. Aut lanam succidā, aut linteolum uino, & oleo, aut aceto & oleo, uel rosaceo, & aceto, aut nardino & uino imbuta, & stomacho adhibeto. Morsus enim, & stomachi puncturas mitigant. Præterea calidā aquā, non tamen feruidā assidue absorbere, & sensim assidue obambulare, & praecordia molli lana integere, fouere ac inungere, & ante cibum infernas partes pro uisibus exercere, haec omnia ad sanitatem affequendam mirificè faciunt.

De tumoribus pedum in praegnantibus. Cap. xi.
Pedū tumores in praegnantibus, rosaceo & aceto, & sale aliquando addito, perfricato. Prodest & terrā cineris molliā cum aceto illinere, aut alumē scissum cum uino. Bonum est, & citrulorum malorū decocto pedes lauare. Et anthyllim aceto maceratam obligare, & brassicae folia per latū distēta imponere ac obligare.
Cura praegnantibus adhibenda, Aspasie. Cap. xii.
Praegnaētes quae recens conceperunt, à timore, tristitia, ac omni fori mentis perturbatione asseruandae sunt. Prohibendae etiam gestationes in curribus, & uolentia exercitia, ac spiritus detentiones, & coxendicū ictus. Neque uerò permittendum est, ut graue onus eleuet, aut saltet, aut duris sellis insideat. Sed nec acris edulia, nec flatuosa, nec clysteres acutos, nec cibi aut potus inopiam, aut superfluitatem concedemus. Sanguinis etiam effluxio, siue è naribus, siue ab haemorrhoidibus, aut alio quocunq; loco, praegnantibus periculū inducit. Quapropter alimentis utendum est moderatis, & stomacho cōmodis, lecticae gestatione, leni deambulatione, molli frictione, & lanificij exercitio. At circa octauū mensem qui omnium molestissimus est, alimentū contrahendū est, & motus uehementiores praescribendi. Et si aluus suppressa fuerit,

fuerit, ob intestini recti angustias ab utero illatas, et
dulia exhibeantur utri subducendo apta, uelut est
pisanae succus, rumex coctus, malua, lactuca. Cæte-
rum mense nono relaxandi corporis gratia, balneo
frequenter utendū est, & omni modo prospiciendū, ut
paritura futuros partus dolores fortiter ferre possit.

Notæ partus secundum naturā futuri. Cap. xiii.

Parituris pectinis, ac superioris uentris grauitas, pu-
dendi ardor adest. Et uterus ad pudendū procum-
bit, ut obstetrici facile sit per contactum tentare. Os
quoque uteri disparatum, ac dilatatum est, & ad tactū
læue, ac humectum percipitur. Partu autem instante,
superior uenter contrahitur, & inguina, ac pubes in-
tumescent, & assidua mingendi cupiditas adest. De-
inde plurimus humor prodit, plerisque etiam san-
guis tenuioribus secundæ uasis ruptis.

Parientibus faciendā. Cap. xiiii.

Quæ præparare oportet, & quomodo secundū natu-
ram parientibus cōsulendum sit, superuacuum fuerit
scripto prodere, quā ex longo usu nō modo obste-
trices, sed reliquæ quoque mulieres ista sciant. De hoc
tamen uelut necessariō admonēbimus, quod parien-
tes spiritum detinere oportet, & ad inferiores partes
propulsare, nō uelut imperitiæ aliquæ faciunt in gut-
ture congregare. Inde enim plerisque gutturis tu-
mor, & uasorum eius loci dilatio contingit, quæ
affectio penitus incurabilis existit.

Cura circa agrē parientes adhibendā, Aspasia.

Cap. xv.

Quum partus difficultas instat, & loci præclusi manēt,
prægnans in balneum ducatur, & in calidæ labrum
desideat, sæpeque perfundatur. Utaturque inflexioni-
bus, ac illitionibus lubricitatem inducentibus. Qua-
le est oleum tepidum, ouorum candida tusa, malug,
foeni græci, seminis lini decoctum. Aut cerato liqui-
do ex oleo cyprino præparato loci, ac inguina illi-
nātur. Sed & hīrūdīnū nidus oleo dissolutus, & lū-
bis iuxta spinam affusus, partum accelerat. Ferunt
etiam ethymalli maioris radicem linteo illigatam
femori utiliter alligari, & similiter styracem, corian-
drum uiride, polygoni radicem, halcyonium, cucu-
meris syluestris semen, atque hæc omnia statim a par-
tu amouenda esse. Cæterum si post partum secunda
non sequatur, uolenter ne extrahatur, sed sternuta-
tio exciteur, & spiritus detineatur, & os, ac nares
obturentur. Et si adhuc remanserit, extractio fiat ue-
lut postea docebimus.

*Quomodo opem ferre oportet his quæ non tutō
conciunt. Cap. xvi.*

Quædam mulieres etiam si concipiant, in partu tamen
periclitantur, siue ob uteri paruitatem, ut ob id foæ-
tum perficere non possit, siue ob colli eiusdem angu-
stiam, siue quoddam tuberculū, aut tale quiddā in elusa-
de ostio exortū est, quod partū impedit. Atque hæc sa-
nē optimē fecerint, si a partu omnino cauerint. At si
cōceperint, satius est foætū corrumpere, quā excide-
re, quare ex ordine de corruptentibus foætū, & de in-
ducētibz sterilitatē agemus. Quod enim sterilitatē
inducit, differt ab eo quod foætū corrumpit. Illud enim
conceptū fieri prohibet, hoc factū corrumpit & ex-
pellit. Proinde, ut ne mulier cōcipiat, primū caueat,
ne temporibus conceptui idoneis cum uiro cōeat, in-
cipientibus uidelicet, aut desinentibus mensibus. In
ipso uerō concubitus tempore, quum uir semen ele-

cturus est, spiritum detineat, ne in uteri cavitatem se-
men feratur, statimque exurgat, ac genibus innixa
sternutamenta cleat, & pudendum probè detergeat.
Ad prohibendum etiam conceptum os uteri cum
melle illinere oportet, aut cum opobalsamo, aut ce-
dria per se, uel cum cerussa. Item cum cerato myrteo
liquido cerussa ammixta: aut alumine liquido, aut
galbano cum uino. Talia enim frigida, meatus ob-
ducentia, ac adstringentia, ante coitum os uteri clau-
dunt, & semen in eius cavitatem penetrare nō sinūt.
Calida uerō proritantia, non solum uiri semen ab
utero pellunt, sed reliquos etiam eius humores at-
trahunt, ac exugunt. Sed & ea quæ sequuntur con-
ceptionem prohibent, ac sterilitatem inducunt.

Pessī sterilitatem inducentes. Cap. xvii.

Corticum pinus, rhois coriarij, singulorum æquales
portiones cum uino & uinacis expresso terito, & in
lana ante concubitum adhibeto. Et hoc ablato post
duas horas mulier cum uiro cōeat. Aliud. Mali-
corum recens cum aqua tritū subdito. Aliud. Ma-
licorij partes duas, gallarum partem unam, terito,
& glandulas paruas efformato, easque ubi menses de-
suerint subdito. Aliud. Gallarum drach. iiii. myr-
rhæ drach. ii. cum uino uelut erui grana efformato,
& in umbra ficcato, atque ante coitum pro pessis
subdito. Aliud. Caricarum carnes cum uino sub-
actas adhibeto. Aliud. Florum mali punici sat-
ui drachm. ii. gallarum tantundem, absinthij drach.
i. cum cedria uelut ordel grana formato, & duobus
diebus a sedatis mensibus subdito, totoque die sumā-
tur, & his amotis itadem uenere mulier utatur. Hoc
non fallit, & longo usu cognitum est. Potio ad
idem. Succus cyrenaisicus ciceris magnitudinē cum
duobus uini diluti cyathis potus, cōceptum prohi-
bet, & menses ducit. Aliud. Succus cyrenaisicus, fo-
liorum rutæ, opopanacis, æquales portiones terito
& cera obducto, & fabæ magnitudinē exhibeto, des-
inde uinum dilutum propinato. Et hoc menses pro-
lestat. Aliud. Aloës drach. i. seminis uiolarum
albarum obolos iiii. myrrhæ drach. iiii. piperis gra-
na ii. Hæc in tres partes diuidito, & tribus uicibus
exhibeto, statim ubi menses cessarint. Quin & fabro-
rum aqua in qua ferrum extinguunt, assidue pota,
maximē statim ubi menses cessarint, sterilitatem in-
ducit. Idem facit & populi albæ drachma, ex aqua
singulis mensibus semel pota. Aliud. Mustelæ he-
par sinistro pedi alligetur. Aut testes eiusdem anima-
lis circa umbilicum gestentur. Aliud. Adeps siue
pinguedo uuluae lænæ in uase eburneo gestetur.
Est hoc efficacissimum. Aliud. Cerussa cum o-
leo uelut pessus subdatur. Aliud. Florum ma-
li punici satui, mallicorij, gallarum, succi uuæ acer-
bæ singulorum drachmas duas, absinthij drachm. i.
cedria excipe, & uelut ordel grana efforma. Et mu-
lieri quæ per bīdium a uiro secubuit subde. Aliud.
Postquā mulier a uiro secubuit, tot hederæ
grana nigra & uino propinato, quot diebus foeminā
condpere nolueris. Aliud. Hyoscyami semen
antequā in terram exciderit, ab ipsa herba decer-
pito, & cum lacte asinino terito, & modica myr-
rha, ac hederæ nigro grano, aut corymbo ammixto,
leporis aut muli, aut cerui corio inuolutum, gestan-
dum exhibeto. Obseruandū est autē ne hoc amuletū
terrā contingat: aut fabrorum aquā frigidā selunæ
S propinato

propinato: aut salicis decoctum cum melle, propter
eximendam amaritudinem, potandum dato. Ferunt etiā
dentem infanti elapsum, si terrā nō attingerit, in anu-
lo à muliere efficaciter gestari. Item lumbricū lapi-
didinæ pro amuleto efficaciter appēdi. Aliud. Hyo-
scyami semen cū aquæ pullū alentis lacte subactū, &
ceruino corio illigatū, sinistro brachio appendito,
& ne terram contingat caueto. Aliud. Coriandri
semē toto anno potū, sterilitatē inducit. Aliud. Vir
aliquo adstringenti illinatur, quale est alumen, malis-
coriū, galla ex aceto trita, & ante coitū muria ab-
luat, & non generabit. Omnia porro medicamenta
splenis conferentia, maxima ex parte conceptionem
impediunt. Idem faciunt, & mulorum castratorum
testes usti, & cum salicis decocto poti.

Factum corruptentia, ex Aspasia. Cap. xviii.

Si mulier ad gignendum foetum inepta, per negligē-
tiam cōceperit, primū usq; ad trigessimū diem con-
traria fiāt his quæ suprà de cura prægnaētib; adbi-
benda diximus, ita ut uehementissimis motibus uel
iubeatur, & ut saliat, ac grauissima onera leuet. Et ut
decoctionibus urinā, ac menses prolestantibus atq;
aluum subducentibus assidue utatur, & acrioribus
infusis uentrem eluat. In balneo item superiorē uen-
trem, pubē, ac lumbos quotidie defricet, & in aquæ
tepidæ labro diu moretur, infususq; paret ex scēni
græci, althææq; ac artemisiæ decocto, & cum oleo
antiquo per se, uel cum rutæ succo, ac melle perfun-
datur: & si adhuc persisterit conceptus, præcordia
& lumbos ex lupinorum farina taurino felle sub-
acta integat, & epithemata huiusmodi imponat. Cy-
clamini, elaterij, artemisiæ, singul. drach. v. absinthij,
grani cnidij, singul. drach. x. nitri drach. viii. radice
cucumeris syluestris drach. v. opopanax drach. x. lu-
pinorum amarorū, radice chelidonij, seminis aut ra-
dice uiolæ albæ, singulorum drach. vi. olei cyprini
quantū satis est ad emplastri formā. Hoc post perfu-
sionem cum artemisiæ decocto, superiori uentri im-
ponere oportet, deinde caricas cum nitro, aut simile
quiddā in pudendi sinum subdere, aut cum oleo tri-
ta illinere. Hoc autem simplex insigne est. Cupressi
folia cocta trita, post balneum cubitum itura uentri
imponat, & tota nocte sinat, & supina iaceat. Præ-
stat & collyriū ex opopanax subdere, & alij coris-
ces, ac pilos muliebres suffire. Quod si hæc nihil pro-
fecerint, ad ualidiora auxilia pergendum erit, neque
tamen temerē hoc faciendum est. Omnis enim foetus
corruptio periculosa est, præsertim in muliere ro-
busta, uterumq; duriores, ac densiores habente.
Quare diligenti animaduersione opus est. Et secun-
dus maximè, ac quartus mensis uitandus: est enim
in utroq; naturalis quædam difficultas ac mora, &
impares menses aptiores sunt ad aggressionem, ac fir-
mitatem. Vnicū itaq; tertij mensis tempus deligen-
dum est: neque enim prius, neq; posterius cōueniet.
Mulier autem à qua foetus expellendus est, per ali-
quot dies antea tenuissimo uictu, & assidue bal-
neis, ac pelvis emollientibus subditijs utatur, & à ui-
no abstineat. Deinde uena secetur, & sanguis copio-
se detrahatur: sanguis enim à muliere prægnaēte eu-
acuatus abortū facit, inquit Hippocrates. Tum post
biduum, aut triduum, ubi interim à cœna euome-
rit, foliorum mercurialis foeminæ decoctum, cum
oleo, & garo conditum, letuna absorbeat. Aut aga-

ricum cum aqua mulsa bibat. Aut seminis uiolæ al-
bæ drac. i. aut artemisiæ, aut dictamnij, aut gentianæ,
aut castorij, singulorū drac. i. aut ammoniacum thy-
miama, aut myrrham, aut lauri baccas cum aqua
mulsa. Aut cacumina thymi, aut sel tauri cōgelatum
nucis auellanæ magnitudine ex uino odorato dilu-
tum bibat: hæc enim omnia etiam mortuos foetus
expellunt. Atque hæc quidem conceptum foetum
corrumpunt. si tamen non profecerint, oportet ante
portiones, & epithemata quæ adhibentur, sternuta-
menta clere cum his quæ ad hoc efficacissima habentur.
Pessus corruptens foetum. Iridis, galbani, gra-
ni cnidij, terebinthinæ, singul. drac. i. cum susino, cy-
prino, ac rosaceo oleo æquis portionibus efforma-
to, & mulieri prius lotæ subdito, ac per totam no-
ctem sinato. Mane uerò in scēni græci, & artemisiæ
decocto sedeat, & si non successerit, idem rursus post
balneum fiat. Alius. Seminis uiolæ albæ, nitri, ab-
sinthij, myrrhæ, pares portiones cum uino subactas
in lana subdito. Alius. Foliorum rutæ, baccarum
lauri, myrrhæ, singulorū drac. ii. cum uino subacta
subdito. Collyrium citra molestiā trimestrem fo-
etum expellens. Seminis nasturtij, seminis uiolæ al-
bæ, myrrhæ, absinthij, singul. drach. i. cum aqua ef-
formato, & mulieri prius lotæ subdito, & interim
pulegij decoctū bibendū dato. Aliud insigne. Ab-
rotonum quantū uoles in aqua ad totius aquæ con-
sumptionē coquito, & exprimito, cumq; liquorem
exceptū lana subdendū exhibeto, uere etiā auxilijs,
ac epithematis, quæ ad relictos menses describemus.
Tradūt etiā stercus columbinum suffitum foetū ex-
pellere. Et cucumeris syluestris grana spōte exciden-
tia, panno excepta antequam terrā attingant, adalli-
gata magnā uim habere ad foetum corruptendum.

Signa futurum abortum præcedentia. Cap. xix.
Futurum abortū à quosa primum euacuatio, deinde sa-
niosa aut cruenta, & uelut carniū lotura præcedit.
Vbi uerò planè exolutio aduenerit, purus sanguis,
deinde grumi, ac demū foetus ipse formatus, aut in-
formis egreditur, plerisq; etiā lumborum, ac coxa-
rum grauitas adit, & superioris uentris, capitiq;
ac oculorū dolor, stomachi morsus, extremarū par-
tiū frigiditas, animi deliquiū, horror febrilis: quæ-
dā etiā conuulsiones retrorsum, & uelut à comitiali
morbo habet. Atq; hæc præcipue accidunt his quæ per
medicamentorū uolentiā abortū procurarūt. Nam
in his quæ citra medicamēta abortum faciunt, præ-
cedit, uelut Hippocrates testatur, mammarū gracil-
litas præter rationem oborta, femorū frigiditas, &
grauitas, etiam lumbos occupans. At uerò ex abor-
tu minus læduntur, quæ saniores sunt, & aluum na-
tura laxiorem, ac uteri partes humidiores habent.
Et quæ frequenter magnos infantes sine molestia pe-
pererunt, & ætate prouectiores, paucumq; sangui-
nem habentes, & non pingues.

Quomodo abrupti fatui eiectioni opitemur.

Cap. xx.

Si foetus abruptus fuerit, & in uteri collo detineatur,
oleo cyprino, terebinthina ammixta totū corpus, &
præcipue partes utero uidinæ perfundantur. Eodem
etiā eiectione iā foetu loci assidue rigetur, & si sic nō suc-
cedat, mulier aromatū decocto insideat, ac sternuta-
menta adhibeat. Et ex resina sicca, bitumine, propo-
li, & cancris fluuiatilibus, ac galbano suffitus fiat. Hæc
& alia

& alia huiusmodi facienda sunt, si inflammatio non obstitit: nam ea praesente, intra infusus laxandi, ac mitigandi vires habentes nos continebimus. at si foetus destinetur ex eo, quod uterus citra inflammationem conclusus est, papyrum & spongas aridas, primum tenuiores, deinde crassiores, instar pessi subdemus, & extrema opopanax, uel panacis radice, cum melle, ac terebinthina trita illinemus. Porro electo foetu, si secunda non fuerit sequuta, uolente extrahenda non est. Sed neque umbilicus incidendus, & secunda relinquenda est. Strangulatus enim, & certa perniciem ex hoc consequeretur. Verum si res diutius protrahatur, umbilicus incisus foemori mulieris alligetur, & summum studium adhibeatur, ut secunda eximatur, quemadmodum inferius de foetus extractione referemus.

De his quae bimestres aut trimestres foetus abortiunt. Cap. XXI.

Quaecumque moderate corpus habentes, bimestres, aut trimestres abortus faciunt, citra manifestam causam, his accubula siue cotyledones mucosa plena sunt, & non possunt praegravitate foetum continere, sed abrumpluntur, inquit Hippocrates. Has igitur curare oportet per medicamenta pituita ducentia, totum corpus euacuando: qui enim ante totius corporis purgationem, & ante prohibitum humorum influxum, statim a principio locos euacuare nituntur, simile facit, uelut si quis perennem putei aquam exhaurire uelit, dum interim in exhaustae locum assidue fluuii scaturiunt. Toto uero corpore euacuato, tandem cum his quae pituita ducent, etiam uterum purgabimus. Quales sunt pessi ex colocynthide praeparati, qui contra sterilitatem ex humorum redundantia contingentem inferius describentur. Optima autem est lorio purgatoria pituitam ex utero educens, sic fit. Colocynthidem magnam supernè incidito, & seminibus electis, ac dimissa medulla oleum irinum infundito, & cum defecta particula colocynthide operito, & per diem, ac noctem madescere sinito, deinde seruati cinere coquito, ac oleum excollato, & hoc tepidum in uulua inijcito. Hoc multas steriles foecundas fecit,educta ex alto pituita, quae conceptum impediēbat. Vultus autem ratio adhibenda est calefaciens, ac siccās, moderata item exercitia, ac frictions, & omnis perfrigeratio uitanda. At uero his quae ob naturalem facultatis retentiam debilitatem abortum faciunt, herinacei terrestres pellis uista, ex aqua, aut uino pota, ex naturali quadam proprietate auxiliatur. Idem facit & pudendi osculo illita. Idem potest & marinus herinaceus, ac conchae uistae. Item myrti baccae cum uino, aut oleo lentiscino siue susino illitae. Rubi quoque, ac myrti & simillimum decoctis, locum uuluae irrigantur. Aetiam etiam lapis circa uentrem gestatus, & praegnantem, & foetus conseruat, nec sinis uterum flaccescere. Idem facit tritici granum intra panem repertum, sinistro brachio alligatum. Sardonius quoque lapis prodest superiori uentri appensus, donec dolores partus instant, & tunc ablatum. Lapis item in uulua, aut corde, aut intestinis ceruarum repertus pro amuleto gestetur: est enim ad retinendos foetus efficacissimus. Iisdem uiribus praeditus est lapis qui trunco arboris pro cunei more impingi solet.

Pariendi difficultatis cause. Cap. XXII.

Pariendi difficultas uarijs de causis contingit: aut enim eo quod puerpera animo, aut corpore, aut utrisque simul imbecilla est, aut ob uteri paruitatem, aut pro-

pter meatus angustiam. Quaecumque autem propter aetatem staturae breuioris sunt, haec ferè uterum reliquis corporis partibus correspondentem habent. Potest & difficultas pariendi contingere: aut ob ceruicis uteri obliquitatem: aut ob carnem eidem ceruici, uel osculo eius adnatam: aut ob eiusdem loci inflammationem, uel abscessum, uel duriciam: aut quod tunica ambientem solidiorem foetus percurrere non potest: aut quod humor in utero collectus ante debitum tempus excretus est, & iuxta partus tempus sine humore, ac siccus manet loci, quando maxime opus est hoc humore, ut qui facilem transitum foetui exhibeat: aut quod puerpera uel sic calculo laborat, qui dum uteri collum comprimit, difficultatem pariendi inducit: aut ob praegnantis carnositatem, siue pinguitudinem. Sed & ossa pubis nimium coacta, pariendi difficultatem faciunt, dum in partu dilatari non possunt: neque enim uelut in uirilis, ita in mulieribus ossa pubis alternatim coaseruntur, sed fortis copula coeuntur. Contingit item pariendi difficultas ob nimiam lumborum cauitatem uterum comprimentem: aut ob excrementorum copiam, in intestino recto, aut uelica detentam. Aliquae etiam prouecta aetate debilitate aegre pariunt. Aliae quod primum parere incipiunt, anguntur, & propter impericiam corpus apte praeparare ignorant, aut quod per aetatem nondum uiriles sunt, nec uires uigores adeptae sunt, sed adhuc puellae pueriliter agunt. Difficilis praeterea fit partus, quum foetus totus, aut pars magnitudine excellit: saepe enim caput, uel thorax, uel uenter, plus equo augetur: aut quum debilius est foetus, & salubus, ac moribus suis matrem adiuuare non potest: aut quum biceps est, aut tripes: aut quum gemini prodeunt, & repente uterque simul collo uteri illabitur: aut quum foetus interijt, & parturienti nihil auxilij praebet: aut quum mortuus intumescit, & praeter naturam facit: situs enim prodeundus foetus naturalis est, ut recta in caput, manibus ad utrumque femur extensis prodeat. Praeter naturam uero caput in dextram, uel sinistram uteri partem declinat: aut altera, aut utraque manus exeritur, & crura intus inter se diducuntur. Reliquis tamen figuris minus suspecta est ea quae in pedes contingit, praecipue si manibus super utroque femore extensis prodeat. Foetus uero qui altero pede prodeunt, altero intus detento, aut duplicati alicui uuluae parti innituntur, directione indigent, sicut & qui manus expansas habent. Caeterum qui obliqui prodeunt, minus improbandi sunt, & hoc tripliciter contingere potest: aut enim in alterutrum latus, aut in utrumque prodeunt. Sed tutius est in latus progredi: ita enim obstetricis manus locus datur, ut in caput, aut pedes nascentem dirigat. At qui duplicati prodeunt, in pessimam figuram illapsi sunt, maxime si in coxarum uertebras deferantur. Tripliciter autem duplicari solent: nam uel capite & cruribus, uel uentre, uel coxarum uertebris, osculo uteri incumbunt. uerum praestat uentrem incubere, eo quoniam a nobis dissecto, & interaenis excerptis, confidete corpusculo, facilis est figurae transmutatio. Difficilis item fit partus, si secunda, aut propter crassitudinem non abrumplitur, aut propter tenuitatem antequam oportet diuellitur. Porro ab externis causis pariendi difficultas oboritur, uelut si anni tempus frigidum, & hyemale meatus costringerit, aut calidum & aestiuum exoluerit. Haec omnia de muliere aegre pariente medicum percunctari ex obstetrice oportet, nec temere ad chirurgiam progredi. Neque

uerò obsterici permittendum est, ut uterum diutius dilanet. Si ergo ob lumborū cavitatē pariendi difficultas contigerit, puerpera in sella, prona flexis genibus collocetur, ut uulua delabens ceruicē rectā extendat: eodē modo sistantur etiā pingues, ac carnosae. Si uerò propter aliquā angustiam, aut stuporē, aut coarctationē, opem ferre oportet laxationi per infusus calidos, & suffusiones, ita ut etiā aer domus calefiat, & per infusiones oleorum, tum actu, tum potentia calidorū, itemq; per illitiones, ac cataplasmata eiisdē generis. Adhibēda quoq; sunt laxamenta à balneis, si non febris, aut aliud quid prohibuerit, & ex gestatione lecticā in loco calidiore. Quidā etiam concussiones fortes in his adhibuerūt. At uerò eam quae ob exolutionē imbecilla est, ad partū corroborare oportet cōdensantibus, ac maximē cōstringentibus, & firmitatē inducētib;: qualia sunt respirationes, ac infusions ex myrto, aut pampinīs uitis, aut malis punicis, aut rosīs. Et odoramēta cum aceto, & ungēta ex uino & oleo rosaceo frigidis: si uerò propter figurā prae naturā ipsius foetus, partus difficultas adest, ad naturālē sitū reducendus est, quātum eius fieri potest. Et si pedē, aut manū protrulit, ne attrahatur per membrū: magis enim impingitur, aut luxatur, aut etiā abrumpitur. Verū per digitos humero aut coxae foetus admotos, promissa pars ad cōueniēte locū introducatur. Si uerò unā cū coarctatione, totius foetus figura mala fuerit, prius ab osculo uteri in sublime eleuetur, & postea rursus ad osculum rectā dirigatur, fiantq; omnia placidē, leniter, ac cū compressione, oleo assidue locis affuso: hoc enim ex salute tū foetus, tū parientis fuerit, & uterus ita quoq; illaesus manet. At si uteri osculū clausum permanserit, pinguib; medicamētis emolliatur, ac relaxetur. Quod si uerò calculus affuerit, eum extra uelicae collū per catheterē propellemus. & si uelica lotio plena fuerit, eodē catheteris instrumento lotiū educemus: si uerò intestinū rectū excrementis plenum fuerit, per clysterē eluimus. At si ob inflammationē, abscessum, ulcus, tumore laxū, aut duritiā, aut simile quiddā mulier parere nequeat, singulis pro affectu ratione succurremus. Si uerò ob carnem collo uteri adnatā, aut ob tunicā aliquā innatā solidiorē, parturitiū difficultas eueniat, uelut in nō perforatis mulieribus accidit, quicquid impedimēto fuerit, resecetur. Et si solidior fuerit, membrana foetū ambiēs quā ut abrumpi possit, discludatur. Quibus uerò humor in tunicis cōtēntus ante debitū tempus effluxit, ita ut loci sint resicati, eis albumina ouorū cum maluae aut feni graeci decocto excolato, aut cū prisaenae cremore tepido infundantur. At si uteri paruitas in causa fuerit, loca pinguedine aliqua inungantur, ac foueantur, & os uteri digitis dilatetur, & foetus uolēter extrahatur. Si uerò nō successerit, disseccetur. Quod tum maximē faciendum est, ubi foetus fuerit magnus, aut mortuus. Mortuū autem cognoscemus, ex eo quod ad tactum frigidus occurrit, & motu caret. At si gemini, aut tergemini fuerint, ac collum uteri obsederint, reliqui ad fundū uteri repellantur, & is qui magis parauis uidebitur, prius educatur. Si uerò ob capitis, aut thoracis, aut uentris magnitudinē, partus difficilis fiat, omnino necesse est foetū secare. Porro tēpus collocandi puerperā in sellam, est quum uteri osculo aperto, digitis oc-

current, ac prominuerit id quod prae-rumpi solet. De foetus extractione, ac exectione, Philumeni. x xiii. Medicū ante exectionis aggressione spectare oportet, resoluta sit ne mulier aut nō. Et an seruari possit, uel sit deplorata. Et seruari quidem potentem aggredietur, deploratā uerò relinquet. Quae igitur letaliter affectae sunt, lethargico sopore premuntur, & resolutae sunt, ac difficulter reuocari possunt. Et ad maximas inclamationes reuocatae, debiliter respondentes rursus deferuntur in soporem. Quaedam etiā per conuulsionē contrahuntur, aut neruis tremulae fiunt. Et pulsus fortiter tumidus, uerum obscurus, ac debilis depræhenditur. At uerò seruandae, nihil tale patiuntur. Mulier itaque supina in lecto decumbat capite declinū, eleuatis cruribus, teneaturq; utrinq; à peritis, ac robustis mulieribus. Ac primum duae, aut tres buccellae panis uino imbutae offerantur, ad arandum animi deliquitum. Et in ipso opere assidue facies uino respergatur. Chirurgus autem difficultatis causam per instrumentum pudendum diducens conspiciat, thymusne sit, an callosa eminentia, aut aliquid ex his quae retulimus, quicquid id fuerit, uol sella arreptum scalpro amputabit, uelut postea docuimus. Si uerò tunica uteri os obstruxerit, eam quoq; resecabit, sicut inferius de non perforatis mulieribus trademus. Si uerò pelliculae foetum ambiētis soliditas obstiterit, eam uol sella extensam cū aculeato incidemus, & incisam digitis dilatabimus, & locum idoneum ad foetus egressionē parabimus. At si caput foetus locum obstruxerit, in pedes uertatur, atq; ita educatur. Quod si ita impactum fuerit, ut nullo modo retrudi possit, uncinus attractorius oculo, aut ori, aut mento infigatur, & ita infans extrahatur, hoc modo, ut instrumentum tractorium in dextra manu teneatur, uncinus uerò ipsius digitis occultatus, per sinistram manum leniter cōintroducatur, & in aliquo ex dictis locis figatur, & deinde alterum instrumentum ex altera parte oppositum similiter immittatur, ac infigatur, ut aequalis, & ad neutram partem declinans attractio fiat, eaq; tutior, ne forte unum instrumentum in attrahendo elabatur, ac foetum dimittat. Atque ita aequaliter non solum in directum, sed etiam ad obliqua trahatur, & digitus pinguedine aliqua illitus, intra uteri os, & impactum corpus immittatur, & circum circa ducatur. Dimidio autē foetu extracto, attractorium instrumentum ad superiores partes transferatur, ac infigatur. At uerò si caput, uel natura, uel hydrocephala affectione aquosa, magis tumidū impactum fuerit, scalpro incidendum est, atque ita euacuatum, ac contractum extrahendum. Quod si neq; sic prodierit, caluam contundere oportet, & ossa digitis eximere: si uerò ossa eminuerint, per forcipem detarium, aut ossarium auferre, ac tum demum instrumentum attractorium infigere, ac foetum extrahere. At si capite progresso, circa thoracem coarctatio fiat, itidem scalpro loci circa clauiculas dissecantur usq; ad uacua: ut humore euacuato, moles thoracis confidat. Si uerò nimis uenter inflatus fuerit, mortuo foetu, aut hydropico existente, eadem methodo uelentes uētem dissecābimus, ac intestina eximemus: si uerò manus protensa fuerit, ab humero resecetur: oportet autem linteo obuolutum, ut ne elabatur, aliquid extrahere, quo sic humeri articulus exeratur,

exeratur, & tunc diductis pudendi labijs refectionē facere, & postea sinistram manum immittere, ac caput dirigere, & ita foetum educere: Idem faciendum est etiam ubi ambæ manus fuerint protensæ. Similiter etiam pedes protensos reliquo corpore non consequente, ab inguinibus rescicare oportet. At si duplicatus foetus occurrerit, & dirigi nō poterit, si caput magis expositum fuerit, ossa eius conteremus tunc non dissecta, deinde alicuius eius parti attractoriū instrumentum infigemus, ac attrahemus, & cruribus directis educemus. Sed si crura magis exposita fuerint, coxæ articulum rescabimus, & ita coxas transgrediemur, ut caput fiat contritioni facile paratū. Si uero duplicatio pertinacior fuerit pedibus magis expositis, caput circa coarticulationē ad uertebraū amputetur, deinde transgresso thorace pedes attrahantur. Si uero reliquis partibus ablatis, caput reuertens detineatur, sinistra manus oleo illita in uteri profunditatem immittatur, & caput requiratur, & per digitos ad uteri os deuoluatur, & unū, aut duo attractoria instrumenta infigantur. Cæterum loci ad infigendū instrumentū idonei, in capite sunt oculi, auriū meatus, os, mēti pars interna. In thpace axillæ, clauiculæ, præcordia, pectus, uertebraū articuli, iugulū. In cruribus ossa pubis, foemineū pudendum. At uero si osculū uteri ob inflammationem fuerit conclusum, nihil uolenter agendū est, sed infusionibus pinguibus largē utendū, infusionsibusq; ac irrigationibus, & cataplasmatibus, quō inflammatione aliquatenus sedata, & osculo dilatato, foetus uelut dictū est educatur. Vbi uero integrā foetus sectionē fecerimus, omnes eius partes componantur, diligenterq; obseruemus ne aliqua desit, aut interius elam nobis relinquatur. Deinde Secunda protinus educatur.

De secunda educatione, Philumeni. Cap. xxiiii.

Si Secunda, quæ etiam locus appellatur, & Secunda quidē dicitur, quod uelut secundū domicilium, ac receptaculū sit ab utero, & uelut foetus indumentū. Si Secunda inquam detinetur, interdū uteri os clausum, interdum apertū reperitur, & aliquando inflammatum, aliquando citra inflammationē. Si modo uteri fundo cōiuncta secunda reperitur, modo secluncta. Si ergo os uulue apertū, & secunda secluncta reperitur, circa aliquā uteri partem instar pilæ conuoluta, facilissima est educatio. Sinistram enim manū calidam & pinguefactā in profundū immittere oportet, & arreptam secundā extrahere. Si uero uteri fundo connexa fuerit, similiter quidē manū immitemus, uerum apprehensam secundam non statim rectā attrahemus, propter prolapsus uulue timorem, sed sensim nulla uolentia adhibita, primum in obliquum placidē ducemus, hac & illac obuertētes. Deinde aliquando ualidius attrahemus. Sic enim obedit, & a concretionē exoluitur. At si uteri os clausum fuerit, per fusionibus pinguibus utemur, & per sinistræ manus digitos leniter aperire, ac paulatim dilatare conabimur. Et si non successerit, superiorē uentrem ex eruda ordeacea farina aqua calida, ac oleo subacta integere oportet, rursusque locos perfundere, pinguisq; fomenta adhibere. Et si uires non fuerint debiles, etiam sternutatorijs utendum est, ex castorio, ac pipere præparatis, & potionibus mēses cōstitibus, de quibus postea agemus. Atq; æc omnia prima, ac secunda die faciēda sunt. Sussibus insuper utemur

per aromata ex olla, qualia sunt calia, nardus, lunci odorati flos, artemisia, iris, sabina, dictamnium, pulegium, & huiusmodi, ita ut olla selle supponatur, cui mulier infideat undiq; uestimentis coniecta. Postea uero tentabimur, & si uteri osculū apertū inuenierimus, manū immitemus, & sicut dictū est, secundā educere conabimur. Si uero neq; sic educata fuerit, perturbari non oportet: intra paucos enim dies putrefacta, & in sanem dissoluta excidet. Quandoquidē uero ob graueolentiam caput replet & obturat, ac stomachū subuertit, odoramenta assidue suffiantur cōuenientia: & ad hunc usum probata sunt, cardamomum, caricæ, bdelliū, sabina, thus, styrax, lapis gagates, onyx aromaticus, ladanum. Eisdem quoq; castorij, ac pulegij singul. drac. i. ex aqua multa bibenda detur. Conueniunt etiam leniora menses ducentia, artemisiæ decoctū, & baccarum lauri, cum uino mulso. Pelsi etiā subditū ad hoc faciunt, myrrha & cyclaminus ungento excepta. Facit item ouis & capræ secunda arefacta, trita, & uino pota. Aut cū ungento subdita, aut pro amuleto gestata. Alius pelsus. Carnium uuarū passarum, cumini, resinæ, terebinthinæ, spumæ nitri, singul. drac. x. excipe melle, ac subde. Idē possunt & infusionses in artemisiæ, baccarum lauri, anethi, ac chamæmeli decoctis.

Cura post foetus exectionem, Aspasie. Cap. xxv.
Postquā secunda siue statim ab educito foetu, siue postea educata fuerit, neq; quicquā superuacuum in utero relictum, crura componantur ut partes distractæ cōueniant. Et si loci satis purgati uidebuntur, maluar, aut foeni græci decocto eluatur, & oleo calido perfundantur. Eodemq; lumbi, ac pubes perfundantur, mollicq; lana oleo calido imbuta integantur. Et alimenta sorbilia offerantur, & aquæ potus uictetur. Ac si purgationes non suffecerint, infusionses ex foeni græci, artemisiæ, althææ, pulegij decoctis adhibebimus. Pulegij itē, ac foeni græci decoctū propinabimus. Si uero purgationes nimij processerint, irrigationes moderatē adstringentes, ac infusionses consimiles adhibeantur, & uenter lōga fascia uindatur, & cibi adstringentes offerantur. Si uero inflammatio superuenerit, inflammationi succurrendum est. Et si copiosa sanguinis eruptio, etiam ipsi medendū est, cum his quæ postea referemus. Si nihil horum acciderit, uteri collum, ac osculū, & pudendum pinguitudine aliqua inungantur, ac foueantur.

Cause sterilitatis, itemq; curatio in uiro, ac muliere. Nota item conceptionis. Cap. xxvi.

Sterilitas aut uiri, aut mulieris, aut utriusque ratione contingit. Et ex uiro quidē est, quum semen eius uel seruidum, & uelut torrefactum, uel frigidum, tenue, aquosum, languidumq; fuerit, quale est decrepitorum. Vel crassius quā oportet emittitur. Aut quum uiri semispadones sunt, & penem breuissimū habent, ut semen in uulue profunditatem eiaculari non possint. Quod etiam aliquando ob nimiam obesitatem contingit: tales enim præ nimia aqualiculi mole, semen ad uteri recessus non eiulantur. At uero mulier non concipit, si uterum habet uel calidum, & igneum, uel frigidum & humidum, uel squalidū ac siccum, uel carnosum & pinguem, uel excarnem ac gracilem, aut debilem, aut angustū, aut breuem. Aut quod uasa eius clausa sunt & obstructa, aut per cicatricem inductā excæcata. Aut quod membranæ

S 3 osculum

eadē Paulus h

osculum uteri obturantes, nullum foramen relin-
quunt. Aut quod uteri ceruix obliqua est. Aut quod
osculum nimis angustum, uel amplum. Aut quod
alia aliqua affectio ex inferioribus recensendis uulvam
impedit. Sed & inuicem coitus inanes, ac steriles sunt.
Amor enim genituram concillat, & propterea for-
midae amantes crebro parant. Aetas etiam, uel iu-
nior, uel prouectior conceptionem impedit. Quae
propter primum pubescentes a uenere prohibendae
sunt, ita ut uir quidem trigentesimum annum, mulier
uero decimum octauum attingat, maxime uero in-
apta mulieris forma sterilitatis occasio est: forunda
enim mulier habere debet proceritatem corporis mo-
deratam, lumbos & superiorem uentre latos, nates
eminentes, pectus angustum, mammas amplas: tales
enim mulieres fecundae, his autem oppositae steri-
liores sunt. Potest & praeter enumeratas causas, ali-
qua magis recedisse esse. Verum tot ferme sunt quae
noscuntur. Viri itaque qui ob deprauatam uisus
rationem semen corrumpunt, ad magis compositum,
ac salubriorem uisum conuersi, seminis fecundita-
tem acquirunt. At qui alienis foeminis delectati pro-
prijs uxoribus non conueniunt, seruata temperantia
generabunt. Qui uero seminis profluuio laborant,
curati, fecundi fiunt. At qui geniturę meatus occa-
tatos habent, uelut quidam quibus calculi excreti sunt,
eos pro deploratis habebimus. Sed neque semispado-
nes, ac nimis angustis meatibus praediti, semen ex-
cernunt. At uero ubi uir, & mulier bene se habent,
neque aetas, neque corporis habitus, neque aliqua uteri
affectio obstat, tunc uisus ratione utemur, ut neque ni-
mulo labore, tum uirum, tum mulierem defatigemus,
neque prorsus odolosos esse sinamus. Hoc enim super-
fluitatibus corpus replet. Illud sanguinem siccant, &
purgationes consumunt. Balneis utantur neque aspidis,
neque copiosis. Cibus ac potus concoctus faciles, &
quos uenter superare potest sumant. Hoc uero uelut
maximum negligendum non est, ut nec uir, nec mulier
pinguem habitum acquirant. Tales enim inepti sunt ad
pueros gignendos, neque pudenda inter se adaptare
possunt, & uiri parum seminis emittunt, & mulieribus
menfes pauci feruntur, quum maxima alimentum pars
in pinguedinem transeat. Caeterum quomodo pingues
se gerere debeant, Sermone quarto de carnium subuer-
sione diximus. Conuenit & cibus, ac potus ueneremur
stimulantes, ac semine generantes assumere, atque tales sunt
qui calfaciunt & inflant. Vinum igitur aquae preferen-
dum est. Et ex oleribus prodest hominum, cruce, &
frio, ac similia. A ruta uero menta, ac calaminta
penitus abstinendum est: metra enim semen quidem mul-
tum, sed debile, ac languidum gignit: ruta uero cor-
rumpit. Illud autem obseruandum est, lunari purgatio-
ne appetere opportunissimum concipiendi tempus esse.
Tunc ergo mulieri ex uberiore alimento aliquid de-
trahendum est, & cibus moderatus, attenuans, ac boni
succi exhibendus. Omnibus tamen alimentis ammixta
da sunt quae purgationes irritare possunt, uelut sunt
olera odorata & acris, scandix, crethmon, scniculū,
gingidū, apiū, smyrniū, asparagus palustris, & si-
milis: spes est enim probe purgata priusquam uterus
refrigeretur coceptura esset: quod si a concubitu cocep-
tionis notae apparuerint, spes rata erit. Coceptionis
notae sunt, si uteri os claudatur, ac siccum est, & a pudē-
do recedit, imo periculosiores formae post semine immis-

sum, uterum moueri percipiunt: mouetur enim ad ge-
nituram complexum. Quibusdam praecordia exiliunt, ac
his oris uentris dolor, ac exolutio cum uoluptate quae-
dam accidit. Est & hoc non exiguum indicium, si mulier
urinae stillicidio vexatur, quod praecipue patiuntur,
quae primum concipiunt, & quae menstruas purgation-
es integre non exegerunt, quanquam idem etiam alijs
usque ad septimum diem aliquatenus accidit. Post septi-
mum autem obscura quaedam placent signa oboritur,
acidorum, ac salforum desiderium, uerigines, pala-
lor, somni longiores. Eodem etiam tempore men-
ses circa molestiam detinentur. Mas autem uehemen-
tius, ac uelocius in dextera parte magis mouetur:
foemella debilius & tardius, atque in sinistra. Atque
hactenus de praeseruatione dictum sit. Nunc quo-
modo singulae affectiones conceptionem impedi-
entes curandae sint, dicetur.

Frigidioris uteri signa, ac curatio. Cap. XXVII.
Si mulier ob uteri frigida non concipit, exercitijs, om-
nibusq; fomentorum genere calorem reuocet: neque inco-
modum fuerit castoreum, cum linum, anisum, pulegium,
& alia huiusmodi bibere, & singulis piper ammis-
cere. Uulnus tamen hoc medicamento purgabitur.
Euphymii, euphorbii, piperis, dauci, petroselinii, sin-
gularum aequales portiones bibat, sit autem totum dra-
chma hoc & aluum ducte, & uulvam calefacit, ut mule-
tis prius non purgatis hinc menfes eruperint. Quod
si purgatio per interna non suffererit, uomitus quoque
prouocetur origani, aut thymi decocto, ante & post
cibum, omni studio adhibito, ut pituita euacuetur.
A uomitu uero castoreum & praedicta semina bi-
bat. Uteri uero fometa sunt per suffitus & uapores,
arundine ollae operculo perforato inserta, ita ut uap-
or intra pudendum excipiat. sunt etiam per affusio-
nes aquae calidae, in qua decocta est artemisia, salvia,
ruta, cum linum, pulegium, cyperus, acorum. Possunt &
haec singula peccini imponi cataplasmatibus modo. Co-
feri & polyarchii epithema, & quod Amythaoni
inscribitur, & reliqua huiusmodi. Peccini item, ac co-
xae irino & amaracino, ac cyprino oleo perfricetur.
Et pessus ex myrrha, ruta, galbano & castorio para-
tus uulvae subdatur. Possunt etiam aliquando ualidiora
ammisceri, uelut est piper, sal, fel bubulum. Validum
est elaterium, sed minime molestum. Fiat quoque ex
aqua mulsis, aut marina per se, uel aceto ammixto
fomenta. Praedicta tamen medicamenta molli lana
excepta adhibeantur, ut ne corpus mordeant, & exul-
cerationem faciant: neque difficile est ipsorum quan-
tatem metiri: pro affectionum enim magnitudine, ac
diuturnitate, medicamenta sunt augenda, aut minuenda,
mora item longioris, aut breuioris temporis tra-
henda in ipsorum usu. Caeterum uterorum frigidi-
tatem ex mensibus suppressis coniectamus. Neque
enim praeter nimiam crassitudinem commode deferuntur. Sed
& stupidus sensus circa peccinem, lumbos, ac crura
percipitur. Aliquae etiam penitus erurum impotentes
sunt. Quod si prorsus perfrigeratae fuerint, ne uene-
rem quidem appetunt, & uteri osculum contractum
habent. Atque haec de uteri frigida sufficiunt.

Calidioris uteri signa, ac curatio. Cap. XXVIII.
Uterorum caliditas ex reliqui corporis caliditate conie-
ctatur, & ex mensium paucitate cum dolore prodeun-
tium, ita ut pudenda mulieris exulceret. Sed & quae
prodeunt nigriora sunt, & ob nimiam puncturam nullum
ordinem

ordinē seruant. Sequitur etiā ad hanc temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas. His itaq; cōueniunt humectantia ac frigefaciētia, qualia sunt ex oleribus quidē lactuca, malua, blitum, cucumis, cucurbita, pepo, atriplex, & portulaca. Itē aliq; cōsimiles cibi. Vinum uerō tenue sit, & album, ac aquosius. Somnus autem longior, & aquarum dulcium balnea. Ad uesicā uerō, & summum uentrem ac lumbos, frigefaciētia adhibenda sunt, uelut est solan aut umbilici ueneris succus rosaceo ammixto lana exceptus. Idem & in pudendum commodē subditur. Mercurialis item lumbis ac pectini imposita, utero calidiori prodest. Spuma quoque argēi & ceppusa cum aqua trita. Horum autem omniū quantitatem recte mederis, si semper singula multum posse arbitratus, perfrigerationis excessum caueris.

Humidioris uteri curatio. Cap. xxx.

Quae ob uteri humiditatem non cōcipiunt, eas sicciorē diēta uel cōuenit, multumq; exerceri ac fricari, & euacuationis ac auersionis gratia aliquando post cibum, aliquando ieiunās uomere, & moderato cibi usu reficari, & carnes assatas potius uiscentium atq; animalium, ac pisces duriores comedere, & uinū potēs meracum quidē, sed parcius bibere. Sicca etiā fomenta crebro balnea uerō raro adhibenda sunt. Ceterū qui statim à principio resicantia ac adstringentia utero adhibēt, non parū laedunt: cohibita enim materia ad principales partes decurrit: utrum ubi totum corpus purgatū fuerit, tutius deinde utero adstringentia corroborantia adhibētur. Quale est lentisculi decoctum, & myrti, ac rosarum, & rubi tenerorum uirgultorum, & polygoni foeminae decoctū: mas enim graminis magis similis est, flore puniceo, folijs rutae similibus, semine intra folia pusillo. Poterit tamen etiā huius decoctū ieiunae cōmodē in potū dari. Ad nimiam quoq; uteri humiditatem huiusmodi potiones cōueniūt. Myrti baccas, aut malicorū punici dulcis, cū uino terito ac exhibeto: aut auellanas nuces uistas cū uino tritas propinato. Hoc autem epichemate utēdū est. Psylliū tusum, & palmularum carne cū aqua mulla trita exceptum apponito. Aut mala cotonea similiter palmulis excepta adhibeto.

Siccioris uteri curatio. Cap. xxx.

Mulier quae ob uteri siccitatem nō concipit, humidiora alimenta exhibenda sunt, & reliqua uictus ratio humidior constituenda. Toto enim corpore humectato, uterus quoq; eadem qualitate participabit.

Diuersarum affectionum, ob quas mulieres non concipiunt, curatio. Cap. xxxi.

Si propter humorum crassitudinem mulier non concipit, humorē cōsiderare oportet, & mordentem sero lactis purgare, heminis quinq; paulatim exhibitis. Cibus item boni succi offerre, & uomitū per interualla ciere. Pituitosos autē & aquosos humores, laboribus & exudationibus ac uomitibus crebris euacuare oportet. Quādoquidē uerō etiā flatus in utero existentes, cōceptionē impediunt, & flatus ab imperfecta cōcoctione fiunt, primum quidē parciore cibis exhibēdus est, deinde danda quae flatus expellūt, uelut est ruta, cuminū, anethū, ac reliqua familiaria fermina, & pleraq; aromata, quae etiā subdī possunt, praesertim ruta cum melle ac modico nitro. Possunt ex hisdem etiā fomenta parari, & cataplasmata ac cerata, ad pubē imponēda. A leguminibus autē & edulijis

dulcibus ac flatuosis omnibus abstinendū est. Si uerō cōclusi fuerint uteri, odoratis perfusionibus, & mollitorijis ex adipe asserino paratis aperiedī sunt. A mollitoribus tamen infusionibus ac perfusionibus incipiedū est, ex malua, semine lini, ac foeno graeco, & oleo, & aliquādo melle paratis. Deinde ad ualidiora trāseundū, artemisiā, conyzam, calaminthā, pulegium, amaracū & chamæmelum. Atq; his adhiēciendū est irinum ac cyprinum oleum, ac mel, myrrha uerō troglodytica, terebinthina, nitrū, calia, caricarū carnes, unguentū amaracinū, & huiusmodi subdantur. At uerō his quae ob uteri os nimium hians non cōcipiunt, conueniunt uictus, & fomenta, ac medicamenta sicciora ac adstringentia. Talia sunt gallarum decoctum, cytini, lentiscus, rubi radix, myrtus, & eiusmodi. Vteros uerō distortos mollientibus fomentis dirigere ac corrigere oportet: fomenta enim ad hoc maxime faciunt, & pessos mollitorios subdere. Quin & specillo & digito correctio eorum faciēda est. Maxime uerō pulegij & artemisiae decoctū, & castorium ē postea potū, utero distorto cōferunt, & tota curatio ad uteri declinationē postea referenda. At si per aliquorū pharmacorū adhibitionē, quae cōceptionem prohibent, mulier non concipiat, eius pharmaci facultas consideretur, nunquid humoris attractione semen eluerit, aut flatuum multitudine idem elegerit, aut per adstrictionem os uteri obturauerit, ac seminis accessum interceperit. Et deinde singulis affectionibus succurratur, perfusionibus ac infusionibus cōgruis. Hae uerō maxime utiles fuerint, si osculum & acetabula uteri fuerint adstricta. Pinguia etiā cuncta ac fomenta adhibenda sunt, & quae humiditates attrahere possunt. Ceterum medicamenta sterilitatē inducentia, quum uasa uteri excācent, incurabilem plerunq; affectionem faciunt. Et tamen non statim omnes uires adimunt: quaedam enim potiones cecitatem curabilem inducunt, cui si protinus subuenias, mederi possis. Quemadmodū enim lethalia uenena uomitu, aut clysteri, aut medicamento cōgruo exoluuntur, temporis uerō progressu nullo modo corrigi possunt, sic & quae ualidam sterilitatē inducunt, aliquando depellere datur, si statim opem feras: si uerō diutius perseuerauerint, incurabilia euadunt. Porro ulcera & inflammationes uteri quomodo curare oporteat: sic carnis excrescentias, thymosq; ac tunicas auferre, singula suis locis ex ordine dicentur. Superuacuum est enim eadē saepe dicere. At uerō si nulla re infecta, nec in utero, nec in reliquo corpore apparente, incertum fuerit cur mulier non concipiat, asinino lacte ipsam purgabimus, cibisq; boni succi alemus, & fomentis suffusionibusq; odoratis, & pessis subditis, uteri os aperientibus, & sanguinem attrahentibus utemur, ueneremq; per duos aut tres menses prohibebimus.

Potiones, pessi, & suffitus ad cōceptionē. Cap. xxxii. Mercurialis cum castorio, item absinthium, tribus aut quatuor diebus consueto mensium tempore in potu exhibeto. Est & haec potio ad conceptum efficax. Salis ammoniaci drac. ii. salulae, cumini, sing. dra. i. omnia simul per tridū menstruis desinentibus cum uino praebeto. Alia. Nigellae, salis ammoniaci, singul. drac. i. cyperi dra. vi. simul terito, & in quatuor partes diuidito, & unam singulis diebus cū uino bibendā dato, menstruis desinentibus, & postea cū uiro

congregiatur. Sed & uirum strenuam operam nauare oportet, interimq; à uenere abstinuisse, & boni succi cibis nutritum esse. Pessum uero subscriptum conueniunt, praesertim si ex humorum mucositate infœcundæ fuerint, poterisq; ex his, congruum singulis affectionibus medicamentum eligere. Pessum Asclepiadæ, utero purgatio idoneus. Cyperi, nitri, aluminis scissi, myrrhæ, thuris, croci, spumæ nitri, mellis, æquales portiones cum modico pipere tritas melle excipe, & pessum in de tenui linteo aut lana pura inuolutum ac rosaceo imbutum, mulieri prius elotæ subde. Vtere etiam elotione purgatoria admiranda supra ad bimestrem aut trimestrem foetum abortientes descripta, ex colocynthide & oleo irino. Alius pessum purgatorium. Succum cyclamini, medullæ colocynthidis, nitri rubri, mercurialis, singul. drachm. iiii. myrrhæ drach. ii. omnia seminis lini decocto excipe, & utere post menses purgatos uelut dictum est. Alius, Medullæ colocynthidis, myrrhæ, nitri, cumini Aethiopici, singulo. unc. i. excipe carne caricarum, & utere post menstruatam purgationem. Alius. Anisi, cardamomi, nitri, aristolochiæ, pulegii, foeni graeci, carnis caricarum pingulum, singul. drach. ii. arida terito & cribrato. Carnes autem caricarum passo subigito, eisq; arida excipito, & in cornea pyxide seruat. Deinde usu expetente columbini oui magnitudine accipito, & irino oleo madefactum ad uteri osculum subdito. Huiusmodi pessum mucosos humores educunt. Sufficiente uero purgatione facta, infestationes adhibeantur. At uero quoniam non ea solum quæ uterum purgant, conceptioni conferunt, sed alia etiam medicamenta ad parandam fecunditatem descripta sunt, ea etiam iuxta ueterum traditionem subiungemus. Pessum ad conceptionem idoneus. Coaguli leporis partes ii. aluminis scissi partem i. melle excipito, & pessum formato, ac utitur ubi prius uterus per praedicta fuerit purgatus. Alius, Seminis satyrini, mellis, singulorum sexuncem in pessum efformato: aut uescicam felis dorcadis aut hirci euacuato, & ex uiscoso intus reposito pessum formato, & paululum ante congressum subdito, aut penem ex eo illinito. Aut purpuram ueram hircino felle imbutam, mulieris umbilico per septem dies imposito, & deinde crescente luna uiro congregiatur. Alius. Dorcadis, hœdi, leporis coagulum, & fel, cum sanguine & adipe agnino, & medulla ceruina, post purgationem subdito. Nardini etiam ac rosacei olei aliquid addito. Alius, quo Asclepiades in nobilibus foemina utebatur. Myrrhæ drach. iiii. iridis, stercoris leporis, singul. drachm. ii. cum aqua in collyria efformato, ac subdito mensibus desinentibus. Et postea cum uiro misceatur. Alius. Aluminis scissi, rhois rubri, singul. drach. ii. myrrhæ drach. i. croci obol. ii. terito, ac melle excipito. Vsu autem postulante, medicamentum gallæ paruae quantitate accipito, & hoc molli lana exceptum ac rosaceo imbutum, post mensium declinationem subdito, & per triduum sinisto, donec purgatio fuerit perfecta. Tertia uero die mulier lauet, & locis rosaceo illitis cum uiro concumbat. Alius. Leonis, aut ursi, aut hyænæ, aut taurini felis uescicam euacuato, & in ipsam olei rosacei, nardini, irini, mellis, æquales portiones indito, omniaq; simul ad calidum cinerem unita seruat, ac utitur post mensem purgationem ante concubitum. Alius. Fel piscis per se uel cum melle subdatur. Aut uerbena

ca rectæ succus cum butyro, desinente lunari purgatione supponatur. Alius lenissimus. Radicis albiæ purgatae ac lotæ quadrantem contundito, & in olei sextario torreto. Deinde ablectis radicibus, adipis coturnicis sexuncem, ceræ sextantem ammisceto. Ego uero trientem ceræ ammisceto, & similiter in pello subdo.

Amuletum naturale. Ossa quæ in corde cerui reperiuntur, sinistro brachio adalligata, arcana quadam naturæ uel conceptionem suauare creduntur. Suffumigium ad conceptionem efficax. Bitumen, pilos leporis, rutam aridam, simul terito, & cum cerâ præmolliata in pastillos formato, & super stercore bubulo suffuto. Aliud obstetricis. Sădarach tritum cum cupressi ramēis, sufficiens cerâ in pastillos cogito, eosq; super bubulo stercore statim post mensium purgationem quatuor diebus suffuto. Aliud eiusdem. Capri cornu ramēa oleo cōspersa peractis mēlibus suffuto, & locis adhuc calētibz mulier cum uiro cōgrediatur.

Ad mares generandos. Si uir dextro pede fasciā cādidā uincto cum muliere coeat, marem ut ferunt, generabit. Si uero sinistrum pedē colorata fasciā ligarit, foemellam. Tradunt etiam satyrini ac serapiadis radicē, solidiorem salaces facere, & masculis generandis prodesse, flacidiorem uero contrarium efficere.

De lactis defectu. Cap. xxxiii. Hæc affectio infantibus magis quam mulieribus grauis est. Quapropter Sermone quarto ubi de pueris tractauimus, conuenientem curationem tradidimus. facit autem naturaliter lapis galactites pro amuleto adalligatus, & aqua dissolutus, ac potatus.

Ne lac in mammis coeat in grumos. Cap. xxxiiii. Vt ne lac in mammis puerperarum in grumos coeat, ab adultis ac peritis mulieribus leniter exugatur, & mammae cyprino oleo, cum ouo & croco illinantur. Aut foeni graeci succum, aut cumini decoctum cum modico croco oblitito. Aliud. Ceræ unc. i. portu lacæ sesquialtera, cum oleo sesamino illine, ac utere uelut probato. Lac etiam instar casei coagulari in mammis prohibet cera alba in pilulas redacta, & quotidie magnitudine trium erui granorum exhibita. Cæterum Soranus mammæ assidue dolentes, neq; à mulieribus, neq; ab infantibus exugari oportere affirmat, & suctione plus materiae attrahi asserit.

Probè etiam facit terra cimolia cum aceto aut aqua, & oleo rosaceo imposita. Et cādidū marmoris aut cādū dorum lapidū ramenta similiter adhibita. Ac si amplior fuerit plenitudo, & ob id mulier grauetur, ac doleat: lentes aqua marina aut muria coquito, & cum decocto quidem mammæ abluito, ipsas autem lentes contusas imposito. Confert item apium & mentam, & fel bubulū praesertim illinere aut imponere.

Aliud. Fucum tinctorium terito, & cerato excipito, & adhibeto, ac singulis diebus his permutato. Sit autem fuci triens, ceræ quadras, olei myrti dextans. Aliud. Pollinis thuris drach. x. ceræ dextantem, pumidis unc. xx. olei rosacei unc. xx. utere eodem modo. Aliud. Lapidis asij, ceræ, singulorum sextantem, olei rosacei, aut cicini bessem, præpara ac utere his in die permutando. Lac enim abolet, & inflammationes sedat. Quod si alius lapis defuerit, pyrites succedat pro ipso. Prestat & aqua marina aut muria assidue fouere.

De coagulato in mammis lacte, & ipsius turgentibus ob lactis redundantiam. Cap. xxxv.

Ad hæc

Ad hæc uicta in principio leniter reprimentibus utendum est, uelut est spongia pura posca imbuta, & pal mulę cum pane & posca tritæ, deinde uincire, ac moderate cōstringere oportet. quod si lac restinguere malueris, alumē & psyllium cum aceto & coriandri succo; aut lapidē pyriten cū rosaceo & aceto adhibeto. Ad coagulationem uerò lactis priuatim surfures in aceto coctos cum rutę decocto imposito, quū primum lac gignere incipiunt. Idem facit menta polentæ ammixta, & iuglans cum ruta ac melle, & ricini folia trita, & cuminum priuatim, uel cum polenta, & capita papaueris cocta cum melle, & crocus cū lacte, & muria fomentum, & apium uiride impositum, quod etiam grumos lactis dissoluit. Utendum & ceratis ad grumos descriptis.

De uitiato lacte mammas lædente. Cap. xxxvi.

Lac uitiatū aliquando māmārū uasa exulcerat: quæadmodū itaq; in reliquis partibus uitiati humoris per culares destillationes efficiunt: falsa enim lacryma o.ulum mordet, & acres excrementisæ superfluitates intestina erodūt. Ita & lac in mammas uitiatum, scabiem, panos, & papularum eruptiones producit. Vlcera ergo hic enata, simili modo hīdemq; remedijs, quibus cætera totius corporis ulcera curantur. Ipsi tamē lactis uitiatiōi primū succurrendū est. cuius improbos colores, subalbidū, nigricantē, flauū, subfuluū, aut uiridē, hæc arte deprehēdemus. Tenuia ac cādidiſsima linteorū frusta eo lacte imbuta, in umbra siccabimus, & in his postea quātum lac a natiuo colore discessit, speculabimur. At uerò utrosū ne sit, aut aliās foetidū: ex olfactu cognoscemus, sicut falsedinē, amaritudinē, acorem, insipiditatem, gustu dignoscimus: tenuitatē uerò ac crassitiem, lubricitatē item ac lentorē ex ungue probabimus: si enim gutta eius unguis instillata non decurret, nec uelut mel aut gluten adhaerebit, lac bonum esse iudicamus. Aliquis pilo probitatē lactis experiūtur. nā si pilus lacte madens suspēdatur, & lac delabitur, aut uni parti guttula adhæret, lac reprobandū est. Si uerò totum pilum circumſideret, optimū esse conſitentur. Alij lac per coagulū concretū digitis exprimunt: deinde seri ac casei mensuras expendunt. Postquā igitur cuiusq; lactis uitiū cognouerimus, recta uictus ratione id corrigemus, purgationesq; prorsus recusabimus, præsertim si nutrices semper eo uitio laborare nouerimus, quādiu lactauerint. Priuatim itaq; eas quæ falso humore abundant, balneis & uini diluti potione curamus. Deinde copiam lactis uino mulso, & aceto mulso reuocamus, & in cibo exhibemus lac ex alijs animalibus probatissimū, quod forma & similitudine humani lactis specīe refert. Est autē omnino rectæ diætæ cō amplius inuitēdum, quod scimus hoc uitium solo alimēto bono non difficulter curari posse. Neq; negligenda est hæc curandi ratio. Sæpe enim infantes eiusmodi lacte corrupti, ad ultimam perniciem deueniunt. Ad panos & scabiem mammarum, myrrham cum oleo sampſuchino tritam, uelut maximū remedium illinito. Ad cōercendas autem uirginum ac reliquarum mammas, æruginem ferri cum oleo omphacino aut uino subactam adhibeto, aut cicutæ semen cum folijs tritum illinito.

Ad mammas inflāmatas, Philumeni. Cap. xxxvii.

Sesamum tritū butyro ammixto moderate repesactū, quotidie bis imposito. At si inflammatio perseuera

uerit, medullæ panis aqua madefactæ ac tritæ partes ii. perdicij herbæ seorsim tustæ partem i. cerati liquidi partem unā & dimidiā simul subigito, & his in die adhibeto. Idem etiam post eruptionē abscessus usq; ad perfectā sanitatē conuenit. Vtere etiam hoc, uelut probatissimū. Foliorum hyoscyami recentū, ceræ, colophonis, adipis porcini recentis, olei, & quales portiones, liquabilia liquefacito, & folijs tritis ammisceto. Pharmacum Iuniadæ, ad omnes inflā mationes, præsertim mammarum. Olei antiqui lib. iiii. ceræ quadrantē, colophonis, adipis suilli, singulorū sesquilibrā, spumæ argenti lib. i. pollinis tritici, seminis lini, cerussæ, singulorū sex uncem, thuris sesquiunciā. Aliud eiusdē. Spumæ argenti, cerussæ, sing. drac. vi. thuris sesquiunciā, ceræ, colophonis, singulorum sex uncem, adipis gallinacei libr. i. pollinis ordeacei sesquiunciam, succi seminis lini dextrantem, olei communis trientē. Spumam argenti, cerussam, & thus cum modico succo terito, deinde cū residuo succo pollinem ordeaceum subigito, & ita per duas aut tres horas finito, postea omnia ammisceto, & cerato excipito. Aliud, ad inflammationes plurimū prurientes, ac rubicundas. Cerussæ, spumæ argenti, mellis, butyri, ceræ, adipis gallinacei, singulorū sex uncem, thuris sextantem, rosacei unc. i. Spumam argenti & cerussam cum rosaceo coquito, & reliquo liquefacta adijcito, & unitis mel addito, & ab igne amotis thus ammisceto, ac utitor. Aliud ad inflammationes, quo utor. Tenerorum solani foliorum quantum satis esse uidebitur coquito & terito, & mellis sex uncem ammisceto. Postea uerò emplastri parhygri, ceræ, singulorum sex uncem accipito, olei unc. i. omniaq; simul unita reliquis ammisceto, & loco prius eloto apponito. Hoc mammarum inflammationes per exudationes plurimas discutit. Vtere & medicamento ex seride ad sedis affectiones præparato, & alijs huiusmodi. Facit hoc & ad igneas māmārū inflammationes. Ceræ, colophonis, olei, sing. lib. i. foliorū papaueris cornuti quadratē: liquata folijs tritis ammisceto. Tradunt & leporis coagulū cum aqua tritū ac illiū, omnibus tumoribus māmārū, & affectionibus ob lactis redūdantiā oboritis, prodesse. Ad profundas mammarū duritias. Sphōdylū herbā, & asphodeli radices uino coctas imposito: aut terræ intestina cū malis cotoneis: aut cæcros fluuiales cum ouo adhibeto, hoc & lac extinguit.

Ad induratas mammarum inflammationes, Phi

lumeni,

Cap. xxxviii.

Semen lini, aut foenigræci, aceto mulso coctum imposito: aut sesamum illotum modicē tostum cum melle terito, & calidum apponito: aut sterus caninum album terebinthina exceptū adhibeto. Aliud optimum. Spumæ argenti lib. ii. strigmentorum balnei in quo uiri solum lauantur lib. iiii. colophonis, ceræ, singulorum bellem, squamæ æris sextantem & semunciam. Aquæ marinæ aut muria lib. i. squamam aqua marina sufficientibus diebus terito, & adiecta argenti spuma ac strigmentis, ad probam cōpagem coquito, deinde cerā & colophoniam liquefactas adijcito, & ablatum ab igne medicamentum frigesacito, manibus subigito, ac utitor, inter coquendū autē cū arūdinis radice uersato, donec nō amplius inquinet. Facit & ad collisa, fracta, ulcera antiqua, cōdylomata oleo dilutū & adhibitu. Vtere etiā emplastro dionysia,

nylia, superiori Sermone descripto, quod habet terebinthinā, mannā thuris, spumam niri, oleum aniquum, cerā, singula ponderibus istis adscriptis. Nec minus conuenit piscatorium.

De mammarum abscessu. Cap. xxxix.

Inflammatione & duritia perseverantibus, & ad abscessum progredientibus, spe discutendi sublata, maturantibus auxiliabimur. nos tamen mammarum inflammationes iam in pus transmutatas, per dionysiam emplastrum supra relatū frequenter discussimus: totus enim humor ab ipso per occultos meatus transpirat, & durities euanescit. Probè facit & fuluum piscatorium, citra acetum paratū. Et nigrum Asclepiadæ. Quæ omnia si parum profecerint, chirurgia opus erit. Reliquæ igitur mammae partes tuto inciduntur, si putrida corpora reperiuntur, uerum locus circa papillam lunari sectione exactè incidendus est, ut per sectionem quidem abscessus profunditas denudetur, sed papilla conseruetur, in maribus quidē formæ gratia, in foeminis uerò præter formam, ut ne lactandi facultas intercipiatur. Peracta chirurgia linamenta sectioni indantur, & omni modo obseruetur, ne plaga linamenti nimium obturetur, huic enim sæpe fistula inducitur. Postea tertia die suppurationi studendum est, deinde his quæ repurgare possunt, postea resiccantibus ac glutinantibus. Bene autem facit ad hæc emplastrum fuluum piscatorium, citra acetum paratū. Et fuluum Galeni, ad maligna ulcera supra præscriptum. Est autem his spongia ex uino expressa superponenda. Prodest etiam nigrum e lolio præparatū. Euacuat enim & glutinat. Magistriani ad mammarum abscessus. Intestina terræ cum polenta terito, & imposito.

De mammarum fistulis, Leonide. Cap. xl.

Aliquando rupto abscessu si mamma non fuerit rectè curata, fistula consequitur, & sanè fistulæ istæ obortæ plerumque in carnem desinunt, rarissimè ad os, nisi diutius durauerint. Has itaque congruis primū medicamentis curare conabimur, quale est quod ex lolio præparatur. Sed & hoc emplastrum peculiariter prodest, quod & in mammarum abscessibus atque omni tuberculorum genere, pus per occultos meatus educit, & probè incidendos abscessus discutit, & foris impositū fistulas efficacissimè desiccant. papillā tamen semper ab eo medicamento adseruare oportet. Spumæ argenti, olei, sing. lib. i. aquæ sexuncæ, ammoniaci thymiamatis, pyrethri, singulorum sexuncem, resinae pinus trientem, colophonizæ unc. i. spumam argenti, oleum, & aquā simul ad prunas coquito, donec non amplius inquinent. Deinde ammoniacum cribratum inspergito, eoque soluto resinas adijcito, & ab lato ab igne pharmaco pyrethrum addito, subigito, ac emollito, & imposito, lana sicca superposita, ita ut papillam uelut diximus non contingat. At si perseverarit fistula, nucleo specilli attollatur ac incidatur, quatenus in profundum specillum fuerit progressum, & quicquid duri ac callosi inest amputetur. Et facta incisione emplastrum adhibeatur repurgans, deinde resiccans, & ad cicatricem perducens.

De mammarum nomis. Cap. xli.

Nomæ mamarū perfusionibus ac cataplasmatibus curantur ad reliquas nomas descriptas. uerū ad muliebriū mamarū ac pudendorum nomas ac putredines, & alia huiusmodi facit hoc medicamentum. Rhois co-

riarū lib. i. pilularum cupressi recentium tantundē, gallæ omphacitidis sesquiliagram, uini austeri libr. xx. Hæc solida per triduum macerato, deinde cum uino ad dimidias coquito, & cupressi ramo uersato. Postea ad horā quiescere finito, ac deinde excolato, & rursus ad mellis copagē coquito. Atque ita paratū pharmacum in uase uitreo seruato. Vsu uerò experiente, si extersione opus fuerit, melli ammisceto, si uerò uim obducendi meatus augere uolueris, lac adijcito.

De exedentibus mammarum ulceribus. Cap. xlii.

Phagedænicum & exedens ulcus à cancerato differt, quod circumscriptas partes non ita duras, neque uenas uaricosas habet, neque ita ad fundum perrepiat. Sed & omnis phagedæna medicamentis cedit. Maligna uerò & efferata ulcera medicamentis magis exacerbantur. Ad exedentia itaque ulcera compendiariam curam adhibere oportet, callosorum uidelicet labiorum excisionem, ita ut eadem labia ignitis cauteriis inurantur. Nam sic & sanguinis eruptionem coercibimus, & tutiorem medicationem peragemus. Postea uerò medicamenta ad mammarum putrefactiones commoda adhibeantur, infra ad caneros descripta.

De cancris mammarum, Archigenis & Leonide. Cap. xliii.

Cancerati tumores circa mammas frequentissimè generantur, & mulieres magis quam uiros inuadunt, & ex illis eas quæ amplas ac carnosas mammas habent. Veteres autem ulcus canceratū, malignū ac ferum appellabant, & canceratū sanè appellatio à cancro animante transumpta est; sunt enim ea animalia aspera & dura, & si quid forcipibus suis ceperint, haud facile auelluntur. his itaque canceratus tumor similis est. Nam & prominet, & ad tactū reniditur, & difficulter tractabilis est. Malignum autem & ferū ulcus à feris ac malignis animalibus cognominatur. Est enim proteruum, & curatione efferatur, & manuum tractatione exacerbatur. Duæ uerò sunt supremæ cancrorum differentia. Quidam enim sine ulcere, quidam cum ulcere consistunt. Qui sine ulcere sunt, ab omnibus ferme ueteribus Occulti appellantur. Philoxenus tamē cancrum occultū priuatim nominauit, qui in utero ac intestinis esset. Cancro itaque non ulcerato in mamma existente, tumor apparet ingens, ad tactū renitens, inæqualis, instar feræ saeuis, penitissimè pertinaciter insertus, radices longè lateque extendens, & uenis circumscriptus uelut illigatus, quas circum circa uaricosas habet, colore cineritius ad ruborem uergens, & aliquando subliuidus, & uidentibus quidem mollis apparet, tangentibus autem durissimus est, ut uisui hac parte non sic credendum; do lorem autem inducit pungentem latè se extendentē, ut sæpe per cōsensum, glandularū malignas inflammationes sub alis extiter. Pertingunt etiam dolores usque ad clauiculā & scapulas. Ac uerò exulceratus cancer assiduè erodit, & ubi ad profundum perfodit, nec si isti potest, & saniem emittit omni ferarū ueneno deteriore, copia & odore abominabilem. Ad sunt & huic dolores pungentes. Arque hic præcipuè medicamentis ac manuum tractatione exacerbatur.

Qui cancri curati faciles, & qui difficiles. Cap. xliiii.
Cancros in pectore obortos oino deploratos esse scito, quemad-

quemadmodum & eos qui in capite, collo, humeris, sub alis, & in inguinibus generantur: sunt enim & hi incurabiles. Nam præterquam quod perfectè tolli non possunt, sanguinis eruptionis timor incubit, ne ex ea æger inter manus pereat. Eos uerò qui papillæ summam occupant, affectæ partis amputatione faciliè curaueris.

Cancris chirurgiæ, Leonide. Cap. XLV.
Ego quidem in cæcis in pectore obortis chirurgiæ uti soleo, quæ sic fit. Aegram supinam decumbere facio. Deinde supra cancrum partem mammæ sanam incido, & incisam cauteriis inuro, donec crusta inducta sanguinis eruptio sistatur. Mox iterum incido & profundum mammæ dissecō, ac rursus partes incisas uro, sæpeq; idem repetō, & secans, & sistendi sanguinis gratia inurens. Ita enim sanguinis eruptionis periculum euitatur: post amputationem uerò integrè peractam, rursus partes omnes ad resiccationē usq; inuro: & primæ quidē inuersiones sistendi sanguinis gratia fiunt. Postremæ uerò ad omnes morbi reliquias abolendas. Sæpe uerò etiam citra inuersionem opus perfecti, ubi induratus tumor cancri generationem minas in mamma fuit: illi enim affectioni amputatio usq; ad sanam partem sufficit, quum nullum hic periculum eruptionis sanguinis imminet.

Cancris curatio post amputationem, & inuersionem. Cap. XLVI.
Post amputationem si inuersione facta non est, linamenta ulceri indemus, deinde suppurationi studebimus, & deinceps ad reliquā curationē resiccatoriam progrediemur. Si uerò post chirurgiam locos inuersionis, aliquādo solo cataplasmate ex plantagine, aut polygono, aut sesamo trito utimur. Aliquādo etiā panis medullam alicui ex prædictis ammiscemus, & supra cataplasma linteum aqua madefactum adhibemus. Citra dolorē uerò crustas aufert lac mellis ammixtū ac illitū. Coniundæ autē sunt ægrotae in domo calida, omnis enim frigiditas ipsis infesta est, præcipuè quo tempore ulcera repurgantur: tunc enim maxime conuulsionis periculū imminet. Secunda uerò aut tertia die ex oluto medicamēto, tepida aqua locū perfundimus, & lenticulā coctā cum modico melle imponimus: mellis enim uim exacerbandi formidamus, deinde folijs uitæ aut lactucæ foris impositis, deligamentū adhibemus. Neque ab horū usu discedimus, donec crustæ exciderint, postea linamēta indimus, atq; in his tum acria, tum pingula medicamēta uitamus. Vtraque enim malum renouant. Quapropter soleo muliebri aut asinino lacti rosaceū ammiscere, & ex eo madefacta linamenta indere, & pro linamenti conseruatione linteum lene ac simplex eodem lacte imbutum forinsecus obligare. Nam plurimum linteorum onus graue est in hac affectione. Et suppurationis quidem tempore rosarum amplius siendum uerò repurgamus, lac excellere debet. Quod si resurget, melilotum cum rosaceo & aqua aut lacte muliebri cataplasmati exteriorius adhibēdo ammiscetur. Cerata enim & nimis elaborata cataplasmata, huiusmodi affectionibus sunt aduersa. At si arido aliquo opus fuerit, spodium pompholygis probè lotum ac siccātū, aut cadmiā ter uisam & rosaceo extrinctā, & postea probè lotam ac resiccātā inspergito. Toto uerò curationis tempore à uino & cibis ægrè concoctilibus, & frigida potu abstinendum est. At

dū ulcus ad cicatricem ducitur, diligēter studebimus ut totius corporis firmus reddatur habitus, & ut bono succo impleatur, id quod bonis alimentis, exercitijs, gestationibus, ac reliquis eiusmodi corpus resistentibus, facere oportet.

Cancrorum curatio citra chirurgiam. Cap. XLVII.
Primū, uelut sæpe diximus, ante cuiusque maligni ulceris curationē, totū corpus curare oportet, deinde localia auxilia adhibere. Alius itaq; cōuenientibus alimentis, & aloë uel picra ex aloë præparato pharmaco soluatur, & quæ uenenis resistūt assiduè exhibeantur, uelut est theriaca, mithridaticum antidotum, & quod ex sanguinibus constat. Ex simplicioribus autem anseris aut anatis recens sugulatae sanguis calidus in potu datur. Aut trifolij bitumen olentis cochlearē I. aut II. cum aquæ cyathis III. aut seminis rutæ unc. I. aut pulegij ueteris drachmam I. cum maluæ decocto. Prodest etiam cancrorum fluuiatilis decoctum cum lacte asinino per dies quinque exhibitum, ita ut per totidem dies etiam ipsi cancri comedantur: talis enim perodus septeno circūitu peracta, mammarum cancris placidissimos efficit, ut deinceps per simplicium epithematū usum pristina sanitas restituatur.

Canceratorum tumorum non ulceratorum curatio. Cap. XLVIII.
Tumoribus canceratis non ulceratis panem cum modico symphyto imposito, exigua quantitate, ut ne grauet. In exacerbationibus autē rosas, melilotum, semen papaueris, omnia cum passo paululū trita coquito, & cū uitellis ouorum subacta imposito: aut althææ folia cocta per se, uel panis ammixta imposito. Est & hoc in exacerbationibus efficax, plantaginis, capitū papaueris unā cū seminibus, psyllij, æquales portiones accipito, & reliqua quidē terito ac cribrato. Psyllium uerò passo cretico maceratum, cum palmulis pinguibus subactum, aridis ammisceto, & parum adipis anserini adiecto. Hoc medicamentū se curē adhibetur calefactum. Si uerò frigidum potius malum postulauerit, omnia prædicta palmularum carne & modico pane madefacto excipito, ac frigida imposito. Prodest & Trilonis semen cum œsypo & aqua mulsā calidum impositum. Fraxini item arboris folia mollia, aqua cocta, & trita, per se calida imposita, malignorum ulcerū dolores mitigant, & assiduus ipsorum usus mirificè ipsa discutiet. Ego uerò eorūdem foliorū decocto huiusmodi locos fouere soleo. Arbor ipsa sterilis est, & ad materiā idonea. Postea uerò cataplasma è plantagine rursus imponatur. Item Icesij emplastrum, aut nigrū panacea inscriptum, ad contactū mollissimum, aut aliud quoddam huiusmodi adhibeatur, nisi obstiterit ulcus.

Cancris ulceratis curatio. Cap. XLIX.
Vlceratis cancris lenissima epithemata imponantur, quorum uelut fundamētum, inquit Archigenes, hoc est: Spumæ argenti, adipis porcini recentis, ceræ albæ, sing. lib. I. olei boni unc. XVI. uitellos ouorum assatorum XII. Spumam argenti cum pauca terito, deinde olei parum affundito, & uitellos ammisceto. Adipem uerò exemptis in mortario terito, & cum cera liquefacto ac excolato. Et his frigefactis residuum olei paulatim affundito, & omnia simul in mortario probè subigito, postremumq; reliqua trita ammisceto. Hoc medicamentum usus tempore rosaceo dissoluit,

dissoluto, & molli lana excepto, pro linamento uti-
tor. Et si dolor aberit ab ulcere, etiā iridis, myrrhæ,
aristolochiæ, singul. drach. III. adjūcto. Idem etiam
non ulceratis cancris adhibitum utile comperies.

Aliud, ulceratis cancris blandè hoc medetur, &
non ulceratos egregiè mitigat. Cera tyrrhenicæ, te-
rebinthinæ, adipis taurini, medullæ cerui, aut vituli
recentis, olei cicini & rosacei recentis, adipis anserini
recentis, mellis optimi, thuris, diphrygis, singulo-
rum partem unam, œsypii triplum. Sine thure tamē
micius est, & ulceribus commodius. Verum cū thu-
re magis discutit ac maturat, & non ulceratis magis
commodat. Et si absque thure præparabis, diphry-
ges cum uino teres. Si cum thure, utrunque diphry-
ges uidelicet ac thus aridum, liquatis reliquis ad-
ijcies, & deinde addito melle securè adhibebis.

Aliud Theodori ad maligna. Spodii cyprii loti &
resiccati, plumbi usti & loti, succi rosarum, singulo-
rum drachmas quatuor, præpara & utere cum rosa-
ceo. Hoc quidē magis mitigatorium est. At si uerò
multa & depascens putrefactio fuerit, ultra quā
credas efficax est hoc ad totum malum extirpandū.
Rhois coriarij sextarios duodecim, pilularum cu-
pressi libram unam, gallarum omphacitidum, cas-
siæ, singulorum sexuncem. Omnia simul contusa in
uini Adriani, id est, adstringentis, odorati & antiqui
sextarijs uiginti, per triduū macerato, & deinde ad
tertias coquito, ac cupressi spathula uersato. Postea-
que omnibus probè expressis ac relectis, succū rur-
sus ad mellis compagem coquito, ac uitreo uase ser-
uato. Hoc medicamento ad nomas sincero utendum
est, modico uino aliquādo addito, si crassius uisum
fuerit: uerum si affectio in muliebri pudendo fuerit,
exactè diluendum est. Sed & asinino aut muliebri la-
cte dilutum, mitigatorium est, & reliquas item no-
mas citra inflammationem curat. Aures diu puru-
lentas, gingiuasq; madore flaccidas resiccat. Ulcera
curatu difficilia, & ægrè cicatricem admittentia sa-
nat, si moderatè adhibeatur, ac pro ratione diluatur:
quomodo enim ipsi mitia resisterint, cui fera & agre-
stia cedunt. Cæterum hoc animaduersione dignum
est, ut ne ulcera ad cicatricem perducantur, priusquā
omnis duritia fuerit resoluta, modo linamentis matu-
rantibus, modò splenis adhibitis, quāle est Icesij me-
linum, aut Serapionis, aut panacæa. Ego uerò decli-
nationis tempore sæpe usus sum theriaca, lacte & ro-
saceo diluta, & in molli lana ulcere indita. Eandem
etiam ex passio bibendam præbeo. Ad huiusmodi
enim affectiōes efficacissima est, sicut quoq; reliqua
antidota ad reptilium letus, & uenenosas poriones
parata, his itaq; cōfidenter utere, ac irritiores contem-
ne, qui mali naturam minimè intelligunt.

De mammis induratis, Leonidæ.

Cap. I.

In alijs equidem corporis partibus prius ostendimus,
induratum tumorem sine dolore esse. At in mam-
mis non ex affectiōis natura, sed detractæ papillæ
grauitate dolorem inducit. Si itaque tota mamma
indurata fuerit, atque ita scirrhi tumor induratus
thoraci annexus, ut citra periculum à sanis partibus
amputari non possit, chirurgiam nequaquam atten-
tabimus. Si uerò summities mammæ solum indura-
ta fuerit, aut ultra dimidium affectio non occupauit,
summities amputanda est citra inuisionē: neque enim
in scirrhi tumore indurato, uelut in cancro, sangui-

nis eruptionem uereri oportet. Post amputationem
uerò linamenta indemus, & reliquam ulcerum cura-
tionem adhibebimus.

De mensibus suppressis, Rufi & Aspasie.

Cap. LI.

Mulieres aliquas menstrua purgatione omnino care-
re, uel naturale est, uel præter naturam. Naturale est,
si mulier nulla inde molestia uel totius corporis, uel
uteri afficitur. Proinde quantum ad ætatem attinet,
infra decimum quartum annum, aut ultra quinquage-
simum purgationes mensstruæ non fiunt. Sed &
steriles, & prægnantes, cantrices item ac saltatrices
naturaliter non purgantur. Quicquid enim in eis su-
perfluum est, nimia exercitiū uehementia consumit.
Et in summa: Mulieres calidioris tēperaturæ, & for-
tibus exercitijs utentes, & agrestes, parum purgan-
tur. Quādo igitur mulier plus iusto calida fuerit, si-
ue ob naturalem temperaturam, siue ob exercitiōrū
excessum, mensstruis purgationibus carebit. Ex mul-
to enim calore corpora sicca euadunt, & calida tem-
peratura cibos optimè cōcoquens, nihil superflui in
toto corpore relinquit. Est autem talis mulier omni-
no uirilis, coloris fuscī, corporis probè compacti,
neruis robustis, uenosa, lumbos & nates ampliores
habens, pectore ac humeris latioribus, mammis soli-
dis, uocē graui, fortior item ac hirsutior. Talis enim
aut omnino non, aut modicè purgatur. Aliquando
uerò etiā menses uel ob nimiam pinguedinem, uel
ob gracilitatē supprimi solent. Pingues enim magis
exangues reliquis sunt, minimasq; uenulas habent,
& sanguis qui in ipsis est paucissimus, ferè in pin-
guedinē transit. Atque huius rei ex eo indicium est,
quod tales minimè omnium concipiunt. Et si ali-
quando conceperint, foetus graciles ac ualdè imbecil-
les parit. Quomodo ergo purgabuntur, quæ neque
sanguinem, neque uenas amplas habent? At uerò
graciliores ob diuturnam aliquam egritudinem at-
tenuatæ, nihil penitus superflui sanguinis habent. Si-
stunt præterea menses eis quibus sanguis crassus aut
uiscosus est, & quibus ad alios locos deferitur, uelut
per nares aut sedē. Quin & ex thorace sanguinē reie-
ctantibus, & quibus ex uenæ sectione multus san-
guis euacuatus est, menses supprimuntur. Sed & re-
liqua excretionum genera sæpe faciunt ut menses
intercipiantur. Velut est multus sudor, assiduus uomitus,
alui profluuius, sanies copia alicubi prodiens, pus-
tularum omne genus per cutem erumpens. Sistunt
item menses morbi acuti ac magni, & alimenta uel
infra uel supra modum ingesta: modicum enim ali-
mentum statim transpirat: multum uerò meatus ob-
turat, & excretionem intercipit. Ad hos itaq; sco-
pos etiam curandi ratio digerenda est. Quæ enim ob
plenitudinem non purgantur, uenæ sectione curan-
tur. Cibi porrò crassi ac pituitosi purgationibus
aduersantur. uerum acres sanguinem fluidum effi-
ciunt. Quapropter uina crassa & noua, aquas frigi-
das & crudas, labores nimios, oculum item sublestū
uitare oportet. Atq; hæc uictus ratio ad totum cor-
pus pertinet. Quantum uerò ad ipsum uterum, con-
clusiones, ceruicis eiusdem distorsiones, durities, in-
flammationes, maces, resolutiones, perfrigeratio-
nes, distentiones, atq; aliæ huiusmodi affectiōes cō-
siderandæ sunt. Et insuper attendendum, an aliquid
uteri os obturans, sanguinis exitum impediāt. Cal-
lositates enim istæ exortæ, aut carnis excrescentiæ,
aut pin-

aut pinguedinis copia, sæpe purgationē prohibent. Aliquibus etiā statim à principio pellicula quædam circa collum aut osculū uteri adnascitur, quemadmodū his accidit, quæ Imperforatæ appellantur. Et tales curari non possunt, nisi pellicula illa locum obturans perforetur, aut refecetur. Aliquibus etiā ulcerū cicatrices, oscula uasorū in utero excecant, quæ penitus incurabiles sunt. Quibusdam post abortum uteri os exulceratur, ac deinceps ad cicatricē perducitur, atq; sic obturatio superuenit, quæ tum alias uulnæ transpirationes impedit, tum sanguinis excretionem prohibet. Quin & curæ assidue, & immodicus timor, ac moeror ingens, menses supprimunt.

Mulieribus quæ nō purgantur accidentia. Cap. LII.

Mulieribus quæ non purgantur cōsuetō more, sanguinis refectionis ac syderationis periculū imminet. Nam suppressis mensibus molesta accidentia consequuntur. Totus corporis grauitas, nausæ, fastidia, horridi quidā discursus uelut in his quæ cōceperunt. Non tamen ita sicut his quæ conceperunt uteri osculum clauditur: illis enim oclusio adest cum quadam duritia. Dolores insuper circa lumbos, fœmora, colūm, sinciput, & oculorum radices adsunt. Febres itē assidue cōcomitantur, & urinae nigrae sunt cum rubicundo quodā seroso ac sanioso humore. Difficultatē itē ac stillicidium urinae patiuntur. Et quædam in melancholicum atræ bilis morbum, aut insaniam delabuntur. Cutis superficiem dolent, & inflammationes ac ignes sacros diuersimodē sustinent.

Curatio earum quæ ob nimiam caliditatem non purgantur.

Cap. LIII.

Præstaret equidem ad integram sanitatis conseruationē, uictus rationē prescribere, à qua mulieris corpus ita resiccaretur, ut menstrua purgationē non haberet opus. Verum hoc conceptioni penitus aduersaretur. Non enim concipiunt quæ non purgantur. Proinde cōceptus gratia, & eod quod omnes ferè mulieres temerē uictitant, purgationes sunt necessariæ. Et propterea curationē conscribere cōuenit, per quam menses suppressi euocantur. calidiores itaq; mulieres & quæ plurimum exercetur, quā maximè humectare oportet, aquarū dulciū balneis, uberiore humidioreq; cibo ac potu, quales sunt pisanæ ac alieq; sorbitiones, & quæ ex lacte præparantur. Et ex oleribus lactuca, cucurbita, & eiusmodi. E' carnibus agni, hoc di, ac porcelli recentes, cicures præsertim & fœmelæ. E' piscibus qui teneras carnes habent. Ex auibus teneriores. Ex fructibus ficus recentes, uuæ maturæ, pepones, cucumeres. E' potibus uinum tenue, albū, dilutum, non uetus.

Frigida temperatura diuulio ac curatio. Cap. LIV.

Cap. LIV.

Frigidioris temperaturæ fœminas, tum ex his quæ dicta sunt cognoscemus, tum quod somnolentiores & ad motum pigriores sunt, & coloris albi siue plumbei, uenis subnigris, urina aquosa, pituitam etiam assidue excreant, & aliquando pituitosos humores euomunt. Harum itaq; curationem oppositā esse oportet ei, quam ad calidiores retulimus. Plurimos enim labores imperabimus, & edulia calidiora exhibebimus. Vinum item suluū, odoratum, uetus, ac minime dulce. Confert etiā uinū aqua marina dilutum. Medicamenta uerò eligenda sunt, quæ calore suo sanguinē dissoluant. Velut est thymū, pulegiū,

calaminthes, dictamnī, abrotoni, lridis, radicū asphodeli, corticum radicis mori, mercurialis, calicæ, carpesij, floris iunci odorati, spicæ nardi ac celticæ, acori, mei, phu, sabinæ, asari, ac similibus decoctum. Hæc enim singula in uino albo ueteri coquuntur, & uinū ipsum merum excolatū calidum à balneo ieiunis bibendum datur. Atq; ita menses ceniunt his quæ frigidam temperaturam habent. Probe facit & succus cyrenæicus erui quantitate potus. Aut opopanacis unc. i. Aut sagapeni tantundem. Aut myrrha magnitudine fabæ. Aut castorij drac. i. Aut nigella pota, & subtilita. Idem possunt etiā seminum nobis familiarium decocta, uelut cumini, fœniculi, petroselini, laueris, dauci, ammij, cicerum. Est & hoc efficacissimū atq; acerrimum. Pulegiū, artemisiæ, rutæ, saluæ, anethi, singulorum manipulum unum, pipēris grana uiginti, aquæ sextarios duos, pipēris contusum & herbis ammixtū per noctem aqua maceratur. Mane uerò ad dimidias coquitur, & ad excolatū mellis quantū satis est adijcitur, indeq; cyathi duo ieiunæ exhibentur. Ipsa uerò sensim inambulare iubeatur, & lectica gestetur. Tempora autem ad talia medicamenta accipienda commoda sunt: alterum appropinquante iam purgationis tempore; alterum ut post unctionem fomentaq; ac balneum statim bibat, ita ut in calidum adhuc & solutum corpus illabens medicamentū, uires suas efficacius declaret. At uerò si quis omnia auxilia in hunc usum commoda recensere uelit, ei multo ocio opus fuerit. Sufficere tamē possunt relata. Si uerò nullum ex his menses euocauerit, alius modus potentior exquiratur. Ego etenim cum hæc medicamenta frustra adhibuissē, mulierem solutuum pharmacum bibere iussit, atq; ea accepto euphorbio cum petroselino, per aluum purgata, & deinde menstruum excretio successit. Quod si redundans humor atræ bilis magis fuerit, epithymi drachm. v. exhibeto, cum aceti nulli diluti hemina, pauco sale adiecto. Fecit enim sanguinis educta, pars subtilior deinceps facilius sequitur. Pleriq; etiā uomitus profuit. Vomant autem accepto prius thymi aut origani, aut hyssopi decocto. Deinde post uomitum cetaurij aut absinthij cremorē potant. Quin & pessis subditisq; uterus friadus est, ut per uictū quidē, sanguis calidus ac tenuis reddatur: per pessos uerò, excretio prouocetur. Fortiores tamen euitabimus, quales sunt qui ex elaterio, cātharidibus, cyclamino, felle bubulo, & ueratro fiunt. Periculū enim est, ne ex eiusmodi medicamentorum uehementia, inflammationes, ulcera, ac febres exoriantur.

Pessimenses educentes. Cap. LV.

Mitiora proinde in pessis adhibere oportet, uelut est rura, bacæ lauri, artemisia, conyza tenuia folia habens, pulegium, mercurialis. Hæc singula cum oleo irino subdantur. Quod si ualidioribus opus erit, myrrhæ drachmam unā, aluminis scissilis drachmas duas, cum uino terito, & rosaceo ammixto subdito. Aut terebinthinam cum myrrha, melle, & croco efformato. Hoc autem ualidius est, pelecini semen cum myrrha & melle. Aut bdellium, uel galbanum, uel styrax, cum absinthio & lupinorum decocto. Aut caricas pingues granulis exemptis, cum thure & nitro, singulis fabæ magnitudine subdito.

Uterus item calido quodā oleo siue ungento perfundatur, uelut est susinum, cyprinum, irinum, sam-

T psuchinum,

Purgat

pluchinum, laurinum, amaracinum, narcissinum, Aspidul etiam suffitus per styracem, galbanum, ac thus fiant. Probe facit etiam lapis gagates. Suffumigium probatissimum. Radicis aristolochiae, radicis asphodeli, resinae siccae, sandarachae, atractylidis agrestis, stercoris uulturis, bdellii, sabinae, cardamomi, artemisiae, singulorum drach. unam, osium piscium salis forum minutissime tritorum drachmas tres, nigellae, styracis, singulorum drachmas quatuor, pastillos cum aqua formato, & usus tempore super bubulo stercore, bis in die, mane ac uespere suffuso. Praecipue uero odoratis fomentis uterum fouebimus, amarae uidelicet, serpilli, pulegii, calamintha, cypero, iride, chamamelio, costo, aniso, ac similibus in aqua coctis. Sit autem fomenti usus talis. Olla operculo perforato operiatur, arundineque foramini inseratur, & undique oblinatur. Et mulier sedens excepta intra pendendum arundine forum admittat. Alius uero fomenti modus est, ut mulier in aliquo ex relatis decocto usque ad umbilicum insideat, & deinde calida aqua dulci abluatur, & postea pessos praedictos subdat. Pessus optimus menses educens. Carpobalsami, caryophyllorum, olei amaracini aut susini, singulorum drachmas octo, passerum uuarum pinguium exemptis uinaculis libram unam, carnes palmularum duodecim, salis communis drachmas sedecim, mellis cochlearia tria, efforma ac utere post balneum, aut fomentum. Cataplasmata insuper adhibebimus ex cruda ordeacea farina, artemisia, amaraco, iride, aut alio quodam ex relatis ammixto. Liquor autem cataplasmae ammiscendus sit, uinum odoratum, mel, amaracinum, irinum, anethinum oleum. Postea lanam quoque oleo aliquo ex praedictis imbutam superponemus. Bonum est etiam bdellium cum styrace ac thure tritum, cum uino & unguento quodam relato, imo uentri ac lumbis illinere. Epithema ad sanguinem menstruum euocandum. Elaterii, myrrhae, galbani, farinae ordeaceae, singulorum drach. quatuor, foliorum rutae recedum drach. ii, fellis taurini quantum satis est. Reliquis omnibus minutissime tritis & unitis sel ammisceto, & lumbis ac imo uentri imponito. Ducti hoc menses, & sedis haemorrhoidas prouocat. Vtere etiam alijs epithematis Sermonis tertio conscriptis. Philosophi ad menses educendos. Cancrum fluuatilem in uinum coactum suffocato. Deinde uinum id meracum, calefactum, ac totum bibendum dato, & ubi satis sanguinis purgatum uidebitur, cancerum suffocatum comedendum dato. Glans subditiua menses educens, facit ad uteri stranguatus diuturnos. Fellis taurini, succi absinthii, & comae eiusdem, radicis struthii, myrrhae, singulorum drachmas quatuor, castorei, opobalsami, singulorum drachmam unam, succi cyclamini drachmas decem. Omnia artemisiae succo excipito, & glandes paruas subditiuas formato, probe facit & sex uini antiqui apij succo excepta ac subdita. Aut lilij radix tosta subdita. Aut nigella, aut sesamum, aut rutae semen & foenum graecum butyro ac melle exceptum ac subditum. Pessus eadem die plerumque sanguinem ducens. Folia artemisiae & nitrum pari portione oleo irino aut rosaceo excipito, & post balneum subdito.

Curatio earum quae praepinguedine non concipiunt. Cap. lvi.
Pinguiores mulieres uictu attenuante curabimus. Dis-

atum est autem in secundo ac quarto sermone de his alimentorum facultatibus, & quomodo macies sit reparanda. Non tamen interim somenta & pouones praetermittantur. Si enim materia infra declinabit, haud aegre euacuabitur, & corpus gracilius reddetur. & quanquam purgatio per inferiorem aluum non sit ualde ruta, ut quae corpus tabefaciat, mulieri tamen ita habenti haec quoque adhibenda est. Saepem enim sola purgantia medicamentis posito ad menses educendos sufficit. Ex purgatorijs itaque acerrima & pinguibus maxime idonea sunt, granum cnidium, scammonia, & cortex radicis ethymalli myrsinitae. Singulis autem petroselinum, aut daucum, aut apium, aut anisum, succunditatis gratia, & ad sanguinem attenuandum, ammiscere oportet. Pessos quoque ualidiores his adhibebimus, uelut pulpam colocynthis, nigellam, myrrham, simul cum uino dulci trita ac subdita. Aut nitrum cum cyclamino, selle bubulo, ac melle. Aut caricarum carnes cum nitro, melle, & ruta. Fomenta ite ac epithemata ad frigidiores temperaturas relata huc transferantur.

Curatio earum quae ob plenitudinem non purgantur. Cap. lvii.

Quae propter plenitudinem non purgantur, congruo menstruatorum tempore magis grauatur, dolores circa lumbos ac finem uentris percipiunt, flatuque replentur, ad quae distentiones ac horrores totius corporis consequuntur. Sed praecipue insigni uenarum tumore dinoscuntur. Atque haec quidem copiosa sanguinis missio ne sanantur. Cubili itaque ac tali uenas secare oportet. Deinde euacuato sanguine cetera facere supra relata, portiones uidelicet ac fomenta adhibere. Postquam autem menses fluere inceperint, mulieri quies imperanda est, & in lecto eadem desinenda. Ac prima die a balneis ac cibis abstinendum, proxima uero pisaniae succus cum aceto praeparatus in cibo exhibeatur. Deinde olera ad hunc usum idonea. Tertia autem die lauanda est, & consueta uictus ratio repetenda.

Curatio earum quae ob maciem non purgantur. Cap. lviii.

Quaecumque ob maciem gracilitatemque non purgantur, siue id ex morbo, siue alia radone contigerit, eas primum reficere oportet, & corpori carnem congruo exercitio, moderatoque labore ac uberioribus exercitijs reparare. Vbi enim carnosae factae fuerint, maxima spes est menses sponte erupturos esse. At si hoc non contigerit, portionibus ac pessis prouocentur.

Curatio earum quae ob uitiatos humores non purgantur. Cap. lix.

Biliosos ac pituitosos humores, & quicumque alij sanguini ammixti mensium purgationem impediunt, totius habitus uiciatione cognoscemus, ac reliquis notis saepe a nobis relatis, & aliquando ex his quae circa uterum contingere solent. Pauci enim menses qui deferuntur, si biliosi fuerint, uuluum mordent ac rodunt, & coloris sunt abunde fului. Si uero pituitosi, segnius prodeunt, crassi sunt, albi, ac subfrigidi, & stuporem inducunt. Quum igitur huiusmodi signa apparuerint, praestantissimum est totum corpus congruis medicamentis purgare. Deinde muliebres locos colluere ac fouere. Cibos autem dulces ac boni succi exhibere, & in potu uinum mulsum dare. Exhibeatur etiam lacasinum cum melle. Et aqua in qua pulegium ebullit cum uino dulci propinetur. Haec

tur. Hæc & menses prouocat, & nullam superfluitatem in sanguine relinquit. Cibis insuper ac potibus semper aliquid odoratum ammisceatur. Ex oleribus Crethmum, gingidum, & daucum, singula ad flacciditatem cocta, & foeniculum eligemus. Neque interim pessum negligatur, qui quales esse debeant, partim relatum est, partim proxime dicitur. Si enim billosa ducere uolueris, elaterium cum carica pingui, aut cyclaminum cum uino subdes. Picuita uero subdita trahunt folia anemones, iris cum melle, lolioacea farina lolio: prius paululum tostis, cum modico pipere & melle, colocynthidis cum carica. Aquositate autem euocat porrum cum melle. Post pessum uero mulier in aqua calida desideat, & unguento rosaceo aut cerato, aut adipe gallinaceo, uteri os inungat.

Curatio earum quibus sanguis ad nares, uel sedem defertur. Cap. LX.

In his a quacunque parte fluxerit sanguis, reprimendus est, & ad uterum congruis auxiliis reuocandus, ne forte inde propulsus ad principalem ac nobilem aliquam partem uertatur. Itaque & sudoribus, & uomitu, & alijs excretionibus corpus euacuetur. Verum hoc sciendum est, non multum male affici eas quæ ob tales causas non purgantur: sicut neque quæ ob maciem, aut laborum excessum. Concipere tamen nequeunt, quum uteri purgationes defecerunt.

Curatio earum quæ ob nimium oculum non purgantur. Cap. LXI.

Certum est eas quæ ob nimium oculum non purgantur, laboribus destinandas esse. Labores autem mulieribus congruas deambulationes sunt, & gestationes aliquanto uehemetiores. De cetero uero uelut frigida ac pituitosa curantur, & omnino contraria iuxta Hippocratem, datur his quæ sanguinis delationem impediunt. Et si ex aqua frigida cruda pota sit offensa, aliam optimam perquiremus, quam uino albo ac tenui permiscebimus. Cibus sit per frigidis calidos, per crassos attenuantes, per siccos humidos exhibebimus, & reliqua iuxta rationem.

Curatio earum quæ ob aliquam uteri affectionem non purgantur. Cap. LXII.

Si corpus bene se habuerit, uictusque ratio purgationi congrua fuerit, & tamen mulier non purgatur, considerandum est an uterus aliqua affectione laboret. Id quod si fuerit, nullum medicamentum omnino adhibeatur, neque aliqua potio menses ducens detur, ut ne attracto ad uterum sanguine, dum loci laxari non possunt, dolores molesti uelut in partu ingruant. Primum itaque affectio curetur, quæ suppressorum mensium causa est. Deinde sanguis prouocetur. Quomodo uero uteri affectiones curandæ sint, postea ex ordine referemus.

De mensium stillicidio. Cap. LXIII.

Mensium stillidium uocatur, quum grauissimo dolore intimas partes uexante sanguis stillatim prodit. Aliqui enim morbi uteri affectionibus uelut similes sunt. Nam & in illa aliquando urina supprimitur, aliquando stillatim prodit, & quandoque difficulter mingitur. Quinque uero sunt stillidii cause specie diuersæ: meatus angustia diuersimode contingens, utriusque debilitas, sanguinis multitudo, sanguis pituitosus, & sanguis seculentus. His singulis quoties impedimento fuerint, succurrendum est: ita ut multitudinem, euacuemus, crassitudinem attenuemus, uires firmemus, & meatus dilatemus. Angustiam tamen causam inquirere oportet, eamque auferre. Causis enim sublati libera purga-

tio consequitur. Quomodo uero singulis causis occurrendum sit, partim de mensibus suppressis diximus, partim deinceps referetur, ubi de uteri morbis agemus. Nunc autem explicare institimus, quomodo graues dolores lenire oportet. Exacerbatione itaque instante mulier in domicilio locetur, moderate tepido, non tamen obscuro. Et manuum ac pedum extremitates fæcens deligetur, neque ullus pessus irritatorius interrim adhibeatur. Aquæ potus uitetur, & omnino ab acerbis potionibus ac cibis, præcipue flatuosis, abstinendum est. Imus autem uenter & femora uarijs calefactorijs foueantur, ita ut aliquando lana succida uino & rosaceo calido imbuta imponatur, aliquando uelut ca oleo calido semiplena adhibeatur, aliquando uasa uaporatoria lentculata admoveantur. Quod si dolor

vide infra

perstiterit, & uires ferre poterint, cubiti uena secetur, & sanguis pro uirtutis ratione auferatur, & deinde rursus eadem fomenta repetantur. Et si neque sic successerit, cataplasma est semine lini, pane, & aqua mulsa paratum adhibebimus, cui aliquando terebinthinâ liquatam ammiscebimus. Vtemur & incisionibus ex altheæ, seminis lini, foeni græci, anethi, rutæ, ac artemisiæ decoctis, & spongijs ex hisdem expressis pudendum fouebimus. Rutam item tritam ac melle exceptam & panno lineo inductam pubi ac pectini imponemus. Aliquando eodem cataplasmate etiam pudendum integemus. Prodest & per uteri fusorium instrumentum infra scriptum liquorem infundere. Rutam & foenum græcum in oleo coquito, & ad hoc ex colatum butyri, terebinthinæ, cespiti, quantum ad ceratū liquidioris formam satis est ammisceat. Idem etiam in sedem ad trimum uel quatuor cyathorum mensuram injici potest. Aliud consimile infusum. Oesypis drach. iiii. cerebella anserum duorum, adipis anserini, phasiani, gallinacei, singulorum unc. i. ceræ quadrantem. Misce ac utere uelut priore. Pessum præterea Libanus & encepharmacus ac alijs consimiles subdantur, qui inferius ad uteri inflammationes & induratos tumores describentur. Adhibenda sunt & epithemata, primum tetrapharmacum, bromium, & quod ex succis constat. deinde polyarchium, & quod ex meliloto, & quod est seminibus paratur, prout usus postulauerit. Si uero adhuc malum non quieuerit, sed aut per certos circuitus, aut incerto ordine uexauerit, ad ualidiora pergendum est auxilia. Et cucurbitæ pectini ac inguinibus apponendæ. Primum quidem tres aut quatuor citra scarificationem, Deinde si affectio durauerit, etiam scarificabimus, & moderatam sanguinis quantitatem euacuabimus. Conferunt & hircines post cucurbitas admovent, nihil minus quam cucurbitæ attrahentes. Deinde epithemata ac dropaces adhibeantur, & cutim rubificata, & loci molliter assidue cum oleo ac sale confricetur. Exercitium præterea temperatum imperabimus, ac gestationem deambulationi præferemus. Postremum balnea naturalia adhibebimus, & marina aqua frigida iugiter abluemus.

De nimia mensium purgatione. Cap. LXIII.

Nimia mensium purgationes mulieribus fiunt, aliquando sanguine copiosiore & per plures dies prodente, id quod rarius, & in uehemetioribus moribus fieri solet. Aliquando post partum, plurimo sanguine socium insequente. Sæpe uero post abortus contingunt, & repletum quodque periculum inducunt. Primum itaque consideranda est erupentis sanguinis multitudo, & delationis modus. Amplioribus enim uasis ruptis aut apertis,

T 2 magna

magna sanguinis copia cōfertim profluit, à minoribus uero uice uersa. Ab erosione uero paulatim & cū maximo dolore prodit. Sequitur autē ad redundantes sanguinis eruptiones decoloratio, ac coloris utilitatio, aliquādo cū febre, quādoq; citra febrē, appetitus prostratus, difficilis cōcoctio. Saepemā pedū ac rotius corporis tumores, & omnia quae ad nimium haemorrhoidū fluxū consequi diximus. Artus ergo & externas partes primū cōstringere oportet, ab aliis & inguinibus exordio facto, & poscā nō frigidā, sed tepidā propinare, & eadē posca locos perfundere, & multam lanā uino & oleo rosaceo, aut melino, aut myrteo imbutā imponere. Nā spongiae ex posca expressae uterum ac uescicā perfrigerant, & damnum amplius quā cōmoditatem afferunt. Imperādū est autem unius aut alterius dies tetinere. Quod si tolerare nequeāt, panis mīcas ē posca exhibebimus, aut alicā lotam, aut oryzam ex posca, aut ouum torbile molle frigefactū. Dabimus item in potu balaustrum ex posca, aut hypocythidis aut acaciae succum. Aut lyciū, aut terrā samiam stellam appellatā, aut uuae acerbae succum siccū. Prodest & sesamum posca macerare, atq; ita molle factū edendum praeberē. Potest idē etiā cōteri, ac in potu dari. Exhibebimus & rhei pontici decoctū, aut idem tritum potioni inspergemus. Aut loti ramenta, & corundem decoctū. Aut corallorum drach. ii. Aut paeoniae grana rubra x. At uero spongia noua liquida pice imbuta, & in olla exusta, cum aceto aut posca subdita, mirifice auxiliatur. Nā & his quae in uterū subijciuntur ac induntur, uti debemus. Noui inquit Galenus, per quatuor aliquādo dies sanguinem ab utero manasse, & ad nullū auxillium celsisse, & tandem à nobis plantaginis succo suppressum esse. Quātitas autē eius inijciendi, sit cyathus mensura. Hoc itaq; optimum est medicamentū ad sanguinis eruptionem ex erosione obortam, cui aliquando fortius aliquod ammiscere soleo, alias aliud, pro affectionis respectu. Si igitur uas unde sanguis profluit, magnū & amplū fuerit, austeris medicamentis opus erit, balaustrum, acacia, hypocythide, succo uuae acerbae, gallis, malicorio, & similibus. Si uero paruum, id quod facile cognoscemus ex modo sanguine citra dolorem prodeunte, cōferent aloē, māna thuris, cortex pinus, terra lemnia sigillata, splinae aegyptiae fructus, crocus, lapis haematites, & reliqua huiusmodi cū succo plantaginis, aut uino nigro austero, aut senecionis succo subdita & iniecta. At si ab erosione sanguis profluxerit, plerumq; uelut diximus nō cōfertim, sed modicus ac paulatim defertur. Et propterea Andronis, aut Pasionis, aut Polyidae, aut Musae pastillo, aut eo qui ex charta paratur, utēdū est. Omnes enim tales quum nomen sistant, erosionem curant, ac sanguinis eruptionē reprimunt. Sunt autem quodā liquore ex relictis diluendi. Pessī uero ad sanguinis ab utero eruptionē faciunt huiusmodi. Aluminis scissi, acaciae, medullae gallarū, pollinis thuris, singulorū dra. i. Haec plantaginis succo teruntur, & uicelli ouorū assatorum quatuor ipsis ammisceruntur. Vfus autē tempore pessī lanā excipiantur, qui rosaceo tinctus subditur. Sunt quae pessī omnes penitus usq; ad uteri os immittendi. Est autē pessus lana carpta ac tōuoluta ad digitī figurā, qua medicamenta excipiuntur. Alius, Medullae gallarū, & thuris, pares portiones aqua subactas subdito. Aut ē polygonū trito pes-

sum formato. Ipsas praeterea in hoc decocto assidue insidere iubeto. Capitulorū iunci acuti, soliorū myrti, rosarū, rhamni, uirgultorū tibi, & quales portiones in aqua coquito pro insillu. Alius Pessus. Cydonorum, soliorū cupressi, oleae, rubi, singulorū & quas partes efformato. Forinsecus autē imposita profunt epithemata ac cataplasmata ex palmulis ac malis coniceis, quae adsumunt balaustrum, acaciam, hypocythidem, alumen, & similia. Conferunt & emplastra glutinatoria, quale est suluum Galeni, & Icelij, & quod ē salicibus paratur. Et Harmonia, & Pallas siue Athena inscriptum, si lumbis ac pectini imponantur. Tauri itē glutinū aceto maceratur donec dissoluatur, deinde ualido panniculo inductū lūbis agglutinatur, & efficaciter prodest. Sed & cucurbitae leues ac magnae ad mammas utilissime affiguntur.

De fluxu muliebri, Archigenis. Cap. LXV.
Fluxus muliebris est uteri destillatio diuturna, à menstrui sanguinis eruptione differēs, eo quod in illa sincerus sanguis prodit. Hic uero fluxus corruptus apparet, & aliquando ruber est, uelut sanguinis sanies, aliquando albus, uelut pisanæ succus, à pituitoso uidelicet sanguine. Interdū pallidus, ubi bilis amara redūdarit: interdum aquosus, à serosorū humorū superfluitate. Qui itaq; exquisitē colorē prae se fert aliquē, is redundantē humorē facile indicat. Si uero obscurū colorē habet, causam eius perscrutabimur. Lintē eo inquinatū arefactū simplici aqua eluemus, & inde à maculae colore redundantis humoris notione capiemus. Hic uero fluxus plerumq; citra dolorē prodit. Aliquando tamē ulcere exulcerato etiā cū dolore promanāt. Si itaq; aliqua pars doluerit, & humor profluens planē cruentus fuerit, partis alicuius in utero ruptionē aut erosionē indicat, id quod maxime in collo uteri contingere solet, & potest hoc digitū immisione percipi. Inferre uero solet hic fluxus debilitatē, coloris utilitacionē, appetitus subuersionē, inenarrabilē tristitiā, pedum tumorē. Et in aliquibus perpetua destillatio perseverat. In aliquibus per interualla quēdā redit. Et aetate quidē uigētes, rubra ferē fluxio insistat. Declināte uero aetate, alba. Et utraque sanē fluxio si suae aetati acciderit, facile curatur: si alienae, difficulter. In oī uero defluxu os aperitur ipsius uteri, & uelut relaxatur. Quibusdam etiā uterus ipse procidit, ut usque ad muliebrem pudēdū progrediatur.

Curatio rubri uteri fluxus. Cap. LXVI.
Mulieri rubro fluxu uexatae primū sanguinē euacuabimus per uenę sectionem. Haec enim nō solum materiā ad uterū confluentem diuerit, sed detentionem etiā ac cōstrictionem cui efficit. Multa enim sequeretur incōmoda, si sanguinis uel cuiuscūq; defluxus lationem localibus auxilijs reprimeremus. Nam aliqua inde in hydropem, aliqua in neruorū affectiones, aut oris uentris, aut capitis uexationes collapsae sunt. Proinde si nihil obstitit, hoc est, si non ualde magna fuerint obstacula, sanguis mittatur, praesertim si aetas uenę sectionē nō prohibet, & sanē paulo antequam dictum est, iuniores fere rubro fluxu uexari. Detractione uero sanguinis uelut in his qui sanguinē reijciunt partiatur, ut paulatim reuulsio fiat. Et dilata uenę cubiti sectione, à frōte, aut naribus, aut scapulis sanguinem auferemus. At uero lumbis ac femoribus detrita ac mollia lintea imponantur, frigidis succis imbuta. Locetur autē mulier coxis acelluibus, cruciatq;

racq̃ extendat ac inter se complice ad uteri partes cō-
trahendas. Quod si copiose sanguis feratur, coxæ, pe-
cten, & lumbi spōgīs posca madefactis integantur.
Si uero modice destillet, lana succida uino & rosa-
ceo imbuta adhibeatur. Et extremæ partes deligētur,
atque hæc non solum in principio fiant, sed etiā post
circuitus ante exacerbationem, & in ipsa exacerba-
tione. Vtatur ægra etiam infelsionibus, ex myrtil,
rubi, malicorij, & similium decoctis, in quibus sepe
aceto affuso usque ad umbilicum immergatur. Ad-
hibeat & infusiones adstringentes ac moderate frige-
facientes, uelut est plantaginis succus, polygoni, stras-
tioræ, malorum cotoneorū, ac mespilorum. Sed &
siderisidis herbæ aut parthenij succus eximie cōfert.
Hæc autem singula cum rosaceo aut myrteo oleo
infundantur. Vinum item dulce in mali punici cor-
nice calsactum, utilissime tepidum infunditur. Effica-
cissime uero fluxum compescit spōgiæ pice liquida
imbutæ ac ustæ cinis subditus, itemque leporis pilli
usti. Solemus & linteum alumine madefactum ac re-
ficatū similiter adhibere. Asininū autem lac, si eius
copia fuerit, præsertim asinæ per pascua pratorū nu-
tritis, omnibus succis præstat, ubi fluxus cū dolore
defertur. Confert & stercoris eiusdē asinæ succus, &
alicæ aut psisanæ succus: & rosaceum uel per se, uel
cū lacte infusum. Cæterū pessī ad rubrū fluxū nō dē-
faciunt, qui ad sanguinis eruptiones sunt relati: sunt
autem in aliquo ex prædictis succis madefaciēdi. Fa-
ciunt & lycium, acacia, hypocysthidis succus, singula
lacte bubulo aut sapa diluta. Aut galla cum thure &
rosaceo. Aut spodiū pōpholygis cū rosis & passo.
Aut oui testa usta cū myrto sicca & passo. Aut cine-
rē farmentorū linteolo illigatū, & aliquo prædicto
succo inctū subdito. Aut senecionē herbā uirā subdi-
to, & bibēdā dato. Galla itē usta, & modo uino, mo-
do aceto extincta, ac in pessum efformata subijcitur.
Ablatis autē his, pedes adstringentibus decoctis mo-
derate frigidis aut tepidis abluantur. Et ex relatis suc-
cis aliquis utero infundatur. In debilioribus tamē ac
delicatis forminis miuora adhibebimus. Ali-
quibus enim oculis uteri mētus à uehementioribus
medicamentis adeo cōstringuntur, ut ulcus aut duritia
oboriat, & concipiendi facultas tollatur. Ventrī
quoq̃ ac lūbis refrigerāda ac adstringētia adhibeantur,
uelut est portulaca, perdictū, solanum, hyoscyas-
mus, per se & cū poscā acetoq̃ ac palmulis. Aut or-
deacea farina cū palmulis, malis cotoneis, ac mēspila-
lis. Cerata itē ex eisdem præparata pectini ac lumbis
imponantur. Cōferunt & cucurbitis dorso & sub alis
affixæ. Et quæcūq̃ portiones sanguinē relectantibus cō-
gruunt, his quoq̃ cōmodæ sunt. Velut est ex simpli-
cibus rheon pōticū, terra samia stella siue aster, appel-
lata, terra lemnia sigillū uocata, cū plātaginis aut po-
lygoni succo, & reliqua tum simplicia, tum cōposita,
suo loco relata. Sit porro & uniuersa uictus ratio ad-
strictoria, quæ aliquatenus crassifaciat, & potus
aqua. Quod si uires collabātur, uinum crassius exhi-
beatur. At si fluxus multitudo reprimatur, paucis
autē adhuc feratur, pro refrigerantibus ac adstringēti-
bus, media inter hæc adhibeantur, ut ne fluxu repen-
te suppresso, inflammatio aliqua oboriat. Vtens
dum est & emplastris ad cruenta uulnera idoneis,
uelut est quod è salice paratur, & quod lcesū appel-
latur, & alia huiusmodi.

Albi fluxus curatio.

Cap. LXVII.

Si fluxus albus, aut serosus, ac saniosus, aut liuidus infe-
stat, in principio quidem resistendum non est, ut alie-
na à corpore excernatur. Post principium uero oleo
solino totū corpus large illinatur. Gestationes autē
& uocis exercitationes, frictiones item ac deambula-
tiones, non in hac solum fluxus specie, sed etiam in
alijs conueniunt. Ipsi uero locis moderate adstrin-
gentia adhibeantur, quæ simul extergendi uires ha-
bent. Et sanies profluens assidue calida aqua eluatur,
& lana detergeatur, ne ab humore transeunte ulcus
excitetur. Rosaceum item aut myrteum, aut meli-
num oleum illinatur. Aqua etiam pura nihil ad-
stringens habens ammixtum. In principio præ-
sertim adhibeatur ob influētis humoris acrimoniā.
Et ob eandem causam etiam alicæ ac oryzae succus
infundatur. Facit & foeni græci decoctum plurimo
oleo solino ammixto. Sulinū enim oleum tū huius,
tum alijs succis utiliter ammiscetur. Atq̃ hi quidem
succī efficaciores erunt, si quid acaciæ, aut hypocysthi-
dis, aut de alio quoptam ad rubrum fluxum relato,
fuerit ammixtum. Possumus etiā pro solino oleo lē-
tiscinum aut oenanthinum adhibere. Stercus insuper
caprinū cum myrrha, thure, & aloë, rosaceo & aceto
addito cōmode subditur, ita ut his ablatis loci uino
nigro austerio abluantur. Vbi uero quæ profluunt
foetida sunt, post relatorum usum tetrapharmacū ro-
saceo dilutum adhibebimus, & per certa intervalla
uicissim tum prædicta auxilia, tum tetrapharmacū
applicabimus. Si uero fluxus sordidus fuerit, & do-
lorē intulerit, uitellos ouorū assatos cū modico cro-
co & rosaceo subdemus. Aut malū coroneum assatū
eodē modo. Et lēdiculæ decoctū cum plātaginis succo
infundemus. At si quæ profluunt sordida quidē fue-
rint, & feci similia, dolorē tamē nō intulerint, infusa
ad dysenteria idonea immittemus. Vbi autē loci pur-
gati fuerint, adstringētibus elotionib⁹ cōfidēter ute-
mur. Locis uero induratis asininū lac cū rosaceo aut
solino oleo infundemus, & in pello subdemus. Et si
asininū defuerit, caprinū succedat. Lac uero præstat
quod ab animali per prata pascēte emulgetur. Ali-
quando etiā amyliū ad crassitudinē comparandā, lacti
ammiscemus. Pessi insuper nōdē, cataplasmataq̃ ac
emplastra eadē quæ ad rubrū fluxū retulimus, huc
transferatur. Præcipuā uero fiduciā in recta uictus ra-
tione habere oportet. Nec quantitatis solū, sed etiam
qualitatis eduliorum ratio habēda est. Sicq̃ alimētū
materia talis, quæ & crassifaciat ac uires corroboret.
Quales sunt sorbitiones è tritico ac lacte paratæ, nō
aquosæ ac dilutæ, sed probe cōpactæ, quæ pro occa-
sione etiā ex passo cretico parentur. Carnes uero eli-
gēdæ sunt siccadi uel præditæ, uelut aues mōtanæ, &
ferarū animalium. Cæterū ubi fluxus cessauerit, à ue-
loci ambulatione, à multis pectinis ac lūborū frictio-
nibus, ab acrisu esu, à calsacientibus, à flatuosis, & ab
his quæ urinā prolectāt, diu abstinēdū est, & balneis
raro utendū, neq̃ uēter mouēdus est, neq̃ spiritus re-
tinēdus. Hæc em omnia malū reuocant. Partes autē su-
periores sensim ac leniter exerceantur, ac perfricentur.
Infelsiones fiat in aqua nō adeo frigida. Et pessi autē
subditijq̃ elaboratiores ac medicamentosi uitentur.
Verū post infelsiones rosacū lana exceptū subda-
tur, & in ipso curationis tēpore ægrotae bibāt ea quæ
ad sanguinis per sputū relectionē retulimus. Faciunt

T ; & pro

& pæoniæ grana pallida x v. assidue pota. Aut coral-
lorū dra. i. e. ulno nigro. Aut uinacea trita cū ulno.
Aut leporis siue hœdi coagulum erui magnitudine
in posca dilutum. Aut corticis loti arboris decoctū.
Aliud Aspalix, ad mulieres quæ sinū pudendi ual-
de humectū habet, ut ex eo nō cōdplant. Gallas per
octo dies aqua macerato, deinde lanā purā ac mollē
in aqua illa siue cremore gallarū tingito, & nō expri-
mito, sed siccatū finito, & lanā ita subdendā dato. Ex
hoc mulier uelut uirgo reddetur, & hoc sæpe repe-
tat. Aliud. Semē rumicis acuti cū pauca aqua subi-
gito. Aut si uiride fuerit, per se terito, & subdēdū ex
hibeto, & fiet pudendum uelut uirginis adstrictum.

De uteri strangulatione. Cap. LXVIII.

Uteri strangulatio ab utero quidem inferne oritur. Ve-
rū supernæ partes & principales præsertim, per con-
sensum afficiuntur. Nam ad cor per arterias; ad cere-
brum per spinæ mēbranas ac nervos; ad hepar per
uenas affectio trāsīt, uideturq; uterus uelut ad super-
nas partes ascendisse. Cōsequitur affectus accedēte exa-
cerbatione, mētis lāguor, pigritia ad agendū, debili-
tas crurum, pallor faciei, tristis aspectus. Instāte uerō
strangulatione, sopor grauis ac pfundus, mētis ac sen-
sū apprēhēssio, cū uocis interceptiōe. Pulsus aut par-
ui ac debiles fiūt, & aliquādo penitus intercipiuntur.
Quibusdā aut neq; respiratio sensibilis pmanet. Ali-
quæ uerō alijs actionibus integris manentibus, ma-
gnā respiratiōē ex hac affectione habet. Et hinc ma-
nifestū est, quod nō circa cor & stomachū cōpressio,
aut morfus, aut perfrigeratio, à parua ascensu sit, sed
circa partes respiratiōis, & pulmonē hoc cōtingit.
Quapropter neq; animi deliquitū his uehēmēs est,
quā cor affectionis exors permāserit. Neq; enim fie-
ri potest ut animi deliquitū cōtra cordis cōsensum in-
gruat. Ceterū affectiōis differētiæ, pro causæ efficiē-
tis differētiā ac magnitudine sunt. Et sanē quidā expe-
riri uolētes an aliqua adhuc supersit respiratio, lanā
carptā naribus admouēt, atq; inde ex lanæ motu col-
ligunt, an aliqua inspiratio aut expiratio restet. Alij
poculū aqua plēnū ad os uentris ponūt, & cōsiderāt
an aliquo motu aqua agitetur. Et profectio utriq;
ignorāt, aliquādo sublata penitus oris ac nariū respi-
ratione, superesse adhuc eam quæ in toto corpore ab
arterijs perfi. litur. Id quod etiā in reptilibus uenenas
tis cōtingere uidemus. Hæc em per totā hyemē mor-
tuis simillima in cauernis latitans, per arterias tantū
totius corporis respirātia. Sic etiam in uteri strāgula-
tione fieri potest, ut toto corpore frigescente, oris ac
nariū respiratio interdāt, supersit autē ea quæ ab ar-
terijs fit. Sed & oris ac nariū respiratio adeo parua
esse potest, ut sensum lateat. Profundissimo itaq; so-
pore corripiuntur huiusmodi mulieres, uoce, sensu, ac
motu interceptis. Stomachi etiā dolore uexantur, &
saluū uomūt, si in stomacho aut capite humiditas si-
ta est. Deinde uerō exolutis causis corpus firmari in-
cipit, & malis rubescūt, & oculi post multā grauitatē
atcollūtur. Et ubi ita malū ægrā relicturū est, humidi-
tas quædā ex locis muliebribus excurrēs, ita se perci-
piunt, & intestina murmurant, & ipse uterus paulat-
im laxatur. Atq; sic exurgens ægra intellectu ac sen-
sum recipit. Accidit hæc affectio omni quidē tēpore,
sed hyeme p̄cipue ac autūno, iunioribus præsertim,
salacibus, ac sterilibus, maxime si per medicamenta
steriles fuerint. Oritur aut uel utero perfrigerato, dū

mēses prodeūt, uel propter abortū, uel sanguinis eru-
ptione ab utero, ab aliquo repente suppressa. Atque
hic morbus ubi inuadere assueuerit, comitialis mo-
do diuturnus, & p̄ circuitū repetēs efficitur, & tutus
quidē apparet, singulis tamē accessiōibus præcepto
periculum affert, ut nō eadem solū die, sed intra pau-
cas horas interimat. Et pulsus quidem primum den-
siores fiunt, & inordinate mouentur, deinde etiā pe-
nitius intercipiuntur, & exigua quædā humiditas cu-
tis superficiem irrorat. Similiter & respiratio pri-
mū obscuratur, postea penitus intercidit. Est autē hic
morbus flauosa perfrigeratio, nō inflāmatiō, uelut
Soranus putat. Semē enim in utero paulatim coacer-
uatū, aut alia quædā materia insita ac putrefacta,
perfrigeratur: & ad cerebrum ac cor frigiditatē trās-
mittit, atque hæc partes principales frigescentiā relata
accidentia inferunt. Et ego sanē mulierē uidī in hūc
morbū collapsam, dum ab obstetrice laxanila ac
odorata auxilia adhiberentur, & pudendi sinus digi-
tis penitus confricaretur, tum ex auxiliorum admo-
torum caliditate, tum ex digitorum contrētatione,
se contraxisse cum dolore quodā uoluptate permix-
to, deinde excreto multo crasso, uiskosoq; semine,
protinus à molestijs ac afflictionibus liberatam esse.
Neque mirum uideri debet, uel ex minima humorū
mole tanta accidentia consequi. Si enim paucissima
uentri quātilitas, & ita exiguum utrius reptilium per
angustissimum foramen eiectū, mala longe sauiora
inducit, non absurdum di. ctu est, semen corruptū aut
menstruum sanguinem suppressum ac detentum, ita
illa inuadere accidentia. Sed & ex canum rabie facilis
hulus rei cōiectura est. Tā enim inde humorum sic
alteratio, ut si eorum canum salua solum corpus hu-
manum cōdigerit, cōfestim rabiem inducat. At uerō
scire opere præcium est, hunc morbum nō solum ob
uteri ascensum fieri, uisidioso humore uelut diximus
in eo collecto: sed sæpe etiam ex uentris repletionē
utero affectionem transmitti. Et aliquando hepatis
aut splenis causa, uasa ex quibus uterus dependet, re-
trahi. Quum ergo uterus ex seipso laborat, pro se-
minis uel mensisui sanguinis coaceruatū quantitate,
ac qualitate, alia aliās accidentia cōsequuntur. Si enim
causa efficiens frigescenti utres habuerit, ita uniuersū
corpus perfrigerabitur, ut respiratiōis ac pul-
suum sensus penitus aboleatur. Si uerō humores as-
siliētes trāsī aut acres fuerint, conuulsio subsequen-
tur, quemadmodū atq; bilis humores animi tristitia
comitatur. At animi deliquitū exacerbationum ue-
hementia, & maxima perfrigeratio, & oris uentris affli-
ctio induci. Aegra itaq; ceruice ac capulis adhiutus
collocetur, femoribus ac inguinibus decliuis. Et
in ipsis exacerbationibus extremæ partes deligētur,
& pedes ac crura fricentur. Naribus aut odorata ad-
mouēatur, uelut est galbanū, aut castorium, aut saga-
penū, singula ex aceto uita, ac naribus illita. Aut ace-
tum acerrimum, in quo pulegium, calamintū, thym-
us, origanum, conyza tenuis, & alia huiusmodi
acris decocta sunt, calefactum naribus adhibeatur.
Hæc enim crassos uapores cerebri incidere & auer-
nuare possunt, ac simul frigiditatem depellere, & in-
spirata thoracem ac pulmonem expurgāt, & stom-
achum corroborāt. Excitentur etiā sternutationes, ca-
storio, pipere, struthio, naribus per specillum admo-
to. Os autem ægræ aperiat, ac medius digitus
ad uomi

ad uomitum proliciendū intrōmittatur. Nares item castorio, bitumine, galbano, sulphure suffiantur, aut funiculo lucernario recēs extincto, aut pennis uitis, aut soleis antiquis, aut ceparū, aut aliorum corticibus, aut capillis ipsius proprijs exustis. Aut cornu caprino incenso, aut pice ad prunas liquefcente, cedriaq; ac ueratro: aut pane recens incenso, & similibus. Quidā etiam maculā urinariam inueteratā, & pannos sulphuratos incensos naribus admouent. Sinapi item tritum cū aceto, & gagates lapis aqua tinctus & incensus, ac oleo extinctus, naribus adhibeatur. Aut rutam uiridē manibus cōtritā suffito. Vterū uerō inferne per pudendū odoratis suffito, stōrace uidelicet, ac sandalis, & aloē ac similibus. Illinātur etiam intra pudendū ea quæ laxandi, calfaciendi, ac flatus dissoluēdi uires habēt, qualis est pessus Enecepharmacus appellatus, & cæteri eiusmodi ad uteri duritias inferius descripti, amaracino, gleucino, irino, cyprino, aut capnistō oleo diluti, adiecta etiā rutæ aut cumini portione. Atq; hæc digitis excepta obsteritæ usq; ad uteri os immittet, ac leniter & diu confricabit, ut hinc frictus crassus humor qui in utero hæret, prouocetur, ac calefactus excernatur. In ipsum quoq; uterum per uteri futorium elysterem, amaracinum, aut gleucinū, aut soliatum unguentum fricciatur. Et in sedem glandes indantur, ex ruta, cumino, nitro & melle cum aliquo ex relatis unguentis & butyro præparatæ. Est & cucurbita primū inguinibus, ac femoribus, deinde utrinq; circa umbilicum, cum plurima flāma citra scarificationem affigenda. Et super hæc omnia mulier magnis uociferationibus excitetur, ac uocetur. Infectiones quoq; parentur in decoctis baccarum, ac foliorū lauri, pulegii, calaminthes, marrubii, artemisiæ, conyzæ, sablinæ, centaureæ, dictamni, sampsiuchi, foeni græci, althææ, chamæmeli, aristolochiæ, tridii, serpylli. Infectionū uerō tempore cerebri cura nō relinquatur, sed rosaceo & aceto caput irrigetur, & in aceto prius serpyllum, sphondyliū, ruta, baccæ lauri, interdum & castorium coquatur. Et naribus prædicta odoramenta assidue adhibeantur, præsertim castoriū cum aceto. Præcordia item fasciis uindantur, & distenditis manibus os uteri comprimatur. At ubi exacerbatio instat, ægra ad uomitū cogatur. Omnes enim uomitu leuantur, sed præcipue quæ cibo grauantur. Tercia uerō die cucurbitæ cum scarificatione pectini, ac lūbis affigantur, deinde loci scarificati sale cōspargantur. Et ubi ab huiusmodi auxilijs discesserimus, ad castorij portione transibimus, quod assidue potū sepe penitus ab hoc morbo liberat. Dandū est quotidiē drachmæ pōdere, aliquando cum aqua mulla, aliquando cum artemisiæ decocto, bituminis quoq; scrupulus utiliter ei ammiscetur. Nec parum hīdem confert ægetum scillinum assiduo potum. Atq; hæc curatio in morbi exacerbationibus adhibetur. Vbi uerō diuturnus factus fuerit, plerunq; a uenæ sectione initiū facimus, præsertim si mēstruæ purgationes fuerint decetę. Deinde ad alui euacuationē progredimur. Achtera quidē ex colocynthide omniū efficacissima est. Mulieribus tamen & uteri affectionibus magis conuenit hlera ex aloē picra, hoc est, amarā appellata, quæ habet aloē drachmas centum, asari, croci, cinamomi, mastiches, spicæ nardi, xylobalsami, singulorū dra. vi. Hoc medicamentū aridū

seruari debet. Vfus uerō tempore ad integram alui ductionem, drach. iiii. ex eo cum aquæ mullæ cyathis sex propinentur. At si partem purgationē maluimus, drac. ii. tantum ex tribus aquæ mullæ cyathis exhibebimus. Ita enim stomachū firmat, uires reparat, ac morbum depellit. Neq; post adeptam sanitatem medicamenti usus statim deferendus est, sed quantitas solum paulatim imminuēda. Peracta euacuatione, cucurbitæ inanes quidē, sed cum plurima flāma affigendæ sunt, & uolenter detrahendæ. Aliquando etiā scarificatio fit, & scarificati loci sale cōsparguntur, deinde cū cyprino cerato ad cicatricem perducuntur. Deinde emplastrū siue epithema emolliens pectini adhibeatur, quod & seminibus præparatur, supra inter splenis auxilia descriptū, primum cum cerato dilutum, postea cerato paulatim detracto, ipsum solū per se imponatur, donec pustulæ uelut uari, in cutis superficie exstentur: quæ postquā emplastro albo, aut alio quopiam ad ambusta destituto, fuerint sanatæ, iam locus est sinapismis & dropacismis acopisq; appellatis, ex euphorbio, pyrethro, adarce, ac pipperis paratis. Multū uerō conferet ad medicamenta etiā recta usuendi ratio, per deambulationes matutinas, gestationesq; in curru, uel nauis, uel lumento. A motu uerō gestationis prodest uociferatio, & lectio clara, modulata, ac congrua. Item unctio, frictio, & exercitatio per congrua intervalla repetita. Balneum autē raro, & non nisi sordis detergendæ gratia adhibeatur, & tamen bis, aut ter per totā curationem, ad morbū expellendum admitti potest. Postremum uerō cōfugiū est ad balnea naturalia, tum calida, tum frigida. Recuperata tandem sanitate mulier non omnino negligatur, sed præseruationis gratia per certa intervalla, suspectis præsertim temporibus, infectiones supra relatæ adhibeantur, & saluæ, pulegii, mercurialis, foeni græci decoctis, loci eluantur. Et pessi calefacientes, & emollientes post elutiones subdantur. Philosophus uerō inquit: ad mulierem ex uteri strangulatio colapsam, plurimis remedijs frustra tentatis, duos statim glomos in oleum anethinum seruens coniecit: Et alterum probè expressum calidissimum loco adhibuimus, & antequam frigeret, alterum pro eo subiecit, hocq; uicissim tam diu repetimus, donec mulier citra dolorem exurgeret. Sed & ceratum ex araneis interdum umbilico impositum. Aliud, ad uteri strangulationem, ac dolores, Testudinis terrestris hepae tritum in pello subdito.

Pessi ad uteri strangulationem idonei. Cap. lxxix. Pessi ad strangulatum uteri idonei tales sunt. Adipis anserini sex uncem, mastiches, adipis phasiani, styraeis, singulorum quadrantem, ceræ quadrantem. Vnā gēu nardini, spicæ nardi, croci, singulorum unciam unam, crocus cum uinō odorato ueteri teratur, sicq; uinū ad strictionis omnis exore. Alius. Ceræ sex uncem, ammoniac, mastiches, singulorum unciam unam, opobalsami, olei irini, singulorum quadrantem. Alius. Stryaciæ sextantē, ceræ albæ dodrantem, cassiæ, spicæ nardi, amomi, croci, mastiches, singulorū drach. i. adipis porcini, terebinthinæ, singulorū sex uncē, thuris sesquunciam, adipis anseris & phasiani, singulorum quadrantem, opobalsami, olei liliorum, amaracini, cyprini, nardini, irini, singulorū unc. i. Quod si ualidiorem facere malueris, cardamomi

drachm. quatuor adijce, & seminis rutę tantundem. Oportet autem aëris constitutionis respectu, ea quę calefaciunt detrahare, uel addere.

Unctiones ad uteri suffocationē, Philagrii. Cap. lxx.

Unctiones post balnea præseruationis gratia tales adhibeantur. Olei dulcis lib. i. seminis uiticis, rutę, cōtusorum singulorū quadrantē, casia trita quadrantiem. Omnia simul miscero, & sub canis. t̄st̄u per dies quadraginta insolato. Quod si pro temporis, anni, aut regionis, aut temperaturę calidiōris siue frigidiōris ratione, unctionis uim intēdere, uel minuire uolueris, addito ac detractis ex medicamentis quantum ex re esse iudicaueris. At si unctio præparata nō fuerit, irino ungento putā, aut casiam, aut amomum, aut quicquam ex his quę supra dicta sunt amisceto, ac utitur. Possunt & citra balneum hæ unctiones pectini, ac lumbis illini. Efficaciores autē euadent, si adarcen ustum, uel crudum, aut pyrethrum, aut piper tritum, aut oleū laurinum, aut cicinum, & reliqua eiusmodi addideris, ita ut unctio crassior fiat. Alia unctio ad eandē uteri strangulationē. Terbinthina, olei laurini, singulorum sex uncem, olei irini, anethini, singulorū lib. i. seminis canabis, adarcę, singulorū sextantē, piperis, saluę, calaminthę, singulorū unci. Pyrethri sextantē, nigellę, casia, singulorum unci. Arida tenuissimē trita liquabilibus liquatis ammisceto, unito, ac adseruato. Vnus autē tempore aliquo oleo calido diluito. Pectiniq; ac lumbis illinco. Suffumigium uteri. Stercoris canini albi, & sabina, æqualis portiones suffro. Et si suffusiones successerint, morbi uexationes quiescent.

Varia auxilia ad uteri strangulationē, Philagrii.

Cap. lxxi.

Mulieres ad uteri strangulatū proclives, diosporitico pharmaco assidue uel debet, & eo quod ex iribus piperis generibus constat, & quod ex calamintha appellationem habet. Singulis autē ammiscenda sunt quę semen minuunt, ac abolent, qualia sunt viticis, rutę, cannabis semina, nymphę radix, ac reliqua huiusmodi, quę in ueneriorum tractatu retulimus. Castorei quoq; drachm. assidue potet, modico aniso adiecto. At uero si prægnantibus respiratio intercepta fuerit, foris quidē ad corporis temperiem emendandam, auxilia adhibenda sunt, uerū potiones, & quę in uterum funduntur, aut subduntur, penitus uitare oportet, sicut etiā dynteres & sanguinis missionem. Ex omnibus enim his abortus periculum imminet. Cæterum meminisse oportet, ut his quę neq; contractionem, neq; declinationem uteri patiuntur, pro humiditatis, aut siccitatis ratione medicamenta idonea exhibeantur, & ualidiora: sicut his quę rarum, ac molle corpus habent imbecilliora, & rursus oppositis fortiora. Eisdemq; lunioribus simpliciora, ætate prouectioribus efficaciora. Et his quidē quę totius corporis distentionem à flatu uēroso percipiunt, flatibus leuantia exhibenda sunt. Quę uerō grauitatem perceptant, incidentia ac attenuanda. His autem quę humorum acrimonia uexantur, laxanda, ac pinguis. At si declinatio, aut contractio, aut inflammatio circa uterum fuerit, omnia imbecilliora offerantur. Fortiora enim morbum exacerbant, & seminis excretionem prohibent. Et contra quę pro curandī corporis ratione moderata sunt, tum ipsi affectioni medentur, tum seminis excretionem adiuuant.

De seminis fluxu, Sorani.

Cap. lxxii.

Mulieres nō aliter quā uiri ē seminis fluxu laborant. Est autē hæc affectio seminis citra concitationē ac tensionem uenerē profluuium, ad quod uteri laxatio, ac debilitas, & totius corporis tabefactio consequitur. A toto enim corpore materia paulatim ad uterum cōfluit, atq; isthic modicē uelut in oculis lacryma mutatur. Et sæpe contingit ut affectio hæc diuturna fiat. Quapropter recentē adhuc reprimere, ac sedare conabimur, per ea quę sensim adstringunt, uelut est rosa, myrtus, rubus, lentiscus, & huiusmodi. Pectiniq; ac inguinibus acaciā, hypocistidem, & similia cū uino austero imponemus. Cerata item ac cataplasmata ē palmulis, malis cotoneis, ac myribaccis adhibebimus. Laminam quoq; plumbeā latam, ac tenuem lumbis alligare oportet, & stratum nō sit delicatū, sed potius asperum. Vomitus a ieiuniis quidem fiat, a cibo tamen admitti quoq; potest. Præterea partes superne exerceantur, ac diu contriciantur. Et cauendū ne affectę partes inungantur, aut calescant. In potu detur solani radix arefacta, aut uitiſcis, aut rutę, aut cannabis semē ex aqua, singula drachmę pondere. Cibi utādi sunt exolui, ac forbiles, & ad seminis generationē, ac uenerem excitandam idonei. Vescatur autē solidioribus edulis, & auculis assatis utatur, ac uinū suluū bibat. Et omnia uita quę ad uenerem irritare possunt, ita ut neq; picturas, neq; signa formosa spectet, neq; de concubitu uerba faciat. Sed tetrica uiuēdi ratione, lectionibusq; ac colloquijs seueris utatur. Perseuerate uero affectione, exercitia, sudorū profectiones, frictiones, & frigida balnea adhibeantur. Et rosaceū assidue pectini, ac lumbis illinatur. Si uero aliquādo ob acriorē cōstitutionem, ac qualitatē irritas, ac quodāmodo mordens sensum, semen ipsis prodit, contrariis cibis, ac potibus utatur, balneis item, ac lactis potu, & fructibus, & aquę potu, ac similibus. Transferantur etiam huc quę ad seminis profluuium in uiris, & ad seminis in somno effusionem supra relata sunt.

De uteri debilitate, Sorani.

Cap. lxxiii.

Quodāmodū alię corporis partes, ita etiā uterus aliquādo debilitatur. Cōsequitur ad hanc affectionē, fastidiū ueneris, flatus uērosi excernuntur, menses exuberant, & singulis mensibus his, aut ter inordinate deferuntur, nigri & aquosi. Neq; semen uiri in cōtū diutius detinetur, sed a concubitu defluit, aliquibus statim, quibusdā post aliquot dies. Quędā abortū faciunt, aliquę nō abortientes gracilē, ac imbecillē foetum generāt. Menstruorū uerō tēpore pectinis, lumborum, ac crurū grauitas adest, & stomachus male habet, & hinc uaporibus ad caput eleuatis aliquādo deliria succedūt, similesq; sunt harū uexationes his, quę ab utero strāgulantur. Quādoq; etiā uelut atrabile percitę desipiunt, ac furore aguntur. Oritur hoc malū ex assiduo partu, ac uteri distensione, præsertim ubi foet⁹ insignis fuerit magnitudinis. Curatio earū facienda est, p ea quę firmadi, ac debiles partes corroboradi uires habet. Infectiones itaq; adstringētes ad tactū tepidę, & uteri elotiones conueniunt. Et rosaceum oleū tepidum, aut narcissinū, aut melinū, aut susinum, & huiusmodi, pectini ac lumbis illinatur. Et mulier per congruos motus assidue exerceatur, & alimentis utatur pauca quidē, sed quę cum leui quadam adstrictione carnis copiā generant. Vinum autem

autem sulum adstringens parensimè potest. Est enim
hinc affectioni commoda. Omnem uero lactis
esum, & obsonia è caelo parata uitare oportet, uni-
uersas ire purgationes, atq; alui ductiones recusare.

De furore uterino, eiusdem. Cap. LXXIII.

Furor uterinus est uteri intemperies, ad affectionis consen-
sum cerebrum trahens, ad quam rabiosum delirium conse-
quitur. Differt ab uteri strangulatione primò causa.
neq; enim hic uterus sursum tractus principalè aliquà
partè ad affectionis consensum ducit, aut còpressionè,
aut morfu, aut uapore, sed eodè loco permanens: per
medullà spinale, aut alias sibi insertas propagines, ul-
tiosam qualitatè quacumq; tandè ad cerebrum mittit.
Deinde etià signis ab uteri strangulatione differt. Ae-
grotae enim minime in hac sicut in illa affectione mu-
tae, ac sine sensu decubunt, sed potius garrulae, iracu-
ndae, ac inquietae fiunt. Differt etià à furore nò per cò-
sensum, sed primario cerebrum impetente. Harum enim
amècia tota in uenere uersatur, & nihil aliud imagi-
nantur, aut loquuntur, p. de coitu, pruritisq; pudendum
habere, eiusq; tactu mirum in modum delectantur. Acci-
dit hæc affectio tēperatura calidis, ætate uigentibus,
uirginibusq; ac castitate seruantibus, & quæ optimis
edulgijs uescuntur, & in delicijs ac animi uoluptate uer-
santur, præcipue si alias libidinis ac ueneri aduetae fue-
rint. Nihil enim aliud est hæc affectio q; ardor, & fer-
uor uteri, ad cerebrum & totum corpus distribuit. Pro-
inde q; supra ad calidam uteri intemperie relata sunt utero
adhibenda, huc transferantur. Irrigationes aut capitis,
& alia auxilia furori cògrua, Sermone sexto retuli-
m. Peculiariter aut huc facit pastillus Trigonus, cū
equale portionib. crocomagmatis, ac cypheos aroma-
tiset. Facti & hydrosolati potus. Et hoc medicamentum.
Smyrni, croci, spicæ nardi, sing. unc. i. excipe diaco-
dio, aut hydrosolato, & dra. ii. pōdus ieiunis exhibe
cū coriandri decocto. Quod si ob corrupti seminis
redūdantia affectio contigerit, nitrū & cardamomū
cerato excipito, ac pudēdis subdito. Salusq; em simili-
le qd elicitur, & affectio sedatur. Ruta uero cū casto-
riō in myrteo cerato supposita, genituram siue semē
cōtrahit, & furorē mitigat. Sed & diacodium aceto
aut solani succo ammixto subditū ardorē extinguit.

De uteri resolutione, eiusdem. Cap. LXXIV.

Vterus sæpe etià ob alias causas, sed maxime ppter fre-
quentes abortus resoluitur. Cōsequitur ueneris odiū,
oris uteri frigefactio, elusdēq; plenus, pinguis, & ue-
lut infartus habitus, cervicis itē laxitas ac stupiditas.
Sæpe etià menses supprimuntur, aut ægre prodeunt. In
cōgressu uiri, uel nihil omnino seminis in uterū im-
mittitur, uel infectū uelut ex inanimato loco statim ef-
luit. Aliquādo etià urina & stercus importune pro-
dit. Curatio aut similis est ei quā de mēstruorū stilli-
cidio dixim. facit & asiduum castorij potus, & pes-
sorū calefacientiu, etotionūq; acunctionū adhibitio.

De uteri prolapsu, eiusdem. Cap. LXXV.

Prolapsi uterum dicimus, quum ita eueritur, ut foras
promineat. Neq; enim totus à suis appendicibus ex-
olutus, uelut imperiti putat, excidit. Nā si ita proci-
deret restitui nō posset. Quod autē procidit strutho-
cameli ouo simile est, iuxta maioris, ac minoris dif-
ferentiā, prout uiolenta euersio cōtingit. Sunt autē pro-
lapsus causæ multæ. Ab alto enim delapsa mulier,
& in coxas delata, disruptis pelliculis, ac ligamentis,
quæ uterū continent, ac uicinis partibus cōnectuntur,

hoc malo corripitur. Corripitur & ob uiolentā se-
cundæ extractionē, quod præcipue in abortibus cō-
tingit. Præterea inaruficiosa foetus extractio, aut ni-
mia spiritus dectio, aut immensū oneris eleuatio, aut
plaga, uteri prolapsum inducit. Sæpe etià ob humo-
ris plurimi, ac lentī defluxū, & ob partuū frequen-
tiā, appendices ex quibus uterus dependet, laxantur,
ac soluuntur. Quin & ob uehementes animi affectus,
uelut si liberorū amissio, aut hostium incursus nun-
cietur, aut ob periculofam nauigationē, aut eiusmodi
quandā causam, mulieres toto corpore exolui so-
lēt, ita ut uterus simul prolabatur. Aliquādo etià ci-
tra ullā eiusmodi causam partes debilitantur, ut pro-
pter pellicularū, ac musculorū uterū sustinēuū reso-
lutionē, hæc affectio cōtingat, qd inclinata ætate ma-
xime fieri solet. In principio itaq; plurimus sanguis
erūpit, deinde cōsequitur dolor pæordiorū, lūborū,
imū uētris, ac pudēdorū, & periculū est ne pfrigeran-
tis locis cōuulsio inferatur. Vbi uero tēporis pgressu
su affectio inualefcit, & loci callosi facti fuerint, neq;
conuulsionis periculū imminet, neq; dolor infestat.
Quū ergo adhuc recēs est affectio, conari oportet, ut
uulua ipsa cōtrahatur. In principio em facile dirigū-
tur, & rectè locata pmanet, præcipue in uigoris æta-
te. Nā ætate prouectiorib. cōtrahitur qdē, sed ex le-
ui occasione rursus plabitur. Si itaq; durū stercus in
recto intestino esse suspicaberis, per clysterē euacua-
bis. Similiterq; si in uesica lotiū collectū fuerit, p fis-
tulā uesicæ adaptatā euocabis. Cōtingit em plerūq;
ut illarū superfluitatū detēctione, uterus inter utrūq;
rectū inquā intestinū, ac uesicā situs, cōprimatur ac
coarctetur, & impediatur, ne repellā, & ad ppiū si-
tū reduci possit. His aut peractis ægrā supinā collo-
cābimus, coxis altioribus, reflexis popliteis, ac cru-
ribus disparatis. Deinde plapsam uteri partē oleo te-
pido, aut butyro, uel betæ, malux, altheæ, saxi græci,
seminis lini, aut similiū decocto fouebimus; & la-
nā cōuolutā figura ac crassitudine muliebri pudēdo
correspōdentē accipiem, eāq; lineolo inuoluemus,
& acaciæ, aut hypocythidis succo uino diluto intin-
gemus, ac utero apponemus, & citra uiolentiā totum
quod prolapsum est reprimemus, donec tota moles
intra sinū recipiatur. Postea lanā in pudendum subde-
mus, & aliū lanæ hapsum uino adstringente imbutū
supponemus, atq; totū pectinē spōgij ex posca ex-
pressis integemus, & mulierem reclinābimus crura
extēsa, ac coaptata habentē, ita ut alterū alteri incum-
bat. Tutius tamē fuerit p fasciā ad gēua usq; cōstrin-
gere. Aliqui uterū recens prolapsum cucurbitæ do-
mesticæ, ac betæ decocto, cum urina graueolētī, aut
acri aceto, aut re aliqua foetida proluunt. At uero si
prolapsus uterus tēporis progressu intumuerit, plus-
rimoq; humore refertus fuerit, ut præ tumore redu-
ci nō possit, betarū decocto ipsum rigamus, deinde
acetū affundimus, & salē tenuissimū inspergimus,
& postea sedato tumore, eodē decocto pfulū retru-
dimus. Deinde cucurbitas umbilico, & utriq; lateri
cum plurima flamma affigimus, & odorata asidue
naribus admouemus. Tertia uero die lana adhuc in-
tra pudendi sinum existente, mulier in uino nigro
austero aliquatenus tepesacto, aut in myrti, len-
tisci, rubi, ac malicorij decocto insideat. Et post in-
sensationem rursus supina coxis altioribus locetur,
& sublata ex pudendo priore lana, alia rursus eo-
dem

Eadem perie ora ex Paulo

dem medicamento imbuta subdatur. Cataplasmata uerò forinsecus imponantur ad imū uentrem, ex pal- mulis, polenta, lēticula, ac malicorio, cū aceto mul- so. Atq; hæc rursus terila die fiāt, usq; ad perfectā cu- rationem. Porro uteri crebro prolabētes posca ab- luantur, in eademq; mulier diutius infideat. Deinde omnia relata fiant. Sæpe uerò ob locorū sensus sub- siliatē, relecto aceto terram nigrā quā in lentibus re- perimus aqua diluimus, & ex ea partē affectam plu- rimum fouemus, ac postea eadē medendi forma u- timur. At uerò si uterus ob humorū lentorem diffi- culter repellitur, uini fecem ustam, aut nitrū lix iulo permixtū oblutimus, & cū decocto aliquo adstrin- gente, aut cum prædicta terra aqua diluta fouemus. Deinde plumbi cremorem oleo myrteo, aut melino ammixto, parti prolapsæ illinemus, ac in sinum pu- dendī retrudemus. Locū insuper interni, ægra undi- quaq; circumsecta rebus sordidis suffiatur. Naribus autē odoratissima quæq; admoueantur. Et cibi bo- ni succi, & uina odorata tenuia offerantur. Ferūt tor- pedinis coriū recēs detractū, parti prolapsæ obuolu- tū, ipsam repellere: atq; idē posse pastinacæ marinæ aculeū cū hyoscyami succo illitū. Illud autē obserua- dū est, ne alius nimis subducatur. Exoluuntur em la- xaturq; uicinar partes, & uterus recidit. Si uerò pars prolapsa tēporis pgressu p negligentia cōputruerit, & ex assidua urina irrigatione & adhærentibus sor- didis, exulcerata fuerit, auferatur citra ullius periculi formidīnē. Narrat em totū uterū putrefactū aliquā- do ablatū esse, & mulierē nihilominus superuixisse.

De reclamatione, auersione, ac recurſu uteri,

Aspasie.

Cap. LXXVII.

Suppressis mēlibus necesse est uenas, & arterias ad u- terum tendētes repleri. Nā sanguis usq; ad uasorum oscula accurrit quidem, uerū intra uterum prodire non potest, aut eò quod nimia crassitudine osculis impingitur, & grumofus sit: aut quod ipsa oscula clausa sunt, & transitū impediūt, ita ut uenæ humo- re refertæ extendantur, & uicinos uteri appendices hu- meant, quorū extēsiōne uterus retrahitur. Si itaq; ex utraq; parte æqualis retractio fiat, reclinatio, aut reuulsio, siue recursus uteri æqualis cōtingit. Si ue- rō in alteram partem maior retractio fiat, alterum ē uisceribus his in causa est, splen uidelicet aut hepar, quorū uenæ superfluo sanguine extenæ à suis par- tibus uterū retrahunt, hepaticæ uenæ ē dextris, sple- nicæ ē sinistris, prout alteræ magis fuerint repletæ. In utram uerò partē uterus declinauerit, digitorum admotione, & signis insequētib; cognoscemus. Si enim in obliquum declinauerit, propinquus femoris distentio, dolor, perfrigeratio, impedimentū, & tor- por indicio erit. Aliquando uerò etiā eiusdem are- factio, & ad innitendum, ac ambulandū impotentia consequitur. Si uerò retro, aut infra inclināt, torpor ac difficilis utriusq; cruris motus sequitur, sæpe etiā motus penitus intercipitur, & ingens uexat dolor. Alius etiā supprimitur, neq; clysterem admittit, ni- si genibus innitatur ægra. Flatus item retinentur, & dolores inter sedendū acuntur, præsertim si uersus anum reclinatio contigerit. At si ad pubem uergit, imus uenter, ac pecten extēditur, & dolores ibidem percipiuntur, aliquando etiam urina supprimitur. Quomocunq; igitur uterus retractus, ac inclina- tus fuerit, eodē modo uelut inflammationes in exacer-

bationibus curare oportet. In remissionibus autem & declinationibus, magis emollientibus utendū est. Perseuerante uerò affectione, his quæ ex alto attra- here, & corporis habitum mutare possunt. At uerò auersionem uersus anum ita curabimus. Primū ob- stetrici Imperabimus, ut digito in anum immisso uterum propellat. Deinde glādem ano subdat qua- tuor digitorū longitudine, ex galbano & cera para- tam, culus extremitati filum extractionis gratia sit annexum. Aut castoriū aqua dilutum, & lana excep- tum similiter subdatur. Aut bitumen aridum, aut pix liquida. Postridie uerò trinu, aut susinu oleum tepidum, in uterum & intestina infundatur. Et loci aromatum, aut marrubij, aut conyzæ decocto fo- ueantur, & ex eodē uterus eluatur. Postea ceratū ro- faceum adhibeatur. Si uerò in obliquū retractio in- clinat, primū eadem somenta adhibeantur. Deinde obstetrix specillo cum digito subimmisso, uteri col- lū dirigat. Aegra uerò in cōtrarium partē affectæ la- tus, aut supina decumbat. Pelsis insuper mollioribus aperiētib; utemur, & ex prædictis oleis aliquod infundemus, & pectini lanā uino, & rosaceo imbui- tam, aut succum seminis lini cerato exceptum impo- nemus. Et castorium cum aniso, aut cumino, aut ni- gella, aut pæoniæ radice, aut smyrnē, aut dauci se- mine, aut aristolochia, aut gentiana, aut helenio, ex aceto mulso propinabimus. Eadem etiā ad repenti- nos uteri dolores faciunt, nō singula solū per se, sed etiā simul coniūcta. Mulier autē acclius capite decū- bat, & si cōpositus recte uterus rursus retrahatur, lo- rida statim naribus admoueantur, & sternutationes prouocentur. Et si urina supprimatur, fistula uesicæ ad hoc destinata proliciatur. Et si ab his exacerbatio fuerit exoluta, quiescendum est. Cæterum pro afflictionis magnitudine, si ægram adoleſcentem & sanguineam nacti fuerimus, considerabimus an cu- biti uena sit secanda. Deinde menses prouocantia propinabimus, & pelsis mitioribus utemur.

De uteri inflatione.

Cap. LXXVIII.

Vterus aliquando ex partu perfrigeratus flatu imple- tur, osculo ipsius concluso, aut grumo sanguinis in ipso impacto. Flatus autē ipse quandoq; in uteri ca- uitate cōcluditur, quandoq; in corporis ipsius uteri angustijs cōtinetur. Cōsequitur pectinis, ac imi uen- tris tumor, uelut in hydrope tympanite, cum dolore pungituo, perpungēte usq; ad septum transversum, & stomachum, & nihilominus utrinq; in lateribus extento, & sæpe ad alterū, sæpe ad utrumq; inguen se extēdente. Umbilicum item lumbosq; ac pectinem idem infestat, & caput quoq; per consensum afficit. Quandoq; uerò flatus per muliebrem pudendū erum- pit, ut ægre id percipiāt. Si itaq; flatus in uteri cau- tate fuerit conclusus, strepitus, ac sonitus quidam in corporis flexu audirur, qualis in intestinis cōtingit, quæ torminibus uexantur, & ad digitorū inflatio- nem sonus tympani redditur. Si uerò intra uterū an- gustias cōtinetur, dolores uehementiores, ac curatu difficiliores infestant. Huiusmodi autē affectiones sa- me, ac olei dulcis calidi irrigatione, in quo ruta & anethū decocta sūt, curatur. Et nisi ætas, regio, & an- ni tēpus obstiterint, uena secetur. Inſersionesq; in ru- tē, pulegiā, calaminthes, marrubij, thymi, artemisiæ, altheæ, ac caricarū decoctis fiant. Et corpus per hie- rā Rufi, & Archigenis ex colocynthide euacuetur.

In exacer

In exacerbationibus autem uulua his colluatur, quæ laxandi, ac flatus discutendi vires habet, quale est oleum gleucini, & pessus eiusdem facultatis plurimo oleo dilutus, & per uteri fusiorem clysterem immisus. Cataplasmata etiam leuia ex caricis, hyssopo, ruta, ac nitro imponantur. At uero si flatus ob impactos grumos fuerit conclusus, postquam ægra in aliqua ex relatis infusionsibus diutius cõsedat, obstetrix digitum illitum in pudendi sinum immittat, & grumum sensim dissoluat, ac educat. Perseuerate uero inflatione, in exacerbatione efficaciora adhibeantur, interpositis temporis spatio, illitionibus calidioribus, crurumque, ac affectorum locorum frictionibus utemur. Et lumbis ac pectini dropacem adhibebimus. Aut rubefactorium è sinapi & caricis. Aut farinam ordeaceam cum caricis, ruta, hyssopo, & melle coctam. Aut epithema ex seminibus, aut ex baccis lauri. Aut polyarchium cerato cyprino exceptum. Aut postea etiam per se solum. Pessus quoque eiusdem facultatis subdatur, ex terebinthina, galbano, iride, ruta, & cœlypo. Et qui ex pulegii, nitri, mellis, fellis taurini, æquis portionibus paratur. Maxime autem cõuenit hic, Caricarum pingulum probe cõtusalum, ut granula non percipiatur, drachmam unam, cumini drachmas duas, spumæ nitri albe drachmam unam. Verum ad acrimoniam obtundendam, pessum hunc in lac prius immergere oportet. Cucurbitæ quoque affigatur, & uolenter detrahantur. Aliquando etiam scarificatio fiat. Utendumque est omnibus quæ ex alto materiam attrahere possunt, & balnearum naturalium aquis prius calidis, deinde frigidis ut corpus ad tolerandam frigiditatem sensim alliciat, & affectæ partes paulatim firmetur. Alimenta quoque attenuata, ac flatus discutientia exhibeantur. Et medicamentum diosporitum, ac ex calamintha cõstant aliquando exhibeantur. At uero auxilia amplius medicata, & aromatum suffragia, tanquam capiti noxia reprobamus. Sed & epithemata adstringentia, qualia sunt quæ ex palmulis, ac malis cotoneis parantur, & similia, ad hanc affectionem inepta sunt.

De uteri hydropo. Cap. lxxxix.

Quum menses longo tempore fuerint suppressi, & impregnatio impedita, sæpe humoris copia in uterum confluit, & aliquando corpuscula quedam uellicæ felis similima in ipso generantur, in quibus humor colligitur. Sequitur affectionem hanc, tumor circa imum uentrem amplius, latus, flatusosus, & murmura uelut in intestinis, in ambulando grauitas, & spirandi difficultas, alui recrementa graueolentia sunt, & menses ac conceptus impediuntur, & quæ prodeunt nullo ordine seruat deferuntur. Vbi uero uolenter excernuntur, ruptis aliquando paruis illis corpusculis, quæ uellicis similia diximus, uiscosa quedam, ac aquosa erumpunt. In quibus itaque humor in utero collectum ex propriis signis cognoueris, decubitu quieto, mox uomitu, ac ualidis elotionibus utendum est. Proinde cordicis radicis thymalli myrti sicci dra. ii. per se, uel cum radice panacæ obolo propinabis. Et in uterum infundes quæ mucosos humores attrahunt, qualia sunt, grani cniidii grana decem, cum oleo irino & modico melle. Aut ueratrum nigri drach. ii. cum irino aut cyprino, aut narcissino oleo, cum modico melle per uteri fusiorem clysterem infundito. Verum ante has elotiones, cardamomum cum sale, aceto mulso, thymo, pulegio, calamintha, aut simili quopiam bibendum da-

bimus. Deinde humorum copia per alium excreta, prædictæ elotiones infundantur. Aut pessus eiusdem facultatis subdatur. Et postea sinus pudendi aqua marina profuatur, primum sola, deinde addito aceto, & aliquo ex prædictis in ipsa cocto. Elotione peracta, ac locis probe deterfis, pudendo ac femoribus oleum cyprinum illinatur. Medicamenta uero ipsidem cõuenientia hæc sunt. Pulegii drachmam unam, cum modico pipere. Aut gentianæ uel origani drachmas duas, cum semine dauci, uel smyrnii, cum uino mulso, aut aqua mulsa in potu dentur. Salis præterea cõmunis loco alimentis inspergatur hoc. Hyssopi tridentem, pulegii quadrantem, origani, cumint, singulorum sextantem, seminis ammi, spicis nardi, singulorum unam, unam, salis tostæ quadrantem. Trita misce, ac utere. Sed & pudendi sinus resina, myrrha, & amomo suffragatur. Pessus autem huiusmodi utendum est. Nitri, colocynthidis, singulorum quadrantem. Melle excipe, & pessum inde paratum oleo cyprino tinctum subde. Alius. Cumint & nitri æquales portiones melle excipe. Potest & uiolæ albae semen addi. Alius. Colocynthidis quadrantem, salis unc. i. pinguium caricarum carne excipe, ut sit iugladis magnitudo, & inde pessum paratum subde. Humorem enim foetidum attrahit, ac mirifice prodest. Idem sed inditus, stertoris & humorum, ac flatuum copia elicit, & uterum leuat. Alius. Comæ ablinthii, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. i. æris usti, nitri, singulorum drach. i. melle excepta subdito. Hoc autem placidissime & citra omnem dolorem attrahit. Cicutæ semen, aristolochiæ, cuminum, salem, carne caricarum excipe & subde. Cæterum ad aquæ receptacula, eas uidelicet uellicas quas in utero generari diximus, fomētis utemur ex aromatibus, quæ menses eliciunt, & pessus sanguinem trahentibus. Ex quorum numero hic est. Cneori, quod est grani cniidii radix, aut illo non præsentē, chameleæ, elaterii, casia, singulorum dra. iiii. aluminis scissi, misyos, sâdarachæ, myrrhæ, costi, croci, singulorum drach. iiii. melle excipito, atque aluo pridie euacuata per clysterem, pessum inde paratum subdito, integramque diem, ac noctem finito. Et si semel parum eduxeris, rursus subdito. Si uero mordacitatem induxeris, cetaurii decocto tepido sinus pudendi foueatur, ac eluatur. Et mitigandi gratia pessus mollis torius subdatur. Aut cicutæ semine cum aristolochia, cum mino, sale, ac caricis, uelut paulo ante diximus subditur. Mitissimum uero omnium ad huiusmodi pelliculas & aqua refertas uellicas, est mercurialis masculæ semine, cum modica myrrha, sale, ac melle, lana exceptum, & multis diebus subditum. Post harum autem educationem, exercitijs, sudoris puocatione, & ualidis totius corporis, & præcipue imi uentris frictionibus utendum est.

De mola uteri.

Cap. lxxx.

Quæ mola appellatur, tumor est uteri induratus, aliquando prægressa inflammatione succedens, aliquando post locale ulcus, cui caro superexcreuit. A motus autem difficultate & grauitate, mola nomen accepit. Cõsequitur hunc tumorem, detractio partium superfinebentium, gracilitas, coloris uitiatio, & appetitus prostratus. Et primum sanè conceptus suspicionem de se præbet. Nam & menses supprimuntur, & mammae inuemesunt, & stomachus subuertitur, & lumbi grauantur, uenterque attollitur, uerum temporis progressu discernitur. Molam enim dolor puentionis sensum inferens subsequitur. Nec in ea motus ullus, uelut in utero conceptu percipitur.

*It. g. sine
seus g. m.
gall. iq.
par. cap.*

capitur. Quin & postea toto corpore imminuto, ac uentre ampliato, hydropis imaginē prae se fert. Discernitur tamen ab illo per tumoris duritiā, & quod tumor hic ad digitorum appressiōē, ac pulsationē non cedit, neq; tympani sonū, uelut in hydrope edit. Et quod neq; ad manus contactum ulla fluctuatio percipitur. Aliquando tamen temporis progressu hepar perfrigeratur, & hydrops superuenit. Quidā uerō tradunt in quibusdā mulieribus carunculas ad iuglandis nucle magnitudinē per pudendum excretas esse, aliquando singulis mensibus, aliquando bimestres, aut trimestres. Hanc affectionem alij uelut incurabilem penitus reliquerunt. Alij incipientem tantū curari posse confidunt, negligenda tamen non est, sed omnia quae conuenire uidebuntur, facienda. Cataplasmata igitur laxandi uiribus praedita, fomenta, clouones mitigatorias, pessos mollitorios, ad duritias infra descriptos, infusions eiusdē facultatis, & cerata ex althea & oleo cyprino parata adhibebimus. Et malagma ex succis, & quod Mnasea inscribitur imponemus. Deinde cucurbitas cū scarificatione apponemus, & alimenta boni succi offeremus. Atq; haec quidē in ipsis exacerbationibus adhibere oportet. In interuallis autem corpus reficiendum est per ea quae id praestant, gestationē uidelicet, deambulationē, balnea, & cibos conuenientes, ac uelut potum. Partibus item affectis dropaces adhibebimus, & nitro ac sale inspersis easdē insolabimus. Et per medicamentū ex sinapi, ac caricis rubificabimus. Epithematis insuper mollitorijs ex seminibus, ex bacis lauri, & polyarchio, ac similibus utemur. Suffragum etiā uaporis aquae marinae, aut muriæ adhibebimus, aut decocti foliorum, ac baccarū lauri, pulegij, thymi, hyssopi, saluiae, marrubij, artemisiae, centaureae, dictamni, scordij, polij. olla autem operculo perforato arundine inserta sellae supponatur, atq; inde per arundinem uapor intra pudendum recipiatur. Pessī item subdantur ex cefypo, butyro, adipe anserino, medulla, aut cerebro ceruino, melle, caricis pinguibus, uuis pallsis, cum oleo antiquo cyprino, trino, sampsuchino, amaracino, fusino. Perseuerante uerō malo, acrum eduliorum esus assumatur, & innationes aquarum calidarum, & aquae marinae. Et ab acceptis raphanis uouendū. Pessos tamē & infusions aciores uitare oportet, ne loci ex assiduo eorum usu exulcerentur. His autem transactis, saepe plurima atrī ac grumosi sanguinis copia repente excernitur, & affectio dissoluitur. Philosophus uerō detentis inquit uxorīs amici cuiusdā mensibus, arbitrabar primū ipsam concepisse. Postea aucto amplius tumore, hydropē suspectū habui, quia totū corpus, ac pedes tumescere uidebā. At ubi tandē id affectionis genus esse deprehēdi, quod alij laeterem, alij molā uocāt, rutā & anethū in uino ueteri fuluo odorato coxi, & abiectis herbis, uinū calidū bibendū dedi, & ferme aquae loco exhibui, statimq; mulier excreta sanguinis copia salutem adepta est.

De tumore uteri laxo, Sorani.

Cap. lxxxix.

Uteri tumor laxus pallidus, ac albus est, ad tactū mollis, & digitorū cōpressioni cedēs, scēp rursus paulatim attollēs, & cutis uētris manu apprahēsa facile attrahitur. Locū itaq; oleo cōmuni calido, aut trino, aut cyprino rigētur, & pessī subdantur, ac reliqua auxilia adhibeantur, quae supra de uteri inflatione retulimus.

De Satyriasi, eiusdem.

Cap. lxxxvi.

Mulieribus quoq; satyriasis & tēdgo accidit, qualē uir fieri supra retulimus. Cōsequitur ad hanc ingens pudendorū pruritus cū dolore, ita ut mulier locis assidue manus admoueat. Atq; ideo intolerabili ueneris desiderio cōturbescit, & falsi humoris effluentis acrimoniā, ac mordacitatē percipit. Et loci utero uicini inflāmantur. Illud uerō ardēs cōiundi desiderij seuiorē reddit affectionē. Quum enim partes affectae distētae sint, & semē excerni nō possit, quoniā meatus per inflāmatōnem obturatur; maior materij copia frustra ad locū attrahitur. Statim igitur a principio uena ipsis secāda est, & alimentū cōtrahendum. Et pubi, ac lumbis illinēda quae leniter refrigerant, ac cōtrahūt. Caput aceto & rosaceo irrigetur. Et in potu aqua tepida exhibeatur. Cibi uerō sint sorbiles, omnis prorsus flatus, ac ueneris cōitationis exortus. Duobus uerō a uenae sectione diebus, cucurbitae cū scarificatione affigantur. Reliqua uerō curatio eadē sit cū ea quā ad inflāmatōnē uteri mox referem.

De uteri inflāmatōne, Philumeni. Cap. lxxxiii.

Uteri inflāmatō ob multas causas cōtingit. Nā & ex plaga, & mensiū suppressione, & abortu, ulceratione, nimio coitu, sellae durioris infessu, longa ac inuenta ambulatione, frigidityteq; ac flatuositate oboritur. Indicāt hanc muliebriū locorū, pubis, imi ueneris, ac lumborū dolores ardentes. Et si digitus in os uteri submitatur, occurrit ad contactum durū, clausum, seruēs, ac retractum, praesertim si in ipso, aut in collo fuerit inflāmatō. Nā ubi cautitas, aut fundū uteri inflāmat, imi uētris dolor ostendit, ut ne cōtraetū quidē foris admittat. Et plerunq; uterus ad inflāmatū locū retrahitur, atq; hāc ob causam os, & collū eius auertitur. Differt autē ab ea quā supra uteri retractionē appellauimus, quia in inflāmatōne febris est acuta, & ardor intensus. Si uerō posterior ipsius pars inflāmata fuerit, dolor circa spinā magis haeret, & cōpresso intestino recto stercora detinētur. Anteriorē autē parte inflāmata, urinae difficultas, aut stolididium cōsequitur ex cōpressa uesica, praesertim si dolor pectinē affligit. At ubi obliquos laterū locos inflāmatō occuparit, Inguina distēduntur, & crura grauātur, ac egre mouētur. Inualescētē uerō inflāmatōne, febres accedunt, dolor capitis, stomachi afflictio per cōsensum, imi uētris tumor, ardor, distēsiō, grauitas coxarū, lumborum, praecordiorum, inguinum, femorū, horrores discurrētes, ac pungentes, pedum torpor, genuū perfrigeratio, extremarū partiū exudatio, pulsus parui, ac densi, animi deliquiū, exolutio. In augmento uerō etiam singultus dolor tendinis, collī, maxillarū, sincipitis, oculorū praesertim in fundo. Urinaq; ac stercorumcrementa supprimuntur. Et inflāmatōne adhuc magis aucta, febres augescunt, delirant, dentibus frendunt. In principio itaq; curationē aggressi, aegrotam in domicilio obscuro, & moderate tepido collocabimus, quietem imperātes, & omni crurum motu interdicentes. Deinde artus manuum contrēctatione demulcebimus, & pedum, ac manū iūcturas fouebimus, irrigabimusq; ac lana pura integemus. Alium autem eluemus, & molli infuso euacuabimus. In potum uerō & ad oris collutionē, aquam calidā, & pisanā succum dabimus. At si uehementior inflāmatō fuerit, & neq; etas, neq; habitus, neq; anni sēpus obstiterit, neq;

neq; inflammatio post abortū, aut nimiam sanguinis euacuationē superuenit. Cubiti uena secetur, & sanguis pro uiriū ratione detrahatur, licetq; in secunda die uenam incidere, in tertia uerò detractionē repetere. Deinde alica ex aqua mulsa, aut pane loto, aut ouo forbili, ægra alternis alatur, omnibus his moderatē exhibitis, feruēte inflammatione lana succida uino & oleo, aut aceto & rosaceo imbuta, imo uētri, ac pubi imponatur. Aut palmulæ uino coctæ. Aut mala cydonia in posca cocta, cerato melino, aut rosaceo ammixta. Cataplasma uerò imponatur sic paratū. Melilotū in passo coquito, ac terito, & uitellos ouorum assatorū addito, & cum rosaceo, aut melino, aut crocino imposito. Aut palmulas uino diluto feruefactas, cum polentæ farina, & aliquo ex prædictis ungentis terito, ac imposito. Cæterū ad inflammationes erysipelatas igneo ardore cognobilis, utendū est cataplasmatibus ex polenta, & intubo, perdicio, umbilico ueneris, sedo, polygono, pampinis uitis, portulaca, plantagine, & similibus præparatis. Et lana aliquo harū herbarū succo, cū rosaceo, aut melino oleo imbuta, in pudēdū subdatur. Quod si cataplasmatū onus loci nō tolerant, aqua rosaceo ammixto ex modicis interuallis affundatur. In exacerbationis declinatione totū corpus inungatur, & ægra in aqua tepida usq; ad lumbos insidere iubeatur. Deinde pessi subdatur ex aliquo ungento leniter adstringēte parati, rosaceo uidelicet, melino, lētiscino, ac cœnanthino, adiectis ouorū uitelis crudis siue assatis, & croco. Potest & ex prædictis succis aliquis ammisceri. Caput præterea rosaceo cū modico aceto irrigetur. Mitigata uerò inflammatione, mulier in aqua oleo ammixto insideat, & pessos ex narcissi no, aut susino ungento paratos subdat. Et lanā oleo calido imbutā pectini, ac lūbis adhibeat. Interdum & cucurbitæ lumbis affigantur, & tumore magno existente, etiā scarificatio fiat. Postquam autē inflammatio declinare incoeperit, ad ea deueniemus quæ laxare, ac discutere possunt. Proinde in foeni græci, althæe, seminis lini, interdum etiā pulegii, marrubii, saluæ, artemisiæ decoctis, ægra insideat. Et ad imum uentrē, ac pubem, farinā ordeaceā cum foeno græco & lini semine, in aqua mulsa coctā, imponat. Aut caricarū decoctū adhibeat. Quæ uerò cataplasmatum grauitatem, ac calorē ferre nō possunt, in aqua tepida insideant, & rosaceo locos illinant, ac pessos subdant moderatē refrigerātes, ex adipe gallinaceo, rosaceo, ac uino præparatos. At his quæ calorē ferunt, ceratum nardinū adhibeatur, & infusiones inijciantur, ac pessi subdantur, ex œsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, ungento susino, & cera tyrrenica, ubi uerò curatio processerit, tenuis uictus & ciborū parsimonia tollatur, & manifesta iā facta declinatione, balneū ac uinū concedi possunt, & cibi reficiētes exhiberi, malagmataq; adhiberi, uelut est quod ex meliloto paratur, & quod ad Mnaseam, & quod ad Serapionē refertur. Pessi porro ad sedādos inflammationū dolores uteri, tales sunt. Foeni græci madefacto, & prima ac secūda aqua diffusa, cū terida pura, ac dulci coquito, ac excolato, & ad decoctū adipē anserinū, uel gallinacē recētem addito, & ad prunas liquari sinito. Et ubi frigefacta fuerint, cōcre tū adipē tollito, ac seruato, atq; usus tēpore spathula in manu subactū pello excipito, ac subdito. Alius

dolores sedāns. Papaueris capita passo coquito, & flaccida facta exprimito, & ad decoctū excolato medullā ceruinā liquatā ammisceto, ac utitor: si ceruina medulla defuerit, uitulīnā accipito. Alius. Foeni græci aridi triti, ac cribrati drach. iiii. in passo cretico, aut sapa coquito. Et terebinthinæ, adipis anseris, singul. drach. iiii. rosacei sesquiquarta accipito, & omnia simul liquefacto, & foeni græci decocto ammixta pello excipito, ac subdēda dato. Alius pessus soporifer, dolorē mitigās, & oēm duritiā molliens. Tria papaueris capita magnitudine mediocria in quatuor passi cyathis p biduū macerato. Deinde coquito, donec capita flaccescāt, & passum ad tertias redigatur, postea expressis & relictis capitibus passū excolato, & galbanī, myrrhæ troglodyricæ, thuris, opii, singul. sesquidrachmā, calicæ drach. iii. accipito, & singula seorsim primū, deinde simul probē terito, & capitulorū papaueris decoctū paulatim adstil lato, donec omnia ad mellis cōpagē redigātur. Tum œsypī, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singul. dra. iiii. oīa simul colliquata ammisceto, ac adseruato. Vfus autē tempore medicamētū hoc rosaceo dilutū pello excipe, ac subde. Oēm em̄ dolorē & uehementes inflammationes statim mitigat, uteri stragulationi medetur, duritiās molliat, & somnū conciliat. Alius pessus somnū inducēs, ualēs ad inflammationes. Musci quē etiā hypnō dicūt, in aqua feruefacti, expressi ac triti, panis aqua mulsa macerati, ac cōtusi, emplastrū basilici, emplastrū ex succis, ungenti nardini, adipis gallinacē, & quales partes liquefacto, ac utitor. Facit ad urinarīū meatū ac uterū inflammatū, & ad uteri declinationes. Ego uerò pro pane fermentū purissimū nō omnino acidū sine sale, in aqua mulsa macero, ac utor. Pessus aureus appellatus. Ad inflammationes & uteri retractiōes siue declinationes. Ouorū assatorū uitellos sex, medullæ ceruinæ dra. iiii. croci dra. ii. œsypī dra. ii. ceræ albæ, terebinthinæ, adipis anserini, sing. dra. i. Crocū cum modico uino dulci terito, & oua trita adijcito, & liquabilia liquefacta ammisceto ac adseruato. Vfus autē tempore medicamentum oleo nardino dilutū pello excipito, ac subdito. Alius pessus. Ceræ tyrrenicæ drach. xxiiii. adipis anserini, porcini, terebinthinæ, singulorum dra. sex, decocti capitū papaueris dra. quatuor, rosacei quantū satis est, aut irini, si calfactione ac discussione opus est. Alius. Adipis anserini trientē, cerati rosacei aut susini sextantē, uitellos ouorū assatorū, croci, singulorū unc. i. myrrhæ drach. iiii. opii obolos duos, aut pro opio, capitū papaueris decoctum. Alius. Ceræ tyrrenicæ, medullæ ceruinæ, singulorū drach. c. adipis anserini, terebinthinæ, singul. trientē, croci obolos quatuor, opii obolos duos, ouī asafati uittelū unum, olei susini, aut telini ex foeno græco parati, quantū satis est. Pessus Enneapharmacus appellatus, ad inflammationes. Adipē anserinū, & bubulum, cerā albā, terebinthinā, butyrū, medullam ceruinā, mel, oleū rosaceum, & cicinū. Omnia recentia æquis portionibus liquefacto. Pessus ad feruentiores inflammationes. Emplastrū ex succis cū rosaceo liquatū succo plātaginis ammisceto, & pessum formato. Si uerò plātago defuerit, senecionis aut intubi succū accipito. At si plurimū excāduerit, & ad erysipelatis naturā tēderit inflammatio, solani folia tenera cū lacte mulieris trita supponito. Alius pessus ad

inflammationes. Lilij flores tritos ceratō rosaceo liquido excipito, & medullā ceruinā, ac adspem anserinum adijcito. Alius. Ex semine lini, foeno græco & althea, succū crassissimū parato, & crocū illi ammisceto. Deinde adipem anserinū liquefactū addito, unito, ac utitor. Cæterū butyrū, medullā, & adipē, omnia recētia ad pessos deligenda sunt. Antiqua em̄ dum liquātur nidiorosa fiunt, ac calidiora euadūt, & inflammationes exacuunt. At uerō nec in distentionibus, neq; in inflammationibus uteri, mēses prouocādi sunt. Locū enim magis distendūtur, & quū ob inflammationē cōclusi sint, sanguinis transitū impediunt. Quin & tetrapharmacū ad uteri inflammationes commodē subditur, aut infunditur rosaceo dilutū. At si inflammationi ulcus cōiunctū fuerit, ceratū rosaceum ex cera alba cū tercia adipis anserini parte pparatū, albumine oui quātū ei⁹ capere potest ammixto, infundito. Sedata demū inflammationē, mēses prouocētur.

De utero in scirrhi tumorem indurato; Sorani.

Cap. LXXXIII.

Induratur uterus aliquādo derepēte nullo præindicio facto, plerūq; uerō inflammatione pgressā, quæ neq; soluta est, neq; in abscessum trāsmutata. Est aut̄ huius indurationis in scirrhi tumore species, ea duritia quæ in uteri ceruicē ut plurimū consistit, & tumore quidem similiter habet, sed minus renitente, & cū moderato dolore. At uerō ubi in scirrhu induratus tumor uteri fundum occupat, tumor uehemens, & tantū renitēs occurrit, cū grauitate, ac ægro motu, nō solum crurū, sed totius corporis: & signicies ad omnes uitæ functiones. Quod si nō recto ductu tractentur, cōsequitur uitiatu corporis habitus, decolor, & ad similitudinē hydropsis. Duritiæ itaq; circa os & collū uteri cōsistentes facile curātur, circa fundum uerō difficulter. In principio itaq; si nihil obstiterit, neq; ætas, aut uires prohibuerint, sanguinis mediocrē copiam a cubiti uena secta detrahemus: aut per Hierā Archigenis purgabimus. In scissionibusq; utemur ex foeni græci, seminis lini, pulegij, artemisiæ, foliorū sambuci, radicis & foliorū cucumeris syluestris, decoctis. Et aromatum uapōre fomēta faciemus. Et uterū oleo fusino, narcissino, trino, gleucino, adipe anserino, gallinaceo, suillo recenti, aliquo ungento ammixto. Itē lacte bubulo, aut caprino cū adipe anserino colluemus. Cataplasma quoq; imo uentri apponemus, ē caricis, hyssopo, nitro, & absinthio. Et cucurbitas cū scarificatione affigemus. Malagmate item polyarchilo utemur, & eo quod ē seminibus cōstat, & quod ex bacis lauri paratur, de quibus paulō post agemus. Pessī uerō mitigatoriū & aperientes subdātur. Facit & is quē infra ad uteri condylomata describemus, ē lycio, ac œsypo paratus, & quē suprà retulimus ē tribus papaueris capitibus cōstans. Cui similis est hic. Duo papaueris capita passō per triduū macerato, deinde ad tertias coquito, & expressis capitibus, ad decoctū excolatum adijcito, galbani drac. i. casia, succi mādragoræ, singul. drac. tres, myrrhæ, thuris, singul. drac. i. Et postea medullæ ceruinæ, œsypi, adipis anserini, sing. simul liquefactorū dra. i. ammisceto, ac in plūbeo uase seruato. Vsu uerō postulāte ex hoc medicamento oliuæ magnitudinē rosaceo diluto, & bis aut ter quotidie tepidū subdito. Bene facit & tetrapharmacū, heptapharmacū, enneapharmacum, emplastrū Azanitæ,

& emplastrum ex succis. Omnia oleo fusino, aut cyprino diluta. Pessus Libanus appellat⁹ mollitorius. Cerae albæ quadranti, olei nardini, gleucini, fusini, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singulorū sextantem, œsypi, butyri, nitri, singulorum drach. i. Alii qui oui assati uitellum addūt. Alius pessus Titianus uocatus. Cerae sexuncem, colophoniam sesquialtem, adipis taurini trientē, picis, terebinthinæ, singul. quadranti, medullæ ceruinæ, ammoniaci thymiamatis, singul. unc. i. Ammoniacū aqua dissoluatur. Alius pessus mollitorius. Cerae albæ, ungenti nardini, singul. quadranti, olei irini, gleucini, cyprini, adipis urli, pinguedinis porci, singulorū sextantem, butyri, medullæ ceruinæ, œsypi, terebinthinæ, singul. trientem. Alius pessus ad duritias. Cerae albæ, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, adipis gallinacii, anserini, butyri, ungenti nardini, fusini, myrrhæ, & quales portiones excipe melle, ac utere. Si fusinum oleū siue ungentum nō fuerit ad manū, telinum pro ipso succedat. Pessus aureus uocatus, mollitorius. Cerae trientem, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singulorū unciam unā, œsypi drac. i. croci drac. i. myrrhæ, galbani, singulorum drac. i. olei fusini quantum satis est. Alius, ad omnes diuturnas uteri affectiones. Myrrhæ drach. i. bdellij drac. ii. spicæ nardi, croci, singul. drac. i. casia, ladanij, singul. drac. ii. meliloti drach. vii. carnium palmularū decem, uini dulcis cyathū, olei fusini, rosacei, cyprini, singulorū trientē. Aridis cum uino dulci tritis olea ammisceto, & molli igne coctis utitor. Ad imum uerō uentrē epithemata uelut diximus imponantur, polyarchium, ē seminibus, ex bacis lauri, ex meliloto. Bene facit ad duritias, ac uteri inflationes & hoc. Resinæ pinus lib. i. cerae unc. x. apochymatis, fermenti acidi, singulorum lib. i. galbani quadranti, ammoniaci thymiamatis, opopanax, singul. sextantem, muria acerrimæ quantum satis est. Opopanax & ammoniacum in muria coquito, & fermentū adijcito, ac aliquatenus dissoluito. Deinde liquabilia liquata ammisceto, & spatula donec frigeat agitato. Et in mortariū translata probē subigito ac utitor. Aliud Epithema ē miscis panis, laxadi ac diffundendi uisū habens, faciens ad omnes duritias quocunq; loco fuerint, & inflammationes duriores discutiens. Radicis altheæ, carnium palmularū quæ Nicolai appellantur, singul. lib. ii. foeni græci, seminis lini, singulorū lib. i. chamemeli, meliloti, singul. sexuncē, uini antiqui adstringentis sextar. vii. spumæ argenti, cerussæ, colophoniam, singul. lib. ii. cerae, terebinthinæ, singul. lib. i. olei antiqui lib. v. panis siliginis sicci contusi ac cribrati lib. v. Herbæ in uino maceratæ coquantur, & succus exprimitur. Et in hoc succo panis madescat, postmodum uerō spuma argenti, & cerussa conteruntur, & oleo affuso coquuntur, donec nō amplius inquinēt. Et ad hæc liquabilia liquata adijciuntur. Et sublatis igne medicamentū panis, præmadefactus commollitur, ac paulatim reliquis ammiscetur, & per spatulā agitādo unitur. Hoc itaq; modo ad duritias stomachi, alui profluuiū, ac dysentericē principiū, præparari solet, ad quas omnes affectiones secure adhibetur. Verū ad uteri, ac cæterorū locorū duritias, uisceribus exceptis, ad prædicta hæc addimus. Aeruginis, floris salis, thuris, singul. sexuncē, iridis, aristolochiæ, singulorū quadranti, terebinthinæ lib. i. Et terebinthina quidem

quidem reliquis liquabilibus ammiscetur. Arida uero trita, accribrata insperguntur, medicamento ab igne ablato. Et postremum panis madefactus adiungitur, & omnia probe per spatulam agitata uniuntur, frigefacta uero in mortario primū pistillo, deinde manibus subiguntur. Pessus ad uteri duritias. Ceræ, resinæ pinus, picis, terebinthinæ, butyri, olei rosacei, irini, nardini, mellis, singul. lib. i. nitri sextantē, & semunciam. Alius pessus, molliendo efficax. Ceræ, olei susini, rosacei, adipis anserini, singul. lib. i. iridis, terebinthinæ, adipis leonini, ursini, singul. sexuncē, medullæ ceruinæ trientē. Habet hic pessus ex toto libr. vi. & trientē. Pessus ex Archigenis scriptis, facit ad duritiā, debilitatē, maciēq; uteri, præ omnibus quos ego noui efficacissimē, & ad omnes ferme uteri affectiones, & ad neruos affectos comodissimus est. Et est acopon quoq; insigne. Olei irini, susini, cyprini, ceræ, singul. lib. i. mellis Attici quincuncē, unguē foliati, nardini, singul. trientē, adipis anserini quadrantem, medullæ ceruinæ, œsypi, sing. sextantē, terebinthinæ sesquicunciam. Oesypum & medullā cum melle subigito. Deinde cerā cū oleis liquefacto, & postea terebinthinā, & adipē, & cōsequēter preciosa ungenta, nardinū ac foliatū addito. Et in mortariū translata probe unito. Hoc si usq; ad exactā curationem ueteris, magnā laudē consequeris. Sed & post adeptā sanitatē aliquanto tēpore postea maioris securitatis gratia adhiberi potest. Ego uero etiā pro malagmate forinsecus impono, & ad prædicta ammisceo thuris, ceræ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, floris iūci odorati sing. dra. viii. picis dra. xvi. galbani, opopanax sing. dra. iiii. thus, galbanū, opopanax, uino odorato adstringente terito, & ad œsypū & medullā, ac mel adijcto, & omnia simul rursus terito, deinde cerā cū preciosis ungentis liquato, & ammoniacū tritū resinamq; ac reliqua ammisceto. Et ablato ab igne medicamentū ac frigefacto, myrrhā & florem iūci odorati inspergito, unito ac utitor. Epithema Oribasij ē baccis lauri, facit ad duritias. Ceræ, resinæ pinus, picis, nitri, baccarū lauri, adipis taurini, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones. Ammoniacū & nitrum & baccas lauri, sing. seorsim terito, ac cribrato, & reliquis liquatis ammisceto. Ego uero, inquit Oribasius, dimidium nitri accipio.

De uteri abscessu, Archigenis. Cap. lxxxv.

Abscessus in utero uelut in cæteris corporis partibus, præcedēte inflāmatōne generatur: primū igitur inflāmatōnis notæ apparebūt: Deinde circa puris generationem dolores augētur, febresq; cum horrore, plerūq; ad uesperam ingruunt, tumor attollitur, dolor punctorius adāst, aliquando urina, aliquando stercoriscrementa supprimuntur, aut utraque simul. Dolor autem localis affectum locum indicabit, præterea si discuti non potest, citius suppurationi auxilium ferendum est. Itaq; semen lini, foenum græcū, farinā ordeī, caricas coctas, altheæ radicē, terebinthinā, in cataplasmate imponemus. Aliquādo etiam columbinū stercus cū oleo, & melle adhibebimus. Hæc autē cataplasmata imo uetri, ac lumbis imponantur. Et pudendi sinus per spongiā assidue foueatur, & uapores per arūdinē operculo ollæ perforato infertā intra pudendū recipiātur. Inseksionesq; frequentes fiant, decoctis in aqua his quæ ulm attractoriam habent, uelut est pulegiū, marrubium, laurus, saluisa,

artemisia, dictamnus, cētaurea. Quod si dolor uehemētius infestauerit, papaueris capita in aqua coquantur, & confusa cataplasmatibus ammisceantur. Caricæ item crudæ in mortario cū resina pinus, terebinthinā, ac modico nitro tritæ imponantur, pessis autem utemur ex terebinthina, myrrha, œsypo, ac butyro paratis. Verū optimus ad uteri abscessus sic præparatur. Carnis caricarū pingulum, adipis anserini, olei irini, singul. dra. ii. terebinthinę dra. i. rutæ dra. iiii. myrrhæ, iridis, nitri, singul. obol. ii. possunt etiā pro caricis uuæ passæ ammisceri. Excipiuntur lana in pessum, quī oleo irino, aut cyprino tepido rinctus subditur. Est & ad hūc usum efficacissima cōpositio, Cyphoides appellata, & suprā ad hepatis abscessum descripta. Itemq; Enneapharmacū ad duritias paratum. Et Malagma polyarchiū, & alia huiusmodi, oleo susino aut telino diluta, & pessa in uterū subdita. Imus item uenter, ac pecten assidue prædictis decoctis foueatur. At uero rupto abscessu, si pus ad uescicam fuerit delatū, & cū urina excernitur, lactis potu utendū est, & cucumeris semē propinandū. Et cataplasmata prædicta adhibenda, cerataq; emollientia, ac odorata. Si uero ad intestinū rectum progreditur, & cū stercore, uel per se egeritur, lentiū & malicori decoctū per clysterē infundemus. Si uero in pudendi sinum erumpit, & purū est pus, rosaceum, aut tetrapharmacū cum butyro recedat, ac rosaceo infundatur. Et loci ros. rū aut lentiū decocto, aut ptisanæ succo eluatur. Sin tenuis & foetida destillat sanies, uelut a noma, & ulcere depascēte, magis adstringens sit quod infunditur, uelut est baccarum myrti, palmularū, lentium, & malicori decoctū. Quod si post humorū excretionē inflāmatō perseverauerit, perseverandū quoq; est in cataplasmatibus & inseksionibus suprā relatis. At si inæqualia fuerint quæ prodeunt, fomenta & inseksiones ex aqua multa fiant, in qua absinthiū, marrubiū, eruum, cētauriū, aut lentes sunt decoctæ. Locū uero ptisanæ succo eluantur, addito melle & rosaceo. Vteri uero os & anus cerato rosaceo, aut butyro inungatur, cui spodiū, aut stibij, aut plūbaginis, aut spumæ argenti aliquid, cū muliebri lacte sit ammixtum, facit & plumbi succus. Si uero profluēs humor foetidissimus fuerit, uino mulso pudendi sinus eluatur, & in eo usque ad exactam curationem perseverandum est.

Abscessus oris uteri chirurgia. Cap. lxxxvi.

Si circa osculum uteri abscessus cōstitit, ut sub chirurgiam duci possit, nō prompte ad sectionē festinandum est, sed perfecta affectione, & inflāmatōne plurimum aucta, & partibus puri incumbētib; attenuatus. Atq; tū mulier locetur in sella supina, ut crura habeat ad uentrē contracta, & femora inter se disparata. Et cubiti ipsius poplitibus subijciantur, & idoneis uinculis ad ceruicem relingentur. Et hoc ad clarā lucē fiat: absideatq; ē dextris chirurgus & per dioptram instrumentū, pro etate cōmodum, ad pudendi diductionē speculetur, & per specillum sinus muliebris profunditatē dimetiatur, ut ne maior dioptræ tibia uterū comprimat. Et si reperta fuerit tibia eius sinu maior, lanæ conuolutæ labijs siue alis pudendi imponantur, ut in ipsis dioptra firmetur: oportet autem tibiam immittere, cochlea ad supernā partem uergente, & dioptram quidē a chirurgo teneri, cochleam uero per ministrum circūuerti, ut diductis

ciblae plicis sinus distendatur, postquam autem occurrerit abscessus ad tactum lenis, & tenuis, apex eius scalpello uel acicula diffecetur, & excreto pure limniscus linamentum tenerrimum rosaceo tinctum in sectionem indatur, aut potius extra sectionem in muliebrem sinum citra impulsione. Extra uero pendendi labia ad pectinem, & lumbos lanæ succidæ, aut puræ oleo imbutæ imponantur, tertia deinde die ægra in aqua & oleo calidis insideat, aut in maluæ decocto. Et deterfione facta, limniscus tetrapharmacum per se, aut cum melle illitus, in sectionis fissuram leniter indatur. Sit autem tetrapharmacum butyro, aut rosaceo dilutum. Cataplasmata autem forinsecus imponantur, donec abscessus ab inflammatione liberetur, ac puri fiant. Si uero difficulter repurgetur, per auricularem clysterem iridis decocto eluantur. Et per emplastrum ex cadmia, aut ex ladano paratum, aut id quod ex ordeo uisto constat, singulis rosaceo dilutis, ad cicatricem perducantur. Quod si intra uterum os abscessus fuerit, chirurgiam reprobamus, & curationem paulo ante relatam adhibemus.

Abscessus uteri inter intestina, & peritonæum membranam, rupti curatio. Cap. LXXXVII.

Eruptionem inter intestina, & peritonæum membranam aluum, ac intestina ambientem, indicat tumor circa illas partes magis hærens. Si uero intra uterum rumpitur abscessus, dolor quiescit, & os uteri ad tactum lenius occurrit. Eruptio itaque ad superficiem tendens adiuvanda est, & cutis postquam satis fuerit attenuata specillo in summo apice diffecanda, qua parte effluxum commodiorem fore speramus. At si sanguinis eruptionis tumor est, pro specillo siue scalpello, cauterium eminentiori loco adhibebimus, & ita pus educemus: plurimum enim ad totam curationem cauterium confert, post excretum autem & probe expressum humorem: ægra collocetur ut residuum commodè excerni possit, & sectio aqua mulsa eluatur, & postea bis quotidie ac semel in nocte spongiis foueatur. Interdum & in aqua calida ægra insideat, & uterus oleo cyprino calido eluatur. Reliqua uero curatio cæteris ulceribus similis fiat. Alimenta autem exhibeantur boni succi, & quæ non facile diffilantur, uelut est lac cum amylo, alica, oryza, pedes porcini in alica, aut pitana ad flacciditatem cocti, aliculae & pisces boni succi. Et nisi febris obstiterit, uinum etiam dulce antiquum concedemur. Balnea autem & alimenta quæ exulcerationes exacerbant, uitentur.

De uteri exulceratione, Archigenis. Cap. LXXXVIII.

Ulceratur uterus sæpe ex fluxione erodente, aut ab acris medicamentis, aut ex abscessibus ruptis, aut ob partus difficultatem, aut foetus extractionem, aut eiusdem corruptionem. Aegrotæ uero in affecta parte dolorem puncturatum perceptant, & ex interuallis foetidi, ac fauosi humores ab ulcere sordido prodeunt, & cõsequuntur etiam alia utero affecto peculiaris accidentia, uelut est capitis, ac præsertimincipitis dolor. Ligamentorum item ac radice oculorum dolor, qui ad manus usque ac digitos se extendit, & reliqua supra de inflammatione relata. Vlcus itaque expositum, per dioptræ usum deprehenditur. In profundo uero reconditum, humores qui excernuntur indicant. Non autem aliter huiusmodi ulcera curantur, quam insectionibus, irrigationibus, cataplasmatibusque ac pessis supra relatis, priuatim tamen commodum est hoc medicamentum. Crocus optimus cum muliebri lacte teritur, & cerato

excipitur, ex cera tyrrhenica, & rosaceo, aut fusino oleo, cum anserino adipe parato, & in pessum subditur. Hoc autem adhuc efficacius est, & ad dolores magis congruum, quod sequitur, papaueris capita decem in passo diluto, per triduum macerantur, deinde donec flaccida fiant coquuntur, & postea expressa teruntur, cum seminis, aut foliorum rosarum drach. v. croci drach. iiii. ammixto etiam inter terendum ipso decocto. Deinde deceratum ex ceræ sextante, & rosacei aut narcissini olei sextante ad ea affunditur, & medicamentum in stannea pyxide seruat. Vsu uero expetente, rosaceo, aut narcissino oleo dilutum, & in pessum exceptum subditur: facit & pessus supra relatus, ex croco, rosaceo, adipe anserino, & medulla ceruina paratus. talia enim dolores mitigant, & ulcera sanant. Philosophi medicamentum. Ad mulieris pudendum exulceratum, & ob aerium humorum influxum pruriginosum, plumbaginis sextantem, glaucum unc. i. cum succo hyoscyami terito, & olei myrtel, aut rosacei quantum satis est ammisceto, utereque uel manu illinens, uel in passo subdens.

Ulcera uteri carbunculosorum curatio. Cap. LXXXIX.

Carbunculosi uteri ulceribus priuatim profunt lætes, & oleæ folia, sine melle. Lupini in uino austero cocti. Insectiones in eorundem lupinorum decocto.

Ad sordida uteri ulcera, Archigenis. Cap. xc.

Ad sordida uteri ulcera emplastro Aegyptio utendum est, citra æruginem preparato. omnia enim mordacia, quemadmodum & crustas inducenda, utero aduersa sunt. Vtemur etiam eo quod ex melle, terebinthina, rosaceo aut fusino oleo & butyro constat, quibus aliqui etiam crocum addunt. Ad ulcera repurganda efficax est & iris illyrice cum melle imposita, & aristolochiæ decoctum per se, uel cum melle infusum. Pessus optimus ad sordida ulcera repurganda. terebinthinæ drach. iiii. adipis anserini drach. vii. myrrhæ drach. i. croci drach. iiii. medullæ bubulæ, & sypi, singulorum drach. ii. mellis, olei cyprini, aut irini, singulorum drachm. xvi. thuris, radice panacæ, iridis, singulorum drachmas duas, cyperi drachm. iiii.

Ad humorem a muliebri pudendo profluentem. Cap. xci.

Ordei uisti, amyli, thuris, singul. unc. i. aluminis scissi drach. iiii. Minutissime terito, ac cribrato, & asinino lacte diluto, ac in pudendi sinu per uteri fustorium clysterem infundito. Quod si ulcus dolorem intulerit, tale medicamentum adhibeatur. Rosarum siccarum tritarum, capitum papaueris paululum torrefactorum, sing. drach. iiii. croci, styracis, sing. dra. ii. farinæ foeni graeci, cenanthes, sing. dra. iiii. thuris dra. ii. oia cum passo cretico, ac oleo rosaceo paulatim affusis, ad mellis copagē conterendo redigito, & in pessum excepta calida subdito.

Ad uteri nomas, Aspasie. Cap. xcii.

Nomæ uero & ulcera depascentia, ac efferata, equino aut asinino lacte recens mulcto eluatur. Et in penuria, quodcumque haberi potest recens, coctum accipiat. Duabus autem lactis heminis mellis hemina dimidia addenda est, & quatuor iridis drachmæ inspergenda, & tale infusum calidum sæpe singulis diebus infundendum. Idem facit aqua mulsa, in qua absinthium, aut calamus aromaticus, aut leucanthemum uel chamæmelum, aut buphthalmum decoctum est. Et ubi quod infusum est excretum fuerit, loci proximus maluæ decocto eluatur. Deinde pessus subdatur ex farinæ erui, iridis, singulorum dra. duabus, cum melle subactis,

subactis, & pello exceptis. Alius pessus. Melilorum in uino aquae marinae experte coctū terito, & melle ammixto subdito. Alius. Farinā lentum cum melle subdito. Alius. Oleae folia cum uino trita, & melle ammixto subdito. Alius. Vuarum passarū carnes eritas cum melle subdito. Alius. Hederæ aureum florem habētis folia in uino cocta cū melle indito. Asclepiadae medicamentū in puluilli forma, ad uteri nomas praecipuū. Lupinos amaros tritos, ac cribratos seruato, & usus tēpore sine ullo liquore subdito, uel mellis ammisceto. Alius pessus optimus. Hederæ aureū florē habentis fasciculū, in umbra paululum siccātū in uas fictile cōjicito, idēq; oblitato, ac torreto, & eo cinere utitor. Alius ad humida ulcera. Aristolochiae longae tritae drac. vi. rubricae sinopicae hepatis colorē referētis dra. viii. misce, & cum melle ad cerati crassitudinē redige, & panniculo attrito excepta deliga, & sub prunis exure, Et ubi optime assata fuerint, tere ac utere. Aut panniculum deligatū in ollā mitte, ac probe opertam, & oblitam in ignē pone, donec medicamentū ad carbonis speciem fuerit exustū: & deinde tritum serua. Vsu uerō expetente ad nomas subde, & breui contrahentur. Hoc usque ad inductam cicatricem idoneum est. Alius. Seminis tamaricis partē unam, nitri rubri tantundem, terito ac cribrato, & simul mixtis aridis utitor, aut rosaceum ammisceto. Vbi uerō nomē fuerint cohibita, adhibeantur ea quae paulo antē ad ulcera repurganda relata sunt.

Quae ad cicatricem ducūt, Asclepiade. Cap. xciii. Postquam ulcera fuerint repurgata, utendū est his quae ad cicatricem perducunt, primū miltioribus, postea efficacioribus. Ceratum cicatricē inducens. Ceræ albæ quadrantē, rosacei optimi dodrantem, ad prunas liquefacto, & quadantenus refrigerato. Deinde in mortarium cōjicito, ac lacte muliebri, aut asinino, aut caprino recens multo affuso, cū pistillo subigito, donec totū inalbescat. Deinde diffuso priore lacte, nouum infundito, ac rursus subigito, & croci ad drac. i. ammisceto. Quod si magis mitigatorium facere uolueris, rosacei olei septuicem, adipis anserini, & medullae elusdē sing. unc. i. accipito. potes & pro rosaceo, melinū, aut susinū ammiscere. Medicamentum ex ordeo ad uteri ulcera. Ordei usti, ac triti, spumae argenti lotae, cerussae lotae, singulorū lib. i. adipis anserini lib. riii. adipis caprē recētis lib. iiii. olei myrti libras ii. mellis despumati bessem, terebinthinae quadratē siue triētem. Hoc etiā ad ardores, & ulcera pudendorū facit. Nec minus utendū est his quae ad sedis affectiones, ex pompholyge & plūbo usto preparatur. Itēq; eo quod ex cadmia & qd ex ladano pparatur, singulis myrteo aut rosaceo oleo dilutis.

De cancriis uteri, Archigenis. Cap. xciiii. Cancratorū uteri tumorū aliqui ulcerati sunt, aliqui nō ulcerati, quēadmodum de mammis supra diximus. Itaq; in nō exulceratis, tumor circa os uteri reperitur durus, ad tactū renitens, inaequalis, emīnēs, colore feculentus, ruber aut subliuidus, uehemētes dolores inducēs circa inguina, summū ventrem, pectinem, ac lumbos: qui ad manuū contactū, & medicamentorū uarietatem exacerbantur. Si uerō ulceratus est cancer, supra dolores duritiasq; ac tumorem, ulcera corrola & inaequalia uidentur, plerūq; sordida, emīnētia, albicāda. Quae uerō pura putatur,

feculenta, liuida, rubicūda, & cruenta apparent. Excernitur autem ab ipsis sanies tenuis, aquosa, nigra, aut fulua graueolēs. Aliquādo & sanguis defertur, & alia signa adsunt suprà de uteri inflammatione relata. Proinde affectio quidē haec incurabilis est, uelut etiā Hippocrates pronūciat: mitigari tamen ac leniri potest, infelsionibus in foenigraci, ac maluē decocto, & cataplasmatibus similibus. In exacerbationibus autē ualdē mitigat malua, aut althea in aqua multa ad flacciditatē cocta, & cum modico rosaceo trita ac imposita. Et cataplasma ē caricis, meliloto, ac ruta paratum. Et quod ex palmulis paratur in passo coctis, ouorū uicellis, ac polenta ammixtis. Aut papaueris capita trita & cribrata, cū polygoni aut intubi, aut coriandri succo. Aut solani folia tenera cum lacte muliebri imposita. Aut solanū cerato rosaceo exceptū, frigida aqua paulatim cerato instillata. Aut maluae folia cū lacte muliebri trita, & rosaceo cerato excepta. Atq; haec omnia in dolorū uexationibus sunt adhibēda, postea uerō ceratū imponatur ex rosaceo, aut myrteo, aut melino, aut oenanthino cū palmulis in passo coctis, facit & cataplasma ex ouis, & quod ex ordeo paratur, quibus etiā ad ambusta utimur: peculiariter autē conuenit id quod ex fece uasforū aereorū in quibus aqua coquitur, paratur. Haec enim sex assata teritur minutissimē, & cerato rosaceo excipitur. Et haec qdē forinsecus. Intrinsecus autē mitigat locos, ubi ulcerati fuerint, lac muliebre, aut asininū infusum, & plāraginis succus tepidus. Si uerō cruentati fuerint, polygoni succus cū modico thure. Idē faciunt etiā pessi ex croco, & lacte muliebri, succoq; papaueris, ac oesypo preparati. Omnibus autem praestat etiā ad sedis affectiones hoc. Spumae argenti lotae sexuncē, thuris masculi, oesypi, adipis porcini recētis, butyri recētis, ceræ tyrrhenicae, sing. sextantē, rosacei trientē. Seruatur hoc medicamentū pyxide plūbea, & arefactū rosaceo diluitur. Ego uerō, inquit Archigenes, spumā argēti cū seridis succi hemina diluo, & ubi mellis spissitudinē habet, liquatis alijs ammisceto: utere etiā medicamentis ad sedis affectiones praescriptis. Optimū est & id quod suprà ad mammarū nomas descripsimus, ex uino, rhoē coriario, pilulis cupressi, ac galla preparatū, quod muliebri aut asinino lacte dilutū adhibetur. Philosophi medicamentū ad caneros uteri. Cancros fluuiatiles, aut quinq; impari numero, sub prunis exurito, & cum oleo cyprino tritos per pennam illinito.

De uteri obturatione. Cap. xc v. Obturatio circa os, aut collū uteri fit, aut propter ulcerationē praegressam, aut ob inflammationē indurātā, per quā loci adeo angusti fiunt, ut semē nō amplius admittant, uel admissum non retineant: ob callosam enim duritiā uterus cōtrahi nō potest. Aliquādo semen admissum, & intra angustissimū os cōtentū foetus causa est. Verū haec cōceptio praegnati mortis causam inducit, quū ob nimias locorū angustias foetus prodire non possit. Infelsiones itaq; ex oleo, & aqua & foeni graci decocto adhibeantur, & p cerata, ac pessos emolliētes ex oesypo, terebinthina, ac nitro praeparatos, laxētur. At uerō si loci ad tactū molles fuerint, spōgiā siccā funiculo appēso intra locorū angustias dilatādī gratia indemus. Et si ea exciderit, alia crassiorē immitemus. Et ea de causa plures, ac diuersas spongas siccas paratas habere oportet, &

postea tale medicamentū spongię illinemus. Sandarachę, aluminis scissi, sing. drac. i. auripigmēti drac. iiii. omnia simul cōtrita melle excipito, & spongię indendę illinito. Quod si sublata spōgia locus non satis apertus uidebitur, inflāmatioq; oborta fuerit, subiectū medicamētū spongię illinatur. Iridis drac. ii. adipis anserini, terebinthinę, thuris, olei irini, cerę, singul. drac. ii. Iridem primū, deinde thus minutissime terito, ac cribrato, & terebinthinā, adipem, ceram, cū oleo liquato, ac omnia simul unito. Vbi uerō inflāmatio quiesuerit, & locus apertus fuerit, ceratum ex oleo rosaceo, & adipe anserino paratū spōgię illinatur, in quo usq; ad inductā cicatricem persistendum est, ut locus paulatim consolidetur.

De utero non perforato. Cap. xcv.

Quedā a nativitate uterū non perforatū habet, & hoc trifariā contingit. Quibusdā enim in ipsius pudendi alis siue labijs, mēbrana aut caro obdurās enascitur. Alijs in ipso pudēdi sinu idem cōtingit. Alijs circa ipsum uteri osculū eadē obturatio fit. Quibus itaq; in pudendi labijs, mēbrana excreuit, eas curaturi supinas pro more reflexis ac diductis cruribus locabimus, & operientem membranā specillo dissecabimus, donec figura pudēdi ad naturalē dimētionem deueniat: postea linamētis cōuulsis sectionē replebimus, ac deligabimus, & curationē suppuratoriā per cataplasmata aliquot diebus adhibebimus. Deinde linamētis cerato rosaceo liqdo imbutis utemur. At si post sectionē pudendi alas carnosas partibus propinqs unitas esse senserimus, utrinq; excoriabimus, & per linamēta dilatabimus, eodēq; curationis modo utemur. Mulier uerō supina puluinar intra femora habēs, usq; ad cicatricē inductā permaneat. Si uerō pudēdi qdē figura externa aperta est, in sinu uerō caro innata locū obstruit, ut angustū foramen relinquitur, muliere eodē modo collocata, stylū in uteri ceruicē maioris tutelę gratia immittemus, ne per errorē altiorē sectionē faciamus: atq; ita infra signatū per stylū locū dissecabimus, per specillū latū, donec sinus secundū naturā habere uideatur. Deinde labia dissectę carnis p uolsellā distēta ad quadrāgularem figurā circumcidemus. Et erectā mulierē diductis cruribus statuemus, ut humor in utero collectus cōmode profluat. Quod ubi sufficēter factū fuerit, ægrā ad priorem decubitus formā reducemus, & linamentū uino & oleo imbutū in sectionē indemus, habeat autē hoc filum alligatum, quo facile extrahi possit, & loco probē deligato quietē imperabimus. Sequentibus uerō diebus locus cū aqua mulsā eluatur, & pharmacū suppuratorum linamēto intorto illitum indatur. Et ubi cicatrix inducēda est, canalis ex stanno indatur, ac alligetur, donec locus fuerit cōsolidatus. Quod si partes rursus inter se coluerint, ac rursus uteri os claudatur, spongiā siccam indito, donec callus fuerit obductus. Si uerō mēbrana ipsum uteri os obstruxerit, mulier in eodē situ locata, dioptra immissa sinus dilatetur, & membrana per uolsellam arrepta, ac extēta intorqueatur, ut tota simul colligatur, & lato specillo amputetur, & medicamentum siccū floridū inspergatur, & linamentū tortum alligato filo indatur, & eadem curatio fiat. Quod si quid de membrana relictū fuerit, florido aut psaro appellato medicamēto cōsumatur. Repurgatis autē locis, hoc pharmaco linamēta tingito. Cerę, terebin-

thinę, adipis anserini, singulorū dra. ii. iridis, thuris singul. drac. i. croci dra. iiii. olei irini dra. xvi. Iridē, crocum, & thus cū passo terito, & liquabilia liquata ammisceto. Dioptra uerō assiduē immittenda est, ac cauendū ne caro superexcreseat, quę tali medicamento reprimatur. Squamę æris, æruginis, corticis thuris, singul. drac. ii. terito, unito, ac utitor. Aur ærugine, & squamā cū plumbi succo subige, & adhibe. Sed nec spōgię sicce usus omittatur, donec labijs callus obducatur. Stanneus itē canalis immittatur.

De Hemorrhoidibus uteri, Aspasie. Cap. xcvi.
Hæmorrhoides quandoq; in osculo uteri, quādoq; in collo, & aliquādo in ipso utero, & aliquando, licet raro, in pudendo cōtingunt. Atq; hæc etiā tactu, melius tamen per dioptram depræhēduntur, & eadem accidentia inducūt, quę reliquę in sede ortę inducere solēt. Et præterea sterilitatē, ac lumborū grauitatē tēpore purgationis inducūt. Varicosas itaq; ac malignas dimittere oportet; reliquę uerō non aliter curentur, q̄ quę in sede sunt, duris quidem ac modicū sanguinē fundētib; neq; uasis annexis, statim amputatis. His uerō quę multū sanguinis emittūt, circa fundū circūcirca scarificatis, & uolsella eleuatis, ac funiculo constrictis, & postea paulatim resectis, atq; hoc facto floridū medicamentū siccū inspergatur. At uerō si citra chirurgiam malueris hæmorrhoidas resiccare, ac excæcare, huiusmodi sicca apponito. Spodiū & rosas siccas terito & inspergito. Aut acaciā uino austero tritā. Aut terrā lemniam sigillū appellatā, cū aceto illinito. Aliud. Subij bessem, rosarū siccatum, pollinis thuris, singul. sextariē, cytinorū unc. i. Aliud. Balauftiorū torrefactorum sexuncē, malicorij quadrātem, florū rosarū, spodiū, singul. drac. ii. Aliud ad hæmorrhoidas efficacius. Succū mandragorę, aluminis rotūdi, acacię, singul. drach. ii. cum uino terito, & in pastillos efformato, eosq; uino dilutos illinito. Aliud. Succū cicutę, succū hyoscyami, aluminis scissi, rubricę sinopicę, singulorū drac. ii. sandicis dra. i. cū uino terito & excipito. Et usus tempore uino item diluto. Aliud. Diophrygis drac. vi. cerussę, spumę argēti, plumbi usti & loti, succū hypocisthidis, singulorū drac. iiii. Excipe succo cicutę, & cū uino adhibe. Vtere etiā medicamentis ad hæmorrhoidas sedis relatis, & præferatim eo quod Hippocrati inscribitur. Et poriones exhibeto ad sanguinis resectionē descriptas. Infectiones quoq; in decoctis adstringentibus adhibeto.

De calculo uteri. Cap. xcvi.

Calculi aliquando rosacei in ipso utero generantur, quos si extrahere uolueris, aluum prius per clysterem stercoris eductoriū euacuato. Deinde sceni greci ac maluę decocto, rosaceo admixto, uterū eluto, & muliere supina disparatis crurib; locata duos longiores sinistrae manus digitos in ani foramē immittito: dextra uerō superiorem uentrem comprimito, calculumq; extrorsum cogito, ac propellito, simul per digitos in anum missos deducens, ac extrahēs. At uerō rosaceam substantiam extra in uteri collo, aut osculo agnatam, muliere rite locata, & locis per dioptram dilatatis, scalpello resicare oportet, & florido medicamento sicco insperso curare.

De calculo uesicę muliebri. Cap. xcix.

In uesicā muliebri raro oriūtur calculi, latorem enim & rectiorem urinę meatum habent. Atque huius extractionem,

extractionem si forte Innatus fuerit, ita facias. Mulier supina coxis decliuis ac cruribus reclinatis locetur, quo facto duos longiores sinistrae manus digitos in pudendum mittito. Dextra uero uesicā superne cōprimito, & calculū uersus uesicæ collū expellito, & ut extra musculum uesicæ collū adstringentem prodeat cogito, & tunc paululū supra pudendi alas, quo loco calculus occurrit, sectionem facito, & per calcularium forcipem extrahito. postea uero sectionē māna thuris repleto, & lanam purā oleo calido imbutā uentri ac lumbis imposito ac deligato, & quouis die bis aut ter, & nocte semel exoluito, & oleo calido perfundito, tertia die aridis medicamentis lenibus & incarnatibus usque ad perfectam incarnationē uulnus explemus, & per emplastrum ex aceto & oleo paratum cicatricem inducimus. Optime autē huiusmodi locos & omne cauū ulcus incarnat hoc. Manne thuris sextantem, colophonie minutissime erite unc. i. Ex hoc arido totam uulneris cauitatē expleto.

De hernia aquosa mulierum, Aspasie. Cap. c.

Hernia aquosa circa pudendi alas consistit, inflationi similis, debili ac molli tumore. Et aliquando alteram tantum, quādoque utraq; partem occupat, ad contactū fluctuationis apparentiā quandā exhibens: primum itaque discusso adhibeantur, supra ad hernias in uiribus aquosas relata, praesertim in uirginibus. At si parū successerit, muliere rite locata sectionē rectā tumori congruā faciemus. Dissecta autē cute, subiectas tunicas paulatim excoriat, & uolsella arreptas distēdit, & membranam humorē continentem dissecato. Excreto humore sectionem membranæ ad myrtel folij figuram facito, & labijs sectionis duabus aut tribus futuris adductis, suppurantia medicamenta adhibeto. Vtere & olei irrigatione, ac reliqua curatione, ad aquosas uirorum hernias supra tradita.

De hernia inguinis mulierum. Cap. ci.

Fiunt & mulieribus herniae inguinis, circa dextrū maxime pudendi sinum, prominet his tumor durus immurmurans, ac premens, praecipue ubi mulieres crura dilatauerint, aut supine decubuerint. Et has quoque cōgruis deligamentis ac medicamentis curare oportet, uelut dictū est in hernia uirorum intestinali ac inguinali. At si haec parū profecerint, ad chirurgiā ueniendū est. Mulier itaque supina decliuis cruribus locetur, & rapulso intestino locus circa inguen oblique secetur, & tuncque cuti subiectae sensim excoriatur, atque ita laxata peritonaei membrana pars attrahatur ac extēdatur, & intestinū diligenter repellatur, & quod superfluum est de peritoneo deligetur, ac cōsuatur, & tunc quod supra futurā extat superuacuum resecetur. Deinde labia sectionis cutis duabus aut tribus futuris adducatur, & unamēra indatur, lanaque succida uino & oleo imbuta imponatur, & deligamenta congrua fiant, postea medicamentis suppurantia & repurgantia. Incarnandi uim habentia. Irrigationes item ac cataplasmata adhibeantur, donec inflammatio quiescat. Et inde ad cicatricem inducentia progressus fiat.

De hernia varicosa, Aspasie. Cap. cii.

Hernia quoque siue ramex varicosus in pudendi alis nasci solet, & est uenarū ampliatio, similis varicibus in cruribus fieri solitis. proinde in huius curatione sectionem rectam in superficie pro uasis figura facias: deinde tunicas uasi adherentes sensim excoriat, & denudatum uas caeca uolsella eleuato, & duobus

uinculis, altero superne, altero inferne deligato. Deinde uenam secato, uelut in uenae sectione ad sanguinē auferendum fieri solet, & detracto sanguine, mediū uasis inter duo uincula superuacuum amputato. Atque hoc sanē omnibus uasis in uaricum formam transgressis commune est. Deinde linamentis sectioni inditis, spongiā aceto aut posca imbutam adhibeto. Et deinceps ad puris generationem, ac reliquā uelut ulceris curationem progreditor.

De nymphae sectione. Cap. ciii.

Nympha substantia quaedam est musculosa, aut pelliculosa supra alarū pudendi cōmissurā sita, quo loco urina rursus est meatus. Hec in aliquibus mulieribus ad tantā magnitudinē augetur, ut deformitatē ac pudorē inducat. Quin & a uestimentorū cōtactu assiduo arrigitur, & ad uenerē ac coitū proritat. Quapropter Aegyptiis uisum est, ut antequā exuberet, amputetur: tunc praecipue quā nobiles uirgines sunt elocandae. Amputandi uero modū hunc tradunt. Virgini in sella locatae retro assideat adolescens robustus, qui brachia sua poplitibus uirginis subiiciat, cruraque eius ac totū corpus regat. Et tū chirurgus ante ipsum stans, forcipe ampliori nymphā corripiat, & per sinistrā manū distendat, per dextrā uero prope forcipis dentes resecet. Mēsurā autē resectionis eandē quā in columellae sectione seruare oportet, ut ne funditus ipsam resecemus, sed superuacua tantum pars amputetur: proinde prope dentes forcipis nymphā resecandā esse diximus, quoniam quum pelliculosa sit, plurimū extenditur, & nisi quis diligenter obseruet, facile ultra quā oportet amputationē faciet, atque hinc carūculae decrementum, rhoeada graeci uocāt, cōsequitur: peracta chirurgiā, spōgia ex uino adstringente aut aqua frigida expressa uulnus detergeatur, & manna thuris inspergatur, & linamentū posca madefactū indatur. Et spongia ex posca expressa superdeligetur. Post septimam uero, cadmiā minutissime tritā per se, aut cum rosarum floribus insperge. Aut siccum ex lapide phrygio paratum, & ad pudendorum fissuras descriptū. Aut cinerem ossium palmularum insperge.

De cauda. Cap. ciiii.

In quibusdā mulieribus carnosā quaedam substantia ab uteri osculo exoritur, & muliebri pudendum replet. Aliquando etiā extra progreditur instar caudae, unde etiam nomē habet. Mulier itaque uelut in nymphae amputatione dictum est, locetur, & prominens carūcula forcipe extēdatur, & tota ex basi resecetur: post chirurgiā curatio uelut in nymphae peragatur.

De thymis, & uerrucis tum alijs, tum formicarijs uteri, Philumeni. Cap. cv.

Thymus aut in alis pudendi, aut in ipso pudendo, aut in uteri osculo, aut collo generatur. Et est aspera quaedam eminentia thymi cacumini similis, in quibusdam mitis, in alijs maligna, rubra, cruenta, praecipue post concubitum aut deambulationes, & sanē moro maturo assimilatur, uisumque deprehenditur, aliquādo sine ulla arte, aliquādo dioptra immissa, oblata. Huiusmodi igitur eminentias in principio curabimus, quemadmodum de reliquis thymis ac uerrucis diximus. Verum ubi diutius perseverat, chirurgiā adhibemus. Muliere itaque recte locata, eminentiam uolsella extentam, totam funditus resecamus, deinde curationem cruentis uulneribus aptam facimus. Thymos autem in abdito reconditos, quum chirurgiā

subijci non possint, medicamentis curabimus, supra ad totius corporis thymos & uerrucas formicarias relatis. Ad uerrucas autem formicarias pudendorum summè cōfert hoc. Capræ iugulatae recens oculos cōpungito, & humorē inde profluentem assidue illinito, & intra sex dierum spatium formicarum uerrucæ extirpabuntur. Sed & bubulū sterco calidum illitum, formicarias in muliebri natura uerrucas sanat.

Aliud, quod ego in uxore mea expertus sum, & ipsas radices tollit. Origanū festucā ad lucernā accēdito, & formicarum uerrucæ admoueo, ut non inde incendatur, sed fumū solū suscipiat. Et hoc ter singulis diebus facto. Aliud, ad pudendi ac sedis thymos. Soleas ueteramentarias, & cucurbitam siccā exurito sigillatim, & minutissime trita paribus portionibus permisceto, & locis uino prius elotis inspergito. Experientia hoc cognitum est. Ceterum maligno rū thymorū sectionē, ob eruptionis sanguinis periculū reprobare oportet: nō malignos autē tuto resecamus. Neq; em̄ hic sanguinis eruptionis timor est. Cauendum tamē est ne uterus a scalpri acie lædatur, quod facile uitare est, si thymus distensus prope uolSELLÆ dentes amputetur, sicut in nymphæ sectione diximus. Refectione uerò facta, ad desiccandos locos pharmacū quoddā sanguinē sistēs adhibebimus. Humectatio enim causa est ut thymi regenerentur, sicut etiā pinguiū medicamentorū usus: proinde per totā curationē, laxatila ac pingula sunt fugienda. post chirurgiā protinus galla trita, aut alumen scissum, cū pari thuris pondere admoueantur. Deinde medicamentis florido, ex stomomate ferri aut rosarum flore, & cytinis siccis parato utemur. Nā hæc contrahunt, & quadatenus repurgant, & ulcera ad cicatricē ducunt.

De condylomatibus, Aspasie. Cap. cvi.

Condyloma est rugosa eminētia. Rugæ enim circa os uteri existentes, dum inflammantur, attolluntur & indurantur, tumoremq; ac crassitudinem quandam in locis efficiunt: præcipue uerò dū menses prodeunt, & post partus attolluntur, & p tactū facile cognoscuntur. Ad has igitur fomēta adstringētia, & eiusdem facultatis pessī subdantur, quæ omnia supra ad sedis condylomata sunt relata. facit & pessus ē malicorio & butyro preparatus, & qui ex lycio indicō ac cōsy po paratur.

De rimis, ac fissuris uteri. Cap. cvii.

Rimæ circa os uteri ex uiolentis partibus ob magnitudinē capitis infantis fiunt. Sed & ex acriū humorū influxu locos rūpente ac corrodeute fieri solent. Et primum quidē latent, dolore à partu adhuc recente, postea uerò paulatim ad sensum perueniunt. Nā & ad manū contactum, & in coitu dolores exciātur, quādo sanē ex affrictu cruciātur, deprehēduntur aut dilatato sinu, fissuræ enim circa uteri osculū per ambitū uisuntur. In harum itaq; curatione chirurgiā, & omnia mordacia pharmaca reprobare oportet: talia em̄ inflammationes ac cōuulsiones inducūt: & insensationibus simplicioribus ac pessis uti, & medicamentis ad sedis rimas descriptis, præcipue eo quod ē pōpholyge, stibio, & plūbo usto paratur. Quod si callosæ fuerint, medicamento ex charta usta utendū est plurius rosaceo diluto: callos enim ex terit, & ulcera repurgat. Si uerò nimiam eius acrimoniam nō ferunt, frigidam illyrīcam terebinthina exceptam inde: postquam autem cicatrix ulceribus inducta est, cōueniē

id quod ex cadmia constat, aut quoddam sedi destitutum, uelut est quod ex spuma argenti lota præparatur, paulo ante ad caneros uteri à nobis relatum. Aut hoc quod ad rimas sedis, & muliebrium locorum condylomata præparatur. Stibij, acaciæ, singulorum drach. vi. passo excipe ac utere. Sæpe & hoc uitamur. Aloës, opij, singulorum dra. xvi. stibij dra. vi. myrrhæ dra. iiii. thuris, æruginis, singulorum dra. ii. uino excipe & utere cum passo. Aliud cito conferens. Stibij, acaciæ, plumbi usti, & loti, singulorum dra. xv. spodij, pompholygis lotæ dra. viii. fructus ericæ, aluminis scissi, atramenti sutorij, thuris, myrrhæ, opij, singulorum dra. viii. cū uino terito uelut collyrium, ac pastillos formato, & cum passo dilutis utitor. Aliud ad omnes pudendorum muliebriū ac sedis affectiones. Siftit etiā hemorhoidas. Spumæ argenti lotæ, cerussæ lotæ, plūbi usti & loti, singulorum dra. xxv. stibij loti dra. ix. pōpholygis lotæ dra. viii. cadmiæ lotæ dra. v. Hæc omnia primū seorsim, deinde simul terito, & uini ac olei myrti singulorum lib. i. paulatim adstillato, ac probe terito, & unita in plumbea pyxide seruato, & uelut optimo medicamento utitor. Nos uerò, inquit Archigenes, ceræ tyrrhenicæ lib. i. & adipis anserini tantundem adijci mus. Quidam etiam plumbaginis drac. xx. addunt.

De tuberculis uteri miliaribus. Cap. cviii.

Aliquando in collo aut osculo uteri, aut in ipso pudendo, millares quædam eminentiæ enascuntur, ad tactum quidem occurrentes, uerum certius ad dioptrā patentes. Solentq; ex coitus affrictu, tum menses, tū conceptionem impedire. In his aluus primum purganda est. Deinde linteolo locus detergendus, & glās ex carne caricarum pinguiū ac alumine scisso subdenda. Aut pessus ex alumine & felle. Aut medicamenta ad concoquenda ac discutienda tubercula cōmoda illinenda. Elutiones quoque ex aqua mulsā, & aliquo aromatum decocto adhibeantur.

De scabris uteri pustulis. Cap. cix.

In pudendo & uteri osculo scabræ pustulæ oriri solent, furfuraceas squamas reijcentes, pruritusq; inducētes, & calidæ aquæ affusione gaudentes. In his aluus asinino lacte purgetur. Vomitus à coena fiat. In balneo exudatio fiat, & in calidam infusus. Et loci uino calido cum nitro eluantur, & post uinum aqua calida infundatur. Et licium indicū, aut amurca, aut butyrum cum sulphure, aut ceratū myrtum cum spuma argenti, aut alumen rotundum cum melle, aut malicorium cum myrrhā & melle illinatur. Squamas autem & fursures exterit, cydamini radix cum melle illita. Cæterum in cibis omnia acris, salsa, & acida cauenda sunt.

De alarum pudendi muliebris abscessu. Cap. cx.

Si in muliebris pudendi alis siue labijs abscessus ortus fuerit, & uersus sedem declinauerit, sectionem eius uitare oportet. Nam ex eorum locorum sectione, quum rugosi sint, facile fistula generatur. Si uerò sursum ad urinarum meatum uergit, tuto secare licet.

Ad umbilicum prolapsum. Cap. cxii.

Ammoniacum thymīama cum modico cumino ex uino tritum apponito ac deligato. Aut buphtalmum cum succo mori tritum imponito. Aliud. Bituminis drachm. xii. carniū caricarum pingulum tantundem, primum seorsim, deinde simul trita imponito.

Ad rugas

Ad rugas uentris, rimasq; ac nigredines à partu exortas.

Cap. cxii.

Adiantum & spumam nitri albam exactissime trita inspergito, & uenter nō corrugabitur. Hoc & in balneo, & extra balneum utendum est. Aliud. Narcissi bulbos cortice detracto concidito, & in umbra siccatō, & de his sumito dra. viii. radicis struthii contusæ, farinæ ptisanæ, farinæ fabarum, maxime Aegyptiarum, singulorū drac. x. radicis bryoniæ, radicis ari, radicis cucumeris syluestris, costi, singulorū trientem, terito & cribrato, ac uentri per erui farinam deterſo inspergito, & rursus affricando detergito. Nā & rugas & rimas generari non ſinit, & genitas tollit. Maculas etiam ac nigredines in quauis corporis superficte exterit. In puerperis igitur uentrem oleo antea probe confricato, & postea chartam medicamentō cōſperſam adhibeto, & fasciā deligato, ac post quartum diem exoluto. Deinde totū corpus in balneo detergito, & omnes nigredines ac rugas abolebis. Aliud, ad uentres à partu nigrefactos. Ostreorum ustorum partem i. farinæ fabarum, maxime Aegyptiarum, partes ii. misce ac utere in balneo. Aliud. Nigellæ, nitri, æquas portiones ad strigmentidam spissitudinem cum aqua terito. Aliud. Scilligustæ drach. viii. cornu cerui uſti, aluminis scissi, ſallis cappadoci, myrrhæ fractæ, nigellæ, singulorum drach. ii. farinæ ordei drachm. xiiii. Vſus tempore melle excipito, & panniculo detricto infartum uentri adhibeto, & per dies septem ſinito. Octaua uerò abluto, ac rursus apponito, & totidem diebus ſinito.

Smegma faciei ac reliqui corporis. Granorum runci, bulborū narcissi decorticatorū ac reſiccatorū, ſing. drach. viii. ſimilaginis drac. iiii. thuris drac. ii. ouorum albumina ii. misce ac utere. Smegma aliud efficax. Floris lunci odorati, iridis, ſing. drac. ii. mastiches dra. i. terito, & ptisanæ succo excipito, ac paſtillos formato, quos uſus tempore aqua dilutos illi nito, et per interuallū frigida abluto. Aliud smegma ad corporis rugas, Ruſi. Caricarū pinguiū, radicis bryoniæ, farinæ erui, testarum ſepiæ uſtarum, ſingulorū æquales portiones. Terenda terito, & ad caricas in mortario contuſas ammiſceto. Hoc in balneo utendum est. Aliud. Vitem albam farinæ erui ammiſceto ac utitor. Smegma, ad deſiccandas nigredines multo uſu cognitum. thuris ſesquialterā, ceruſſæ lotæ, ſpumæ argenti lotæ, amyli, ſcobis marmoris præconſi, maſtiche, ſpumæ nitri albæ, testarū ſepiæ, ſing. unc. i. ſaponis gallici unc. xii. ouorum albumina x. omnia ſapone excipe, & utere in quacūq; corporis parte. Smegma admirandum. Cutis superficte exterit & illuſtrat. Farinæ ſoeni græci, amyli, tragacanthæ, ſingulorum trientē, terræ ſamiæ quæ Stella uocatur, ammoniaci thymiamatis, ſingulorū quadrātem, maſtiche, medullæ ceruinæ recentis, ſingulorū trientem. Tragacantham lacte macerato, & reliqua minutiffimè trita ammiſceto, ac paſtillos formato, eosq; in umbra exiccato. Vtere etiam smegmatis Sermone octauo relatīs, ubi habetur etiā ea quæ ad alarum ac oris ſortorem conferunt.

Preparationes unguentorum ſiccorum, moſchatorum. Item conditorum, ornanthariorum, ac

ſuſſumigiorum uariorum. Cap. cxiii.

Xeromyrum, hoc est, unguentū ſiccum, Beredrias appellatum. Arnabo, amomi, ſpicæ nardi, ſingulorum

quadrātem, ſolij malabathri, ſtyracis, ſingulorum quadrātem, croci, caryophyllorum, ſingulorum ſesquialterā, opobalfami ſexuncem, roſarum uiridiū unc. xxv. misce. Xeromyrum moſchatum. Folij malabathri, caſiæ, croci, ſtyracis, arnabonis, amomi, ſpicæ nardi, ſingulorum ſesquialterā, caryophyllorum drachm. iiii. moſchi ſcrup. iiii. opobalfami unc. i. olei indicis aut ſimilis quadrātem, roſarum ſiccarum ſextantem, aut uiridiū trientem. Compoſitio Arabica. Maſuaphij, caryophyllorum, costi, ſingulorum ſextantem, ſpicæ, ſolij, roſarum, ſing. ſcrup. xii. amomi, ſtyracis, ſingu. unc. i. gummi ſextantem. arida terito ac cribrato, gummi uerò maderfacto, & ad ſtyracē in mortario tritum arida ammiſceto, & cū gummi pilulas rotundas ad ciceris maſſæ magnitudinem formato, eaſq; acu perforato, ac ſilum traſſito, & arefactas de collo ſuſpēdendas præbeto. Xeromyron roſatum. Roſarum aridarum libr. i. costi, ſolij, caryophyllorum, hypni, caſſami odorati, unguum aromaticorum, ſtyracis, ſingulorum ſextantem. Aliud. Folij, roſarum ſiccarum, amomi, costi, caryophyllorum, ſpicæ nardi, arnabo, croci, ſingulorum unc. i. hypni, ſtyracis, opobalfami, ſingul. drachm. iiii. Aliud. Roſarum libras tres, hypni lib. i. ſtyracis ſauil & pinguis, unguum aromaticorum, ſingulorum unciam i. Xeromyron leucophyllon appellatum. Cuius uſus ad collum & axillas eſt. Terræ ſamiæ librā i. ſtyracis, ſolij, opobalfami, ſingulorum ſextantem. ſtyracem cum opobalfamo ſubigito, folium uerò terito ac cribrato. Et ad omnia ſimul in mortario probe permixta, ſucci roſarum quantum ſatis eſt adijcito ac uſitor. Hygromyron, hoc eſt, liquidum unguentum, quo mulieres ad aures utuntur, ſolij, ſpicæ nardi, maſuaphij, maſtiche, caryophyllorū, ſingulorū unc. i. ſcrup. xii. ſtyracis pinguis, opobalfami, ſingulorū ſextantem, croci ſcrup. vi. moſchi ſcrup. i. olei ſalca electi trientem.

Olei ſalca præparatio præcioſa. Cap. cxiiii.

Olei omphacini ſextar. xx. iridis illyricæ lib. i. amomi ſexuncem, aſpalathi, hypni, ſing. lib. i. caſſami aromatici lib. i. caryophyllorū, ſolij, carpobalfami, ſingulorum lib. i. xylocæſiæ quincuncem, caſiæ trientem, costi, ſtyracis pinguis, croci, ſing. unc. i. myrrhæ, arnabo, ſingulorum quadrātem, ſpicæ nardi trientē. omnia in aqua coquito. Modus autem præparandi habetur Sermone primo, ubi etiam aliam olei ſalca deſcriptionē, & unguētū nardini præparationē habes.

Hygromyri præparatio. Olei ſalca lib. ii. opobalfami libr. i. ſpicæ nardi, ſolij, ſingulorum trientem, carpobalfami, arnabo, amomi, ambræ, ligni aloës, ſingulo ſextantem, maſtiche, moſchi, ſing. ſcrup. vi. quod ſi caphuræ copia fuerit, ſextantem ex ea addito. Hoc ad axillas utitur, & in aures cum auriculario ſpecillo indunt. Leucophylli ſiue xeromyri albi præparatio. Lapidis ſpecularis lib. i. ſolij, ſpicæ nardi, caryophyllorum, ſingulorum ſcrup. vi. ſuccini ſcrup. xii. moſchi ſiliquas vi.

Olei ſiue unguenti foliati, ac ſpicati præparatio. Cap. cxv.

Opobalfami lib. i. ſtyracis, amomi, ſingulorū quadrātem, caſiæ trientē, liſſiā xx. ſimul terito ac utitor, & ſi craſſius fuerit, cum oleo ſalca diluto. Alia foliati deſcriptio. Cere libr. i. nardini olei cyziceni libr. iiii. picis brutiæ quincuncem, ladanū unc. i. ſtyracis pinguis

pinguis quadrantem, costi, casia, singulorum sextan-
tem, cardamomi, folij, sing. unc. i. spice nardi semun-
ciam, croci, uini Aminæi, singul. unc. i. opobalsami
quadrantem. Foliatum præparatio ex Oribasio. Casie
sexuncem, folij quadrantem, amomi, ladani, singul.
unc. i. piperis grana quadraginta, myrrhæ troglody-
ticæ unc. i. ungenti nardini libr. i. Arida terito, & te-
nuissimo cribro excutito. Deinde nardinum addi-
to, ac rursus probè terito, & ut nigrius reddatur me-
dicamentum, iuglandium cortices ustos ac tritos am-
misceto, & opobalsami cochlearia III. instillato, ac
utor. Facit etiam eximie ad resolutiones Spicati
præparatio. Amomi sextantem, myrrhæ troglodyti-
cæ, costi, sing. unc. i. folij, casie, ungenti, foliatum aut sal-
ca, singulorum quadrantem, spice nardi unc. i. spice
celticæ trientem, ungenti nardini sexuncem, ceræ albæ
quantum satis est, & ut compages liquidior fiat, opo-
balsami quadrantem addito.

Oenanthariorum præparationes. Cap. cxvi.
Costi sextantem, casia, carpobalsami, spice nardi, sing.
unc. i. amomi quincuncem, nardi celticæ trientem,
ungenti spicati & foliatum, aut salca, singulorum qua-
drantem. Ceræ albæ quantum satis est, & ut compages
liquidior euadat, opobalsami quadrantem ammisce-
to. Alia oenanthariorum descriptio. Costi sextantem,
casia, carpobalsami, masuaphij, myrrhæ, sing. unc. i.
amomi quincuncem, spice nardi, styracis, singulo-
rum trientem, caryophyllorum sesquunciam, opo-
balsami sexuncem, lilia x i. uini adstringentis odora-
ti sextar, x ii. salis cappadocici sextantem. Folia lilio-
rum croceo ipsorum ac unguibus demptis probè de-
tergito, & in sindone pura inuoluta per diem ac no-
ctem in umbra siccato, donec marcescant, deinde ad
myrrhæ in mortario cū uino subacta arida trita am-
misceto, & pariter cum uino subigito. Et his postea
styracem in minutissimas partes contusum addito, &
omnia opobalsamo affuso unito. deinde lilia quoque
ammisceto, & omnia in uitreū uas trāsusa cōcutito,
& uino postea in idē uas infuso rursus cōcutito, &
uas ipsū moscho aut hypno diligēter obturato, deli-
gato, luto oblinito, & p dies quadraginta insolato.
*Absinthati siue rodabsinthati præparatio sa-
lubris.* Cap. cxvii.

Spice nardi scrupu. ii. folij, amomi, singulorū scrupu.
i. mastiches scrupulos III. rosarum siccarum scrupu.
vi. mellis sextarium i. uini sextar. IIII. aut ut aliij ha-
bent, quinque. Quidam pro amomo costum adij-
ciunt. Aliud. Rosarum resectis unguibus, & in
sindone per diem ac noctem resiccatarum libr. i.
mellis optimi sextarium i. uini antiqui sextarios
vi. Rosas in uino ad dies quindecim macerato, &
quotidie uas ipsum ad solem exponito. Deinde ui-
no excolato, spice nardi scrupul. ii. & folij aut casia
scrup. i. ammisceto. Sint autem hæc prius cum uino
trita. Postea uerò mel adijcito, unito, ac utor.
Aliud rosatum. Rosarum exemplis unguibus in
umbra siccatarum libr. i. uini antiqui ac splendidī
sextar. v. mellis sextar. i. Rosas in uino per diem ac
noctem macerato. deinde ad uinum excolato mel
adijcito, & post triduum exhibeto. Quidam masti-
ches scrupul. vi. addunt, & ita aluum mollit.

Conditi purgatorii præparatio. Cap. cxviii.
Hoc cōdito ad pituitosos hyemis tēpore uteris. Mellis
sextariū unū, uini sextarios v. piperis grana x lvi.

styracis calamitæ scrupul. III. Styracem ad prunas
cum modico melle diluito, deinde in mortario cum
pipere probè terito, & mel paulatim adstillato, ac
postea uinum ammisceto. Eius uerò meminisse ope-
ræ prædum est, quod mel nisi ualde purum fuerit,
non permittit ut potio ex ipso præparata desideat, ac
pura & clara fiat. Proinde despumandum est mel, ac
pulum faciendum: si enim despumatum fuerit, po-
tio eadem die desidebit ac pura euadet. Alia absin-
thati præparatio. Spice nardi scrupulos v. croci si-
liquas III. absinthij drachm. i. mastiches scrupul. vii.
mellis sextarios IIII. uini sextar. xxi. Alia con-
diti præparatio. Piperis scrupulos vi. spice nardi
scrupul. i. croci si libuerit, siliquam i. uini sextar. v.
mellis sextarium unum. Mastichati ac cuminati
præparatio. Cumini scrup. xii. mastiches sesqui-
unciam, uini sextar. v. mellis sextarium unum. Ani-
sati præparatio. Anisi scrupul. vii. spice nardi
scrupul. vii. uini sextar. v. mellis sextarium i. Citra-
ti præparatio. Corticis citri electi, uel foliorum
eiusdem bessem, uini sextarios viii. mellis sextar. i.
corticem aut folia in uino per dies septem macerato,
deinde uino excolato mel ammisceto. Apicati præ-
paratio. Seminis apij scrupul. xii. seminis rutæ scru-
pul. vi. mellis sextar. i. uini sextar. IIII. aut v. pro ab-
stemijs uini loco, aquam accipito.

Rhomeli præparatio. Cap. cxix.
Succi malorum cotoneorum, dempto cortice & gra-
nis siue medulla, expressi sextar. ii. succi rosarum
sextar. i. aquæ ad tertias decoctæ sextar. IIII. mellis
sesquiseptarium. Succum malorum suo tempore ex-
primio ac excolato, eiq; mel ammisceto, & ad rosa-
rum tempus seruato. In uere autem cum aqua ad ter-
tias decocta, & rosarum succo, asservatum cum mel-
le, malorum succum unito, ac utor.

Mustati præparatio. Cap. cxx.
Similaginis sextar. xvi. olei omphacini sextar. v. pipe-
ris quincuncem, folij malabathri, caryophyllorum,
sing. unc. i. musti dulcissimi sextar. III. mellis lib. ii.
ex his omnibus uelut placentulæ paruæ efformantur.

Gari præparatio pro abstemijs. Cap. cxxi.
Aquæ sextar. xxxi. salis sextar. ii. ciccorum nigrorum
siccorum sextar. IIII. amanitarum libr. ii. caricas
quinquaginta, præparato, excolato, ac seruato.

Suffumigij moschati præparatio. Cap. cxxii.
Rosarum uiridiū lib. vi. mellis Autici excolati lib. III.
& quadrantem, folij sexuncem, amomi trientem, ca-
ryophyllorum sextantem, spice nardi trientem, co-
sti bessem, ungulum aromaticorum unc. i. carpobal-
sami trientem, asari sextantem, aloës unc. i. calami
indici sexuncem, nuces indicas tres, sandalorū scrupu-
los xvi. ambræ unc. i. styracis pinguis libr. III. qui-
dam pro styrace, ladani pinguis, & stactes myrrhæ
sing. lib. i. aut ut aliij habet, dextrantē accipiunt. croci
unc. i. mastiches quadrantem, moschi scrup. IIII. Ad ar-
ida trita ac cribrata, ladanum, styracem, stactem, myr-
rham, & mel in mortario ammisceto, deinde ambrā
liquefactam adijcito. Postea moschum aqua calida
dissoluito, & partem eius addito, & partē ad pastil-
lorū efformationē seruato, deinde manibus omnia
probè subigito, ac cum moscho efformato. Suffu-
migium regium. Styracis calamitæ lib. i. ligni aloës
sexuncem, ambræ unc. i. moschi scrup. IIII. quidā ita præ-
parant, styracis calamitæ libr. i. ligni aloës trientem,
ambræ,

ambrae unc. i. moschi scrupul. iiii. & addunt succi ro-
sarum quantum satis est. Suffumigium moschatum, Theo-
pompi. Styracis pinguis dextantem, caryophyllo-
rum, costi, rosarum siccarum, folij, mastiches, sing. unc.
i. moschi siliquas quatuor. Ego uero inquit, moschi
scrupulos iiii. & balsami quantum satis est adijcio.

Aliud suffumigium moschatum. Folij, costi, ro-
sarum siccarum, hypni, spicae nardi, singul. unc. i. cro-
ci, ungulum aromaticorum, caryophyllorum, amo-
mi, casiae, singul. scrup. xii. carpobalsami, bdellij,
singul. scrup. xii. styracis scrupulos xx. moschi scru-
pulos iiii. Rhodomelitis, hoc est, mellis rosacei quan-
tum satis est. Suffumigium Moschatum in ecclesia
usurpatum. Costi libras iiii. & dimidiam, caryo-
phyllorum lib. ix. folij sesquilibram, spicae nardi ta-
rundem, cassami unc. xiiii. styracis liquidij lib. xvi.
aspri lib. iiii. croci dextantem, moschi, ambrae, singu-
lorum sextantem. Caeterum princeps Orientis sic
praeparat. Costi quadrantem, spicae nardi unc. i. fo-
lij unc. i. caryophyllorum sesquunciam, cassami se-
munciam, aspri sextantem, styracis liquidij electi quin-
cuncem, croci scrup. ii. moschi, ambrae, singul. scrup.
ii. Suffumigium bonum rosatum. Foliorum rosa-
rum aridorum, costi, mastiches, singulorum sexun-
cem, spicae nardi, amomi, opobalsami, singulorum ses-
quunciam, croci, myrrhae, singul. unciam i. styracis
dextantem. Vini odorati antiqui, & mellis, quantum
satis est. Suffumigij ungentarij praeparatio. Costi
sesquilibram, elenij, rosarum siccarum, nigellae, singu-
lorum lib. i. carpobalsami, aspalathi, singulorum lib.
ii. myrrhae sesquilibram, tari, hoc est, ligni aloes, la-
dani, singulorum lib. iiii. amomi lib. i. mastiches
bessem, ligni caryophyllorum sexuncem, foliorum
scylmatis, hypni, singulorum lib. xii. myrrhae sta-
ctes libras v. bdellij libras ii. ungulum aromatico-
rum, croci, singulorum trientem. Suffumigium un-
gentarium insigne. Costi sesquilibram, cassami lib.
i. ligni caryophyllorum, foliorum scylmatis, spicae
nardi, singulorum sexuncem, corticis aspalathi, rosa-

rum siccarum, singulorum quadrantem, mastiches
chia, bdellij, singulorum sextantem, ladani lib. iiii.
staetes nigrae lib. vi. croci scrupulos vi. ego uero in-
quit, pro staete nigra, albæ lib. ii. & styracis libras
iiii. ammisceo. Suffumigium ualde amabile. Co-
sti unc. xix. caryophyllorum trientem, ladani lib. i.
spicae nardi, folij, singulorum sexuncem, styracis
lib. iiii. aspri unc. xvi. croci sexuncem, moschi bessem,
mellis quincuncem. Suffumigium dominae Romu-
lae. Styracis calamitae lib. ii. costi, staetes albæ, singu-
lorum sexuncem, caryophyllorum, tari, singulorum
sextantem, spicae nardi sextantem & semunciam,
croci trientem, ambrae drachm. iiii. succini unciam
unam, moschi scrupul. iiii. uel quantum accipe-
re uolueris. Suffumigium rosatum, Embularchi.

Cassiae, myrrhae, bdellij, arnabo, calami indicij, suc-
cini, carpobalsami, ladani pinguis, hypni, folij, singu-
lorum quadrantem, caryophyllorum, ungulum aro-
maticorum magnorum, mastiches, singulorum trien-
tem, croci sextantem, spicae nardi, opobalsami, singu-
lorum sexuncem, rosarum siccarum, styracis, singul.
lib. i. rosarum uiridium lib. ii. uini odorati ueteris,
& mellis Antici, singulorum quantum satis est. Suf-
fumigium Pamphili Episcopi. Folij, caryophyllo-
rum, hypni, ladani pinguis, singulorum sextantem &
semunciam, calami indicij, spicae nardi, ungulum aro-
maticorum magnorum, bdellij, carpobalsami, croci,
cassiae, singulorum quadrantem, amomi, mastiches,
singulorum quincuncem, costi sesquunciam, arnabo
tantundem, succini unciam unam, opobalsami qua-
drantem, styracis pinguis lib. iiii. rosarum uiridium
refectis unguibus lib. vi. uini mulsi quantum satis
est. Sit autem mel electum, & uinum antiquum odo-
ratum, ex quibus uinum mulsum parari debet.

Myrrhatio ad cadaueris conseruatio-

nem.

Cap. cxxiii.

Aloes, myrrhae, gummi, singulo lib. i. sarcocollae lib.
ii. acaciae sesquilibram, thuris sexuncem, opobalsa-
mi quadrantem.

DECIMISEXTI AC VLTIMI SERMONIS AETII
FINIS, IANO CORNARIO MEDICO
PHYSICO INTER-
PRETE.

PONDERA IN AETIO VSVRPATA.

Libra	uncias xii.
Deunx	unc. xi.
Dextans	unc. x.
Dodrans	unc. ix.
Bes	unc. viii.
Seprunx	unc. vii.
Sexunx	unc. vi.
Quincunx	unc. v.
Triens	unc. iiii.
Quadrans	unc. iiii.
Sextans	unc. ii.
Vncia	drach. viii.
Semuncia uel semissis	drach. iiii.

habet

Reliqua pondera ac mensurae iuxta Pauli traditionem usurpata sunt.

DE PON

DE PONDERIBVS AC MEN- SVRIS, EX PAVLO AEGINETA,

IANO CORNARIO Medico Physico
Interprete.



PONDVS, grauitatis mensu iudicatur. Mensura autem, uasculi capacitate. Vasculum uerò, tum aridæ, tum liquidæ quantitatis mensura existit. Quare tres omnino dimensæ quantitatis sunt differentiæ: una quidē ponderis: altera uerò rerum aridarum, utpote quæ uelut in aggerem accumulatur; tertia autem liquidorum. Cæterum quum penè infinitæ pondera ac mensuræ, tum pro locorum, tum pro eorum qui eis utuntur consuetudine, existant; de his saltem quæ omnibus maximè familiaria sunt, nobis sermo erit.

De ponderum ac mensurarum notis.

VERVM quum quidam non integris literis, sed per notas hæc ipsa pondera ac mensuras significant, presterit fortassis & nos in hac parte ueteres imitari, atque primum characteres ipsos declarare. Primum igitur litera χ ubi α literam habuerit incumbentem, Chalcum, id est, Aereum, significat: hoc modo, χ . Si uerò, ipsi χ incubuerit, Choa, id est, Congium, demonstrat: sic χ . Si α Chœnicem, χ . Si α Chemam χ . K uerò litera, si incumbens habeat, & linea recta inferiorem ipsius apicem per obliquum secet, Ceramium, id est, Siliquam, significat: hoc modo κ . Quod si, ipsi κ incumbat, Cyathū significat, sic κ . Si uerò, κ Co tylā, id est, Hemīnam, κ . Porro linea circumflexa, quam nihil aliud circūstat, & quæ omnino per obliquum ponitur, Obolum denotat, ω . Si uero duæ sunt lineæ, quas nihil circumstat, duos obolos signant, $\omega\omega$. Qui Gramma, hoc est, scrupulū, faciunt, quod per literam γ quæ ρ adiectum habet denotatur, recta amplius linea ipsum γ secante, hoc modo $\gamma\rho$. Duæ autem lineæ iuxta alteram extremitatem confertæ, angulumq; cōstituentes, ad similitudinem duorum apicum, qui in ipsius K literæ pictura, ad rectam lineam adscribuntur, Drachmam significant, quæ & Holca cognominatur: hoc modo λ . Propriè autem Holca per λ literam notatur, λ . Altera medium eius occupante: hoc modo λ . Quod si, litera ad λ apponatur, libra significatur, λ . Aliqui tamē lum suum α literam habens, Vnciam significat, ν . M autem iuxta medium ipsius ν habens, Minam denotat, μ . Si uerò ν habeat, Mystrum, μ . Si ν Medimnum, μ . Si ν Modium, μ . Porro ν literam ρ complectens, & ν incumbat superscriptum. Oxybaphum, id est, Acetabulum, ξ . Aliqui tamen Xesten per ξ denotant, recta linea dissectum, hoc modo, ξ . H autem incumbens μ habens, Hemīnam indicat, μ . K uero cum ρ connexum incumbente ipsius litera μ , Ceramium signat, $\mu\rho$.

DE PONDERIBVS.

M N A Attica & Aegyptia habet Vncias xvi

Mna Romana Vncias xx

Libra Vncias xii

Vncia Drachmas viii

Drachma Scrupulos iii

Scrupulus Obolos ii

Obolus Siliquas iii

Siliqua Aereos ii

duasq; tertij partes: ita ut obolus aereos octo complectatur.

DE MENSVRIS LIQVIDORVM.

ITALICVM Ceramium habet Choas viii

Chus siue Conglus Sextarios vi

Sextarius Cotulas ii, quæ & Trybliæ appellantur.

Cotula autem siue Tryblium, Magna Mystra iii. Acetabula uero ii

Magnum enim mystrum continet Acetabulum i, & Drachmas vi

Acetabulum uerò Sesquicyathum habet.

Cyathus Chemas paruas, aut Mystra parua ii habet.

Quod si uelis liquidorum iuxta pondus scire dimensionem: multæ enim rerum liquidarum differentiæ iuxta lancis momentum existunt: id ipsum ex olei, uini, & mellis exemplo docebimus. Mel igitur uino grauius est quarta ampliusq; decima parte, quod ferè totum tertiam eius partem facit: habet enim eadem mellis ad uinū mensura totum uini pondus, accedente insuper tertia eius ponderis parte. Ad oleum autem mel dimensum, dimidia eius parte ponderosius existit: habet enim totum olei pondus, atq; insuper dimidiam eius ponderis partem. Vinum uerò nona parte oleum excedit: habet enim pondus ipsius totum, ampliusq; nonā eius ponderis partē. Quæ res ut magis euidens & manifesta fiat, omnium mēsurarum pondus sigillatim subiecimus, uelut in tabella depictum: ita ut manifestè constet, quod per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, Oleum, Vinum

Vinum, & Mel, ex ordine demonstrantur.

Ceranium Italicum habet.

Olei
libras LX XII

Vini

libras LXXX

Mellis

libras CVIII

Chus siue Congius habet

libras X

libras XIII & dimidiam

Sextarius habet

uncias XX

uncias XXVII

Cotula siue Hemina habet

uncias X

uncias XIII & dimidiam

Magnum mystrum habet

uncias III scrupulos VIII

uncias III & dimidiam

Acetabulum habet

uncias II scrupulos XII

uncias III scrupulos IX

Cyathus habet

sesquunciam scrupulos IIII

uncias II drachmas II

Parvum mystrum habet

scrupulos XX

drachmas IX

Olei

libras LX XII

libras IX

uncias XVII

uncias IX

uncias III

drachmas XVII

drachmas XII

drachmas VI

Orbafius autem iuxta Adamantium, Sextarium Italicum vini quidem iuxta mensuram Vncias uiginti quatuor habere ait: iuxta pondus uero Libram unam, Vncias octo. Sextarium autem mellis Librarum duarum & dimidia pondus habere tradit.

DE MENSVRIS ARIDORVM.

AEgyptia Artaba continet Modios III

Modius Aegyptius & Italicus habet Choenices VIII

Choenix, Sextarios II

Sextarius habet Semisextarios II. qui & heminae appellantur.

Hemina autem habet Cyathos VIII

Atticus Medimnus continet Hemiecta XII

Hemiectum autem seu Semodius, Choenices IIII. quo fit ut Medimnus habeat Modios VI. choenices XLVIII.

sextarios XCVI.

Cæterum pondus harum mensurarum non facile est proferre, quod immensa diuersitas rerum aridarum iuxta lancis inclinationem existat.

FINIS EORVM QVAE PAVLVS AEGINETA

de ponderibus & mensuris tradidit, interprete IANO

CORNARIO Medico Physico.

QVATVOR AETII TETRABI-

BLON, IDEST SERMONVM XVI. INDEX,

In quo præter cætera ad Medicinam spectantia, Simpli-
cium nomenclaturæ tam Græcæ quam Latine in-
dicantur, iuxta Alphabeti ordinem.

A			
Ab lactadi infantes tempus	263	Adamantis efficacia	338
& quæ post		Adarces cuius facultatis	85
Ablactationem uictus ratio sit ha-		Adianti facultas	10
benda	ibidem	Adeps uulpinus qualis	171
Abortiætes bimestres aut trimestres		Adipis uirtus medica	107.108
fœtus quomodo medendæ	965	Adipis animalium conditio	107
Abortum futurum signa præceden-		Adstrictionis actio	113
tia	964	Adstringentium medicamentorum	
Abrotoni facultas, & abrotoni usti	9	qualitas	2
Abcessum signa iudicatoria	241	Adstringentia simplicia quæ	125
Abcessus intestinorum ortus & re-		Aeger seruandus quatuor morbi tem-	
media	598	pora superat	131
Abcessus palpebrarum cura	403	Aegris incurabilibus neque occasio	
Abcessum sedis medicinæ	843	ne neque auxilia commodare	255
Abcessum generalis curatio	863	Aegrotates quomodo doleant, nul-	
Abinthium quale	16	lo forinsecus accedente quod do-	
Abinthium quod præstantius	118	lorem ipsis inducat	173
Abinthiorum uariorum descri-		Aegilopis uirtus	10
ptio	355	Aegilops quid, eiusq; cura	405.
Abinthiorum oleorum præpara-		406.407	
tio	1027	Aegiros quibus uiribus	10
Acacia unde fiat	10	Aegyptiacæ terræ usus	76
Acaciæ facultas	10	Aegyptium Andromachi empla-	
Acacia quæ optima	117	strum	923
Acalyphes uirtus	10	Aegyptium pharmacum ad omnes	
Acanthæ Aegyptiæ proprium	11	aurium dolores	350
Acanthæ leuces uis	11	Aequinoctium uernū quando	181
Acanthi uirtus	11	Aequinoctium autumnale quando	182
Accipitrum quale fel	98	Aeræ facultas	40
Acerbitas lyneera ubi	3	Aeris flos qualis	90
Acerbus sapor qualis	1.2.3.4.5	Aeris qualitatis notio & differen-	
Acerborum & dulcium natura	5	tia & deinceps	179
Aceti facultas	4.5.16.135	Aeris squamæ efficacia	87
Acetum ab uuæ immaturæ succo		Aeris usti qualitas	90.854
quo differat	1	Aeruginis æris qualitas	855
Aceti multi præparatio	211.290	Aeruginis rase usus	87
Acetum mulsum qualis facultatis		Aeruginis uermiculatæ facultas. ibi	
126.132		dem	
Acetorum mulsum purgatorio-		Aetitis lapidis energia	84
rum uariæ cõpositiones	156.49	Aetius prestigatoris opinionem ne	
Aceti purgatorii descriptio	156	incurreret fugit	91
Acharista collyria	423	Aethyopas à natiuitate frontem cir-	
Acharistos antidotus	806	cumcidere, ne oculorum fluxio-	
Achores infantium quomodo cu-		ne infestentur	409
rentur	202	Affectiois principium & genera-	
Achorum descriptio & curatio	343.	tionem posse esse ex diuersis par-	
344.345		tibus	301
Achoribus quæ cicatricem indu-		Agarici proprietates	152
cant	345	Agaricum quod præstantius	117
Achrades quali uirtute	14	Agerati lapidis efficacia	82
Acidus sapor qualis	2.3	Ageraton cuius facultatis	10
Acnæ, id est, faciei uari, quomodo		Aglaide liquidum collyrium.	416
sanandæ	449	Agninæ carnis qualitas	102
Aconiti energia	11.784	Agnini pulmonis uis medica	108
Aconitum, iris syluestris	340	Agnos seu uitex	9
Acopa quæ dicantur	170	Agrostis qualibus uiribus	9
Acopa podagrica diuersa	742. &	Aizoi uires quæ	10
inde		Alabandicus lapis qualis	84
Acori facultas	11	Alabandici lapidis uis	338
Aeris sapor qui	2.7	Albi collyrij compositio & præstan-	
Aerium saporum natura	7	tia	424
Acrochordon quid, & unde ei no-		Albuginibus puerorum quæ cura	
men inditum, eiusque curatio		conueniat	200
837.838		Albuginum oculorum remedia ua-	
Acron Agrigentinus quomodo aë-		ria	383.384.385
rem transmutauerit pestis tem-		Albuginum tincturæ	385
pore	269	Alcibiadium, alias onochilos	9
Acte qualibus uiribus	11	Alcyoniorum species & uires	85
Acutorum morborum terminus deci-		Alenum oleum quod	398
ma quarta dies	233	Alexandrinæ terræ usus	77
Acutorum morborum prædictiones		Algæ conditio qualis	70
non esse tutas	243	Alicæ qualitas	127
		Alimentorum ratio	
		Alimentorum quæ sint facultates	
		125. usq; 136	
		Alisma quali uirtute	20
		Allij propria conditio quæ	164
		Aloë quæ præstantior	117
		Aloës qualitas	11.857
		Aloës uis medicamentaria	149
		Aloëdaria Oribasij	259
		Aloëdarium purgantium uariæ	
		compositiones	161.162
		Alopecia qualis affectio, undèque	
		generetur, & eius cura	334.335
		Alphos quid & unde dictus, eiusq;	
		cura 826. & quomodo differat à	
		lepra	830
		Alfines facultas	12
		Altheæ qualitas	21
		Alui animalium qualitas	103
		Alui adstrictionis remedia	545.548.
		562	
		Alui fluxione laborantis remedia	
		584	
		Aluminis species & efficacia	89
		Aluminosa balnea quibus conue-	
		niant	136
		Alysson quibus uiribus	12.150
		Alyssus cur dicta syderitis heraclea	
		317	
		Amaracinum oleum	22
		Amaranti uires	12
		Amarorum natura	7
		Amarus sapor qui	3.7
		Amazonum pastillus	542
		Ambigua morbi quomodo inuesti-	
		ganda	234
		Ambrosiæ qualitas	13
		Ambustorum ab igne medelæ	895.
		79.85.100.	
		Amomi facultas	13
		Amomi electio	117
		Ammium seu Ammi	12
		Ammodites quale animal, & qualis	
		eius morsus	773
		Ammoniæ qualitas	13.857
		Ammoniacum quod melius	117
		Ampelitis terræ qualitas	79
		Ampelos leuce qua facultate sit præ-	
		dita	12
		Ampeloprasii uirtus	12
		Amphæmerina febris quæ, & cur sic	
		dicta	261
		Amphisbæna quale animalculū, &	
		quod à scythala chalcidica differat,	
		eiusq; noxa & cura	775
		Amureæ facultas	12
		Amyli temperamentum	61
		Amylum cur dictum	ibidem
		Amyli qualitas	120
		Amygdalorum uires	12
		Amygdalinum oleum	23
		Anagallidis utriusq; qualitas	13
		Anchusæ specierum facultas	9
		Ancyloglossorum remedia	470.60
		rumq; affectio duplex	ibidem
		Ancylosis quid, & cura eius	397
		Andrachnes facultas	13
		Andromachi compositio ad dentes	
		molares, quæ eadem hora dolo-	
		res sedat	467
		Androsæmon qua uirtute	16
		Anemones qualitas	13
		Anethi facultas	13
		Anethinum	

AETII INDEX.

Anethinum oleum 25
 Aneurysma quid 147.915
 Aneurysma quò fiat & curetur 915
 Aneurysmatis quæ sint indicia ibi.
 Anginæ species & causæ, remediaq;
 483.484.485.486
 Anginæ medicinæ 87.99.101.117.
 144.173.416
 Anhelosis medentia 80 108.164.
 173.501
 Ani fistulas quomodo curare oportet 843
 Anicetum emplastrum 940
 Animalia uenenata quibus artibus tollantur 763
 Animalium quis usus in medicinis 91. & inde
 Animalium morbi unde deprehendantur 92
 Animalium per singulas suas partes qualitas describitur, pagina 91. usq; 117
 Animalium quæ præsaga sint & uenenum prodant 790
 Animi deliquij remedia 537
 Animi deliquium in balneo quomodo curandum ibidem
 Animo linquentibus remedia 270. & deinceps usq; 278
 Animo linqui quosdam propter crudorū humorū multitudinē 270
 Animo linquētes ob flauā bilē 272
 Anisati præparatio 128
 Anisi facultas 14
 Anserinus adeps qualis 3.108
 Anserum carnis qualitas 104. item ouorum 105
 Antiades, uide Glandularum.
 Antidoti ex cancriis fluuiatilibus compositio 316
 Antidoti ex nucibus cōpositio ibidem
 Antidoti podagricæ 751. & inde
 Antidoti mithridaticæ compositio & usus 801.802
 Antidoti pæoniæ compositio 804
 Antidotus aromatica optima Galli 805
 Antidotus ex duobus piperis generibus ibidem
 Antidotus Athanasia ibidem
 Antidotus Esdræ qualis 802
 Antidotus Hadriani 806
 Antidotus Acharistos ibidem
 Antidotus theriaca contra uenena quæ simplicia recipiat, & quò conficiatur 793. eiusq; usus 794
 Anthomis qualis 14
 Antoninus, collyrium 420
 Anulus digito impactus quomodo detrahatur 901
 Aparines uires 14
 Apes & uespas fugantia
 Aphronitri energia 86.87
 Aphtha quid 197.200
 Aphthorum remedia 471
 Apiati præparatio 927
 Apij qualitas 14.63
 Apocynum quid 191
 Apocynum præparatio 947
 Apogei uenti qui
 Apollonij Memphytæ medicamentum 119
 Apollonij naturale ad polypos medicamentum 355
 Apollonij liquida compositio 417
 Apomeli quid 252
 Apomelitis præparatio & uis 289
 Apophlegmatismorum pituita per os detrahentium descriptio 332
 Apoplexia quid & qualis affectio,

eiusq; cura 318.319
 Apoplexia quo differat à paralyfi 319
 Appetitus perdit remedia 552
 Appetitus caninus qualis, eiusq; species & cura 553.554.555
 Appetitus uitiosi medicinæ 555
 Aqua qualitatis expertus
 Aquosus sapor ibidem
 Aqua nihil humidius
 Aquam concoctioni maximè resistere 131
 Aquæ frigide noxa & remedia 719
 Aqua quò per fossas ducenda 183
 Aqua quomodo emendetur 184. si ne aqua alimentum concoqui non posse ibidem
 Aquæ lixiuij usus ibidem
 Aquam ducentia remedia 153.656
 Aquarū albularū potus utilitas 698
 Aquarum dulcium iuxta temperaturam uis 184.185
 Aquā horrentiū affectio & cura 314
 Aquæ mulsæ usus 132.133.134
 Aquarum potabilium differentia & notæ 182.183.184. & quibus comoda & incōmoda sit ibidem
 Aquaticorū animalium alimentū 105
 Aquilæ ortus & occasus 182
 Aquilarum fel quale 98
 Arabica compositio 1026
 Araci facultas 15
 Aranearum telæ ad quid utiles 111
 Arborum fructus ferè omnis prima generatione acerbi sunt gustu
 Arbuti, eiusq; fructus qualitas 43
 Arceutos qualis 15
 Archigenes quò suum præceptorē Agathinū delyrio liberarit 187
 Arction, quod & Bunion 18
 Arcturi occasus, ortusq; 182.183
 Ardor æstuosus quò curadus 214
 Arenæ ingestionis modus 143
 Argemum quid, & eius cura 374
 Argenti scoria 89
 Argenti spumæ uis 88.789
 Argenti uiui proprium 789
 Aridorū collyriorū cōpositio 412
 Aridum Danai 413
 Arietinae carnis qualitas 102
 Aristolochia triplex, & qualis 14
 Aristolochiæ clematidis seminis energia 152
 Armeniaca mala 53
 Armenij usus medicus 151
 Armenij pictorū facultas 85.384
 Armutheus lapis 86
 Arnoglossi qualitas 15
 Aromaticum collyrium 430.435
 Aron quali uirtute 15
 Artemisiæ uires 15
 Arundo sepiaria 37
 Arquatus morbus quid, & eius remedia 545.546
 Arsenicum, auripigmentum 86
 Arteriarū sectio quomodo fiat 147
 Arteriarum sanguinis sistendi medicamentum ibidem
 Arteriarum sectionis ratio 408
 Arteriarum remedia 489
 Arteriæ confectiones 491
 Articularis morbus, uide Arthritis & Podagra
 Articulorum incuruatorum quæ sit causa 718
 Articulari morbo qualis perustio conueniat 723
 Articulorum distortorum malagma 737
 Articulos laxos & luxatos quomodo cures 898

Arthritis quid, & quomodo differat à podagra, ac eius causæ 716. cur in quibusdam paruus, in quibusdam magnus morbus, & alijs diu, alijs paruo tempore duret 717. uide Podagra, & Articularis
 Artis circa hominis corpus uersantis duæ primæ ac maximæ partes quæ 195
 Asari facultas 15
 Ascarides quid, quomodoq; curentur 597.598
 Ascites hydrops quid, eiusq; causæ
 Ascitæ hydropis cura 651 (650
 Asclepius siue Aesculapius pastillus 877
 Asellorum millepedum usus 328. 340.349
 Aselli marini usus 116
 Asiæ petræ flos flaccidas carnes consumit 121
 Asininum lac quale 92.94
 Asinorum domesticorum & syluestrium caro qualis 102
 Aspalathi qualitas 15
 Aspalathus quomodo probetur 117
 Asparagus siue aspharagus 15
 Asperæ arteriæ si qua infixæ, aut illapsæ fuerint, quò reuocet 489
 Asperæ arteriæ descriptio & affectus eius remedia ibidem
 Asphaltion cur trifolium dictum 69
 Asphaltiti maris aqua qualis 7
 Asphaltus, bitumen 86
 Asphodeli facultas 16
 Aspersorum faciei ratio 187
 Aspis acutias 417
 Aspritudo palpebrarum unde oriatur, quomodo à densitate differat, & curetur 386.387
 Asij lapidis & floris eius uis 82
 Astaphys quali ui 16
 Astaphys agria qualis ibidem
 Aster siue stella samia, terræ samia
 Aster Attricus 15 (species 78
 Aster Asclepiadæ 426
 Aster Magni collyrium 427
 Aster samius, collyrium 423
 Asthmatici qui dicantur, & unde fiat, quomodoq; curentur 501
 Athanasia antidotus 805
 Athanasia collyrium 426
 Atheromatum curatio 405
 Atramenti scriptorij constitutio 88
 Atramenti sutorij uis 90
 Atramenti sutorij qualitas 855
 Atræ bilis generatio, unde 302
 Atræ bilis quò cognoscatur 239
 Atram bilem quæ ducant 305
 Atræ bile laborantium cura 732
 Atræ bile stomachum infestatum habentibus quomodo medendū 531
 Atractylis qua ui 16
 Atraphaxis qualis ibidem
 Atriplicis uirtus ibidem
 Attenuatæ partes quò sanandæ 207
 Attenuatoria alimenta quæ, & quibus conueniant 126
 Attenuatoriorum & crassificantiū media quæ 127
 Atractoria emplastra 849. & inde
 Atractoria simplicia quæ 124
 Auditus difficultatis cura 347.348
 Auellana nux 39
 Auenæ proprietas 18
 Augustus, collyrium 426
 Auium quæ optimæ 126.127
 Aurea faciei circumlitio 44
 Aureum Hygieni collyrium 435
 Auricula muris, alfine 12.54
 Aures quæ purgent 172
 X 2 Aurium

AETII INDEX.

Aurium dolorum origo, item diuer- fitas & curatio 346.347	Britannicæ qualitas 18	Canceri ulcerati medicinz 982
Aurium infantium doloribus quo- modo medendum 200	Bromium emplastrum 948	Caceratorum tumorū nō tamen ul- ceratorum remedia. ibidem
Auris suppuratz curatio ibi. (280	Bronchocele quid, & eius medica- mina 912	Cancerata ulcera oculorum quæ di- cantur, & quibus accidunt 378
Aurium elotiones quibus fiant 349	Bubastica ulcera in pueris 201. eo- rumq; remedia 202	quomodoq; curentur. ibidem
Auriū sordes quō expurgandæ 346	Buprestis qualis & quomodo affi- ciat hominem 782	Canceratorum tumorum medicami- na 889
Aurium sonitus causa & remedia ibidem	Bubonium, aliās. Aster atticus 15	Candidi nardinum collum 436
Auriū inflammationū medelæ 348	Bubulæ carnes quales 102	Canes rabiosi quō curentur 316
Auris meatus ulcerum cura 349	Bubulum fel quale 98	Canicule ortus occasusq; 182.183
Aurium foetores, item superexcre- scentes in aurium ulcerib. carnes, tum uermes aurium sanantia 350	Bubulum lac quale 92	Canis fluuiatilis testiculorum usus 115
Auribus humectis absq; ulceratione remedia 349	Bubuli stercoris qualitas 100	Canis terrestris catuli utilitas ibidē
Auribus sanguine fluctibus, aut qui- bus calculi aut aliud qd illapsum fuerit, medelæ 350.351	Buccellæ purgatoriz cōpositio 160	Canū temperatura, & rabies 314
Aurium affectionib. extra meatū 351	Buccinorum teste ad quid utiles 115	Canū rabiosorū signa quæ ibidem
Auricularis compositio ad dolores magnos, & pus album 350	Buglossi qualitas 18	Canina cōuulsio, eiusq; remedium 173.187
Auribus purulentis & graueolenti- bus, item Aurium diuturnis ulce- rationibus remedia ibidem	Bulbi proprietas 18	Caninæ conuulsionis curatio 321
Auripigmenti qualitas 86.789.855	Bulbus uomitorius ibidem	Canina infania qualis 307
Austerum quale 2.4.5	Bulimus quid 276	Canini stercoris qualitas 99
Austrorum uentorum qualitas 181	Bulimos unde oriatur, & eius reme- dia 536	Canities ne eueniat 339
II		
B Alanos myrepfica qualis 16	Bunij facultas 18	Cantharidū haustus remedia 781
Balaustium quid & uis 17	Buphthalmi flores & actio 18	Cantharidum usus 113
Balneorum ratio 184.185	Butyri qualitas 97	Capnias lapis, qualis 84
Balneorum ingressus qualis sit 186	C	
Balneorum usus in morbis oculo- rum 365	Achexia quid, eiusq; indicia, ac cura, & in quos morbos trāseat 649	Capnion, fumaris qualis 37
Balsami facultas 17	Cadmiz energia 87.855	Capparis facultas 37
Barbā nigrefaciens pharmacū 339	Calami aromatici præstantia quomo- do discernenda 118	Capillos quæ tingant & nigrefaciāt 338. fuluos faciant 339
Barbari emplastri usus 76	Calamus aromaticus 37	Capillorum corruptio unde proue- niat 334
Basiliscus & eius plaga qualis 776	Calamus phragmites ibidem	Capillorum defluuium qualis affe- ctio, & quomodo curetur. 336. ui- de etiam de pilorum defluuio
Basilicum tetrapharmacum 947	Calaminthæ qualitas 36	Capræ ortus occasusq; 182
Balsi liquida 417	Calcis uirtus medica quæ 68. 89. 789	Capræ cornu quale 101
Batrachij specierum uires 17	Calculi palpebrarum cura 404	Caprinæ carnis temperamentū 102
Batos seu Rubus ibidem	Calculi uesicæ muliebris cura 1020	Caprini sanguinis usus in meden- do 91
Bdellij dinotio 118	Calculis exectis quæ diæta conue- niat 679	Caprini seui usus 108
Bdellij energia 153.857	Calculi ne nascantur, aut renascan- tur, diæta præseruatiua 671	Caprini stercoris conditio 100
Bdellij utriusq; natura 17	Calculis uesicæ remedia 673	Caprinum fel quale 98
Befasa, ruta syluestris 54	Calculis uesicæ & renum remedia 672.676.677	Caprinum lac quale 92
Beredrias unguentum 1025	Calculos uesicæ atterentia medica- menta 673	Caprarum fimi præstantia 192
Berenices thymiana 809	Calculorū qui nec atteri nec excer- ni possunt medicamina 679	Caput p. nares quæ purgēt 173.332
Beta stomacho quā incommoda 131	Calculos renum ac uesicæ euacuan- tia 175	Caput resiccantium medicamento- rum compositio 333
Betę uis 67	Calculosorum rhenum causæ & re- media 668.669	Capitis dinotio 218
Betonice uirtus 40	Calfacientia alimenta 134	Capitis dolori in febribus quomo- do medendum 277
Bilis effusio quid, eius causæ & re- media 544	Calfacientia moderate, item primo, secundo, tertio & quarto ordine, quæ sint 120.121	Caput lædentiā alimenta 136
Bilem atram euacuantia 150. & inde. 159. & inde	Calidi temperamenti notæ 216	Capitis doloribus omnibus quæ me- deantur uaria 330.331
Bilem flauam quæ expurgenti 49. & inde. 159. & inde	Calidorum temperamentorum cor- rectionis modus 223	Capitis dolorū distinctiones 325
Bilis expurgatio quomodo confide- randa & facienda 223	Calidi & sicci, itē calidi & humidi te- peramenti notæ quæ sint 217	Capitis doloris ex ardore aut calidi- tate aborti, aut in febribus, siue ex ebrietate aut meri potu, cura- tio 315
Bilis influxu laborantes quomodo medendi 727	Caligo oculi quid, eiusq; cura 373	Capitis perfrigerati cura 326
Bithynus pastillus 878	Callyonimi fel quale 98	Capitis dolori à stomacho, aut ob plagam remedia ibidem
Bituminis electio 118	Callositas palpebrarum quid, eiusq; cura 387	Capiti quæ ex natura dolorem adfe- rant 327
Bituminis qualitas 86.856	Calor duplex 4	Capitis pustularum diuersarum re- media 343.344
Bituminosa balnea quibus conue- niant 186	Caluariæ circuncisionis ratio 409	Capitis scabritiei remedia 345
Bliti qualitas 18	Caluities unde proueniat 334	Capitis ulcuscula parua, densa & ru- bicunda quæ curent 345
Bolæ collyrium 426	Camelinæ carnis qualitas 102	Capitis totius illitionum modus & ratio 411
Bolæ liquida 416	Camelinum lac quale 92	Capitum ex animalibus uis medica 108.109
Bolus Armeniæ cuius facultatis 79	Canani radix qualis 48	Carabi seu locustæ usus 114
Boni succi quæ sint 129	Cancani mammarum quō curadi 980	Carbunculi palpebrarum 377
Borealum uentorum qualitas 181	Cancari qui facile & qui ægrē curen- tur ibidem	& quomodo curetur ibidē. & 378
Brassicæ facultas 44	Cancari chirurgiā 981	Carcinades, qualia animalcula 106
Brassica quomodo preparāda ut aut aluū subducatur aut listat 133.135	Cancari post amputationē & inuisionem curatio 981	Cardamines herbæ proprietates & ex ea sinapisimus qualis 710
Brathy qualis 18	Cancerorum citra chirurgiam sana- tio 982	Cardamines energia 193. 194
Bryon qualis 18		Cardami uirtus 38
Bryon thalassion 19		Carda
Brionia, ampelos leuce 12		

Cardamomum quod optimum	118	Ceratorum diuersorum compo- sitiones	950	accidat, tum quō medenda.	959
Cardamomi uis	38	Cerata podagrica	741	Clauus quid & cur sic dictus, eiusq; remedia	838
Cardiacorū dinotio & remedia	529	Cerati rosacei usus	24	Clematidis qualitas	14
Cardui facultas	64	Cerasi qualitas	40	Cleonis spodiaceum	428
Cares quomodo serum parent	95	Ceratia, Ceratonia	ibidem	Cleopatraz reginae smegma	444
Caricarum uirtus	16.66.67.129	Cerastes & eius plaga qualis & quæ remedia	774	Cleopatraz pastilli ad defluuium ca- pillorum	337
Caries lignorum qualis	63	Cerealiū seminum qualitas	126	Clidion pharmacum	114
Carnem duram habentia quib. cōue- niāt, & quomodo præparāda	133	Cerebri inflammationis affectio & cura	317	Cnici qualitas	42
Carnes quadrupedum qua parte bo- ni succi sint, & qua mali	130	Cerebri erysipelas, eiusq; curatio	318	Cnici seminis efficacia	152
Carnis in magno oculi angulo de- crementum quomodo fiat	407	Cerebri duæ facultates	359	Cnici sylvestris natura	16
Carnis in oculi angulo excrescentis medicamentum	396	Cerebri temperaturarū dinotio	219	Cnide, quæ urtica	10
Carnis animalium præstātia quomo- do exploranda	126	Cerebri membranā glutinantia	328	Cnidij cocci facultas	42
Carnium qualitas	102	Cerebrum palmæ	70	Cnipas quid perimat	79
Carnium iuxta cocturā qualitatem mutari	102	Cerium quid, eiusq; cura	916	Coaguli qualitas	97
Carnium saliarum differentia	108	Ceruinae carnis qualitas	102	Coaguli diuersa efficacia in lacte	789
Carnofitas quomodo liquanda aut subuertenda sit	206	Ceruinarū cornuū uis medica	110	Cocci facultas	48
Caro animalium quomodo dijudi- canda	104	Cerussæ qualitas	90.789.855	Cocci cnidij, item tinctorij facultas	42
Caroi proprietates	38	Cestri uirtus	40	Coccymeles qualitas	42
Caros quid, & quomodo à lethargo differat, eiusq; curatio	297	Chalbana seu galbanum	70	Cochleæ terrestris usus	115
Carpasi succus qualis efficacia	785	Chalcanthus, qualis	90	Cochleæ mucus quid, quomodoq; colligendus, & ad quæ utilis ibi.	620
Carpesij uis	45	Chalcuanthos	90	Coeliaci qui dicantur	620
Carphia, quæ tubercula	50	Chalcos æs ustum	90	Coeliaca affectio quæ proprie dica- tur, qualisq; sit, & eius remedia	589
Carya, nux arbor	38	Chalcitis qualis	88.90.855	Coitus ratio, item commoda & in- commoda	141.142
Caseorum qualitas	96	Chamaecte qualis	11	Coitus mala	314
Caseorum usus in medicamentis	97	Chamaedryos qualitas	70	Coitus potentia indicia	222
Cassie uirtus	38	Chamelæ efficacia	71.153	Coitus impotentia quomodo sane- tur	703
Cassie dinotio	118	Chamaeleuces temperamentū	71	Colicorum affectionis causæ uariæ & remedia uaria	576. usq; 586
Cassij siccum collyrium	416	Chamaeleonis facultas, ib. &	788	Colis resoluti curatio	322
Castaneæ quales	21	Chamaemeli qualitas	14	Colliquatio quid, & quomodo ei medendum	263.594
Castorium, id est, testes castoris	114.	Chamaelinum oleū ibid. &	25	Colla, qualis uirtutis	43
115. quibus sit uirtus, præditū. ibidē		Chamaepitys energia	71.153	Collyriorum aridorum descriptio- nes	412.413.414
Castratio, ppter elephantiasim	812	Characias quid, & eius usus	68	Collyriorum liquidorum compo- sitiones	415. & inde
Catalepsis quid, eiusq; cura	297	Charatilagineorū pisciū qualitas	108	Collyrium siccum Cassij	416
Cataplasmatum uariorum compo- sitiones	159.190	Chelidonij utriusq; facultas	72	Collyria ex croco & ex succis diuer- sa	418
Cataplasmatum usus	188.189	Chersydri serpentis malitia	776	Collyria monohemera	419
Catarrhi remedia	494	Chezananze epithema, quale	170	Contusorum medelæ	897
Catheter, instrumentum quo urina prolicitur	322	Chiaca collyria	429	Coquere bis aliquid, quomodo cō- ueniat	134
Catocha qd, & quomodo curet	297	Chiaæ terræ efficacia	79	Collyrium monomelum	ibidem
Causus febris cur dicta	240	Choeradolethron, quale	55	Collyriorum sistentium descriptio	420. & inde
Causos quomodo differat ab exqui- sita tertiana 253. item quomodo differat à cōtinēte putrida, tū, quæ sint eius notæ & remedia	ibidē	Chiliodynami uirtus	60	Colloriorū leniū compositio	423
Caucalis qualitas	48	Cholera quid, causæ eius & reme- dia	544	Collyriorū cygni, libianorum, spo- diacorum & tephricorum ratio & compositio	426.427
Caudæ muliebris resectio	922	Chondrilla species seridis	63	Collyria ex rosis uiridibus & al- bis	428
Cedri utriusq; facultas	39	Chryfocolla	90	Collyria diasmyrna & chiaca dicta,	429
Cedrix uirtus	ibidem	Chryselestri energia	84	Collyria ad aspritudines & exterso- ria	431
Cedrolei uis	ibidem	Cibi quando febricitantibus porri- gendi	250	Collyrium pressum	433
Cedrides fructus cedri	39	Ciborum qui optimi	125.126	Collyria enstacta, id est, instillatitia appellata	435
Cele uocatur omnis tumor	912	Ciborum uarietas uitanda	ibidem	Collyria ex cornu cerui	435
Cenchrias quale animal, & quā no- xius eius morsus	773	Ciborum qualitates	125	Collyria nardina & theodotia	436
Cenchrites & eius plaga qualis, tum quæ eius curatio	774	Ciborum quid	41	Colocasij qualitas	42
Cenchros, milium	39	Cicada ad quid commoda	117	Colocynthidis energia	43.151
Centaureæ maioris uirtus	39	Cicatrice quæ simplicia inducant	124	Coloris consideratio	8
Centaureæ minoris facultas	40	Cicatricibus inalbadis remedia	248	Columbas quibus edere liceat	126
Ceparum qualitas	46	Cicatricibus nigris ex ulceribus re- lictis remedia	825	Columbini sanguinis utilitas	91
Cephalæa quid, & qualis affectio, eiusq; uarietatis dinotio, tum cu- ra	327.328.329	Cicatricem pulneribus inducentia	1017	Columbini stercoris qualitas	100
Cephalicorum emplastrorum com- positio & usus	922	Cicerbitæ uis	65	Columellæ affectæ ablatio quomo- do fiat	475
Cephalicorum medicamentorū sic- corum ad repurgandum & incar- nandum confectio	866	Cicerulæ quales	48	Colymbades qua uirtute	21
Cephalus piscis qualis	106	Ciceris natura	32	Colymbadum oliuarum muria ad quid utilis	108
Cera quæ præstantior	118	Cichorij uirtus	63		
Ceræ facultas	41.87.856	Cici, arbor	22		
Cerebri animalium qualitas	103.104	Cicis, id est, galla qualis	41		
		Cicinum oleum	22		
		Cicis arboris fructus qualis	41		
		Cicutæ efficacia	48.785		
		Cimices prohibentia	778		
		Cimolæ terræ facultas	79		
		Cineris in genere uis	68.856		
		Cessos, hederæ	42		
		Cisthos siue Cistharus	41		
		Cisthus siue Ladanum	42		
		Citreæ malus & citreum	53		
		Citra prægnantium quid, unde di- cta, quor & quando mulieribus			

ARTII INDEX.

Coma quid, eiusq; cura	278	Coriandri efficacia	43.785	Cymini facultas	47
Comarus arbutus	43	Corianum seu corion, quale	43	Cynoglossæ facultas	49
Comes uiz, collyrium	410	Coria animalium ad qd cōducāt	110	Cynos orchis	16
Comitialium auxilia uaria	310	Corij fomentatio quō fiat	143	Cyparissi usus	47
Comitialis ex stomacho primario		Corion, qualis affectio	343	Cyperī facultas	47
affecta aut ex aliqua parte, quo-		Corniformē oculi tunicam ex qua-		Cyperī radice exploratio	119
modo curentur	311	tuor constare corpuseulis	375	Cyprinum oleum	27
Comitialibus puerorū & senū quæ		Cornuū ex animalib. uis medica	110	Cyphi duplex	808.809
cura conueniat	ibidem	Coronæ ortus, occasusq;	182	Cypheos confectio	801
Comitialium qui curabiles & qui		Coronopodij usus	43	Cyri archiatri Edeffæ pastillus ad	
incurabiles	312	Corpora ex quibus causis induren-		ozenas	314
Comitialē morbum quæ arguāt	309	tur	123	Cyriacus pastillus	877
Comitiales collabentes quibus exci-		Corporum quæ sit præstantissima		Cytinus quid, & eius facultas	17
tentur	ibidem	constitutio	196	Cytisi uis	48
Comitialis morbi differentie tres		Corpus odorum reddentia	441		
308. item cura	309	Corroborantia simplicia quæ	123	D	
Comitialis morbi puerorum reme-		Corrodentia simplicia quæ	124	D Amasonij facultas	20
dium	19	Corrosiua medicamenta	882	Daphnes facultas	20
Comitialis morbi præseruatiua	313	Corruptu facilia aut difficilia alimē		Dauci qualitas	65
Comm, gummi	43	ta	133	Dauci species & facultates	20
Commorosos à canerabioso quomo-		Corydalis ad quid utilis	115	Dauci syluestris uis	ibidem
do deprehendas sanatos esse	316	Costi dinotio & species	118	Decamœron unguentum	745
Commororum à rabioso canē affe-		Costi facultas	43	Declinatio morbi quid	231
ctio & cura	314.315.316	Cotyledonis qualitas	44	Declinationis totius morbi cogni-	
Complexio, uide Temperamentum		Crambes utriusq; facultas	44	tio	231
Compositis medicamentis quando		Crapula quid, eiusq; remedia	562	Declinatio quorundam morborum	
utendum	254	Crapulæ quæ cura conueniat	215	non potest cognosci	ibidem
Compositorum mendicamentorum		Craffarū partiū simplicia quæ	122	Defluuium capillorum, qualis affe-	
quæ causæ	853	Craffefacientium & attenuantium		ctio, & unde generetur, eiusq; cu	
Conceptionem impredientium di-		quæ sint media	127	ra	336
uersarum affectionū curatio	973.	Craffi succi alimenta quæ	127	Defluuij pilorū species & curæ	364.
974.975		Craffo uictu qui uti possint citra di		403	
Conceptus tempus homini, quod		scrimen	ibidem	Deglutitionis resolutæ cura	322
fit	959	Craffi succi alimenta quæ sint ibidē		Deglutiti metalli aut talis cuiuspiā	
Conceptus indicia	958.959	Cretæ usus	79	rei remedia	609
Concipiente muliere quæ in utero		Cretmon, quale	44	Delicatum collyrium	428
eius nascantur	956	Crimnon quid	45	Deliquijs animi, uide Animo linqui	
Concipientibus ægre aut non secu-		Crini facultas	45	Delphini ortus & occasus	182.183
re, quomodo auxiliandum	961	Crithæ, ordeum	ibidem	Delyrij causæ & medela	312
Conchiliorum testarū qualitas	856	Croci uis	45	Delyrij & fatuitatis differētia	ibidē
Concoctio quid	556	Croci exploratio	118.879	Dendromalache qualis	51
Concoctionis auxilia 557. & dein-		Crocodilij qualitas	45	Dēfantia cutē simplicia quæ	124
cept		Crocomagmatis preparatio	118	Densitas & aspritudo palpebrarum	
Concoctionis signa semper esse bo		Crocomagmatis ad capitis dolores		differunt	387
na	230	preparatio	330	Dentes duabus contrarijs affectioni	
Concoctoria simplicia quæ	123	Crommion, cepa	46	bus esse obnoxios	457
Concoctu facilia aut difficilia quæ		Croton, arboris fructus	22.41	Dentiū affectionibus remedia	457
sint	130	Crudi humores quales sint	211	Dentium ex caliditate, frigiditate,	
Conditorum uariorum præparatio		Crudi humoris generatiua quæ sint		humiditateue affectorum reme-	
1025.1027		127		dia	461.462.463
Conditorum ad flauam bilem, ad pi		Crudititas quid, & unde, eiusq; reme-		Dentium à siccitate, nem caliditate	
tuitosos, ad melancholicos descri		dia 556. & inde		& humiditate simul affectorum	
ptio	155	Crudititas quomodo curanda	215	medicinæ	465.466
Condyloma uteri quid, & quæ eius		Cruris aut alterius cuiusdam mem-		Dentium erosorum curatio	466
medelæ	1023	bri resolutio	323	Dentes quō lima atterendi	465
Condylomatum medelæ	614.616	Crustam inducentia 875. & inde		Dens ut citra dolorem & absq; fer-	
Coni fructus qualis	48	Crustam inurentia	879	ro extrahatur	468
Conia stacte, qualis	43	Crustuminati præparatio	290	Dentiū denigratorum, liuentium &	
Conij summa frigiditas	48	Cucumis syluestris	64	rarefactorum smegmata	469
Conizæ utriusq; facultas	43	Cucumeris syluestris energia	152	Dentitio puerorū quomodo iuuan	
Cōstitutio corporis optima quæ	196	Cucumerum facultas	63	da, & quando incipiat	199
Cōstitutionis optimæ quæ nota	203	Cucurbitæ uis	43.189	Desquamata quæ dicantur, & quo-	
Cōstitutioes corporis uitiosæ dupli		Cucurbitularum quis usus	147	modo curentur	896
ces	216	Culicum ictus curatio	778	Destillationis remedia	495
Conuulsio cur comitalem morbū		Cuminati præparatio	1028	Diabete quid & eius cura	665
sequatur 308. & quomodo cure-		Cupholithos lapis	89	Diacenteton collyrium	435
tur	309	Cupressi uirtus	47	Diacodiō cōpositio 263. & usus	287
Conuulsionis caninæ curatio	321	Corari recte morbum non posse ci-		Diacodion, non consequenter exhi	
Cōuulsionū aut distētionū originis		tra eius prænotionem	228	bendum, & cur	301
dinotio & nomina, tum cura	323	Currus collyria	452	Diaria febris quæ & quō fiat	243
Conuulsionū in febribus cura	286.	Cutem quæ densent	244	Diariarum febrium tractatio	243.
& unde causentur	ibidem	Cutis densatæ curatio, & unde den-		usq; 248	
Continens febris quæ	247	setur cutis	213	Diaphanes, lapis specularis	87
Cōtusio unde fiat	273	Cyamos, faba	46	Diasmyrna collyria	429
Corax pastillus	877	Cyani efficacia	87	Dictamni qualitas	20 (234
Cordis animalium qualitas	103	Cyclami qualitas	46.153	Dies iudicatorij boni aut mali qui	
Cordis mortificationem quæ denu		Cydonati præparatio	290	Dici qua æger est moriturus præno	
ciant	229	Cygni pullus, ad quid utilis	115	tio	242
Cordis temperaturas quomodo di-		Cygni seu cygnaria collyria quæ di		Dies prima morbi quæ dicatur siue	
noscas	221	cantur 424. & qualia 426		principium	229
Cordis tremor, qualis affectio	506	Cygnus reginæ, collyrium	425	Diebus singulis differentias aëris	

AETII INDEX.

Dionis collyrium	375
Dionysia emplastrum	933. & 945
Dionysus collyrium	430
Diospolitici pharmaci compositio duplex	559
Diphrygis conditio	87. 855
Dipsacos, qualis	20
Dipsas quid, ac eius morsus auxilia	772
Discussoria simplicia quæ	124
Discurientia quæ	328. 353
Discussoriorum emplastrorum compositio	942. 943
Distentionum uide Conuulsionum	
Distichiasis quid	397
Diuites in plenitudinis morbis peius curari quàm pauperes	188
Diuitum peruersum iudicium ibid.	
Duritiei in artubus cura	749
Dolichi quales	20
Dolere quomodo possint ægroti, nullo forinsecus accedente quod dolorem causetur	273
Dolor quid	273
Dolorum iuxta situm causæ & differentiæ	273. 274
Dorcadias herba, alio nomine Muscium	354
Dorycnion quale	20. 784
Dracones quales & ubi, & quæ ab eis noxa	776
Draconis marini usus	112
Draconis marini plagæ medela	777
Dracontij qualitas & usus	15. 21
Dracontij sanguis	413
Dracunculus quid, & quomodo auferatur	904
Dropacis usus & compositio uaria	191
Drupæ oliuæ quales	21
Dryinus serpens & eius plaga qualis, quomodoq; curètur	774. 775
Dryos qualitas	21
Dulce ulcus, quod aliàs Meliceris dicitur	202
Dulcis sapor qui	2. 4. 5. 6
Dulcium & acerborum natura	6
Dulcis uocata compositio	541
Dulcia sitim inducere	134
Dulciū usus q̄s in cibis & potib.	127
Durities quibus de causis corporibus accidat	123
Dysentericæ ortus & curatio	599
item 603. & 607. & inde usq; 618	
Dystros, mensis Martius	181
Dysurias in febribus curatio	281
Dysuria quid & eius medicamenta	684. 685
Dysuricæ in febribus remedia	685

E

E Beni facultas	21
Ebiscus qualis	21
Ebrietatem quæ arceant	326
Ebrietatem quæ restinguant	ibid.
Ebrietas, epithema	311
Ebuli facultas	11
Echini marini usus	108
Ectropij qui dicantur	364
Eczerata quæ pustulæ, & quæ eorum remedia	824
Edeffenum collyrium	420
Eduiorum quæ optima	126
Edysari uirtus	33 (238. 239)
Egestionum notæ ac iudicationes	
Elæa & elæon quali facultate sint	21. 22
Elaphobosci facultas	31
Elate, palmæ germen	70
Elaterij temperamentum	64
Elaterij facultas	152
Electri uis medica	84
Elenium siue Helenium	31

Elelisphacos qualis	31
Ellebori qualitas	31
Ellebori utriusque dinotio	118
Elephantiacus quomodo inopinato curatus	113
Elephantiasis qd, & cur sic dicta	810.
eius remedia	811. usque 820
Elephantinum emplastrum	930
Elxines facultas	31
Elymos qualis	32
Emerocallis, uel Hemerocallis	33
Eminentiarum repressiua simplicia quæ	124
Eminentij corporis tumentibus illationes	814
Emollientium emplastrorum compositio & usus	927. & inde
Empetri seu Epipetri uires	32
Emplastica quæ dicantur	2
Emplastrum ex aspidibus	940
Emplastrorum uariorum præparatio & coctura, tum quæ in ipsa conijciuntur	853
Emplastrorum diuersorum & plurimorum, uarijque usus descriptio	916. usque 952
Emprossthotonus quid	223
Encanthus quid, curatioq; ipsi	396
Encauma quid, & eius curatio	373
Enneapharmacum	947
Enneapharmacus pessus	1010
Ephemeris efficacia	784
Ephestias emplastrum	83
Ephialtiæ usus	19
Epicauma oculi qd, ei curatio	373
Epinyctides quid & quomodo medendæ	894
Epithemata quæ post euacuatos corporis humores pro glutino sunt	655
Epithematum purgatoriorum compositiones uariæ	170. 171
Epithematum ad capitis dolorem compositio	331
Epithymbro flos eiusq; facultas	150
Epithymi facultas	32. 150
Equi ortus in cælo	181
Equinæ carnis qualitas	102
Equinum lac quale	92
Equiseti facultas	35
Equitationis modus & usus	141
Erasistrati panchrestos liquida compositio	416
Erebinthi qualitas	32
Ericerum acharistum, collyriū	423
Ericera etiam alia	ibidem
Erigeron quali ui	33
Erosio unde fiat	273
Erypylos siue Herpylos	32
Eruca uis	32
Eruca pinus potata qualem dolorem inferat	782
Eruici efficacia	56
Eringij qualitas	34
Erysimi qualitas	32
Erysipelas quis morbus	262
Erysipelatis ortus & species quot, earumq; medicamina	892. 893
Erysipelas cerebri	318
Erythrodani uirtus	32
Eldræ antidoti confectio	802
Essentia, emplastrum	928. 952
Ebrietas, emplastrum	928
Euacuare per ferū quō deceat	95
Euacuatione q̄ op ^o habet, neq; tamē euacuatia ferūt, quō sanandi	272
Euacuationis quæ sit mensura	145
Euacuationum localium tractatio	172. & deinceps
Euphorbij energia	153
Euphorbium quod melius	118

Eutonum collyrium	432
Exacerbatio quid	230
Exacerbationis particularis & universalis quatuor tēporum, id est, principij, augmenti, uigoris ac declinationis signa	230. 231
Exedentia medicamenta	882
Exercitata omnia in exercitatis meliora	126
Exercitatio qd, eiusq; usus	138. 139
Exercitationum species	139
Exhalationum terræ ratio	187
Experientiæ certitudo	8
Extorsoria quæ sint	123. 383
Extergentia alimenta	132
Extremæ partes animalium quæ dicantur, earumq; facultas	102. 103
Extremitatum ulcera ac callos quomodo sanes	875
Exulcerantia simplicia	124
Euchrun collyrium	418
Eupatorij uis	33
Euphorbij qualitas	33
Euzomon quali uirtute	32

F

F Abz facultas	46
Facies ne à sole aut uento exuratur quomodo illinenda	442. 443
Faciei rugæ & nigredo quomodo præcaueantur aut tollantur	443
Faciem nitidam reddentia smegmata	443. 444
Faciei lentigines, maculas solares & uaros sanantia	446
Faciei ficosis tumoribus quomodo medearis	450
Fagi facultas	21
Farinæ crassioris usus	45
Farris præparatio	604
Far clusinum quod	ibidem
Fatuitas quid	312
Fatuitatis origo & cura	312
Fatuitas quo differat à delyrio	ibi.
Fauonij flatus quando	182
Fauus quid, eiusq; cura	343. 916
Febris quid	230
Febris continens quæ sit, & quibus peculiaris	247. 248
Febris cōtinētis differētiz tres	248
Febris epiala quæ & cur sic dicta	261
Febris lipyria quæ	262
Febris tertiana qbus familiarior	255
Febris tertianæ rigor quo differat à quartanæ rigore	ibidem
Febris tertianæ exquisitæ dinotio & quæ ita nominetur	ibidem
Febris tertiana extenta, item tertiana dupla quæ dicatur	ibidem
Febris tertianæ exquisitæ & spurie generatio & curatio, item semitertianæ	256
Febrium diuisio	243
Febriū genera & causæ describuntur, tū dicitur & remedia	243. usq; 273
Febrium cognitio & curatio	227
Febris putrida in quibus maximè locis generet, & quas ob causas	251
Febrium putridarum septem iudicationes	251
Febris hecticæ descriptio	266. & curatio
Febris quartanæ dinotio	257. quibusq; familiaris, & quōd hominē nō plus quàm semel capiat ibidē.
item curatio	258
Febris ardens quibus notis differat ab exquisita tertiana & continente putrida	253
Febris quotidianæ dinotio	260. itē curatio
Fellis, id est, flauæ bilis conditio	97

X

4

Feras

AETII INDEX

Исправ

Heptapharmacum 247
 Hepsema, siræum, sapa, idem 4
 Heracii lapidis facultas 83
 Herbarum fabinarum facultas 18
 Herbarum lanarum efficacia 65
 Herinacei marini caro qualis 108
 Herinacei marini usus 113
 Herinacei item terrestres ibidem
 Hermolaus parvus & Hermolaus magnus, collyria 422
 Hermonis emplastrum uiride 917
 Hernia aquosa quid & quomodo generetur, ac curetur 849.850
 Hernie menstruorum cura 851.852
 Hernie inguinis ibidem
 Hernia aquosa mulieribus ubi accidat, qualis sit, & quomodo medendum ei 1021
 Hernie inguinis muliebris medicamina ibidem
 Hernie uaricosæ in mulieris pudendis curatio ibidem
 Herpes quid, & quot eius species, item quæ curatio 893
 Hieræ Rufi præstantia 313
 Hierarum uariarum iuxta suos auctores compositio 163.164.165
 Hieracitis lapidis energia 83
 Hippocamporum marinorum usus 113
 Hippocrates quomodo aërem purgarit Athenis tempore pestis 269
 Hippofelini potentia 65
 Hippuris quæ uirtute 35
 Hirca adeps qualis 3
 Hircinæ carnis qualitas 102
 Hircinæ medullæ qualitas 109
 Hircini sanguinis uirtus 91.675
 Hircinum seuum quale 109
 Hirudinum deuoratarum noxa quæ 383
 Hirundines quando apparere incipiunt 182
 Hirudinum usus medicus 117
 Hispidi pueri quomodo curandi 103
 Hoedi sanguis ad quid conferat 91
 Hoedorum seuum quale 109
 Hoedorum carnis qualitas 102
 Hoedorum ortus & occasus 182
 Holoschoeni constitutio 67
 Hominis ætati cuique quid exercitij conueniat 103
 Homo, ceratum 950
 Humanum stercore quale 99
 Humectantia alimenta 135
 Humectantium secundæ ordinis enumeratione 122
 Humectationum ratio 188
 Humectationis & irrigationis differentia ibidem
 Humidissimos, diutissime uiuere 224
 Humidæ temperaturæ præstantia ibidem
 Humiditatem ex ore quæ trahant 173.332
 Humor melancholicus, frigidus & siccus 304
 Humoris, atrabiliarij, biliosi, crudij, frigidi generatiua quæ sint 128
 Humorem euacuantia, & post euacuatos humores adhibenda maglamenta & epithemata 655
 Humores cur non excidant extra uasa in febribus continuis 250
 Humoribus euacuatis cura quæ conueniat 659
 Humor in podagricis dinotio 718.719.720
 Humor in uentris amplitudine & in uentris tunicis sitorum differentia 220

Humor omnium in corpore æqualiter redundantium purgatorij compositio 160
 Humor permixtorum curatio 735.736
 Humor à capite in uentrem destillantium remedia 547
 Hyacinthi temperamentum 69
 Hyadii ortus occasusque 182
 Hyæna tota cocta quid proficiat 111
 Hyæne fel quale 98
 Hyæne pellis usus 111
 Hyæne uirtus 117
 Hyderus quid, & eius remedia 665
 Hydna, tubera 69
 Hydrocephala affectio quæ, & unde dicta, eiusque generatio 291.292
 Hydromeli præparatio 289
 Hydropiperis facultas 69
 Hydrops pro diabete 665
 Hydrops quid, eiusque differentia, & causæ 650. tum remedia 651. 652.653.654.655.656.657
 Hydropsis subtercutis cura 660
 Hydrosati præparatio 288
 Hydrus qui & natrix 776
 Hygidiu nardinum collyrium 437
 Hygieni aureum collyrium 435
 Hyoscyami qualitas 69.786
 Hyoscyami dinotio 119
 Hyperici efficacia 69
 Hypnon quale 19
 Hypnophori solani uis 69
 Hypocistis quali facultate 41
 Hypophthalmium quid 441
 Hypopia quid, & cur sic dicta 441
 Hypopiorum curationes ibid.
 Hypopspatissimus quid, eiusque usus 409
 Hyscas quid 408
 Hyslopi temperamentum 69
 Hystera cur uterus dicatur 955

I
 Asme uel lasmolæum 26
 Iasmolæon 26
 Iaspachates lapis qualis 84
 Iaspidis uiridis usus 552
 Iaspidis uiridis proprietates 84
 Iaspidis subuirdis ibidem
 Iberidis herbarum descriptio, uires & sinapis eius 193.710
 Icterus quid 645
 Icterus quid, unde dicatur & oriatur 645. eiusque cura 646
 Iecoris animalium qualitas 103
 Iectur sycotum seu ficatum 103
 Iecinoris debilitas, affectionesque & cura 620. uide Hepatis
 Ignis sacer, erysipelas 692
 Illicis qualitas 21
 Illitiones ad tumentes corporis partes 814
 Illitiones oculorum uariæ 412
 Illitiones præseruatiuæ aduersus febras 763
 Illitionum stomaticarum confectioes 477
 Illitionum omnium stomaticarum usus doctrina summaria 478
 Imber & uentus quando simul fiant 180
 Imbrium generatio 180
 Impetiginis equorum utilitas 110
 Impetiginosis corporis tumoribus remedia 451
 Incubus quid, eiusque curatio 308
 Indarium collyrium 437
 Indicum regium collyrium 434
 Indici lapidis energia 83
 Indurantia simplicia quæ 123

Infantes stertentes quomodo medendi 199
 Infantium uox intercepta quomodo restituatur 196
 Infantium deditio, inflammationes oculorum, albugines, aurium inflammationes, & sirialis quomodo curentur 199.200
 Infantes quando ab lactandi 203. & quomodo post ab lactationem pascendi ibidem
 Infantis recens nati sanitas quomodo cognoscatur, item eius educatio qualis sit 196
 Infantibus spinas aut festucas deuoratas quomodo eximas 200
 Infantium sternutationes & grauedines, tusses, profluvia, alui suppressa ac pustulæ quomodo curanda ibidem. & 202
 Inflammata triplicem sanationem habent 209
 Inflammatio cerebri 317
 Inflammationis cuiuscunque remedia 862
 Inflammationis oculorum cura 365
 Inflammationibus incipientibus, quomodo uenæ sectio debeat fieri 145
 Inflammationibus non ualde fruentibus remedia parabilia 732
 Inflammationum podagricarum causæ quæ 718
 Inflationis cura 817
 Inflationis uentris causæ & remedia 565
 Infusionum sedis ratio 177
 Inguini inflammato quæ cura conueniat 245
 Infantiæ origo & indicia 299
 Infantiæ species infinitæ 300. & quomodo curanda ibidem
 Infania lupina seu canina qualis, eiusque indicia & remedia 307
 Infectionum ratio 187.188
 Infectionis in solium ex oleo ratio 187
 Insolationis modus & utilitas 143
 Instrumenti uocalis resolutio quomodo curanda 322
 Intemperaturæ ex morbo conflata differunt à naturalibus 219
 Intemperaturam aliquā diutius perseuerare impossibile 216
 Intertriginis inter femora exortæ curationes 844
 Intertriginum medelæ 896
 Intervallum morbi 230
 Intestina terræ quid 193
 Intestina tenuia quæ euacuent 174
 Intestini recti resoluti curatio 323
 Intestinorum ex animalibus qualitates 103
 Intestinorum abscessus unde proueniat, & quomodo curetur 598
 Intestinorum tormina, id est, dysentericæ, quomodo oriuntur & medeantur 599.603.609. & inde usque 618
 Intestinorum leuor, id est, lenteria quid, & quomodo curetur 618
 Intyborum facultas 35
 Ion, id est, uiola, qualis 35
 Ios xystos qualis 87
 Ionthi, id est, uari faciei quomodo curandi 449
 Iordanes fluuius 7
 Irinum oleum 28
 Irionis facultas 32
 Irrigationum ratio 187
 Irrigationis & humectationis differentia 187
 Iliatus

Isatis utraq; qua ui prædita 36
 Ischiadici qui dicantur, & quomo-
 do ipsorum morbus oriatur acun-
 de 707
 Ischiadicorum auxilia 708. usque 717
 Ischiadic. uisionis modus 710
 Isidori Memphitæ collyrium 433
 Isij uirtus 152
 Isis, uiride emplastrum Hermonis
 917
 Isophoton collyrium 429
 Isotheon collyrium 429
 Isij quali uirtute 35
 Ischuria quid, & eius auxilia 686
 Itea, salix quali uirtute 36
 Iudæi emplastrum 935
 Iudaicus lapis qualis 81
 Iudicationis morbi modus & signa
 232. & deinceps
 Iudicationis euctus quomodo præ-
 noscendus 232
 Iudicatorij dies qui boni & qui ma-
 li 233
 Iulides pisces quales 107
 Iunci acuti qualitas 67
 Iunci leuis temperamentum ibidem
 Iunci odorati facultas 47
 Iunci rotundi qualis flos 67
 Iuniperi uirtus 15
 Izæz efficacia 787
L
 Labiorum fissuris remedia 456
 Labrum ueneris quale 20
 Lac optimum quod 128. 129
 Lac cur febricitantibus nociuū 131
 Lac generantia ac mouentia 173
 Lac uitiatū quomodo mamas lædat,
 & quomodo curandum 977
 Lac ad quid utile 92. 93
 Lac quibus conueniat 93. quibus
 non 94
 Lactis utendi ratio 93
 Lactis coctura 94. 96
 Lactis serum quale 94
 Lactis acidi qualitas 96
 Lactis concreti conditio ibidem
 Lac primarium quod 96
 Lac pyriaton uel pyriephthon quod
 ibidem
 Lactis nutritis probatio 197
 Lactis usus & differentie uariæ 92. 93
 Lactis coagulati mala, eorumque re-
 media 789
 Lactis defectui quomodo succur-
 rendum 976
 Lac in mammis ne grumescat ibidē
 Lacti in mammis coagulato quomo-
 do medendum ibidem
 Lactis purgatorij compositio 158
 Lacti quæ in coctione admiscet 96
 Lacti nutriti deficienti, aut tenui,
 seu crassiori facto, quomodo me-
 dendum 198
 Lactis item alijs uitij ibidem
 Lactucæ facultas 34
 Lagophthalmi qui, & eorum medi-
 camenta 363. 367
 Lanæ lotæ, puræ, succidæ, & usæ
 quis usus & quō uenda sit 110
 Lapathi uis 48
 Lapis Phrygius 82
 Lapidum uariarum nomina & faculta-
 tes medicæ 80. 81. 82. 83. 84. 85
 De lapidibus omnibus generalis do-
 ctina 80
 Lapidēs qui emplastris immittan-
 tur 856
 Lapidis specularis uirtus 87
 Lapidis qui nec atteri nec excerni
 potest curatio 679
 Lapidibus exectis quæ dicta conue-

niat ægroto ibidem & 680
 Lapidēs ne aut nascantur, aut rena-
 scantur, dicta 671
 Lapidēs. uide Calculos
 Lappæ qualitas 55
 Lapsanæ qualitas 48
 Lapsorum ex alto remedia 790
 Laser qualis facultatis 56
 Lascitudinum uariæ species, & ua-
 riæ curationes 207. 208. 209. 210.
 211. 212
 Lascitudinum spontanearum spe-
 cies tres 210
 Lauri facultas 20
 Laurinum oleum 23
 Lathyri & Lathyrus qualis 48. 152
 Leæna emplastrum 713
 Lenis facultatis quæ sint 423. 424
 Leoninum senum 109
 Leonis stella illustris quando occi-
 dat 182
 Leontiasis quid, & cur sic dicta, ac cu-
 ra ipsius 810. 811
 Leontopetali qualitas 49
 Leontopodij uirtus 49
 Lens stagnorum seu palustris cuius
 qualitas 70
 Lentēs qua facultate 69
 Lenticulæ coctura qualis 134
 Lentiginibus faciei medentia 446
 Lentisci temperamentum 67
 Lenticinum oleum 23
 Lepidij qualitas 49. 193
 Lepis duplex, & qualis 87
 Leporis capitis uis medica 110
 Leporinæ carnis qualitas 102
 Leporini coaguli præstantia 97
 Lepus marinus qualis & quā uen-
 enatus 792
 Lepra quo differat ab alphi, leu-
 ce, scabie & impetigine syluestri
 829. 830
 Lepræ remedia plurima 829. 830
 Lepræ generatio 829
 Lethargus unde causetur 295. quæ
 habeat accidentia, & quomodo
 curandus 295. 296
 Lethargus & caros quomodo dif-
 ferant 298
 Leucacanthæ facultas 11
 Leucanthemi facultas 150
 Leuce, populus alba 49
 Leuce quid, & unde, ac cur sic dicta,
 eiusque medelæ 827. 828
 Leuce quomodo differat à lepra &
 ab alphi 830
 Leucographis lapis 77. 81
 Leucophyllon unguentum 1026
 Leucorij uirtus 49
 Libanoti qualitas 49
 Libanoti fuligo qualis 49
 Libanotidis temperamentum 50
 Libidinis extinctæ prouocamenta
 703
 Libræ in suas partes diuisio 1030
 Libyana collyria quæ dicantur 424.
 & qualia 426
 Lichen seu muscus petrarum 49
 Lichen morbus, sui nominis herba
 curatur ibidem
 Lienis affectionum cognitio 631
 Lienis animalium qualitas 103
 Lienis intemperierum cura 632.
 inflationis 633. & inde
 Lienosorum uisio & dicta, tum iu-
 xta morbi uarietatem curationes
 643. 644. 645
 Lienteria quid, & quomodo curan-
 da 618
 Ligamentorum induratorum me-
 delæ 909

Lignorum cariei aut putredinis u-
 sus 62
 Lignos facultas 50
 Ligustici usus 50
 Ligustri qualitas 47
 Lilij temperamentum 45
 Liliaceum oleum 25
 Limniscorum usus 293
 Linguae asperitas quomodo curan-
 da sit 278
 Lingua principium & finis intera-
 neorum est 279
 Linguae inflammatae, desquamatae &
 tumentis remedia 471
 Linguae resolutæ curatio 321
 Lini seminis uis 50
 Linozostis qualis 50
 Lini seminis oleum 22
 Lipothymia quid, eiusq; causæ 274
 & quomodo differat à syncope
 ibidem
 Lippitudinis in febrib; curatio 280
 Lippitudinis species & curatio 401
 Lipyria febris quæ 262
 Liquefieri quid 75
 Liquidorum collyriorum descriptio-
 nes 415. & inde
 Litri spumæ qualitas 86. 88
 Lixiuij facultas 43
 Lobi quales 20
 Loculus, uide Secundæ
 Locustæ usus in medicina 114
 Localium euacuationum tractatio
 172. & inde
 Lolij uirtus 10
 Lonchitis ad quid conducatur 50
 Lopima, castanæ 21
 Loquentium difficulter affectio du-
 plex, item quæ remedia ipsis con-
 ueniant 470
 Loti arboris qualitas 51
 Loti herbæ facultas 51
 Lucernarum oleum 22
 Lucij malagma ad articulos distor-
 tos 737
 Lumborum doloris curatio 282
 Lumbricorum generatio, diuersi-
 tas & remedia 194
 Lumbricus latus quid, unde gene-
 retur & curetur 197
 Lumbricos educentia 176. 179
 Luna secundum mensem quatuor
 differentias in aëre operatur 180
 Lupi piscis qualitas 106
 Lupini qualitas 34
 Lupinus erraticus 34
 Lupini stercoris qualitas 100
 Lupinus morbus qualis 307
 Luxatorum membrorum curatio 897
 Lycij descriptio 50
 Lycopsos, Anchusæ species 9
 Lycos, pastillus 614
 Lymonij uires 49
 Lyncurij facultas 84
 Lyræ ortus, occasusq; 182
 Lysimachium quæ 51
 Lythargyri uis 88

M
 Acer quid & qualis 51
 Macies & tabes oculorum quid
 & quomodo differant, curen-
 turq; 393
 Maculis solarib; cōmoda 406. 407
 Madarosis quid 364. 368
 Madefieri quid 75
 Mænularum murisæ usus 108
 Mænularum caput quæ uirtus
 109. 116
 Magnetis lapidis efficacia 83
 Magos emplastrum 83. 655
 Magnum collyrium 428
 Malaba

AETII INDEX.

Malabathri folium quale 11
Malabathri foliū qd̄ præstatius 119
Malabathrinum oleum 30
Malaches uirtus 51
Malagmata humorē euacuātia 655
Mali Armeniacæ qualitas 53
Mali Medicæ facultas ibidem
Mali nauis occasus 182
Mali punici qualitas 62
Mali persicæ proprietates 53
Malorum in genere tractatio 53
Malux efficacia 51
Malux sylvestris energia 153
Malua sylvestris, ebiscus 21
Malus habitus corporis quid, eius
que indicia & remedia, tum in
quos morbus transeat 649
Mammis ob lactis abundantia tur-
gētibus quomodo auxiliādū 976
Mammarum inflammatarum reme-
dia 977
Mammarum inflammationum in-
duratarum medicinae ibidem
Mammarum abscessuum, fistularū,
ulcerum depascentium, ac cæcro-
rum curæ 979-980
Māmarū induratarū medela 983
Mandragoræ uis 786
Manna quid, & quomodo differat
à thure 383
Manus emplastrum 948
Manizanon, colocasion 42
Marasimus quid 267
Marathri facultas 51
Marciaton unguentum 744
Mare mortuum 7
Marrubij uires 60
Masculo gignēdo quid agēdū 976
Mastichati præparatio 1028
Mastiche duplex & qualis 52
Mastiche, lentisci resina 173
Mastiche, resinarū præstatissima 61
Mastichinum oleum 26
Masuaphij confectio 809
Matrix. uide Vterus
Maza quid 45 (tate 45)
Maturitas fructuum ex solis calidi-
Meconis natura 52
Meconis ceratitidis qualitas 53
Meconium quid 197
Media quæ sint in quatuor qualita-
tibus 120.122
Medica siue citrea malus qua-
lis 53
Medicamentorū quæ sint qualita-
tes ex uirtute simplicium 125. & ide
Medicamenta purgantia componē-
di methodus 153
Medicamenti ex papaueris capiti-
bus præparatio & usus 286
Medicamentorū electio, quæ tradit
quæ sint præstantiora 117. & inde
Medicamentorum qualitatū or-
dines quatuor 1
Medicamentorum diuisio, & qua-
litates 3
Medicinæ practicæ duæ partes ma-
ximæ quæ 195
Medicini, naturæ operum esse gna-
tum debere 227
Medullæ usus ex animalibus 109
Medullarū differētia efficaciaq; 109
Medullarum quæ optima 119
Megaleum oleum 27
Meiradicum usus 54
Melamphylli facultas 11
Melan quale 88
Melancholiæ generatio & uarietas,
indiciaque 302-303
Melancholiæ species quot 303. eius
quæ sit cura ibid. & 304-305-306

Melancholici qui dicantur 364
Melancholici cur plures cibos ap-
petant &c. 303
Melancholicus sanguis nū cerebriū
tantū, an totū corpus occuparit,
quomodo cognoscas 304
Melanteria qualis 88
Melantheriæ exploratio 119
Melanthij qualitas 52
Melanthij noxa 790
Meleæ armeniacæ proprietates 53
Meleæ persicæ qualitas 53
Meliceridum remedia 405
Meliceris qualis affectio, & cur sic
dicta 343
Meliceridis puerorum cura 302
Meliloti uires 52
Melines qualitas 32
Melinum oleum 24
Melyssophyllon, quale 52
Melitites lapis qualis 80
Mellis facultas 52.854
Mellis emollientis præparatio 157
Mellis rosacei cōpositio 155. & 288
Mellis in Heraclæa Pontinati pro-
prietates 785
Melli quō adimat extensoria uis 52
Memæcydon quid 43
Membranam cerebri sauciata quæ
glutinent 327-328
Membrorū resolutorum cura 323
Memoriæ amissæ differentia & re-
media 312.313
Mendesium oleum 27
Mensis cuiuslibet quatuor esse dif-
ferentias secundum lunam 180
Menses quibusdam mulieribus sup-
primi naturaliter, aut præter na-
turā 984
Menses qua ætate fluere incipiant
& desinant ibidem
Menstruis purgationibus quæ mu-
lieres careant ibidem
Menstrua quibus de causis suppri-
mantur, & quomodo curēt ibid.
Menstruis quæ non purgantur, qui-
bus accidetibus obnoxie sint 985
Menses ducentia remedia 986
Menses quibus mulieribus non fluūt,
uel ob plenitudinem, uel ma-
ciem, uel uiciatos humores, uel
ob sanguinis ad nates, aut sedē
delationē: uel ob nimium otium
aut aliquam uteri affectionem,
remedia 987.988
Mensium stillicidij medicinae 989
Mensium nimia purgationi quomo-
do subueniendum 990
Menses quæ ducant in potu sum-
pta 176
Mensium fluxu morbum sæpe fuisse
solutum 240
Menstruæ mulierum purgationis
ratio 957
Menstruæ purgationis in uirgini-
bus indicia 958
Mensura quomodo iudicetur 1031
Mensurarum liquidorum descri-
ptio 1031
Mensurarum notæ 1031
Metiendæ quantitatis differentias
esse tres ibidem
Mentæ facultas 33
Menti papulas manātes quomodo
cures 451
Menti scabrieiei medela 446
Mercurij herbae usus 57
Mercurialis quali uirtute 50.
152.153
Mergi uentriculus ad quid utilis 111
Merula piscis qualis 107

Mespili natura 13
Metalli alijsue similis rei degluti-
tionis remedia 609
Metallica quæ dicantur, & quæ co-
rum uirtus 85. & inde
Metopium oleum 27
Metasyncritica quæ dicantur 690
Metasyncritica curatio 194
Metra cur uterus dicatur 861
Miliaris, species herpetis quid, &
quomodo medenda 893.894
Milij constitutio 39
Milphosis quid, & unde dicta 364.
403
Miltos, id est, rubrica 78
Minthe, quæ menta 33
Miscendorum medicamentorū quæ
sit ratio 153
Misy quale 88.855
Mola uteri quid, unde dicta, quæ
affectiones eam consequantur, &
quomodo curentur. 1006.1007
Molares dolentes quomodo citra
forcipem tollas 112
Mollientia simplicia quæ 123
Mollium piscium qualitas 107
Moly quale 54
Molybdenæ & molybdi usus 88
Moni collyrium 431
Monohæmera collyria 419
Monomelum collyrium 420
Morbi prima dies quæ dicatur 229
Morborum principium trifariam
dici 229.230
Morbi principium, augmentum, ui-
gor & declinatio quæ & quomo-
do dinoscantur 230.231
Morborum causæ quomodo consi-
derandæ 205.206
Morborum perfecte aut imperfecte
solutorum signa 242
Morbum recte curari non posse ci-
tra ipsius prænotationem 228
Morbus utrum tardius aut citius
iudicetur 231. item an iudicari
possit, quomodo & quando præ-
noscat 231. ibidem
Moroxus lapis cuius uirtutis 81
Morsus hominis medela 759
Morsus canis 760
Morsui leonum, pantherarum, aut
urforum antidoti 761
Morsus suum, felis, crocodili, & be-
stiarum uenenatarū remedia 762
Morsui stellionis, salamandre, lacer-
tæ, chalcitidis, murisq; aranei me-
dientia 766
Morsuum aspidis & uiperæ utriusq;
remedia 770
Mortem non esse prædicendam in
acutis morbis 243
Mortis & diem & horam præno-
scere posse doctum medicum
241.242
Mortis signa ex atræ bilis motu
239
Morus & mora 54
Moschatorum unguentorum com-
positiones 1025
Motus externus & internus qui di-
cantur 234
Mucus ex qua nasi parte excole-
tur 357
Mugil qualis piscis 106
Mulieris uirilis notæ 984
Mulierum quæ non purgantur acci-
dentia & remedia 985
Mulierum fecundarum dinotio
958
Muliebres purgationes sæpe soluē-
te morbum 240
Mulus

Mulus qualis piscis 106
 Muralis siue Muralis herbe uirtus 31
 Murenæ morsus medela 778
 Muræ uis medicamentaria 108
 Muscæ æreæ quæ dicantur 413
 Muscas necantia 778
 Musci marini facultas 19.70
 Muscium, aliàs Dordadias 354
 Muscus arborum qualis 19
 Muscus petrarum 49
 Mustati olei præparatio 1028
 Mustellarum usus medicus 111
 Musti usus 55
 Mutum, emplastrum 935
 Myacanthus, qui asparagus 15
 Mycetes quales 55
 Mydryasis quid 364
 Mydryasis quid, eiusq; cura 392
 Myle quid, & eius usus 49
 Myocephalò quid, & cur sic dictus, & quomodo differat à pustula 380
 Myopes quæ dicantur 388
 Myopiam esse incurabilem. ibid.
 Myos otis qualis 54
 Myricæ usus medicus 54
 Myrmecia unde dicta 17
 Myrobalani facultas 16
 Myrobalaninum oleum 23
 Myrrhæ temperamentum 65.857
 Myrrhæ dinotio 119
 Myrrhatio ad cadauerum conseruationem 1030
 Myrsine siue myrtus 54
 Myrteum oleum 26
 Mysterium, alio nomine tetrapharmacum 754

N
 Napy quales 55
 Narcissi uirtus 55
 Narcissinum oleum 26
 Nardi celticæ uirtus 55
 Nardi cretici conditio 70
 Nardi spicæ facultas 55
 Nardinum oleum & eius præparatio 28.29
 Nardinum secundarium 28
 Nardostachi quale 55
 Naribus ulceratis quæ cōueniāt 350
 Narium affectionum tractatio 352 & inde
 Narium mucii remedia 495
 Narium obturationis medela 357
 Nariū ulcera quomodo cures 356. 357 item sanguinem fluentem ibidem
 Narthex qualis 55
 Nasus quomodo cōstructus sit 357
 Nasturij facultas 38
 Nauseæ origo & cura 539. & inde
 Nausearum cataplasmata & epithemata 543
 Nauseas, esse communia accidentia omnium redundantium in uentre humorum 220
 Natrix qualis 776
 Naturalium operum per se nullum esse nocuum 141
 Naxiæ cotis retrimenti uis 83
 Nechepsi regis ad carnem in naribus enatam medicamentum 355
 Nechepson Aegyptius 14
 Nerij efficacia 55
 Neriurum sauciatorum cura 859
 Neriurum contusorum cura 861
 Nicarium Zouli collyrium 436
 Nictalopes qui dicantur & quomodo curandi 388
 Nigellæ uis 52
 Nilamnon collyrium 426
 Nilei epithema 551
 Nili aquæ præstantia 183

Nili collyrium 428
 Nitri qualitas 856
 Nitri spumæ uis 86.87
 Nitrosa balnea quibus conueniant 185
 Niuis generatio 180
 Noctis quatuor esse differentias 180
 Nomarum oculi remedia 378
 Nabecula oculi quid, eiusque cura 373
 Nucis arboris qualitas 38
 Nucis pinæ uis 48
 Nuclei pinei quales 59
 Nucum oleum 23
 Nux auellana 39
 Nux iuglans seu regia 38
 Nux parua, auellana 39
 Nux pontica, auellana. ibidem
 Nux pinea seu picea 59
 Nutricis electio & uictus, tum exercitia 197.198
 Nutrientia multum & item parum quæ sint 128
 Nympha quid, & eius sectio 1022
 Nymphæ qualis actio 55

O
 Oducentium meatus medicamentorum qualitas 3
 Obfuscatio oculorum quid & unde, curatioque ipsius 390.391
 Obolum continere siliquas tres 323
 Ofuratio oculorum quid 364
 Obturantia, aut obturatione liberantia 132
 Occidentalium uentorum qualitas 181
 Ochrorum facultas 70
 Oculorum obscuracionis in febrib. remedia 281
 Oculorum infantium inflammacionibus quid conueniat 200
 Oculos quæ pungent, & lachrymas prouocent 172
 Oculos humectos & flentes quomodo cures 407
 Oculorum lippientium cataplasmata 411
 Oculorū illitiones & collyria 412. 413.414.415 & inde
 Oculorū ulcera cancerata, itē maligna quomodo curētur 378.379
 Oculorum ulcerib. quomodo cicatricem inducas 382
 Oculorum cicatrices & albugines quomodo curandæ. ibidē & 383
 Oculos glaucos quomodo nigricantes facias 385
 Oculorum fluxionibus, suppuracionib. ficosis eminentijs 387
 Oculi debiles qui dicantur, debilitatisq; curatio, & quomodo differant à fluentibus 388
 Oculorum hebetudo & obfuscatio quid, quomodoq; curanda 379
 Oculorum resolutio, & ipsius curatio 391. item quæ curabilis & quæ non ibidem
 Oculorum macies, expressio & confusio quid, quomodoq; curetur 383.384
 Oculi albis innata quomodo tollenda 394.395
 Oculorum quæ sit natura 363
 Oculi singulæ partes quot & quibus affectionibus infestetur ibi.
 Oculi humores tres ibidem
 Oculorum perturbationis cura 364
 Oculorū inflammatiōis medela 365
 Ocularium morborum curæ uariæ 364.365.366.367.368.369

Oculorum frigida intemperiei curatio 369
 Oculorum inflationis, tumoris, & tumoris indurati cura 369.370
 Oculorum ulcera, & ulcerationes ab igne, item si qua oculis illapsa fuerint, quō curanda 370.371
 Oculis infixa quomodo extrahantur 371
 Oculorum sugillatio, punctura & uulnera profundiora quomodo curentur 372
 Oculi humor uniformis quomodo exiccandus 373
 Oculi prolapsus, item ulcerationū superficialium, nubecula, caliginis, epicaumatis & encaumatis curatio 373.374
 Oculorum argemum, fossula, concaua ulcera, tum suppuratio & unguis quomodo sananda 374
 Oculi pustularum origo, dinotio, curaq; 375.376
 Oculorum nomæ quomodo curandæ 378
 Ocymi basilici constitutio 72
 Odoramentorum uariorum compositio 1025
 Odoratus & gustus conspiratio 8
 Odoratus oblesionis medela 357
 Odorum corpus reddentia, & odorem corporis foetentem tollentia 445
 Oenanthariorum uariorum confectio 1017
 Oenanthæ quid 23
 Oenanthinum oleum 23
 Oenos, uinum 35
 Oesypi præparatio 248
 Oesypi præparatio, & usus 101
 Oleæ qualitas 21
 Olei uirtus & quid proprie 22
 Olei purgatorii compositio 171
 Oleorum salca, foliati, & spicati præparatio 1016
 Oleum alenum 398
 Oleorum diuersorum præparationes & qualitates describuntur pagina 22 & deinceps
 Oleum amaracinum 27
 Oleum amygdalinum 23
 Oleum anethinum 25
 Oleum chamæmelinum 25
 Oleum cicinum 22
 Oleum cyprinum 27
 Oleum fœni græci 25
 Oleum foliatum quomodo fiat 30
 Oleum lasnæ dictum 26
 Oleum irinum 28
 Oleum malabathrinum 30
 Oleum laurinum 23
 Oleum lentiscinum 23
 Oleum liliaceum seu lirinon 25
 Oleum lini seminis 22
 Oleum mastichinum 26
 Oleum megaleum 27
 Oleum melinum 24
 Oleum mendesium 27
 Oleum metopium 17
 Oleum myrobalaninum 23
 Oleum myrteum 26
 Oleum narcissinum 26
 Oleum nardinum Cyzicenum 28
 Olei nardini præparatio 28.29
 Oleum nucum 23
 Oleum oenanthinum 23
 Oleum populi nigre 22
 Oleum raphaninum 22
 Oleum rosaceum 24
 Oleum sabinum 22
 Oleum salcas 29
 Olei

AETII INDEX.

Olei sampsuchini præparatio 212.
 Oleum sesaminum 23.
 Oleum sicyonium 27.
 Oleum styracinum 26.
 Olei suffumigabilis præparatio 30.
 Oleum susinum 25.
 Oleum telinum 25.
 Oleum uiolatum 26.
 Olerum nullum esse boni succi 130.
 Oliuarum esus qualis 126. 127. 128.
 Oliuarum purgatoriarum compositio 158.
 Oliuarum salutarum uirtus 133.
 Olympionici collyrium 423.
 Omotribes oleum 22.
 Omphacij & aceti differentia 5.
 Omphacinum oleum 22.
 Omphacomelitis præparatio 288.
 Omphacocarpos, quæ Aparine 14.
 Onochilos, Anchusæ species 9.
 Onoclea, Anchusæ species 9.
 Operis huius institutum 8.
 Ophiasis qualis affectio, & unde proueniat, quomodoque curetur 334.
 Ophitis lapidis energia 83.
 Opisthobares collyrium 432.
 Opisthotonos quid 323.
 Opos qualis 56.
 Opopanax qualis 57. 57.
 Opopanax fructus qui 66.
 Orchestæ unguentum 745.
 Orchis cynos qualis 56.
 Orchis altera ibidem.
 Ordei facultas 45.
 Ordeoli tuberculi sedes 377.
 Ordeoli oculorum cura 404.
 Orientalium uentorum qualitas 181.
 Origani uires 56.
 Orionis ortus 182.
 Oris foetori remedia 455.
 Oris illitionum, quæ stomatice dicuntur, descriptiones & usus 477.
 Oris inflammationum remedia 476.
 Orobanthæ temperamentum 56.
 Orobi facultas ibidem.
 Orophe Siris, crocodilias 667.
 Orthopnoici qui, & unde fiant, ac quomodo curentur 501.
 Oryzæ actio 56.
 Oscula uasorum aperientia simplicia quæ sint 123.
 Ossium lasitudo quæ 208.
 Ossium uisum uis quæ 110.
 Ostracitis lapidis uires 83.
 Ostracodermorum qualitas 107.
 Ostreorum testarum usus 116.
 Ostrydis uirtus 57.
 Ocium quantum obicit sanitati 126.
 Oua animalium qualia 105. item uis medica ibidem.
 Oui candidum quale 3.
 Quorum iuxta cocturam quæ meliora & quæ deteriora 105.
 Quillæ carnis temperamentum 102.
 Quillæ pellis usus 110.
 Quilli stercoreis qualitas 100.
 Quillum fel quale 98.
 Quillum lac quale 92.
 Oxallidis efficacia 310.
 Oxos, acetum 56.
 Oxygala quale 96.
 Oxygalactini casei utilitas 96. 97.
 Oxylapathi uirtus 48.
 Oxylipes panes 246.
 Oxyporium medicamentum 246.
 Oxyporium polyetes 560.
 Oxyporij ad inflationes præparatio 307.
 Oxyporiorum purgatoriorum 65.

positiones 158.
 Oryschonos qualis 67.
 Ozænarum ortus & cura 352. 353. 354. 355. 356.
 P
 Paccianum collyrium 435.
 Paccijs asclepiadeum 429.
 Pæderotis uires 11.
 Pæoniz facultas 19.
 Pæoniz antidoti compositio 804.
 Pæoniz radices uis 311.
 Palati remedia 471.
 Paliuri facultas 57.
 Palmæ temperamentum 70.
 Palpebrarum morborum omnigenarum differentia & curationes 386.
 Palpebrarum sutura quomodo fiat tam sursum quam deorsum 399. 340.
 Palpebræ eversio qualis & eius curatione 340.
 Palpebrarum concretio & contractio quomodo sananda 397.
 Palpebrarum pediculis & pilis quomodo medendum ibidem.
 Palpebræ pilorum ordo duplex & multiplex ibidem.
 Palpebrarum aspritudines unde fiât & quomodo curentur 386.
 Palpebrarum ganglia, atheromata, steatomata, melicerides, uarices & reliqua mala quomodo cures 405.
 Palpebrarum abscessus & calculi curatione 403. 404.
 Palumbi sanguis ad quid conferat 91.
 Pampathes emplastrum 938.
 Pamphili Episcopi suffumigium 1030.
 Panacea emplastrum 936.
 Panacis radicem & succi exploratio 119.
 Panax Herculeus 57.
 Paneratijs temperamentum 57.
 Panchreston fuluum collyrium 434.
 Panchrestos Erasistrati, cur sic appellata 349. 416.
 Pani circa quam oculi partem proueniant 377.
 Panicum quale 32.
 Panis usus in cataplasmate 190.
 Panum ordeaceorum qualitas 45.
 Papaueris qualitas 52.
 Papaueris cornuti uis 53.
 Papaueris succi uis 787.
 Papaueris Thebani proprietates 53.
 Papularum ortus & cura 895.
 Papularum menti eruptionibus manantibus quomodo medendum 451.
 Papulis ex sudore aut feruore auxiliata 824.
 Papulis ulcerosis crurum medicamenta 824. uide Pustulæ.
 Paralij efficacia 53.
 Paralyseos affectio & cura 319.
 Paralysis quomodo ab apoplexia seu syderatione differat 319.
 Paralysicos præseruatiua 313.
 Pardalyanches uires 11.
 Pardalis emplastrum 654.
 Paræas serpens qualis 775.
 Pariendi difficultatis causæ 965.
 Parientibus ægre quomodo succurrendum 961.
 Paronychiarum medelæ 899.
 Parotidis affectio & cura 351. 352.
 Paroxysmus quid 230.

Paroxysmi quatuor esse tempora 230. 231.
 Paroxysmi particularis ac uniuersalis, id est, principij, augmenti, uigoris, & declinationis signa 230.
 Parthenij proprietates 341. 50.
 Parientes quomodo in enixu se gerere debeant 961.
 Partus instantis indicia 951.
 Pasiphilum, medicamentum siccum 876.
 Pastilli ex acacijs & ueratri compositio 725.
 Pastilli flauam bilem purgantis compositio 160.
 Pastillorum ad hemicranias & omnes capitis dolores compositio 331.
 Pastillorum scilliticorum præparatio 791.
 Pastillorum theriacorum præparatio 791.
 Pastillus Cyri archiatri Edesse ad ozænas 354.
 Pastinaca, daucus 20.
 Pastinacæ uirtus 65.
 Pastinacæ caro qualis 108.
 Pastinacæ marinæ uulneris remedia 777.
 Patos quæ sordes 62. 98.
 Paulina antidotus Aristarchi 517.
 Pauonis caro qualis 104.
 Pectus purgantia 173.
 Pedicularis morbi generatio & curatione 343.
 Pediculorum in palpebris origo & curatione 397.
 Pediculorum capitis & totius corporis remedia 343.
 Pediculos omnis generis circa corporis superficiem deuastantia 177.
 Pegani uirtus 58.
 Pelagiz patritiæ sapo 444.
 Pelaria collyria 431. 432.
 Pelecinus qualis 33.
 Pellium animalium qualis usus 110.
 Pentamæron unguentum 745.
 Pentaphilli facultas 57.
 Pentatheton emplastrum 949.
 Pentorobos, aliâs pæonia 19.
 Peplij usus 57.
 Peplij uirtus quæ sit 150.
 Peponis facultas 57.
 Perca piscis qualis 107.
 Perdicium quali ui 31.
 Perdicum esus quomodo conueniat 126.
 Perdicum quale fel 98.
 Perfusionis usus & ratio 188.
 Peripneumonicorum affectio & remedia 518.
 Peristereonis qualitas 58.
 Periscyphus quid, & eius ratio 409.
 Peritonæon quid 626.
 Pernionum medicina 898.
 Perseæ foliorum facultas 58.
 Pes cornicis quali uirtute 43.
 Pestis futuræ signa 269.
 Pestilentes morbi qui dicantur, & unde generentur, tum quomodo cauere liceat 268. 269.
 Petri Archiatri collyrium 433.
 Petroselinum quale 58.
 Peucedani uires 58.
 Phaci, id est, lentes 69.
 Phacos palustris qualis 70.
 Phagi uirtus 21.
 Phalangosis quid, & quomodo curetur 397.
 Pharmaca uehementiora quæ 205.
 Pharmaci ex pice Brutia Galeni compositio.

Y positio

AETII INDEX.

positio 315
Pharmaci ex tribus piperis generi-
bus compositio 560
Pharmacum qui biberit, & non pur-
gantur, quomodo curandi 165
Pharmacitidis terræ uis 79
Phaselorum facultas 20.70.
Phasganij qualitas 55
Phasiacorum caro qualis 104. oua
qualia 105
Phemus, pharmacum 611
Philadelphus pastillus 613
Philanthropi qualitas 14.55
Philetærij efficacia 60
Philinus præses quo medicamento
curatus 78
Philotimus quomodo melancholi-
cum se caput non habere putan-
tem curauerit 302
Phlomos qualis 79
Phlogini linameti compositio 414
Phoenix palma 29
Phoenix collyrium 150
Phoenix niger, collyrium 431
Phœnicinum, epithema 311
Phœnigmorū compositiones 642
Phosphorus collyrium 418
Phrenitis quid, quotque eius dif-
ferentiae, & quomodo curanda
293
Phrygius lapis qualis 82
Phu qualis efficacia 70
Phucus pisces quales 107
Phycos, fucus 89.90
Physema pinus 62
Phycoryche emplastrum 949
Phycos qualis 70
Pica prænantium quid, unde di-
cta, cur & quando mulieribus ac-
cidat 959
Picæ quomodo medendum ibidem
Picationis usus & compositio 191
Picis efficacia 59. & quomodo ex
ea fuligo præparetur ibidem
Picra ex aceto mulso, Oribasij
808
Picris qualis & cur sic dicta 63
Pili palpebrarum uarij, & euulsi ne
renascantur, medicamenta 397.
398
Pilorum agglutinatoria 398
Pilos quæ nigros, aut fuluos, aut
albos faciant 338.339
Pili ut crispi fiant 339
Pilos quæ corrumpant, quæ extir-
pent, & quæ attenuent 340.
341
Pilos corrumpentia, triplicia sunt
339
Pilorum in palpebris defluuij spe-
cies & curæ 403.404
Pilos pulchros & densos quid faciat
in pueris 337
Pilularum ex fimo, caprarum præ-
stantia 192
Pilorum ustorum usus 110
Pinguetudinis animalium usus & dif-
ferentiae 108.109
Pinguetudinum qualitates & différen-
tiae 3
Pinguedo & seuum quomodo dif-
ferant 109
Pinguis sapor qui 2
Pini corticis usus 59
Piperis differentia & efficacia 57
Piri uires & pirorum 14
Pira syluestria, qualia 14
Piscatoria emplastrum 945
Pisces molles qui, eorumque usus
107.108
Pisces saxatiles 106

Piscium descriptio 105. usque 109
Piscium optimi qui 127.128
Piscium salforum qualitas 128
Piscium pinguedinis usus 109
Pistaciæ facultas 59
Pituita laborantium cura 730
Pituitam per os à capite ducentium
descriptio 333
Pituitam ducentia quæ sint 151
& inde 160
Pityides quale 59
Placitis stypteria 89
Plaga capitis quomodo curanda 327
Plagæ scolopendræ, araneæ, tetra-
gnathi & phalangij medicamen-
ta 766.767
Plantaginis qualitas 15
Plantarum rimis utilitas 902
Platani qualitas 60
Platycoria quid 364
Pleiadum ortus occasusque 182
Plenitudinis dinotio unde sumatur
144
Pleuritis qualis affectio & cura 522.
& inde
Pleuritis quæ uidetur & tamen non
est, quomodo dinoscenda & cu-
randa 525
Plintitis stypteria 89
Plumbaginis qualitas 88.854
Plumbi usus 88.875
Plumbi succus quomodo fiat 726
Plumbum quomodo augetur 88
Pluuia aqua qualis 181
Pluuiarum generatio 181
Pluuia, cur aliquando post uentum,
aliquando ante fiat ibidem
Podagra quid, & quo differat ab
arthritide, eiusque cura 716
Podagra cur aliquibus magnus
morbus, aliquibus paruus exi-
stat, item alijs diu, alijs breui tem-
pore duret 717
Podagricorum accidentiū quæ sint
rationes 718
Podagrica cerata 741
Podagrica unguenta & acopa di-
uersa 742. & inde
Podagricæ antidoti 751. & inde
Podagricorum qui lauandi & quo-
modo 756
Podagricorum humorum dinotio
718.719
Podagricorum præseruatiua, diæta
& medicamina 721.722.741.
742
Polemonij uires 60
Polentæ ordeaceæ uis 45
Polij qualitas 60
Polyarchiorum compositio 583.
584
Polygoni temperamentum 60
Polypodij facultas 60.156
Polypodites uinum 154
Polypus qualis affectio, eiusque cau-
sa & cura 352.353.354.355
Pomorum fructus qui optimi 126
Pompholygis constitutio 89.855
Pompholygis exploratio 368
Ponderum descriptio 1031
Ponderum notæ 1031
Pondus quomodo dijudicetur 1031
Populi albæ qualitas 40
Populi nigrae facultas 10
Populi nigrae oleum 22
Porcinarum carniū qualitas 206
Porcini pulmonis uis medica 109
Porri efficacia 60
Porri capitati succus quid efficiat
153
Porri syluestris facultas 12

Porriginis affectio, origo, & cura-
tio 341.342
Portulacæ uirtus 13
Poscarum aluum purgantium com-
positio 157
Potamogeton qualis 60
Potionum iucundarum & commo-
darum in febribus compositio 286
Potus intempestiue sumptus sitim
auget 279
Præcocia quid 13
Prædicere mortem in acutis mor-
bis non decet 243
Prægnantes quomodo se gerere de-
beant 960
Prægnantis utero quæ innascan-
tur 956
Præputiolum seu ordeolum quid,
& quomodo curetur 404
Præst efficacia 60
Præstion qua ui 60
Præsoides, qualis 32
Priapismus quid, & eius cura 699
Principis orientis, suffumigium
1019
Principium morbi quid, & trifariâ
dici 229.230
Procidentiarum sedis remedia 842
Procidentis sedis perustio quando
fiat 844
Procyonis ortus 182
Prolapsus oculi qualis 373
Prophetæ doctoris antidotus 802
Propolis qualis 61
Proteus collyrium 434
Pruinæ generatio 180
Pruna Hispanica qualia 205
Prunorum facultas 42
Prurituū omnis generis curando-
rum remedia 819
Pseudobonij facultas 18
Pseudodictamni qualitas 20
Psychotrophi facultas 40
Psidracibus pustulis quæ auxiliem-
tur 824
Psilothra quæ dicantur, eorumque
compositio 340
Psilothrum, ampelos leuce 12
Psilothrum ex herinaceo terrestri
quomodo fiat 113
Psoricum quomodo fiat, & eius co-
ditio 90.91
Psyllij efficacia 72.864
Psymmithium cuius uirtutis 90
Pteleæ temperamentum 61
Pterios facultas 61
Pterygium quid, curatioque eius
395.396
Pterygiorum medelæ 899
Ptilosis quid 364.403
Ptilanæ ordeaceæ uirtus 45
Ptolemæi psoricum collyrium 435
Pubes puerorum quomodo diutis-
sime maneat in gubis 46
Pudendorum inflammationes, no-
mæ, carbunculi, interna in uri-
næ ineatu ulcera, quomodo sa-
nes 847.848
Pudendorum thymi, rimæ & ulcera
quomodo curanda 845.846
Pumicis qualitas 83.856
Puer febriens ut exudet 200
Pueri quomodo in literis & disci-
plinis exercendi, & qua æta-
te 203
Puerorum comitialium cura 311
Puerorum uictus ratio iuxta æta-
tem 203
Pulegij uires 19.150
Pulices necantia 778
Pulmonem purgantia 173
Pulmo

physis fol. sig.

ARTII INDEX.

Pulmonis qualitas 109
Pulmonis uis medica 109
Pulmonis animalium qualitas 103
Pulmonis uenarum rupturæ unde cognoscantur 107
Pulmonis temperaturę dinotio 220
Puls farinæ crassioris 143
Pulsuum signa 234
Puluillorum ad ozenas compositio 313
Puluillorum inspersilium caput dentis compositio 332
Puluillorum pilos attenuantium compositio 341
Puluis Theodesij caput resuscians 333
Pupillæ dilatatio quid, & curatio ipsius 392
Pupillæ tabes quid, & unde, eiusque chirurgia 393
Purgandi rationes 148. & inde Purgantia medicamenta componendi methodus 153. & inde Purgationi inhabiles 194
Purgatoria omnia stomachum infestare, præter aloë quæ ubi 149
Purgatio ob quinque causas nihil proficit in uentre 165
Purgationis excessui quomodo medendum 155. 170. 171
Purgationi nihil efficiendi quomodo succurrendum 165
Purgationis aut uenæ sectionis impatientes quomodo curandi 176
Purgationis usus in morbis oculorum 367
Purgatiua medicamenta articularibus morbis conuenientia 170
Purpurorum testæ ad quid utiles 117
Pustularum ortus & curatio 189
Pustularum in febribus curatio 183
Pustularum capitis diuersarum descriptio & medelæ 343. 344
Pustularum diuersi generis remedia 813. 824
Puteana aqua qualis 183
Putrefactio quid 150
Putrida febris quæ 143
Pyrethri temperamentum 61
Pyri qualitas 61
Pyriatrotuel pyriephthon lac quod 96
Pyriepton lac 117
Pyrites lapis qualis 81
Pyxanthos qualis 10
Pyxis emplastrum 935

Q Valitarum medicamentorum ordines quatuor 1
Quantitatis dimetiendæ tres differentias esse 1031
Quartana, uide Febris
Quercus qualitas 21
Quid cani & balneo comune, pro uerbium unde ortum 315
Quinquefolij qualitas 57
Quotidianæ febris, uide Febris

R Abies canum unde causetur 314
Rabiosorum canum indicia ibidem
Radiciis dulcis usus 19
Ranex uaricosus quid, ubi oriatur mulieribus, & quomodo curetur 1021. uide etiam Hernia
Ranarum usus 111
Ranz palustris attractus quid mali inferat 777
Ranunculi species quali ui 17
Ranunculi sub lingua remedia 470

Raphani qualitas 61
Raphani uomitorij præparatio 166
Raphaninum oleum 22
Rapi facultas 20
Rarefacientia eutem simplicia 124
Recidiuæ signa 442
Reduillarum medelæ 399
Regium medicamentum 109
Regium suffumigium 1928
Remissio morbi quid, eamque dici dupliciter 230
Renale emplastrum 668
Renale unguentum 672
Renibus & lapide laborantibus corporis constitutione gracili existente remedia 672
Renum inflammationis medicamenta 681
Renū duricie & suppuratōis medicinæ 682. 683
Renes purgantia 175
Renum calculosorum affectio, & causæ & remedia 668. 669
Renum in animalibus qualitas 103
Renum incontinentiam urinam excernentium debilitas & remedia 666. 667
Repellentia quæ sunt 328. 352
Reprimentia eminentias simplicia quæ sunt 124
Resinæ qualitas 356
Resinarum facultates 61
Resinæ quomodo urantur 62
Resinæ fuligo qualis ibidem
Resolutio seu paralytis quomodo differat ab apoplexia 319. eiusque affectio & curatio ibidem
Respirationis signum 428
Reuulsionis modus 328
Rha cuius temperamenti 61
Rhamni temperamentum 61
Rheoponticum quale 61
Rhinarium collyrium 433
Rhinema collyrium 433
Rhoa qualis 62
Rhodabuntapi præparatio 1027
Rhododaphnes proprietates 55
Rhodomeli præparatio 1028
Rheas quid Græcis 407
Rheadis uires 52
Rhoidarij præparatio 39
Rhois facultas 62
Rhypos qualis sordes 62
Ricinus arboris fructus 41
Ricininum oleum 41
Ridiculum medicamentum 489
Rimarum in pudendis medicinæ 833. 834. 835
Rimis platarum quomodo medeantur 902
Robur hominis omne debilius reddi in coitus usu 141
Robur hominis quid ibidem
Romulæ suffumigium 1030
Roris generatio 180
Rosæ qualitates 8
Rosarum facultas 62
Rosacei cerati usus 24
Rosacei mellis compositio 155
Rosaceum emplastrum 249
Rosaceum oleum 24
Rosari flauam bilem ducentis descriptio 155
Rosatum pituitam & atram bilem trahens 155
Rosatum xemomyron 1026
Rosarum præparatio 1027.
1028
Rubeta quid, ac quotplex, & lesionis ab ea quæ sit cura 777. 783
Rubi qualitas 17

Rubia tinctorum facultas 32
Rubificantia quæ sunt 192
Rubricæ facultas 78. 855
Rubrica Sinopica 78
Rumicis qualitas 48
Ruptio quid, & quo a sinu differat, eiusque medelæ 827
Ruptoria emplastra 241
Ruptura unde fiat 273
Rutæ temperamentum 58. 126
Rutæ syluestris facultas 54
Rutæ syluestris noxa 790

S Abinum oleum 22
Sacra herbarum proprietates 58
Sagapeni qualitas 857
Sagapenum quale & quid 63
Salamandraquale animalculum, & quæ ab ea homini mala obueniant 782
Salcas oleum 29
Salca olei compositio 1026
Salicis uirtus 36
Salis fomentatio quomodo fiat 143
Salis generum differentia 7
Salis morsus qualis 179
Salis specierum differentia & facultates 85
Salis usti usus ibidem
Salis floris qualitas ibidem
Salis spumæ efficacia ibidem
Salis purgatorij compositio quadruplex 161
Salis qualitas 856
Sales Iamblichi 561
Sales Poletis ibidem
Salis dodecathei compositio 562
Sales theriaci quomodo conficiantur 797
Salsamentorum ex animalibus qualitates 108
Salforum natura 7
Salsuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ 108
Salsus sapor qui 27
Saluæ energia 3153
Sambuci facultas 11
Samiæ terræ facultas 78
Samius asfer collyrium 423
Sampsuchi uirtus 63
Sampsuchini olei præparatio 212.
744
Sanalia, alio nomine Meliceris 202
Sandarachæ efficacia 89. 789. 855
Sandyx, collyrium 427
Sandycis natua uis 90
Sanguine euacuato, si rursus fluat sanguis, quomodo auxiliadū 714
Sanguinem quæ purgent 153
Sanguinem per nares educens epithema 170
Sanguinis animalium diuersitas, & quæ ex eo remedia 91
Sanguinis uiscosi generatiua alimentum quæ sunt 127
Sanguinis ex naribus erumpentis prænotio & significatio 240
Sanguinis narium fluxus in febribus curatio 281
Sanguinis in homine alteratio quomodo fiat, aliquando particulatim, aliquando uniuersaliter 302
Sanguinis ex auribus eruptioni 350
Sanguinis ex naribus eruptioni quomodo medeantur 356
Sanguis quomodo ex naribus eliciatur 357
Sanguinis ex oculorum angulis eruptio quomodo sistenda 397

AETI INDEX

Sanguis dracontij 413
Sanguinis ex pectore aut pulmone
reiectionis unde proueniat 106.
quomodo curetur 108
Sanguinis reiectionis cuiuscunq;
auxilia 110. 111. & inde
Sanguinem meientium per elen-
tium, remedia 667
Sanguinis hircini efficacia 671
Sanguinis ex uelica erumpentis au-
xilia 693. 691
Sanguinem meientium cura 691
Sanguinis abundantis causa agro-
tantium auxilia 722. 723
Sanguinis testudinis marinæ præpa-
ratio & usus 723
Sanguinis taurini proprietates 788
Sanguinis erumpentis cura 879.
& deinceps
Sanguisugarum usus qualis 848
Sanitatem esse duplicem 891
Sapa quid 902
Sapa, hepsema, siræum, idem 904
Saponis Constantini fluxiones re-
ficcantis compositio 933
Saponis Andrea comitis ad eadem
compositio ibidem
Sapores obscuri quomodo depre-
hendendi
Saporum alteratio
Saporum proprietates
Saprotæ xyloni, id est, caries ligno-
rum
Sapphiri energia 84
Sarcites hydrops quid, eiusq; cau-
sa & remedia 651. 652
Sarcocolla quid & qualis 663
Sardoniz herbæ efficacia mirabilis
785
Satyreiz uis 35
Satyriasis qd, cur sic uocata, ipsiusq;
curatio 699. 810. 811
Satyrj facultas 63
Scammoniz uirtus, & qualitas 149
Scandicis conditio 80. 64
Scarificationis quis usus 647. 148
Scarus piscis qualis 107
Schinus, lentiscus 67
Schistos lapis qualis 80
Schizæ uis 64
Scinci ad quid conducant 117
Schœnflos qualis 67
Schœnos lea qualis 67
Scolimi facultas 64
Scordij qualitas 64. 153
Scoriz conditio qualis 89
Scorodon quale sit 64
Scorpij marini fel quale 98
Scorpionis marini plagæ medela
778
Scorpionis plagæ opē ferentia 769
Scorpium sputo ieiuni hominis oc-
citum 99
Scribentes turpia, peiores quàm qui
perpetrant 91
Scroti scabiosi & pruriginosi, tum
inflammati medela 847. 848
Scutulare collyrium 422
Scobelites uinum quod 561
Scylacium collyrium 430
Scytala Chalcidica qualis 775
Secantia alimenta 132
Secundæ cur sic uocatur, & hæ in
utero detetæ quomodo eiciant-
ur 969
Secundatum generatio 956
Securidacæ qualitas 33
Sectio arteriarum, uide Arteriarum
Sectio uenæ, uide Venæ
Sedis affectionum causæ 833
Sedis inflammationū medela 833

Sedis fissuris & tuberculis quæ re-
media conueniant 835
Sedis omnigenis malis auxiliantia
ibidem. 836. 837. usque 844
Sedem infantium prociuem quo-
modo cures 202
Sedis infusionū ratio & differentia
177
Sedis thymis, uetruis formicarijs,
elapis, ficibus, hæmorrhoidibus,
prociuem, abicelsibus, ulceribus
proserpētibus & depascentibus, &
fistulis quæ medicinae sint adhi-
bendæ 837. usque 843
Selachia quæ Græcis dicantur 108
Selini temperamentum 63
Selinusæ terræ uirtus 79
Semen prouocantia simplicia 125
Semen quæ inhibeant ibidem
Semen qua ætate appareat, & qua ad
generationem aptum fiat 918
Sentinis fluxus quid, mulieribus &
uiris quæ communis, ac quo-
modo medearis 1000
Seminis profluuium quid, & eius
remedia 700
Seminis profluuium in fomito qui-
bus & quas ob causis contingat
701. eiusq; cura
Semperuiui facultas 10
Senecionis uirtus 33
Senecta ex morbo quæ dicatur 267
Senecta naturalis quid 204
Senuum uictus ratio 204
Senuum comitialium cura 311
Sepiz usus medicamentarius 117
Seps quale animalculum, & quàm
hocus eius ictus, tum quæ cu-
ra 774
Septica quæ Græcis dicantur 32
Serum lactis quale, & quomodo præ-
parandum 94. 95
Serum lactis quomodo uentrē sub-
educat 133
Serpilli proprietates 32
Sesami conditio qualis 63
Sesaminum oleum 23
Seselli quale 63
Serapias qualis 16
Seris qualis 63
Seridis nomine quæ herbæ ueniant
127
Seueri album collyrium 421
Seuum quomodo differat à pingue
dine 109
Seui ex animalibus usus 109
Siccantia alimenta 135
Siccantia citra mordacitatem, item
simpliciter & secundum quatuor
ordines quæ sint 121. 122
Sicci medicamenti ad scabros ocu-
lorum angulos compositio 402
Sicci temperamenti notæ 217
Siccitas corpora animalium citò ad
senectam producit 224
Sicya quali potentia 63
Sicyos agrios qualis 64
Sicyonium oleum 27
Sideritis Heraclea 12
Sideritis qualis 63
Sigilli lemnij usus 78
Sigillum Coracium 878
Signa bona & mala quæ sint 228. 229
Siliquæ lobi 20
Siliquæ facultas 40
Silphij proprietates 64
Silulorum muria quibus conferat
108
Similaginis qualitas 127
Simplicium medicamentorum fa-
cultas traditur, pigina 9. & de in-

ceps, & pagina 119. ac deinde
Sinapi quale, & quod optimum 15
Sinapi uim, consumilem quæ ha-
beant 192
Sinapismus quid, eiusq; usus & præ-
paratio 191. 192
Singultus unde sit & eius remedia
131
Sinon qualis uirtutis 84
Sinus ulcerum quomodo curandi
893. 894. 895
Sion quo temperamento 64
Siphon quid Græcis 346
Sira, que pars corporis dicatur 322
Siræum, hepsema, sapa, idem 904
Sirialis infantium quid, & quomo-
do curetur 200
Siros quid Græcis ibidem
Sistoma quid 30
Sisymbrij natura 64
Sitis duplex
Sitis quibus corporis partibus cause-
tur, eiusq; dinotio 220
Sitis sanorum cura 272
Sitis in febribus curatio 279
Sitim esse duplicem ibidem
Sirculoform remedia 134
Smagdi uirtus 84
Smegmata ad achoras, furfures, aspe-
ritates ac scabritiem 345
Smegmatum caput densantium, co-
positio 332
Smegmatis ad cutem illustrandam
& pilos lanuginosos compositio
341
Smilax hortenensis 20
Smilacis natia uis quæ 285
Smiridis efficacia 83
Smyrna, myrrha 65
Smyrni qualitas 65
Solani efficacia 62
Solani furiosi efficacia 784
Soleorum coria, usta ad quid pro-
funt 202
Solstitium æstiuum quando 182
Solstitium hybernium quando 182
Solutionis morborum signa 242
Sonchi constitutio 65
Sorbitionum ex æruo præparatio,
ad ulcera depascentia 607
Sordis balneorum usus 19
Sordis in ouium lanis innutritæ u-
sus 101
Sordium qualitas 62
Sori qualis facultatis 88. 855
Soporis grauis curatio 278
Sparti qualitas 65
Spathiuos & eius morsus qualis,
quomodoq; curetur 775
Sphacelus quid, quæq; eius medica-
mina 883
Sphæron emplastrum 949
Spinster quid 569. 597
Sphragidis lemniz facultas 78
Spicæ ortus 182
Spicæ nardi facultas 55
Spicati olei compositio 1026
Spinæ albæ uires 11
Spinæ Aegyptiæ qualitas 41
Spinæ deuoratæ ac tonsillis infixæ
quomodo excerni possint 489
Splanchnon, qualis 19
Splenis affectionum cognitio 631
Splenis intemperierum remedia 633
inflationis 634. in scirrhum indu-
rati 636. & inde
Splenorum ustio & diæta, tum iux-
ta affectionis uarietatem curatio-
nes 643. 644. 645
Spodiaca collyria unde dicantur, &
qualia sint 424. 427
Spodia

Spodiaceum coll. Demosthenis 428
Spongiæ uirtus medica 89.187
Spongiarum lapillorum facultas 83
Splenem euacuantia 175
Spumæ argenti qualitas 854
Sputi hominis uis 99
Sutorum signa 141
Squamæ æris uirtus 87.153.854
Squamæ ferri usus 87
Squatinæ marinæ usus 117
Squama stomomatis ferri 87
Stactæ, quid & qualis 65
Stactæ myrrha quæ bona 119
Stagnina aqua qualis 183
Staphis quæ & Astaphis 16
Staphyles usus 65
Staphylomata quid, eorumq; differ-
rentiæ & curatio 380.381
Staphylinus, daucus 20
Staphylinus quali ui 65
Steatoma quid, eiusq; cura 914
Steatomatum remedia 405
Stella lamina, terræ samis species 79
Stellarum ortus & significatio 181
Stercoris diuersorum animalium qua-
litas 99.100.101
Stercus exigentia 11.154.163.176
Sterilitatem foeminas quæ inducant 973
Sterilitatis & in uiro & muliere cau-
sæ & remedia 970
Sternutationem quæ moueant 360
Sternutationis usus & ratio 359
Sternutationes redundantes quo-
modo sedandæ 360
Stercentibus pueris quomodo auxi-
liandum 199
Stibij facultas 89
Stibij ornandis palpebris 413.414
Stibium Alexandri regis 407
Stibia alia 407.408
Stillicidium urinæ quid, & eius re-
medium 684
Stœchadis temperamentum 65.330
Stomachus, id est, gula 322
Stomachi adstrictionis remedia 546
Stomachi imbecillitas; supinitas &
subuersio quomodo curetur 538
Stomachi exusti remedia 534
Stomachi dissoluti, item inflamma-
ti remedia 548
Stomachi exulcerati medicamenta 551
Stomacho si qui conuellantur, comi-
tialis modo, curæ 551
Stomacho atra bile grauato reme-
dia 531
Stomacho commodantia aut incom-
modantia 131
Stomachici qui dicantur 620
Stomaticarum illitionum cōfectio-
nes 477.478
Stomomatis ferri facultas 87
Strangulati quomodo reuocentur 488
Strangulorum auxilia 790
Stranguria quid & quomodo curan-
da 684
Stratiotæ collyrium 435
Strobili uirtus 48
Strumæ quid, eorum ortus & medi-
camina 910.911
Strumarum inter se differentiæ 910
Struthij facultas 65
Struthocamelorum caro qualis 104
Struthocamelorum oua qualis ali-
menti 104
Strychni facultas 65
Stupefacientia medicamenta 729.

Post horum usum, qualibus un-
guentis sit utendum ibidem
Styrax qui melior 119
Styracis efficacia 65.153
Styracium oleum 16
Stryteria, alumen 89
Subsidentia urinæ alba non semper
bona 235
Subsidentiarum urinæ signa 237
Substantiam simplicem & incom-
mixtam inuenire impossibile 75
Subtercus hydrops quomodo cure-
tur. 660.661.662
Succi boni aut mali qui 129.130
Succini uirtus 84
Succus-Cyrenaicus qualis 56
Succus Medicus 56
Succus siriacus ibidem
Sudor, & ex eo pharmacum 98
Sudores excludentia 176
Sudores quomodo sedentur 170
Sudorum significationes 240
Suffusiones ad tussim 501
Suffitum ratio 174
Suffocati quomodo reuocentur 488.
489
Suffumigabilis olei præparatio 30
Suffumigij moschati præparatio, &
aliorum 1028
Suffumigiorum uariarum præpara-
tio 1025
Suffusio oculorum quid, & eius in-
dicia ac species, tum cura 392
Sugillatio quid 372
Sugillationum sub oculis curatio-
nes 441
Sugillatorum medela 897
Suilla pinguedo qualis 109
Suillæ carnis præstantia 102
Suillum fel quale 98
Suillum lac quale 92
Suillus talus ad quid conducatur 110
Suis pinguedo qualis 3
Sulphuris conditio 87.856
Sulphurulentæ balneæ quibus conue-
niant 186
Supercilij resolutionis cura 321
Supercilij denudatis quomodo pi-
los inducas 337
Supercilij ornandis remedia 441
Superfluitatibus quæ redundant, &
quæ careant 128
Suppuratoria simplicia quæ 123
Suppuratorum affectio & dinotio,
curaq; 515
Surditatis curatio 347.348
Susinum oleum 25
Sycæ, qualis constitutionis 66
Sycosis qualis affectio, eiusq; cura 90.386
Sycamina qualia 54
Sycomora qualia 54.57
Syderon quid, & qualis affectio,
eiusq; cura 318.319
Syderationis præseruatiua 313
Syderos quomodo differat à resolu-
tione, eiusq; affectio & cura 319
Syderii ortus & significatio 181.182
Syluestria satinis fortiora 44
Syluestrii animalium caro qualis 103
Symphytum petraeum 67
Synerotis collyrium 429
Syncope quid 300
Syncope & lipothymia quo diffe-
rant 274
Synoptici sudores ibidem
Synochos febris quæ 247
Syriaci lapidis uis 81
Syricum, Cerussa 90
Syricum collyrium 427

TAbes siue tabida febris quæ di-
catur 267
Tamarix 54
Tauri-adeps qualis 3
Taurinæ carnis qualitas 102
Taurinæ medullæ qualitas 109
Taurinum fel quale 98
Taurin-adeps medullaq; qualis 109
Taxi efficacia quæ 785
Tecolithos qualis 81
Telamonium emplastrum 949
Telis, id est, foenum græcum 68
Telinum oleum 25
Tellinorum usus medicus 117
Temperamentorum corporis hu-
mani dinotio 216. & deinceps
Temperamentorum omnium cor-
rectio & medela 223.224
Temperaturæ alterationis ratio di-
uersa 302
Tempora inurere an liceat 408
Temporum quatuor anni, singulo-
rum tres esse differentias 180
Temporum musculis quæ cataplas-
mata agglutinatoria, illitiones cō-
ueniant 410
Tendinum induratorum medela 909
Tenesmus quid, & ei cura 601.602
Tenuium partium simplicia quæ 122
Tephra, id est, cinis 68
Tephrica collyria unde dicta, & qua-
lia sint 424.426
Tephron collyrium 427
Terebinthi efficacia 67
Terminthus quid, quomodoq; me-
dendus 895
Terra quid, eiusq; qualitas 75
Terræ differentiæ quæ sint 75
Terra quomodo lauanda 76
Terræ agrorum quis usus in medi-
camentis ibidem
Terra lemnia seu sigillata 78
Terra samia 78
Terra selinusia & chia 79
Terra cimolia 79
Terra Ampelitis siue Pharmacitis
ibidem
Terra Cretica seu Creta 79
Terræ ustæ uis ibidem
Terræ exhalationum seu uaporum
ratio 181
Terræ quæ in emplastra commiscen-
tur 856
Terræ intestina ad quid cōferat 111
Tertiana, uide Febris
Testarum elibani usus 83
Testa intestorum naturam esse ex-
contrariis facultatibus compositam 133
Testæ onorū ad quid cōducant 105
Testa intestorum piscium qualitas 107
Testa mollitestorum conditio ibi.
Testarum conchiliorum qualitas 856
Testarum fistulium qualitas 856
Testamentum aurifabri collyrium 437
Testamentum, collyrium ibidem
Testes animalium qualis tempera-
menti, quiq; esu optimi 103.104
Testium temperamenti indicia 222
Testiculus canis qualis 56
Testiculorum castoris usus 114
Testiculorum canis fluuiatilis usus 115
Testudinis fel quale 98
Tetanica conuulsio quos non in-
uadat 324
Tetanus quid 324. unde proueniat
& quomodo curetur, ibidem
Tetragnathus quid, eiusq; idios me-
dela 767

AETII INDEX.

Tetrapharmacum basilicum	947	Trixago qualis naturæ	70	Venenatorum plagis omnibus com- munia remedia	764
Tetrapharmacum medicamen	109	Trychiny facultas	69	Venter quinque de causis purga- torio accepto, nihil excernit	165
Tetrapharmaci compositio	751	Tubera qualia sint	69	Ventris suppressionem, plurimo- rum malorum esse causam, quæ- que ea sint, & eorum cura	177
Teudon quale	67	Tumores pedum grauidarum quo- modo curandi	960	Ventrem subducentia	133
Thalassorum Hermophili, collyriū	434	Tumores faciei ficosos, quomodo cures	450	Ventrem supprimentia	134
Thapsiæ facultas	34.857	Tumoris gutturis medelæ	912	Ventris temperaturæ dinotio	120
Theion sulphur	87	Tumoriū pultacei ac mellei humo- ris curatio	912.913	Venti cur aliquando post, aliquan- do ante pluuiam ueniant	181
Theodoretos antidotus triplex	807.808	Tumoriū adiposorū medelæ	914	Venti multi & assidui boreales cur æstate fiant	ibidem
Theodotium magnum	438	Tumorum canceratorum medica- mina	889	Ventos locales, vniuersalibus mor- bosiores esse	181
Theodotium Seueri	ibidem	Tumorum durorum, item crudorū & inconcoctilium medicamenta	735.736	Venti apogei qui	ibidem
Theodotium nardinum coll.	436	Tumorum laxorum medelæ	905	Ventorum iuxta situs qualitas	181
Theodotium Placianum	437	Turdi pisces quales	107	Ventorum generatio, pumerus & nomina	181
Theophilium collyrium	431	Turturis sanguinis usus	91	Ventus & imber quomodo simul fiant	181
Terebinthina resina	62	Turturis marini plage auxilia	777	Venus, emplastrum	936
Theriaces confectio, usus & proba- tio	792.793.794	Turturum esus qualis fiet	126	Venerem emortuam quomodo ex- cites	703
Theriace exhibitionis modus quis	795	Tulsis causæ & remedia	497. & inde	Veneri quæ naturæ ac diætæ com- modiores, item quod tempus	142
Theriace ex uiperis Andromachi compositio	791	Tympanites hydrops quid, eiusq; causæ & remedia	650.651	Veneris herbæ uires	58
Theriace Oribasij, qua Marcus Imp. est usus, compositio	805	Tyrhenicum, emplastrum	938	Veneri rei signa	222
Theriaca eiusdem alia	806	V		Veratri qualitas	31
Thermus sativus	34	Vaporum ratio	7	Veratri nigri uirtus	150
Thermus syluestris	34	Vaporum terræ ratio	180	Veratrum quomodo & quando qui busq; dandum, & quibus non, quidq; facere possit, ac quæ pro- bati sint notæ	167
Thlaspi quali uirtute	34	Vaporariorum fomentorum usus et modus	143	Veratri purgandi ratio, eiusq; exhi- bendi differentie	168.169
Thryallis, uerbasci species	70	Vari circa quam oculi partem orian- tur	377	Veratri cremor, decoctum, ramenta &c. qualia	168
Thridacis qualitas	34	Varos faciei tollentia	446	Veratro purgadis quæ sit diætæ præ- scribenda	ibidem
Thronus Marcellius pastillus	614	Varices quid, & quò curentur	203	Verbasco species & facultas	70
Thuris facultas	49.857	Varices palpebrarum	495	Verbenacæ usus	58
Thuris dijudicatio	119	Vasculi mensuratio	1031	Verberum uibices seu notæ quomo- do curandæ	449
Thuris cortex qui melior	ibidem	Vasorum dilatatio ubi, & quomodo fiat, & quomodo curanda	911	Vermes ulcerum quid curet	36
Thytes lapis qualis	81	Vasorum oscula quæ simplicia ape- riant	123	Verruca, & uerruca formicaria quid & unde uocata	837
Thylacitidis facultas	52	Vasorum sectionis usus	410	Verrucarum, tum uerrucarum for- micarum remedia	838
Thymus niger, elleborus	35	Venam in anno sæpe incidere, incō- modum & cur	147	Vertigo unde oriatur, & quomodo curanda	298
Thymi proprietas	35.153	Venæ sectionis usus in oculorum morbis	366	Vesica bilis susceptrix	97
Thymi pudendorum quomodo sa- nandi	845	Venæ sectionis aut purgationis im- patientes quò curandi	726	Vesicæ collam ubi situm	322
Thymi sedis quid, unde dicti, & quæ eorum cura	837	Venæ sectionis usus in febrib.	248	Vesicæ doloris in febribus curatio	281
Titanus, id est, calx	68.89	Venæ sectioni quod corpus aptum ibidem	ibidem	Vesicæ calculorum remedia	672
Tithymalli uirtus	151	Venæ sectioni quæ obstant	ibidem	Vesicæ calculis & etiam renum si- mul	673.676.677.678
Tithymallorum efficacia	68	Venæ sectio quibus conueniat, & cur fiat, quæq; in ea sint conside- randa	144.145	Vesicæ calculos atterentia medica- menta	673
Titianus pessus	1012	Venæ quales secandæ, & quo modo	145	Vesicæ inflammatio, qualis affectio & cura	689.690
Toforum in artubus quæ sit causa podagricis	718	Venæ sectionis quæ magnitudo, fi- gura, & quod tempus sit	146	Vesicæ sanguinis floris auxilia	690
Toforum in artubus cura	749	Venæ sectionis iteratio, quomodo fiat & quando	146.147	Vesicæ tubercula quomodo ad ma- turitatem producenda	692
Tomentorū subditiōrū ratio	179	Venarum pulmonis rupturæ unde cognoscantur	507	Vesicæ ulcerum curatio ibidem, & inde	697
Tonillarum inflammationum re- media	479	Venarum apertio & corrosio unde proueniat	507	Vesicæ laborantium diætæ	697
Tonillarum ulcera qualia, quomo- do fiant & curentur	480.481	Venas eleuatas & incuruas ex mem- bris fluxione infestatis auferen- das	723	Vesicæ fluxionis auxilia	698
Tonillis infixas spinas quomodo educas	482	Venenata animalia quibus artibus tollas	763	Vesicæ resolutæ curatio	322
Tonoris emplastrum	654	eorum moribus quo- modo medearis	ibidem	Vesicæ scabiosæ medicamenta	687
Terminum intestinorum ortus & cura	599. & 601.608. & inde usq; 618	Venenata animalia quæ fugēt & quæ occidant	764	Vesicæ paralyti dissolutæ auxilia	688
Torpedinis qualis caro	108	Venenatorum animalium quæ leta- liter corrumpant	778	Vesicam quæ purgent	175
Torpedinis usus	116	Venenosum pharmacum ne lædat præseruatiua	779	Vespas & apes fugantia	765
Torpor, uide Lethargus.		Venenum qui sumpserint quomo- do cognoscendi	779	Vibicum à uerbere illatarum reme- dia	449
Troxicum unde dictum, & quæ eius uis	787	Veneni omnis curationes commu- nes	780	Victus ratio cuiq; ætati	203.204
Tragacanthæ dinotio	119			Vigiliarū in febribus remedia	277
Tragacanthus, qualis	69			Vigo	
Tragorigani facultas	56.150				
Transseuntia tarde quæ sint	132.133				
Tremorum in febrib. curatio	285				
Tribuli efficacia	69				
Trichiasis quid	364				
Trichiasis quid & quomodo curan- da	364				
Trifolij facultas	51.69				
Trifolium pro satyrio	63				
Trigla piscis qualis	106				
Triphyllon, trifolium	69				
Tritici facultas	61				
Triticeæ farinæ usus in cataplasma- tis	190				

AETII INDEX.

Vigoris totius morbi cognitio 231
 Vinaceorum facultas 19
 Vini uis 55
 Vinorum qualitas iuxta colorem 134.135
 Vinum cur acescat 5
 Vina quomodo alant 127.128
 Vina qualia senibus cōueniant 198
 Vini bilē & pituitam purgantis præparatio 154
 Vinum quod melancholicis auxilietur quomodo componatur ibidē
 Vini potus usus in morbis oculorū 366
 Vinum polypodites 154
 Vinū mulsū stercus exigēs ibidē
 Vinū mulsū flauū, itē quod atrā bilē, itē quod pituitā expurget 155
 Vinum scybelites quod 561
 Vindemiatoris ortus 182
 Violæ qualitas 35
 Violæ albæ energia 153
 Violatum oleum 26
 Viperæ usus & qualitas 112
 Viperarum adeps qualis 109
 Viperarū capitū usus medicus 110
 Viperarū esus & præparatio in elephantiasi 812
 Viridis iaspidis usus 552
 Viscerum animalium qualitas 103
 Visci uis & constitutio 35
 Viscum optimum quod 118
 Vitex siue Agnos 9
 Vitis albæ uires 12
 Vitis nigræ facultas ibidem
 Vitiliginum origo, & curatio 826.827
 Vitulinarum carnis qualitas 102
 Vitulinum seuum quale 109
 Vitri uis medica 83
 Vitri leuissimē triti usus 406
 Vlcerationis circa os sacrum, item circa scrotum & anum, in febribus curatio 282.283
 Vlcerum sedis proserpentium & de pascantium medicinæ 843
 Vlcerum, & cautorum ulcerum curā dorum ratio 864.865
 Vlcerum suppurandorum, repurgandorum ac incarnandorum medicamenta 865
 Vlcerum carne excrescentium remedia 867
 Vlceribus cicatricē inducentia 868.869.870
 Vlcerā quæ citra mordacitatem exciccent 871
 Vlceribus medicamentorum adhibendorum ratio ibidem
 Vlcerum ligamenti ratio 872
 Vlceribus malignis qualia emplastra conueniant 873
 Vlcerum post cicatricem obductam rursus ruptorum cura 874
 Vlcerum uermes ac noīas ac putredines quomodo sanes 875
 Vlcerosæ lassitudinis causa & cura 210
 Vlmi qualitas 61
 Vlophoni efficacia 787
 Vmbilici puerorum procidētiae causa & cura 202
 Vmbilici ueneris uirtus 44
 Vnguenta odorata quibus commo-

dent, eorumq; ratio 30
 Vnguenta recalcatoria post stupefactiuorum medicamentorū usum adhibenda qualia 729
 Vnguenti purgatorij cōpositio 171
 Vnguentorum siccorum moschatorū ac uariorū præparatio 1025
 Vnguentorum quæ doctrinam sustineant, & quæ non 856
 Vnguis oculi quid, ipsiusq; cura 395.174
 Vnguim abscessuum medelæ 899
 Vnguim contusorum, subcruentorum, motorum, scabrorum ac leproforum cura 900
 Vnguibus reparandis quid conueniat 901
 Vnguū ex animalib. quis usus 110
 Vocalis instrumenti resolutio quomodo curetur 322
 Vociferatio quid, eiusq; usus 139
 Vocis suppressæ & asperæ, aut raucae & cæt. 492. & inde
 Volucriū animalium caro qualis 104
 Volucrum animalium partes quomodo differant 104
 Voluulus quid, eiusq; generatio & remedia 567
 Vomentes ægrē quō iuandi 223
 Vomitus ratio & usus insignis, item quibus conueniat & quibus non 165.166
 Vomitus quæ iuuent, quæq; sedent 166.167.168. & inde
 Vomitoria qualia debeāt esse 166
 Vomitus prænotio & significatio 239
 Vomitus cataplasmata & epithemata 543
 Vranium collyrium 427
 Vrentia medicamina 882
 Vrinarum qualitas 98
 Vrina an bibenda 98
 Vrinæ notæ 139
 Vrinæ proliciendæ qualis glans præparetur 175
 Vrinā cientia remedia 656.673
 Vrinarum signa 234.237. & inde
 Vrina naturalis & optima quæ tam in sanis quā ægris 235
 Vrinæ subsidentia alba non semper bona ibidem
 Vrinæ subsidentiarum signa 237
 Vrinarum oleosarum differentiæ & significationes ibidem
 Vrinæ difficultas quid, & eius remedia 684
 Vrinæ difficultatis in febribus auxilia 695
 Vrinæ suppressio quid 686. eius medicinæ 686
 Vrinam in somno emittentium auxilia 689
 Vrinæ mucosæ, capillis aut lanis fissilis, medicamenta 698
 Vrsinum fel quale 98
 Vrsinum seuum quale 109
 Vrticæ uires 10
 Vsta quomodo mutant qualitatem suam 76
 Vstoria simplicia quæ 124
 Vteri animalium qualitas 104
 Vteri situs, magnitudo & forma 955

Vtero prægnantis quæ & quo ordine innascantur 956
 Vteri frigidioris signa & medicinæ 972
 Vteri calidioris indicia & curatio 972
 Vteri humidioris ac siccioris medelæ 973.974
 Vteri strangulationis remedia 995. & inde usq; 999
 Vteri suffocationis auxilia 999
 Vteri debilitatis sanatio 1000
 Vteri furor, resolutio & prolapsus quomodo medeantur 1001
 Vteri reclinatiois, auersionis & recursus medicamenta 1003
 Vteri inflatio & hydrops quomodo curentur 1004.1005
 Vteri tumoris laxi & inflammationis pharmaca 1007.1008
 Vteri in tumorem indurati medicamina 1011
 Vteri abscessuum uariorum medelæ 1013.1014
 Vteri exulceratio, ulcera carbunculosa & sordida, quomodo curentur 1015.1016
 Vteri humor profluus & nomæ quomodo medenda 1016
 Vteri canceri obturationisq; medelæ 1017.1018
 Vterus non perforatus tripliciter contingit, & quomodo curetur 1019
 Vteri hæmorrhoidum & calculorū medicinæ 1020
 Vteri thymorum, uerrucarū, & uerrucarum formicarum medelæ 1022
 Vteri condylomata, rugæq; ac fissuræ quomodo curentur 1023
 Vterum euacuantia 175
 Vuæ temperamentum 65
 Vuæ iminaturæ succus quo differat ab aceto 5
 Vuæ passæ qualitas 16
 Vuarum reponendarum ratio 65
 Vulcania quid 411
 Vulnerum cruentorū remedia 857
 Vulneribus cruentis glutinandis ac comoda emplastra 916
 Vulpes quem usum in medicamentis præstent 111
 Vulpini pulmonis uis medica 109
 Vulpinus adeps qualis 171
 Vulsio quomodo fiat & curetur 897

X
 Anthij qualitas 55
 Xeromyron ad capitis fluxionem 333
 Xiphion quale 55
 Xylocollæ dinotio 118
 Xyster collyrium 431.432

Z
 Arinaca, bolus Armenicus 80
 Zarnacha idem ibidem
 Zea quid 33
 Zigir, species Cassiæ 118
 Zingiberis uirtus 33
 Zoili nardinum collyrium 436
 Zoili Nicarium, collyrium 436
 Zygis serpylli species 32
 Zyma, id est, fermentum, quale 33
 Zythi qualitas 33

FINIS INDICIS.

*Lugduni excudebant Godefridus & Marcellus
 Beringi fratres, M. D. XLIX.*



1888